

LOUIS VIDAL

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES

1938

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
PARIS



LOUIS VITALE

P. 1154

PHARMACEUTIQUES
DE SPÉCIALITÉS
ET DE TONNAGE



1930

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
11, rue Quinze-Vingts, Paris (V)

Cet ouvrage est distribué par les soins de :
OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

===== SIÈGE SOCIAL : =====

11, rue Quentin-Bauchart, Paris (VIII^e).

Téléph. : Élysées 90-91.

AGENCE DE LYON :

8, rue des Marronniers.

Tél. : Franklin 39-83.

AGENCE DE MARSEILLE :

15, rue La Fayette.

Tél. : National 12-65.

AGENCE DE BORDEAUX :

1, rue Albert-de-Mun.

== Tél. : 76-20. ==

AGENCE DE LILLE :

5, rue Gauthier-de-Châtillon.


== Tél. : 212-48. ==



OFFICE BELGE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

47-51-55-57, rue François-Bossaerts, Bruxelles.

===== Tél. : 15-79-05. =====





DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

Le Dictionnaire des Spécialités Pharmaceutiques, dont les
éditions antérieures ont été, depuis sa première édition, le
manuel indispensable de tous les pharmaciens, est, par sa
actualité et sa précision, devenu le livre de poche de
tous les médecins et de tous les pharmaciens.
Les renseignements qu'il contient sont
complètement à jour.

" A 313 "**Usage externe.**

Solution huileuse de vitamine A et de ses produits de désintégration.

Indications. — Traitement des plaies atones, suppuration chronique, escarres, brûlures étendues, fistules, détermine un bourgeonnement très actif des tissus et provoque la cicatrisation.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de un cc.

Utilisation. — *Plaies atones, escarres, brûlures.* Répandre sur le tissu à traiter le contenu d'une ou plusieurs ampoules, recouvrir de gaze stérile et laisser en place 4 jours. *Fistules, Foyers d'ostéomyélites.* Injecter la solution dans le trajet fistuleux ou dans le foyer. Répéter les injections tous les 2 jours.

" A 313 "**Injectable.**

Solution huileuse de vitamine A pour injections intramusculaires.

Indications. — Traitement des infections généralisées. Septicémies, Pneumonies, Fièvres typhoïdes. Ostéomyélites aiguës.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 0 cc. 5.

Utilisation. — Injections intramusculaires, une ampoule tous les 2 jours chez l'enfant, une ampoule tous les jours chez l'adulte.

Labor. pharmaceutiques CHABRE Frères
TOULON



A « 313 »

A ingérer.

Solution huileuse de vitamine A à 5 %, en capsules à ingérer.

Indications. — Tous les États infectieux, notamment les Fièvres typhoïdes. Les Fièvres puerpérales. Les Hyperthyroïdies. Les Recto-colites. Les Infections locales. Les Syndromes anémiques et neuro-anémiques. Les Héméralopies.

Présentation. — Boîtes de 20 capsules de 15 cgr. contenant chacune 7 mm. 5 de vitamine A.

Posologie :

Dans les affections aiguës : une capsule matin et soir au début du repas.

Dans les affections chroniques : une capsule avant le repas du soir.

Laboratoire pharmaceutique

CHABRE Frères

TOULON

ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique.
Le plus puissant antiseptique urinaire.

Composition. — Citro-lactate de lithine.
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de quinoléine.

Indications. — Affections des reins et de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, urétrites, etc.). Goutte, arthritisme, gravelle, rhumatismes, artériosclérose, dysenterie amibienne.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée.

Le flacon : 16 fr. 65.

Laboratoire de l'ABSURIC

17, rue de Provence — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 76-18.)

ACATAR

(a **privatif**, contre le catarrhe).

Médication balsamique par excellence.

Composition. — Pilules glutinisées à base de Baume de Tolu, Baume d'Abiès, Cinnamo-benzoate de soude, Goudrons de pinus et Juniperus (Harlem), Argent colloïdal.

Indications thérapeutiques. — Véritable balsamique très doux n'irritant pas les reins, médication antiseptique et anti-infectieuse, modifiant les sécrétions, applicable dans tous les écoulements aigus ou chroniques, toutes manifestations catarrhales irritatives ou douloureuses des voies urinaires, bronchiques, biliaires, intestinales (cystites, cystalgies, pollakiurie, toutes affections prostatiques, uréthrites, néphrites, toutes pyélo-néphrites, tuberculoses rénale ou intestinale, etc...).

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 9 pilules par jour en 3 fois. (60 pilules par flacon.)

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X°).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

ACÉCOLINE

Chlorure d'acétylcholine en solution anhydre et stable, directement injectable par voie intramusculaire.

Boîtes de 3 et de 8 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 cgr.

Propriétés. — L'Acécoline dilate les artères de la périphérie, résout les spasmes vasculaires et régularise la circulation périphérique. Elle renforce, en outre, puissamment le tonus des muscles lisses et rééquilibre le système neuro-végétatif.

L'Acécoline est parfaitement tolérée, elle n'a pas de contre-indication.

Indications et posologie :

- 1° *Affections artérielles périphériques* : Artérites chroniques, syndrome de Raynaud : 20 à 60 cgr. par jour ;
- 2° *Affections veineuses périphériques* : Ulcères variqueux, 10 cgr. par jour ; Phlébites, 10 à 40 cgr. par jour ;
- 3° *Affections vasculaires générales* : Hypertension artérielle, angine de poitrine : 10 à 20 cgr. par jour.
- 4° *Affections neurologiques* : Ramollissement cérébral, 20 à 40 cgr. par jour ; troubles de la ponction lombaire, 20 cgr. ; sciatique, 20 cgr. par jour ;
- 5° *Indications ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques* : Spasmes de l'artère centrale de la rétine, 20 à 40 cgr. par jour ; Glaucome, 20 cgr. par jour. Vertiges labyrinthiques, Bourdonnements d'oreilles, Ozène, 10 à 20 cgr. par jour ;
- 6° *Indications gastro-entérologiques* : Hypochlorhydrie, Hyperchlorhydrie, 20 à 40 cgr. par jour. Atonie vésiculaire, 10 à 20 cgr. par jour ;
- 7° *Indications phthisiologiques* : Sueurs profuses des tuberculeux, 2 à 4 cgr. par jour.

L'Acécoline et ses associations thérapeutiques ne doivent pas être prescrites en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de leurs effets vasculaires.

Boîtes de 3 amp. à 10 cgr. : 12 fr. ; 8 amp. : 30 fr.

Boîtes de 3 amp. à 20 cgr. : 15 fr. ; 8 amp. : 40 fr.

Assurances Sociales, Classe B.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

ACÉCOLINE-PAPAVÉRINE

Composition :

	Pour 1 ampoule de 2 cc. :	
Chlorure d'acétylcholine (Acécoline : marque déposée).....	0 gr. 10	0 gr. 20
Phénylglycolate de papavérine.....	0 gr. 05	0 gr. 05

Boîtes de 3 et de 8 ampoules pour chacune de ces deux formules.

Bien préciser, en Acécoline, le dosage prescrit (10 ou 20 cgr.).

Propriétés. — L'Acécoline dilate les artères par voie nerveuse en excitant le parasympathique.

Le phénylglycolate de papavérine atteint le même but par action directe sur le muscle artériel. Il en provoque le relâchement et s'oppose ainsi à toutes les excitations spasmodiques réflexes.

De l'association de ces deux actions, nerveuse et musculaire, résulte une artério-dilatation maximum, propriété essentielle de l'Acécoline-Papavérine.

Il en résulte, en outre, un renforcement et une prolongation du pouvoir hypotenseur de l'Acécoline.

Indications médicales :

- 1° *Artérites des membres, claudication intermittente* : 1 à 3 ampoules à 20 cgr. par jour ;
- 2° *Spasmes des artères rétiniennes*, 1 à 3 ampoules à 20 cgr. quotidiennement ;
- 3° *Migraines ophtalmiques* : 1 ampoule à 10 ou 20 cgr. ;
- 4° *Hypertension artérielle, migraines rebelles* : 1 à 2 ampoules à 10 cgr.
- 5° *Ramollissement, épilepsie* : 1 à 3 ampoules à 20 cgr. dans les accidents graves. Dans l'état de mal épileptique, injection intraveineuse d'une ampoule à 10 cgr. ;
- 6° *Angine de poitrine* : 1 ou 2 ampoules à 10 cgr. par jour.

Indications chirurgicales.

- 1° *Gangrènes par artérites* : 1 à 4 ampoules à 20 cgr. par jour ;
- 2° *Embolies artérielles* : 1 à 4 ampoules à 20 cgr. par 24 heures.

L'Acécoline-Papavérine ne doit pas être prescrite en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de ses effets vasculaires.

Boîtes de 3 ampoules à 10 cgr. : 13 fr. ; à 20 cgr. : 16 fr.

Boîtes de 8 ampoules à 10 cgr. : 32 fr. ; à 20 cgr. : 42 fr.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

(Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

ACÉCOLINE-SPARTÉINE

Vaso-dilatateur et Toni-cardiaque.

Acécoline (Chl. d'Acétylcholine) 0 gr. 10

Spartéine (Sulfate) 0 gr. 05

Hypertension avec insuffisance cardiaque. Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour.

Boîtes de 3 ampoules : 12 fr. 50 ; de 8 ampoules : 31 francs.

Assurances Sociales, Classe B.

ACÉCOLINE-CAMPHRE

Vaso-dilatateur et Eupnéique.

Acécoline (Chl. d'Acétylcholine) 0 gr. 10

Camphre 0 gr. 20

Dyspnée des hypertendus. Asthénie des hypertendus.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir.

Boîtes de 3 ampoules : 12 fr. 50 ; de 8 ampoules : 31 francs.

Assurances Sociales, Classe B.

ACÉCOLINE-YOHIMBINE

Hypotenseur et Sympathicolitique.

Acécoline (Chl. d'Acétylcholine) 0 gr. 10

Yohimbine 0 gr. 01

Hémorragies cérébrales et méningées. Hypertensions paroxystiques.

Contre-indications. — Ramollissement cérébral et spasmes des artères rétinienne.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir, 2 ampoules dans les cas d'urgence.

Boîtes de 3 ampoules : 12 fr. 50 ; de 8 ampoules : 31 francs.

Assurances Sociales, Classe B.

Les associations thérapeutiques de l'Acécoline ne doivent pas être prescrites en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de leurs effets vasculaires.

ACÉCOLEX

Pâte trophique à l'Acécoline.

Traitement des Ulcères variqueux, des Plaies atones et des Dermatoses. (Chlorure d'Acétylcholine ; fenchone ; oxydes de zinc, de titane, etc.)

Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.

Le tube de 35 gr. : 17 francs ; de 105 gr. : 37 francs.

Assurances Sociales, Classe B.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

ACEPILINE

Composition. — Acétone très pur, Alcool, Pilocarpine, Essences aromatiques stimulantes déterpénées.

Indications. — Alopecies post-fébriles, Alopecies séborrhéiques.

Posologie. — Chaque matin, peigner au démêloir et à la brosse dure, puis friction à l'Acepiline avec une brosse à dents demi-dure, raie par raie pendant 10 minutes pour la femme, ou durant 5 minutes sur toute la tête pour l'homme. Quand les cheveux morts cesseront de tomber, continuer par périodes d'une semaine de temps en temps.

Le flacon 250 cc.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).
(Tél. : Gobelins 39-44.)

ACÉRYL

Composition. — Extrait fluide concentré sucré et aromatisé, contenant les principes actifs du trèfle d'eau, du pissenlit, du maïs, de l'épine-vinette, de la benoîte, associés aux principes aromatiques de la verveine, de l'angélique et de l'écorce d'orange amère.

Propriétés et indications. — Médication apéritive et stimulante du foie et de l'estomac. — Spécifique de l'anorexie. — Uniquement à base de plantes. — Aucun produit chimique. — Aucun produit toxique.

Posologie et mode d'emploi. — Aucune contre-indication. Une cuillerée à café dans un 1/2 verre d'eau trois fois par jour, un quart d'heure avant chaque repas.
Enfants : demi-dose.

Prix : 20 francs le flacon de 125 cc. représentant 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE

J. BLANCHARD

PONT-DE-VAUX (Ain).

(Tél. : 86.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 1195-1.

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaine.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS. (Tél. : Littré 26-92.)

ACÉTAMONE

Préparation à base d'acétate d'ammoniaque stabilisé chimiquement pur.

Composition. — Présenté dans une solution de pH optimum assurant une conservation indéfinie.

Une cuillerée à soupe = 1 gr. d'acétate d'ammoniaque stabilisé.

Propriétés. — Stimulant diffusible le plus énergique et le plus inoffensif, diaphorétique, tonique, anti-infectieux.

Indications. — Toutes les *maladies fébriles*. — *Maladies infectieuses* : grippe, rougeole, rubéole, varicelle, oreillons, scarlatine, etc. — *Les affections aiguës de l'appareil respiratoire* : angine, trachéite, bronchite, congestion pulmonaire, broncho-pneumonie, pneumonie. — *Les affections cardiaques* : myocardites, collapsus.

Présentation et prix. — Flacon de 150 cc. : prix 16 fr. 65.

Posologie et mode d'emploi.

Adultes : 3 à 8 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 3 à 8 cuill. à dessert par jour suivant l'âge.

Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café par jour à prendre pur ou dans un liquide tiède.

Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD

Docteur ès Sciences.

Ancien chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris
40, rue de Bellechasse, Paris (VII^e). (Tél. : Inv. 78-44.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 111-10.

ACÉTO-STERANDRYL

Acétate de Testostérone.

Composition. — Ether-sel de l'hormone testiculaire cristallisée, obtenue synthétiquement.

Forme. — L'*Acéto-Sterandryl* est une solution huileuse d'acétate de testostérone.

Boîte de 1 ampoule 1 cc., 40 mgr.

Boîte de 5 ampoules 1 cc., 40 mgr.

Boîte de 5 ampoules 1 cc., 10 mgr.

Indications. — Prostatiques en rétention complète aiguë ou chronique. Mastopathies. Hyperménorrhées. Métrorragies des Fibromes.

Posologie. — On variera la posologie suivant les cas à traiter en se basant sur les directives puisées dans la littérature de l'*Acéto-Sterandryl*.

(Voir *Sterandryl*.)

Prix au public :

Boîte de 1 ampoule 1 cc. à 40 mgr. : 65 francs.

Boîte de 5 ampoules 1 cc. à 40 mgr. : 300 francs.

Boîte de 5 ampoules 1 cc. à 10 mgr. : 75 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSÉL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

ACÉTYLARSAN

4 oxy — 3 acétylamino — phényl — 1 arsinat de diéthylamine.

Solution aqueuse neutre et stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien tolérée. Toxicité réduite.

Indications. — Arsénothérapie de la Syphilis et de certaines protozooses par les voies sous-cutanée ou intramusculaire.

Présentations et posologie. — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23,6 p. 100, 1 cm³. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cm³. (Boîtes de 10.)

Acétylarsan infantile : solution à 9,4 p. 100, 1 cm³. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cm³. (Boîtes de 10.)

Injectons hebdomadaires ou bihebdomadaires (consulter la *Notice spéciale*).

Prix de vente :

A. *Pour adultes* : 35 francs.

A. *Infantile* : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ACOBELLA

Le médicament sédatif de la Toux.

Forme. — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 20 comprimés.

Formule. — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; Extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera, 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de Lobelia 0,01 ; Benzoate de soude, 0,01 ; Poudre de Dover, 0,06 pour 1 comprimé.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Indications. — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacilliose pulmonaire.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-1.

Prix : 13 francs.

Laboratoire HOCQUETTE

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

ACOLITOL

Topique intestinal.

Composition. — Charbon organique pur, charbon activé, carbonate de calcium amorphe, salicylate de bismuth, peroxyde de magnésium, belladone pulvérisée titrée (0,01 par dose).

Présentation. — Granulé fondant et poudre.

Propriétés. — Topique intestinal de choix, neutralisant, fixateur et sédatif. Entrave les processus inflammatoires. Ramène à la normale le chimisme de l'intestin, en régularise le péristaltisme. Empêche les fermentations anormales. Adsorbe les toxines microbiennes endogènes ou exogènes. Modifie la flore protéolytique.

Indications. — Colites, gastro-entérites, entéro-colites, fermentations, intoxications et auto-intoxications, infections intestinales, dysenterie, entérite des tuberculeux, colibacilliose.

Posologie. — Une cuillerée à entremets croquée ou délayée dans un demi-verre d'eau le matin à jeun, et une 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

(Voir Rect'Acolitol, pansement recto-sigmoïdien).

Prix : 18 fr. 75.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII°)

(Tél. : Élysées 17-46.)

ACONITINE HOUDÉ

Granules titrés à 1/10^e de milligramme.

Propriétés thérapeutiques. — Action analgésique, puis anesthésique, *élective*, sur les noyaux sensitifs bulbo-spinaux (Nerfs de la face, *trijumeau*).

Indications. — Médication *spécifique* des *névralgies faciales graves ou rebelles*. Très efficace dans certaines *sciatiques*.

Présentation. — Granules titrés à 1/10^e de milligramme de Nitrate d'aconitine (alcaloïde de l'*Aconitum Napellus*).

Posologie. — Produit très actif à petite dose. Débuter par un granule (dépistage des intolérances). Augmenter jusqu'à 5 granules, par doses réfractées. Limite maxima : 10 granules (1 milligramme). Contre-indications : Insuffisance cardiaque ou urinaire.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 40-58.)

ACTICARBINE

2 formes, 4 formules.

Granulé anisé : *Acticarbine simple* ; Charbon animal purifié ; charbon végétal suractivé, Hexaméthylène. Tétramine chimiquement pure ; *Acticarbine naphtolée* : Même association + 5 p. 100 benzonaphtol.

Poudre sans arôme, sans sucre (diabétiques).

Acticarbine simple : charbon animal purifié — charbon végétal suractivé — Hexaméthylène. Tétramine chimiquement pure.

Acticarbine naphtolée : Même association + Benzonaphtol + carbonate de chaux + magnésie calcinée + peroxyde de magnésium.

Contenance 125 grammes (flacon de 210 cc.)

Prix : Granulé 18 francs. Poudre : 18 francs.

Indications. — Toutes affections et infections gastriques, intestinales, biliaires, urinaires et troubles digestifs d'origine hépato-biliaire (auto-intoxication intestinale).

Posologie. — *Granulé* : 1 à 3 cuillerées à café à la fin des repas, croquées ou délayées dans un peu d'eau.

Poudre : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau.

Acticarbine poudre ne contenant pas de sucre peut être prescrite aux diabétiques.

Dans le cas où l'on recherche une action intense et rapide, prescrire *Acticarbine poudre* simple ou naphtolée selon les cas.

Intoxications alimentaires : empoisonnements : 3 à 4 cuillerées à soupe d'*Acticarbine* poudre délayées dans de l'eau (faire absorber ou introduire dans l'estomac par la sonde après lavage).

Par la finesse de leur grain, les Charbons utilisés dans les préparations de l'*Acticarbine* développent une surface absorbante et adsorbante considérable.

Échantillons d'*Acticarbine* sur demande.

Laboratoires SEDA

149, avenue des Minimes — TOULOUSE

ACTIFORMINE

Forme. — Granulé effervescent soluble dans l'eau.

Composition. — Extrait rénal, Uroformine, Pipérazine, Benzoate de soude, Lithine, Citrons.

Action. — Active la diurèse. Élimine acide urique, urates et oxalates, antiseptise les suppurations rénales et urinaires, diminue la viscosité sanguine. Régularise la circulation, la tension artérielle et la nutrition des tissus.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Lithiase hépatique et rénale, Hypertension, Artériosclérose, Infections des voies urinaires.

Dosés :

2 à 4 cuillerées à café par jour dissous dans un demi-verre d'eau au début des repas.

Flacon contenant 25 cuillerées à café de granulé (8 jours de traitement).

Prix : 20 francs.

Laboratoires SEDA

149, avenue des Minimes — TOULOUSE

ACTIPHOS

A base de Phosphates Monométalliques de Magnésium, associés au Calcium, Manganèse, Lithium et Fer.

Caractéristiques. — Puissant modificateur du pH dans tous les cas d'alcalose sanguine ou urinaire.

Reminéralisateur et reconstituant puissant dans toutes les affections diathésiques caractérisées par un *Déséquilibre acido-basique* ou une *Déminéralisation*.

Mode d'action. — Rétablit l'équilibre acido-basique sans toucher à la réserve alcaline et sans déminéralisation par l'action de ses *Radicaux phosphatés non saturés*.

Avantages.

a. Au point de vue chimique : l'*Actiphos* est un composé de phosphates diacides. Il agit dans l'organisme par régularisation de l'acidité sanguine ou urinaire et reminéralisation prolongée.

b. Au point de vue biochimique, l'*Actiphos* est un puissant modificateur des pH sanguin ou urinaire, qu'il ramène facilement à la normale, lorsque ceux-ci sont altérés.

Par son emploi, dès la première quinzaine : un pH sanguin oscillant entre 7,40 et 7,45 descend aux environs de 7,32.

c. Au point de vue clinique : l'*Actiphos* améliore l'état général, active les sécrétions des glandes endocrines, tend à rétablir le fonctionnement normal des divers organes : estomac (dyspepsie), foie (insuffisance hépatique), pancréas (diabète), reins (lithiase), peau (eczéma, urticaire, herpès).

L'*Actiphos* augmente les puissances musculaire, nerveuse et cérébrale.

L'*Actiphos*, d'une tolérance remarquable, n'exerce aucune action irritative sur les voies digestives.

Forme. — Ampoules buvables de 3 cc. (non injectables).

Posologie. — Dose de 24 heures :

Adultes : 2 à 4 ampoules suivant avis médical, à prendre pendant les principaux repas dans un verre d'eau coupée de vin ou sucrée à volonté, et par petites gorgées.

Enfants : 1 à 2 ampoules suivant l'âge à prendre pendant les repas dans un verre d'eau sucrée à volonté.

Prix : 24 francs. (La boîte de 14 ampoules.)

Laboratoires du **GAMBÉOL**

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

42, rue Émile-Deschanel. — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 17-67.)

ADÉNOSEPTYL

Solution pour instillations et pulvérisations nasales.

Formule :

Argent colloïdal.....	0,30
Protéinate d'argent.....	0,30
Vitellinate d'argent.....	0,30
Solut. Adréaline au 1/1 000°....	1
Essence de Niaouli.....	0,016
Eucalyptol	0,016
Camphre	0,02
Excip. Glycéro-Hydro-Alcool.....	98,05

Indications. — Toutes les Affections du nez et de la gorge, Sinusites, Adénoïdites, Laryngo-trachéites, Etat grippal, etc.

Déterge la muqueuse sans l'irriter.

Mode d'emploi. — En *instillations*, à l'aide du compte-gouttes spécial ou en *pulvérisations*.

Prix au public : 16 francs.

Enregistré au Laborat. Nat. de Contr. sous le N° 884-3.

E. DUFOUR, Pharmacien.
AMPLEPUIS (Rhône). (Tél. : 55.)

ADIPO-FUGINE

DU

DOCTEUR L. DELALBRE

EX-ADIPOLYSINE

privée de son élément thyroïdien

PRÉPARATION

CHOLAGOUE ET OPOTHÉRAPIQUE
non toxique**RÉGULATRICE DE LA NUTRITION**

par modification physiologique de l'assimilation

PARTICULIÈREMENT EFFICACE CONTRE L'OBÉSITÉ**SANS RÉGIME****SANS DANGER**

Une seule formule pour les deux sexes

sans corps thyroïde ni glandes génitales.

PRÉSENTÉE sous forme de DRAGÉES

— COMPOSITION —

1° Poudres salines :

Phosphate de soude	0 gr. 04
Sulfate de soude	0 gr. 05
Sulfate de magnésium	0 gr. 06
Bicarbonate de soude	0 gr. 05
Citrate monosodique	0 gr. 06
Bromure de calcium	0 gr. 05
Hyposulfite de magnésium	0 gr. 02

2° Poudres d'organes :

Poudre d'estomac	0 gr. 02
— de duodénum	0 gr. 01
— d'intestin	0 gr. 02
— de foie	0 gr. 05
— de pancréas	0 gr. 04
— de rate	0 gr. 03
— de surrénale	0 gr. 002
— d'hypophyse	0 gr. 001

Pour 1 dragée.

Excipient spécialement étudié.

— Enrobage soluble dans l'eau.

— EFFETS PHYSIOLOGIQUES —

Les effets physiologiques de l'Adipo-Fugine dépendent essentiellement des instants où s'effectuent les décharges biliaires après l'absorption de quantités données de ce produit médicinal cholagogue par rapport au x heures du début ou de la fin des repas.

— PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES —

Selon les moments de son administration,

L'ADIPO-FUGINE**FAIT MAIGRIR LES OBÈSES****Accélère les DIGESTIONS LENTES****Guérit la CONSTIPATION**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE L'ADIPO-FUGINE

Obésité sous toutes ses formes

Digestions lentes

Constipation opiniâtre

Aérophagie — Insuffisance du Foie — Entérite

Débilité minérale magnésienne et sodique

Carence soufrée

AUCUNE CONTRE-INDICATION

— MODE D'EMPLOI ET DOSES DE L'ADIPO-FUGINE —

Les dragées s'avalent avec un peu d'eau ou bien à sec.

On peut aussi les ingérer écrasées et mélangées à de la confiture.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

ADULTES :

OBÉSITÉ : 3 dragées à la fois 1/2 heure exactement avant le début de chacun des 2 principaux repas.

DIGESTIONS LENTES : 3 dragées à la fois au milieu de chacun des 2 principaux repas.

CONSTIPATION : 3 dragées à la fois le matin à jeun et 3 également le soir au coucher, le plus loin possible de la fin du dernier repas.

Ces doses répétées tous les jours pendant plusieurs mois consécutifs, et même plusieurs années avec intervalles de repos.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS : 2/3 des doses ci-dessus.

ENFANTS : 1/3 des doses ci-dessus.

PRIX AU PUBLIC : 27 fr. 00 LE FLACON de 60 dragées.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

P.-L. DUMONT, Pharmacien

2, rue Claude Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

Tél. : Michelet 24-11 et 22-68.)

ADOVERNE « ROCHE »

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Action thérapeutique. — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

Avantages. — Etalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

Posologie. — XL gouttes ou 4 granules ou un suppositoire = 1 cc. d'une solution à 5 p. 1.000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Modes d'emploi. — Par voie buccale : XX à XL gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Par voie rectale : 1 suppositoire une à trois fois par jour.

Adoverne « Roche »

Gouttes (flacon de 15 cc.).

Granules (flacon de 60).

Suppositoires (boîte de 6).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-2 (*gouttes*), 504-3 (*granules*), 504-64 (*suppositoires*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

ADRÉNALINE CARRION

Adrénaline *naturelle*, extraite des glandes surrénales.

Formes :

Solution au millième en ampoules, pour injections, et en flacon pour l'administration *per os* et l'usage externe.

Indications :

Adynamie, hypotension, Maladie d'Addison, Vomissements incoercibles de la grossesse, Ostéomalacie, Rachitisme, Phénomènes de choc. Crise nitritoïde, Hémorragies, Applications locales.

Présentation et prix :

Le flacon de 10 cc. : 11 fr. 45.

La boîte de 6 amp. de 1 cc. : 11 fr. 45.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

ADRÉNALINE CHOAY

Chlorhydrate d'Adrénaline physiologique.

Nature. — Principe hypertenseur, vasoconstricteur et cardiotonique extrait des capsules surrénales (*Adrénaline naturelle*).

Indications:

Applications locales : Hémostase, Anesthésie locale (fixation de l'anesthésique).

Injectons hypodermiques ou intramusculaires : Hypotension. Etat de shock. Crises nitritoïdes. Asthme essentiel.

Par la bouche : Peu active. Préférer l'opothérapie surrénale totale.

Formes pharmaceutiques:

Flacons de 15 cc. de solution au 1/1000°.

(Vingt gouttes représentent 1 cc. de solution, soit un mgr. de chlorhydrate d'adrénaline.)

Ampoules de solution au 1/1000° (1/cc. = 1 mgr.).

Ampoules de solution au 1/2000° (1/cc. = 1/2 mgr.).

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

ADRÉNALINE CLIN

Adrénaline lévogyre chimiquement pure,
exempte de toute adrénaline racémique.

Pouvoir rotatoire : $53^{\circ},3$.

Propriétés. — Agent vaso-constricteur et hémostatique, ayant une action cardiotonique, antidépressive et antitoxique. Analgésique léger et antichoc.

Excitateur du système nerveux sympathique.

Indications. — Anesthésie locale, hémorragies ; phénomènes de collapsus, de choc ; syncope chloroformique ; infections générales avec adynamie ; asthme ; vomissements incoercibles de la grossesse ; intoxications aiguës ; asthénie ; crises nitritoïdes ; certaines algies ; ostéomalacie ; rachitisme ; maladie d'Addison ; certaines affections oculaires, etc.:

Formes. — 1^o *Solution aqueuse* (Chlorhydrate d'Adrénaline) au 1/1000. — Flacon de 5, 10, 30 cc. (20 gouttes = 0 gr. 001).

2^o *Ampoules injectables* (Solution aqueuse) dosées à 1/10, 1/4, 1/2, 1 milligramme par cc.

3^o *Ampoules compte-gouttes* de 10 cc. pour Collyres (Solution aqueuse à 1 0/00). Instillations nasales (Solution huileuse en ampoules compte-gouttes de 25 cc.).

4^o *Granulés* au 1/4, 1/2, 1 milligramme. — Flacons de 50 granulés.

5^o *Suppositoires* au 1/2 milligr.

Formes associées (cocainé, etc...) en ampoules.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

30, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ADRÉNALINE INVARI

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de pureté chimique et d'activité constante.

Action. — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

Indications. — Rachitisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

Formes. — Ampoules de 1 cc. boîtes de 6 ampoules au milligr. Solution au millièrme, flacons de 5 et 10 grammes.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 18-67.)

ADRÉNARGOL

Composition :

Adrénaline physiologique associée aux sels d'Argent : protéinate d'Argent et vitellinate d'Argent, en solution aqueuse, isotonique et stérile.

Avantages :

Bactéricide stable et énergique. Action rapide. Tolérance parfaite.

Présentation :

Ampoule nasale scellée très pratique à l'emploi. Olive compte-gouttes stérilisable.

Indications :

Infections du Rhino-Pharynx (Sinusites, Coryzas, Angines, etc.) ; Antisepsie des Voies respiratoires, de l'Œil, de l'Oreille ; prophylaxie des maladies contagieuses (Grippe, Coqueluche, Rougeole, etc.).

Posologie :

Rhinologie : IV à V gouttes dans chaque narine, matin et soir, plus souvent si nécessaire.

Otologie : quelques gouttes dans l'oreille malade, 2 à 3 fois par jour.

Oculistique : introduire 2 fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

Durée du traitement : 15 à 25 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

ADRÈNINE

Soluté au millième de Chlorhydrate d'Adrénaline cristallisée.

Véritable principe actif, extrait des Capsules surrénales.

XX gouttes = un milligramme = 1 cm³.

Anesthésie locale, Hémorragie, Phénomènes de Choc et de Collapsus cardiaque, Syncope chloroformique, Asthme, Vomissements incoercibles de la grossesse, Intoxications aiguës, Asthénie, Crises nitritoïdes, Maladies d'Addison, etc.

Dose forte :

Per os : C gouttes à doses fractionnées par 24 heure (toutes les heures X gouttes).

Conservation indéfinie.

Un flacon mal bouché s'évapore rapidement.

Flacon de 20 cc. Prix : 20 francs.

Ampoules au 1/10^e de milligr. et au millième.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

Formes. — Poudres. — Cachets. — Granulés.

Composition. — Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

Posologie. — 3 doses par jour.

Prix : Cachets : 14 fr. 75. Poudre : 12 fr.

Granulé : 12 fr.

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie

GRANVILLE (Manche).

ADRÉNOÏDES BÉRAL

Comprimés pour l'administration efficace de l'adrénaline par voie buccale.

Composition. — Chaque Adrénoïde contient 1/4 de milligramme d'adrénaline stabilisée, ce qui correspond à V gouttes de la solution d'adrénaline au millième.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline *per os*, avec cet avantage que l'absorption des Adrénoïdes par la muqueuse buccale met l'adrénaline à l'abri des altérations causées par le suc gastrique et évite sa destruction au niveau du foie.

« Depuis 1904, j'emploie systématiquement l'adrénaline et ai presque exclusivement recours à l'administration par voie buccale. Les résultats obtenus ne me permettent pas de douter de son efficacité. Netter. » (*Bulletin Société Biologie*, mai 1922.)

Mode d'emploi. — Laisser fondre les *Adrénoïdes* dans la bouche. « Ce serait perdre l'avantage de l'absorption par la muqueuse buccale que de les avaler. »

Posologie. — Un *Adrénoïde* toutes les 2, 3 ou 4 heures, soit de 6 à 12 par jour.

Tous états de dépression organique et circulatoire.

Formuler : Adrénoïdes Béral. Une boîte : 14 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ADRÉNOLÉINE

Forme pharmaceutique et composition. — *Huile adrénalinée* au millième, avec addition de chlorétone, orthoforme et essences antiseptiques. (Flacon de 20 grammes.)

Propriétés. — Vaso-constricteur, sédatif, antiseptique des voies respiratoires.

Avantages. — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée d'action* est considérablement *augmentée*, le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

Indications thérapeutiques. — Sinusites, Hémorragies nasales, Catarrhe nasal, Troubles respiratoires et Coryza de l'enfance, Adénoïdites aiguës.

L'Adrénoléine ne présente aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine), 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique (type Vaast grand modèle), *avant les inhalations*.

Prescripteur. — Un flacon *Adrénoléine Falvy*.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias. — PARIS (XVII^e). (Tél. : Étoile 18-26.)

ADRÉPATINE

Composition. — Association pluriglandulaire : Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate. — Extraits végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamélis. — Excipient antiseptique et calmant.

Propriétés et indications. — L'ADRÉPATINE est une préparation pharmaceutique qui :

- 1° Par les extraits polyglandulaires englobés ;
- 2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
- 3° Par son action vaso-constrictive locale ;
- 4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique, est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des hémorroïdes internes et externes, des Rectites, Prostatites, du prurit anal et des fistules.

Formes. — Suppositoires et pommade.

Posologie et mode d'emploi. — de 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de pommade est muni d'une canule rectale.

Durée moyenne des unités de vente : 12 à 15 jours.

Prix de vente	Boîte de 15 suppositoires.....	14 fr. 25
au public	Tube de pommade avec canule rectale ...	14 fr. 25

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). — (Trocadéro : 62-24.)

ADRÉPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 centicubes pour injections sous-cutanées.

Composition. — 1/4 milligramme d'Adrénaline et 2 centigrammes d'Éphédrine Béral par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline sous-cutanée, mais avec cette différence avantageuse qu'à dose égale elle est moins toxique, plus maniable et surtout d'une durée d'action beaucoup plus prolongée. De plus, cette action n'est pas suivie de la réaction hypotensive adrénalinique. Elle présente donc tous les avantages de l'adrénaline sans ses inconvénients.

Indications. — Toutes celles de l'adrénaline sous-cutanée, notamment : *Accès d'asthme déclenchés, États de choc avec défaillance circulatoire périphérique et collapsus (chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), États hémogéniques, Purpuras, Anémies Hémoptysies, Urticaire (effet immédiat), etc.*

Posologie. — De 1 à 4 centicubes sous-cutanés. Chez sujet neuf, débiter par 1 centicube. Comme pour l'adrénaline, éviter la voie musculaire qui pourrait exposer à injecter dans un petit vaisseau.

Prix : la boîte de 5 : 16 francs.

Formuler : Adréphédrine. Une boîte.

Laboratoire de l'Éphédrine BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

AÉINE

Médication type des troubles vago-sympathiques et particulièrement de l'émotivité et du trac.

Forme. — Petits comprimés jaunes de 0 gr. 25, non solubles.

Composition. — Complexe de cortico-surrénale (2 cgr.) associé à la Malonylurée (15 mgr.), Ephédrine (5 mgr.) et Peptone polyvalente.

Coefficient de toxicité nul, élimination en 1 h. 1/2 au lieu de 7 à 8 heures. Aucune contre-indication.

Indications. — Toutes affections ou symptômes sous la dépendance du déséquilibre vago-sympathique et endocrinien (instabilité vagale). C'est le terrain neuro-végétatif qui conditionne la maladie que le Dr Bayard a décrite sous le nom d'AEISME (Anxiété, Émotivité, Irritabilité et Insomnies). C'est le médicament des névrodermites, de l'urticaire, de l'asthme, névrose des voies respiratoires, des troubles psychiques de la menstruation et de la ménopause. (C. Litt, avec préface du Prof. Laignel-Lavastine) et communications aux Sociétés Savantes. (Thérapeutique et Pathol. comparée).

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour, 2 avant chaque repas ou en se couchant. 2 à 3 comprimés chez les enfants.

Prix : 13 fr. 30 le tube (pour 8 jours de traitement).

Laboratoire de l'AÉINE

6, place Clichy — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 65-18.)

AÉROCID

Conception entièrement nouvelle.

Traitement opothérapique de l'aérophagie et de ses conséquences.

Basé sur l'action de la parathyroïde dans le métabolisme du calcium, dont le rôle antispasmodique a été mis en évidence par de nombreux auteurs.

Formule :

Parathyroïde.....	0,001
Hypophyse.....	0,0035
Poudre Pancréas.....	0,02
Surrénine.....	0,02
Hépatine.....	0,30

Indications. — Aérophagie, Asthme, Emphysemé, Fausse angine de poitrine, Insomnie.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher, avec un verre d'eau.

Présentation :

Boîte de 20 cachets.....	20 fr. 80
Etui de 40 comprimés.....	20 fr. 80

Pour obtenir la guérison suivre le traitement 50 jours.

La Boîte-cure : 93 fr. 60.

Laboratoire de l'AÉROCID

G. SCHMIT, pharmacien

71, rue Sainte-Anne — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 19-26.)

AÉROCOLYL

du Docteur Moity

Granulé Fondant.

Introduction dans la thérapeutique courante de trois corps nouveaux.
1^o **GEL DE SILICE** en association synergique avec le *charbon suractivé* (aires d'absorption mutuellement augmentées de 50 p.100).

2^o **LE SILICATE DE CALCIUM ACTIVE.** — 5 gr. absorbent 268 cc. de gaz de fermentation.

3^o **LA FORMINE ARGENTIQUE** (combinaison d'argent et d'hexaméthylène-tétramine), antiseptique puissant non toxique.

Formule. — Gel de Silice, 5 (aire d'absorption $4,5 \times 106$ cc.).

Charbon activé, 15 (aire d'absorption $6,3 \times 106$ cc.).

Silicate de Ca activé, 7,50 (5 gr. absorbent 268 cc.) de CO_2 .

Formine argentique titrant 13 p.100 d'argent, 2.

Poudre de belladone, 0,15 pour 100 gr.

Indications. — Aérocolie, Aérophagie, Colites diverses, états infectieux du tube digestif, diarrhées, colibacillose, auto-intoxications, dermatoses.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café aux trois repas.

Prix : 17 fr. 60 la boîte contenant 125 grammes de granulé

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoire M. de RIVE

J.-O. MOITY, Docteur en Médecine et en Pharmacie

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

199, Bd Bineau — NEUILLY (Seine).

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert, PARIS (20^e).

AÉROPHAGYL

Combinaison complexe constituée par l'association à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br, sédatif; et Ca, antispasmodique.

Indications. — Spécifique de l'Aérophagie, dans toutes ses manifestations : digestives : éructations, ballonnements, aérocolie; respiratoires : dyspnées, faux asthme; circulatoires : tachycardie, palpitations, faux angor. Insomnies d'origine digestive. Gastrites nerveuses. Médication bromurée calcique dissimulée (0,25 CaBr par comprimé).

Posologie. — 1 à 2 comprimés délayés dans un demi-verre d'eau au milieu des repas. En cas de crise, 2 comprimés à la fois.

Enfants : Demi-dose.

Présentation et Prix. — Boîte de 45 comprimés, pour 2 semaines de traitement : 17 fr. 20.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

ÆSCULASE

Composition. — Alcoolature de marrons d'Inde stabilisée, extraits d'hamamélis et de capsicum.

Propriétés thérapeutiques. — Action vasoconstrictive énergique et constante sur le système veineux périphérique. Action régulatrice de la circulation, puissant analgésique, antihémorroïdaire.

Indications. — Tous les troubles circulatoires, Puberté, Ménopause, Hémorroïdes.

Mode d'emploi :

Troubles de la circulation : XV gouttes avant les deux repas. Hémorroïdes : pour éviter les crises X gouttes avant les deux repas.

Dans les crises aiguës : XX à L gouttes 2 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MICHELON

Docteur en pharmacie

20, boulevard Heurteloup — TOURS.
(Tél. : 308.)

ÆTHONE

Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche et de la Toux.

Doses. — 1° Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : I goutte par mois d'âge. de 1 à 2 ans : XII à XX gouttes. de 2 à 5 ans : XX à XXV gouttes. de 5 à 10 ans : XXV à XXX gouttes. de 10 à 15 ans : XXX à XXXV gouttes, et plus s'il est nécessaire.
------------------------	---	---

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée, de sirop de tolu additionné d'eau, ou dans une infusion de Guinauve sucrée avec du miel. L'Æthone doit être administrée 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

Prix au public : 12 fr. 40 le flacon.

Laboratoire de l'ÆTHONE

35, rue Boissonnade — PARIS.
(Tél. : Danton 92-10.)

AGARASE

(Comprimés.)

Régulateur et rééducateur des fonctions hépatiques et intestinales. Laxatif des femmes, des hépatiques, des gros mangeurs, des coloniaux.

Composition. — Extrait de bile purifiée, Peptones de levure (Vitamine B), Extraits intestinaux (Duodénum), Agar-Agar, Ferments lactiques, etc.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes. Constipation des neuro-arthritiques, de la grossesse, des sédentaires. Colites et entérites diverses, Maux de tête, Migraines d'origine intestinale, Maladies cutanées de même origine.

Affections hépato-biliaires, Congestions hépatiques des coloniaux et des gros mangeurs, Ictères, Cirrhoses, Cholécystites, Angiocholites, Lithiase biliaire.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés au repas du soir. A avaler avec un peu d'eau sans croquer.

Prix : 12 fr. 80.

G. RÉAUBOURG et Cie,
Docteur en Pharmacie,
115, rue de Paris,
BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

AGAROL

Traitement rationnel de la constipation.

Composition :

Émulsion parfaitement homogène et stable d'huile de paraffine, *spécialement traitée*, remarquablement pure et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphtaléine *chimiquement pure*.

Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalins.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications, constipation post-opératoire. Utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices. Absence totale d'inconvénients.

Action physiologique :

Pénètre et ramollit le bol fécal tout en facilitant son évacuation. Stimule doucement et sans irritation le péristaltisme du gros intestin.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion, ne cause ni nausées ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

De goût agréable naturel, l'Agarol est miscible à tous liquides : lait, eau sucrée ou non, infusions, potages.

Adultes : De 2 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES
(Tél. : 11-21-41.)

AGOCALCIUM

Neuro-sédatif de l'enfant.

Composition. — Sirop de framboise composé contenant par cuillerée à café :

Gluconate calcique.....	0 gr. 10
Lévulinate calcique.....	0 gr. 03
Gluconate magnésien.....	0 gr. 05
Chlorure de calcium.....	0 gr. 10
Bromure de calcium.....	0 gr. 10

Indications. — Etats spasmophiles, Convulsions, Décalcification, Rachitisme, Caries dentaires, Fractures, Hémostatique, Thérapeutique pré-opératoire.

Posologie. — De 2 à 4 cuillerées à café par jour, selon l'âge.

Prix : Le flacon : 18 francs.

Enreg. au L. N. C. M. sous le N° 1781-1.

Laboratoires de l'AGOCALCIUM

299, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).

(Tél. Mén. 82-89.)

AGOCHOLINE

Stimulant hépato-biliaire.

Forme.

Granulé soluble aromatisé à la menthe ou sans arôme.

Composition.

Sulfate de Magnésie desséché.
Peptone sèche purifiée.

Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.
Réalise le drainage des voies biliaires *per os* et le rend facile en clientèle.

Indications :

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.
Lithiase biliaire.
Ictère et Cholémie.
Cholécystites chroniques.

Certains troubles digestifs.	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.	} d'origine hépato-biliaire.
Certains troubles généraux.	{	Céphalées, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.	

Contre-Indications (Temporaires).

Cholécystites aiguës.
Diarrhées aiguës.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau chaude.
Enfants : A partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café, suivant l'âge.

N. B. — Il est bon de commencer par les doses faibles et de les augmenter progressivement, suivant la tolérance du malade.

Prix : 19 fr. 75

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux.
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.
24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e)
(Tél. : Diderot 28-96.)

AGOMENSINE

CIBA

EXTRAIT OVARIEN HYDROSOLUBLE.

Action physiologique. — Congestionnante de la muqueuse utérine, stimulante de l'ovaire, aide au déclenchement du flux menstruel et favorise l'apparition ou le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

Indications :

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec la Sistomensine).
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés. Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures.

Flacon de 20 comprimés

— de 40 —

— de 100 —

Boîte de 4 ampoules

(Voir Sistomensine.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

AGORÉNAL

Indications. — Toutes insuffisances rénales : augmentation sensible de la diurèse, élimination de l'acide urique. Dyspnées. Hypertension, etc.

Aucune contre-indication.

Composition. — Extrait total de rein.

Forme. — Ampoules buvables.

Prix : 26 francs la boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour, dans de l'eau sucrée, avant le repas.

Laboratoire de l'AGORÉNAL

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

AGOREXINE

Gentiane, Condurango, Colombo, Simarouba, Camomille romaine, Badiane, muqueuse gastrique.

Toutes les Inappétences.

Posologie. — Flacon contenant 1 000 gouttes, 1/4 d'heure avant les deux principaux repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée :

Adultes : XX à XXX gouttes.

Enfants : A partir de 1 an : 1 à 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 15 francs.

Laboratoires de l'AGOREXINE

37, avenue de la République — PARIS (XI^e)

AGO SELS

Médication des Gastro-Hépatiques et Entéritiques.

Composition. — Chaque paquet rigoureusement dosé et soigneusement préparé contient :

Sulfate de Na	0,60
Phosphate de Na	0,40
Bicarbonate de Na	0,20

Posologie. — Un paquet le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède au bain-marie et un autre paquet le soir 1 heure avant dîner ou selon prescription.

Indications. — Syndromes gastro-hépatiques, Dyspepsies, Insuffisances hépatiques, Hépatisme et ses conséquences, Cholécystites, Entérite, Constipation, Intoxications intestinales, Anorexies digestives.

Présentation. — En boîte de 30 paquets.

Aucune contre-indication.

Laboratoires FOSSET

MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).

Publicité : **Société d'Expansion thérapeutique**

Société anonyme au capital de 20 000 francs.

Siège social : 129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

R. C. : 248.921.

AGOZYMASE

Granulé de saveur aromatique.

Composition. — Sulfate de soude anhydre, Sulfate de Magnésie desséché, Chlorure de magnésium, Peptone purifiée, Extrait de boldo.

Indications :

- 1° *Maladies des voies biliaires* : Congestion du foie, Cirrhose, Atonie et Stase vésiculaires, Cholécystite.
- 2° *Maladies gastro-intestinales* : Dyspepsie, Atonie gastrique, Flatulence, Constipation.
- 3° *Maladies cutanées* : Prurits généralisés et localisés. Urticaires, Eczémas, Prurigos, etc.
- 4° *Action dérivative intestinale* : Dans l'Hypertension artérielle, les Néphrites chroniques, les Migraines, les Céphalées.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café de granulé au réveil dans une infusion chaude ou dans eau de Vichy pendant 10 jours.

A renouveler après 5 jours de repos.

Prix : 17 fr. 70.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue République — CHAMPIGNY (Seine).
(Tél. : 16.)

AIGUE D'OR

Analga du D^r Redier.

Composition:

Diméthyle amido-antipyrine.....	0,25	} pour un verre à liqueur.
Salicylate de pyramidon.....	0,25	
Héroïne.....	0,001	
Plantes sédatives	Q. S.	

Propriétés. — Action thérapeutique du Diméthyle amido-antipyrine et du Salicylate de Pyramidon *considérablement renforcée* par la dose minime d'Héroïne. L'action tonique de l'alcool corrige l'action déprimante des calmants.

Indications. — Névralgies, Migraines, *Dysménorrhées, Tranchées utérines*, Douleurs dentaires, Coliques néphrétiques, *Gripes*.

Posologie. — 1 verre à liqueur renouvelé, si nécessaire, 1/2 heure après
Efficacité plus grande dans une tasse d'infusion.

Enfants: 1/2 ou 1/4 de dose, selon âge.

Sans contre-indication.

Présentation. — Liqueur agréable.

Le flacon de 6 doses : 16 francs.

Laboratoire de L'AIGUE D'OR

53 bis, boulevard de la Liberté — LILLE (Nord)
(Tél. : 5-45.)

AIROGLYCE

Composition. — Préparation bismuthée (oxyiodo-gallate de bismuth spécialement porphyrisée).

Mode d'action. — Réalise le pansement et l'antiseptie de la muqueuse urétrale.

Indications. — Blennorragie aiguë. Blennorragie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

Mode d'emploi. — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

Injection 27 francs.

Ovules : Agent thérapeutique de choix dans le traitement des métrites, vaginites, ulcérations du col, etc.

Suppositoires : Prostatites. Hémorroïdes.

Prix : Ovules : 19 francs. — Supposit. : 16 francs.

Laboratoires PIALOUX

55, rue de Chabrol — PARIS (X^e). Tél. : Prov. 10-51.

AKÉSOL MUZI

Spécifique de la douleur. Antithermique.

Rhumatisme. Sciaticque. Règles douloureuses.

Migraines. Grippe.

Cachets de valériamidoquinine caféinée :

Phénacétine.....	0,20
Pyramidon.....	0,10
Sulfate de quinine (essai physiologique).....	0,15
Caféine (essai physiologique).....	0,05
Valérianate de zinc.....	0,05
Poudre de cannelle.....	0,05
Bicarbonate de soude.....	0,20

pour 1 cachet.

2 à 3 cachets par jour au moment des repas dans 1/2 verre d'eau, ou mieux une infusion chaude.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1750-3.

Laboratoires BIOPHARMAX

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.).

ALBU-COLI

Médicament spécifique des affections aiguës et chroniques des Voies Urinaires.

A base d'extraît de feuilles de Biguignan (*Psiloxylon Mauritia num* D. Th.)

Ses 3 formes :

Granulé de saveur agréable. La boîte de 20 doses : 24 francs.

Comprimés. La boîte de 60 dragées : 23 francs.

Apozème de BIGUIGNAN, 10 jours de traitement : 18 fr. 75

Principales indications. — *Albuminuries, Colibacillose, Bactériuries, Lithiase rénale, Pyélo-Néphrites, Mal de Bright, Cystites, Prostatites, Urétrites, Hypertrophie de la prostate, Manifestations de l'Arthritisme et de l'Artério-Sclérose.*

Absence de toxicité : Ne détermine ni congestion ni inflammation ; tolérance absolue.

Posologie. — Granulé. Deux cuillerées à café de Granulé *Albu-Coli* trois fois par jour en dilution dans un demi-verre d'eau (entre les repas).

Comprimés : 1 à 2 comprimés à chacun des trois repas.

Apozème : trois fois par jour.

Cette posologie peut être doublée selon avis du médecin (en particulier dans la *Colibacillose*).

L'*Albu-Coli* est en dépôt chez tous les Grossistes et en vente chez tous les Pharmaciens.

Laboratoires ALBU-COLI

84, av. de Versailles — PARIS (XVI^e). (Tél. : Jasmin : 58-67.)

E. LEMONNIER, pharmacien.

ALBURÉNOL

Composition. — A base d'extraît de kawa, de barbiflore, de stigmates de maïs, de douce-amère et de saponaire.

Indications. — Albuminurie, œdèmes, néphrite aiguë, néphrite chronique, mal de Bright, cystite, calculs vésicaux, colibacillose.

Ne contient pas de produits chimiques.

Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Liqueur agréable à absorber.

Le flacon de 250 gr. : 16 fr. 80

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Laboratoire ALPHA

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

ALCACHOL

Granulé effervescent.

Composition :

Extrait d'Artichaut	5 gr.
Sulfate de Soude.....	8 gr.
Citrate de Soude	6 gr.
Phosphate de Soude.....	7 gr.
Bicarbonate de Soude	10 gr.
Granulé effervescent. Q. S. p ..	100 gr.

Indications. — Insuffisance hépatique, Cholécystite, Ictère catarrhal, Intoxication alimentaire, Urticaire, Gastralgie, Hyperchlorydrie, Entérite.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café avant les deux principaux repas, ou deux cuillerées à café, le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau. Ces doses sont variables et peuvent être modifiées par le Médecin traitant.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires COMBEFREYROUX

134, avenue Parmentier.

(Tél. : Ober. 51-10.)

ALCACYL WANDER

Composition. — Acétylsalicylate de calcium 0,50, alucol 0,4 pour un comprimé.

Sans action sur l'estomac, le cœur et les reins.

Forme. — Comprimés.

Indications. — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciatiques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagrégés dans un peu d'eau sucrée, avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet.

A répéter si nécessaire 3 à 4 fois dans les 24 heures.

Enfants : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

P. BASTIEN, pharmacien

CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

ALCALINOSE

Composition. — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs, Bicarbonate de sodium saturé.

Action. — L'ALCALINOSE fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître ; régularise les sécrétions digestives ; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée de transit gastrique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées-mesure avant les repas dans 1/2 verre d'eau, ou 2 à 3 cuillerées mesure le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau.

Traitement pour 15 jours.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pyloréctomie, Aérophagie et Dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses, Entérites et Colites chroniques, Acidose.

Prix : Poudre 8 francs. Granulé 10 fr. 50 (10 jours).

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

ALCALISALYL

Association de salicylate et de bicarbonate de soude.

Granulé effervescent.

Composition. — Chaque mesure dissoute représente :

Salicylate de soude.....	1 gramme
Bicarbonate de soude.....	1 —

Comprimés glutinisés.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Salicylate de soude.....	0 gr. 40
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 15

Avantages. — Antiacidosique grâce au bicarbonate et bien toléré par l'estomac.

Mode d'emploi. — Une mesure dissoute dans un demi-verre d'eau sucrée de 3 à 10 fois et plus par jour. Ou de 5 à 20 comprimés par jour.

Prix : La boîte de granulé = 31 mesures : 22 francs. L'étui de 80 comprimés : 20 francs.

Ampoules pour injection I. V.

Composition. — Solution contenant 1 gramme de salicylate de soude dans 10 cc. de sérum glucosé à 10 p. 100.

Avantages. — Avec cette solution, dont le pH constant est très voisin du pH sanguin, la sclérose de l'endovéine ne se produit pratiquement pas.

Indications. — Maladie de Bouillaud, Rhumatismes infectieux et chroniques. Encéphalites et séquelles. Chorée, Sclérose en plaques, etc.

Prix {	La boîte de 3 ampoules de 10 cc.....	11 fr. 50
	— 6 ampoules de 10 cc.....	19 fr. 50
	— 3 ampoules de 20 cc.....	14 fr. 50
	— 6 ampoules de 20 cc.....	25 fr.

Remboursé par les caisses d'A. S.

Laboratoires GATEL-LÉGER

35 et 37, rue Joinville — LAVAL (Mayenne).

ALDINE

(Contre toutes algies.)

Calmant efficace de la douleur, effet immédiat.
Stimulant du système nerveux dans les états dépressifs.

Présentation. — Sous forme rationnelle d'un élixir agréable à prendre, sans pouvoir offensif sur l'estomac, l'ALDINE est une ingénieuse composition fondée sur les sédatifs les plus fidèlement victorieux de l'élément douleur associés à un stimulant général.

Indications. — Gripes, migraines, toutes névralgies, règles douloureuses, etc...

Posologie. — Médicament destiné aux adultes.
 Une cuillerée à soupe pure ou dans un peu d'eau.
 Par jour : de 2 à 4 cuillerées.

Prix : 12 fr. 50 le flacon.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le numéro 339-6.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).

Tél. : Suffren 12-63.

ALEPSAL (Comprimés)

Calmant non déprimant.

Grâce à l'association Phényléthylmalonylurée, belladone et caféine, l'ALEPSAL (0,10) supprime les crises convulsives et les équivalents, fait disparaître les troubles du caractère sans exercer aucune action défavorable ni sur l'intelligence ni sur la mémoire. — Toujours bien supporté et sans accoutumance.

3 Dosages : 1° Comprimés à 0 gr. 10 de Phényléthylmalonylurée.
 2° Comprimés à 0 gr. 05 de Phényléthylmalonylurée.
 3° Comprimés à 0 gr. 015 ou doses fractionnées.

Indications. — (Comp. à 0,10): Epilepsie, Insomnies rebelles. — (Petits dosages) : États anxieux, Troubles neuro-cardiaques, Angine de poitrine, Troubles nerveux chez les enfants, Coqueluche.

Posologie. — Epilepsie, Adultes : Débuter par 2 ou 3 comprimés par jour (dosage à 0,10). Se rappeler que les doses initiales doivent être continuées très longtemps sans changements ni interruptions et qu'en cas de diminution dans les doses, on devra procéder très lentement et par paliers successifs. Doses maxima des comprimés à 1 cgr. 1/2. Enfants : 1 an : 3 comp. par 24 h. ; — 5 à 6 ans : 7 comprimés ; — 10 ans : 8 comp. — Espacer les doses.

Bibliographie. — Communication à la Société Médico-Psychologique de Paris (1921). Thèse Dr Labarthe (1926). — Dr Rodiet, Médecin-chef des Asiles (Traitement de l'Epilepsie 1927). Professeur de Pathologie. G. Ferrua de Turin. Précis Clinique de l'Epilepsie (1931).

Prix : 8 fr. 35 et 9 fr. 35.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché, à NEUILLY (SEINE). (Tel. Mai. 17-77.)

ALEXIME

(Anciennement Alexine.)

Composition. — Formule et procédé du Laboratoire Joulie. Acide phosphorique libre associé au phosphate de fer et de manganèse.

Propriétés. — Tonifie la cellule nerveuse, combat l'hypo-acidité humorale, contribue à la reminéralisation.

Indications. — Anémie, asthénie, chlorose, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence, prébacillose, phosphaturie, prétuberculose, déminéralisation, hypo-acidité, arthritisme, fatigues physiques ou nerveuses, rachitisme, etc.

Présentation. — Granulé rose de goût agréable.

Posologie. — Adultes et enfants de plus de 5 ans : 1 ou 2 cuillerées à café avant ou après les deux principaux repas dans un 1/2 verre d'eau sucrée ou non. *Enfants* de 2 à 5 ans : 1/2 cuillerée à café à chaque repas.

Prix : le flacon, 16 fr. 55.

Laboratoires de l'**ALEXIME**
Ch. PLAZENET, Pharmacien,
8, rue Riblette — PARIS (XX^e).
(Tél. : Roquette 36-36 et 36-37.)

ALGANE

Cytoplasma de *Laminaria Flexicaulis* déminéralisé par un procédé spécial qui respecte les principes de cette Algue. C'est l'origine de la partie active de l'huile de foie de morue.

Composition. — L'Algane agit :

- 1° Par son iode lié à la matière organique (2 mgr. par gr.).
- 2° Par ses traces catalytiques d'éléments minéraux (As, Mn, Mg, Fe, etc.).
- 3° Par ses graisses, ses protéines et hydrates de carbone qui en font un puissant suraliment.
- 4° *Et surtout par sa haute teneur en vitamines naturelles A et D* (sous forme d'algostérine, pigments carotinoïdes, fucoxanthiques et chlorophylliens).

Action. — Celle de l'huile de foie de morue, mais singulièrement exaltée et plus complète, en raison de sa plus grande richesse en vitamines A. Résultats plus constants, le produit étant soumis à un contrôle biologique.

Les deux plus remarquables actions de l'Algane consistent :

- 1° En une augmentation rapide de poids ;
- 2° En l'accroissement du pouvoir anti-infectieux de l'organisme.

Présentation :

1° Cachets dosés à 1 gr. 25.

2° Granulés fondants renfermant 0 gr. 50 de poudre par cuillerée à café

Posologie. — Chaque cachet correspond à 125 unités de vitamines D et 150 unités de vitamines A. Un cachet représente la quantité de vitamines D d'une cuillerée à soupe d'une bonne huile de foie de morue et la quantité de vitamines A de 3 cuillerées à soupe.

Adultes : 4 cachets par jour au minimum (2 au début de chaque repas).

Enfants : jusqu'à 15 ans, 1 à 2 cachets par jour ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés. Ces doses peuvent être augmentées sans inconvénient.

Administration du granulé. — Le granulé peut être absorbé directement comme une friandise : on le croque, puis on l'avale en s'aidant d'une gorgée d'un liquide quelconque. On peut également le dissoudre au préalable dans une petite quantité d'eau ou de lait.

Nota. — L'Algane en granulé possède un goût difficilement perceptible. Chez les sujets constipés, le mucilage contenu dans le produit provoque un effet laxatif qui ne peut être que bienfaisant.

Prix de la boîte (cachets ou granulés) : 16 fr 65.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 994/1 et 2.

Durée moyenne de la boîte : 10 jours.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

(Tél. : Pereire 14-08.)

ALGIPAN MIDY

Boîte de 6 ampoules pour injections intradermiques.

Composition :

Bichlorhydrate d'Histamine..... 0 gr. 000125

Monochlorhydrate d'Histidine 0 gr. 040

Pour une ampoule de 1 cc. en équilibre ionique stabilisé.

ASSOCIATION ANTIALGIQUE RÉVULSIVE NEUROTROPE

Dose et mode d'emploi. — Infiltration intradermique dans la zone de projection cutanée de la douleur, une séance tous les jours ou tous les 2 jours.

Indications. — Névralgies, Myalgies, Arthralgies, Algies viscérales, Douleurs de l'angine de poitrine, Crises solaires, Coliques hépatiques, Coliques néphrétiques, Douleurs d'origine ulcéreuse, Spasmes douloureux des artérites, Maladie de Raynaud, Etats anaphylactiques (asthme, urticaire, œdème de Quincke, rhume des foins).

Chaque boîte contient une aiguille spéciale pour injection intradermique.

Prix : 25 fr. 60.

Durée du traitement : 8 à 15 jours.

Remboursé à 80 % aux Assurés sociaux (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram, — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

ALGOCRATINE

(Phenylamidoxanthine.)

Présentation. — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation rapide).

Suppositoires : même dosage que les cachets.

Produit de prescription médicale.

Ne contient aucun hypnotique.

Indications thérapeutiques. — Migraines, névralgies, sciaticques, grippe, algies cancéreuses. En général, toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les *régles douloureuses*.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Élimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

Posologie. — Un cachet dès l'apparition des douleurs, un second une heure après si nécessaire. Trois cachets par 24 heures.

Suppositoires : Même posologie que les cachets.

Prix : Le tube : 8 fr. 50 ; la boîte de 25 cachets : 22 fr. 50 ;
suppositoires : 13 fr. 50.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III —
PARIS (VIII^e). — (Tél. : Élysées 17-46.)

ALGOÏL DU D^r GUIRAUD

Liniment Histaminé.
(Excipient spécial.)

Indications. — Toutes manifestations douloureuses articulaires, musculaires ou nerveuses. Cellulite.

Favorise la résolution rapide des fluxions et œdèmes, notamment dans les rhumatismes.

Action thérapeutique. — L'excipient spécial d'Algoïl, solvant les lipides, permet de faire pénétrer rapidement dans le derme des substances telles que l'histamine, dont les propriétés antialgiques ou vaso-actives réalisent *loco dolenti* une thérapeutique des plus active de l'influx douloureux.

Composition. — Histamine, trichlorométhane, ester amylosalicylique, terpènes, capsicine, hydrocarbures oléo-schisteux.

Mode d'emploi. — Étendre Algoïl sur la région douloureuse, faire une légère friction et recouvrir d'un pansement ouaté.

Prix : 16 fr. 10.

Laboratoires CHAMBON

place Francheville — PERIGUEUX.
(Tél. : 4-43.)

ALGONAL

Traitement des affections rhumatismales,
Arthrite, Goutte, Poly-arthrite.

En capsules kératinisées à base de iodure de lithium, Essence de Salicylate de Méthyle pur et désodorisé, Colchicine et Urotropine.

Mode d'emploi :

3 capsules le matin avant le petit déjeuner
et 2 le soir avant le dîner.

Prix : 18 fr. 70.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie
37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 10-23.)

ALGOPHAGINE

Capsules glutinisées contenant 1/10 de milligramme de colchicine dans l'essence de Gaulthéria pure associée à: iodure de lithium et formine.

Indications :

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

Posologie :

Trois capsules le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnées d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy), ou hypominéralisée (Vittel, Evian).

Prix : 20 francs.

Compléter le traitement avec le *Baume Algopha*.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

ALGOZONE

Composition. — Formation d'oxygène naissant par perborates en présence de l'eau chaude, d'algues marines et essences volatiles eucalyptolées et balsamiques.

Propriétés. — Décongestif, antiseptique, balsamique, bactéricide.

Indications. — Traitement externe complet des affections des voies respiratoires, asthme, emphysème, bronchites, trachéites, trachéo-bronchites, bronchites aiguës et chroniques, coqueluche, prophylaxie des maladies infectieuses.

Présentation et prix. — L'appareil complet composé de :

1^o La boîte à inhalation pourvue de son cornet mobile.

2^o La boîte à prises nasales.

3^o La boîte de poudre inhalante.

Prix : 16 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — *Inhalations humides* : Une cuillerée à café de poudre dans 150 à 200 cc. d'eau bouillante en inhalations plusieurs fois par jour.

Inhalations sèches : Une cuillerée à soupe de poudre dans la boîte à inhalations.

Prises nasales : Plusieurs fois par jour.

Gargarismes : Une cuillerée à café comme pour l'inhalation humide.

Laboratoire Marin de Royan-Pontailac

P. CASTANET;

Pharmacien de 1^{re} Classe.

Lauréat Médaille d'Or de la Faculté de Lyon.

Dépôt: Pharmacie PIAULT, 45, avenue Félix-Faure — PARIS (XV^e).

O. C. P. Office Commercial Pharmaceutique,

71, rue du Temple — PARIS (III^e).

C. N. P. F. Comptoir National

Ile-de-France Pharmaceutique, 4, rue de l'Alma — ASNIÈRES (Seine).

ALIBOURINE B. E. A.

Forme :

Pommade en tube de 50 grammes environ.

Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lano-vaseline.

Indications :

Eczémas suintants, *Impétigo*, Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Érysipèle, Brûlures, Engelures.

Laboratoires B. E. A.

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe —
BELFORT.

ALIMENT EDEL

Aliment compensateur permettant une régularisation des selles en plus (constipation) ou en moins (diarrhées fausses, vraies, entérites), en même temps qu'une désinfection parfaite de l'intestin.

Composition. — Poudre de lait privée de matières grasses et minéralisées.

Ne renferme ni produit laxatif d'origine chimique ou végétale, ni mucilages, ni astringents.

Poudre blanche légèrement teintée, de saveur neutre. S'emploie mélangée aux aliments, potages (aux légumes de préférence), purées, riz, crèmes, liquides, etc., au moment du repas et sans cuisson.

Doses : *Adultes* : 2 à 4 cuillères à soupe 2 fois par jour aux repas.

Enfants : 1/2 dose.

La boîte de 200 gr. pour un traitement de 8 jours :
14 francs.

Laboratoire COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 45-01.)

ALIMENTS ÉQUILIBRÉS JOLY

à base de Farines d'Avoine sélectionnées.

Préparation journalière. Pas de stock. Livraisons et expéditions immédiates.

Obtenus exclusivement de produits frais convenablement dosés d'après leur composition exacte, ces aliments assurent plusieurs états d'équilibre alimentaire compatibles avec le fonctionnement régulier d'organismes malades, débiles ou délicats.

SUPRAVÈNA. *Vanillé* : Aliment du 1^{er} âge et des dyspeptiques de tout âge. Remarquable aliment anti-diarrhéique sans blocage, notamment des Nourissons à partir du 3^e mois.

ALIMAVÈNA. *Au Cacao spécial* : Admirablement toléré par nombreux hépatiques. Aliment de l'enfance. Énergétique et léger. Le plus parfait des petits déjeuners, goûters, desserts, des Enfants, Vieillards, Convalescents, Nourrices, Amaigris, Nerveux, etc.

BOVAVÈNA. *Carné* : Exquis potage suraliment à la Poudre de Viande bien assimilable.

Littérature et échantillons :

ALIMENTS ÉQUILIBRÉS JOLY
BOURG-LA-REINE (Seine).

ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

Médication calcico-magnésienne, dont la présentation agréable, en bouillies ou entremets, en facilite l'administration aux sujets affaiblis et atteints d'inappétence.

Composition :

Carbonate de chaux .	0,33	Lactose	1,50.
Phosphate de chaux.	0 20	Arrow-Root	3,80.
Glycéroph. de chaux.	0,06	Sucre	14,60.
Magnésie	0,05	Cacao vanillé	11,60.
Eléments complets céréalo-légumineux.	1,50		
Pour 2 mesures.			

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.
Adultes : 2, 3 ou 4 mesures par jour.

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule.
Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

ALISAL

1° POMMADE

Composition :

Résorcine, Borate de soude, Acide borique, Acide salicylique aa.....	1 gr.
Hyposulfite de soude.....	2 gr.
Huile de bouleau rectifiée.....	2 gr.
Camphre, Glycéré d'amidon, Eau d'Alibour, Extrait saturne.	
Excipient : Lanoline et huile douce Q. S. p. 100 gr.	

Indications. Traitement des dermatoses, Eczémas, Impétigo, Psoriasis, Herpès génital, Prurit vulvaire, etc.

Prix : 13 fr. 50 le grand tube.

Formule : 2° COMPRIMÉS GYNÉCOLOGIQUES :

Sulfate de cuivre.....	} aa 0,15
— zinc.....	
Alun de potasse.....	} aa 0,01
Acide picrique.....	
Naphtolate de soude.....	
Sulf. n. Oxyquinoleine.....	
Trioxyméthylène.....	0,001

pour un comprimé effervescent, soluble et parfumé.

Indications. — Gynécologie générale et hygiène intime.

Prix : 19 fr. le tube de 50 comprimés.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les Nos 403/41 — 403/42

Laboratoires HOCQUETTE.

191, Faubourg St-Antoine — PARIS (XI°)

(Tél. : Diderot 04-71)

ALLAUROL LUMIÈRE

Dentifrice scientifique, à base d'or, en combinaison sulfo-organique.

Traitement hygiénique, préventif et curatif des Maladies de la Bouche et des Dents.

L'AllauroL Lumière contient un sel d'or nouveau : **Le Thio-propa-nol sulfonate doublé d'or et de calcium.**

Ce sel d'or est un **antiseptique** tout particulièrement actif à l'égard des microbes spirillaires, grands responsables des affections de la bouche et des dents.

— L'AllauroL Lumière présente une **totale innocuité.**

— Il n'est ni caustique, ni toxique, ni irritant.

— L'AllauroL Lumière est capable, non seulement d'exercer l'hygiène indispensable, mais aussi de prévenir et de guérir les affections bucco-dentaires, au premier rang desquelles il faut citer : **les caries dentaires et les paradentoses** (Pyorrhée alvéolo-dentaire).

L'AllauroL Lumière est le dentifrice de choix pour l'hygiène préventive de la bouche chez les personnes bien portantes. Mais il s'impose chez l'arthritique, victime désignée des troubles paradentososiques, et chez les nombreuses personnes qui présentent des états inflammatoires ou des suppurations — aiguës ou chroniques — au niveau des alvéoles dentaires.

Mode d'emploi :

1° **Brossage** comme avec tout dentifrice (chez les sujets aux dents parfaitement saines). Brossage auquel il faut ajouter :

2° **Massage** des gencives avec le doigt imprégné d'AllauroL Lumière chez les personnes qui ont une tendance à la carie dentaire ou à toutes affections des gencives).

Chez les personnes atteintes d'infection, l'usage de l'AllauroL Lumière doit être complété par celui de la **Dentochrysine Lumière**, médication active de la Pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON

ALLERGANTYL MILUC

Modificateur du terrain humoral

SOLUTION INTERNE. — Rate. Bardane.

Indications thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre normal du système endocrino-sympathique : Furunculose, Eczémas (adultes et nourrissons), Allergies cutanées, etc.

Furunculose. — *Fortes doses indispensables* : 3 cuillerées à soupe par jour et plus, suivant les cas.

Dermatoses. — *Doses faibles, mais prolongées*. 2 cuillerées à dessert par jour (20 jours par mois).

Demi-dose pour enfants.

2 demi-cuillerées à café pour nourrissons de 4 mois.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau, 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 19 fr. 80.

POMMADE. — Noyer.

Traitement externe synergique à utiliser quelques jours après le début de la cure interne et tout en continuant l'ALLERGANTYL solution.

Prix : 9 fr. 80

Assurances Sociales : Catégorie B.

Laboratoires MILUC, L. Ragoucy, Pharmacien

2, rue Joseph-Bara — PARIS (VI^e).

(Tél. : Odéon 02-53.)

ALLERGINE

Extrait bacillaire
obtenu par la méthode de Jousset.

Composition. — Extrait bacillaire sélectionné (permettant une vaccinothérapie d'une grande efficacité dans les indications favorables).

Indications. — Presque toutes les *tuberculoses*, quelles que soient leurs localisations et leurs formes cliniques, aiguës ou chroniques, pourvu qu'elles soient reconnues et traitées de bonne heure. Les *tuberculoses aiguës initiales* guérissent de façon remarquable quand elles sont soignées dès le début de leur évolution. Dans les tuberculoses chroniques, ne prescrire l'Allergine que si la cuti-réaction est franchement positive.

En outre, la vaccinothérapie par l'Allergine est le complément indispensable de la sérothérapie antibacillaire, pour consolider les résultats de cette dernière.

Contre-indications. — Ancienneté des lésions (et surtout mauvais état général, cachexie, température irrégulière, anarchique ; fièvre hectique. Maladie d'Addison).

La *granulie aiguë* et la *méningite tuberculeuse* ne sont pas des contre-indications, mais *ne doivent pas être considérées comme des indications de l'Allergine* : elles ne méritent un essai de traitement que dans les cas tout à fait exceptionnels de diagnostic particulièrement précoce.

Posologie. — L'Allergine est présentée en deux concentrations : *solution normale*, en ampoules de verre jaune contenant 1 milligramme par cc. ; ampoules d'un 1/2 cc. dans la boîte n° 1 et d'un cc. dans la boîte n° 2 ; *solution concentrée*, contenant 5 milligrammes par cc., en ampoules d'un cc. en verre bleu.

Le traitement doit être longtemps poursuivi : injections hypodermiques à doses progressives ; progression basée sur les réactions fébriles qui vont en s'atténuant. Doses très faibles au début : 1/10 ou 1/8 de cc. de la solution normale, de plus en plus élevée dans la suite. L'espacement des injections, de quatre à cinq jours tout d'abord, est rapidement d'une semaine et atteint 10, 15, 20 jours et plus lorsqu'on utilise la solution concentrée, qui doit être injectée assez profondément. En cas de rechute fébrile au cours du traitement, prescrire la sérothérapie antibacillaire (Sérum de Jousset) et reprendre la vaccinothérapie par l'Allergine dix jours après la dernière injection de sérum ou les accidents sériques.

Dépositaires généraux :
Laboratoires d'Analyses BRÉANT

11, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 23-84.)

ALLIOCAR

ou *Alliocardia*.

Composition. — *Allium sativum*, *Cratoegus*, *Camphora*, *Eucalyptol*, *Spartéine*.

Propriétés thérapeutiques. — *Cardiotonique*. Régularise la tension artérielle. Calme les palpitations, l'angoisse, la dyspnée nerveuse, l'asthme. Action antiseptique sur les sécrétions pulmonaires.

Indications. — *Tous états pathologiques associant cœur et poumon*: Hypertension, Sclérose rénale, Bronchites fétides, Coqueluche, Asthme.

Non toxique, sans odeur, pas d'accoutumance, pas de contre-indication.

Présentation. — Pilules glutinisées : 6 à 10 par jour prises par trois ou quatre avant les repas ou dans leur intervalle.

Enfants au-dessous de 5 ans : demi-dose.

Étui de 80 Pilules.

Laboratoire BERGER,
14, rue des Pyramides — PARIS.

ALLISATINE

Composition. — Tous les principes actifs de l'*Allium Sativum* fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, *inodores*, insipides.

Propriétés. — Stimulant des fonctions gastriques, puissant antidiarrhéique. Hypotenseur. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour, à la fin des repas.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

ALLIUM COIRRE

(Marque Stasima)

Composition. — Préparation stabilisée, contenant tous les principes de l'ail cru.

Deux formes : Alcoolature et Pilules (une pilule correspond à environ X gouttes d'alcoolature).

Action. — Au point de vue *circulatoire* :

Abaisse la tension artérielle en augmentant l'indice oscillométrique ; l'allium est de plus cardiotonique (XXX gouttes en 2 fois).

Dans l'*Hypertension* : 2 jours de traitements, 2 jours de repos et ainsi de suite pendant 15 jours.

Au point de vue *antiseptique* :

Antiseptique pulmonaire (alcoolature), 50 gouttes P. J. en 2 fois. Antiseptique intestinal (pilules), 4 à 8 pilules P. J. en 2 fois.

Au point de vue *général* :

Reconstituant général et antiscléreux, 4 à 8 P. J. en 2 fois

Prix : 17 francs.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard Montparnasse — PARIS.

(Tél. : Ségur 02-79.)

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

Constitution. — (Chlorhydrate de paramino-benzoyl-diéthyl-amino-éthanol).

Les solutions allocaïne-adréraline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérable. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacte les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale fonctions intellectuelles).

Indications. — Les mêmes que pour la cocaïne. L'**Allocaïne Lumière** est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi aux titrages suivants :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc.

Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc.

Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc.

Solution BB à 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc.

Solution C. à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc.

Solution J. à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a. à 2 cc.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon. — LYON.

ALLOCHRYSINE LUMIÈRE

L'or en combinaison sulfo-organique
par la voie intramusculaire.

Adoptée par l'Assistance publique, inscrite au tarif
de l'A. G.

L'Allochrysine Lumière (thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium) est un composé dans lequel le métal est lié directement au soufre et dont la deuxième valence est occupée par un radical organique.

30 p. 100 d'or métallique.

Cette préparation (solution aqueuse), injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement. Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie.

Pas de contre-indications formelles ; cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales, les lésions intestinales.

Dans les cas très rares de troubles anaphylactoïdes, la substitution au solvant spécial d'une ampoule d'**Emgé Lumière** en évite le retour.

Indications :

Tuberculose (pulmonaire et externe), **Rhumatisme** chronique infectieux, **Syndromes infectieux divers**.

Formuler :

Une boîte d'**Allochrysine Lumière**, contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution :

Une ampoule de 2 cc. d'**Allochrysine Lumière**,

Une ampoule de 8 cc. de sérum artificiel.

Il existe trois dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.

Bien spécifier le dosage désiré.

Mode d'emploi :

Tuberculose. — Débuter, pour tâter la susceptibilité du malade, par une ampoule de 0 gr. 05 ; continuer par injections de 0 gr. 10, puis 0 gr. 20. Une à deux injections par semaine jusqu'à dose totale, moyenne de 3 à 5 grammes.

Rhumatisme. — Débuter, pour tâter la susceptibilité, par 0 gr. 05, une injection tous les cinq jours ; continuer par une injection tous les 5 jours à 0 gr. 10, jusqu'à imprégnation moyenne de 3 gr. Employer, dans quelques cas, la dose de 0 gr. 20, à raison de une par semaine.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

ALLONAL « ROCHE »

ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine ; il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnotiques de l'acide isopropylallylbarbiturique ($C^{10}H^{14}O^3Az^2$).

Indications thérapeutiques. — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil ; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie ; agitation, excitation, délires, etc.

Avantages. — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées ; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté ; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal ; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0 gr. 16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés par 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau ou de tisane, $\frac{1}{2}$ h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-5.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

ALLOPHA-QUINA

Le cachet analgésique rationnel.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-3.

Allophanate de benzyle	10 egr.
Diméthylaminoantipyrine	30 —
Poudre de quinquina	10 —

Mécanisme d'action. — L'Allophanate (éther cristallisé, pur et stable) donne, par hydrolyse « in vivo », de l'alcool de benzyle dont les propriétés antispasmodiques sont bien connues et, par dédoublement, de l'urée naissante capable d'entretenir la perméabilité rénale pendant qu'agit, cette fois, sans brutalité, la diméthylaminoantipyrine.

Toutes les algies. — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

Fièvre-Grippe.

3 cachets à répartir dans les 24 heures.

Boîte de 12 cachets : Prix : 12 francs.

Laboratoire du Jécol

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 10-36.)

ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 4 centigrammes.

Aloïne Houdé

Glucoside cristallisé de l'aloès des Barbades.

Indications :

Dyspepsies atoniques ou hypotoniques.

Constipation droite ou gauche.

Syndrome entéro-hépatique, *leiasthénie*.

Doses et mode d'emploi :

Comme stomachique :

1 granule par jour.

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir au repas.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.

Pâte poreuse, stable, non grasse.

Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras ou de vaseline souvent mal tolérés.

Ne tache pas le linge.

S'enlève facilement.

Répond à une classique formule de l'Hôpital Saint-Louis.

Indications. — Érythèmes fessiers des nourrissons, érythèmes intertrigo, rougeurs. Eczémas aigus et subaigus, eczémas suintants, coups de soleil, engelures, prévention des escarres, eczématisation des plaies, prurit, etc. Dermites irritables, dermites artificielles, eczémas des blanchisseuses et des laveuses, etc.

Mode d'emploi. — Etendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Il existe également une poudre d'*Aloplastine*.

ALOPLASTINE ICHTHYOLÉE

Pâte à l'eau renfermant 5 p. 100 d'Ichthyol.

Présente les avantages de l'*Aloplastine* simple (absence de vaseline et de corps gras, pâte poreuse, facile à enlever), à laquelle s'ajoute l'action réductrice et kératoplastique de l'Ichthyol.

Indications. — Toutes celles de l'Ichthyol : Eczémas, Eczématides, Parakératoses, Dermo-épidermites microbiennes, Acné, Engelures, Brûlures, Ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Etendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Laboratoires Biologiques de l'ILE-DE-FRANCE

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e)

ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail.

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

Indications. — Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire, Urticaire.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension, interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Prix de vente : 12 francs la boîte.

Laboratoire GOUZÈNE

139, rue de Paris — PANTIN (Seine).

(Tél. : Botzaris 00-97.)

ALSODINE

Poudre composée de sels alcalins et de lactose.

En faisant dissoudre 1 cuillerée à café de cette poudre dans une tasse à thé d'infusion tiède non sucrée, ce qui représente 125 centimètres cubes de liquide, on obtient une solution de degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

Prescrire cette dose après le repas de midi et du soir, ou au moment des crises douloureuses, chaque fois que les troubles observés pourront être rapportés à une évacuation incomplète ou retardée de l'estomac.

Dyspepsie, hyperchlorhydrie, affections du pylore, atonie, aérophagie, vomissements de la grossesse.

Prix : 10 fr. 40.

Dépôt O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal simple-belladonné.)

Réducteur d'HCl.

Nouvelle thérapeutique gastro-intestinale : l'Alucol, corps chimiquement défini, obtenu par procédé spécial, fixe HCl sans neutraliser ; il l'adsorbe et favorise :

- 1° La protection de la muqueuse stomacale par formation d'un mucilage colloïdal isolant en présence d'un excès de suc gastrique.
- 2° La fixation et l'entraînement par le mucilage ainsi formé des éléments fermentescibles et des entéro-toxines.

Formes. — Paquets, comprimés, granulés, cachets belladonnés.

Paquets dosés à 3 gr. pour pansements gastriques et traitement des états aigus. Comprimés de 0^{gr},50. Cachets belladonnés (0^{gr},50 Alucol et teinture de Belladone V gouttes).

Doses. — Alucol simple : 2 à 6 gr. par jour une heure avant ou deux heures après les repas et davantage sur avis du médecin.

Alucol belladonné : 1 à 2 cachets à distance des repas, en cas de crises aiguës avec spasmes.

P. BASTIEN, pharmacien

CHAMPIGNY (Seine). — (Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine à l'état gélatineux.

Tolérance parfaite.

Indications :

Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons.

Posologie :

Adultes : 2 à 10 comprimés ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Prix de vente :

Comprimés..... 5 fr. 30

Granulés 14 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ALZINE

Composition. — Dionine, Lobélie, Belladone, Polygala, Iodure de Sodium, 0,15 par pilule.

Forme. — Pilules enrobées au gluten F1-de 40.

Indications. — Asthme, Emphysème, Spasmes bronchiques, Catarrhe.

Doses. — Cas aigus : 4 à 6 pilules par jour.
Après la crise : 2 à 3 pilules par jour.

Dose préventive. — 1 à 2 pilules par jour pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Flacon : 40 pilules. — Prix : 18 fr. 45.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT
9, avenue Jean-Jaurès — LYON.
(Tél. : Parmentier 31-29.)

AMBOCURINE

Granulé.

Composition :

Carbonate de Bismuth.....	10 gr.
Bromure de potassium	7 gr.
Carbonate de chaux.....	13 gr.
Magnésie lourde	5 gr.
Extrait de Belladone	0,06
Extrait de Fèves de Calabar.....	0,04
Sucre granulé gr. pr	100 gr.

Indications. — *Toutes gastralgies sans exception, qu'elles soient conditionnées par une vago ou une sympathicotomie.*

Aérophagie. Vomissements de la grossesse.

Doses :

Enfants au-dessus de 15 ans : 1 cuillerée à café midi et soir dans un peu d'eau avant de manger.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café midi et soir, dans un peu d'eau avant de manger.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II°).
(Tél. : Louvre 53-16.)

AMIBIASINE

Extrait de Garcinia composé.

Fournisseur des Ministères des Colonies et de la Guerre
Non toxique. Sans contre-indication.

Présentation :

Liquide. — Solution brune stabilisée, de saveur amère, en flacon de 60 cc. (12 cuillerées à café titrées à 0 gr. 10 de principe actif par cuillerée).

Comprimés. — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 05 de principe actif, en étui de 2 tubes : 40 comprimés.

Suppositoires. (Voir à *Suppositoire Amibiasine*.)

Propriétés. — Désinfectant et antiparasitaire puissant, antidiarrhéique énergique sans action constipante, calmant des douleurs abdominales et du ténésme sans opiacés. Cicatrise la muqueuse intestinale et rétablit l'intégrité fonctionnelle du foie.

Indications. — Toutes parasitoses intestinales : Amibe, *Lamblia*, *Trichomonas*, *Schistosomum Mansoni*, Ankylostomes, Dysenteries et diarrhées de toutes natures et origines, aiguës et chroniques. Diarrhée symptomatique des tuberculeux, des appendicites chroniques, des typhoïdes, Hémorragies intestinales, *Melæna*, Entérites chroniques, muco-membraneuses, entérocolites, Fermentations intestinales, fétidité des selles, Colibacillose, eczéma.

Diarrhées infantiles (Voir *BIOENTÉRASE*).

Posologie. — En faisant prendre l'AMIBIASINE dans de l'eau sucrée ou, mieux, du café noir sucré, on lui enlève toute amertume. Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau sans être croqués.

Formes aiguës : 6 à 9 cuillerées à café ou 8 à 12 comprimés par jour.

Formes chroniques : 3 à 6 cuillerées à café ou 4 à 8 comprimés par jour.

Administrar le médicament à ces doses et dès amendement des symptômes ramener les doses à 3 cuillerées à café ou 4 comprimés par jour, pendant une huitaine de jours.

Cure d'entretien : 2 cuillerées ou 4 comprimés par jour, 10 jours par mois pendant 1 à 3 mois.

Régime habituel des entéritiques en notant de s'abstenir du lait, des œufs, du bouillon de légumes. Boissons : thé léger, eau sucrée ou eau rouge.

Diarrhée infantile. — Formuler AMIBIASINE BB : 1 à 3 cuillerées à café par jour jusqu'à disparition de la diarrhée.

Prix du flacon :

Solution : 16 fr. 65. — *Comprimés* : 12 fr. 50.

Laboratoire de l'AMIBIASINE
69, rue de Wattignies — PARIS.

AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, artériosclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à 3 cuillerées à café ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre : 14 fr. 75.

(Boîte aluminium).

La boîte, Comprimés, Cachets : 19 fr. 50.

Le flacon de Dragées : 18 fr. 25.

Le tube de Comprimés : 10 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

AMIDO-SEPTINE

CACHETS

Composition. — Para-amino-phényl-sulfamide et catalase compensatrice ; l'Amido-Septine emprunte à la Sulfamide ses remarquables propriétés bactéricides tout en neutralisant sa toxicité.

Mode d'action. — Bactéricide puissant administrable *per os*, agissant par voie sanguine et détruisant l'agent pathogène au lieu même de l'infection.

Atoxique, sans danger pour le malade grâce à son activateur d'oxydo-réductions intracellulaires.

Préparation qui permet une large utilisation des propriétés bactéricides de la Sulfamide.

Indications. — Préventive et curative, l'« Amido-Septine » paraît être la « *Therapia Sterilisans Magna* » de tous les états infectieux, et en particulier des infections à : Streptocoques, Méningocoques, Pneumocoques, Gonocoques, Colibacilles, Méliocoques.

Infections polymicrobiennes des plus bénignes (grippe) aux plus graves (septicémies).

Activité spécialement nette en Urologie.

Posologie. — Selon la nature de la maladie, son évolution et l'état du malade.

Adultes : 6 à 12 cachets par 24 heures.

Enfants : 2 à 8 cachets par 24 heures.

A forte dose (10 à 12 cachets par 24 heures) traiter 4 à 5 jours, laisser reposer 3 jours, puis reprendre si nécessaire.

Prix : Boîte de 40 cachets, 28 francs.

Laboratoire de Pharmacologie appliquée.

Rue Frédéric-Chevillon — ALLAUH (B.-du-R.).

AMIFLORINE

Gouttes.

Présentation. — En flacon-compte-gouttes.

Principes actifs. — Extrait de marrons d'Inde, d'Hamamélis virginica, de Gui, de Viburnum, d'Hydrastis canadensis.

Indications. — Troubles de la circulation, maladies des vaisseaux, varices, phlébites, accidents de retour d'âge.

Mode d'emploi. — XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, 3 fois par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

AMINOLÉINE

Composition. — Sulfate de paraaminobenzoyldibutylaminopropanol, adrénaline, essence de niaouli, camphre, baume du Pérou, borate de soude, vaseline, huile de vaseline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, vaso-constrictive et décongestive.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires supérieures : Coryza, Sinusite, Laryngite, Pharyngite, Rhino-pharyngite, et toutes infections et inflammations du carrefour rhino-pharyngien.

Présentation et prix. — Un tube : 14 francs.

Deux dosages : *Adultes* et *Enfants*.

Posologie et mode d'emploi. — *Adultes et enfants* : matin, midi et soir, placer gros comme un pois d'AMINOLÉINE à l'entrée de l'orifice narinaire et aspirer fortement en obturant l'autre narine. Pratiquer la même opération sur l'autre côté.

Laboratoires de Thérapeutique Oto-rhino-laryngologique

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 02-41.)

AMINOPHYLLINE BOUDIER

(Théophylline-éthylène-diamine)

Propriétés : Antalgique cardiaque, toni-cardiaque, tonique du cœur périphérique, diurétique direct, diurétique cardio-rénal, diurétique tissulaire, eupnéique,

Indications :

- A. *Médicament du spasme vasculaire* et particulièrement des spasmes coronariens (angine de poitrine, infarctus myocardique, claudication intermittente).
- B. *Médicament cardiotonique* (insuffisance ventriculaire gauche, myocardites chroniques, arythmies).
- C. *Médicament diurétique* (oliguries infectieuses ou toxiques, néphrites hydropigènes, cirrhoses, ascites, œdèmes).
- D. *Médicament eupnéique* (asthme vrai, dyspnée et asthme cardiaques, Cheyne-Stokes, accidents de la narcose, comas toxiques).

Posologie :

- Comprimés :* 4 à 8 par jour (cure préventive des crises angineuses).
- Suppositoires :* 1 ou 2 par jour, en cas d'intolérance gastrique (cirrhose, hématomatose, hypertension portale).
- Ampoules intramusculaires :* action rapide et sans danger : 1 à 2 par jour.
- Ampoules intraveineuses :* à injecter lentement (3 minutes), 1 à 2 par jour. Traitement d'urgence réservé aux cas graves (infarctus du myocarde, crises aiguës d'angor, œdème aigu du poulmon, oliguries graves, comas toxiques).

Laboratoires J. BOUDIER, 37, rue de Bourgogne, PARIS (7^e).

AMINOPHYLLINE CARÉNA

(Théophylline-éthylène-diamine synthétique française.)

Le plus puissant dilatateur des artères coronaires.

Augmente de 80 p. 100 le débit coronarien.

Démonstration expérimentale. — La ligature d'une artère coronaire chez le chien provoque, sur l'électrocardiogramme, l'onde en dôme caractéristique de l'obstruction coronarienne. La théophylline éthylène-diamine amène le retour du tracé à la normale.

(Communication Société française de cardiologie, 23 mai 1937.)

Henri Morel, Thèse de Toulouse, 1938.

Indications cliniques :

Antalgique cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde).

Diurétique sans toxicité (oliguries, œdèmes).

Eupnéique (dyspnées, asthme, Cheyne-Stokes).

Présentations :

- | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Caréna comprimés | dosés à 0 gr. 10. | } Voir CARÉNA. |
| gouttes | — 0 gr. 005. | |
| suppositoires | — 0 gr. 40. | |
| ampoules intramusculaires | (2 cc. = 0 gr. 50). | } Voir Caréna |
| ampoules intraveineuses | (10 cc. = 0 gr. 25). | |

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60.)

AMIPHÉDRINE

Composition. — Chlorhydrate d'éphédrine naturelle, Véronal, Dionine, Sulfogaiacolate de potasse, Aspirine, Kola pulvérisée.

Action. — Antidyspnéique, analgésique et hypnotique léger, non toxique, antispasmodique, décongestionnant bronchique, tonicardiaque et diurétique.

Indications. — Etat grippal, céphalées et courbatures, Rhinites, Prévention des sinusites, Rhume des foins, Rhinite spasmodique, Asthme essentiel, Asthme cardiaque, Bronchites, Emphysème, Oppression.

Posologie. — *Dans le traitement d'attaque :* 3 cachets d'Amiphédrine par jour, avant les repas.

Dans la période d'état : 1 cachet d'Amiphédrine matin et soir.

Présentation. — Boîte de 8 cachets : Prix 10 fr. 40.

Laboratoire de l'AMIPHÉDRINE

Lucien HUGON, docteur en pharmacie

6, place Jean-Jaurès — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 18-85.)

AMIPHÈNE CARRON

Le plus puissant antiseptique intestinal.

Antidiarrhéique iodé.

Présenté en cachets de 25 cgr. de : Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse $C^6H^4O^5SKI + 3\text{ aq.}$

Création du Laboratoire Carron, l'*Amiphène* contient 31 p. 100 de son poids en iode dissimulé et possède les qualités suivantes :

- 1° *Ne fatigue pas l'estomac*, parce que inattaquable par le suc gastrique.
- 2° *Toxicité nulle. Pas d'iodisme.* Chez l'animal, le chat supporte par kilo et sans aucun trouble *per os* 5 gr. d'Amiphène ; en injection sous-cutanée : 2 gr. 50. Tolérance absolue chez l'homme avec de hautes doses et un traitement prolongé (observations multiples).
- 3° *Antisepsie intestinale parfaite.* Combat les fermentations et les putréfactions intestinales (nombreuses analyses coprologiques).
- 4° *Rapidité de l'action curative.* Remarquable.

Indications. — Toutes les diarrhées quelle qu'en soit l'étiologie, aiguës ou chroniques, Diarrhées banales, Fermentations ou putréfactions intestinales, Entérocolites muco-membraneuses, Diarrhées tuberculeuses, Diarrhées colibacillaires, Diarrhées des pays chauds, suites de Dysenterie.

Mode d'emploi et posologie. — Cachets dosés à 0 gr. 25. Prendre 2 à 6 cachets par jour, au début de chaque repas Alcaliniser l'intestin en cas d'acidité pathologique, par l'ingestion préalable de quelques grammes de bicarbonate de soude.

Boîte de 12 cachets : 20 fr. 80.

(C. R. Académie de médecine, 19 novembre 1929 ;
Société de gastro-entérologie, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, janvier 1931.)

Échantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).
(Tél. : Michelet 00-10.)

AMPHOMUTH

Bismuth métallique colloïdal en extrême dispersion huileuse amicroscopique.

Ampoules de 2 cc., dosées à 0 gr. 040 de bismuth métal par cent. cube. Antisyphilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien.

Ses avantages sont : assimilation facile, toxicité faible, absence de douleur, grande activité.

Posologie et mode d'emploi. — L'AMPHOMUTH est habituellement administré par séries de 12 injections musculaires fessières de 2 cc., deux fois par semaine, avec un repos de trois semaines avant la série suivante. Mais le médecin est seul juge des doses, de la durée de traitement et de l'intervalle à laisser entre chaque série.

Adultes : environ 2 centimètres cubes d'AMPHOMUTH.

Enfants : jusqu'à 3 mois : 1/10 à 2/10 de centimètre cube.

De 3 mois à 1 an : 2/10 à 4/10 de centimètre cube.

De 1 an à 8 ans : 4/10 de centimètre cube à 1 centimètre cube.

De 8 ans à 16 ans : 1 centimètre cube à 2 centimètres cubes.

En boîte de 12 ampoules injectables de 2 cc.

LABORATOIRES RONCHÈSE DE THÉRAPEUTIQUE

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à Paris, 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Turbigo 72-34.

AMPHOPROPHYL T. A. B. RONCHÈSE

à ingérer.

Vaccin antitypho-paratyphique *Préventif*.

Composition. — Suspension de corps microbiens de bacilles typhiques et paratyphiques A. et B. avec addition des lysats correspondants.

Indications. — L'*Amphoprophyl T. A. B.* à ingérer est un agent *préventif* des affections à bacilles d'Eberth et à bacilles paratyphiques A. ou B.

Posologie. — *Adultes et adolescents :* Pendant 6 jours consécutifs, avaler le matin à jeun (au moins une heure avant le petit déjeuner) une pilule de bile et, un quart d'heure après, absorber le contenu d'une ampoule de vaccin dilué dans un peu d'eau.

Enfants : demi-dose.

Innocuité absolue ; Aucune réaction ; Peut être appliqué à tous les âges.

Cette vaccination doit être renouvelée chaque année.

En boîte de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A. D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Tur. 72-34.

AMPHOSTABYL

du docteur MOITY

Médication stabilisatrice et équilibrante des dystonies vago-sympathiques et méta-sympathiques.

Tonicardiaque, Sédatif, Régulateur des systèmes neuro-végétatifs et autonomes périphériques

Formules. — Ess. marjolaine, 0,066. — Ext. de ballote, 0,01. — Ext. anémone, 0,01. — Ext. passiflore, 0,02. — Ext. cratægus, 0,04. — Ext. de boldo, 0,01. — Ext. valériane, 0,05. — Peptones polyvalentes, 0,03. — Ext. de jusquiame, 0,01. — Phényl-éthyl-urimido-propane-diméthyl-aminophényl-diméthyl-pyrazolone, 0,05

Par comprimés

Doses. — 3 à 6 comprimés par jour par prises séparées.

Diffusion. — Strictement médicale.

1° *Troubles cardiaques* : tachycardie, palpitations, éréthisme, angine de poitrine, spasmes vasculaires, hypertension artérielle.

2° *Troubles digestifs* d'origine nerveuse : dyspepsies nerveuses, spasmes digestifs.

3° *Troubles respiratoires* : asthme, dyspnée, coryza spasmodique.

4° *Troubles nerveux* : nervosisme ; états anxieux, névralgies, migraines, insomnies, psychasthénie, émotivité, surmenage nerveux, mal de mer.

5° *Troubles endocriniens* : hyperthyroïdie, Basedow, dysménorrhée, règles douloureuses, ménopause, tétanie.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Prix : 40 comprimés, 17 fr. 60.

Laboratoire du Dr J.-O. MOITY

Ex-interne des hôpitaux de Paris

Docteur en médecine, Docteur en Pharmacie

199, boulevard Bineau. — NEUILLY-PARIS

AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-Vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles de Friedländer*, *streptocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles de Pfeiffer*, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

Indications. — Véritable gargarisme sec aux antiviruses. Immunisant et curatif. — *Traitement des angines, irritations de la gorge*, toutes les infections buccales : *gingivo-stomatites*, *pyorrhée alvéolaire*, *accidents de dents de sagesse*, etc... — Leur rôle *prophylactique* en période de *grippe* est des plus importants.

Doses. Mode d'emploi. — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

En flacon de 70 comprimés.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Turbigo 72-34.

AMPHOTONYL « LERSAM »

Sédatif spécifique du système vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonyl-urée (<i>gardénal</i>)...	0,02
Extrait de belladone	0,002
Para-acetphénétidine (<i>phénacétine</i>)	0,10
Extrait fluide d'aubépine	0,05
pour un comprimé.	

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Indications thérapeutiques. — Analgésique. Sédatif général. *S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques.* Spasmes douloureux, Palpitations, Insomnies, Dyspepsies nerveuses, Asthme, Troubles endocriniens, névralgies, etc.

Action très efficace. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

Prix : Le tube de 40 comprimés : 18 fr. 20. (Admis aux A. S.).

Échantillons, littérature :

Laboratoires INGE

14, rue Maublanc,

PARIS (XV^e).

AMPOULES ANTI-H

(H = symbole de l'acidité).

Médication stomacale.

Présentation. — 14 ampoules buvables.

Composition. — Suspension colloïdale de silicate d'alumine et de sodium.

Action. — Action non pas chimique, par neutralisation, mais physique par formation en présence de l'acidité stomacale d'une bouillie gélatineuse à la fois *fixatrice d'acide* (hyperchlorhydrie) *modératrice* (hypermotricité et spasme du pylore) et *protectrice* (pansement physiologique de l'ulcère).

Indications. — Traitement héroïque et d'une innocuité absolue des gastralgies, dyspepsies, hyperchlorhydrie, hypermotricité et spasme du pylore, ulcères, aérophagie.

Mode d'emploi. — Une ampoule dans un peu d'eau après les 2 repas, ou au moment des douleurs, ou selon indications médicales.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS. (Tél. : Gobelins 90-00.)

AMPOULES AUTO-INJECTABLES ACRON

Pour injections hypodermiques.

Présentation et composition. — *En ampoules de 300, 100 et 50 cc.*
Tous les sérums artificiels (Soluté physiologique glucosé, gélatine, physiologique camphré et glucosé camphré).

En petites ampoules de 1 cc.

Tous médicaments courants et d'urgence (Adrénaline, Caféine, Ergotine, Morphine, Strychnine, Cacodylate de Soude, Ether, Spartéine).

En petites ampoules de 1, 2 et 5 cc.

Camphre solution aqueuse et huileuse.

Mode d'emploi. — Injection Hypodermique :

Casser le bec de l'ampoule, pointe en bas, à travers le caoutchouc et le gaz sous pression fait sortir le liquide (pour les grosses ampoules on régularise le débit à volonté au moyen d'une vis).

Pour injection intraveineuse (appareillage avec aiguille démontable).

Avantages. — Asepsie absolue, rapidité d'exécution.

Remarque. — Le tout est stérilisé en fin de fabrication (d'où stérilisation parfaite). Tout est prêt pour l'injection, pas besoin de seringue.

Laboratoires de TECHNIQUE THÉRAPEUTIQUE

M. COUDERT, Pharmacien

37, rue de la Haie-Coq — AUBERVILLIERS (Seine).

AMPOULES BOISSY

pour Inhalations.

AMPOULES BOISSY DE NITRITE D'AMYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 160-1

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabès, Mal de mer, Migraines, etc.*

AMPOULES BOISSY D'IODURE D'ÉTHYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 160-4

Indications. — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.
Durée d'utilisation : suivant fréquence des crises.

Prix : 16 francs la boîte de 12 ampoules.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV°).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

AMPOULES REIPAR

Composition. — Solution d'acide salicylique injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu. Toutes les algies rhumatismales. Sciatique. Lumbago.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées ou intramusculaires *loco dolenti*. Le Reipar porte l'acide salicylique là même où il doit agir.

Pour la voie intraveineuse : Intra-Reipar (*Voir ce mot*).

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 18 francs.

Prix spéciaux pour propharmaciens, cabinets médicaux, hôpitaux et cliniques.

Echantillons et littérature sur demande.

LES LABORATOIRES DRAPIER
RETHIEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

AMPOULES « VIGOR »

Composition :

Cinnamate de Benzyle.....	0,050
Cholestérine.....	0,125
Camphre.....	0,150
Lécithine.....	0,050
Vitamines D.....	500 Unités Internationales.
Huile d'Olive stérilisée, Q. S... pour une ampoule de 5 cc.	

Propriétés. — Puissant reconstituant, non toxique, à effet durable, renforcé par la présence des Vitamines D. en solution huileuse.

Son emploi nouveau en injections intramusculaires contrôlé par de multiples essais en clientèle et en milieu hospitalier se révèle avec cette voie directe comme présentant le maximum d'efficacité.

Indications. — Convalescence de maladies infectieuses ; Convalescence à la suite d'interventions chirurgicales ; Anémies sans origine bien déterminée ; Pré-tuberculeux ; Tuberculoses en évolutions (même fébriles) ; Lymphatismes ; Tous les états asthéniques.

Contre-indication. — Aucune.

Posologie et Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 jours, dans les cas moyens. — Une ampoule tous les jours dans les cas où un résultat rapide est recherché.

Important. — A employer uniquement par la voie intramusculaire.

Nota. — Boîtes de 10 ampoules pour un traitement de 20 jours.

Prix au public : 28 francs.

Laboratoires VIGOR

26, Chaussée de la Madeleine. — NANTES (Loire-Inférieure).
 (Tél : 149-78)

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et Vitamines de croissance des Céréales germées.

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indications thérapeutiques. — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop 3 fois par jour après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Prix : le flacon sirop 18 fr. 70 ;
La boîte de comprimés : 14 fr. 70.

**Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER**

10, rue Clapeyron — PARIS.
(Tél. : Europe 58-97.). — C. 150.854.

ANACLASINE INFANTILE

États digestifs et cutanés. — Anaphylaxie.

Composition. — Hyposulfite de soude et de magnésium associés à des polypeptides spécifiques.

Indications :

Troubles digestifs : Etat saburral, inappétence, nausées, déficience hépatique, intoxication alimentaire, troubles de l'assimilation.

Dermatoses : Urticaire, eczéma, prurit, œdème de Quincke, éruptions.

Phénomènes neuro-endocriniens et diathésiques : Migraines, Insomnies, Vaso-dilatation et Vaso-constriction périphériques, Accidents sériques.

Posologie. — *Granulé.* — Jusqu'à 3 ans : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Au delà de 3 ans : 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, de lait ou à croquer.

Prix . 18 fr. 70.

Laboratoires A. RANSON
Docteur en pharmacie

96, rue Orfila — PARIS (XX^e Arr^t).
(Tél. : Ménilmontant 62-81, 62-82).

ANACLASINE RANSON

Antianaphylaxie, Cytophylaxie.

L'Anaclasine Ranson (ἀνὰ — contre, κλάσις — choc) est une préparation anti-anaphylactique polyvalente et cytophylactique.

Forme. — Comprimés et Granulé.

Action. — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme, stimule la fonction cellulaire, améliore l'état hépato-biliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension.

Composition. — L'Anaclasine comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés halogénés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et, d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques (20 peptones différentes).

Indications. — Anaphylaxie alimentaire, états hépatiques, intolérance digestive, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foins, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes.

Doses journalières. — *Adultes* : 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

Enfants : au-dessus de 10 ans : de 1 à 3 comprimés par jour, ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

Anaclasine infantile (Voir ci-contre la notice).

Durée du traitement : minimum 15 jours.

Prix : Granulé : 19 fr. 20. — Comprimés : 17 fr. 10.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS.

(Tél. : Ménilmontant 62-81 et 62-82.)

ANALGÉNINE OBERLIN

Deux formes : A. solution, B. cachets.

A. Solution.

Une cuillerée à soupe contient :

Pyramidon.....	0 gr. 30
Antipyrine	0 gr. 30
Bromhydrate de quinine	0 gr. 10
Caféine	0 gr. 05

Solution agréablement aromatisée au café. A diluer dans une tasse à café pleine d'eau chaude et très sucrée. Il est important de sucrer largement.

B. Cachets.

Même formule, mais phénacétine au lieu de pyramidon.

Indications. — Migraines, Névralgies, Sciatique, Paludisme.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

ANALGÉSOL

Présentation. — Pommade pour l'usage externe.

Composition. — Menthol, Salicylate de Gaïacol, Excipient.

Indications. — *Curatif* : Névralgies intercostales, Névralgies faciales, Névrites, Rhumatismes, Sciatiques.

Préventif : Angine, Otite, Oreillons.

Posologie. — *Névralgies intercostales* : 3 applications à 1/2 heure d'intervalle, en onction locale, continuer 3 applications par jour pendant 4 à 5 jours.

Névralgies : Faciales dentaires, etc... 2 à 3 applications à 1/4 d'heure d'intervalle.

Névrites, Rhumatisme, Sciatique, Lumbago, 3 applications par jour pendant 5 à 6 jours.

Préventif : une application matin et soir sur les régions Parotidiennes et Sous-Maxillaires.

Contre-Indications. — Ne jamais appliquer sur les muqueuses.

Prix : 12 fr. 75.

Littérature et échantillons :

Laboratoires MARCEL LOGEAS

Docteur en Pharmacie.

24, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Suff. 03-38.)

ANALPYRINE

Antinévralgique.

Composition. — Chlorhydrate d'amyléine, salipyrine, pyramidon, en milieu alcalin caféiné.

Indications. — Névrites, névralgies, sciatiques, céphalées de la grippe ou des pyraxies, rhumatisme articulaire, arthrites douloureuses.

Algies du cancer, du tabes. Coliques hépatiques et néphrétiques (traitement symptomatique seulement).

Présentation. — En flacons de 45 cc.

Posologie. — Doit être prise à la dose de XXX gouttes, dans un peu d'eau, de préférence loin des repas. Cette dose peut être renouvelée sans inconvénient jusqu'à 10 à 12 fois par 24 heures, selon l'intensité de la douleur et la réceptivité du malade.

S'abstenir chez les albuminuriques.

Le flacon, prix au public : 17 francs.

Laboratoires de l'ANALPYRINE

M. BERTRAND, Pharmacien

NOMEXY (Vosges).

ANAPEPTONE VASSAL

Forme et Composition. — Comprimés dragéifiés de *peptones polyvalentes* de viande, de poisson, d'œuf, de lait, de gélatine, de végétaux.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

Doses moyennes. — 1 ou 2 comprimés 1 heure avant les repas principaux.

La boîte de 50 comprimés suffit à une cure :
20 fr. 80.

Échantillons gratuits.

Laboratoire LÉON DANJOU

28, rue Hôpital-Militaire — LILLE.

ANAPYOL

Pommade antiseptique cicatrisante.
(Formule expérimentée à l'hôpital Saint-Louis.)

Composition :

Oxyde jaune de Hg.....	5 gr.
Acide salicylique.....	2 gr.
Ichthyol	3 gr.
Oxyde de zinc	15 gr.
Lano-vaseline	75 gr.
Essences antiseptiques et aromatiques.	Q. S.

Indications :

Topique d'une efficacité reconnue dans toutes les lésions suppurées et infectées de la peau, **Anapyol** est d'un emploi courant dans la clientèle où il peut être prescrit pour les affections suivantes : eczémas chroniques et eczémas aigus *infectés*, ulcères variqueux et ulcérations de toutes natures, pyodermites, impétigos, gourme, acné, séborrhée, dartres, blépharites.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires FABIU

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI°).
(Tél. : Passy 87-85.)

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylocinnamiques, Thymol, Eucalyptol.

Forme. — Liquide rosé pour usage externe, entièrement miscible à l'eau (inhalations froides, compresses, gargarismes).

Indications. — Rhumes, Sinusites, Grippe, Toux spasmodiques, Coqueluche. Prophylaxie des contagions, Angines.

Mode d'emploi. — *Pure* : pulvérisations ou aspersions dans les pièces sur vêtements, draps, linge, *mouchoirs*. (Toux, Rhumes, Grippe, etc.)
Inhalations froides sur mouchoir et dans les mains.

Diluée (Toux, grippe, coqueluche) : *compresses* sur la gorge et la poitrine.
Diluer dans 4 parties d'eau chaude. Recouvrir de coton cardé ou d'une étoffe de laine. Laisser en place toute la nuit.

Gargarisme : angines, adénoïdites, 1/2 cuillerée à café d'Anaquintine, plus une cuillerée à café de Borate de Soude dans un verre d'eau chaude.

Anaquintine gouttes nasales.

(Voir RHINAQUINTINE.)

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados)

ANAUURAL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Phényl-éthyl-malonylurée, phényl-méthyl-malonylurée, bo-rotartrate de calcium.

Indications. — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

Doses. — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 20 fr. 80 (20 jours de traitement).

Laboratoires BARTHELEMY

1, place Forbin

AIX-EN-PROVENCE

(Tél. : 1-70.)

ANAXÉRYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 363-25.

Forme. — Pommade (tube).

Composition. — Dioxyanthranolsulfonate de sodium, Thioélaïdinosulfonate de sodium, Huile de Bouleau, Résorcine, Baume du Pérou.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiparasitaire, Antipsoriasique.

Indications. — Toutes dermatoses sèches ou squameuses, Psoriasis, Parakératoses, Affections parasitaires, Mycoses, etc...

Mode d'emploi. — Appliquer l'ANAXÉRYL en massant légèrement. Enlever l'excès de pommade avec un tampon d'ouate. Éviter le contact de l'Anaxéryl avec les muqueuses.

Le tube de 40 grammes : 14 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

ANDROCALCION

Forme II

Composition. — Calcium, Magnésium, Phosphore, associés à la Théobromine, à l'Iodaseptine et à l'Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Ménopause masculine, *Préventif* des troubles de la Cinquantaine, *Traitement* de ses accidents.

Troubles endocriniens, nervosité chez la femme non mariée.

Propriétés. — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

Doses. — Trois à quatre dragées à prendre trois fois par jour (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

Forme E

Composition. — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, hormone gonadotrope. Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent.

Présentation et Doses. — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 à 4 dragées trois fois par jour, 12 jours par mois.

Prix : 25 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.
(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

ANDRO-GOUTTES

Opothérapie orchitique renforcée.

Fractions lipo-soluble et hydro-soluble de la glande.

Glande interstitielle + glande spermatogénétique.

1 cc. = 50 gr. de testicule frais de taureau.

Indications. — Chez l'enfant : Troubles du développement génital ; Chez l'adulte : Asthénie sexuelle, Sénilité précoce, Adiposité (par diminution du métabolisme), Surmenage ; Chez le vieillard : Adénome de la prostate.

Chez la femme : Troubles de la puberté et ménopause, Carence sexuelle, Troubles nerveux.

Posologie. — XXX à XL gouttes par jour en deux prises dans un peu d'eau, à jeun. (On peut augmenter ces doses sans inconvénient.)

Opothérapie complémentaire chez la femme : aux mêmes doses dans les 20 jours qui suivent le dernier jour des règles.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII°).
(Tél. : Wagram 07-90.)

ANDROSTINE

CIBA

EXTRAIT ORCHITIQUE HYDROSOLUBLE.

Action physiologique. — Chez la femme: Équilibre de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. (Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas.) Chez l'homme: Activa-trice de la spermatogénèse. — Dans les deux sexes: Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

Indications. — Chez la femme: Troubles de la ménopause et de la puberté. Anxiété génitale, érotomanie, onanisme. Troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. Chez l'homme: Asthénie post-infectieuse, Infantilisme, impuissance. Dans les deux sexes: Obésité, engelures, acrocyanose, diabète.

Comprimés. Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comp. par jour, 1 amp. tous les 2 jours.

Flacon de 40 comprimés.

Boîte de 4 ampoules.

(Voir Perandrone.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél.: Moncey 43-26.)

ANDROVAR

(Gouttes.)

Traitement de choix des troubles ovariens.

Composition: { Orchitine (discrète).
Gouttes à base { Thyroïde (dose réduite).
d'extraits { Hypophyse (lobe antérieur).

Indications. — Tous les troubles de la fonction ovarienne: Puberté, Aménorrhée, Dysménorrhée, Nervosisme, Carence sexuelle (célibataires et veuves de fait et de « principe »), Ménopause, Obésité.

Présentation:

Gouttes: Flacon compte-gouttes de 20 cc. = soit 600 gouttes environ. Prix: 25 francs.

Demi-flacon compte-gouttes de 10 cc. = soit 300 gouttes environ. Prix: 15 francs.

Posologie:

XXX à LX gouttes pro die en deux ou trois fois, loin des repas si possible (sinon, faire absorber avant le repas, dans un peu d'eau).

Laboratoires ANDROVAR

139, rue Jean-Jaures — MAISONS-ALFORT (Seine).

(Tél.: Entrepôt 13-97.)

ANDROVULES

(Ovules.)

Traitement de choix des affections gynécologiques liées ou non à une insuffisance ovarienne. (Opothérapie complémentaire par voie naturelle.) Antiseptique, Décongestif.

Composition. — Orchitine (absolument discrète), Sulfate neutre d'oxyquinoléine, Glycérine solidifiée.

Indications. — D'une part, toutes les affections gynécologiques (métrites, salpingites, annexites, etc.) et, d'autre part, tous les troubles de la fonction ovarienne (aménorrhée, dysménorrhée, nervosisme, carence sexuelle, etc.). (*Voir également Androvar.*)

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Posologie. — 1 ovule le soir au coucher (faire garnir la malade).

Le traitement de 20 jours par mois pour les cas rebelles sera très utilement complété par l'**Androvar**.

Les Androvules ne tachent pas.

Laboratoires ANDROVAR

139, rue Jean-Jaurès — MAISONS-ALFORT (Seine).
(Tél. : Entrepôt 13-97.)

ANÉGRINE

Composition :

Acide quinoléique carbonique, associé à l'Arbutine, à la phénolactine et au cascara.

Action :

Élimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Mode d'emploi :

Cas aigus, 6 à 8 comprimés ou cachets par jour, en 2 ou 3 fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés ou cachets par jour. — Cas chroniques : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Prendre les comprimés ou cachets au commencement des repas avec les premiers aliments.

Prix : Comprimés : 18 fr. 15. — Cachets : 19 fr. 20.

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : + Alésia 22-46.)

ANGÉIOL

Gouttes.

Cure spécifique des malaises de l'Hypertension artérielle.

Composition. — Extraits sélectionnés de citronnelle, fleurs d'oranger, tilleul, uva-ursi, prêle, genêt...

Doses et mode d'emploi. — XV gouttes dans un demi-verre d'eau froide sucrée ou non, trois heures après le repas du soir, ou le matin à jeun une heure avant le petit déjeuner, pendant 20 jours. Arrêt de 10 jours et reprise du traitement, autant de fois qu'il sera nécessaire.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nervin, faible hypotenseur, il donne une rapide sensation d'euphorie. Goût agréable.

Indications. — Vertiges mêmes ceux d'origine toxique (tabac, alcool), spasmes vasculaires, troubles subjectifs labyrinthiques, déséquilibre vago-sympathique, angoisses, nervosisme, pléthoriques, algies précordiales.

Prix : Le flacon pour 45 jours de traitement environ : 24 francs.

Demandez échantillons copieux à la

Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques.

10, rue du Pont-aux-Chèvres — FONTENAY-LE-COMTE (Vendée).

Dépôt : ÉTABLISSEMENTS DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, Paris, et leurs succursales : Rouen, Caen, Rennes, Tours, Moulins, Lyon, Limoges, Bordeaux, Toulouse Montauban, Narbonne.

ANGIHORMOL

du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition :

Pancréas (Extrait total)	}	0,05
Ovarine		
Orchitine		
Hypophysine (glande totale).....		
Prostatine.....	}	à 0,02
Placentine		
Parathyroïdine.....		0,001

Propriétés. — L'Angihormol, grâce aux propriétés énergiques des glandes endocrines, agit tout particulièrement sur les veines et sur les varices en stimulant les contractions du muscle veineux, atone.

Indications. — Porteurs d'Ulcères Jambiers des deux sexes. Varices, hémorroïdes, périphlébites (déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux).

Remarques. — L'emploi de l'Angihormol doit être suspendu pendant la période de menstruation.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas.

Demandez les brochures des docteurs P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

ANGIOLYMPHE

Extrait végétal d'Orchidées (*Orchis mascula*).

Profond modificateur du terrain, dont il exalte les réactions de défense. AUCUNEMENT TOXIQUE. Ne provoque aucune réaction générale ou de foyer.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose. Etats déficients.

Dans les formes pulmonaires :

EUFHORIE manifeste. BAISSSE de la température. DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs et autres symptômes.

AUGMENTATION de l'Appétit, du Poids, des Forces. AMÉLIORATION rapide de l'état général.

AMELIORATION des signes stéthoscopiques. DIMINUTION et DÉGÉNÉRESCENCE des Bacilles de Koch.

Dans les formes ganglionnaires osseuses, etc. AMÉLIORATION rapide de tous les symptômes.

Posologie. — 2 à 5 cc. en une injection intramusculaire quotidienne par séries de 8 à 12. Repos d'une dizaine de jours et reprise.

Compresses dans les manifestations chirurgicales (fistules, etc.).

Prix : 30 francs.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE

MORO, Pharmacien de 1^{re} classe

15, avenue de la Défense — PUTEAUX (Seine)

(Tél. : Défense 12-11.)

ANGIOSÉDINE

Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Formule. — Ext. mou de passiflore, de crataegus, de jusquiame, phenylethylmalonylurée, nitrite de soude, extrait de muguet, de gui, d'hamamélis, marron d'Inde, d'hydrastis, hypophyse et silicate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés de 0,50.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 614-1.

Prix : 21 fr. 30.

Pharmacie LACOR

81, rue de la Roquette — PARIS.

ANGIOXYL

Composition. — Extrait pancréatique désinsuliné.

Propriétés. — Action trophique vasculaire, vagotonisante et hypotensive.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension artérielle, Artérites de toute nature, Ulcères trophiques, Troubles de la ménopause, Troubles vasculaires de la vieillesse, Sclérose artérielle.

Formes. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc,
Sirop, flacon de 150 cc.

Posologie. — *Ampoules* : Série de 10 à 20 jours à raison d'une à 2 ampoules par jour en injection intramusculaire. — *Sirop* : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Prix : *Ampoules*, 27 francs. — *Sirop*, 21 francs.

Remboursement aux Assurés Sociaux :

Ampoules : Catégorie A. — *Sirop* : Catégorie B.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

ANGORAL

Antispasmodique complet.

Régulateur du système Neuro-Végétatif.

Indications principales. — Tachycardies, palpitations, extrasystoles, angoisses cardiaques, angine de poitrine, insomnies, mal de mer.

Déséquilibres du système vago-sympathique cardiaque, notamment ceux de la ménopause et de la maladie de Basedow.

Troubles précurseurs de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque.

Forme. — Comprimés dragéifiés non glutinisés.

Composition. — Un comprimé contient :

Extr. stabilisé de fleurs de Cratægus..	0 gr. 03
Extr. stabilisé de Valériane.....	0 gr. 03
Extr. stabilisé de Passiflore.....	0 gr. 01
Sulf. de spartéine (du genêt)	0 gr. 015
Phényléthylmalonylurée	0 gr. 016

Posologie. — *Dose moyenne* : 1 ou 2 comprimés au début des deux principaux repas jusqu'à sédation des phénomènes pathologiques.

Suspendre quelques jours et reprendre la médication s'il est besoin.

Mal de mer. — Aux trois repas précédant l'embarquement, prendre deux comprimés d'Angoral et continuer ainsi pendant les premiers jours de la traversée à absorber deux comprimés d'Angoral à chacun des deux principaux repas. Le traitement devra être continué le temps qu'il sera nécessaire pour s'amariner.

Par la suite, ne plus prendre qu'un comprimé à chaque repas et cesser la médication.

Prix : 17 fr. 20 le tube (8 à 15 jours de trait.)

Non soumis à la Réglementation des substances vénéneuses.

Laboratoires CHAMBON

Place Francheville — PERIGUEUX.

(Tél. 4-43.)

ANIODOL EXTERNE

Le plus puissant antiseptique externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

Formes. — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons ; ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses. — Normale : 1 cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : aseptie et désinfection des mains et des plaies. Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

Prix :

Poudre, comprimés, solution externe :
9 fr. 35.

Ovules : 14 francs.

Savon : 2 fr. 75.

Vaseline : 2 fr. 85.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes. — Nanterre (Seine).

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les
Docteurs. (Tél. : Longchamp 07-26.)

ANIODOL INTERNE

Le plus puissant antiseptique interne, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

Forme. — Gouttes.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses :

Nourrissons : III à V gouttes à chaque tétée.

Enfants : XX à L gouttes.

Adultes : XXX à CC gouttes.

Par jour dans une tasse de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

ANKYLOSYL

Composition. — L'*Ankylosyl* est une préparation à base d'iodure de Strontium additionnée de produits qui évitent l'iodisme : l'hyposulfite de sodium et des extraits de levure sélectionnés.

L'*Ankylosyl* est présenté en pilules glutinisées.

Indications. — Rhumatisme chronique, Raideurs et Ankyloses rhumatismales, Rhumatisme vertébral.

L'*Ankylosyl* chasse le calcium.

Mode d'emploi. Doses. — La dose moyenne est variable selon les maladies et l'intensité du processus pathologique.

Chaque pilule contient 0 gr. 20 d'Iodure de Strontium. La majorité des auteurs ont obtenu des améliorations remarquables en donnant de 2 à 10 pilules d'*Ankylosyl* par jour. C'est la dose efficace ordinaire.

Présentation. — Flacon de 40 pilules.

Flacon de 120 pilules pour les traitements prolongés.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes, rectites, prostatites.
Suppositoires, Pommade.

Formule simple. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

Formule composée. — Même composition que formule simple mais en plus : Adréraline huileuse, Stovaine basique, Menthol.

Administration. — *Crises aiguës* : Suppositoires Anoïde, formule simple. *Cas habituels* : Suppositoires Anoïde, formule composée. Pommade Anoïde.

La caractéristique des suppositoires Anoïde est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement-irritant contre les tissus voisins.

Mode d'emploi. — *Suppositoires* : Un le soir en se couchant. *Crises aiguës* : Un matin et soir.

Pommade : Application locale, matin et soir. } Traitement
Prix : 18 fr. 20 }
Prix : 16 fr. 10 } pour 10 jours.

* Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 12-35.)

ANOREXYL

Composition :

Condurango, Badiane, Colombo, associés à une Vitamine B et à la Génésérine.

Propriétés thérapeutiques :

Provoque l'appétit, stimulant gastrique, régularise les fonctions de l'estomac, calme les troubles du système nerveux sympathique et du plexus solaire.

Indications :

Toutes les inappétences, insuffisances gastriques, Gastropathies douloureuses, Troubles nerveux des fonctions digestives. Pas de contre-indications.

Doses :

Chez l'adulte : XXX à L gouttes, un quart d'heure avant le repas dans un peu d'eau.

Chez l'enfant : au delà d'un an, XII à XV gouttes deux fois par jour un quart d'heure avant le repas, dans un peu d'eau.

Le flacon : 17 fr. 05.

Laboratoires ARMORIL

7, rue de l'Armorique — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 53-70.)

ANTALGYL

du Docteur Moity

Trois présentations :

1° Antalgyl Cachets. — Spécifique radical de toute douleur, apaisant neuro-végétatif. Innocuité absolue pour la muqueuse stomacale. Euphorie rapide.

Formule. — Ether diéthylique de l'urimidopropane (1,3), en combinaison équimoléculaire avec la diméthylaminophényl-diméthyl-pyrazolone (1,23), 0 gr. 50 par cachet. (Excipient inerte magnésie hydratée Q. S.).

Indications. — Migraines, névralgies, rhumatismes, lumbagos, sciaticques, menstrualgies, coliques hépatiques et néphrétiques, algies post-opératoires. Un cachet d'Antalgyl épargne souvent une piqûre de morphine.

Pas d'accoutumance, pas de contre-indications.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Prix : 12 fr. 50 la boîte de 12 cachets.

2° Antalgyl Baume. — Au salicylate de Méthyle dissimulé et à odeur agréable.

Indications. — Rhumatisme, circulation, points de côté, sciaticques, névrites, névralgies, rhume négligé, pleurites, lumbagos, gouttes, torticolis, entorses, foulures.

Formule. — Acide salicylique, gr. Camphre du Japon, 5 gr. Salicylate de méthyle, 10 gr. Ess. de citronnelle, 5 gr. Méthane trichloré, 5 gr. Oxyde d'éthyle, 5 gr. Teinture térébenthinée de capsicum, 40 gr. p. 100 cc.

Mode d'emploi. — Frictions légères 3 à 4 fois par jour. *Ne pas employer en compresses.*

Prix : 13 fr. 50 le Flacon de 100 gr. environ.

3° Antalgyl suppositoires. — Enfants et adultes.

Peuvent être prescrits aux Assur. Sociaux. Diffusion strictement médicale.

Laboratoire du Dr J.-O. MOITY, Docteur en médecine,

Dr. en Ph^{ie}. Ex. I. H. P. — 199, bd Bineau. — NEUILLY-PARIS

ANTASTHÈNE CARRION

Composition. — Association de glycérophosphates à un extrait cérébral et spinal.

Formes. — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

Indications. — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

Posologie et mode d'emploi :

Enfants : 1 injection tous les 2 jours. 2 comprimés par jour aux repas.

Adultes : 1 injection par jour. 4 comprimés par jour aux repas.

Présentation et prix. — Boîtes de 12 ampoules ou de 50 comprimés : la boîte, 22 fr. 90.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

ANTÉLOBINE

Composition. — Hormone gonadotrope du lobe antérieur de l'hypophyse, physiologiquement titrée. *Pour injections sous-cutanées profondes ou intramusculaires.*

Propriétés thérapeutiques. — Excitant de l'ovaire et du testicule agit par leur intermédiaire sur l'ensemble du tractus génital.

Indications et posologie. — 1° Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien : aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la formation. Prescrire, alors, 1 ampoule quotidienne de 100 unités, 6 jours par mois, de préférence dans la première moitié de la période intermenstruelle ; 2° dans les méno-métrorragies, injecter 100 unités quotidiennes dans la semaine précédant la date présumée des règles ; une fois les règles déclenchées, injecter 250 à 500 unités par jour ; 3° Cryptorchidie, infantilisme masculin, impuissance : pratiquer des séries de 15 à 20 injections de 100 unités, séparées par des périodes de repos de 8 à 10 jours ; 4° Alopécie séborrhéique : 2 à 3 injections de 500 unités par semaine.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. à 100 unités-rat, prix : 57 fr. 20. Boîtes de 3 ampoules de 2 cc. à 500 unités-rat, prix : 57 fr. 20.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

ANTÉPARSINE GRÉMY

Composition. — Extrait antéhypophysaire mixte (gonadostimulines).

Titrage biologique. — 1 unité lapin ou 100 unités physiologiques par ampoule.

Indications. — Insuffisance endocrinienne de la puberté. Ectopies testiculaires. Hypofonctionnement ovarien et troubles ménopausiques. Hyperfolliculinémie. Stérilité. Déficiences glandulaires masculines, impuissance, séborrhée, alopécie. Sénilité précoce.

Forme. — Ampoule injectable, par voie sous-cutanée.

Prix. Boîte de 3 ampoules.....	23 fr.
— de 5 ampoules.....	35 fr.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX°).

ANTEPSAL INTERNE

Antiseptique intestinal sans égal.

Composition. — Combinaison d'aldéhyde formique et d'hexaméthylène tétramine dans une solution de Mixiod (sel d'oxyquinoléine).

Indications. — Toutes infections et intoxications du tube digestif, Diarrhées, Entérites, Infections des voies urinaires, Fièvres infectieuses, Grippe, Colibacillose et toutes maladies contagieuses.

Forme. — *Gouttes.* Facilité de prescription aux enfants et nourrissons.

Posologie :

Nourrissons..... 20 à 60 gouttes.

Enfants..... 30 à 100 —

Adultes..... 60 à 200 —

par jour dans un liquide quelconque, par doses fractionnées.

Prix : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle.

Laboratoires A. CLANCHE

VARS (Charente).

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique des D^{rs} Dufour et Le Hello.

Médication fondée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

Indications. — Hémorragies et États hémorragiques. Hémoptysies. Hémostase préopératoire.

Présentation. — Boîtes de 1 ampoule de 10 cm³.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule de 10 cm³. à renouveler au besoin après quelques heures.

Prix de vente :

L'ampoule..... 29 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ANTHIOMALINE

(Antimonio-thiomalate de lithium).

Composé organique titrant 16 % d'antimoine, contenant du soufre dans sa molécule.

Indications. — Lymphogranulomatose inguinale subaiguë (maladie de Nicolas et Favre), Rétrécissement du rectum, Leishmanioses, Kala-Azar, Bouton d'Orient, Bilharzioses vésicale intestinale, hépatique.

Présentations. — Boîtes de 10 ampoules de 1, 2 et 3 cm³. d'une solution à 6 % de sel. Boîte de 5 ampoules de 4 cm³.

Posologie. — Injections intramusculaires parfaitement tolérées. Séries de 12 à 20 injections (2 ou 3 par semaine).

Adulte : débiter à 0 gr. 03 de sel en augmentant chaque fois de 0 gr. 03 jusqu'à 0 gr. 18 ou 0 gr. 24.

Enfant : Selon l'âge et le poids, réduire les doses de 2 à 5 fois.

Prix de vente :

La boîte d'amp. de 1 cm³. : 17 fr. 50 ; 2 cm³. : 23 fr. 50.
3 cm³. : 29 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ANTHRASEPTOL

Granulé urotropine, charbon, citrate de soude et magnésie.

Propriétés. — Absorbant, Antiseptique intestinal, biliaire, urinaire, Cholagogue, draine la vésicule. Laxatif léger.

Indications. — Aérophagie, Fermentations intestinales, Colite, Appendicite chronique, Cholécystite, Infections des voies urinaires et biliaires, Migraines, Colibacillose, Syndrome entéro-rénal, Angiocholite, Lithiase.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café une heure après le repas, midi et soir.

Prix : 16 francs.

Durée : 9 à 10 jours.

Pharmacie BAUDE

SAINT-AUBERT (Nord).

(Tél. : 16.)

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

Colchicine en solution iodosalicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode	1 gr.
Excipient. Q. S. pour 100 cc.	

Dose et mode d'emploi. — Accès : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indications thérapeutiques. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

LABORATOIRES DE LA PHARMACIE DE LA PLACE ROYALE

4, rue Colbert — REIMS

Compte-Postal Paris 182-35. R. C. Reims 14101.
(Tél. : Reims 48-34.)

ANTI-ASTHÉNIE LAURIAT (Ex-Lauriatol)

Propriétés. — Reconstituant général, accroît le dynamisme des cellules nerveuses, accélère les échanges nutritifs.

Indications. — Dépressions nerveuses, surmenage physique et intellectuel, neurasthénie, anémie, chlorose, insuffisance de la nutrition, convalescences, pré tuberculeuse, tuberculose, croissance.

Composition. — Pour un comprimé :

Nucléinate de Manganèse	0, 025
Extrait sec de Noix vomique.....	0, 0025
Salicine cristallisée.....	0, 05
Quassia amara	0, 05
Condurango	0, 05
Glycérophosphate de magnésie.....	0, 05
Phosphate tricalcique	0, 20
Excipient (Talc, Gomme).....	0, 20

Forme et Avantages. — Comprimés dragéifiés inaltérables, pratiques à emporter, aucune saveur désagréable.

Conservation indéfinie.

Posologie :

Adultes : 4 comprimés par jour, soit 2 comprimés 1/2 heure avant chaque repas.

Enfants : au-dessus de 8 ans : 1/2 dose. Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 16 francs la boîte de 60 comprimés.

Laboratoires LAURIAT.

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-73.)

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
solanées nitrées, digitale et menthol.

Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.
Calme la toux.

Mode d'emploi. — Faire brûler la valeur d'une
demi-cuiller à café sur une soucoupe et aspirer
doucement la fumée de préférence par les narines.

Indications. — Crises d'Asthme, Emphysème,
Oppressions des bronchites chroniques, Ca-
tarrhes, Coryza spasmodique, etc.

Cigarettes Schulzé-Bengalais
aux mêmes principes.

Prix de l'étui (poudre) : 12 fr. 80
la boîte de cigarettes : 6 fr. 40.

L. N. C. n° 474-1 et 2. Ass. Soc. Catégorie B.

Laboratoire FAGARD
LONS-LE-SAUNIER (Jura).

ANTI-ASTHME DEHAUSSY

A chaque variété d'asthme, son traitement approprié.

Médication de fond :

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobélie, Belladone.

Médication complémentaire :

particulière à chaque variété d'asthme.

Anti-Asthmine A Iodurée. Asthme sec. Emphysème.

Anti-Asthmine B. Balsamiques, expectorants : asthme
vieilli avec bronchite chronique et emphysème.

Anti-Asthmine C. Iodure-caféine : asthme vieilli avec
retentissement cardiaque, dyspnées paroxystiques
des vieux scléreux pulmonaires.

Anti-Asthmine E. Éphédrine naturelle à donner de demi-
heure en demi-heure dès le début de la crise.

L'Anti-Asthmine E prévient et juggle la crise.

Posologie :

Adultes :

Comprimés : 2 à 3 par 24 heures.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants 10 ans : demi-dose.

Prix { Sirop. } 18 fr. 20
 { Comprimés. }

Laboratoire DEHAUSSY
50, rue Nationale — LILLE.

ANTI-DIABÈTE H

Composition :

A base de *Myrtille*, de *Fabiana* et de *Galéga*.

Indications :

Diabète et toutes ses manifestations et complications : gangrène, ulcères, phlegmons, asthénie génitale diabétique. — Incontinence urinaire. — Furonculose. — Acné.

Aucune contre-indication.

Dispense de régime

Présentation :

Une boîte de 20 cm. × 10 cm. pour un traitement de 8 à 15 jours.

Posologie :

1 cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Prix : 16 fr. 80

Laboratoire ALPHA

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin)

ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

Indications thérapeutiques. — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attaque à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante et lutte contre l'amalgrissement causé par l'excès de désassimilation.

Composition et Mode d'emploi :

Elixir contenant $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 30 \text{ extrait de kola par verre à} \\ \text{liqueur.} \\ 0 \text{ gr. } 021 \text{ saccharine par verre à li-} \\ \text{queur.} \end{array} \right.$

1 à 2 verres à liqueur après chaque repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Prix public : 20 fr. 75.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

ANTIDIABÉTIQUE REQUIS

Extrait concentré glyciné, inaltérable, de Vitamines B et de Diastases végétales.

Composition. — Feuilles de Noyer, Feuilles de Géranium Robert, Myrtille des Vosges, Boldo, Artichaut, Gui, Combretum R, Noix vomique, Arrhénal.

Propriétés. — Polyurie, Polydipsie, Polyphagie, Acétonurie, Acétonémie, Hyperglycémie, Vertiges, Troubles de la vue, Plaies et dermatoses d'origine diabétique, etc.

Dans les diabètes graves : Auxiliaire précieux de l'insuline à laquelle il convient de l'associer à la dose de 6 cuillerées à café par jour.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour aux repas soit pur, soit additionné d'eau fraîche aromatisée au citron, à l'orange, à la menthe, etc.

Enfants : 1 cuillerée et demie à café au-dessous de 10 ans diluée dans 3 cuillerées à soupe d'eau fraîche ou de lait, à prendre en 3 fois avant les repas du matin, de midi et du soir.

Durée des flacons de vente, à la dose normale de 3 cuillerées à café : 16 à 17 jours.

Prix au public : 32 francs du 1^{er} Mars 1938.

Laboratoire des Antidiabétiques REQUIS

163, boul. de la Croix-Rousse — LYON. (B 87-18).

ANTIDOL LEROY

Formule. — Cachets :

Codéinum.....	10 mgr.
Chinum Monobromhydricum.....	100 mgr.
Phenacetinum.....	150 mgr.
Acidum-Acetyl-Salicylicum.....	400 mgr.

Sans incompatibilités ni contre-indications.

Indications. — Rhumatisme articulaire, séquelles de Rhumatisme articulaire aigu, Arthrite sèche à craquements, Douleurs rhumatismales changeantes : articulaires, musculaires ou viscérales, Rhumatisme déformant et ankylosant, Sciatique intercostale, cervico-brachiale, faciale, Névralgies dentaires, menstruelles, Céphalées, Migraine, Grippe, etc.

Posologie. — 2 à 4 cachets en 24 heures, pris de préférence avec une infusion chaude, à n'importe quel moment de la journée.

LEROY-JALABERT

Pharmacien

LAMALOU-LES-BAINS (Hérault).



100

A

ANTI-FLOCLINE

DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRÉPARATION CHIMIOTHÉRAPIQUE
non toxique

DISSOLVANTE DES FLOCLATS

HUMORAUX OU TISSULAIRES

grâce aux propriétés anti-choc de ses 2 éléments solubles
ET

STIMULANTE DE LA CIRCULATION

à la faveur de l'action toni-cardiaque de son camphre soluble
pour

TRAITEMENT DES CHOCs ANAPHYLACTIQUES

curatif et préventif

PAR

DÉSENSIBILISATION DE L'ORGANISME

DANS LES MULTIPLES MALADIES D'INTOLÉRANCE

caractérisées par les troubles les plus divers
traduisant des états pathologiques souvent alarmants,
particulièrement des fonctions de la vie organo-végétative.

PRÉSENTÉE sous forme d'AMPOULES INJECTABLES

- COMPOSITION -

Hyposulfite de magnésium pur.....	0 gr. 10
Camphosulfonate de pipérazine.....	0 gr. 01
pour 1 c.c.	

En solution aqueuse..... à pH = 6,7 à 6,9
délivrée en **AMPOULES de 5 cc. à 2 pointes.**

Chaque ampoule de 5 cc. contient 5 fois les doses ci-dessus.

- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES -

L'Anti-Flocline permet de combattre efficacement tous les syndromes d'intolérance et troubles d'origine sympathique, par stabilisation des humeurs chez les sujets reconnus sensibles à certains agents alimentaires, médicamenteux, microbiens, chimiques, végétaux, etc.

L'Anti-Flocline donne des résultats cliniques très favorables, quelquefois tout à fait inattendus, par exemple dans l'Urticaire, l'Eczéma, les Névralgies, le Coryza, l'Asthme, la Colibacillose, les dyspepsies, l'Entérite, la Neurasthénie, les Palpitations, etc.

----- AUCUNE CONTRE-INDICATION -----

- MODE D'EMPLOI ET DOSES -

L'injection, toujours indolore, se fait dans les muscles (fesse ou cuisse).
Jamais la moindre réaction; toutefois mieux vaut l'injection lente.

DOSES MOYENNES POUR 48 HEURES

ADULTES :

Une injection d'une ampoule de 5 cc. tous les 2 jours (pratiquement trois injections de 5 cc. par semaine) jusqu'à concurrence de 24 injections de 5 cc. au minimum en 2 mois.

Pour la durée du traitement (2, 4 ou 6 mois consécutifs) et pour doses supérieures (5 ou 10 centic. par jour), se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS
4 cc.

ENFANTS
1 à 2 cc.

NOURRISSONS
1/2 à 1 cc.

PRIX AU PUBLIC : 27 fr. 00 LA BOITE de 8 AMPOULES

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

P.-L. DUMONT, Pharmacien,

2, rue Claude Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11 et 22-68.)

ANTIGÉNINES

Vaccins par voie buccale.

500 milliards de microbes par ampoule de 10 centimètres cubes, de bouillon-lysate.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 25 francs.

Antigénine C. E.

Colibacilles-Entérocoques : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

Antigénine C.

Colibacilles polyvalents : Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

Antigénine S.

Staphylocoques polyvalents : Anthrax, Furunculose. Staphylococcies.

Antigénine E. P. S.

Entéro-Pneumo Streptocoques : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

Antigénine T. A. B.

Bacilles typhiques, Para A. et Para B. : Fièvres typhoïde et paratyphoïde.

Posologie. — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

Aux nouveau-nés et enfants : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par 1/2 centimètre cube, augmenter de 1/2 centimètre cube chaque jour, jusqu'à 2 centimètres cubes.

Bouillon-Antigénine pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 26 francs.

Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique.

Boîte de 4 ampoules. Prix : 15 fr. 60

Ovules-Antigénines : métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 18 francs.

Laboratoires des ANTIGÉNINES

1, place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(Anciennement 43, rue Tournefort.)

(Tél. : Gobelins 26-21.)

ANTIGRIPPINE MIDY

Cachets

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dower, phénaoétine et pyramidon, caféine, codéine (1 centigr. par cachet). Ni quinine, ni antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — GRIPPE, aux premiers frissons, prescrire de préférence : 1 cachet vers 17 heures ; 1 cachet vers 21 heures ; 1 cachet le lendemain matin ; 1 cachet le lendemain soir, si besoin est, dans une boisson chaude (alcoolisée) ou tisane (verveine ou menthe).

Pour les adultes seulement.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique.

Indications. — État grippal et fébrile, Courbature, Maux de tête, Névralgies, Influenza et complications.

Prix : 7 fr. 80.

Durée du traitement : 3 jours.

Remboursé à 80 % aux Assurés Sociaux (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

ANTIPHLOGISTINE

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria, Eucalyptus).

Propriétés. — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'elle attire et engloutit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîtes fer-blanc embouties. Se chauffe au bain-marie, s'applique directement sur la peau ; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

Formats	{	0, 150 grammes.
		I, 300 —
		II, 450 —
		III, 900 —
		IV, 2 kg. 300

Antiphlogistine gynécologique.

Boîte gazez préparées.

Laboratoires de l'ANTIPHLOGISTINE

B. TILLIER, Pharmacien

11, rue Collange — LEVALLOIS (Seine.)

N° 433 du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

ANTIPIOL

Vaccin filtrat antipyogène polyvalent.
Immunisation locale suivant la méthode de Besredka.

Quatre formes :

- 1° Pommade pour pansements non adhérents.
- 2° Ampoules de 10 cc. pour compresses.
- 3° Ampoules de 1 cc. pour oto-rhino et oculistique.
- 4° Ovules pour gynécologie.

Indications. — Furoncles, Phlegmons, Absès, Plaies infectées, Plaies variqueuses, Ostéomyélites, Gerçures des seins, Crevasses et toutes blessures ou maladies de la peau, Affections gynécologiques.

Prix :

Pommade, amp. de 10 cc. et amp. de 1 cc. 14 fr. 35
Ovules..... 21 fr. 50

Ces produits peuvent être prescrits pour les Assurances Sociales.

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum.

Myagrium, Laurinum, Spirea, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer les SUPPOSITOES ANTIRRHOÏDES qui, plongés dans l'huile antirrhoïde, doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 27 francs. — Le demi-flacon : 15 fr. 50.

La boîte de supposi-cônes : 12 fr. 50.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ANTISCIATIQUE P. CHAMBON

Indications. — Traitement étiologique du *Rhumatisme chronique* de la *Sciatique*, du *Lumbago* et des différentes manifestations de l'*Arthritisme*. Aucune contre-indication.

Composition. — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (manganèse, magnésium, calcium, nickel, fer et excipient lactosé).

Forme. — Paquets de poudre soluble dans l'eau.

Mode d'emploi très important. — Sept petits paquets par jour d'heure en heure, ou de demi-heure en demi-heure, sans discontinuer, malgré les repas ; chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte ordinaire (5 jours de traitement)..... 15 fr. 60

Triple boîte (12 jours de traitement)..... 36 fr. 40

Boîte cure (21 jours de traitement)..... 54 fr.

Remboursable par les caisses d'Assurances sociales. La triple boîte et la boîte-cure renferment de gros paquets, spécialement dosés pour le flacon gradué contenu aussi dans ces boîtes : le malade fera dissoudre un paquet dans le flacon plein d'eau et absorbera toutes les heures pendant 7 heures, ou toutes les demi-heures pendant 3 heures et demie, une cuillerée à soupe de cette solution.

Laboratoires CHAMBON

place Francheville — PERIGUEUX

(Tél. : 4-43.)

ANTISEPTOMA

Spécifique des affections gastro-intestinales, complétant le pouvoir absorbant du *Charbon activé*, par l'adjonction de *Salicylate d'Urotropine* et de *Benzonaphtol*.

Forme. — Granulé sucré et anisé.

Indications. — Fermentations intestinales, dilatation d'estomac, aérophagie, ptose abdominale, pyrosis, Etats préulcéreux, insuffisance biliaire, cholécystite, colibacillose, intoxications.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café après le repas.

Prix : 14 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1403-1.

L. ROBERT, Pharmacien.

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : 70.)

ANTI-URIQUE

de Contrexéville.

Citrate sodique de Pipérazine..	4 p.	100.
Héxaméthylène-tétramine	1	—
Benzoate de soude	5	—

Indications. — Lithiase, Gravelle, Goutte, Obésité, Artériosclérose, Rhumatisme déformant et chronique.

Forme. — Granulés.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à dessert par 24 heures dans un verre d'eau immédiatement avant les repas.

Prix : 15 francs (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires du D^r PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques antimicrobiens.

Antivirus colibacillaire. — Antivirus staphylococcique. — Antivirus streptococcique. — Antivirus mixte (strepto-staphylococcique).

Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 12 fr. 50.

— de 12 — 4 cc. — : 20 fr. 80.

— de 6 — 4 cc. — : 10 fr. 40.

Antivirus puerpéral (streptococcique).

En boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 20 fr. 80.

Antivirus gonococcique (Gonolyt).

En boîtes de 6 ampoules 10 cc. : 24 fr. 95.

Antivirus typhique.	{	1 boîte de 1 ampoule rectale de
		125 cc. : 20 fr. 80.
		1 boîte de 2 ampoules buccales de
		50 cc. : 20 fr. 80.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

Antivirus mixte en pommade (Arapal) :

10 fr. 40 et 5 fr. 20,

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens


Produits de « La BIOTHÉRAPIE »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

ANURIQUE DUPLEX

Composition :



Indications. — Incontinence d'urine infantile, Chorée, Sommeils agités et Tics nerveux de l'enfance.

Mode d'emploi :

De 3 à 4 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 4 à 5 ans : 3 cuillerées à café par jour.

De 5 à 7 ans : 4 cuillerées à café par jour.

De 7 à 9 ans : 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

De 9 à 15 ans : 2 à 3 cuillerées à bouche par jour.

(Au début des 3 repas et au coucher).

80 à 85 p. 100 de guérisons dans l'Incontinence d'Urine infantile.

Prix : 30 francs.

Durée d'une unité: environ 8 jours.

Laboratoires DREYER-DUFER

NOGENT-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 0-17.)

Échantillon sur demande.

ANUSOL

Composition. — Suppositoires et pommade anti-hémorroïdaires à l'iodorésorcinosulfonate de bismuth.

Indications. — Traitement rationnel, efficace et sans danger des hémorroïdes, rectites, fissures, érosions et états inflammatoires de la muqueuse anale, prostatites, congestion de la prostate. L'Anusol calme les douleurs, arrête le saignement, décongestionne et cicatrise.

Mode d'emploi. — Cas aigus : un suppositoire matin et soir ; applications de pommade sur les muqueuses anales externes.

Traitement d'entretien : un suppositoire tous les soirs puis tous les deux soirs à garder pendant la nuit.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N° 150-5 et 150-6.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en Pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85 - 16-86.)

En Belgique : **LABORATOIRES SUBSTANTIA**

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

ANXIOL (comprimés)

Forme pharmaceutique et composition :

Ephédrine naturelle (chlorh.).	0,01	Extrait d'Euphorbia.....	0,02
Hypophyse.	0,02	— de Cratægus ..	0,02
Belladone stabilisée	0,01	— de Scille	0,005
Phényléthylmalonylurée			0,01

pour 1 comprimé. (Flacon de 30 comprimés.)

Propriétés et avantages. — Synergie médicamenteuse permettant de rétablir l'*Equilibre humoral* par une action simultanée, légèrement *Excitante* sur le *Sympathique* et *Inhibitrice* sur le *Pneumogastrique*. L'association éphédrine-hypophyse a l'avantage d'une action *rapide* et *durable* par la voie *buccale*.

Indications thérapeutiques. — *Asthme bronchique, Emphysème, Dyspnées asthmatiformes, Rhume des foins, Vertiges, Migraine, Hypotension* avec état dépressif. Spasmes viscéraux. Dysménorrhée. Petit mal des rayons X. Allergies diverses.

Mode d'emploi. — 4 à 8 compr. par jour chez l'adulte ; 1 à 2 compr. par jour chez l'enfant au-dessus de 5 ans ; 1 à 4 compr. par jour chez l'adolescent. Chez l'asthmatique, 2 compr. à jeun le matin, 2 le soir et 2 en cas de menace de crise. Débuter par des doses faibles chez les individus à tension un peu élevée.

Prescription (strictement médicale). — 1 étui comprimés *Anxiol Falvy*.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Étoile 18-26.)

AORTOL

Composition :

Solution de trinitrine 1 p. 100	1/2 goutte.
Teinture de cratægus.....	III gouttes.
Nitrite de soude pulvérisé.....	0,01
Silicate de soude pulvérisé.....	0,015
Scille pulvérisé	0,015
Extrait de valériane stabilisé	0,03
Extrait de gui stabilisé	0,025
Scammonée	0,015

Il existe deux formes d'Aortol :

1° Dragées rouges répondant à la formule ;

2° Dragées blanches ne contenant pas de trinitrine.

Avantages. — Vaso-dilatatoire puissant ne provoquant pas de phénomènes réactionnels, sans action nuisible sur la muqueuse gastrique, étant donnée la glutination des dragées.

Indications. — Spasmes vasculaires, Tachycardie, Arythmie, Angines de poitrine, Fréthisme cardiaque, Cardialgie, Dilatation aortique, Hypertension, Artériosclérose, Troubles congestifs. Action cardio-rénale incontestable.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour : 2 au commencement des repas.

Prix : 20 fr. 80 le flacon.

Laboratoires A. CAPITREL

16, Bd des Filles-du-Calvaire — PARIS. Tél. : Roq. 33-63.

APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : Aphloïa, Piscidia, Hamamelis, Hydrastis et Viburnum.

Indications. — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).

Sédatif utéro-ovarien.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste

PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

APHOSAL

Spécifique de l'insomnie
chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

Composition. — Chloralose chimiquement pur, préparé d'après les travaux des professeurs Ch.-Richet et Hanriot.

Présentation. — Tube de 12 cachets de 20 centigr.

Propriétés thérapeutiques. — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique ; sans action sur le rein ni l'estomac. Tonique du cœur.

Posologie. — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Prix : 9 fr. 75.

Laboratoire de l'APHOSAL

48 bis, avenue Mozart — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 13-81.)

APIOLINE de CHAPOTEAUT

Composition. — L'Apioline est le principe actif des graines de l'*Apium petroselinum*. Sa préparation rationnelle ainsi que sa pureté en font un produit efficace et *sans danger*.

Propriétés. — Emménagogue, régulateur des règles, sédatif utéro-ovarien.

Indications. — Dysménorrhée, aménorrhée, troubles de la puberté et de la ménopause.

Présentation. — Capsules dosées à 20 cgr. d'Apioline.

Posologie. — 2 à 3 capsules par jour à prendre au moment des repas, 4 à 5 jours avant l'apparition des règles. Continuer cette dose pendant la durée de l'écoulement mensuel.

Effectuer une cure de consolidation le mois suivant et le troisième mois si nécessaire.

Prix : 17 fr. 05 la boîte de 20 capsules.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et C^{ie}
Laboratoire de Pharmacologie Générale
8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

APIOL TANIT

Composition. — Capsules d'Apiol jaune pur dosées à 0 gr. 25.

Indications thérapeutiques. — Emploi habituel de l'*Apiol*. Règles douloureuses et irrégulières.

Mode d'emploi. — Pendant les quatre jours qui précèdent les règles, prendre matin, midi et soir, une capsule d'*Apiol Tanit* dans une infusion chaude de *Tisane Tanit*. Cette dose peut être doublée si nécessaire.

Prix : 15 francs.

ROUANET, Pharmacien
ANTIBES (Alpes-Maritimes).

Approvisionnement pharmaceutique O. C. P.
et Grossistes.

APIVÈNE

Composition. — *Solution injectable de venin d'abeilles désalbuminée et titrée.*

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 1 cc. titrées à 1,5 US et 1 ampoule titrée à 0,15 US (ampoule jaune).

Propriétés thérapeutiques. — Action antialgique due à une « neurotoxine ». Action antirhumatismale.

Indications. — Sciatiques, radiculites, névralgies, névrites rebelles, zonas, etc. Rhumatismes chroniques ou déformants, lumbagos.

Mode d'emploi. — Pratiquer l'injection en totalité de l'ampoule jaune (ampoule à 0,15 US). Puis tous les 3 jours pratiquer une injection intramusculaire ou sous-cutanée (autant que possible *in loco dolenti*) en commençant par 1/4 et augmentant la dose par 1/4 jusqu'à 1 cc.

Il faut en général 6 injections pour une sciatique et 12 pour les rhumatismes chroniques.

Apivène Onguent. — (Association des salicylliques et de l'Apivène.) Traitement des Algies et des Rhumatismes par voie externe.

Prix : 15 fr. 30 le tube de 35 grammes.

Préparé par les LABORATOIRES PORSIN

39, rue Claude-Bernard — PARIS (V^e). Tél.: Gob. 80-34.

APPETYL

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille. Extrait délipodé de muqueuse gastrique.

Donne de l'appétit. — Aide la digestion.
Favorise l'assimilation des médicaments.

Ne contient ni AS ni P.

Posologie :

Flacon contenant 1.000 gouttes. 1/4 d'heure avant les repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée.

Adultes : XX à XXX gouttes.

Enfants : à partir de 1 an : I à 2 gouttes par année d'âge.

Aucune contre-indication.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires de l'APPETYL

37, avenue de la République — PARIS (XI^e).

APSOPHOL

Composition. — Agents nervins, antispasmodiques et sédatifs, à l'exclusion des iodures et de tout alcaloïde stupéfiant.

Indications. — Spécifique contre les bourdonnements d'oreilles, sifflements, battements et tous bruits subjectifs d'oreilles, avec ou sans vertiges.

Mode d'emploi. — Uniquement chez l'adulte. XXX gouttes matin et soir dans un peu d'eau ou de tisane 1/4 d'heure avant les repas. Après 8 jours de traitement, prendre XL gouttes matin et soir. Cure de 15 jours environ.

Echantillon sur demande.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire de l'EDISTOL.

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe,
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,
40, rue des Carmes — ORLEANS (Loiret).

AQUINTOL MIALHE

Spécifique de la Coqueluche, des Toux Spasmodiques et Coqueluchoïdes. — Calme la Toux des Bronchites chroniques.

Aucune toxicité, goût agréable, guérison rapide. Dès les premiers jours, la toux est modifiée, le malade n'éprouve plus ni suffocation ni vomissement, et il retrouve l'appétit et le sommeil.

1° Sirop à base de Chloro-Bromo-Fluor.

Doses :

Au-dessus de 6 m.	2 à 4	cuillerées à café.	
Moins de 5 ans...	3 à 8	—	—
Moins de 15 ans..	4 à 8	—	à dessert.
Adultes	5 à 8	—	à soupe.

Flacon 250 cc. Prix : 20 fr. 80.

2° Double Flacon Sirop Aquintol (500 cc.).

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

Conservation indéfinie.

Prix : 31 fr. 20.

3° Gouttes.

Deux formes : 1° Sucrée ; 2° Glycérinée.

Doses :

Les gouttes seront toujours prises dans un demi-verre d'eau :

De 6 mois à 2 ans : XV gouttes 2 à 3 fois par jour. De 2 ans à 5 ans : XV gouttes 3 à 8 fois par jour. De 5 ans à 15 ans : XXV gouttes 4 à 8 fois par jour. Adultes : L gouttes 4 à 8 fois par jour.

Flacon 30 cc. Prix : 15 fr. 60.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (II^e).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

ARAPAL

Bouillon-Vaccin en pâte molle, non grasse, contenant 75 p. 100 d'Antivirus Strepto-Staphylococcique Mixte de *La Biothérapie*.

Son excipient non gras évite toute macération et cloisonnement des exsudats.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies infectées, Brûlures, etc.

Présentation. — En tubes.

Grand modèle : 10 fr. 40.

Petit modèle : 5 fr. 20.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

ARCICA

Composition. — Ampoules buvables renfermant par dose cinq mgr. d'arséniate de soude associé à tous les principes actifs, tanniques et toniques, de la coca, cola, cannelle et du condurango.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant dans toutes les asthénies, Stimulant de l'organisme.

Indications. — Nutrition défaillante ou déficiente, Suites postopératoires, suites d'accouchement, Convalescence, Surmenage, Anémie, Rachitisme tardif, Neurasthénie, Lymphatisme, Diabète.

Nota bene. — L'Arcica répond aux desiderata de certaines caisses concernant les lois sociales actuelles : ce n'est ni un vin, ni un élixir, ni un aliment. C'est un médicament concentré que le malade peut prendre pur ou additionné, à son goût, de vin liquoreux ou d'eau sucrée.

Dose journalière. — Le contenu d'une ampoule avant le repas de midi. Chez les personnes très anémiées, ou chez les enfants (au-dessus de 12 ans seulement), une demi-ampoule.

Prix : 22 fr. 85 la boîte de 10 ampoules.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 45-18.)

ARG-EPH (GOUTTES)

Gouttes nasales.

Composition :

Argyrol de Barnes 3 gr. 33 } pour 100 grammes.
Chlorhydrate d'éphédrine naturelle . 0 gr. 25 }

Présentation. — Solution. En flacon de 10 grammes.

Indications. — Coryza aigu et chronique. Sinusite, Catarrhe du rhino-pharynx, Rhume des Foins, Céphalées d'origine nasale, Surdit  par catarrhe du rhino-pharynx. Congestion des trompes d'Eustache et dans tous les cas o  une d sinfection nasale s'impose.

Posologie. — *En gouttes.*

Comme pr ventif. *Adultes :* IV gouttes. *Enfants :* II gouttes, dans chaque narine, matin et soir.

Comme curatif. *Adultes :* IV gouttes. *Enfants :* II gouttes dans chaque narine, 4 fois par jour.

En pulv risations. — 4 fois par jour avec pulv risateur de mod le ordinaire.

Autres indications. — Toutes affections oculaires : Conjonctivites, Bl pharites, K ratites, etc., 1 goutte dans chaque o il 2   4 fois par jour,

Prix : 15 fr. 60.

Enregistr  au Laboratoire National de Contr le des M dicaments sous le N  783-3.

R. CUNIASSE, Pharmacien,

6, place des Ternes — PARIS (XVII ).

(T l. : Wagram 39-93.)

ARGYBIL

Composition. — Complexe d'Argyrol de Barnes (Vitellinate d'argent) et de bile.

Pr sentation. — Liquide.

Indications. — Traitement de l'oz ne, infections aigu s ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents r sultats en association avec le vaccin local.

Mode d'emploi. — Par le m decin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulv risations : 2   3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 15 fr. (Traitement pour 1 mois.)

LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III — PARIS
(T l. :  lys es 17-46.)

ARGYCUPROL

Association stable d'argent colloïdal 10 p. 100
et de cuivre colloïdal 0,1 p. 100.

Activité remarquable. Tolérance parfaite.

Forme — Boîte de 6 ampoules injections.

Mode d'action :

L'Argent : Spécifique du Gonocoque.

Le Cuivre : attaque les microbes associés que n'atteint pas l'argent.

Avantages. — Action polyvalente. Aucune causticité. Ne provoque pas de rétrécissement en raison de son action kératolytique sur l'Épithélium de la muqueuse.

Indications :

Chez l'homme : Blennorrhagie aiguë (traitement abortif). Guérison très rapide. Blennorrhagie chronique et ses complications. (Instillations uréthrales, grands lavages.)

Chez la femme : Blennorrhagie aiguë ou chronique. Affections gynécologiques (gonococciques ou simples) : Métrites, vulvo-vaginites, salpingites, etc... (Injections-Tampons.) Ophtalmologie. Dermatologie.

Prix : 20 fr. 80, la boîte de 6 ampoules-injections.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE.

MORO, Pharmacien de 1^{re} classe.

15, avenue de la Défense — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Défense 12-11.)

ARGYRESCINE MARS

Tire son nom de l'Argyrescine, l'alcaloïde le plus actif
du marron d'Inde.

Composition. — Extrait physiologique de Marron d'Inde, extrait d'hamamélis, de noix vomique, etc...

Indications. — Toutes affections ayant pour origine une mauvaise circulation et l'inflammation des veines.

Mode d'emploi. — Dose normale, X gouttes deux fois par jour aux repas. Dans le cas de crise aiguë d'hémorroïde, donner XV gouttes toutes les dix minutes jusqu'à cessation de la douleur, puis continuer à la dose normale. Chez la femme enceinte, X gouttes deux fois par jour en cas de varices, hémorroïdes, lourdeurs des jambes.

Résultat. — Disparition en quelques heures de tous ces troubles.

Contre-indications. — Néant.

Remarque. — Dans tous les cas, faire prendre l'ARGYRESCINE MARS en gouttes, la pommade ne servant qu'à hâter la guérison des ulcères et des hémorroïdes, si elle est employée en même temps. La pommade n'est employée seule que pour les engelures.

Échantillons sur demande.

Prix. Gouttes ou pommade : 18 francs.

Le flacon contient 600 gouttes environ.

Laboratoire MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22.

Et chez tous les grossistes.

ARGYRINE

Principe actif du Marron d'Inde.

Forme. Composition :

Granules : Argyrine, cinq milligrammes ; *Pommade* : Suppositoires Argyrine associée au benjoin et au Borate de soude. Ni belladone. Ni adrénaline.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et vaso-constricteur rapidement efficace dans les douleurs et hémorragies hémorroïdaires.

Apporte un soulagement et une amélioration durables dans les troubles circulatoires.

Mode d'emploi. — Granules ; 1 à 2 avant chacun des 3 principaux repas.

Suppositoires : 1 le soir au coucher.

Pommade : en onction, le soir de préférence.

Prix :

Granules	14 fr. 90
Suppositoires et Pommade ..	12 fr. 80

Laboratoires GEV

26, rue Chaptal — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 32-88.)

ARGYROPHÉDRINE

Gouttes nasales.

Composition. — Argylol de Barnes, Chlorhydrate d'Ephédrine naturelle, en solution isotonique stabilisée par procédé spécial.

Présentation. — 3 dosages. Ephédrine. Argylol.

Solution faible.....	1/2 p. 100	1 p. 100.
— normale	1	1
— forte	3	1

Indications. — Rhinites aiguës, rhinites chroniques, asthme, rhume des foins et tous les cas nécessitant une *désinfection nasale* parfaite.

Posologie. — En pulvérisations, cinq fois au moins par jour, avec tout pulvérisateur ou vaporisateur ordinaire.

En gouttes, le contenu d'un demi-compte-gouttes dans chaque narine, 5 fois par jour.

Prix : 17 fr. 40.

Laboratoire de l'ARGYROPHÉDRINE

20, avenue Jean-Jaurès — SURESNES (Seine).
(Tél. : Longchamp 17-37.)

ARGYSEPTINE

Granulé.

Affections gastro-intestinales et biliaires.

Indications. — Infection gastro-intestinale ; toutes intoxications ; Diarrhées ; Flatulences ; Intoxication alimentaire ; Affections gastriques ; Dyspepsies ; Dilatation d'Estomac ; Aérophagie ; Infection biliaire ; Lithiase biliaire ; Hépatisme ; Cholécystite ; Eczémas ; Prurits.

Formule :

Argent colloïdal	0,30
Charbon activé	5
Charbon animal	5
Urotropine	1,50
Extrait de belladone	0,025
Soufre colloïdal	1
Magnésie calcinée	2
pour 100 gr. granulé.	

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café au moment des repas. A croquer ou à délayer dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix : 18 fr. 65.

Laboratoires E. SOULIÉ

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS.

ARHÉMAPECTINE GALLIER

Hémostatique « per os » et injectable.

Admis dans les hôpitaux de Paris. Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante, de *Pectine* associée à son coferment minéral (calcium).

La *Pectine*, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, *C. R. Ac. Méd.*, 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix ... 25 fr.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — ... 15 fr.

Indications. — Toutes hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc., et à *titre préventif* : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

Posologie. — *Chirurgie* : 1 à 4 ampoules, dans un peu d'eau sucrée ou aromatisée, durant les 10 heures qui précèdent l'opération, et, après l'opération, 1 à 3 ampoules en 2 heures.

Médecine : dans les hémorragies faibles, 1 à 4 ampoules en 24 heures à 2 heures d'intervalle ; dans les hémorragies prononcées, 1, 2 ou 3 ampoules à 20 minutes d'intervalle et une 4^e ampoule 1 heure après l'ingestion de la précédente.

Dans les cas d'urgence : en injections intramusculaires ou intraveineuses, à raison de 5 cc.

S'emploie aussi par voie rectale.

Petite chirurgie, stomatologie : en application locale.

Ne présente aucune contre-indication.

Laboratoire R. GALLIER

38, bould du Montparnasse — PARIS (XV^e).
(Tél. : Littré 98-89.)

ARHÉOL

$C^{18} H^{24} O$

Principe actif de l'essence de Santal.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur, n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal.

Indications. — Blennorrhagie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyéllites, pyélo-néphrites.

Forme. — 40 capsules à 0 gr. 18 (10 à 12 par jour enttrois fois).

Le flacon : 19 fr. 50.

Deuxième présentation : Flacon de 40 capsules de 0 gr. 50 pour la cure à haute dose réalisant le traitement radical et spécifique de la blennorrhagie, 12 capsules par jour en trois fois et trois heures avant ou après les repas.

Le flacon : 40 fr. 50.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène digalacol tannin. Composé chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *maux de gorge*.

Prix : 18 fr. 15.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

ARISTARGOL

Association 9 parties Ichtyol, 1 Argent colloïdal, Antiseptique, Décongest., cicatrisant. Résolutif. Non caustique.

Ovules à 1 % (Pansem. vag.).

Poudre à 1 % Alcaline (Inject. gynécologie, toilette, yeux, O. R. L.).

Pommades :

Aristargol à 10 % : Dermatologie-Gynécologie.

Aristargol Stovaïne : Antihémorroïdale (1 % de stovaïne).

Prix de vente au public : 16 fr. 10.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer, — SAINT-MANDÉ
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

ARISTOPLASTIC

Aristoplast élastique.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 540-15.

Composition. — Pansement instantané, antiseptique, élastique. Agents antiseptiques : Biiodure de mercure, Sulfonaphtalène Azonaphtol disulfonate de Sodium.

Avantages. — Facilite la formation du tissu cicatriciel. En effet, grâce à un procédé, couvert par des brevets que la Maison Vigier a pris en France et à l'étranger, ce pansement instantané combine l'indépendance absolue de la compresse médicamenteuse recouvrant la plaie, au maximum d'élasticité du tissu élastique qui supporte la compresse. L'aération de la peau saine, au voisinage de la plaie, se fait librement. Antiseptique de puissance extrême, sans contre-indication.

Indications. — Pansements au voisinage des articulations.

Présentations :

Boîte métallique 6 pansements. Coffret : 3 bandes de 1 m. Boîte contenant des bandes de 0,25, 0,50 et 1 mètre ; largeur de 4 et 7 centimètres.

**Anciens Etablissements F. VIGIER et Cie,
Jean HUERRE et Cie**

9, r. de la Gare — LEVALLOIS-PERRET (Per. 57-41.)

ARKÉBIOS

Composition. — Soluté concentré, stabilisé, d'ACIDE PHOSPHORIQUE et de phosphates de : Calcium, Magnésium, Potassium et Sodium.

Cette préparation correspond au tiers de son poids d'Acide Phosphorique total. en un mélange équilibré de 1/5 à l'état libre et 4/5 sous forme de combinaisons monométalliques.

Ne contient ni Fer, ni Manganèse, qui sont de puissants antifixateurs du Calcium.

Indications. — Puissant régénérateur polyvalent des forces vitales, Reminéralisant, Recalcifiant, Toutes dépressions morales et physiques, Asthénies, Anémies nerveuse, somatique, musculaire. Surmenages, Nervosisme, Spasmes nerveux, Convalescence, Rachitisme, Etats prénéoplasiques, Colibacilloses, Aérophagie.

Présentation. — Gouttes, en un flacon de 40 centicubes.

Mode d'emploi et doses. — *Adultes* : XL gouttes dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas ; ou bien LXXX gouttes en une fois, le matin à jeun. Ces doses peuvent être doublées sans aucun inconvénient.

Enfants : II gouttes par année d'âge, dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Flacon de 40 cc. Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV^e).

(Tél : Littré 98-89.)

ARMANITE

Manganite d'Argent $\text{Ag}^2\text{O}^2\text{MnO}^2$.

Bactéricide non toxique kératoplastique.

Armanite colloïdal. Solution fluide 1 p. 100.

Flacon de 100 gr.

Abortif et curatif des Urétrites gonococciques.

Armanite. Suspension aqueuse 0,5 et 1 p. 100.

Flacon de 100 gr.

Gynécologie, Chirurgie, Dermatologie.

Armanite Ovules-Suppositoires. Boîte de 10.

Métrites, Cervicites, Rectites.

Armanite Pommade. Tube de 25 gr.

Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies atones.

Armanite Poudre.

Chirurgie. Pulvérisation vaginale, utérine et rectale.

Laboratoires de l'ARMANITE

J.-C. PERROTIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

3, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 00-53.)

ARQUERITOL LESURE

1° Huile injectable d'amalgame d'argent à 40 p. 100 de mercure.

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse, tolérance parfaite grâce à l'action de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Adopté par l'Assistance publique.

Flacon de 5 gr. pour une série de 6 à 8 piqûres : 25 francs.

Se fait aussi au titre de 16 p. 100.

2° Suppositoires d'Arquéritol.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS. Tél. : Littré 99-74.

ARRHÉNAL ADRIAN

Méthylarsinate de soude chimiquement pur.

Présentation. — a. Gouttes.

b. Ampoules à 5, 10 et 20 centigr. c.) Granules à 1, 2 et 5 centigr.

d. Comprimés à 25 milligrammes.

Indications thérapeutiques. — Préparation permettant la thérapeutique arsenicale intensive par voie buccale. Tuberculose, asthme, bronchite chronique, Maladies consomptives, chlorose, scrofule, anémie, maladies de la peau, fièvres paludéennes.

Posologie. — Gouttes dosées à 2 milligr., 12 à 30 par jour. Ampoules, 1 à 2 par jour. Granules, 1 à 3 par jour. Comprimés, 1 à 3 par jour.

Gouttes et ampoules..... 21 fr. 90

Granulés et comprimés..... 17 fr. 05

ARISTÉNAL

Présentation. — Comprimés dragéifiés sans saveur ni odeur désagréables, dosés à 10 centigr. de carbonate neutre de quinine et à 1 centigr. d'arrhénal Adrian.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhume de cerveau, de la grippe et de l'asthme des foins. Antiseptique général interne, décongestif des voies respiratoires. Stimulant des défenses organiques.

Posologie. — Adultes : 6 dragées par jour.

Enfants : 3 dragées par jour.

Le tube 14 fr. 90

Société française des produits pharmaceutiques

Anc^e ADRIAN & C^{ie}.

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

Composition. — Complexe de Ferro-manganèse codiastatique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

Propriétés. — Hématopoïétique, phagocytogène et névrosthénique.

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies, le surmenage des écoliers, et les convalescences.

Mode d'emploi. — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

Prix : 18 francs la boîte de 60 pilules.
pour traitement minimum de 15 jours

G. BERGEVIN

Docteur en pharmacie
CHATEAUDUN (Eure-et-Loir).
(Tél. : 68.)

ARSAMINOL

Composition. — Solution stérilisée, à la concentration de 26, 13 p. 100 de « 3-acétylamino-4-oxyphénylarsinate de diéthylaminoéthanol » titrée à 0 gr. 05 d'arsenic par centimètre cube.

Propriétés. — Produit arsenical pentavalent, injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire, à des doses réellement tréponémicides. Grâce à la technique de sa préparation, qui permet d'obtenir un corps à l'état de pureté parfaite, débarrassé de tous les isomères toxiques et grâce à la présence d'un groupement amino-alcool, qui favorise la très large tolérance de l'organisme pour le produit, l'Arsaminol n'a aucun des inconvénients des arsénobenzènes ou des autres arsenicaux pentavalents.

Injectations indolores

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations, spirochétoses, amibiases, trypanosomiasés, paludisme.

Posologie. — Consulter notices spéciales.

Formes. — Ampoules de 3 cc. (0 gr. 15 d'As.) et de 5 cc. (0 gr. 25 d'As.).

Pour les Enfants : *Arsaminol infantile*, solution dosée à 13,06 p. 100 en ampoules de 1 cc. 5 (1 cc. correspond à 0 gr. 025 d'arsenic).

Laboratoires CLIN-COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatico-arthritique.

L'Arséniodé donne toujours de l'appétit.

Mode d'emploi. — Doses moyennes.

Enfants : II gouttes par 24 h. et par année d'âge.

Adultes : X à XX gouttes, 2 fois par jour.

Durée moyenne : enfants 15 à 20 jours.

Laboratoire BURIAT

37, rue Spontini — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 64-23.)

ARSÉNOMYL

Nouvel arsénobenzol.

Très puissant tréponémicide en solution aqueuse stable préparée d'avance ou en poudre.

Indolore en injection intramusculaire.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre de Malte, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du Sommeil.

Formes. — Ampoules pour injections intramusculaires de solution d'Arsénomyl aqueuses glucosées préparées d'avance et indolores.

Poudre.

Posologie. — *Adultes* : débiter à 0 gr. 30. Augmenter progressivement les doses à 0 gr. 50, 0 gr. 70, 0 gr. 90, 1 gr. 05, suivant les malades.

Chez l'enfant les doses sont de 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 02, 0 gr. 03, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert
VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. Nord 03-34 et 66-53.)

ARSÉNOS-SOLVANT

Adopté par les hôpitaux.

Sérum glucosé avec addition de Gaïacol et de Chloroforme acétone pour injections hypodermiques et intramusculaires de Sulfarsénol.

— Indolores —

Présentation. — Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.

Boîte de 1 ampoule : 1 fr. 60.

Boîte de 6 ampoules : 8 francs.

Boîte de 12 ampoules : 14 fr. 90.

Voir *Sulfarsénol*.

Mode d'emploi. — Utiliser :

1 ampoule jusqu'à 30 cg.

2 ampoules de 30 à 60 cg.

3 ampoules au delà de 60 cg.

Laboratoires de Biochimie Médicale.

CH. DESGREZ, Docteur en Pharmacie

19-21, rue Van-Loo. — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

ARSHÉMO-FER-B

Forme. — Cachets (boîte de 30 cachets). Traitement de 15 jours.

Propriétés thérapeutiques et indications. — Puisant régénérateur du sang, Traitement rationnel et complet des diverses anémies. Chloro-anémies, états cachectiques survenant après les fièvres intermittentes. Maladie de Basedow, faiblesse physique et intellectuelle, Grossesses.

Formule. — Chaque cachet contient :

Hémoglobine.....	0,05
Nux vomica.....	0,02
Méthylarsinate de Sodium.....	0,02
Oxalate ferreux.....	0,15
Gluco-phosphate de Calcium.....	0,15
MgO lourde.....	0,15

Arshémo-Fer-B =

globules rouges + hémoglobine ++ coagulabilité ++ +

Pcsologie. — *Enfants* au-dessus de 12 ans : 1 cachet par jour avant les repas.

Adultes : 2 à 3 cachets par jour avant les repas.

H. BENOIT

Docteur de la Faculté de Pharmacie de Paris

POLIGNY (Jura).

(Tél. : 84.)

ARTÉRIOCRINOL

Chimiothérapie et opothérapie associées.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, Hypotenseur, Vaso-dilatateur et régulateur tensionnel, Antisclérosant.

Indications. — *A titre préventif* : tout sujet présentant, soit une tension ascendante, soit de la sclérose artérielle débutante, soit des spasmes viscéraux ou périphériques.

A titre curatif : chez tout malade présentant des manifestations rattachées aux trois mécanismes déjà cités ou à leur réunion. A titre indicatif : artérite des membres, Angine de poitrine, Manifestations nerveuses ou sensorielles, Phénomènes rénaux, digestifs, respiratoires, des hypertendus, etc.

Composition. — Trinitrine, caféine, silicate de soude, phényléthylmalonylurée, extraits de gui, hépatique et musculaire.

Forme. — Dragées à noyau mou.

Posologie. — 4 dragées par 24 heures espacées, en dehors des repas, à croquer.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160).

ARTÉRIOLEX OU MINÉRALOGÈNE

Spécifique de l'Artério-Sclérose.
Silicate de Soude titré soluble, assimilable.

Poudre : 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Comprimés : 4 à 8.

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café.

Dissoudre avant d'absorber.

Laboratoires VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON.

Tél. : Burdeau 28-07.

ARTÉRION VINCARDI

HYPOTENSEUR

Principes actifs. — Complexes stabilisés extraits du *Viscum album*, de l'*Allium*, du *Fucus vesiculosus*, du *Citrus limonum*.

Forme. — Comprimés lenticulaires glutinisés.

Innocuité absolue, tolérance parfaite. Pas de contre-indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires, qu'il dégrasse et assouplit. — Artério-sclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

Doses. — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire VINCARDI

Ph. VIGUIER, Pharmacien

14, avenue G.-Clemenceau. — NICE (Alpes-Maritimes).

Chèques postaux : Marseille 105-38.

R. C. Nice 9046.

ARTÉRIO-PHAN

Traitement anti-urémique et cholestérolitique
(préventif de l'artériosclérose et du cancer).

Formule :

Chlorophyllate de soude	0,002
Extrait de cynara	0,10
Chlorure de magnésium	0,10
Silicate de soude	0,10
Thyroïde.....	0,001
Parathyroïde.....	0,0005

Indications :

- 1° *A titre préventif* : Cholestérinémie, hypertension légère ou intermittente, artériosclérose au début, ascendance cancéreuse, traitement préventif à la suite d'ablation chirurgicale des tumeurs.
- 2° *A titre curatif* : Artériosclérose confirmée, athérome, aortite, néphrite scléreuse, thrombose, hémiplegie, essoufflement et défaillance du cœur chez les scléreux, spasmes des vaisseaux.

Prix : 20 francs.

Laboratoires A. MOURÉ

5 bis, boulevard des Italiens (Passage des Princes) —
PARIS (II^e). (Tél. : Rich. 82-56).

ARTÉRIO-VEININE

Composition. — *Cratægus, passiflora, gui, marron d'Inde, hamamélis* (Extraits stabilisés), *iode peptonisé*.

Indications. — Troubles de la ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

Forme. — Gouttes (Conservation indéfinie).

Doses. — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 16 fr. 25.

Laboratoires J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen

PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 22-32.)

ARTHRILAX

Poudre granulée sodique effervescente.

Deux cuillerées à café = 10 gr. de poudre contiennent :

Sulfate de soude	1 gr. 40
Phosphate de soude	0 gr. 60
Citrate de soude	1 gr.
Bicarbonate de soude	0 gr. 60
Sucre effervescent	Q. S.

Dose moyenne. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café dans un verre d'eau chaude le matin à jeun, ou bien fractionner en plusieurs doses avant ou après les repas.

Indications. — *Arthritisme* et ses douleurs, *Congestions hépatiques*, *Goutte*, *Obésité*, *Migraines*, *Hypertension artérielle*, *Eczémas* et *Affections de la peau*, *Constipation chronique*, *Infections gastro-intestinales*, *Gastro-entérites aiguës ou subaiguës*, *Gastralgies*, *Dyspepsies*, *Gastrites*.

En résumé, toutes les indications de la formule de Bourgel.

Prix : 22 francs.

Durée du flacon : 2 à 3 semaines.

A. LYONS, Pharmacien

30, rue Monge — PARIS (V^e).

(Tél. : Odé. 73-42.)

ARTHRILYSE

Granulé effervescent.

Composition. — Acide phénylcinchoninique, Pipérazine, Urotropine, Salicylate de lithine, Phosphate de soude, Citrate de soude, Boldine.

Propriétés. — Dissolvant et éliminateur puissant de l'acide urique. Cholagogue. Eupeptique. Antivisqueux. Décongestif.

Indications. — Arthritisme. Diathèse urique. Rhumatismes. Goutte aiguë et chronique. Gravelle et Lithiase rénale. Coliques néphrétiques. Artériosclérose. Troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires. Auto-intoxication. Dyspepsies. Hyperviscosité sanguine.

Posologie. — Traitement d'attaque : de 3 à 5 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau. Traitement d'entretien : de 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 22 francs.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

17, rue Chomel — PARIS (VII^e). (Litré 53-05).

ARTICHOLINE

Drainage biliaire.

Composition. — Sels de magnésium et extrait total d'artichaut en granulé.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café dans 3/4 de verre d'eau chaude le matin à jeun.

15 jours par mois.

Laboratoires Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mon. 33-86.)

ARTOBYL

Forme. — Dragées.

Composition :

Boldine.....	0,001
Extrait spécial superconcentré de feuilles d'artichaut obtenu par procédé professeur Quirin et Dagonnot.....	0,20
Cascara pulvérisé.....	0,05
Pour une dragée,	

Indications. — Lithiase biliaire, Insuffisances hépatique et biliaire, Cholémie, Constipation chronique.

Doses. — 1 à 3 dragées (dose normale : 2 dragées) à la fin de chacun des deux repas.

Prix : 18 fr. 50 la boîte pour une durée de 30 jours environ.

Durée moyenne de traitement : 3 mois.

Laboratoires DAGONNOT
CANNES

ARTREX-CROZ

Indications. — Traitement rationnel du rhumatisme sous toutes ses formes et des algies.

Composition. — Pyramidon, acide phényl-cinchonique, carbonate de lithine, soufre lavé, aspirine, lactose.

Doses. — 3 à 6 cachets par jour.

Laboratoires Ch. SEGUIN

7 rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mon. 33-86.)

ARTROCOLCHINE « C »

Goutte, Rhumatisme, Arthritisme.

Composition :

Acide Acétyltriméthylcolchicinique.	0,0027
Résine de Gaïac.	0,33
Hexaméthylènetétramine.	0,65
Iodure de Potassium.	2
Excipient.	Q. S. pour 100 grammes.

Propriétés. — Analgésique par la Colchicine ; Antiseptique urinaire par l'Hexaméthylènetétramine, diurétique et diaphorétique par la Résine de Gaïac ; Modificateur de la nutrition par l'Iodure de Potassium.

Indications. — Spécifique de la goutte aiguë ou chronique, du rhumatisme, de la sciatique, des névralgies, des névrites et des myalgies d'origine gouteuse et rhumatismale.

Avantages. — L'ensemble de l'association à base de Colchicine donne une action synergique très nette sans toxicité appréciable et sans les dangers de la Colchicine. Il n'y a donc à craindre, en principe, ni diarrhées ni vomissements.

Posologie, Forme et Mode d'emploi :

Sirop à prendre *loin des repas* à la dose de une cuillerée à bouche une ou deux fois par jour dans un demi-verre d'eau.

Se conformer aux indications du médecin.

Produits POLYPHARMA

Concess^{re}, L. BRUN, pharmacien, 92, rue Bobillot, PARIS (XIII^e).

ARVENSYL

Formule :

Phytothérapie associée aux alcalins (Formules dépuratives de BROCCQ).

Une cuillerée à bouche dans un verre d'eau correspond à une infusion de Bardane, Pensée sauvage, Séné lavé à l'alcool, Saponaire, Cassis, Gentiane, et à un verre de la Solution de Bourget.

Indications. — Traitement interne des Dermatoses, Hépatisme, Manifestations cutanées de l'Arthritisme.

Par cuillerées à café, ou cuillerées à bouche suivant le cas, dans un verre d'eau avant les repas ou le matin à jeun.

Prix : 18 fr. 90.

Laboratoires GERDA

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

ASCÉINE

**Acide acétyl-salicylique. Para-acétyl-phénétidine
Caféine**

ANALGÉSIQUE, SÉDATIF, ANTIRHUMATISMAL.

Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur et des clochers thermiques.

Indications. — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc..., Grippe, Arthrites aiguës et toutes manifestations fébriles ou rhumatismales.

Doses. — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour ;
Enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Tube de 20 comprimés.

Laboratoires O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

ASCIATINE

Diméthylamino-phényl-diméthyl-pyrazolone-
butylchloral.

Antinévralgique, analgésique et hypnotique.

Action élective dans le domaine du trijumeau.

Indications. — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

Présentation et posologie. — Comprimés à 0 g. 25,
1 à 3 comprimés par dose, 4 à 5 comprimés par
24 heures.

Prix de vente : { Les achet de 2 comprimés : 1 fr. 50
 { La boîte de 12 comprimés : 5 fr. 85
 { — 24 — 10 fr. 60

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

ASCOLÉINE RIVIER

L'ASCOLÉINE est à base de lipoïde hépatique phosphoré et iodé. Elle renferme les vitamines A et C, la vitamine D à l'état naturel, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

Indications. — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, prétuberculose.

Deux formes. — *Solution huileuse* : Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

Prix : 19 fr. 20.

Granulés : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

Prix : 19 fr. 20.

Toutes pharmacies, ou à défaut chez :

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : + Alésia 22-46.)

ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

Formule. — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

Indications. — Antisepsie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, flueurs blanches, ulcérations du col de la matrice, toilette intime.

Avantages. — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

Emploi. — *Poudre* : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir.

Comprimés : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

Prescrire : Une Aseptone, poudre ou comprimés.

Prix au public : 12 fr. 50.

Revient à 0 fr. 35 par injection.

Littérature et échantillons.

Laboratoires MOULIN

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 00-51.)

Remboursé par les A. S.

ASEPTORHINE

Huile aromatique, balsamique et antiseptique à base d'éphédrine, d'adrénaline, d'anesthésine et d'huiles essentielles.

Indications. — Désinfection habituelle des fosses nasales, coryza, ozène, rhinites, polypes, ulcérations, protection contre les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — En gouttes ou, mieux, en pulvérisations, 2 ou 3 fois par jour.
Prix : 15 fr. (pour 20 jours de traitement).

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

ASMOCRINE

(Dragées)

Composition. — Médication oposérothérapique à base de sérums activés de jeunes taureaux et d'organes frais de jeunes animaux.

Propriétés. — Désensibilisation, libération des émonctoires, brassage endocrinien.

Indications. — Asthme, Coryza, Rhume des foins.

Présentation et posologie. — Flacon de 70 comprimés à prendre à raison de 7 comprimés par jour pendant dix jours, au moins une heure avant chaque repas.

Prix : 24 fr.

Forme infantile : PEDIASMA (granulés).

Laboratoire biologique VALTRY

122, Champs-Élysées — PARIS.

(Tél. : Elysées 28-12.)

ASTHMASÉDINE

Respiratoire, Décongestif, Cardio-tonique, Diurétique.

Composition. — Pour 1 cuillerée à café:

Chl. d'Ephédrine	0,015	Iodure de potassium.....	0,20
Phényléthylmalonylurée..	0,015	Teinture de belladone	0,25
Caféine	0,10	Teinture de lobélie	0,50
Benzoate de soude	0,10	Excipient spécial	Q. S.

Traitement de la Crise d'Asthme et du Terrain Asthmatique. **Asthme.**
Emphysème. Dyspnées. Troubles Cardio-Vasculaires:

Doses moyennes : *Pour éviter les crises d'asthme :* Prendre entre les accès une cuillerée à café au début des 2 repas, pendant 2 jours. Puis 2 matin et soir au début des repas pendant 10 jours. Cesser 4 ou 5 jours et refaire une cure semblable.

Pendant les crises : 2 cuillerées à café au début des 3 repas, soit 6 par jour dans un peu d'eau sucrée.

En cas de crise subite et seulement en dehors des périodes de traitement : 1 cuillerée à café toutes les heures pendant 4 heures.

Demi-dose pour les *Enfants* à partir de 10 ans.

Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires HENRI SCHÉHADÉ
Pharmacien de la Faculté de Paris.
17, rue Chomel — PARIS (VII^e).
(Tél. : Littré 53-05.)

ASTHMÉDRINE

Composition :

Iod. de caféine stabilisé	0,40
Chl. d'Ephédrine	0,02
Sirop de Morphine.....	0,03
Teint. Datura.....	0,15
Teint. Belladone	0,20
Teint. Euphorbia pilulifera.....	0,10

par cuillerée à dessert.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe, Oppressions, Toux rebelles, Intoxications par les gaz et toutes dyspnées.

Posologie. — Pas de contre-indication. Une cuillerée à dessert au lever : une au coucher.

Emploi. — Diluer dans un peu d'eau. Prendre ensuite lait ou tisane.
Pour les enfants (10 ans) et les vieillards : cuillerées à café.
Le flacon dure 10 jours.

N. B. — *Asthmédrine* comporte la prescription et la surveillance médicales, que notre littérature préconise.
Echantillon sur demande.

Laboratoires ÉTIENNE
19, avenue Secrétan — PARIS.
(Tél. : Nord 89-34.)

ASTHMO-ACTINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-Cardiaque.
Le plus fort Elixir antiasthmatique connu.

Composition. — Synergie totale : Respiratoire, circulatoire et sympathique.

Une cuillerée à soupe contient : iodure de caféine 0,50, teinture de lobélie 0,50 ; Ext. thébaïque 5 milligr. Ext. belladone 1 milligr. Ars. de soude 1 milligr. Ext. grindelia 0,10, et...

...Nouveauté. — Ext. Actœa 0,05. Ext. nat. surrénale au 1/1000 0 gr. 07 dans sirop antiasthmatique stimulant diffusible pour 15 cc.

Indications. — Asthmes divers. Emphysème. Dyspnée des gazés, Catarrheux, Intoxiqués, etc...

Action rapide curative et préventive.

Posologie. — Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour loin des repas dans un peu d'eau ou de lait.
Enfants : à partir de 6 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

Le flacon 210 cc. : 17 fr. 25.

Pour un traitement de 8 à 15 jours.

Laboratoires G. BERTHON, Pharmacien, 9
DORNES (Nièvre) — (Tél. : 25.)

ASTHMOLYSIN

(Nom déposé.)

Contre l'asthme bronchique et le rhume des foins.

Composition. — Solution stérile du principe actif de la surrénale préparé selon la méthode du Dr Weiss.

Propriétés. — Ne contient aucun narcotique. Aucun effet secondaire nuisible. Injections indolores. Effet rapide et puissant.

Indications. — Asthme bronchique, Rhume des foins, Angine de poitrine, Collapsus cardiaque et vasculaire, Pneumonies.

Présentation. — Boîtes de 5 et de 10 ampoules de 1 cc. 1 cc. contient 8/10 de mmgr. de produit actif.

Posologie. — Au-dessous de 3 ans : 1/4 d'ampoule.
De 3 à 8 ans : 1/2 ampoule.
De 8 à 15 ans : 3/4 d'ampoule.

Injections sous-cutanées ou à la rigueur intramusculaires.
Jamais d'injections intraveineuses.

Laboratoires LOBRU

L. Brun, Pharmacien

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

ASTHMOSINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-cardiaque, Diurétique.

Composition. — Heureuse association de substances non toxiques, à action synergique, absolument inoffensives.

Un cachet contient :

Acide valérianique	0,007	Caféine	0,043
Théobromine (essai physiologique)	0,36	Acide acétylsalicylique ...	0,24
		Valériane pulvérisée	0,10

(Procédé spécial de préparation).

Indications. — Médication héroïque contre l'Asthme dit essentiel ou asthme nerveux. Soulage immédiatement les crises aiguës. Efficace aussi dans les cas d'emphysème aigu ou chronique dans les bronchites, dans la dyspnée brightique ou cardiaque. Bons résultats chez les gazés.

Action rapide, curative et préventive.

Posologie. — *Crise aiguë.* Dès le début de la crise un cachet dans une infusion de tilleul, camomille ou feuilles d'oranger. Si nécessaire un deuxième cachet deux heures après et au besoin, exceptionnellement, un troisième 4 heures après le second.

Etat chronique. — Un cachet le soir dans une infusion.

Pour les enfants, leur donner, une seule fois par 24 heures, un des cachets spécialement préparés à leur usage. S'il n'est pas possible de le leur faire absorber, il conviendrait de mettre le contenu dans de la confiture ou de la crème et de faire suivre d'une boisson chaude.

La boîte de 12 cachets. *Adultes:* 12 fr. 50. *Enfants:* 8 fr. 30.

Laboratoires L. TATTEVIN, Docteur en Pharmacie,
3, rue Emile-Burgault — VANNES.

ATALANTE

Pâte cicatrisante.

Non grasse, soluble à l'eau, ne tachant pas le linge.

Formule. — Allantoïne, 0 gr. 295; Résorcine, 0 gr. 200;
Excipient non gras, Q. S. p. 100.

Mode d'action. — L'allantoïne est un constituant normal des noyaux cellulaires. Les travaux de M. Robinson en Amérique ont montré le grand pouvoir cicatrisant de l'Allantoïne dans les plaies post-opératoires, les brûlures, les ulcères variqueux, les furoncles et les anthrax.

L'Allantoïne agit en favorisant les granulations du tissu sain et en éliminant les éléments infectés.

Indications. — Plaies, Brûlures, Ulcères variqueux, Dermatoses, Erythèmes des nouveau-nés, Crevasses du sein, Furoncles, Anthrax.

Mode d'emploi. — Sur les ulcères, les brûlures et les plaies, appliquer la pâte en couches épaisses.

Prix : 12 francs.

Laboratoires BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e).
(Tél. Anjou 61-61.)

ATENS

Hypotenseur.

Composition. — Pour une pilule :

Tétranitrates d'Erythrol	0,003
Diméthylxanthine (Théobromine)	0,128
Phosphate de Calcium	0,022
Extrait de Viscum Album	0,060
Phényléthylmalonylurée	0,010
Extrait de Belladone	0,0025

Propriétés. — Régulateur du travail du cœur. Hypotenseur. Vaso-dilatateur, diurétique.

Indications. — Association médicamenteuse à doses faibles, qui constitue un traitement complet, actif et sans danger, de l'Hypertension et de ses dérivés.

Forme et mode d'emploi. — Pilules rouges à prendre accompagnées d'un verre d'eau au milieu des repas.

Posologie. — 2 à 3 pilules par jour.

Se conformer toujours aux indications du médecin.

Prix de la boîte de 25 pilules : 19 fr. 50.

N. B. — Le traitement par l'ATENS peut être heureusement complété par l'emploi du NESAL, sédatif nervin par excellence.

Produits POLYPHARMA

Concess^{re} L. BRUN, Pharmacien, 92, rue Bobillot, PARIS (XIII^e).

ATOCRAZINE

du Professeur Carrière

Association médicamenteuse parfaitement tolérée à base de **Crésophanyl**, de **Pipérazine**, d'Acide quinique.

Traitement prolongé de la **Diathèse arthritique**. 2 cachets par jour en traitement intermittent, 10 à 20 jours par mois.

Produits STENE

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

ATOMINE

Composition. — Acide phénylcinchoninique, Phosphate de soude.

Indications. — Solvant urato-oxalique en milieu alcalin grâce au phosphate de soude associé ; très bien toléré.

Rhumatismes aigus ou chroniques, Sciatiques, Goutte, Lumbago, Algies, sédatif rapide de la douleur.

Doses. — Cas aigus : 3 à 6 cachets par jour pendant 5 jours ; cesser 5 jours et reprendre.

Cas chroniques ou atténués : 2 cachets par jour pendant 5 jours, cesser 5 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 16 fr. 40.

Absorber avec tisane sucrée.

Laboratoires L. Boize et G. Alliot,
9, avenue Jean-Jaurès — LYON.
(Tél. : Parmentier 31-29.)

ATOQUINOL

Phénylcinchoninate d'allyle.

CIBA

SPÉCIFIQUE ANTIGOUTTEUX.

Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général : Goutte, Rhumatisme goutteux, Dermatoses d'origine arthritique, algies, migraines et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — États aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

États chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

Boîte de 20 cachets.

Flacon de granulé.

(Voir Sanoquinol.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

ATOSPIRINE

Association d'Acide acétylsalicylique, d'acide phénylcinchoninique, de caféine, constituant le type parfait de la *Synergie médicamenteuse renforceuse*.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1134-5.

Indications. — Diathèse arthritique, Goutte, toutes Algies, Etats grippaux et leurs complications.

Présentation. — Boîte de 20 cachets de 0,50 centigr. ou de 20 comprimés de 0 cgr. 50.

Posologie. — 2 à 4 cachets ou comprimés par jour.

Prix : 15 fr. 60, remboursé aux Assurances sociales. Classe B.

Laboratoire A. LUCIEN

19, rue du Bac — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 55-03.)

ATURAL

Supprime l'intolérance pour le lait.

Travaux du professeur Louis GAUCHER.

Composition. — Poudre à base d'un principe anti-présurant absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum de cheval.

Action. — Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale. Facilite aussi la digestion des aliments en permettant les contractions et l'évacuation de l'estomac. †

Indications. — Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte avec ses conséquences : Diarrhée verte, Vomissements, Gastro-entérite des nourrissons, Troubles digestifs chez l'adulte après les repas.

Mode d'emploi. — Une mesure pour 100 gr. de lait. Dans l'alimentation ordinaire, 2 mesures dans un peu d'eau après les repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires de Physiologie et de Thérapeutique

10, rue de Strasbourg — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 46-14.)

AUBELIODE

Gouttes.

Combinaison stabilisée et équilibrée de :

Peptone iodée..... 50

Hamamélis (Extrait fluide)..... 25

Aubépine (Extrait fluide)..... 12

Intrait de Passiflore, etc. Q. S. P. 100 gr.

En un flacon normal de 45 cc. = 1 500 gouttes.

Prix : 20 fr. 85 (pour 15 jours de traitement)

Il existe un double flacon de 90 cc. = 3 000 gouttes.

Prix : 37 fr. 80 (économie : 6 francs).

Posologie :

100 gouttes
d'AUBELIODE = $\left\{ \begin{array}{l} 50 \text{ gouttes Peptone iodée.} \\ 25 \text{ gouttes Hamamélis.} \\ 12 \text{ gouttes Aubépine.} \end{array} \right.$

Doses :

100 à 160 gouttes par jour.

en deux fois aux repas

Action :

Active circulation et diminue viscosité et tension.

Accélère nutrition, échanges, hématose.

Équilibre système nerveux et vago-sympathique.

Composants et Propriétés :

Iode (Peptone) : Fluidifiant, Vaso-dilatateur, Hypotenseur, Oxydant, Antiseptique, Stimulant.

Hamamélis : Décongestionnant, Hémostatique, Tonique et Trophique veineux.

Aubépine, Passiflore : Sédatifs, Antispasmodiques, Cardiotoniques et Hypotenseurs.

Indications :

Vaisseaux : Ménopause, dysménorrhée, artériosclérose, hypertension, phlébites, varices, hémorroïdes, pléthore, cyanose, asthme, emphyseme, bronchites.

Nutrition : Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, lymphatisme, obésité.

Système nerveux : Éréthisme cardiaque, anxiété, insomnies.

Littérature et échantillons à la disposition de MM. les Docteurs.

Laboratoires OPOS

60, rue Nationale, 1 et 3 rue Soumet,

CASTELNAUDARY (Aude). (Tél. : 3-10.)

AUDIGÉLINE

Forme. — Comprimés.

Composition. — Di-iodo-antipyrine (2,5 %) et Bromures alcalins (92,5 %).

Indications. — Traitement médical interne de la Sclérose de l'oreille moyenne et du tympan. Surdit . Vertiges. Bourdonnements.

Mode d'emploi. — 2 comprim s au milieu de chaque repas.

(Le traitement doit  tre interrompu 10 jours chaque mois.)

Litt rature et  chantillons :

Laboratoires E. VAILLANT et Cie
19, rue Jacob — PARIS (VI ).

AURIXEMA

Pommade anti-ecz mateuse semi-fluide.

Composition :

Para aminobenzoate de butyle normal (Paraforme).....	0 gr. 25
Huile essentielle de Melaleuca viridiflora rectifi�e.....	1 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Protochlorure de Mercure.....	3 gr.
Sulfate de zinc.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	10 gr.
M�tadioxyph�nol.....	1 gr.
Camphre.....	1 gr.

Pour 100 grammes.

Propri t s. — Analg sique, antiseptique, k ratoplastique.

Indications. — Traitement des ecz mas et imp tigos de l'oreille, des narines et en g n ral de toutes l sions ecz mateuses ou imp tigineuses.

Pr sentation. — Tube avec long embout sp cial.

Prix : 12 fr. 80.

Peut  tre prescrit aux Assurances sociales.

Enregistr  au Laboratoire National de Contr le des M dicaments sous le n  888-11.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX ).

AXYOL

du Docteur P. Bourggraff.

Composition. — Iodo-amido-féculose dépourvu de toute trace d'iode libre.

Propriétés. — Grâce à ses propriétés biologiques, l'*Axyol* active l'apparition des bourgeons charnus et aseptise les plaies.

Indications. — Plaies atones, ulcères, ulcères des jambes, plaies infectées, fistules.

Mode d'emploi. — Se rapporter aux différents opuscules publiés par le Laboratoire du Praticien.

Présentation. — Poudre noire, en flacon.

Prix : 23 fr. 45.

L'*Axyol* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)

AZAMA

(Gouttes)

Présentation. — En flacon compte-gouttes.

Principes actifs. — Teinture de Lobélie, Chlorhydrate d'Ephédrine.

Indications. — Asthme, Rhume des foins, Hoquet, Mal de mer.

Mode d'emploi — XX gouttes de la solution dans un peu d'eau sucrée, quatre fois par jour et au moment des accès.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

AZIGOL THÉVENOT

Crises convulsives. États nerveux.

Composition. — Tartrate Borico-Calcique, Phényl-éthylmalonylurée. Extrait de Gelsénium et de Piscidia.

Forme. — Dragées.

Indications. — Toutes crises nerveuses, Épilepsie, Convulsions. Tous états nerveux : Asthme, Prurit, Eczémas, Urticaire, Hyperexcitabilité, Asthme infantile.

A l'action suspensive des crises par le Phényl-éthylmalonylurée s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits végétaux qui diminuent la sensibilité périphérique et de certains organes, origine des réflexes déclenchant les crises.

Dose. — 2 à 6 comprimés par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

Enfants : 1/2 à 1 comprimé par jour.

Prix du flacon de 40 dragées : 21 francs.

Laboratoires THÉVENOT — DIJON.

AZOTYL

Composition. — Extraits spléniques et biliaires, cholestérine, goménol, camphre, irradiés aux rayons ultra-violet.

Forme. — Ampoules et pilules.

Propriétés thérapeutiques. — États de dénutrition et de carence. Anémies.

Doses et mode d'emploi :

A. *Ampoules.* — Injections sous-cutanées et mieux intramusculaires (tous les jours ou tous les 2 jours).

B. *Pilules glutinisées.* — 6 par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

Tél. : Aut. 81 45 (deux lignes groupées).

AZUFROL

Soufre colloïdal.

Description. — 1° *Capsules* glutinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° *Pommade* à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du colloïde par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

Indications. — 1° *Capsules* : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de Sulfurion (voir plus loin).

2° *Pommade* : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Prix : 28 fr. 60 pour 5 à 12 jours de traitement. A. S. C.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

AZYM

S'oppose à la lenteur des digestions.

Présentation. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

Posologie. — 1 cuillerée à café après le repas : 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommodé. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

Indications. — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

Prix : 16 francs.

La boîte contient 30 cuillerées à café environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-2.

Laboratoire PARET

28, rue Guibal — MARSEILLE.

BABEURRE DARDELET

pour Nourrissons ou Adultes.

Le Babeurre Dardelet. — Médicament héroïque de la diarrhée verte et entérite. D'un goût agréable, il est non seulement employé pour les Nourrissons, mais aussi pour les Adultes.

La Soupe de Babeurre est du Babeurre additionné de 2 p. 100 d'Arrow-Root.

Ce qui fait la supériorité de ces deux produits est leur homogénéité absolue. Ni dépôts, ni grumeaux. On peut les donner à la tétine.

Conservation sous le vide.

Se fait en 1/4 de litre. Prix : 3 francs départ usine.

Notre emplacement au centre de la France sur une grande ligne nous permet de livrer instantanément toute commande en Province.

(Voir rubrique *Laits DARDELET.*)
Fournitures gratuites aux Hôpitaux.

J. DARDELET

Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne).

(Tél. : 4.)

La Maison est à la disposition des Docteurs désirant entreprendre la *Maternisation* à leurs gouttes de lait.

BABEURRE GUIGOZ

(Soupe de Babeurre en poudre.)

Grandes facilités de préparation par simple adjonction d'eau bouillie froide.

Stabilité et homogénéité parfaites (pas de grumeaux).

Conservation facile.

Substantielle, quoique extrêmement digestible en raison de l'adjonction de dextrines ; peut être administrée même à des prématurés et constituer le régime exclusif du nourrisson pendant un temps prolongé.

Peu acide. Facilement acceptée.

Grande valeur thérapeutique en raison de son acidité naissante et non seulement préexistante comme dans les babeurres liquides.

Indications. — Gastro-entérites, diarrhées infantiles, eczémas. Réalimentation.

Dose. — De 60 à 200 gr. de poudre par jour pour 400 à 1 300 gr. d'eau suivant l'âge du nourrisson, soit environ 1 cuillerée à soupe pour 45 à 50 grammes d'eau.

Voir : { Lait en poudre GUIGOZ.
Lait Dextrosé Malté GUIGOZ.
Lait Déchloruré GUIGOZ.
RAVIX (Lait GUIGOZ irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII°).

(Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

BABEURRE NESTLÉ EN POUDRE ÉLÉDON

Simple, sans sucre ni farine.

*Complet, avec sucre (5 p. 100) et farine (2 p. 100)
(maltose dextrine et crème de maïs).*

Babeurre 1/2 gras, en poudre, préparé par Nestlé, destiné à la diététique des nourrissons, enfants et adultes atteints de troubles digestifs et à l'alimentation mixte.

Pureté absolue, composition constante, conservation parfaite, bonne valeur nutritive.

Indications. — Diarrhées banales ou graves de l'enfant ou de l'adulte. Dermatoses du nourrisson. Alimentation des intolérants au lait, des prématurés et des enfants menacés par les troubles digestifs (colonies).

Prix : La boîte de 250 gr. : 13 francs.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire -- PARIS (VIII^e).

BABEURRE NUTRICIA

Composition. — Lait écréméensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

Présentation. — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré, babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

Le Babeurre Nutricia est également présenté en poudre, soluble, pur, permettant par simple addition d'eau la reconstitution du babeurre naturel pur.

Indications thérapeutiques. — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia, par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé.

Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment. Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

Mode d'emploi. — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

Léon CLAEYS

1, boulevard Saint-Martin — PARIS (III^e).

Tél. : Turbigo 92-60.

BABEURRES CARRION-LAGNEL

Pour l'alimentation des nourrissons et des adultes (Prématurés, sujets débiles, entériques, hépatiques, etc.).

Présentation et prix.

1^o Babeurre *acide*.

2^o Babeurre *doux*.

Le flacon de 250 cc. : 3 francs.

3^o *Bouillies* au babeurre, maltées et autres sur demande.

Le flacon de 250 cc. : 5 francs.

(Livraisons quotidiennes à domicile dans Paris.)

Laboratoires CARRION-LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 40-30.)

BABEURRES « LA FAYE »

Pour enfants et adultes.

Préparés avec du lait frais à la ferme de « La Faye », à Marlhès (Loire).

Les Babeurres La Faye sont le résultat d'une fermentation lactique spéciale sur du lait très frais privé de sa matière grasse et non un résidu de la fabrication de beurre, d'où leur goût agréable.

Ils sont *liquides* afin de conserver toutes leurs propriétés (lactosérum, caséine modifiée). D'une conservation parfaite, d'une digestibilité incomparable, ils sont constants, sûrs et efficaces et ne demandent aucune manipulation. Ils sont présentés sous trois formes :

Babeurre léger (étiquette bleue) pur, sans farine, 498 calories au litre, acidité 3 grammes, 35 grs. de sucre au litre. Indiqué pour les prématurés, débiles, vomisseurs et pour les hépatiques.

Babeurre (Soupe) (étiquette blanche). Mélange de farines 3 % 764 calories, acidité 7 grammes, 75 grs. de sucre au litre. Aussi nourrissant que le lait. *Le plus employé* à cause de son pouvoir calorique et thérapeutique et de sa grande facilité d'assimilation. Indiqué dans tous les troubles digestifs même légers, intoxications, dermatoses, intolérance lactée, et aussi comme complément du sein et pour éviter les troubles du sevrage.

Babeurre gras (étiquette rouge). Même composition que le Babeurre (soupe) ordinaire avec 35 grammes de matières grasses, 1 072 calories, 75 gr. de sucre au litre. Suralimentation des convalescents (particulièrement après typhoïde, colibacillose), prétuberculeux, enfants aux intestins délicats, anorexiques. Bien supérieur au yoghourt.

Posologie. — Ces trois babeurres, présentés en boîtes de 430 grammes, et 200 grammes s'emploient *de la même façon que le lait naturel* en tenant compte de leurs indications particulières. En cas de troubles graves, multiplier au début le nombre des repas en diminuant les doses.

En vente dans toutes les Pharmacies

Fournisseurs des Hôpitaux et des Municipalités de Lyon et de Saint-Étienne depuis 25 ans.

Échantillons et documentation sur demande adressée :

Ferme de LA FAYE
MARLHES (Loire).

BABEURRES MOLARD

employés dans les Hôpitaux.

Babeurre, farine et sucre.

Présentés sous trois formes :

1° Babeurre léger : liquide, vendu en boîtes de 500 gr., 6 fr. conservation parfaite, acidité 4 gr., farine 0,5 p. 100, sucré — 500 calories par litre.

Indications. — Vomissements, troubles digestifs graves, alimentation des prématurés.

2° Babeurre normal : liquide, vendu en boîtes de 1 kg. et 500 gr., acidité 5 gr., farine 2 p. 100, sucré, 750 calories par litre.

Indications. — Gastro-entérites, eczémas, intolérance lactée, débilité congénitale, athrepsie, troubles du sevrage ; 9 fr. la boîte de 1 litre

3° Babeurre en poudre : soupe (*même composition et mêmes indications que le Babeurre normal*). Se prépare par simple addition d'eau et ébullition. Revient à 5 fr. 50 le litre.

Doses. — Mémes doses que le lait.

Durée de l'alimentation au Babeurre : de 1 à 10 mois.

Echantillons sur demande.

Laits MOLARD

25, Cours Lafayette — LYON (VI°).

Tél. : 20-71.

BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie. Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation.

Formes. — Ampoules injectables de 1 cc., ampoules. Buvables de 5 cc., cachets, dragées.

Indication. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours ou prescrire une à deux ampoules Buvables tous les deux jours. On prescrira en même temps, l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 27 fr. 50.

La boîte de cachets ou de dragées : 18 francs.

La boîte de 12 ampoules Buvables : 22 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°). (Tél. : Archives 41-65.)

BACTÉ-INTESTI-PHAGE BACTÉ-COLI-PHAGE

Composition. — *Bacté-Intesti-Phage* : Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.).

Bacté-Coli-Phage : Mélange de bactériophages adaptés à de nombreuses variétés de bacilles Coli ou Paracoli.

Propriétés. — Le Bactériophage de d'HERELLE est un principe : qui détruit et dissout les bactéries ; qui se régénère au cours de la lyse ; dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

Avantages. — Action puissante et rapide. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

Indications. — *Bacté-Intesti-Phage* : Entérites, Colites, Diarrhées infantiles. *Bacté-Coli-Phage* : Colibacilluries, Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Prostatites, etc.

Forme. — Ampoules de 2 cc.

Posologie. — Ingestion buccale : une ampoule matin et soir dans 20 cc. d'eau alcaline (Voir notice explicative).

Prix : 32 francs la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

BACTÉ-PYO-PHAGE BACTÉ-STAPHY-PHAGE

Composition. — *Bacté-PYO-Phage* : Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.). *Bacté-STAPHY-Phage* : Mélange de bactériophages adaptés aux diverses variétés de staphylocoques (Aureus-Citreus-Albus).

Indications. — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées, Infections urinaires à staphylocoques.

Avantages. — Action puissante et rapide. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

Forme. — Ampoules de 2 cc., 5 cc., 10 cc.

Posologie. — Injection *in situ* (méthode Raiga) dans le foyer même de l'infection ou dans la région enflammée pouvant passer rapidement à l'état aigu ; et en pansements locaux.

Prix : 4 ampoules 2 cc. : 19 fr. 20 ; 10 ampoules 2 cc. : 32 francs
5 — 5 cc. : 37 fr. 30 ; 5 — 10 cc. : 64 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

BACTÉ-RHINO-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques, etc.).

Propriétés. — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

Qui détruit et dissout les bactéries ;

Qui se régénère au cours de la lyse ;

Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

Avantages. — Action puissante et rapide. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

Indications. — Grippe, Coryza, Rhino-pharyngites, Otites, Sinusites.

Forme. — Ampoules de 2 cc.

Posologie. — Pulvériser suivant la gravité des cas la valeur d'une ou plusieurs ampoules au moyen du pulvérisateur spécial : Pulvolyseur Ercé.

Prix : 4 ampoules 2 cc. : 19 fr. 20 ; 10 ampoules 2 cc. 32 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE,
1, avenue de Villars — PARIS.

BACTÉ-RICYL

Antiseptique physique
agissant par sa Tensio-Négativité.

Puissant bactéricide. Non toxique. Non irritant.
(Odeur et goût agréables. — Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution stable, concentrée de ricinoléate de triéthanolamine à 30 p. 100.

Indications. — Désinfection de la cavité bucco-pharyngienne. Angines, Amygdalites, Stomatites, Gingivites. Prévention des maladies infectieuses à point de départ pharyngé : Gripes, Fièvres éruptives, Maladies épidémiques. Soins gynécologiques et obstétricaux : Leucorrhées, Vaginites (blennorragiques ou autres). Ulcérations de toute nature, etc.

Mode d'emploi.

Gargarismes, lavages buccaux, pulvérisations :

1 mesure de la pipette jaugée pour un grand verre d'eau.

Lavages gynécologiques et chirurgicaux :

1 à 3 mesures de la pipette jaugée pour 1 litre d'eau.

Prix : 10 fr. 70.

Laboratoires A. WELCKER et C^{ie}
72, rue du Commerce — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 42-40.)

BACTURYL

Comprimés.

Formule:

Hexaméthylène-tétramine.	0,15
Acide Benzoïque	0,15
Salol.	0,20
Bleu Méthylène	0,015

Pour 1 comprimé dragéifié.

50 comprimés. Prix : 19 francs.

Indications :

Pyuries, Bactériuries, Colibacilloses, Pyé-
lites et Pyélo-néphrites, Cystites, Prosta-
tites, Urétrites.

Dose moyenne :

2 comprimés avant chacun des 3 repas.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien.

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

(Tél. : 820-04.)

BAIN BAGNOR RADIOACTIF

Le seul approuvé et autorisé par l'établissement ther-
mal de

Bagnoles-de-l'Orne.

Synthèse des éléments minéraux du complexe salin de
Bagnoles-de-l'Orne, suractivé par le bromure de ra-
dium. Prépare et prolonge la cure de Bagnoles-de-
l'Orne.

Indications thérapeutiques. — Troubles circulatoires
de toutes natures. Phlébites, varices, stase veineuse.
Rhumatismes chroniques, névralgies et toutes affec-
tions douloureuses.

Forme. — En paquet pour bain de 200 litres. Faire
dissoudre au moment de l'emploi.

Posologie. — Cure intensive : 3 bains par semaine pen-
dant 6 semaines.

Cure d'entretien : 1 bain par semaine. Repos couché
après le bain.

Prix du bain : 10 francs.

Les 10 bains : 95 francs.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

BAIN CARBOGAZEUX WOLO

Forme. — Poudres dont les dissolutions successives dans l'eau du bain sursaturent cette eau d'acide carbonique.

Indications. — Maladies des organes circulatoires (Cœur, Hypertension, Artério-sclérose), Maladies dites d'échanges internes (Goutte, Rhumatismes), du Système nerveux (Névralgie, Neurasthénie, Surmenage cérébral, etc.).

Mode d'emploi. — Verser successivement les sachets 1 et 2 dans le bain en brassant l'eau. Se plonger dans l'eau en laissant agir le dégagement gazeux. La température sera de 30 à 35 degrés, sauf indications spéciales du médecin. Durée du bain : 15 à 20 minutes.

Prix : 10 fr. 70.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin)

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X^e).

(Tél. : Trudaine 92-52.)

BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatismes, arthritisme.

Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

Gynécologie. — Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

Prix : 7 fr. 80.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Élysées 17-46.)

BAIN DE BOUCHE A LA DUNA-CAÏNE A. D.

Bain de bouche anesthésique, ne s'emploie jamais pur, mais dilué.

Indications. — *Stomatologie*: douleurs post-opératoires, stomatites, ulcérations gingivales, prises d'empreintes, pointes de feu, galvano-cautérisations.

O.-R.-L.: Angines, processus phlegmasiques, abcès de l'amygdale, ulcérations diverses, dysphagie d'origine cancéreuse ou tuberculeuse.

Mode d'emploi. — En gargarismes, en bain de bouche, en tamponnement local.

Le flacon est à diluer dans un quart, un demi ou un litre d'eau bouillie suivant la concentration voulue. (Voir Notice détaillée.)

Présentation. — Flacon de 40 cc. avec mesure graduée permettant la préparation d'une petite quantité de solution au moment du besoin.

Prix : 18 francs.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}
17, rue de Berri — PARIS (VIII^e)

BAIN DE BOUCHE ESTÈVE

Chloral hydraté..... 2 gr.

Acide thymique : à saturation

Glycérine 30 gr.

Alcool de menthe : à saturation

Colorant rose,

Eau chloroformée..... Q. S. p. 100 cc.

Une cuillerée à dessert pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Cicatrisant, Désinfectant, Postopératoire, Alvéolites, Stomatites, Abcès.

Prix au public : 8 francs. Taxe comprise.

Petit modèle : 4 fr. 90.

Laboratoire ESTÈVE

187, rue de la Croix-Nivert — PARIS (15^e).

(Tél. : Lecourbe 92-16)

BAIN DE « ROYAN VARECH »

Composition. — Algues marines naturelles vivantes, vitaminées, fluorées, magnésiées et hyposulfitées. Possède les éléments de la vie organique : chlorure, sels de magnésium, fer, calcium, provitamine D. Solubilité immédiate de tous les principes chimiques et mucilagineux. (Dorvaux, *l'Officine*, p. 808).

Procédé spécial de préparation sur les algues fraîches.

Propriétés. — Tonique et nervin, stimulant de l'état général, reconstituant, reminéralisateur, action lénitive sur la peau qui devient plus souple et plus blanche.

Indications. — Identiques aux bains de mer, prolongation de la cure à domicile, traitement externe de l'obésité, désinfection cellulaire épidermique.

Posologie et mode d'emploi. — Plonger le sachet dans l'eau chaude du bain à 36° environ ; le sachet devient mucilagineux ; l'exprimer à la main, s'en servir pour le massage du corps. Le même sachet sert pour un deuxième bain, à prendre pour le lendemain.

Prix du sachet : 8 fr. 50.

Laboratoire Marin de Royan-Pontailiac

P. CASTANET,

Pharmacien de 1^{re} Classe.

Lauréat Médaille d'Or de la Faculté de Lyon.

Dépôt : Pharmacie PIAULT, 45, avenue Félix-Faure — PARIS (XV^e).

O. C. P. Office Commercial Pharmaceutique,

71, rue du Temple — PARIS (III^e).

C. N. P. F. Comptoir National

Ile-de-France Pharmaceutique, 4, r. de l'Alma — ASNIÈRES (Seine).

BAIN FLÉVAR

Minéral, Synthétique, Radifère.

Traitement à domicile des : Phlébites, Varices, Hémorroïdes et des Troubles de la Circulation veineuse.

Le « FLÉVAR » se présente sous la forme d'une poudre qui, par ses analogies chimiques avec les eaux les plus réputées des Sources thermales azotées et chloro-sulfatées calciques et par ses propriétés radio-actives *contrôlables*, donne à l'eau du bain, pris chez soi, les mêmes résultats thérapeutiques.

LE BAIN FLÉVAR produit 250 millimicrocuries d'émanation du Radium (Radon) par bain de 200 litres d'eau.

Il ne se recommande d'aucune station. — Il convient à toutes.

Prix de la boîte pour un bain : 10 francs.

Fabrication et dépôt général :

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

BAIN SALVIA

(Un traitement « aux Eaux » chez soi.)

Composition. — Silicate de magnésie hydraté, bicarbonate de sodium, perborate de sodium, nitrate d'uranium.

Présentation. — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

Indications. — Stases veineuses (Varices, phlébites), arthritisme, rhumatismes et dépression générale. Soins gynécologiques.

Posologie. — Un bain à la température d'environ 37°, pendant 20 minutes, traitement de 21 jours. En gynécologie : 1 cuiller à soupe par litre d'eau.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 157 fr. 50 ;
au Corps Médical, 100 francs.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à une station thermale peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures « aux eaux ».

Pilules Salvia : Traitement interne des stases veineuses, varices, hémorroïdes, ménopause, puberté, par l'extrait mou de Teskra.
Une pilule avant les 2 principaux repas.

L'étui de 30 pilules : 15 francs.

Laboratoires VENOT

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV^e). — (Tél. : Suffren 31-75.)

BALDISÉDAN

BALsamique, DIurétique, SÉdatif, ANTiseptique.

Présentation. — Flacon de 50 pilules glutinisées.

Composition. — ACIDE CAMPHORIQUE, hexaméthylène-tétramine, térébenthine de Venise, extrait mou d'uva-ursi, salol, benzo-naphtol.

Indications. — Cystites, Colibacilluries et toutes Pyuries, Pyélo-néphrites, Cholécystites, Gonorrhées et toutes complications.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et sédatif génito-urinaire. Aseptise et clarifie les urines par modifications du pH urinaire.

Contre-indication. — Aucune, tolérance parfaite.

Posologie. — 4 à 5 pilules avant chaque principal repas.

Prix : 17 fr. 05.

Laboratoires Robert COLAS

Docteur en Pharmacie.

133, rue Lecourbe — PARIS.
(Tél. : Vaugirard 48-10.)

BALLOTYL

Agent le plus efficace de la Phytothérapie Antispasmodique. Sédatif du Grand Sympathique.

Composition. — Ballote stabilisée contenant entre autres constituants de la *Choline*, antispasmodique vasculaire et puissant hypotenseur.

Formes pharmaceutiques. — Liquide ; Dragées ; Suppositoires.

Indications. — Insomnie, Vertiges, Tous états névropathiques, sympathicotoniques ou vago-toniques.

Posologie : 4 prises de XXX à LX gouttes ou 4 dragées par jour (avant les 3 repas et le soir au coucher) ; 1 suppositoire le soir au coucher.

Laboratoire de Phytothérapie de Paris

M. GUILLON, pharmacien

113, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 70-76.

BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

Forme pharmaceutique. — Tablettes comprimées effervescentes.

Composition. — Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

Action. — Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

Indications. — Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

Mode d'emploi. — Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

Prix : 6 fr. 95.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, Bd Saint-Michel — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 22-01.)

BALNERADOL

Bain radioactif en comprimés.

Principes actifs. — Bromure de Radium, Oxygène naissant, Extrait d'Hamamélis.

Effets thérapeutiques et indications. — Action régulatrice des fonctions circulatoires (Varices, Phlébites, Age critique, Artériosclérose). Stimulation générale de l'organisme (Etats anémiques, Convalescences). Vitalisation des cellules cutanées, Action sédative puissante (Algies, Rhumatismes chroniques, Etats neurasthéniques et dépressifs).

Doses. — Grand bain, 8 comprimés. Bain local, 1 à 2 comprimés (teneur en radium-élément : 33,5 milli-microcuries par comprimé).

Présentation et prix. — Comprimés de 4 gr. parfumés à l'essence de pin.

La boîte de 16 comprimés..... 14 fr. 50

La boîte de 40 comprimés..... 30 fr. »

Etablissements LABORADIUM

25, rue Friant — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Vau. 25-07.)

BALSAFORMINE

(Dragées de)

Formule :

Anhydrométhylène citrate d'hexa-	
méthylène-tétramine pure ...	0 gr. 25
Térébenthine de Venise purifiée....	0 gr. 15

Par dragée.

Mode d'action. — Agit comme antiseptique et calmant des organes génito-urinaires et désinfectant général.

Indications. — Infections du tractus génito-urinaire et des voies biliaires. Pyélites et Pyélonéphrites, Colibacillose urinaire, Bactériurie, Cystites et Catarrhes vésicaux, Urétrites, Prostatites, Vésiculites, Lithiase et Calculose urinaire, Coliques hépatiques et néphrétiques, Gripes.

Prix : le flacon de 50 dragées : 21 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires du GAMBÉOL

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

42, rue Émile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 17-67.)

BALSAMOL LESCÈNE

Combinaison à base de Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoates, Aldéhyde benzylique.

Formes. — Sirop, Comprimés.

Caractéristiques. — Produit non toxique. *Chez les enfants*, il peut être administré à *partir de 5 à 6 mois*. Antiseptique des voies respiratoires. Expectorant, Diurétique, Toni-Cardiaque.

Indications. — TOUX, COQUELUCHE, BRONCHITES, GRIPPE, toux émetisante des tuberculeux, asthme, *toux des vieillards*, Insomnies.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour. *Insomnies* : adultes et enfants, 1 cuillerée à soupe le soir au coucher ou pendant la nuit.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19).
et LIVAROT (Calvados).

BALSAMORHINOL

Définition. — Huile balsamique, antiseptique, décongestionnante, cicatrisante ; d'odeur agréable ; non irritante.

A base : 1° d'*essences végétales* (en particulier d'essences de zestes de fruits) dont l'action est bien établie contre les divers microbes qui hantent habituellement les muqueuses des voies aériennes supérieures, et dont la vertu cicatrisante a été éprouvée ; 2° de *principes décongestionnants, calmants*, qui soulagent d'emblée. (Ces principes actifs sont ceux-là mêmes qui entrent dans la composition de nos comprimés *Inhalantyl*).

Indications. — Le Balsamorhinol vise avant tout la *désinfection efficace du nez et du rhino-pharynx*. Des travaux récents ont montré l'importance capitale de ce dernier comme porte d'entrée d'infections non seulement régionales mais aussi broncho-pulmonaires, méningées, sanguines. Pratiquement, et en bref, les indications sont les suivantes : *Coryzas* aigus et chroniques ; *rhinites* torpides ou spasmodiques ; *rhume des foins* (*hay fever*) avec ou sans *asthme* ; *sinusites* ; *rhino-pharyngites* ; *laryngites* ; *trachéites* ; *bronchites* ; *infections grippales* ; *toutes infections à point de départ rhinopharyngé*.

Présentation. — Flacon avec bouchon compte-gouttes très pratique.

Mode d'emploi :

De 2 à 4 fois par jour. Soit en *instillations*, à la dose de III à IV gouttes dans chacune des fosses nasales ; soit en *pulvérisations* (3 ou 4 jets du pulvérisateur à l'entrée des narines, pendant qu'on inspire largement) ; soit (de préférence) *à la fois* en instillations et en pulvérisations.

Prix : Flacon de 20 cc., 15 fr. 85

Laboratoire FIDES

R. VOUZELLAUD, Docteur en Pharmacie

14, rue de la Comète — PARIS

(Tél. : Invalides 64-13.)

BALSAQUINTINE

Combinaison terpino-bromiformique injectable avec campho-gaïacolate, de pilocarpine, de strychnine et d'atropine en milieu d'essences balsamiques.

Présentation. — Ampoules injectables indolores de 1 cc. et 2 cc.

Contrôle de tolérance. — Séries d'injections à des cobayes.

Propriétés. — Sédatif. Désinfectant pulmonaire. Diurétique. Toni-cardiaque. Anti-infectieux. Antithermique. Fluidifie les sécrétions. Prévient les complications des maladies contagieuses.

Indications. — Affections pulmonaires aiguës et chroniques, Bronchites, Grippe, Coqueluche, Maladies infectieuses.

Posologie. — *Enfants* en dessous de 2 ans : 1 cc. tous les 2 jours ; de 2 à 8 ans : 1 cc. par jour ; au-dessus de 8 ans : 2 cc. par jour. *Adultes* : 2 cc. 1 ou 2 fois par jour.

Laboratoires LESCÈNE

58, rue de Vouillé — PARIS (Tél. Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados).

BALSOFORME

Mélange de Schleich additionné de Gomenol
Prevet.

(Formule du Dr Siauve-Evausy.)

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Gomenol.

Indications. — Anesthésie générale, Prévention des complications pulmonaires post-anesthésiques.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules compte-gouttes de 60 grammes. S'administre à l'aide de l'appareil d'Ombredanne. Une ampoule suffit pour une anesthésie de plus d'une heure.

Prix de vente :

L'ampoule..... 10 fr. 60

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

BALSOFUMINE

Présentation. — Inhalation balsamique liquide, 3 formes:
Balsofumine simple ou mentholée à 1 p. 100 ou 4 p. 100.

Composition. — Acide oxybenzoïque, benjoin et baume du Pérou désempyreumatisés, essence de thym, eucalyptus, essence de lavande, alcool à 80 degrés.

Balsofumine mentholée.

Additions de 1 p. 100 ou 4 p. 100 de menthol.

Indications. — Lénitif, décongestionnant et calmant pour rhinites, laryngites, sinusites, rhumes et trachéo-bronchites.

Balsofumine mentholée à action spéciale en sinusites.

Posologie. — 1 cuillerée à café par inhalation, 2 à 6 inhalations par jour.

Prix : 18 fr. 70 le flacon, pour 20 jours de traitement.

Balsofumine Mentholée à 4 % : 20 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les n^{os} 1790-2, 1790-3, 1790-4.

Vente autorisée pour les Assurances Sociales.

Laboratoire de CHIMIO-OPOTHÉRAPIE

22, rue de Turbigo, — PARIS (II^e).
(Tél. : Central 95-18.)

BALSORHINE

(Ancien Balsorhinol)

La BALSORHINE Huile, Capsules et Pommade remplace le Balsorhinol.

Huile balsamique, éphédrinée à 0,50 p. 100.

Composition. — Essence de Niaouli, terpinol, essence de pin sylvestre, essence de lavande, essence de badiane, éphédrine base, huile végétale.

Présentation

1^o Flacons munis de compte-gouttes.

2^o Capsules gélatinées.

Posologie. — Instillations ou pulvérisations.

Prix : 15 fr. 60 le flacon-compte-gouttes pour 20 jours de traitement ;

12 fr. 50 la boîte de capsules pour 8 jours de traitement.

Pommade : 6 fr. 25.

Laboratoire de CHIMIO-OPOTHÉRAPIE

22, rue de Turbigo — PARIS.

Vente autorisée pour les Assurances Sociales.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 1790-5, 1790-6, 1790-7.

BANDE DU PRATICIEN

Présentation. — Bande élastique, marquée à ses deux extrémités, à double enrobage assurant le coefficient optimum de contention.

Longueur..... 3 mètres.
Largeur 0^m,08

Prix : 46 fr. 90

Indications. — Ulcères variqueux et plaies atones. Varices. Œdèmes de fractures. Œdèmes post-phlébitiques. Séquelles de phlébites.

Nota. — Sur demande spéciale, les Laboratoires du Praticien peuvent fournir des bandes d'une longueur supérieure à la longueur standard de 3 mètres.

Pour les malades hypersensibles, prescrire de préférence la

LASTO-BANDE DU PRATICIEN

modèle plus souple et plus mince.

Longueur..... 3 mètres.
Largeur..... 0^m,08

Prix : 54 fr.

La *Bande du Praticien* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)

BANDE MÉRINOS « BÉBÉ »

*Bande Rationnelle du premier âge.
Extensible, chaude, lavable.*

Composition. — Fil crêpe (sans caoutchouc) et laines mérinos, 1^{er} choix.

Indications. — Pour soutenir les organes fragiles du bébé jusqu'à 18 mois.

Maintient sans comprimer.

Entretient la chaleur autour du ventre.

Poreuse : Laisse respirer l'épiderme.

Présentation et prix au public :

Bande n° 1 (9 cm.) jusqu'à 6 mois..... 9 fr.

Bande n° 2 (14 cm.) de 6 à 18 mois 13 fr.

Fabricants :

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

BARBIFLORINE

(Hépariflorine liquide suractivée.)

Priorité. — La barbiflore (*Orthosiphon stamineus*) et le *phyllanthus* javanais ont été introduits dans la pharmacopée courante par « Angla », respectivement en 1934 et en 1937.

Composition. — Solution hydro-glycérinée de Barbiflore, *Cynara scolymus* et *Phyllanthus javanais*. Goût agréable.

Propriétés. — Puissant diurétique végétal atoxique. Hépatotonique de choix. Uréopoiétique et protéolytique. Sclérolysant. *Spécifique naturel de l'instabilité humorale.*

Indications. — Oliguries, Cirrhoses, Ictère, Azotémie, Uricémie, Chlorurémie, Cholestérinémie, Athérome, Œdèmes et Ascite, Lithiases urinaire et biliaire, Insuffisance hépatique ou hépatorénale, Infiltration calcaire, Hypertension, Suites d'infections, Prophylaxie post-opératoire, etc.

Posologie. — 3 cuillerées à café et plus par jour, aux repas ou dans une infusion chaude.

Flacon de 125 cc.

Bibliographie et échantillons à volonté.

PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »
MONTE-CARLO

« La Barbiflore en thérapeutique. »

BARCAN

Proliférations cellulaires. Artériosclérose.

Composition et présentation :

Granules de saccharate de baryum.

1 granule correspond à II gouttes de la solution à 1/10 000 de saccharate de baryum.

Action :

- 1° Tend à rendre à la cellule néoplasique le métabolisme d'une cellule normale ;
- 2° Provoque l'élimination du calcium, en même temps qu'il augmente le débit urinaire.

Indications :

Artériosclérose, Traitement préventif et curatif des proliférations cellulaires.

Posologie :

Artériosclérose : 2 à 5 granulés par jour, le matin à jeun, 2 ou 3 fois par semaine.

Néoplasies bénignes et malignes :

a. Préventivement : 2 ou 3 fois par semaine, 2 à 5 granules le matin à jeun dans un peu d'eau. Compléter le traitement par 4 divisions de *Choco-chaux*, une semaine sur deux (cf. Choco-chaux).

b. Adjuvant des traitements néoplasiques habituels. Tous les 2 jours, 1 à 5 granules le matin à jeun.

Adjonction de *Choco-chaux* comme ci-dessus.

Prix. — Flacon de 100 granules : 24 fr. 50.

Remboursé par les A. S.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs de l'Assistance Publique et du Ministère des Colonies.

79, rue de Paris, à SAINT-DENIS (Seine).

Tél. : Plaine 02-78.)

BARDANE STABILISÉE

(Extrait de racine.)

Propriétés et indications thérapeutiques. — Médication abortive de la Furunculose, Spécifique de la furunculose vraie, mais sans action sur la Folliculite ou sur les autres inflammations superficielles.

Formes spécialisées. — Pilules et Dragées DAUSSE de Bardane stabilisée, dosées à 0 gr. 20 d'extrait mou par pilule ou dragée. 3 pilules matin, midi et soir, soit 9 pilules par jour, pendant 4 ou 5 jours.

EXTRAIT FLUIDE DE BARDANE DAUSSE

Prendre 4 à 6 cuillerées à café par jour, en nature ou dans un peu de tisane dépurative.

Élixir Dépuratif Dausse préparé avec l'extrait fluide.
2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

BARYTOL

Sulfate de baryum poudre, produit rigoureusement pur, inaltérable, d'une innocuité absolue pour examens radiologiques par voies buccale et rectale.

Préparation :

- 1° *Pour ingestion par voie buccale :* Prendre un récipient contenant 200 à 250 grammes d'eau froide ou tiède, verser par petites quantités le *Barytol*, soit 150 grammes, en agitant constamment avec une cuillère et dans le même sens jusqu'à émulsion complète. Le lait de baryum ainsi préparé reste homogène et assure une image parfaite.
- 2° *Pour administration par voie rectale :* opérer de la même façon, mais en employant 600 grammes d'eau et 400 grammes de *Barytol*.

Prix en pharmacie : 150 grammes : 10 fr. 40
400 grammes : 20 fr. 80.

En vrac, prix spécial pour radiologues, hôpitaux, cliniques.

Émulsionneur prix médical : 18 francs.

Laboratoires SAPOREX

184, rte de Genas — LYON (III^e). (Tél. : Vil. 93-88.)

BARYX COLLOIDAL

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif. Poudre colloïdale dosée à 84 p. 100 de sulfate de baryum chimiquement pur.

Enregistré au L. N. M. C. sous le n° 1143-2.

Avantages. — Facile à diluer. Donne une émulsion très stable. Sans aucune adjonction alimentaire. Conservation parfaite. Examens des contours, Etude du relief des muqueuses. Lavements barytés.

Posologie :

Estomac	150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 fois.
Région cæco-appen- diculaire	150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.
Transit	300 gr. dans 450 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.
Lavement baryté	5 à 600 gr. dans 1 litre 1/2 d'eau.

Mode d'emploi. — Verser la poudre dans la quantité d'eau indiquée en agitant rapidement avec une cuiller jusqu'à complet mélange.

Présentation. — Boîte de 150 grammes. Prix : 12 fr. 50.

Conditions spéciales à MM. les médecins.

Présentation réservée au corps médical et aux hôpitaux : Boîtes de 2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, 18 kgs et fûts de 50 kgs.

Tarif, Echantillons et Littérature sur demande aux :

Laboratoires du RADIO-BARYX

1, rue de Paris — LIMOURS (Seine-et-Oise). (Tél. : n° 71)

R. C. Rambouillet 5-184. — Compte Chèques postaux : Paris 1857-27.

Commandes pour Paris : Trudaine 55-77.

BASEDOWINE

Indications. — Maladie de Basedow fruste et constituée. Nervosisme féminin. Instabilité thyroïdo-ovarienne. TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE et RÈGLES DOULOUREUSES.

Composition. — Extrait thyroïdien, Ovarine et Hormone Ovarienne lipodique cétosoluble, un dérivé bromé en très faible dose.

Particularités. — Médication parfaitement inoffensive.

Traitement d'essai de toutes les déficiences et irrégularités du système sympathico-endocrinien chez la femme.

Posologie. — 1 à 4 comprimés le soir au coucher 5 fois par semaine. (A continuer sans danger.)

Prix : 22 fr. 50.

Laboratoires R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 98-89.)

BASMYL

Composition par dragée :

Castoréum	0,025
Bromure de Codéine	0,01
Dionine	0,005
Extraits d'Aconit	0,004
De Belladone.....	0,004
D'Ipéca.....	0,005
D'Erisimum et de Grindelia	āā 0,05
Thiocol	0,10

Forme. — *Comprimés dragéifiés.*

Indications. — Toux spasmodiques, Affections pulmonaires, Emphyseme, Spécifique du spasme dans toutes les affections trachéo-bronchiques.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour, à distance des repas.
Prix : 14 francs la boîte de 20 dragées. Durée de la boîte : 6 jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1206-1.

A. BOUCHAND, Pharmacien

à MELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 46.)

BAUME ADOL

Composition. — Préparation à base de : Acide salicylique, Salicylate d'Amyle, *Gaïacol*, Menthol, Chloroforme.

Action thérapeutique. — Analgésique puissant anti-rhumatismal. Suppression de l'odeur désagréable du salicylate de méthyle. *Décongestionnant antijébrique. Action précieuse dans les affections bronchiques et pulmonaires (Gaïacol).*

Indications. — Rhumatismes aigus ou chroniques, goutte, lumbago, *torticolis*, zona, sciatique, névralgies, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, orchites, etc...

Mode d'emploi. — Faire une friction légère et une onction et recouvrir d'ouate et de tissu imperméable. Une à deux applications par jour.

Prix : 10 fr. 95.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe.

78, Cours de la Liberté — LYON.

(Tél. : Moncey 13-37.)

BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

Composition et forme. — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques	6	Salicylate d'amyle	4
Beurre de muscade	2	Acide salicylique	3
Vaseline.....	60		

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et résolutif puissant. Révulsif pulmonaire. Odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, torticolis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciaticques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

Mode d'emploi. — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration, recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre ou du thorax et des reins.

Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Prix : 11 francs (pour 10 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). — Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

BAUME du Dr BAISSADE

adopté par les hôpitaux de Paris (Saint-Louis).
et de province ; par les Ministères des Colonies
et de la Marine.

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Antiprurigineux et analgésique supprime immédiatement les démangeaisons et la douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furunculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onctions douces (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Prix au public : 12 francs et 18 francs.

Laboratoire du Baume du Dr BAISSADE

Saint-Loup — MARSEILLE.

BAUME BENGUÉ

Composition. — Menthol, Salicylate de méthyle, Lanoline et **Topique Bengué**, Baume sans odeur au Salicylate de Glycol.

Propriétés et indications. — *Analgésique externe* : Rhumatismes aigus ou chroniques, Goutte, Névralgies diverses : faciales, intercostales (points de côté), lombaires (lumbago), ovariennes, sciatiques. Douleurs de l'ataxie locomotrice, Hyperesthésies diverses, Coliques de plomb, Coliques néphrétiques, Péritonite, Gastralgie, Torticolis, Zona.

Forme. — Pommade en étui d'étain.

Posologie. — Onctions douces et persistantes deux fois par jour; enveloppements d'ouate, serviette ou flanelle.

Prix : 9 fr. 35.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,
Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trin. 85-60.)

BAUME BERTHELOT

Analgésique puissant d'odeur agréable.

Non irritant.

Permet l'application des U. V.

Formule. — Ext. Belladone, Essences de Lavande, Thym et Romarin, Salicylate de Benzyle, Acide salicylique, Menthol, Camphre, Chloral, Chloroforme, Excipient parfumé.

Indications. — Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Lumbagos, Entorses, Foulures, Maux de Rein, Névralgies, Points de côté, Toutes douleurs.

En massages deux fois par jour.

Laboratoires BERTHELOT

J. BERTHELOT, Pharmacien,

Saint-Ouen-l'Aumône (S.-et-O.).

BAUME CRÉSA
du Professeur Carrière

A base de Crésotate de Glycol.

Préparation d'odeur agréable, opiacée
et belladonnée.

Traitement local externe des douleurs.

Rhumatisme, Goutte, Sciatique, Lum-
bago, etc...

Produits STÈNE

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général.

Baume benzo-tannique.

Mode d'emploi. — Laver la crevasse avec
de l'eau bouillie et un tampon d'ouate,
appliquer le baume et recouvrir les
mamelons avec les bouts de sein en métal
afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec deux bouts de sein
8 francs.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS

(Tél. : Wagram 33-70.)

BAUME DE LA MATERNITÉ

Composition :

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,10
Résorcine.....	0,20
Acide borique	2 gr.
Dermatol	0,50
Baume du Pérou	0,10
Lano-vaseline.....	Q. S.

pour un tube.

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

Indications. — Érythème fessier, toutes gerçures en général.

Dépôt : **Laboratoires NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

BAUME DURET

Créé et adopté à l'hôpital Saint-Louis
(Dermatothérapie).

Composition. — Combinaison de soufre, goudron de Norvège, camphre, huile de cade, résorcine, borate de soude, gaïacol, dans un mélange d'acétone, huile de ricin, lanoline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestif et cicatrisant. Ni toxique, ni irritant.

Indications. — Eczéma, Lichen, Psoriasis, Acné, Prurigo, Dartres, Parakératoses, Prurit, etc...

Mode d'emploi. — Onction deux fois par jour recouvrir ensuite d'une compresse de gaze.

Le flacon d'environ 80 gr. : 17 fr. 25.

Enregistré au Laboratoire National du Contrôle des Médicaments sous le n° 306-3.

H. ROUTIER, Pharmacien de 1^{re} classe

20, rue Saint-Lazare — PARIS.

(Tél. : Trudaine 20-81.)

BAUME HEPTALGINE

Chimiothérapie élective de l'infection cutanée et de la douleur sur les surfaces cutané-muqueuses.

Composition. — Toluène sulfamide monochloré associé aux éthers aminobenzoïques dans un excipient neutre entièrement absorbé.

Indications. — Pansement anesthésique permettant une antiseptie élective, prolongée, sans nécrose sur les tissus. Stérilisation et cicatrisation parfaite des téguments, Plaies douloureuses septiques ou non, Brûlures, Ulcères, Escarres, Crevasses, Dermatoses microbiennes, Prurits, Fistules, Abscesses après ouverture et drainage, Hémorroïdes douloureuses, Suppurations nasales, Ozène, Sinusite.

Mode d'emploi. — Présenté en tube canule spécial, le Baume Heptalgine est appliqué, *loco dolenti*, selon les indications du médecin.

Laboratoires J. BERTHOUMEYROUX

Docteur en Pharmacie,

SOUILLAC (LOT)

Echantillons gratuits. Littérature sur demande.

BAUME KALENDOL

Composition et forme. — Pommade en tube à base de bismuth, Teinture spéciale de Calendula, Extr. de ratanhia, associés à un excipient nouveau.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant, antiseptique, cicatrisant.

Indications. — Gerçures et crevasses des seins, Rougeurs et feux des bébés, brûlures, engelures, Coups de soleil, Impétigo et plaies de toutes sortes.

Mode d'emploi. — En applications, recouvrir de gaze et de coton,

Huit jours de traitement.

Laboratoires COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE. Tél. : 0-21.

BAUME LARTIGOL

A base de chloral, camphre, acide salicylique et menthol. Odeur agréable, incolore.

Mode d'emploi. — Étendre avec les doigts sur la région douloureuse et faire des frictions douces pendant 5 minutes.

Indications. — Contre les névralgies et douleurs de toute nature, assouplissement des articulations avant ou après les exercices sportifs.

Prix, le tube : 13 fr. 90.

Durée moyenne de l'unité de vente : de 2 à 4 semaines.

ÉTABLISSEMENTS FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

BAUME-PANTHÉSINE

A base de Panthésine « Sandoz », anesthésique local.

Propriétés. — Calmant analgésique non révulsif pour toute douleur et névralgie *accessible extérieurement* (douleurs musculaires, articulaires, cutanées) et pour toute démangeaison. Modère les processus inflammatoires en neutralisant par sa réaction basique l'acidité des tissus enflammés et en supprimant les réflexes axoniques.

Indications. — Névralgies intercostales, pleurodynie, névrites, arthralgies. Rhumatisme aigu et chronique. Pseudo-rhumatisme infectieux. Sciatique. Contusions douloureuses. Coup de soleil. Erythème actinique. Lumbago. Crises hémorroïdales, tout prurit.

Présentation. — Tubes de 10 et 20 grammes.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BAUME RAFAX

Composition. — Borate de soude, sulfate double d'alumine et de potasse, alcool, huile d'amandes douces.

Indications. — Le *Baume Rafax* est indiqué dans le traitement des maladies de la peau, en particulier dans l'eczéma, dartres, acné, psoriasis, ulcères et *Brûlures*.

Avantages. — Agréablement parfumé, le *Baume Rafax* ne contient aucun acide et son emploi est rigoureusement sans danger.

Présentation et prix :

Flacon : 25 fr.

Un seul flacon suffit pour un traitement normal.

Agence Générale des Produits RAFAX

4, rue Boulard — PARIS (XIV^e).

Tél. : Ségur 96-72.

BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal
(Salicylate de Glycol)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.

Ne tache pas le linge.

Indication :

Traitement externe des douleurs rhumatismales et des névralgies.

Présentations et mode d'emploi :

Deux présentations : Forme liquide et forme crème.
Onctions légères suivies d'enveloppement ouaté non compressif.

Le tube de crème : 8 fr. 50. — Le flacon : 11 fr. 70.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean- Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

BAUME ROBUR

Toutes douleurs Rhumatismales, Névralgiques
et Musculaires.

Formule :

Extrait de belladone	0 gr. 30
Salicylate d'Amyle	5 gr.
Camphre	4 gr.
Menthol	2 gr.
Chloroforme	3 gr.
Teint. de Capsicum	4 gr.
Ess. de lavande	1 gr.
Ess. de Cèdre	3 gr.

Lanovaseline pour 100 grammes.

En tube de 90 grammes.

Mode d'emploi. — En massages et applications.

Le remarquable pouvoir de pénétration et d'entraînement dans les tissus de l'essence de Cèdre triple l'efficacité du Baume Robur.

Prix : 14 francs.

Échantillon et Littérature:

Laboratoire ABARNOU

72, avenue Thiers — LE MANS

(Tél. : 15-56.)

BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOÏDAL

Propriétés thérapeutiques. — Il en est quatre principales :

Le Baume Sélénia est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, *décape les léguments*, est *cicatrisant*.

Indications. — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

Mode d'emploi. — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 15 francs.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par **O. DAVID et ses fils**

Pharmaciens, 49, rue de Biche — COURBEVOIE

(Seine). (Tél. : Défense 01-41.)

BAUME THOMAS

Formule :

Scuroforme	5
Borate de soude	4
Excipient insoluble, Q. S. pour 100 gr.	

Présentation. — Pâte de goût et d'odeur agréables.

Indication. — Douleurs de la dentition chez les nourrissons.

Avantages. — Ne fond pas dans la bouche. Malgré les suctions de l'enfant, reste en contact avec la gencive pendant toute la durée de la friction et assure ainsi rapidement une anesthésie prolongée. Absolument inoffensif. Quinze ans d'existence. Nombreuses attestations médicales.

Posologie et mode d'emploi. — Effectuer avec le doigt recouvert d'un peu de Baume Thomas des frictions sur les gencives douloureuses aussi souvent que nécessaire, après avoir lavé la bouche de l'enfant.

Prix : 10 francs le tube pour une dentition.

Enregistré au Lab. N° de Contrôle sous le n° 650-2.

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

BAUMIX

Formule :

Menthol	0 gr. 281
Calomel à la vapeur	2 gr. 81
Péroxyde de zinc	7 gr. 025
Baume du Pérou	5 gr. 62

pour 100 gr.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle 322-1.

Indications thérapeutiques. — Ulcérations variqueuses. Brûlures et toutes plaies de toute nature.

Chaque pot est accompagné d'un mode d'emploi très détaillé.

Livré en pot aluminium de 60 cgr.

Prix : 11 fr. 50.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SÈVRE (Vendée).

BAUMOLACPININE

pour bains à l'essence de pin.

Forme. — Liquide de fluorescence verte.

Composition. — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

Indications. — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

Posologie. — Une à deux cuillerées à soupe par bain.

Prix :	{	Flacon de	3 bains...	6 fr. 90
		— de	15 — ...	28 fr. 25
		— de	50 — ...	74 fr. »
		— de	100 — ...	133 fr. 25

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.
(Tél. : Trudaine 92-52.)

BBDERM MARS

Pommade adhésive contre toutes les dermites simples et particulièrement contre celles des nourrissons. Recouverte d'une simple couche de poudre de talc, elle forme à elle seule un véritable pansement qui protège la peau.

Formule. — Oxyde de zinc pur, sous-gallate de bismuth, lanoline, vaseline.

Mode d'emploi. — Étendre une couche bien homogène sur toutes les parties atteintes et poudrer. Renouveler ce pansement au moins une fois par jour, après avoir enlevé la vieille pommade à l'aide d'un tampon d'ouate imbibé d'huile.

Indications. — Dermite, prurits, etc. C'est le préservatif et le curatif par excellence de tous les érythèmes des nourrissons. Dans les dermatoses suintantes et impétigo, employer le **BBDERM ECZÉMA** après lavages à l'eau Sanubrolée. (Voir à l'article SANUBROL MARS)

2 sortes de Bbderm Mars :

Bbderm simple : toutes dermites des nourrissons.

Bbderm Eczéma : impétigo, eczéma et toutes dermites suintantes.

Prix : 11 fr. 50 le tube.

Echantillons sur demande.

Laboratoire MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22.

BÉATOL

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nerveux. Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, intoxications, Maladies nerveuses ou mentales.

1^{re} Forme: AMPOULES

Composition :

Diéthylmalonylurée	0,125
Bromhydrate de scopolamine.....	0,00012

Pour 1 cc. en ampoules de 2 cc.

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

2^e Forme: LIQUIDE

Composition :

Diéthylmalonylurée	0,18
Extrait de jusquiame	0,015
— fluide de valériane	0,10

Pour une cuillerée à café.

Mode d'emploi :

- a. *Calmant nerveux* : 1 cuillerée à café le matin au petit déjeuner ; renouveler, suivant besoin, dans la journée, la dose de 1 cuillerée à café.
- b. *Hypnotique* : 1 cuillerée à café avant le repas du soir et une seconde cuillerée à café au coucher à prendre dans de l'eau ou une infusion, une troisième cuillerée à café dans la nuit, si besoin.

3^e Forme: COMPRIMÉS

Composition :

Diéthylmalonylurée	0,18
Intrait de valériane	0,10
Extrait de jusquiame	0,02

Pour un comprimé.

Mode d'emploi :

- a. *Calmant nerveux* : 1 comprimé le matin au petit déjeuner ; renouveler, suivant besoin, dans la journée la dose de 1 comprimé.
- b. *Hypnotique* : 1 comprimé avant le repas du soir et un second au coucher à prendre dans de l'eau ou une infusion, un troisième comprimé dans la nuit, si besoin.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, deux lignes groupées).

BÉCALCIOL

« MÉTÈRE »

Indication :

Chimiothérapie (non aurique) des Tuberculoses osseuses, ganglionnaires et pulmonaires.

Composition :

Association de catalyseurs en solution huileuse colloïdale contenant :

Manganèse	0,09 mgr.
Cuivre.....	0,08 mgr.
Calcium	0,05 mgr.
Potassium	0,02 mgr. par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. En même temps prendre 2 capsules par jour de Bécalsiol-capsules par la bouche. Au bout de 5 semaines, arrêt et reprise du traitement s'il est nécessaire. Il est recommandé d'associer une opothérapie appropriée à chaque cas.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix

Composition. — A base de vieux vin de liqueur, le *Beef Lavoix* contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

Indications. — Convalescence, Inappétence, Tuberculose, Anémie, Épuisement, Grossesse, Allaitement.

Posologie. — Un verre à madère avant ou après chaque repas.

Prix : 23 fr. 30 le flacon ; 14 fr. 05 le 1/2 flacon.

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

BÉGESSOL

Chimiquement : Éthylbromogalacolate d'Hexaméthylène-amine. Produit nouveau cristallisé, hydrosoluble, d'activité antiseptique générale 5 fois 1/2 celle du gáiacol.

L'action bactéricide vis-à-vis du bacille de Koch est très supérieure à celle de la créosote et du gáiacol.

Dépourvu de causticité et de toxicité, ne provoquant pas d'hémoptysie, il est d'absorption pulmonaire rapide, contrairement au sulfogalacolate de potassium, d'action bactéricide nulle et non retrouvé dans le pöumon. (Gordonoff, Annales de Médecine, oct. 1935.) Il amène vite chute de la température, sédation de la toux, excitation de l'appétit avec modification de l'expectoration.

Indications. — Affections de l'appareil respiratoire — Tuberculose — Pleurésies — Pneumonies — Bronchites — Tubercules rénales et génito-urinaires.

Forme. — 1^o Ampoules dosées à 0 gr. 50 de produit actif en tube fermé à dissoudre dans 10 cc. de sérum glucosé joint à l'ampoule.

2^o Sirop contenant par litre 10 gr. Bégessol avec 250 gr. de sirop de codéine. 3 à 4 cuillères à soupe par jour (adultes).

3^o Comprimés dosés à 0 gr. 30.

4^o Suppositoires adultes dosés à 0 gr. 30.

5^o Suppositoires enfants dosés à 0 gr. 15.

Demandez les indications de traitement et la littérature complète.

Laboratoires LORRAINS à ETAIN (Meuse).

(Tél. : 74 ETAIN — Télégr. : Labodés ETAIN.)

BELCARMINE

Association de Belladone, Charbon, Formine.

Formule. — Une cuillerée à café de granulé contient : Teinture de Belladone, teinture de Jusquiame : à 5 gouttes. Formine 0 gr. 15. Charbon animal 0 gr. 50. Charbon végétal 1 gr.

Présentation. — Cachets. — Granulé fondant de goût agréable.

Indications. — Entérocolites, cholécystites chroniques, angiocholites, fermentations intestinales, constipation chronique, aérophagie.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café ou cachets après les repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café 2 fois par jour.

Prix : Boîte modèle courant : 14 fr. 50. (Durée moyenne 6 jours).

Flacon Cure : 32 fr. 25.

Laboratoire R. THIRODE

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,

33, Grande-Rue — BESANÇON.

(Tél. : 0-37.)

BELHÉMINE

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval,
Sérum hématopoiétique.

Indications. — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

Mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix public : 22 francs la boîte de 6 ampoules.

Compléter le traitement par l'usage de la
SANQUIPLASMINE

Granulé préparé avec le Caillot sanguin :
Hémoglobine, 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 15 francs le flacon.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire de Sérothérapie

H. AMMANN, Pharmacien, Licencié ès sciences,
Impasse Adam, 3, BOULOGNE-BILLANCOURT.

(Tél. : Molitor 01-90.)

BELLADÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée + Bellafoline.

Sédatif nervin général et des cas résistants.

Indications spéciales. — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, douleur morale, vomissements de la grossesse. Mal de mer.

Présentation. — Tubes de 20 et flacons de 100 et de 500 comprimés. Boîtes de 5 et de 25 ampoules.

Posologie. — *Comprimés :* 2 à 4 par jour. Dans l'épilepsie, 3 à 5 par jour. Enfants : 2 à 4 demi-comprimés. *Suppositoires :* 1 à 2 par jour.

Belladénal injectable : 1 à 4 cc. selon l'intensité des cas.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLAFOLINE

Alcaloïdes totaux de la Belladone.

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

Posologie :

Comprimés : 1 à 2, trois fois par jour.

Gouttes : X à XX, trois fois par jour.

Ampoules : 1/2 à 2 par jour (injections sous-cutanées, intramusculaires et endoveineuses indolores).

Sirop : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

Naupathie :

Bellafoline : 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures et en plus :

Belladénal : 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLASODINE

Traitement Alcalino-Sodique Belladoné, établi d'après la formule du P^r Bourget.

Formule :

Sulfate Soude anhydre.....	0,30
Phosphate Soude anhydre.....	0,20
Bicarbonate Soude anhydre.....	0,15
Citrate Soude anhydre.....	0,10
Belladone pulvérisée.....	0,01

Essence de Badiane pour aromatiser, pour un paquet n° 30.

Avantages. — Produits chimiquement purs et anhydres. Prix établi judicieusement, moins cher qu'une préparation magistrale tarif A. G.

Indications. — Toutes celles de la Solution de Bourget : insuffisances hépatiques et biliaires, gastralgies, dyspepsies, pyrosis et toutes dermatoses d'origine digestive.

Posologie. — *Adultes* : 1 paquet le matin à jeun et le soir avant dîner dans un verre d'eau tiède ou dans une infusion de badiane, pensée sauvage, etc.

Enfants : 1 paquet le matin.

Prix : 14 fr. 60 pour 15 jours de traitement.

Laboratoire Y. RAVALEC, Pharmacien.

13, Grande-Rue — HERBLAY (S.-et-O.). — Tél. : 83.

BELLERGAL

Modérateur de l'éréthisme nerveux. Traitement du terrain névropathique et de l'émotivité. Régulateur des dystonies neuro-végétatives. Traitement préventif du mal de mer.

Composition. — Comprimés dragéifiés renfermant : Tartrate d'ergotamine (Gynergène) : 0 mgr. 3.

Alcaloïdes totaux de la belladone (Bellafo-line), 0 mgr. 1.

Phényl-éthyl-malonylurée : 2 cgr.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 dragées par jour, et jusqu'à 6 s'il y a lieu.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour à partir de 5 ans.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLINGUOL

Traitement du diabète par amélioration progressive des fonctions glandulaires.

Organothérapie Bellas.

Présentation. — En boîtes de 50 comprimés : 40 francs.

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique, Extrait de rate, Poudre de bile.

Indications. — Toutes formes de diabète après l'âge de 40 ans. Particulièrement indiqué dans les cas de plaies diabétiques ou plaies accidentelles chez les diabétiques.

Posologie. — 3 à 9 comprimés par jour à prendre 1/2 heure avant les repas, matin, midi et soir.

Dans les cas de glycosurie persistante chez des malades impatients et habitués à ne reconnaître une amélioration de leur état que dans la diminution immédiate du taux de sucre dans l'urine, ce résultat peut être obtenu en administrant des doses massives, soit 9 comprimés par jour. Toutefois à cette dose le Bellinguol provoque parfois des troubles intestinaux (diarrhée) ne présentant aucun danger, mais souvent pénibles. Il vaut donc mieux faire patienter le malade et persister avec des doses moyennes pour arriver normalement au même résultat.

Régime. — Le régime habituel, mais moins rigoureux, est à suivre.

Enreg. au Labor. nat. de Contrôle des médicaments. N° 167-16.

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, Pharmacien, 3, place Intérieure-St-Michel - TOULOUSE
(Tél. 213-06.)

BEMAX

Le produit naturel le plus riche connu en **Vitamines B**,
(15 unités internationales par gramme en vitamines B¹.)

Constitué de germes de blé sélectionnés et stabilisés, contient en outre des vitamines A et E, en quantité notable, Teneur en phosphore 2,66 p. 100 en P 2 05.

Indications. — Toutes déficiences en vitamines B, et spécialement : Traitement curatif de la constipation et de l'atonie gastrique.

Grossesse et allaitement (dans ce cas, tripler ou quadrupler la dose, un minimum de 500 unités par jour étant nécessaire).

Enfants sous-alimentés, débilités ou simplement de constitution délicate ; rachitisme.

Convalescences, Suites de grippe.

Diabète (augmente la tolérance des hydrocarbures).

Doses. — Le traitement doit être prolongé au moins un mois. 1 cuiller par jour : à soupe pour les adultes ; à café ou à dessert pour les enfants.

Se prend dans du potage, du café, des compotes, etc.

Prix : 13 fr. 25 et 22 fr. 50 (durée : 3/4 semaines ; 6/8 semaines.)

Laboratoire LACOMBE
Rue Barbès — COURBEVOIE.
(Tél. : Défense 10-48.)

BÉNERVA « ROCHE »

Composition. — Vitamine B¹ cristallisée.

Propriétés. — Élimination rapide des déchets toxiques du métabolisme des sucres (acide pyruvique et ses dérivés). Aucune toxicité, aucun danger d'hypervitaminose.

Indications. — Béri-béri, Polynévrites alcoolique et nicotinique, Polynévrite des diabétiques, Sciatique, Névroses intestinales, Vomissements incoercibles de la grossesse, Auto-intoxications des nourrissons, Furunculose, etc.

Posologie et modes d'emploi. — Comprimés dosés à 1 mgr. = 500 u. i. — Ampoules de 1 cc. de dosage normal (2 mgr.) = 1 000 u. i. — Ampoules de 1 cc. de dosage fort (10 mgr.) = 5 000 u. i. — 1 à 2 comprimés par jour ; 1 ampoule de 1 cc. à 2 mgr. tous les jours ; 1 ampoule de 1 cc. à 10 mgr. tous les deux ou trois jours selon les cas.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N^{os} 504-81 (ampoules normales), 504-83 (comprimés), 504-84 (ampoules fortes),

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

BENSAMINE

Composition. — Combinaison boro-benzoïque d'Hexaméthylènetétramine. Antiseptique général interne et anti-infectieux puissant. Action combinée du benzoate et de l'urotropine créant dans son absorption humorale et dans son élimination urinaire le milieu acide favorable au dédoublement de l'urotropine en son composant actif, le méthanal (formol).

Indications. — **Voies urinaires :** urines troubles, alcalines, microbiennes, purulentes. **Syndrome entéro-rénal.** Pyélites gravidiques, colibacilluries, gravelles.

État général : Voies biliaires, coliques hépatiques, ictères, septicémies, rhumatismes, arthralgies.

Formes :

1° Comprimés instantanément solubles à 0 gr. 50 de combinaison active. Dose moyenne : 3 à 6 par jour (avalés ou dissous).

2° Bensamine liquide : Goût agréable, pure ou diluée : 1 cuillerée à café correspondant à 1 comprimé ; 3 à 6 fois par jour.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X°).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

BENZETHOL

Traitement des affections pulmonaires.

Composition et présentation. — Solution à 20 p. 100 de benzoate de diéthanolamine en ampoules de 10 cc. pour injection intraveineuse.

Indications. — Abscès du poumon — Suppurations bronchiques et pulmonaires — Bronchites chroniques — Bronchopneumonie — Asthme — Emphysème — Tuberculose pulmonaire.

Posologie. — **Adultes :** Cure de 30 ampoules de 10 cc. en intraveineux : 1 injection par jour. En intramusculaire : une fois tous les deux jours, l'injection étant précédée d'une ampoule d'anesthésique.

Enfants : 1/2 dose.

Contre-indications. — Hépatiques et Rénaux.

Incidents : L'injection doit toujours être poussée très lentement. Parfois le malade peut accuser quelques petits troubles caractérisés par de la rougeur de la face avec sensations douloureuses du creux épigastrique et légers troubles de la vision. Ces incidents sont rares et passagers et ne donnent naissance à aucune séquelle. Ils sont évités en faisant prendre au malade, quelques minutes avant l'injection, une cuillerée à café de la potion ci-dessous, que la malade gardera quelques instants dans la bouche avant de l'ingurgiter définitivement.

Ephedrine naturelle.....	3 gr.
Solution d'adrénaline au millième.....	150 gouttes
Excipient q. s. p.....	150 cc.

Prix : La boîte de 6 ampoules — Francs : 45.

Produit enregistré au Laboratoire de Contrôle.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs du Ministère des Colonies et de l'Assistance Publique
79, rue de Paris, à SAINT-DENIS (Seine).

BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisypilitique énergique.)

Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux

Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15, ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à faits comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzo-bismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant, pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes et Comprimés.

Composition :

Benzoate de benzyle et dériv. benzylés.	10
Extr. fluide valériane fraîche stabil...	1 000
Alcoolature de Passiflora Incarn.....	1 000
Teinture de Cratægus oxyacantha...	1 000

Indications. — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Éréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

Posologie. — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion, ou 1 à 3 comprimés. Spasmes : XXV gouttes ou 1 comprimé 3 ou 4 fois par jour. Prix : Gouttes, 13 fr. 90. Comprimés, 16 fr. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie
105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 80-76.)

BENZO-GYNŒSTRYL

Folliculine cristallisée du D^r Roussel à l'état de Benzoate de di-hydro-folliculine (Benzoate d'Œstradiol).

Voie intramusculaire. — Ampoule de 1 cc. contenant 1 mgr. d'hormone, soit 10 000 U. I. (1935) en solution huileuse.

Indications. — Infantilisme utérin, aménorrhée, oligoménorrhée, dysménorrhée, ménopause naturelle ou artificielle. Vomissements et troubles de la grossesse.

Posologie. — Si la fonction ovarienne n'est pas abolie, 1 à 4 injections réparties au cours des 2^e et 3^e septénaires de la période intermenstruelle.

En cas de carence totale, 4 injections dans le mois en maintenant entre elles un intervalle de 7 à 8 jours.

Prix au public : La boîte de 2 ampoules : 27 francs.

Remboursement aux Assurés Sociaux : catégorie B.

Voir aussi Gynœstryl et Benzo-Gynœstryl 5.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

BENZO-GYNŒSTRYL 5

Folliculine cristallisée du Dr Roussel à l'état de benzoate de di-hydro-folliculine (Benzoate d'Œstradiol).

Ampoule de 1 cc. contenant 5 mgr. d'hormone, soit 50 000 U. I. (1935) en solution huileuse (voie intramusculaire).

Indications. — Troubles fonctionnels ou généraux résultant des déficiences ou des carences ovariennes graves ou rebelles.

Posologie. — Si la malade est encore réglée : 1 à 4 injections par mois au cours des deuxième et troisième septénaires de la période intermenstruelle.

Si la malade est aménorrhéique, régler la posologie suivant le but à obtenir en utilisant une dose minima de 2 ampoules par mois.

Prix au public : 42 fr. 60 la boîte de 1 ampoule.

Remboursement aux Assurés sociaux : catégorie B.

Voir aussi **Gynœstryl** et **Benzo-Gynœstryl**.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Gherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

BENZO-IODHYDRINE

La BENZO-IODHYDRINE n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du Dr Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence des Cardio et des Artérioscléreux, des Goutteux, des Emphysémateux. Chaque capsule de gluten correspond à 30 cgr. de KI.

Doses. — 2 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Fabrication, vente en gros et échantillons.

H. RIVIER, Pharmacien

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 22-46.)

BENZOQUINOL

Composition. — Benzoate de quinoléine, thymol, benjoin mentholé eucalyptolé, créosote, essence de niaouli, et essences diverses.

Propriétés. — Antiseptique et anesthésique des voies respiratoires. Sédatif et antispasmodique certain.

Indications. — *Coqueluche, asthme, emphyème, toux nerveuses, dyspnée, bronchites aiguës et chroniques.*

Caractéristiques. — Effet rapide et continu, pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — En inhalations, XV gouttes dans un quart de litre d'eau bouillante, deux à trois inhalations par jour.

Pour les enfants en bas âge, les inhalations au pied du lit dans une chambre bien fermée.

Remarque. — Que le médecin traite la coqueluche par des vaccins, des injections d'éther, de sérum, il est nécessaire de compléter le traitement par des inhalations au **Benzoquinol**.

Prix : 13 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

BENZOSULFÈNE

Dragées glutinisées d'Hyposulfite de Na, Hyposulfite de Magnésium et Benzonaphtol.

Indications :

Intolérances alimentaires, Dermatoses, Eczéma, Urticaires, Déficiences hépatiques, etc.

Doses :

Adultes : 1 dragée avant chacun des 3 repas (à avaler sans croquer).

Enfants : 1 à 2 dragées par jour.

Laboratoire MARTINIE

62, avenue Philippe-Auguste—PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 86-84.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1122-5.

BENZYLOCALCIUM

Récalcification (vitaminée-phosphorée) intensive, renforcée par le Fenugrec désodorisé.

Assimilation assurée par les actions combinées :

1° Antispasmodique et hypnotique du noyau Benzyl-lique ;

2° Antitoxique de la substance génératrice de vitamine B.

Formule :

Benzylhypophosphite de calcium.....	7 gr. 50
Fenugrec désodorisé	4 gr.
Substance véhicule de vitamine B.....	1 gr.

Deux formes : Granulé et cachets.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé, ou un cachet 3 fois par jour, avant les repas.

Enfants : 1 demi-cuillerée à café ou un cachet 2 fois par jour.

Indications. — Adénopathie ; Prétuberculose ; Débilité ; Amaigrissement.

Prix :

Cachets	21 fr.
Granulé	19 fr.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.)

BÉTUL-OL MIDY

Composition. — Menthol et chloral, en solution dans le salicylate de méthyle.

Propriétés. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbagos, Sciatiques, Douleurs des articulations, Névralgies, Névrites, points de côté, douleurs thoraciques, courbatures.

Forme. — Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Posologie et mode d'emploi. — Le BÉTUL-OL MIDY peut être employé, soit sous forme d'onctions et de frictions, soit sous forme d'enveloppements.

1° Onctions et frictions : Enduire la région douloureuse avec une pièce de flanelle imbibée de BÉTUL-OL. Frictionner *doucement* et *longtemps*. Recouvrir avec la flanelle, puis avec un taffetas gommé imperméable et une couche de coton.

2° Enveloppements : Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé puis de coton. Renouveler l'application 2 à 3 fois par jour.

L'absorption du BÉTUL-OL se fait si rapidement par la peau que, 10 minutes après, on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Prix : 19 fr. 20. Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e). — (Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

BEVITA

Composition. — Levure de bière purifiée, désamertu-
mée et séchée, de goût agréable.

Protéines	56 p. 100
Hydrates de carbone	26 —
Lécithine	1 —
Glutathion	0,65 —
Vitamines B ¹ , B ² , B ³ , B ⁴ , B ⁵ , B ⁶ .	

Indications. — Convalescence, Affections cutanées,
Staphylococcie, Diabète, Anorexie, Dyspepsie, Enté-
rocolite chronique, Constipation, Ulcère gastro-duo-
dénal, Vomissements de la grossesse, Hypovitaminose
B de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.

Posologie. — *Enfants* : 5 à 10 grammes, soit 2 à 4 cuil-
lerées à café par jour.

Adultes : 10 à 30 grammes.

Remarque. — Le goût agréable de BEVITA en permet
l'utilisation infantile. Il est recommandé de l'ajouter
aux potages, bouillies, purées, ou de le mélanger aux
légumes ou pâtes, ou encore de l'absorber délayé dans
un verre d'eau fraîche ou tiède.

Prix : 12 francs le flacon de 150 grammes.

SANAVITA

7, rue Fontaine-Delsaux — LILLE. (Tél. : 11-35.)

BEVITINE

Vitamine B1 cristallisée.

Vitamine B1 cristallisée, antinévritique. Comprimés et
solution aqueuse.

Vente limitée à la France, Colonies Françaises, Pays de
protectorat et sous mandat français.

Indications. — Bériberi, troubles du métabolisme, de la
nutrition des nerfs, Névrites, polynévrites (toxiques,
infectieuses, gravidiques, diabétiques), névralgies,
funiculites, myéloses, chorée, sclérose en plaques,
diabète, anorexie du jeune âge.

Présentations et posologie.

Comprimés dosés à 0 gr. 005 (tubes de 20). 1/2 à 1 com-
primé par jour suivant l'âge. Le tube : 31 fr. 20.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 002 de Vit.
B1 =. 26 francs.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 01 de Vit.
B1 =. 72 fr. 50.

Injections sous-cutanées, intramusculaires ou intravei-
neuses (0 gr. 002 à 0 gr. 01 *pro die* suivant la gravité
des cas. Séries de 10 à 12 injections).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marqués Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

Tél. : Balzac 22-94.

BEXININE

Sirop anticoquelucheux.

Composition. — Association d'essences aromatiques antiseptiques des bronches (eucalyptol, niaouli, cyprès, serpolet, etc.) et d'antispasmodiques (bromoforme, benzoate de benzyle, droséra et grin-délia).

Indications. — Efficacité remarquable dans le traitement de la *coqueluche*, toux spasmodiques, toux rebelles, catarrhe bronchique.

Posologie. — Peut être prescrit depuis l'âge de deux mois : X à XXX gouttes en 3 fois par 24 heures.

Enfants de 1 an : 2 cuillerées à café par jour.

Enfants de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Prix du flacon : 18 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments, n° 1463-1.

Laboratoires de la Bexinine L. COLIN

19, rue Saint-Jean — CAEN (Calvados).

BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

Présentation. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr. 035 de bismuth métal par cent. cube.

Propriétés thérapeutiques. — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le Dr L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydrosolubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

Posologie. — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série par 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 33 fr. 25.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, Place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(anciennement 43, rue Tournefort). (Gobelins 26-21.)

BI-CI-PA

Sirop eupeptique de l'enfance à la papaïne.

Régulateur et stimulant des fonctions digestives.

Bicarbonat de soude	1 gr.
Citrate de soude	1 —
Papaïne liquide à 50 p. 100....	2 —
Teinture de Belladone	III gouttes
Sirop simple..... Q. S. pour	120 cc.

Indications. — Troubles digestifs au cours de l'allaitement artificiel, Inappétence, Vomissements, Constipation. Etats spasmodiques de l'estomac. Agitation nocturne. Troubles cutanés. Acétonurie.

Posologie :

Nourrissons : une cuillerée à café avant chaque tétée ou mélangée au biberon.

Jeunes enfants : une cuillerée à dessert avant chaque repas.

Prix : 14 fr. 50, taxe comprise.

Laboratoires du BI-CI-PA

G. et P. MOISIÈRE, Pharmaciens.

62, rue du Gros-Noyer — ERMONT (Seine-et-Oise).
(Tél. : 163.)

BI-CITROL MARINIER

L'Agent rationnel de la Médication citratée.

Citrates monosodique et trisodique en granulé soluble de goût agréable.

Eupeptique, Cholagogue, Antivisqueux, Décongestif.

Dyspepsies, Gastrites, Vomissements :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau chaude, au cours du repas ou au moment des malaises.

Insuffisance hépatique, Arthritisme :

Deux cuillerées à café le matin à jeun dans un verre d'eau tiède ; ou bien une cuillerée à café avant chaque repas.

Hyperviscosité sanguine :

(Pléthore, Hypertension, États congestifs, Stases veineuses) :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau trois fois par jour avant les repas.

Pneumonie :

Une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

Enfants : 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Prix du flacon : 18 fr. 65

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 48-1, le « BI-CITROL » peut être légalement prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires G. MARINIER

23, rue Ballu,
PARIS

BIÈRE DES NURSES

La bière du Corps Médical (39^e année).
En usage dans les Établissements Médicaux.
Non Alcoolisée quoique très riche en malt sans colorant, de conservation garantie car très pure, de saveur identique aux bières supérieures du Commerce, cette Bière de Santé est recommandée aux Alcooliques, Nourrices, Enfants, Vieillards, Convalescents, etc., outre son usage à table.

Livraisons : Paris, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. **Expéditions** ailleurs du parfait « **Concentré des Nurses** ».

CORPS MÉDICAL. — Tarif de Gros et échantillons gratuits sur simple demande : Paris, Seine, S.-et-O, S.-et-M : *Bière*. Autres départements : *Concentré*.

La Bière des NURSES
à BOURG-LA-REINE (Seine)

BIFIDIGÈNE

Bouillon de culture antiputride du D^r Henry Tissier.

Composition. — Symbiose de *Bacillus Bifidus* et de *Bacillus Acidiparalactici*.

Présentation. — Ampoules buvables de 5 cc.

Flacons de 1 litre, 1/2 litre,

Mode d'action. — Rétablit la flore intestinale physiologique. Le *Bacillus Bifidus* s'acclimate et pullule très rapidement dans le tube digestif.

Indications. — *Per os* : Putréfactions intestinales : Entérites, Diarrhées de l'adulte et du nourrisson, Auto-intoxication digestive, Appendicite chronique, Syndrome entéro-rénal, Etats typhiques et paratyphiques. *En pansements* : Gynécologiques et chirurgicaux dans les plaies infectées. *Aucune contre-indication.*

Posologie. — Une ampoule au milieu des deux principaux repas. Un verre à madère au milieu des deux principaux repas.

Le régime du D^r Henry Tissier renforcé et active les effets thérapeutiques de *Bifidigène*.

Dans les entérites graves du nourrisson, on peut sans inconvénient alimenter l'enfant uniquement au *Bifidigène*.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire du BIFIDIGÈNE

A. BOUDET, Pharmacien,

22, rue Pigalle — PARIS. Tél. Trinité 96-76.

BILAXYL

Le laxatif des Hépatiques.

Composition :

Bile poudre	0 gr. 05
Agar-Agar	0 gr. 03
Evonymine verte	0 gr. 02
Podophyllin	0 gr. 02
Diacétyl-dioxyphénylisatine .	0 gr. 005
Extrait de Belladone.....	0 gr. 005 cinq milligr.
Extrait de Jusquiame	0 gr. 005 — —

Pour 1 comprimé dragéifié.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés. — Laxatif cholagogue, rééducateur intestinal.

Doses. — 1 à 2 comprimés au début du repas du soir.

Prix au public : 12 fr. 80 les 40 comprimés.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e)

(Tél. : Louvre 53-16.)

BILEYL

Sels biliaires dépigmentés et décholestérinés.

Forme. — Globules kératinisés, étui de 60 globules, 16 fr. 65 (chaque globule contient 0 gr. 20 d'extraits biliaires).
4 à 8 globules par jour après les repas.

Indications. — Les stases biliaires, Ictères, Constipation, Insuffisance biliaire, Cholémie familiale.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

BILIASÉ RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

Mode d'action. — Chologogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

Indications. — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiasé biliaire. Entérocolite et constipation par **insuffisance biliaire**.

Doses. — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

Prix : 17 fr. 20 l'étui de 80 globules.

R. RABY, pharmacien

ASNIÈRES (Seine).

(Échantillons sur demande.)

(Tél. : Grésillons 03-15.)

BILIBOLDO

Forme. — Pilules glutinisées.

Composition. — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiasé biliaire, Ictères, Constipation.

Doses. — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 12 fr. 50 les 60 pilules.

(30 jours de traitement).

Laboratoires BARTHÉLEMY

1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE.

(Tél. : 1-70.)

BILICRINOL

Propriétés thérapeutiques. — Médication cholagogue et anti-anaphylactique.

Indications. — Insuffisance hépatique, Congestion du foie, Lithiase biliaire, Ictère, Cholécystite, Troubles anaphylactiques, Migraines, Dermatoses, Urticaire, Constipation par insuffisance hépatique, Troubles digestifs d'ordre hépatique, Anorexie, Vertiges, Nausées, etc...

Composition. — Peptones, bile dépigmentée et décholestérinée, sulfate de magnésie desséché.

Forme. — Granulé.

Posologie. — Le matin à jeun ou demi-heure avant les repas dans un quart ou un demi-verre d'eau.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café.

Enfants : 3 ans, 1/2 cuillerée à café.

8 ans, 1 cuillerée à café.

Prix : 18 fr. 20.

Laboratoires DEMASLES

Vienne (Isère). (Tél. : 160.)

BILIFLUINE

du D^r L. BIGNON, de Vichy.

Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères.

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal. Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures, et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

Produits « STÉNÉ »

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

BILIFLUOL

**Peptones magnésiées,
Phyothérapie hépatobiliaire.**

Composition :

Sulfate de Magnésie desséché	15
Peptone de viande purifiée	5
Extrait de boldo	0,80
Extrait d'artichaut	0,20
Citrate de soude	4
Hyposulfite de Magnésie	15
Saccharose aromatisé..... Q. S. pour	100

Indications. — Insuffisance hépatique et ses conséquences. Antiarthritique.

Présentation. — Granulé. Boîte métallique de 120 gr. environ. Durée moyenne : 15 jours. Prix : 18 fr. 75.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède.

(Se coucher 10 minutes sur le côté droit).

Laboratoires du BILIFLUOL

L. PROTS, pharmacien.

20, rue de Rivoli — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 03-07.)

BILIOGASTRINE

Médication anaphylactique.

Forme. — Granulé légèrement effervescent.

Composition. — *Citrus Vulgaris*, *Kinkelibah Raimbaultii*, *Orthosyphon Staminus*, Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

Indications. — Troubles et Dermatoses d'origine gastro-intestinale de l'Adulte et de l'Enfant, Urticaire, Intolérance gastrique du jeune âge.

Posologie. — Autant que possible, prescrire la Biliogastrique le matin à jeun et le soir vingt minutes avant le repas

Enfants : 1 à 6 ans, 1/2 cuillerée à café par jour en 2 fois.

6 à 10 ans, une 1/2 cuillerée à café matin et soir.

10 à 15 ans, 2/3 de cuillerée à café matin et soir.

Adultes : 2 à 4 par jour.

Prix : 18 fr. 50 (8 jours).

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise). (Tél. : 22.)

BILIVACCIN

1° *Antityphique.*

2° *Antidysentérique.* — 3° *Anticholérique.*

Vaccination préventive, par VOIE BUCCALE, contre la Typhoïde, les Para A et B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication. Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun trois matins de suite une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, un comprimé de vaccin.

Vaccination annuelle et revaccination en cas d'épidémie.

Prix : Dose pour adultes : 10 fr. 40.

Dose pour enfants (moins de 7 ans) : 8 fr. 30.

H. VILLETTE et Cie, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 11-23.

BILIVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes affections colibacillaires du tractus intestinal, constipation, colites, appendicites et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entérocoque-perfringens-proteus).

A prendre le matin à jeun, pendant 18 jours consécutifs, une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, 2 comprimés de vaccin. Renouveler après repos de 6 jours.

Prix : 20 fr. 80 la dose.

H. VILLETTE et Cie, Pharmaciens

Produits de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

BILLABSTINE

Simple et Laxative.

Composition. — Extraits biliaires, Ferments lactiques, Pancréatine, Extraits d'artichauts, Extrait de Coto.

Laxative : Extraits Cascara et Bourdaine, Évo-
nymine brune.

Posologie. — *Simple :* 4 comprimés par jour un peu avant les repas, midi et soir. En cas de dysenterie grave, la dose peut être augmentée, sans inconvénient, jusqu'à 10, 12 ou 14.

Laxative : 1 à 3 comprimés le soir.

Indications. — Dysenteries, Infection intestinale, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Cholécystite, Angiocholite, Entérite. *Entérites à forme dysentérique.* Constipation chronique. Atonie de l'intestin.

Laboratoires BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS.

Publicité : **Société d'Expansion Thérapeutique**
Société anonyme au capital de 20.000 francs.

Siège social : 129, rue de Turenne, PARIS (III^e).
R. C. 248.921.

BINIDIA

Suspension de **Bismutho-8-Oxyquinoléine** à 10 p. 100, rendue pénétrante par l'addition de 1 p. 1.000 d'isopropyl-naphtalène-sulfonate de soude.

Propriétés. — Antiseptique génito-urinaire local, non toxique, non caustique, très bien toléré, pénétrant et adhérent.

Indications. — Métrites, endocervicites, vulvites, vaginites d'origine bactérienne, en particulier gonococcique. Vulvo-vaginites des petites filles.

Mode d'emploi. — Le BINIDIA s'emploie pur en tamponnements, mèches et instillations.

Présentation. — Flacon à large col de 120 cc. environ, permettant le prélèvement direct au moyen de la seringue de Bonneau.

Produits R. A. L. Spécialisés

Établissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. Élysées 99-51 à 57.)

BINOXOL

Bismutho-8-oxyquinoléine.

(Produit synthétique, défini et pur.)

Propriétés. — Antiseptique gastro-intestinal dépourvu de toute toxicité et dont l'oxyquinoléine s'élimine par les voies urinaires. Inaltérable.

Indications. — Diarrhées infectieuses et parasitaires, fermentations, diarrhées infantiles. Particulièrement efficace dans le traitement des diarrhées des tuberculeux. Oxyurose.

Antisepsie urinaire : pyélonéphrites, cystites, urétrites.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cachets à 0 gr. 50 par jour avant les repas. Exceptionnellement jusqu'à 8 par jour.

Enfants : 6 mois-1 an : 1 paquet à 0 gr. 25 par jour en 2 fois ;

1 an-2 ans : 2 paquets à 0 gr. 25 par jour.

Au-dessus de 2 ans : 3 paquets à 0 gr. 25 par jour.

Présentation :

Adultes : { Tube de 12 cachets ou 15 comprimés à 0 gr. 50.
 { Boîte de 100 cachets à 0 gr. 50.....
Enfants et { Boîte de 12 paq. ou tube de 15 compr. à 0 gr. 25.
Nourrissons : { Boîte de 100 paquets à 0 gr. 25.....

Produits R. A. L. spécialisés

Établissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élysées 99-51 à 57.)

BIOCALCION

Spécifique des voies respiratoires.

Rhumes. — Bronchites. — Poumons.

Composition :

Sulfate de manganèse.....	0,060
— cuivre.....	0,213
— calcium.....	0,104
— magnésium.....	0,091
pour 1 cc. quantité en milligramme.	

Association de métaux catalyseurs ionisés sous forme d'oléate métallique parfaitement osmosable. Innocuité complète.

Formes : voie buccale : Capsules (étui de 20) et Elixir.

voie intramusculaire : ampoules de 2 et de 5 cc., boîtes de 6 et 12.

voie intrarectale : huile ; lavements de 10 cc à conserver 5 à 6 heures.

Instillations d'huile dans les plaies fistuleuses.

Indications : Maladies des voies respiratoires, tuberculose osseuse, pulmonaire, ganglionnaire, synoviale. Bronchites.

Posologie : Une Capsule ou une cuillerée à soupe d'Elixir au début des deux principaux repas pendant 10 jours — arrêt de 5 jours.

Tous les 3 jours, une injection intrarectale de 10 cc. ou une piqûre intramusculaire de 2 cc. ou de 5 cc. suivant la gravité du cas — piqûre faite *très lentement* avec aiguille de 9/10°. Piqûres et injections intrarectales *alternées* pour traitement intensif.

Il est conseillé d'alterner à la fin des 3 dizaines **BIOCALCION** avec 1 dizaine de **Rénovitase**.

Inscrit au L. N. C. M. sous le N° 1024-3.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires des HORMOMÉTALIONS

50, Avenue Jacqueminot. — MEUDON (Seine-et-Oise). (Tél. : Obs. 13-33.)

BIOCALCIUM

Composition :

Gluconate de chaux, chl. de choline, cacodylate de soude.
Il existe une forme non arsénée, exempte de cacodylate de soude.

Indications :

Chaque fois qu'il est nécessaire de :

- 1° Obtenir un relèvement rapide de l'état général ;
- 2° Stimuler les réactions de défense et les centres de production globale ;
- 3° Augmenter le taux du calcium sanguin et rétablir l'équilibre glycémie-cholestérolémie.

Notamment dans les états tuberculeux et pré-tuberculeux (parfaitement toléré même dans les tuberculoses évolutives), anémies, paludisme, les chocs traumatiques (fractures), interventions opératoires, hémorragies. Traitement préparatoire avant les opérations. Tétanie, spasmophilie déséquilibre du système neuro-végétatif.

Posologie :

Adultes : une ampoule de 5 cc. en injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours.

Enfants : 1/2 ampoule.

L'injection est indolore. Si besoin, faire tiédir l'ampoule.

Prix : Boite 6 ampoules 21 fr. 35 ; Boite 10 ampoules 31 fr. 95

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

BIOCALYPTOL

Spécifique des affections pulmonaires.

Composition.

Eucalyptol	0,14
Gaiacol	0,06
Acide phénique	0,02
Cinnamate de benzyle	0,012
Camphre	0,05
Huile d'olive	1 cc.

Forme. — Ampoules de 1 cc. et 2 cc.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires, qu'elles soient aiguës ou infectieuses, avec ou sans localisations pulmonaires : Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippe, Congestion pulmonaire, Coqueluche...

Dose. — Injections intramusculaires journalières
1/4 cc. pour des enfants de 2 mois à 1 an ; 1 cc. pour des enfants de 1 an à 5 ans ; 1 à 4 cc. selon l'âge du malade et la gravité de la maladie.

Prix : 21 fr. 85.

Laboratoire du BIOCALYPTOL

76, rue Jean-Jaurès — PARIS.

BIOCÉANE OLIVIÉRO

Eau de mer intégrale 100 p. 100 ionisée, stabilisée.

Véritable Lymphé marine. Sérum marin. Ampoules buvables et injectables de 10 cc.

Par boîte de 16 ampoules.

Action thérapeutique. — *Athrepsies, Diarrhées et vomissements* des nourrissons, Colibacillurie.

Toutes *Phosphaturies*, le pH urinaire est abaissé à 6-5 1/2.

Toutes *déchéances, Fatigues, Surmenages, Précancer.*

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour.

Adultes : 2 à 4 ampoules par jour.

Prix : 22 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoire OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE. (Tél. : Molitor 27-06.)

BIOCHOLINE

Composition. — Chlorhydrate de Choline R et C chimiquement pur
Seule préparation contrôlée aux points de vue physiologique et clinique par les auteurs.

Propriétés. — Amélioration du terrain par l'augmentation régulière et durable du taux de cholestérol sanguin. Régularisation de la glycémie. Action génératrice sur les globules sanguins et la moelle osseuse. Excitation des fonctions d'élimination et du péristaltisme intestinal.

Avantages. — Innocuité complète ; Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

Indications. — Tuberculoses externes ou viscérales, même évolutives à tous degrés et tous âges. Anémies et conséquences. Insuffisances pancréatiques.

Forme. — Ampoule 1 cc. = 0,02 cgr. Boîte de 10 ampoules (type normal); Boîtes de 25 et 50 ampoules (cures prolongées). Suppositoires (1 suppositoire = 0,02 cgr.).

Posologie. — Ampoules : 1 injection sous-cutanée tous les 2 jours d'une façon continue et sans interruption.

Suppositoires : 1 suppositoire tous les 2 jours par séries de 20 jours.

Prix : 10 ampoules : 32 francs ; 25 ampoules : 51 francs ; 50 ampoules : 98 francs ; 10 Suppositoires : 36 fr. 75,

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE,

1, avenue de Villars — PARIS.

BIOCRINA

Ampoules buvables (tubes scellés) de 5 cc.
(Méthode de Whipple).

Association d'Extrait de foie de cheval, de Plasma sanguin défibriné de cheval et de Nucléinate de fer soluble. (Procédé Alf. Daniel-Brunet et Oliviéro.)

Indications. — Anémies, Hypoglobulie, Hypohémoglobulinémie, Consommation, Atonicité, Convalescences.

Dose et mode d'emploi. — Une ampoule dans un peu d'eau : eau sucrée, — eau gazeuse, — infusion froide, — à prendre 1/4 d'heure environ avant les deux principaux repas.

Enfants : à partir de 5 ans : 1 ampoule par jour avant l'un des repas.

Adultes : 2 ampoules par jour.

Prix. La boîte de 12 ampoules : 30 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86.

BIODARCINE

Elixir.

Puissant tonique, régénérateur, accélérateur de la nutrition et stimulant des fonctions vitales.

Composition :

Teinture de ténugrec désodorisé.....	6,25
— de cacao	5
— de coca	34
— de gentiane	5
Acide phosphorique	4
Glycéro-phosphate de soude liquide 40 p. 100	2,90
Phosphate de soude.....	3,70
Teinture de noix vomique	15

Excipient liquide aromatisé et Malaga : Q. S. pour 1000 cc.

Indications. — Convalescence, surmenage, états anémiques, neurasthénie, dépressions nerveuses, suites opératoires, pré-tuberculose, tuberculose, lithiase, faiblesse etc...

Ne contient pas d'arsenic. — donc pas de risque d'hémoptyisie chez les bacillaires.

Présentation. — Flacon.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à café. — *Adolescents* : 1 cuil. à soupe.

— *Adultes* : 1 verre à liqueur avant les principaux repas.

Prix au public 20 fr 20

Enregistré au laboratoire de contrôle des Médicaments sous le n° 888-8.

Laboratoire M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité, Neurasthénie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

1° Ampoules :

Sulfate de strychnine	1 milligr.
Cacodylate de soude	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré	1 cc. 3
par ampoule.	

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

2° Gouttes concentrées (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine . .	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de soude.	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Acide phosphorique....	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

3° Elixir : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique	0 gr. 012
Sulfate de strychnine	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

BIOÉLIXIR

Reconstituant complet.

Composition. — Formule complète réalisant sous une forme euphorique (excipient = vins liquoreux de muscat) :

- 1° Une médication substitutive, Iode (iodure de fer), Phosphore (acides phosphorique et nucléinique), Arsenic (Méthylarsinate de soude), Calcium (chlorure de calcium) ;
- 2° Une médication énergétique, comprenant :
 - a. Un amer héroïque (noix vomique).
 - b. Des amers exotiques (simarouba, coca, feuilles Yerba Santa).
 - c. Un stimulant nervin aromatique (écorce de Winter).
 - d. Un amer stomachique (condurango).

Indications. — Les convalescences médicales et chirurgicales, les anémies, l'asthénie, l'amaigrissement, les déchéances organiques.

Formes :

P. M. (450 cc. environ) : 16 fr. 80.

G. M. (900 cc. environ) : 30 francs.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuillerée à bouche avant les deux repas.

Laboratoires REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS.

(Tél. : Gobellins 90-00.)

BIOENTÉRASE

Admis à l'achat par le Ministère des Colonies.

Ampoules buvables.

Non toxique. Sans contre-indication.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Poni-miferum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

Indications. — Diarrhée verte, Gastro-entérite des nourrissons, Choléra infantile, Entérites aiguës, Entérocolite dysentérique, colibacillose, eczéma, dermo-épidermite.

Propriétés. — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme, sans opiacés. Préviendrait ou fait disparaître l'athrepsie.

Doses. — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée ou en lavement dans 50 cc. d'eau bouillie.

La BIOENTÉRASE s'emploie de la naissance à deux ans à la dose quotidienne de 1 à 2 ampoules par année d'âge, suivant l'intensité des symptômes et jusqu'à leur sédation. Une ampoule tous les 2 jours évite l'athrepsie.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou de l'eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables 19 fr. 10.

— — — 3 — — — 10 fr. 40.

Littérature et Échantillons :

69, rue de Wattignies — PARIS.

BIOGASTROL

Le médicament de choix des Gastropathies rebelles.

Composition. — Bismuth - 8 - oxyquinoléine (Quinophage bismuthique), Charbon végétal sur-activé, Charbon animal purifié, Phosbiose, Silicate d'alumine léger, Hydrate de magnésie.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Intoxications, Fermentations, Ulcérations, Pyrosis, Entéro-colites, Hépatites.

Présentation :

Forme *poudre*. — Forme *comprimés*.

La grande boîte : 18 fr. — La 1/2 boîte : 12 francs.

Posologie :

Poudre : 1 cuillerée à café avant les repas et une autre après, si besoin.

Comprimés : 6 à 10 comprimés par jour avant les repas et autant après, si besoin.

Laboratoires BOYER et Cie

12, rue Pavée — PARIS (IV^e).

BIOGÉNOL

Composition. — Association Glycéro-arséniat de soude, Kola, Coca, Quinquina.

Indications. — Reconstituant général, accélérateur de la nutrition, tonique de la cellule nerveuse, stimulant de l'appétit. Anémies, Convalescences, toutes déficiences de l'organisme, Surmenage physique et intellectuel, Anorexie, Asthénie.

Formes. — Liquide, Granulé, Gouttes, Ampoules.

Posologie. — Liquide : un verre à liqueur avant les deux principaux repas.

Granulé : une cuillerée à café avant les deux principaux repas.

Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas.

Ampoules : injection sous-cutanée, une ou deux par jour.

Prix : liquide et granulé : 17 fr. 10 ; Gouttes : 14 fr. 95 ; Ampoules : 12 fr. 80 (15 jours de traitement).

Laboratoires DEMASLES

VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

BIOLACTYL

Ferments lactiques sélectionnés.

Formes :

Boîte de 10 flacons	27 fr. 05
— 6 flacons	19 fr. 75
— 2 flacons	9 fr. 35
Étui de 60 comprimés	16 fr. 65
Boîte de 6 tubes (caillage du lait)	8 fr. 30

Indications :

Usage médical : Infections et auto-intoxications gastro-intestinales.

Posologie :

Comprimés : 2 à 4 comprimés avant les repas.

Culture liquide : 1 flacon par jour en 2 fois avant les repas (dans de l'eau sucrée).

Usage chirurgical : Pansements gynécologiques, Bouillie lactique (par mélange de poudre de lactose et biolactyl) pour pansements des périnées, Plaies infectées, Affections nasales et laryngées.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

BIOLIPASE « ROCHE »

Composition. — Extrait fermentaire lipolytique de foie de porc.

Indications thérapeutiques. — Cirrhoses avec ascite et œdèmes, ictères aigus ou prolongés par hépatite, états post-opératoires chez les sujets atteints d'insuffisance hépatique.

Contre-indications. — Cirrhoses avec ictère grave, ictères rétentionnels néoplasiques ou calculeux.

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule de 5 cc. par jour (10 Unités Butyrase par cc.) par voie sous-cutanée ou intramusculaire pendant 6 jours. Deux jours de repos. Nouvelle série de 6 ampoules.

Selon gravité des cas : 3 à 6 séries.

Les injections de Biolipase « Roche » n'ont aucune action nocive sur les principaux appareils et sont toujours très bien supportées par les malades.

Recommandations très importantes. — Pendant la cure, faire observer au malade un repos absolu au lit, le soumettre à une alimentation lacto-végétarienne peu salée et n'appliquer aucun autre traitement. Ne pas faire d'injections de Biolipase « Roche » dans les 15 jours qui suivent une injection diurétique à base d'un dérivé mercuriel. Le traitement serait inefficace.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-76.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

BIOMUCINE

Composition. — Mucine pure, neutre et stérile, obtenue à partir des muqueuses d'estomac et adaptée à la thérapeutique des affections gastriques.

Propriétés. — Protecteur naturel de la muqueuse stomacale contre les irritations des particules alimentaires et contre toute attaque chlorhydropeptique ; Anti-acide idéal assurant l'intégrité et le bon fonctionnement de l'estomac.

Avantages. — La BIOMUCINE est supérieure : *a.* aux alcalins qui saturent toute l'acidité, la mucine ne fixe que les acides en excès ; *b.* aux poudres absorbantes : la mucine se laisse pénétrer par la pepsine, elle ne constipe pas ; *c.* aux mucilages ; la mucine est indigestible.

Indications. — Hyperacidité et toutes affections douloureuses qui en découlent. Ulcères gastriques et duodénaux. Ulcères peptiques post-opératoires.

Posologie. — 1° Hyperacidité : 2 cachets avant les 2 principaux repas ; 2° Ulcères : 2 cachets, 10 minutes avant toute prise de nourriture, la poudre délayée dans un 1/2 verre d'eau froide.

Prix : 33 francs la boîte de 36 cachets ; 77 francs la boîte de 100 cachets.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars, — PARIS.

BIO-ORGANIC

Granulés.

Reconstituant-type des enfants et des adultes délicats.

A la fois reconstituant général par une médication phospho-calciqne énergique et protection pulmonaire par le tétragaïacolate de calcium.

Formule :

Tétragaïacolate de calcium.....	0 gr. 10
Inosito-héxaphosphate de calcium et de magnésium	1 gr.
Gluconate de calcium	4 gr.

Pour 100 gr.

Indications. — Troubles de la croissance, Déminéralisation, Faiblesse de constitution, Affections broncho-pulmonaires, Adénopathie, Lymphatisme, Convalescences.

Mode d'emploi :

Nourrissons et jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 cuillerée à dessert avant les 2 repas.

Adolescents ou adultes délicats : 1 cuillerée à bouche avant les 2 repas.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires P. REYGAQNE

160, avenue d'Italie — PARIS. — (Tél. : Gobelins 90-00.)

BIOPHÈNE

Composition. — Chlorophylle, Carotène, Extrait de foie concentré et stabilisé, Extrait de rate concentré et stabilisé, Rumex crispus, Prêle, Carragaheen, Gluconates chaux, Ammonium, Magnésie, Manganèse, Plasma marin synthétique.

Indications. — Décalcification en général, tuberculose sous toutes ses formes, déséquilibre du système nerveux végétatif, Anaphylaxie, Hyperacidité gastrique, tous les états anémiques, Chlorose, surmenage, Insomnie.

Mode d'emploi. — Un cachet au milieu des 3 repas.

La boîte : 16 fr. 65.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

BIOPHÉNYL ROSSO

Deux formes : Simple et Iodé, Solution Hypertonique de Phényl-Cinchoninique-Barbiturique, Magnésienne.

Chimiothérapie antirhumatismale et cholagogue par injections intraveineuses et intramusculaires. Antiphlogistique, Analgésique, Sédatif pour le traitement de toutes les affections rhumatismales, douloureuses, toutes manifestations uricémiques et affections biliaires, hépatiques.

Posologie. — *Traitement d'entretien.* — Une ampoule de 10 cc. tous les jours en injections intramusculaires ou intraveineuses.

Traitement d'attaque. — De 1 à 2 ampoules tous les jours en injections intramusculaires ou intraveineuses.

L'injection peut être pratiquée au siège même de la douleur, en profond muscle, au contact du plan osseux sous-jacent ou des lames vertébrales.

L'injection peut être périnerveuse, paravertébrale et épidurale.

Présentation et prix. — Biophényl Rosso, Biophényl Rosso Iodé. En boîtes de 6 ampoules de 10 cc. : 31 fr. 80.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd.

PRODUITS BIOCHIMIQUES ROSSO

THURET, Pharmacien,

63, rue de Charonne — PARIS.

BIOPHORINE GIRARD

Granulé.

Extrait total de kola contenant la caféine, la théobromine et les principes actifs de la noix fraîche ; Glycérophosphate de chaux assimilable, Extrait de quinquina.

Propriétés thérapeutiques :

Régulateur cardiaque, reminéralisant, apéritif, tonique, nerveux et musculaire.

Indications :

Asthénies, Adynamie cardiaque, Anémie cérébrale, Dépression nerveuse, Grippe, Toutes convalescences, Surmenage physique et intellectuel.

Dose et mode d'emploi :

3 à 4 cuillerées à café par jour, aux repas, pur ou dans un liquide quelconque. *Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 14 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire national n° 405-1.

BIOPHYTOL

Composition :

Elixir :

Extrait hématique total.....	10 cc.
Méthylarsinate de sodium.....	0 gr. 03
Nucléinate de manganèse.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude cristal.....	0 gr. 25
Extrait de cola fraîche.....	0 gr. 75
Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères.....	Q. S. P. 15 cc.

Indications. — Anémie, Asthénie, Surmenage, Convalescences, Ralentissements de la nutrition, Amaigrissement, Tuberculose, Troubles de la Croissance, Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Paludisme, Diabète.

Présentation et prix. — 18 fr. le flacon de 187 cc.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe au début des deux principaux repas. — *Enfants* : de 4 à 12 ans: 1 ou 2 cuillerées à café, au début des deux principaux repas.

Laboratoires R. BOUYSSOU

à CHAMBOIS (Orne).

BIOPLASTINE

Inscrite aux Assurances sociales.

Composition. — Association lécithine-éthers du cholestérol.

Propriétés. — Régularise le métabolisme cellulaire et le renouvellement azoté. Augmente le phosphate des tissus et provoque une augmentation de poids.

La BIOPLASTINE est entièrement assimilable.

Indications. — Tuberculose. Toutes les formes d'épuisement : croissance, rachitisme, lymphatisme, anémies, chlorose. Neurasthénie. Sénilité. Diabète. Autres maladies graves.

Posologie. — 1 injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours. Il existe également un type spécialement préparé pour injection intraveineuse. 25 injections suffisent pour un traitement. Ces injections sont indolores.

Présentation. — *Type intramusculaire* : en boîtes de 6 ampoules de 5 cc. ; en boîtes de 10 ampoules de 1 cc. 5.

Type intraveineux : en boîtes de 4 ampoules de 10 cc. ; en boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e). (Tél. : Dor. 56-71.)

Fournisseur des Hôpitaux et des Grands Réseaux de Chemins de fer.

BIORÉGINE

**Combinaison iodotannique phosphatée
éminemment active.**

Composition. — Iodotannique phosphaté à base de noyer, ratanhia, phosphate de soude.

Forme. — Élixir citronné au goût très savoureux.

Particularité. — Pas d'astringence, pas d'arrière-goût d'iode. Tolérance parfaite été comme hiver.

Indications. — Anorexie, convalescences. Lymphatisme, troubles de la croissance. Surmenage physique et intellectuel des scolaires en particulier.

Posologie. — *Adultes et adolescents* : une cuillerée à soupe.

Enfants : une cuillerée à dessert à 10 ans ; une cuillerée à café à 5 ans, avant les repas.

Prix : 20 francs le grand flacon. Traitement de un mois.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle et au A. S.

Échantillons **Laboratoire CHAMBRON**
PORTES (Drôme).

BIOSÉRUM DE BROWN

Sérum reconstituant injectable.

Présentation. — Par boîtes de 10 ampoules de 5 cc.

Principes actifs. — Cacodylate de soude, Arrhénal, Glycérophosphate de soude, Nucléinate de soude, Sulfate de strychnine, Sérum physiologique glucosé.

Indications. — Anémies de toutes origines, Anémies de croissance, Anémies graves idiopathiques ou consécutives aux infections, en particulier chez les paludéens, les convalescents de fièvres graves, typhoïdes, typhiques, Mélitococcie, les Asthénies de causes diverses, Chlorose, Surmenage.

Mode d'emploi. — Les ampoules de 5 cc. peuvent être employées : a. par la bouche ; b. en injections sous-cutanées ; c. en injections intraveineuses, à la dose de 1 ampoule par jour chez les adultes.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél.: Turbigo 40-83.)

BIOSODINE

Composition. — Citrates alcalins naissants, phosphate de soude, bicarbonate de soude, sulfate de soude.

Indications. — Affections digestives, arthritisme, céphalées.

Présentation. — Granulé eupeptique, *effervescent*.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun, et avant les deux principaux repas.

Prix : 10 fr. 70 le flacon pour un traitement d'une semaine.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

BIOSULFOL DUCATTE

Nouveau laxatif scientifique (à base de soufre).

Une forme : Dragées de 0 gr. 40.

Indications. — Contre la constipation, les affections du foie et de l'intestin et leurs complications sur la peau.

Le *Biosulfol* a été réalisé par l'union des extraits biliaires et du soufre. C'est un laxatif à la fois doux et antiseptique.

Par ses extraits biliaires, le *Biosulfol* produit au même titre que la bile normale les mouvements péristaltiques de l'intestin. Par le soufre qu'il contient, le *Biosulfol* réalise l'antisepsie intestinale.

Posologie et Mode d'emploi. — 1 à 4 dragées par jour.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré, Paris.

BIO-TITANE « PRIMA »

Poudre médicale pour les soins de l'épiderme du bébé et des adultes.

Composition. — Oxyde de Titane, Ferments lactiques, Stéarate de zinc, Acide borique, Silicate de magnésie.

Indications. — Irritations et rougeurs des bébés, Démangeaisons, Varicelle, Impétigo, Urticaires, Erythèmes fessiers, Escarres des vieillards, Eczéma.

Forme. — Boîte saupoudreuse.

Enregistrée au L. N. C. M. n° 1 229-2.

Prix de vente au public : 8 francs.

Dépôt général :

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

BIOTONE

(Ampoules buvables vitaminées)

Composition. — Acide orthophosphorique, inositolphosphate de calcium et de magnésium, phosphate de manganèse, noix de Kola fraîche stabilisée, foie frais adrénaliné, acide ascorbique (Vitamine C), en milieu glycéринé aromatisé.

Mode d'action. — Reconstituant général agréable au goût et extrêmement actif, présenté en coffret de 10 ampoules stériles. — Immédiatement tonique et euphoriant par sa noix de Kola fraîche stabilisée, enrichie en Vitamine C, anti-hémorragique.

Reminéralisant par ses phosphates calciques, magnésiens et manganéux, d'assimilation rapide et complète, régénérateur du système nerveux par sa haute teneur en acide orthophosphorique. Stimulant de la cellule hépatique et de la fonction anti toxique du foie, par l'extrait de foie frais adrénaliné.

Indications thérapeutiques. — Fortifiant des systèmes nerveux, musculaire et osseux :

Surmenage physique et intellectuel.

Anémies et asthénies passagères ou persistantes.

Convalescences. Suites de maladies infectieuses.

Neurasthénie. Inappétance. Amaigrissement.

Grossesse. Allaitement et toutes déminéralisations.

Doses et mode d'emploi : *Adultes et enfants au-dessus de 12 ans :*
Une ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à la fin de chacun des deux principaux repas.

Enfants de moins de 12 ans : demi-dose.

Cure normale. — Deux coffrets séparés par un repos de quatre jours.

Prix : Le coffret de 10 ampoules de 10 cc. : 31 fr. 20

Laboratoire de Pharmacologie appliquée
Rue Frédéric-Chevillon — ALLAUCH (B.-du-R.).

BIOTRIGON

Composition :

Élixir formule A. — Extrait fluide de fenugrec désodorisé, Arrhéнал, Manganèse.

Élixir formule C. — Extrait fluide de fenugrec désodorisé. Chlorure de Calcium.

Dragées. — Extrait sec de fenugrec. Phosphate de chaux. Extraits opothérapiques fixateurs.

Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

INDICATIONS

Élixir formule A. — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

Élixir formule C. — Mêmes indications et maladies présentant des lésions pulmonaires évolutives.

Dragées. — Mêmes indications.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à soupe au moment des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café au moment des repas.

BIOTRIGON HÉPATIQUE (Voir CARBOTRIGON)

Laboratoire Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS

(Tél. : Ségur 79-58.)

BIOXYOL

du D^r P. Bourggraff.

Composition. — Anhydride titanique. — Diatomées stérilisées calibrées. — Peroxyde de zinc (titré 50). — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

Propriétés. — La pâte *Bioxyol* a une action très active sur les trois stades de la cicatrisation. Stimule la poussée vasculaire, active la poussée fibreuse, accélère et régularise l'épidermisation. Les cicatrices ainsi obtenues sont souples, non adhérentes aux plans profonds, à peine perceptibles.

Indications. — Plaies de toutes natures, post-opératoires, atones, pertes de substances, ulcères phagédéniques, ulcères variqueux, etc., brûlures, radiodermes, chirurgie esthétique, varicelle.

Mode d'emploi. — S'en référer à l'opuscule édité par le Laboratoire du Praticien qui le tient à la disposition des médecins.

Présentation. — Pâte blanche en pot :

Grand modèle	32 fr. »
Petit modèle	18 fr. 10

Le *Bioxyol* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)

BIPHÉDRINE

Vaso-Constricteurs + Antiseptiques

Biphédrine aqueuse : Ephédrine chlor. 1 %, Sol. au millième d'adrénaline 4 %, Novocaïne, Chlorétone.

États aigus : Coryzas, Rhinites, Rhumes de cerveau, Rhumes des foins, Sinusites, Asthme.

Biphédrine huileuse : Ephédrine base 0,50 %, Camphre, Eucalyptol, Essences terpéniques.

États subaigus et chroniques : Rhumes, Coryzas, Rhinopharyngites, Injections trachéales, Désinfection post-opératoire.

Mode d'emploi. — Instillations ou mieux pulvérisations.

Particularité. — Un procédé spécial nous permet d'obtenir de l'éphédrine absolument pure, dénuée de propriétés irritantes, à action lente et prolongée. Notre huile végétale, rigoureusement neutre et stérile, ne rancit pas et ne laisse dans la gorge aucun goût âcre ou désagréable.

Prix : le flacon de 24 cc. : 15 fr. 60.

Laboratoires E. BOUCHARA
47, rue de Bretagne — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 94-65.)

BIS-HYD

Bismuth-Hydrargyre.

Ampoules de 2 et 3 cc. dosées à 0,024 de Bi-métal par centimètre cube. Suspension huileuse d'éléments *chimiques* : Iodo-bismuthate de quinine ; traces de Hg et Cu (Catalyseurs) et d'éléments *biologiques* : Lipoïdes cérébraux et testiculaires. BIS-HYD réalise pour la première fois une *thérapeutique antisypilitique complète*.

Il accroît par catalyse les forces défensives de l'organisme contre la spirochétose. » (J. Schumacher.)

BIS-HYD exerce dans la Syphilis et la spirochétose en général une double action :

1° *Spécifique* vis-à-vis du spirochète par l'ensemble de ses composants chimiques ;

2° *Non spécifique* mais immunisante de l'organisme par ses composants biologiques : lipoïdes cérébraux et testiculaires.

Posologie. — Traitement d'attaque : 2 à 3 ampoules de 2 cc. par semaine.

Traitement d'entretien : 1 à 2 ampoules de 2 cc. par semaine.

Les injections indolores seront intramusculaires profondes (point fessier).

Prix :

6 amp. : 2 cc. 20 fr. 80 ; 12 amp, 2cc. : 37 fr. 45 ; 6 amp. 3 cc. : 22 fr. 90.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine) (Tél. : Mai. 17-77.)

BIS-KA-MA

POUDRE MICELLAIRE

Composition. — Bismuth (carbonate), Kaolin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, édulcorant vanillé.

Action. — Réalise le pansement par « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

Indications. — Acidité pré ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux trois repas au moment des malaises ou des douleurs

Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun dans un verre d'eau.

Le flacon. Prix : 22 fr. 90.

La boîte triple dose. Prix : 49 fr. 95.

DRAGÉE

Composition et Indications. — Les mêmes que BIS-KA-MA poudre. Les Dragées sont préparées spécialement pour les malades ambulatoires.

Sucer lentement 1 à 4 dragées au moment des douleurs.

Prix :

L'étui aluminium pour la poche : 15 fr. 60

Le flacon réserve de 4 doses : 41 fr. 60

SUPPOSITOIRE

Composition. — Oxyquinoléine, Hydrargyri-hydroxidibromofluorescéine, Oxyde de Bismuth, Ephédrine, Jusquiame, Ciguë, Hédobutyl, Hypalène, Mucilage de Guimauve, Kaolin colloïdal.

Indications. — Hémorroïdes, Fissures anales, Ulcérations, Spincté-ralgies.

Au-dessus de 12 ans : 1 suppositoire après l'évacuation des selles et 1 suppositoire le soir au coucher.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 suppositoire.

Prix :

La boîte de 6 suppositoires : 15 fr. 60.

La boîte de 18 suppositoires : 33 fr. 30.

PANSEMENT RECTO-COLIQUE

Granulé à émulsionner dans l'eau pour lavement.

Composition. — Oxyquinoléine, Sous-Gallate de Bismuth, Ciguë, Mucilage de Guimauve, Hypalène, Kaolin colloïdal, Oxyde de Zinc.

Indications — Colites, Rectites, Sigmoidites, Séquelles de dysenteries, Infections génito-urinaires, Salpingites.

Au-dessus de 12 ans : A) Lésions sphinctériennes ou génito-urinaires : 1 mesure de granulé dans 5 cuill. à soupe d'eau tiède.

B) Lésions des côlons sigmoïde et iliaque : 2 mesures dans 10 cuill. à soupe d'eau tiède.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 ou 1/4 de dose.

Prix :

La boîte : 20 fr. 80.

La boîte triple dose : 45 fr. 80.

Société Industrielle de Thérapeutique scientifique appliquée

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

et DURET et RÉMY réunis

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

BISMHYDRAL

Composition. — Association définie et stable de chlorure mercureux léger pur et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (D^r Milian). Cholagogue doux.

Indications. — Syphilis (à toutes les périodes et sous toutes ses formes ; cure complémentaire d'entretien discrète par voie buccale, la boîte-vente ne renferme aucun prospectus et ne porte pas d'indication de maladies).

Insuffisance hépato-biliaire.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Posologie. — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Prix : 13 fr. 50.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

BISMOKAOL

Pansement gastrique.

Action. — Associe l'action cicatrisante du bismuth et du kaolin à l'action sédatrice et analgésique de la belladone et de la codéine. (Ne constipe pas.)

Indications. — Ulcères, Hyperchlorhydrie, Gastralgie, etc.

Formule :

Kaolin colloïdal	72,5
Carbonate de bismuth léger.....	5
Magnésie hydratée	12,5
Codéine	0,10
Belladone pulvérisée	0,10

Pour 100 grammes.

Posologie. — De 2 à 4 paquets par jour, avant ou après les repas, de préférence le matin à jeun.

Présentation. — Poudre en sachets de 5 grs.

Prix : 17 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).
(Tél. : Lon 04-61.)

BISMULLIUM

Non constipant.

Sous-Nitrate de Bismuth chimiquement pur et Mucyllium.

Médication de choix des affections gastro-intestinales. — Calme la douleur. Désinfecte l'intestin. Panse et cicatrise l'Ulère gastro-duodénal et les ulcérations coliques.

Antidiarrhéique à faible dose, à haute dose, traitement de la constipation.

Traitement de choix des parasitoses intestinales.

1 cuillerée à soupe de *Bismullium* contient une cuillerée à café de Sous-Nitrate de Bismuth.

Cures alternées de Bismullium et de Mucyllium contre la constipation.

Doses. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café, 3 fois par jour avant les repas dans un peu d'eau.

Enfants au-dessous de 10 ans : 1 cuillerée à café dans les mêmes conditions.

Prix. — La boîte : 25 francs.

Enregistré au Lab. de contrôle des Médicaments sous le n° 914-2.
Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires Bernard GARCIN
SAINT-SATURNIN-LEZ-AVIGNON (Vaucluse).

Eugène GRAS

Pharmacien de 1^{re} classe. Ex-interne des hôpitaux.

BISMUSODINE

Granulée.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

0 gr. 50 carbonate de bismuth.

0 gr. 50 citrate de soude état naissant.

1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

Indications. — Gastropathies. — Hyperacidité.
— Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. —
Antisepsie intestinale.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même croquées telles, suivant indications du médecin.

Prix : 17 fr. le flacon d'environ 25 cuill. à café.

Laborat. S. A. R. L. au capital de 100 000 fr.

C. CHAMARD et **R. NIEL**

Ex-Inspect^r des pharmacies. Docteur en pharmacie.

3, rue Royet — LYON-CALUIRE.

(Tél. : Burdeau 23-31.)

BISMUTH ADRIAN

Composition. — Complexe bismuthique riche en oxyde de bismuth hydraté, sans excipient ni produit étranger.

Propriétés. — Pansement gastrique. Saturant de l'acidité gastrique. Antiseptique et cicatrisant gastro-intestinal. Parasiticide intestinal. Antiseptique dermatologique. Utilisable pour le radio-diagnostic.

Indications. — Hyperchlorhydrie, aérophagie, entérites aiguës et chroniques, gastralgies, infection intestinale, ulcères de l'estomac et du duodénum, cancers gastriques et intestinaux, parasitose intestinale (ascaris, nématodes, oxyures), antisepsie des ulcères et plaies en dermatologie, irritations cutanées.

Indication particulière : examens radioscopiques.

Présentation. — Poudre.

Posologie et mode d'emploi :

1° A l'intérieur : délayer la poudre dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Adultes : 5 à 20 gr. par jour.

Enfants : 0 gr. 50 à 5 gr. suivant l'âge.

2° Parasitose intestinale :

Adultes : 10 à 15 gr. par jour.

Enfants : 0 gr. 50 à 5 gr. par jour.

Cure de 7 jours, faire suivre d'une légère purgation au calomel.

3° A l'extérieur (dermatologie).

Poudre, pommade ou glycérolé à 5 % en applications locales.

Prix :

Boîte de 50 gr. : 19 fr. 15.

Boîte de 100 gr. : 31 fr. 95.

Boîte de 200 gr. (pour examens radioscopiques) : 57 fr. 50.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

BISMUTH B-3

Composition. — Suspension homogène de sels de Bismuth (carbonate, sous-nitrate et salicylate) dans un mucilage. Une cuillerée à soupe renferme 1 gr. de sels de Bismuth.

Indications. — Toutes les affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin, *ulcère*, colites, etc...

Parasitoses intestinales (oxyures), Rectites (en petit lavement à garder).

Posologie. — 1° Affections gastriques 1 à 3 cuillerées à soupe avant les repas.

2° Affections intestinales, 1 à 3 cuillerées à soupe à jeun ou une heure avant les repas.

3° Rectocolites, 2 à 5 cuillerées à soupe en lavement à garder toute la nuit.

Présentation et prix. — Crème aromatisée.

En flacon de 300 cc. : 22 fr. 90.

En flacon d'un litre : 52 francs.

BISMUTH B-3 poudre

Pour faciliter certains malades, nous présentons, sous la dénomination **Bismuth B-3 Poudre**, notre produit à l'état sec.

Une cuillerée à soupe de cette poudre correspond sensiblement à deux cuillerées à soupe de **Bismuth B-3 Crème** et représente la dose habituelle. On prendra donc en poudre la moitié des doses prescrites pour la forme crème.

Pour obtenir la **crème de Bismuth B-3**, ajouter à une cuillerée de poudre deux cuillerées d'eau. Bien délayer en tournant. Attendre quelques instants le développement du mucilage qui donnera la consistance voulue. On obtiendra ainsi une crème comparable au produit tout préparé sans atteindre cependant à la parfaite homogénéité que le brassage mécanique peut seul donner.

Sauf spécification expresse, **Bismuth B-3 Poudre**, la forme habituelle sera toujours délivrée.

Prix : la boîte 22 fr. 90.

Laboratoires L. BORNET

Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences.

5, boulevard des Brotteaux — LYON.

CRÈME DE BISMUTH

du D^r QUESNEVILLE

Préparation créée en 1856 et toujours préconisée depuis plus de 80 ans dans toutes les indications du Bismuth en thérapeutique gastro-intestinale.

Action favorable et innocuité confirmées par la plus longue expérimentation.

Composition. — *Hydrate de bismuth neutre obtenu à l'état de précipité gélatineux* par le procédé du D^r Quesneville et conservé en suspension dans de l'eau. Sans mélange avec aucune matière étrangère.

Indications. — Traitement de tous états inflammatoires et affections lésionnelles du tractus digestif. Thérapeutique symptomatique des troubles fonctionnels (douleurs gastriques, pyrosis, spasmes, diarrhées, etc.).

Doses. — 1 à 5 cuillères-mesures (1 à 5 fois par jour) dans de l'eau ou du lait fournissant un lait de bismuth sans odeur ni saveur, facilement accepté.

Prix : 24 fr. avec cuillère-mesure en os (100 doses).

Crème de BISMUTH CHLORO-MAGNÉSIEENNE

du D^r QUESNEVILLE

Nouvelle dénomination : **MABISCAL.**

Composition. — Crème du D^r Quesneville additionnée de chlorure de magnésium et de phosph. bicalcique.

Indications. — Éléments associant des propriétés cytophylactiques et une action topique, particulièrement favorables au traitement des séquelles de gastrite, entérite, colites chroniques et de toutes affections ulcératives.

Cure de la Colibacillose : médication auxiliaire cicatrisant les lésions intestinales déterminant la voie d'invasion colibacillaire.

Doses. — 1 cuillerée à café dans un verre à madère d'eau ou de lait, 1 ou 2 fois par jour un peu avant de manger.

Prix : le flacon pour 10 jours : 18 francs.

Laboratoire QUESNEVILLE

L. COLLESSON, Pharmacien, licencié ès sciences,
5, rue d'Angoulême — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 18-08.)

BISMUTH DESLEAUX

Pansement Gastro-Intestinal Idéal.

Au carbonate de bismuth amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastro-intestinal de choix à teneur en bismuth élevée, assurant un tapissage intégral, homogène et uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice cicatrisante et anti-infectieuse. Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate.

Indications. — Ulcus, ulcérations gastriques et duodénales, hyperchlorhydrie, gastrites, ulcère peptique, entéro-colites, colibacillose aérophagie, suites d'opérations gastriques, oxyurose.

Présentation. — Poudre impalpable de goût agréable. Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond à environ 6 gr. de produit.

Posologie. — *Pansement gastro-intestinal* : 12 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit 1 à 3 mesures 3 fois par jour, prises à jeun, matin, midi et soir, une 1/2 heure avant les repas, dans un 1/2 verre d'eau.

Aérophagie : 6 à 12 grs. (1 à 2 mesures) par jour à jeun.

Colibacillose : 30 à 40 gr. par jour à jeun par cures de 7 jours.

Oxyures : Adultes, 30 gr. (5 mesures), enfants, 20 gr. (3 mesures) ; petits 10 gr. (2 mesures), par jour le matin à jeun. 2 à 3 cures de 7 jours espacées de 7 jours de repos, suivies d'une légère purgation.

Prix : 25 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Elysées 17-46.)

BISMUTHION

Description. — Le Bismuthion est un complexe colloïdal isotonique de Bismuth et or dans l'eau distillée, obtenu par procédé électrique et destiné au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

Action thérapeutique. — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

Indications. — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement, syphilis nerveuses, tabès, hérédosyphilis.

Prix : 34 fr. 30 pour 6 à 18 jours de traitement. A. S. G.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal à grains fins.

Ampoules.

De 2 cc. titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Stériles.

Solution aqueuse.

Indications.

Spirillicide. Coqueluche.

Syphilis. Angines aiguës.

Toutes maladies à protozoaires.

Mode d'emploi. — Une ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

Prix : 26 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

BISMUTH TULASNE

Composition :

Sous-nitrate de bismuth polybasique 65 grammes
Kaolin lavé et gomme blanche..... 35 —

Propriétés. — Pureté chimique contrôlée, degré d'acidité bien au point et constant garantissant une innocuité absolue même aux plus hautes doses. Action sédative, cicatrisante et antiseptique puissante et rapide. Forme avec l'eau un mélange homogène, facile à boire, adhérent fortement à la muqueuse et insoluble dans les sucs digestifs. Supérieur au carbonate de bismuth et aux sous-nitrates dits « légers » Action laxative à fortes doses (15 à 20 gr.), constipante à faibles doses (5 gr.).

Présentation. — Sachets de 10 grammes :

Boîtes de 10 sachets 25 fr.
— 30 sachets..... 63 —

Remboursé par les Assurances sociales. Contrôle n° 91-1.

Indications et Posologie (Chaque prise dans 2/3 de verre d'eau environ).

Estomac : Ulcères, Gastrites : 1 à 3 sachets (10 à 30 gr.) soit en une seule fois le matin à jeun, soit en 2 ou 3 prises, au réveil et une demi-heure avant les repas.

Dyspepsies : 1 sachet (10 gr.) en se mettant à table.

Vomissements, Aérophagie : 1 sachet dans un verre d'eau en 3 ou 4 fois dans la journée.

Le produit peut se prendre également après les repas.

Intestin : Entérocrites, Troubles fonctionnels (diarrhée, constipation), Fermentations, Ballonnements, Intoxications, Troubles circulatoires, nerveux (migraines), psychiques (angoisses), d'origine intestinale.

Avec diarrhée prédominante : 1 demi-sachet (5 gr. environ) une demi-heure avant les deux repas. Avec constipation : 2 sachets (20 gr.) le matin à jeun. Si cette dose occasionne une diarrhée anormale, on la fera diviser en deux prises, un sachet avant les deux repas.

Colibacillose : 1 sachet (10 gr.) une demi-heure avant les 2 repas.

Oxygurose. Adultes : 1 sachet le matin à jeun et 1 sachet une demi-heure avant le repas du soir. *Enfants :* de 3 à 7 ans : 1 demi-sachet (5 gr. environ) ; de 7 à 12 ans : 1 sachet (10 gr.). En une seule fois le matin à jeun ou en deux prises égales dans la journée comme ci-dessus. Cures de 5 jours espacées par 6 jours de repos. Purgation entre chaque cure. Les lavements d'eau salée sont bien indiqués concurremment.

SOUS-NITRATE DE BISMUTH TULASNE

Pur

Composition. — Sous-nitrate de bismuth polybasique absolument pur

Propriétés, Indications, Posologie. — Mêmes propriétés, mêmes indications et même posologie que le *Bismuth Tulasne*.

Présentation. — Sachets de 10 grammes :

Boîtes de 10 sachets 32 fr.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marcadet 82-01.)

BISSYL

Composition. — Silicate de Bismuth chimiquement pur.

Produit obtenu synthétiquement et se décomposant sous l'action du suc gastrique en acide silicique et bismuth à l'état de division moléculaire.

Propriétés. — Réunit les propriétés de l'acide silicique et du bismuth.

Dénué de toxicité, anti-infectieux, anti-acide, cicatrisant. — Traitement gastrique et intestinal, efficace sous faibles doses. — Pas d'accoutumance, même après administration prolongée.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou chroniques du tractus gastro-intestinal : crampes, brûlures, dyspepsies hyper et hypo-acides. Leurs complications : gastralgie et gastrite, gastro-entérite, entérite, entérocolite, ulcus de l'estomac et du duodénum.

Présentation et prix. — 20 fr. la boîte de 20 cachets.

Posologie. — Un cachet avant les repas. Reprendre 1 cachet après les repas en cas de douleurs.

Laboratoire du BISSYL

117 ter, rue Ordener — PARIS (XVIII^e).

(Tél.: Mont. 23-54).

BISTOMAX

Composition. — Carbonate basique de bismuth pur, léger, de fabrication spéciale.

Propriétés. — Pansement gastro-intestinal, anti-infectieux, cicatrisant, sédatif ; d'innocuité absolue.

Indications. — Poussées évolutives des affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin : Ulcères, Colites, Colibacillose.

Présentation. — Poudre impalpable, donnant mélangée à l'eau un lait homogène de saveur agréable.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à potage (suivant les cas) prises à jeun trois fois par jour, dans de l'eau ou de la tisane, 1/2 heure au minimum avant les trois repas : matin au réveil, midi et soir.

Prix : 25 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

(Tél.: Élysées 17-46.)

BIVATOL

Formule. — Carboxéthylméthylnonoate de bismuth. Le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

Indications thérapeutiques. — Antisypilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien. Provoque la négativation rapide et la disparition de tous accidents. A utiliser chez les hérédos et les femmes enceintes.

Présentation. — Ampoules huileuses fluides :

Adultes : 12 ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 07 de bismuth métal.

Enfants : 10 ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 035 de bismuth métal. Chaque boîte constitue une cure.

Posologie :

Adultes : 12 injections de 2 cc. faites intramusculaires, à raison d'une tous les 2 jours pendant la première semaine, puis de 2 par semaine.

Enfants : 1/10 de cc. par semaine jusqu'à 3 ans ; 1/2 cc. par semaine de 3 à 5 ans ; 1 cc. par semaine, à 10 ans.

Prix. — La boîte de 12 ampoules de 2 cc. (*adultes*) : 26 fr. 50.

La boîte de 10 ampoules de 1 cc. (*enfants*) : 21 francs.

Remboursement aux Assurés Sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

BLAGNY

Dans toutes les *toux* de toutes origines, s'administre facilement grâce à ses trois formes :

Gouttes, Dragées, Sirop.

Sa formule. — *Éthylmorphine, Codéine, Bromoforme, Éphédrine, Drosera, Aconit, Eau de Laurier-Cerise.*

Mode d'emploi. — *Adultes* : L gouttes = 1 cc., correspondant à 2 dragées et à 1 cuillerée de sirop, 4 à 5 fois par jour.

Enfants : de X à XXX gouttes suivant l'âge, 4 à 5 fois par jour. — 1 à 2 dragées par jour à partir de 10 ans.

Laboratoire du VITARSENIC

René PAMÉLA, Pharmacien

85, rue Turbigo — PARIS (III°).

Tél. : Archives 12-39.

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites); désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée, et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^e mois : 1 *gramme par biberon et par mois d'âge*. Du 5^e au 6^e mois : 1 1/2 à 2 *cuillerées par biberon*. A partir du 7^e mois : 1 *cuillerée à soupe par repas*, 1 1/2 à 2 *pour les adultes*.

Prix : La boîte 365 gr. 9 fr.

Nota. — La *Blédine* peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

BLÉCAO. — Toutes les qualités de la *Blédine* se retrouvent dans le **Blécao**, déjeuner reconstituant, aliment de régime d'une digestibilité exceptionnelle. Prix : La boîte 250 gr. 6 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10 000 000 de frs
VILLEFRANCHE (Rhône).

BLENNOPIAT

Composition. — Association de : Copahu, Cubèbe, Santal, Sassafras, Térébenthine. Ancien opiat complet du Codex sous forme pilulaire, *glutinisée*.

Action thérapeutique. — Synergie balsamique efficace, absorption facile, pas de troubles gastriques ni de réaction rénale.

Indications. — Blennorragie à toutes ses périodes et toutes complications dues au gonocoque. Cystites. Urétrites.

Mode d'emploi. — 6 à 12 pilules par jour, au moment des repas.

Prix : 17 fr. 20 la boîte.

Laboratoire **ADOL**

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe
78, Cours de la Liberté — LYON.
(Tél. : Moncey 13-37.)

BLOCS « VECOR »

Complexe phytothérapique.

Forme. — Carrés fondants. Succédanés du café et du thé.

Composition. — Gui, Prêle, Aubépine, Oranger, Cassis, Anis.

Indications. — Hypertension, Palpitations, Azotémie, Sclérose, Aérophagie.

Mode d'emploi. — Solution chaude après les repas.

La boîte de 18 carrés : Prix : 22 francs.

Laboratoires **H. AMMANN**, Pharmacien
3, Impasse Adam

BOULOGNE-BILLANCOURT.

(Tél. : Molitor 01-90.)

BLÜYL

Composition. — Cyanure de Mercure, Bleu de Méthylène, Chlorhydrate de Cocaïne, Eau distillée d'Hamelis, Excipient isotonique spécial.

Sans danger, sans douleur ni contre-indication.

Préventif et curatif des états congestifs et douloureux des yeux et des paupières : Conjonctivites, Blépharites, Iritis, Kératites, Complications oculaires des maladies infectieuses, Surmenage et hygiène des yeux.

Posologie :

États aigus : III à IV gouttes 5 à 6 fois par jour.

États légers : II à III gouttes, 4 à 5 fois par jour.

Hygiène : II gouttes matin et soir.

Prix : 16 francs. Durée à l'usage : 2 mois environ.

Toutes les Pharmacies et Dépôt général :

Office Pharmaceutique (O. C. P.),

108, rue Picpus, Paris.

Laboratoire du BLÜYL.

6, avenue Mirabeau — NICE.

BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Boldine Houdé

Alcaloïdes totaux du Boldo.

Emplois thérapeutiques :

Toutes les *insuffisances hépatiques*. Cirrhoses hypertrophiques, Cholécystites chroniques, Lithiase biliaire, Congestion du foie, Ictère. Constipation chronique.

Mode d'emploi :

De 2 à 6 granules par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

BOLDOCHOL

Gouttes titrées.

Composition :

Extrait fluide de boldo	38 gr.
Extrait fluide d'artichaut	38 —
Extrait fluide de rhubarbe	11 —
Extrait fluide de combretum	11 —
Excipient. Q. S. pour	100 —

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Ictères, Lithiasé biliaire, Insuffisance hépatique, Intoxications alimentaires, Dermatoses, Migraines, Urticaire, Troubles digestifs, Maladies des pays chauds, Constipation.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : XXV à XXX gouttes.

Enfants : X à XV gouttes.

Deux fois par jour dans un peu d'eau de Vichy. Cure de trois flacons avec arrêt de dix jours entre chaque.

Prix : 17 fr. 75 le flacon de 45 grammes.

Laboratoire du BOLDOCHOL

145, avenue de Montredon.

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).

BOLDOCRINOL

Anclennement : Boldobiline Jammes

Boldo et Opothérapie biliaire.

Opothérapique utilisé en parfait état d'activité thérapeutique grâce à une date limite d'utilisation portée sur chaque boîte.

Le BOLDOCRINOL est le plus physiologique des cholérétiques. Rééducateur idéal du foie et de l'intestin, il réalise un drainage biliaire sans brutalité, évitant surtout la violente chasse biliaire des sels magnésiens et sodiques.

Constipation, Hépatisme, Infections intestinales, Coliques hépatiques, etc.

6 à 8 comprimés par jour.

La boîte de 60 comprimés : 16 fr. 65.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — Paris (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 51-85.)

BOLDOCYNA**Composition :**

Boldine.....	0,001
Extrait sec purifié de <i>Cynara scolymus</i>	0,10
Pour 1 comprimé.	

Indications :

- 1° Dans les *affections hépatiques* : l'insuffisance hépatique, les congestions du foie, les hépatites simples ou avec ictères, les cirrhoses, les coliques hépatiques et leurs complications, les cholécystites.
- 2° Dans les *manifestations digestives, rénales, cardiovasculaires, cutanées, humorales* des hépatiques.
- 3° Comme le complément naturel et indispensable des cures hydrominérales de Brides, Contrexéville, Pougues, Vals, Vichy, Vittel.
- 4° Comme préventif et curatif des affections hépatiques des pays chauds.

Posologie :

De 2 à 5 comprimés par jour au moment des repas.
Prix : 13 francs.

Laboratoires du BOLDOCYNA : A. JOURDIN
6, av. Victor-Hugo — PARIS (XIV^e) (Tél. : Passy 92-54).

BOLDO GMET

Composition. — Extrait *total liquide sans alcool ni sucre* renferme tous les principes actifs de la feuille de boldo fragrans ; correspondant à 2 grammes de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Cholagène et cholagogue. Diurétique, Stimulant antiseptique du foie et de la vésicule. Facilite l'élimination des calculs.

Indications. — Tous les troubles hépatiques. Insuffisance, Congestion, Anorexie, Constipation, Entérocologie, Neurasthénie et insomnie des hépatiques, Lithiasse biliaire, Cholécystite, Pyélonéphrite, Grossesse, Cellulite.

L'absence d'alcool rend le Boldo Gmet plus efficace que les teintures ; la présentation liquide et la présence des huiles essentielles et des matières aromatiques le font préférer aux granules de Boldine (ne contenant que l'alcaloïde de la plante) et aux teintures ou autres extraits alcoolisés.

Très employé pour les coloniaux. Prépare le foie à la cure thermale (Vichy, etc...), dont il maintient les effets.

A donner un mois avant une intervention sur le foie ou la vésicule et au cours d'un traitement opothérapique ou spécifique pour maintenir l'intégrité du foie.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau chaude au repas du soir ou à défaut le matin à jeun.

Le flacon pour 1 mois : 27 doses.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoire GMET

27, rue du Fg.-Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél.: Provence 43-10.)

BOLDOINE ÉPARVIER

Forme. — Granulé fin sucré.

Composition. — 1 cuillerée à café équivaut à 4 gr. de Boldo frais, parties active et aromatique comprises.

Action. — Cholagogue, Stimulant général, Antisep-tique intestinal favorisant l'oxydation et l'éli-mination des déchets (urée).

Indications. — Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Lithiase rénale. Ictères. Dyspepsies d'origine hépatique. Anorexie. Atonie des voies digestives. Cachexies. Vomissements acétoné-miques chez l'enfant.

Posologie. — Après chaque repas, 1 ou 2 cuillerées à café, prises en nature ou dans un peu d'eau chaude. « Très bien acceptée par l'enfant ».

Peut être prise également à jeun et avant les repas.

Échantillons et littérature :

Laboratoires ÉPARVIER

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON.

(Tél. : 150-21.)

BOLDOLACTIC LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

Ext. de feuilles d'artichaut.....	0,10
Ext. de boldo	0,05
Ext. biliaires dépigmentés	0,05
Ferments lactiques sélectionnés	0,05
Poudre de glandes intestinales.....	0,02

Pour un comprimé.

Action thérapeutique. — Spécifique des mala-dies de la cellule hépatique et des voies biliaires.

Indications. — Ictère, Cholécystite, Angiocholite, Cirrhoses, Congestion hépatique, Dyspepsie bi-liaire, urticaire et dermatoses, Constipation.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour, 3 à midi et 3 le soir avant les repas.

Prix : la boîte de 60 comprimés, 16 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35):

BOLDOLACTOL

Composition. — Association de ferments lactiques, de ferments biliaires dépigmentés et décholestérinés et de boldine (1/2 mgr. de boldine par comprimé).

Propriétés. — Empêche les fermentations intestinales, excite la sécrétion biliaire, stimule les fonctions hépatiques, laxatif.

Avantages. — Conservation indéfinie, tolérance digestive parfaite.

Indications. — Affections hépatiques, Entérites, Auto-intoxication intestinale, Diarrhées paludéennes, Constipation chronique.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour 20 jours par mois.

La boîte de 60 : 14 francs.

Laboratoires A. SALLES

R. FOSSOUL, Pharmacien.

11, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).
(Tél. : Provence 10-01.)

BOLDOLAXINE

Laxatif à base de feuilles fraîches de boldo.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes.

Avantages. — Laxatif physiologique. Action douce et certaine, assurant des selles naturelles. Dépourvu d'accoutumance.

Posologie et mode d'emploi. — Un comprimé avant le repas du soir.

Enfants : demi-comprimé.

Présentation et prix. — 13 fr. 50 le flacon pour 25 jours de traitement.

Laboratoire Émile CHARPENTIER

7, r. du Bois-de-Boulogne — PARIS (Tél. : Pas. 55-46).

BOLDOLIVE

Composition. — Huile d'Olive vierge ultra-filtrée et neutre combinée à froid avec les principes actifs lipo-solubles de Boldo.

Propriétés. — Excite la sécrétion biliaire. Draine la bile. Rééduque la fonction intestinale. Constitue un pansement de la muqueuse.

Indications. — Angio-cholécystites, cholécystatonie, lithiase biliaire, typhlo-cholécystite, syndromes entéro-hépatiques, colites, stase intestinale droite, ictères et suites d'ictères.

**Produit actif ne présentant aucune toxicité
Toujours bien toléré.**

Présentation et posologie :

1^o *En solution* : De préférence une ou deux cuillerées à soupe le matin à jeun ou 20 minutes avant chaque repas.

2^o *En capsules* : 2 capsules de 2 grammes ou 3 capsules de 1 gramme 20 minutes avant le repas de midi.

3^o *En suppositoires* (adultes ou enfants), 1 ou 2 suppositoires à quelques minutes d'intervalle le soir au coucher.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE.

ARNOUX-BERENGUIER, Pharmacien.

(Voir *Suppolive, Dermolive et Sulfolive.*)

BOLDOMUCYL

(Granulé)

Composition.

Mucilage gommeux Normucyl	45 gr.
Charbon végétal activé	10 gr.
Extrait d'artichaut	1 gr.
Extrait de boldo	1 gr.
Excipient non sucré. Q. S. pour	100 gr.

Mode d'action. — Accroît et accélère la sécrétion biliaire. Possède une action absorbante, antiseptique et antitoxique. Assure l'évacuation normale de l'intestin sans l'irriter grâce au mucilage rééducteur Normucyl. Pas d'accoutumance.

Indications. — *Constipation* en particulier chez les hépatiques (syndrome entéro-hépatique).

Intoxications intestinales. Insuffisance biliaire.

Fermentations, Aérocolie.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café au cours des deux principaux repas.

Avaler sans mâcher en s'aidant d'un peu d'eau.

Prix : 20 fr. 80 la boîte de 200 gr. de granulé (15 à 20 jours de traitement).

Laboratoires CHATRON

PLOMBIÈRES-LES-BAINS (Vosges)

et 45, rue Cambonne — PARIS (XV^e).

(Téléphone : Ségur 26-79.)

BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

Composition. — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

Posologie. — L à C gouttes par jour.

Prix : 17 fr. 20.

Traitement de l'unité vente : 20 à 25 jours.

Laboratoire VERNE

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE

Téléphone : 19-84.

BOLÉASE MONAL

Médication spécifique des maladies du foie et de l'intestin

Forme. — Globules glutinisés.

Composition. { Extrait de Boldo 0,05
 — de Bile..... 0,10
 Calomel..... 0,005

Propriétés. — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestion, cholémie, cirrhose. Affections intestinales : entérite muco-membraneuse, constipation, auto-intoxications.

Doses. — 4 à 6 globules par jour.

Le flacon de 50 globules : 14 fr. 90.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

BOLÈNE

*Désinfection des voies hépato-biliaires.
Normalisation des fonctions intestinales.*

Composition. — Sels biliaires, Poudre de muqueuse intestinale, Hexaméthylène-tétramine, Rhamnus frangula, Agar-agar.

Mode d'action. — Rééducation et désinfection de l'intestin par l'association de l'opothérapie biliaire et intestinale à l'hexaméthylène-tétramine.

Action douce et régulière. Pas d'accoutumance.

Présentation. — Comprimés dragéifiés de 0 gr. 50.

Doses et mode d'emploi. — Commencer par 2 comprimés avant le repas du soir. Augmenter ou diminuer la dose suivant les résultats obtenus. La boîte de 60 comprimés (traitement de 25 à 30 jours) : 12 fr. 50.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

BOROSODINE LUMIÈRE

*Médication calmante et antispasmodique
des Affections nerveuses de toute nature.*

Constitution. — Solution aqueuse de Tartrate boricosodique chimiquement pur dosée à 1 gr. par cc.

Propriétés. — Renferme, à poids égal, une plus forte proportion de bore actif que le Tartrate borico-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

Indications. — Agitation, insomnies, délires, hystéries, névrose, chorée et incontinence nocturne d'urine des anormaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du faciès du malade.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Administrer à doses progressives de 2 à 10 grammes par jour, mais, en raison de sa parfaite innocuité et de sa très faible toxicité, cette limite peut être, dans certains cas, notablement dépassée sans aucun inconvénient.

Demi à 2 cuillerées à café de solution en deux fois dans un demi-verre d'eau sucrée, à la fin des principaux repas.

<i>Enfants</i>	{	1 à 2 ans :	Demi à 1 cuillerée à café	}	de SIROP par jour.
		3 à 4 ans :	1 à 2 cuillerées à café		
		5 à 7 ans :	2 à 4 cuillerées à café		
		8 à 14 ans :	4 à 6 cuillerées à café		

Formuler. — *Adultes* : Flacon de Solution BOROSODINE LUMIÈRE.
Enfants : Flacon de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances cutanées ou muqueuses.

Composition et présentation. — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; 3° Huile ; 4° Ovules à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piqures, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. —

Prix : Flacon, 11 fr. 75 : tube, 10 fr. 65 Huile, 21 fr. 30 ; ovules, 19 fr. 20.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A Bruxelles : **LE MARINEL, Pharmacien**
4, avenue Orban.

BOUES RADIOACTIVES RHEMDA

L'activité permanente des Boues Rhemda est due à la présence de corps actifs tels que l'ionium, l'actinium, le polonium, l'uranium, séparés au cours de la fabrication du Radium et du Mésothorium.

De même essence que les Boues naturelles (Dax, etc.), mais 50 fois plus actives, elles conservent indéfiniment leurs propriétés.

Elles peuvent être utilisées pour les Rhumatismes divers, les Lumbagos, la Goutte, la Sciatique, les Maladies cutanées, les Ulcères variqueux et comme stimulantes sous forme de lotions, de bains, de cataplasmes ou d'emplâtres.

Mode d'emploi. — Pour un bain complet délayer de 250 à 300 grammes de Boue dans l'eau du bain. Pour les bains locaux délayer de 10 à 20 grammes par litre d'eau.

Prix au public : 2 kg. 50 fr. ; 1 kg. 38 fr. ; 1/2 kg. 23 fr.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. G. 255-068 B.

BOULES QUIES

Dormir et travailler au milieu des bruits.

Boules plastiques adoptant exactement la forme du conduit auditif, point de fusion plus élevé que la température maximum du corps. Antivibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Indications. — Accessoire précieux de la thérapeutique, permettant d'assurer le repos. Contre les bruits de la rue, de l'usine, de l'hôtel, etc...

Permettent aux aviateurs d'atténuer à volonté les bruits des moteurs ou la déflagration des mitrailleuses (long usage).

Indispensables aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans les oreilles. Echantillons sur demande :

Laboratoires « QUIES »

8, rue Auguste-Chabrières — PARIS (XV^e).

(Tél. : Lecourbe 85-68.)

BOVCARDIAC LEFRANCO

(Organozymothérapie cardiaque).

Composition. — Le *Bovcardiac* renferme par ampoule tous les ferments et principes solubles contenus dans 25 gr. de fibre musculaire de cœur de bœuf frais, concentrée à froid et dans le vide.

Propriétés. — Renforce la contractibilité du myocarde. Complète toutes les médications cardiaques.

Indications. — Asthénie cardiaque, irritabilité et instabilité, tachycardie, myocardite, asystolie, troubles cardio-pulmonaires, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Présentation et posologie. — 10 ampoules buvables de 10 cc.; 2 à 3 ampoules buvables par 24 heures dans 1/2 verre d'eau froide, naturelle ou gazeuse, pendant 10 jours.

Cures d'entretien : Même posologie, 3 fois par semaine. **Enfants :** demi-dose.

Remboursable aux ASSURANCES SOCIALES

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, av. de Metz. — ROMAINVILLE (Seine). (Tél. : Nord 19-52.)

BOVHÉPATIC LEFRANCO

Composition. — Extrait Hépatique intégral et soluble sauvegardant le principe antitoxique du Foie.

Indications. — Toutes les insuffisances de la cellule hépatique :

- a. Troubles de la fonction biliaire : Ictères, Cholécystites, Cirrhose biliaire, Cholémie.
- b. Troubles de la fonction antitoxique : Dermatoses, migraines, arthritisme, intoxications alimentaires, psychoses auto-toxiques ou hétérotoxiques, manifestations anaphylactiques.
- c. Troubles de la Crase sanguine : Hémorragies, hémogénie, hémophilie, purpura.
- d. Cirrhoses d'origine toxique ou infectieuse.
- e. Intolérances médicamenteuses. Forme sèche : Voir *Extrait Hépatique Lefrancq*.

Présentation et posologie. — 10 ampoules buvables de 10 cc. — 2 à 4 ampoules par jour avant les repas dans 1/2 verre d'eau froide naturelle ou gazeuse.

Demi-dose pour les enfants.

Remboursable aux ASSURANCES SOCIALES

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

BOVSTROL LEFRANCO

Complexe organochimique.

Auxothérapie.

Composition :

Sulfate de Strychnine	1/2 mgr.
Glycérophosphate de Na	0,25
Suc Musculaire de bœuf cru à haute concentration, glyciné et sucré	13 gr.

Propriétés. — Tonique musculaire et nervin, aliment de la cellule nerveuse, mais non excitant, reminéralisant.

Indications. — Asthénie, surmenage, convalescence, rachitisme, lymphatisme, neurasthénie, tuberculose, anémies de toutes natures, grossesse.

Présentation. — Coffret de 20 ampoules buvables de 10 cc. Boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc.

Posologie. — 2 ou 3 ampoules par jour pendant 10 jours, arrêter 10 à 20 jours entre 2 cures. Demi-dose pour les enfants.

Nota. — Diluer chaque ampoule dans un liquide froid ou tiède (eau naturelle ou gazeuse, vin de liqueur etc...)

Remboursable aux ASSURANCES SOCIALES

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

BRADYGASTRINE DUCLOY

Modérateur de la sécrétion gastrique.

Formes. — Granulé. — Comprimés.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-citrate trisodique-phosphate tricalcique-carbonate et bromure de calcium-magnésie calcinée-terre sigillée.

Propriétés thérapeutiques. — *Antinauséuses* par l'acide fumaro-protocétrarique et le citrate trisodique. *Neutralisantes* par la terre sigillée et la MgO. *Modératrices de la sécrétion* par le phosphate et le bromure de calcium. *Dépourvues d'action excitante secondaire* grâce à la faible proportion de citrate trisodique : 5%.

Indications. — Toutes hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Contre-Indications. — Aucune. Même l'hyperchlorhydrie des cardiaques.

Posologie. — Une dose : 1 cuillerée à café = 3 comprimés.

3 à 6 cuillerées à café de granulé à avaler à sec ou mieux avec une gorgée de liquide ou 9 à 18 petits comprimés à sucer lentement.

Prendre une nouvelle dose : au bout d'un quart d'heure si l'action sédative n'est pas immédiate; au moment de la réapparition des douleurs si la sédation est *passagère*.

Ces doses moyennes peuvent être augmentées sans inconvénients et très rapidement si le soulagement se fait attendre. Une fois le soulagement obtenu, diminuer progressivement les doses, mais ne pas cesser brusquement.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée en cas de besoin.

Prix : 21 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

BRILO-ENTÉRINE

La médication antidiarrhéique la plus efficace des nourrissons, enfants et adultes.

Forme. — Liquide de saveur très agréable.

Composition. — A base de Teinture de Chasmantera, Teinture de Catechu, Extractum Salicariæ, Bismuthum Carbonicum et de Naphtholum Benzoicum; exempts de toute substance toxique, dosés minutieusement, font de la Brilo-Entérine le vrai spécifique des Diarrhées vertes et de toute nature.

Indications. — Son action d'une efficacité extraordinairement remarquable est indiquée dans les Diarrhées vertes et de toute nature, Entérites aiguës et chroniques des nourrissons, enfants et adultes. C'est le plus sûr désinfectant gastro-intestinal.

Mode d'emploi :

Nourrissons et enfants : 5 cuillerées à café par jour ;

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Résultat immédiat et durable avec un seul flacon.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires de la BRILO-ENTÉRINE

M. Piette, Pharmacien de 1^{re} classe
à ETRÉAUPONT (Aisne).
(Tél. : Etréaupont 12.)


BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine).

Propriétés. — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes pharmaceutiques. — *Ampoules dosées* 0,02 cgr, 18 fr. 50. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule.  *Dose* : 2 à 8 pilules par jour, 15 francs. *Sirop* : 0,03 par cuillerée à soupe. Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 18 fr. 50 — *Gouttes* : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 18 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU


49, boulevard de Port-Royal — PARIS
(Tél. : Gobelins 23-90.)

BROMESERINE

Thérapeutique sédative de l'hyperexcitabilité sympathique.

Composition. — La Bromésérine associe les bromures alcalins (Na et Ca) à dose réduite, au salicylate d'ésérine, *spécifique de la sympathicotomie.*

Forme. — Comprimés dragéifiés rigoureusement dosés à 0 mgr 165 de salicylate d'ésérine par dragée.

Indications. — *Syndrome immédiat* : somnolence et  constriction postprandiales, érythrose, palpitations ; *Syndrome solaire* : aérophagie, aérocolie, battements aortiques, atonie intestinale ; *Hyperthyroïdisme.*

Posologie. — 2 dragées au milieu de chacun des trois repas.

Prix : 20 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

BROMIASE

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Bromure de potassium	0 gr. 30
Bromure d'ammonium	0 gr. 20
Levurine extractive	0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Prix : 34 fr. 30 pour 8 à 25 jours de traitement A. S. C.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

BROMOCARBONE

Bromure de calcium	0,12
Charbon activé	0,15
Sucre anisé	Q. S. pour une tablette.

Propriétés :

Du charbon activé : absorbe l'air dégluti et les gaz de fermentation. Fixe les toxines circulant dans le milieu digestif.

Du bromure de calcium : sédatif nervin antispasmodique.

Indications. — **AÉROPHAGIE**, dyspepsies nerveuses. Troubles intestinaux secondaires à un mauvais fonctionnement de l'estomac.

Posologie. — 3 à 6 tablettes par jour, sucées ou dissoutes dans un liquide.

Présentation. — 18 à 20 tablettes par tube.

La boîte de 3 tubes : 16 francs.

Laboratoire National de contrôle, n° 46

Laboratoire LEURQUIN

DREUX

BROMOCODÉINE CHENU

Présentée sous la forme pratique de comprimés dragéifiés kératinisés, ne se dissolvant que dans l'intestin et par suite sans action irritante sur l'estomac.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Codéine	0,01	Aconit extrait.....	0,005
Belladone	0,01	Benzoate de soude	0,05
Terpine	0,05	Bromoforme spécial	0,10

Indications thérapeutiques. — Sédatif puissant de la toux (toux sèche, toux spasmodique et grippale, toux nerveuse, toux des tuberculeux).

Toutes les affections des voies respiratoires : bronchite aiguë et chronique, trachéite, laryngite, coqueluche, asthme et emphysème.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par 24 heures. *Enfants* au-dessus de 8 ans : 2 à 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni croquer avec une gorgée d'eau ou une tasse d'infusion.

Prix de la boîte de 30 dragées : 13 fr. 50.

Laboratoire Thérapeutique du Centre,
J. CHENU, Pharmacien de 1^{re} classe,
Ancien Chef du Laboratoire de Pharmacologie,
Lauréat et diplômé d'Hygiène de la Faculté de Médecine de Lyon.
MONTFERRAND (Puy-de-Dôme). — Tél. : 15-01.

BROMO-GARNAL

Sédatif nervin, Hypnotique.

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café :

Phényl-éthyl-malonylurée sodique	0,025
Na Br. chimiquement pur	0,25
Phosphoglycérate de Na	0,10

Indications. — *Toutes névropathies* : nervosisme, insomnie, excitation psychique, anxiété, épilepsie, convulsions de l'enfance, etc...

Avantages. — *Forme liquide* : action rapide et sûre, tolérance parfaite. Elimination totale, Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucun risque de toxicomanie. *Jamais de dépression consécutive. Ni goût* (après dilution), *ni odeur*. Ne contient ni sucre ni alcool.

Mode d'emploi. — Toujours dilué : eau (sucrée ou non), infusion, lait.

Posologie. — *Adultes*, comme sédatif nervin : de 2 à 4 cuillerées à café par jour, espacées. Comme hypnotique : 2 cuillerées à café au coucher.

Demi-dose pour les *enfants* au-dessus de 6 ans. Au-dessous de cet âge, X gouttes par dose et par année d'âge. De 2 à 4 doses par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du SIÈCLE
13, rue Boïnod — PARIS (XVIII^e).

BROMOGASTRINE VERGELOT

Sédatif et antispasmodique du système nerveux de l'adulte.

Composition :

Bromure de sodium	0 gr. 50
Extrait de belladone	0 gr. 01
Phényl-éthyl-malonylurée.....	0 gr. 005

pour une cuillerée à café.

Propriétés. — Antispasmodique et sédatif de l'éréthisme nerveux. — Hypnotique et calmant des affections douloureuses. Pas de bromisme.

Indications. — Troubles gastriques, douloureux des nerveux, Sténoses pyloriques, Pré-ulcères, Ulcères, Aérophagie douloureuse, Insomnies consécutives, Vomissements incoercibles de la grossesse.

Présentation et mode d'emploi. — Granulés effervescents, n'irritant pas l'estomac.

Affections chroniques : une cuillerée à café dans de l'eau au milieu des deux grands repas.

Crises aiguës : une cuillerée à café ou deux dans une infusion de tilleul.
Ne pas l'employer chez les enfants.

Prix : 18 fr. 75 la boîte.

Laboratoires Ch. VERGELOT, Docteur en Pharmacie.

6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-18.)

Enregistré au Lab. de Contrôle sous le N° 1236-2.

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale.

Forme. — Gouttes.

Doses et mode d'emploi. — XX gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : Affections du système nerveux, Insomnie, Hystérie, Convulsions, Epilepsie, Névralgies, etc.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUQ

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

BROMOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe du Brome et d'une Albumine d'origine strictement végétale, sans aucune autre association médicamenteuse.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

Posologie. — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire national n° 218-1.

(Tél. : Gobelins 06-89.)

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome
et de Peptone trypsique.

Gouttes : XL gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : XX à L gouttes. *Enfants* : X à XX gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

Propriétés thérapeutiques. — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — **Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.**

Posologie. — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS

(Tél. : Anjou 09-83).

BROMURE DE CALCIUM

(Sirop Henry Mure, au)

Les convulsions de la première enfance, les coliques, les accidents et les douleurs de la dentition, l'agitation, l'insomnie, l'énervement.

Chez les enfants plus grands, le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium est le médicament qu'il faut donner contre les crises nerveuses, la Chorée, les toux nerveuses.

A donner aux enfants irritables, agacés, à ceux qui souffrent de névralgies, qui ont des colères sans motif et qui ne peuvent travailler sans être distraits. Rapidement leur caractère se transforme.

Ce sirop s'emploie aussi comme tonique.

Mode d'emploi. — Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium peut être administré sans danger dès la naissance jusqu'à la puberté.

La dose moyenne est de 2 à 3 cuillerées à café par année d'âge. En raison de l'innocuité du médicament et de la pureté du sel chimique qui entre dans sa préparation, cette dose peut être dépassée sans inconvénient.

Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium, d'un goût très agréable, se prend ordinairement pur. On peut aussi le donner dans du lait ou dans une infusion de tilleul.

Prix : 8 fr. 85

L. N. C. 428-4.

Laboratoires du Docteur VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

BRONCHASMINE

Nébulisations buccales.

Spécifique préventif et abortif de la crise d'asthme. Résultat immédiat garanti, pas de contre-indication.

Composition. — Extrait pur de glandes surrénales stabilisé selon technique spéciale en liquide physiologique; ne contient ni alcaloïde, ni toxique ni stupéfiant.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pulvérisations dans la gorge dès les premiers symptômes d'oppression suppriment radicalement et en quelques secondes la sensation d'étouffement.

Voir également *Garéphédrine, Diuréphédrine, Éphédrasmine.*

Prix :

Appareil avec liquide	50 fr
Flacon de rechange (pour plusieurs mois) . . .	16 fr.
Remise médicale 50 p. 100.	

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

BRONCHIAL LUNA

Composition. — Gaïacol, Iodoforme, Camphre et Huile offic. Ampoules de 1 cc. et 5 cc.

Indications. — Toutes les affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour. Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire du QUINA BOURCET

7, avenue du Doyenné — LYON
(Tél. : 25-35.)

BRONCHO-CORRECTINE

Composition. — Comprimés à base de benzoate de soude, terpine, sulfogaiacolate de potassium, marrube blanc.

Indications. — Trachéite. Bronchite. Grippe. Crises d'Asthme.

Posologie. — 3 à 5 comprimés dans les 24 heures.

Prix : 16 fr. 65.

Établissements André HATIER,
Pharmacien

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

BRONCHO FAVROT

Sirop actif, agréable.

Toux, gripes, bronchites.

Par cuillerée à soupe :

Ephédrine	0,01
Sulfogaiacolate de K.....	0,40
Teinture Aconit.....	0,15
Teinture Drosera.....	0,15
Teinture Belladone	0,10
Eau laurier-cerise.....	0,20
Sirop Thébaïque.....	6
Elixir Garus.....	3
Excipient Q. S. pour	15 cc.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 4 cuillerées à café.

Littérature et échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

BRONCHO-LACTOL

Composition. — Codéine; Teintures: Aconit et Belladone, Drosera et Grindelia; Tolu et Benjoin en nature, en suspension colloïdale, pour 100 grammes.

Propriétés. — Balsamique énergique, calmant et diurétique remarquable.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires; Bronchites aiguës et chroniques, Tuberculose pulmonaire, Coqueluche, etc...

Présentation. — Émulsion pectorale de goût agréable d'Orgeat.

Deux formes	{	a. Simple : Affections aiguës des voies respiratoires.
		b. Gaïacolé à 0,30 % ; suppuration chronique du poulmon.

Aucune intolérance.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à potage par jour.
Enfants : par cuillerée à café, suivant l'âge, pur ou pour sucrer lait ou infusion.

Laboratoire du BRONCHO-LACTOL
6, place de l'Académie — ANGERS.

BRONCHOPHILOS

Sirop pulmonaire.

Particulièrement actif dans l'état grippal.
Neutralise les crachats muco-purulents, grâce à ses peptones sélectionnées.

Composition :

Peptone, Lactophosphate de Chaux, Gaïacol, Codéine, Teinture Lobélie, Teinture Aconit, Teinture Belladone, Décoction de Tolu.

Présentation :

Flacon 210 cc. Prix : 11 fr. 40.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 10 à 15 ans, 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 4 à 10 ans, 3 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 1111-3.

Laboratoires M. BOURILLOT
6, rue Berbisey — DIJON.

BRONCHORECTINE

Suppositoires sans créosote (ni irritants ni toxiques).

Sédatifs de la Toux, Antiseptiques pulmonaires, Eupnéiques, Tonocardiaques.

	Composition :	Adulte.	Infantile
Hélénine.....		0,05	0,02
Cinnamate de Benzyle.....		0,05	0,02
Camphre.....		0,20	0,10
Eucalyptol.....		0,15	0,10
Essence de serpolet.....		0,10	0,05
Carbonate de galacal.....		0,40	0,15

Indications. — Toutes affections pulmonaires aiguës ou chroniques ; Germicide réalisant l'antisepsie des voies Respiratoires dans Grippe, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Asthme, Emphysème, Bacilloles. *En médecine infantile, évite la difficulté de la médication hypodermique.* Prophylaxie des complications pulmonaires, de la coqueluche et des maladies éruptives : Rougeole, Rubéole, Scarlatine.

Contre-indications. — Aucunes. Peut être prescrit aux enfants dès l'âge de 6 mois. Au-dessous de 6 mois, utiliser la moitié d'un suppositoire.

Posologie. — De 1 à 3 suppositoires par 24 heures (à garder).

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Prix : Adultes : 19 fr. Infantiles : 16 fr. 50.

Littérature et échantillons :

Laboratoires BONCOUR

46, rue de Saint-Mandé — SAINT-MAURICE (Seine).

BRONCHO SANYL ESTÈVE

(Adultes)

Sulfogaïacolate de K.....	0,12
Chl. d'Ethylmorphine.....	0,005
Bromoforme.....	0,02
Teinture belladone	0,04
— aconit.....	0,01
Eau de laurier-cerise	1
Sirop de diacode	5
Sirop de polygala	2
Sirop de Dessesarts. Q. S. une cuillerée à soupe de 15 cc.	

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 4 cuillerées à café par jour.

Sirop actif.

Toux rebelles, Catarrhe, asthme, emphyseme, bronchites.

Expectorant cicatrisant.

Prix au public : 16 francs.

BRONCHO SANYL ESTÈVE

(Enfants)

Eau de laurier-cerise	0,05
Benzoate de soude.....	0,03
Teinture rac. aconit	0,0035
— drosera	0,008
Sirop de diacode	0,18
Sirop de Dessesarts. Q. S. une cuillerée à café de 5 cc.	

Bébés jusqu'à 1 an : 2 cuillerées à café par jour.

1 à 3 ans : 3 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.

Prix au public : 8 francs, taxe comprise.

Sédatif, Expectorant, Rafraîchissant,

Ne constipe pas.

Laboratoire ESTÈVE,

187, rue Croix-Nivert — PARIS (15^e),
(Tél. : Lecourbe 92-16.)

BRONCHOSÉDOL

Forme. — Solution aromatisée à l'élixir de Garus.

Formule. — Chaque cuillerée à soupe contient :

Gaiacol.....	0,105
Terpine	0,26
Benzoate de Na.....	0,05
Codéine	0,0075
Acide salicylique.....	0,015
Biphosphate de Chaux	0,15

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et sédatif puissant des affections broncho-pulmonaires. Cicatrisant, récalcifiant.

Indications. — Gripes, Rhumes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhes, Tuberculose et toutes affections broncho-pulmonaires.

Mode d'emploi. — De 3 à 5 cuillerées à soupe par jour pur ou dans un peu d'infusion.

Pour les enfants : par cuillerée à café ou à dessert suivant l'âge.

Prix : 13 fr. 50. — Durée du traitement : 4 à 5 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

BRONCHOSEPTOL-LAURIAT

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration : fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

Indications cliniques. — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, toux des tuberculeux, gazés de guerre.

Composition. — Chaque comprimé renferme .

Poudre de Dower codéinée (Opium 0,01 remplacé par Codéine 0,01).....	0,10
Bromol (Tribromophénol).....	0,02
Extrait d'Aconit (titré Codex).....	0,0025
Extrait de Belladone (titré Codex).....	0,005
Terpine.....	0,05
Benzoate de soude.....	0,10
Enrobage au gluten et au baume de tolu.....	0,33

Forme et avantages. — Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin, pratiques à emporter. Dose uniforme. Volume réduit. Aucune saveur désagréable. Absence de sucre, donc recommandé aux diabétiques. Conservation indéfinie.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 4 comprimés par jour et 2 dans la nuit s'il y a lieu.

Enfants : au-dessus de 8 ans : demi-dose.

Avaler sans sucer, ni croquer.

Prix : 13 fr. 85.

Laboratoires LAURIAT

' A GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

BRONCHO-VACLYDUN

Lysats-vacols du Docteur Duohon.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat polyvalent (B. diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

Indications. — *Enfants, adultes, vieillards* : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

Posologie. — Première injection de 1/2 cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Nourrissons, enfants, adultes, mêmes doses. (Voir VACLYDUN.)

Présentation. — En boîtes de 8 ampoules de 1 cc (8 jours.)

Prix : 43 francs.

La demi-boîte : Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

BRONCOSOL

Spécifique des affections broncho-pulmonaires.

Composition. — Le Broncosol ne se présente que sous la forme de comprimés, chaque comprimé renferme : Codéine, 0 gr. 015 ; Extrait d'aconit, 0 gr. 01 ; Extrait de belladone, 0 gr. 01 ; Terpène, 0 gr. 10 ; Thiocol, 0 gr. 05 ; Ipéca pulvérisé, 0 gr. 02.

Action thérapeutique. — Hypnotique puissant, calmant nerveux, modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant parfait, régulateur des actes respiratoires.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 5 ou 6 comprimés par 24 heures.

Enfants de plus de 10 ans : 2 ou 3 comprimés par 24 heures. Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer, de préférence dans l'intervalle des repas et au moment des crises.

Prix : 13 francs la boîte de 20 comprimés.

Laboratoires CH. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 67-05.)

BRONCUROL

Dragées glutinisées.

Composition. — Chaque dragée contient :

Créosote	0 gr. 05
Gluconate de chaux.....	0 gr. 10
Terpine	0 gr. 03
Extrait de grindelia	0 gr. 02
Extrait de drosera	0 gr. 01
Extrait de lobélie	0 gr. 002

Action. — Anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante par la créosote, tonique et récalcifiante par le gluconate de chaux, antispasmodique et expectorante par drosera, grindelia, lobélie, sédative des sécrétions bronchiques par terpine.

L'enveloppe de gluten se dissolvant seulement dans l'intestin en présence du liquide pancréatique, la créosote ne se trouve pas en contact avec la muqueuse stomacale.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : toux, catarrhes, bronchites chroniques, grippe.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 dragées par jour de préférence aux repas.
Enfants au-dessus de 6 ans : 1 dragée matin et soir.

Prix du flacon : 15 francs (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Lab. 26-47.)

BRONPHELIA

Sirop éphédro - Benzothiolcolé.

Antiseptique - Cicatrisant - Calmant.

Composition. — Chlorhyd. éthylmorphine ; Chlorhyd. éphédrine ; Teinture digitale ; Teinture aconit ; Teinture belladone ; Benzoate soude ; Sulfogalactate de potasse ; jus de cassis vitaminé ; Baume de tolu.

Indications. — Trachéo-bronchite, Catarrhes, Coqueluche. Laryngite, Pharyngite, Asthme, Toux nerveuses, Coryza aigu.

Présentation. — Flacon de 250 cc. Prix : 16 fr. 60.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants de 8 à 15 ans : 3 à 4 cuillerées à dessert, par 24 heures.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

BROSÉYL

Médication antinerveuse.

Forme pharmaceutique et composition. — *Dragées* à base de *brome colloïdal* associé aux *Ethers du Bornéol* et suc *frais* de Valériane. (Flacon de 60 dragées.)

Propriétés et avantages. — Calme les douleurs *sans déprimer*, régît et discipline le système nerveux. Tonique et non toxique, le BROSÉYL n'a aucun des inconvénients et additionne tous les avantages des bromures, valérianates et albumines bromées.

Indications. — Neurasthénie, épilepsie, insomnie nerveuse, névralgies, palpitations cardiaques, asthme nerveux, troubles de la puberté et de la ménopause, etc.

Mode d'emploi. — 1° *Sédatif*, 6 dragées par jour dans le courant de la journée.

2° *Contre l'insomnie*, 4 à 6 dragées en une seule fois, avec une infusion avant de se coucher.

Dragées à avaler sans croquer.

Prescription. — Un flacon BROSÉYL FALVY.

Les Laboratoires FALVY

Licencié ès Sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 18-26.)

BRUZARINE

Farine lactée, maltée, vitaminée.

Goût exquis sans cacao.

Caractéristiques. — Aliment biologiquement complet, contenant tous les éléments nécessaires au développement normal et progressif des enfants, spécialement étudié au point de vue des vitamines de croissance et d'utilisation nutritive.

Propriétés. — Entièrement digestive et assimilable dès le Premier Age, augmente la valeur nutritive du lait. Favorise la dentition, prépare et facilite le sevrage.

Ne constipe pas. Régularise les selles.

Indications. — Aliment de choix des enfants dès l'âge de six mois, aliment de régime dans : sous-alimentation, retard de croissance, constipation. Aliment de Régime des adultes.

Suraliment des vieillards et des convalescents.

Particularités. — Par sa préparation spéciale dérivée d'un biscuitage préalable dans des fours appropriés, BRUZARINE subit, dans sa constitution, un commencement de transformation qui la rend éminemment digestible et en fait un aliment parfait.

Prescriptions. — Habituer progressivement l'enfant à une nouvelle alimentation, commencer par une cuillerée de BRUZARINE par jour, et progresser peu à peu pour arriver à la quantité indiquée sur le mode d'emploi imprimé sur la boîte.

Mode d'emploi. — BRUZARINE se prépare à l'eau, au lait frais, sec ou condensé.

En cas d'intolérance lactée, BRUZARINE se prépare à l'eau ou au bouillon de légumes.

Prix : La boîte de 375 grammes : 9 fr. 25.

Laboratoires ERLA — LATOUR, Pharmacien,
Avenue de la Gare — TERRASSON (Dordogne).

BUCHOBLEU

ANTISEPTIQUE ET SÉDATIF URINAIRE

Composition : Bleu de méthylène..... 0,05
 Bromure de camphre..... 0,03
 Extrait de Buchu..... 0,02
 Extrait de Boldo..... 0,02

Propriétés. — *Antiseptique urinaire* par excellence grâce au *bleu de méthylène*, dont l'action *antinévralgique* est complétée par les propriétés sédatives du *Bromure de camphre* et du *buchu*. Le *boldo* intervient heureusement sur le foie, dont la déficience est fréquente chez les urinaires.

Indications. — Tuberculose urinaire, Blennorrhagie, Pyélites, Cystites, Prostatites. Il est recommandé de faire alterner les cures de Buchobléu et d'Uroclarol.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour.

Boîte de 30 comprimés : 20 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1480-3.

Laboratoires de l'UROCLAROL

117, r. Victor-Hugo, HOUPLINES (Nord). (Tél. : 11.)

BUCMINE ET BUCMINE-ORTHO

Composition. — *Bucmine simple* : Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé. Benzoate de lithine. *Bucmine-ortho* : même formule + extrait d'Orthosiphon stamineus.

Formes et doses. — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0 gr. 50, 2 à 4 par jour.

Indications. — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix : 16 fr. 90

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette—PARIS. Aut. 71-98.

BUFOX

Ampoules injectables à base de venin de crapaud.

- 1° **Action toni-cardiaque** plus puissante que celle des glucosides de la digitale, qui détermine un état d'euphorie d'une influence certaine sur l'évolution de la maladie.
- 2° **Action vaso-constrictive** comparable à celle de l'adrénaline, qui relève la tension, agit sur les masses tumorales qu'elle fait régresser et sur l'adénopathie localisée ou généralisée.
- 3° **Action hypersécrétante** qui assure la reprise du fonctionnement du système endocrinien et oppose aux invasions microbiennes, quel qu'en soit le caractère morphologique, la barrière la plus efficace, celle de l'auto-défense de l'organisme.
De là, les succès du *Bufox* dans les cas les plus graves et les plus divers : cancer, tuberculose, syphilis, affections à base de streptocoques, de staphylocoques, de gonocoques, etc.
- Cette action certaine sur le foie, qui guérit les eczémas les plus résistants, est encore plus précieuse aux Colonies.
- 4° **Action hémostatique** qui a donné ses preuves dans les hémoptysies, métrorragies, hémorragies de diverses origines.
- 5° **Action analgésique** évitant l'emploi des stupéfiants, dont l'efficacité est brève et les effets si contre-indiqués.

Posologie

Le *Bufox* s'utilise en *injections intra-musculaires* à raison d'une ampoule tous les deux jours. Comme *hémostatique*, il convient d'utiliser deux ampoules (une le matin et une le soir) en injections intra-musculaires chaque jour sans interruption. En *gynécologie*, on l'emploie également par pansement local, en introduisant le contenu de 2 ou 3 ampoules de *Bufox* par une sonde de Nélaton au siège de l'hémorragie.

Les laboratoires du BUFOX

21, rue de la Grange-aux-Belles. — PARIS. (Téléphone : NORD 16-06.)

BULGARINE THÉPENIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

Formes. — Bouillon, comprimés, poudre et gouttes.

Indications thérapeutiques. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale). Dysenterie, Dermatoses, Furunculose, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra.
Poudre : Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

Modes d'emploi. — *Adultes :* Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon ou prendre 20 gouttes dans un peu d'eau sucrée, 4 fois par jour, 1/2 heure avant le repas.

Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 13 fr. 40.

Le 1/2 flacon de bouillon : 9 fr. 40.

Le flacon de gouttes : 17 fr. 10.

Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPENIER

10, rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 150-854. — (Tél. : Europe 58-97.)

BUXEMA

Pour le traitement des Affections de la peau.

Propriétés thérapeutiques. — Action calmante et cautérisante. Supprime les démangeaisons. Fait disparaître rougeurs et croûtes. Reconstitue l'épiderme. Convient à tous les cas d'irritation de la peau.

Composition. — Baume du Pérou, Goudron de Houille lavé, Oxydes de Zinc et de Titane, Menthol, Peroxyde de Zinc, Acide Orthoxybenzoïque, Essence de Thym.

Indications. — *Chez le nourrisson :* Eczéma, Rougeurs, Erythème fessier.

Chez l'enfant et l'adolescent : Dartres, Impétigo, Boutons.

Chez l'adulte : Eczémas professionnels ou accidentels. Toutes Dermatoses, y compris Ulcères.

Mode d'emploi. — Etendre une couche de BUXEMA sur la lésion et recouvrir de gaze hydrophile. Renouveler le pansement chaque jour. Enlever la pommade avec un tampon de coton imbibé d'huile d'amandes douces.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1687-I. Remboursé par les Assurances Sociales.

Prix : Le tube : 9 fr. 50.

Laboratoire du BUXEMA

J. AVRIL, Pharmacien,

18, rue Thiers — MANTES-GASSICOURT (Seine-et-Oise).

CACHETS BRONCHOSTHÉNIQUES

Composition :

Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie....	0 gr. 20
Carbonate de calcium.....	0 gr. 20
Phosphate tricalcique.....	0 gr. 20
Tanin à l'alcool.....	0 gr. 20
Carbonate de gaïacol.....	0 gr. 20

pour 1 cachet.

Propriétés. — Assainissent et tonifient les bronches. Relèvent l'état général.

Indications. — Toutes les Affections bronchiques, pulmonaires et pleurales aiguës et chroniques, en particulier : Bronchites chroniques, Pleurésies *a frigore*, Rhumes à répétition de l'enfance, Tuberculoses torpides.

Contre-indications. — Aucune. Tolérance parfaite par tous les estomacs.

Posologie. — 1 cachet au cours du repas de midi et du soir.

Présentation et prix :

La boîte de 30 cachets.....	18 fr.
La double boîte de 60 cachets.....	30 fr.
La boîte enfants (1/2 dose), 30 cachets.....	15 fr.

Laboratoires du D^r P. FOUCAUD
SAINT-GILLES-SUR-VIE (Vendée).

CACHETS DU D^r RICHOMME

Composition :

Phényl-diméthyl-pyrazolone.....	0,40
Diméthylamino-Antipyrine.....	0,10
Poudre d'ovaire.....	0,02
Carbonate de chaux précipité.....	0,10
Cascara sagrada pulvérisé.....	0,10

Pour un cachet.

Propriétés. — Régulateur des règles, sédatif utéro-ovarien.

Indications. — Dysménorrhée douloureuse, douleurs intermenstruelles.

Posologie et mode d'emploi. — A. Au moment des règles : 1 ou 2 cachets par jour dans un verre d'eau de Vichy ou une tasse de tisane.

B. En cas de douleurs intermenstruelles : 1 cachet, suivant le besoin.

Présentation et prix. — 12 fr. 50 la boîte de 6 cachets.

Laboratoires RICHOMME
29, boulevard Voltaire — PARIS
(Tél. : Roquette 42-74.)

CACHETS LEKMA

Association végétominérale agissant dans les troubles du métabolisme du soufre et dans les cas de déminéralisation avec déficience hépato-biliaire.

Composition. — Soufre colloïdal ; Calcium et magnésium assimilables ; Boldo ; Levure de bière.

Indications. — *Dermatoses Prurigineuses* : Eczémas, Acné, Prurits, Anaphylaxie, Urticairé, accidents sériques, Ulcérations infectées, Ulcères variqueux.

Posologie. — Un cachet matin, midi et soir au milieu du repas.

Prix : 18 fr. 20 la boîte de 36 cachets.

Laboratoire GUIN
à CONTRES (Loir-et-Cher).

CACHETS PACHAUT

(Cachets de santé.)

Propriétés thérapeutiques. — Laxatifs, cholagogues, ne provoquant ni coliques ni selles diarrhéiques.

Composition :

Alpha :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude	0,15

Gamma :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude	0,15
Belladone	1 centigramme.

Mode d'emploi. — De 1 à 4 cachets par jour à prendre de préférence au début du repas du soir.

Prix : 12 fr. 25.

Laboratoires PACHAUT
130, boulevard Haussmann — PARIS.
(Tél. : Laborde 16-72.)

CACHETS SPÉVIN

Cure rationnelle d'amalgrissement.

Ni iode, ni produits opothérapiques. Aucun produit chimique nocif.

Indications. — Obésités simples, Obésités avec hypertension, avec manifestations dites « arthritiques » (Migraines, Asthme, Urticaire, Rhumatisme, Goutte).

Propriétés thérapeutiques. — Antisepsie intestinale. Assure le bon fonctionnement des voies digestives et des reins, maintient la force et l'activité.

Composition. — Chlorure de magnésium, Charbon végétal pulv., Cascara sagrada, Lactose, Quassia amara, Ergostérine irradiée (Vitamine D).

Présentation. — Cachets. Plusieurs numéros :

Cachets Spévin n° 5, formule normale.

Cachets Spévin n° 1, plus forts que n° 5.

Cachets Spévin n° 10, diurétiques.

Cachets Spévin n° 4, contenant en plus un purgatif (jalap).

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : La boîte de 15 cachets : 28 fr. 85.

— La boîte de 50 cachets : 80 francs.

Laboratoires des produits L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV°).

(Tél. : Vaug. 21-10.)

CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le procédé Hélier.

Présentation et composition :

<i>Sirop</i> : Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill. à soupe) associé à un sirop iodophosphaté tannique spécial (Sirop de Lovel).....	Prix public. 16 fr.
<i>Vin</i> : 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr. de phosphoglycérate de chaux, soude et potasse.....	16 fr. 20
<i>Granules</i> : 2 cgr. de Cacodylate de soude.....	10 fr. »
<i>Ampoules</i> : 5 à 10 cgr. par cc.....	10 fr. 50
<i>Gouttes</i> : 1 cgr. par V gouttes.....	10 fr. »

Propriétés thérapeutiques. — Toujours bien toléré, permet d'administrer l'arsenic à haute dose et pendant longtemps, sans craindre les inconvénients des composés minéraux de l'arsenic. Excitant de la nutrition et modérateur nervin.

Indications. — Affections pulmonaires, anémie profonde, chlorose, scrofule, impaludisme, psoriasis, et tout état cachectique.

Posologie :

Sirop : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Vin : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Granules : 3 à 6 par jour.

Gouttes : V à XV gouttes par jour.

Ampoules : 1 par jour.

Durée moyenne d'une unité de vente :

Sirop : 5 jours. — *Vin* : 8 jours.

Granules : 25 jours. — *Gouttes* : 45 jours.

Ampoules : 10 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore.

Enfants : Cacodyline A. 10 cgs. Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B : 20 cgs. Cacodylate de soude (2 cc.).

Adultes : Cacodyline C, 30 cgs. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgs. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.). *Magnésie-Cacodyline*, Cacodylate de soude : 30 cgs. Chlorure de magnésium : 20 cgs. (3 cc.).

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

Indications. — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis.

Prix public : 26 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

CADIOR

Composition. — Complexe organo-métallique dépourvu de soufre, dans lequel l'iode, catalysé par le cadmium, ajoute sa puissante action antibacillaire à celle de l'or. Tolérance parfaite assurée par la présence de strontium et de calcium.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. (boîte de 6 pour injections intraveineuses ou intramusculaires.)

Indications. — Tuberculose sous toutes ses formes. Septicémies ; complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses ; rhumatismes chroniques ; mycoses ; convalescences traînantes, amaigrissements de causes indéterminées.

Mode d'emploi. — Une ou deux injections intraveineuses ou deux injections intramusculaires par semaine. Série de 25 à 30 injections.

(Pour technique détaillée du traitement, consulter littérature spéciale.)

Laboratoires LECLERC — S. A.

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

CAFÉINE GRANULÉE HOUDÉ

Granulé titré à 2 p. 100.

10 centigrammes de caféine pure par cuillerée à café.

Propriétés. — Tonique nervin et musculaire. Diurétique énergique (sans céphalées). Toni-cardiaque, action vaso-dilatatrice sur les artères coronaires. Eupnéique puissant.

Indications. — Efforts intellectuels et sportifs, Névralgies, Dyspnées pulmonaires, Anorexie, Convalescence. Toni-Cardiaque d'appoint. A associer aux barbituriques dans l'épilepsie.

Posologie. — 2 cuillerées à café par jour (maximum 4), matin et midi. (Pas le soir, pour éviter l'insomnie.)

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

CALCÉRIODE MARIN

Médication bio-dynamique, eau de mer, iode, calcium.

Composition. — Eau de mer suractivée en présence d'iode et de calcium organique, par un procédé spécial permettant d'obtenir un complexe véritablement « vivant ».

Médication dépourvue de toute toxicité.

Indications. — Avant tout, c'est un modificateur du terrain.

Anémies, Adénopathies. Toutes manifestations bacillaires, Insuffisances glandulaires, Bronchites chroniques, Troubles du développement, Décalcification.

Contre-indication : Hypertension.

Posologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour.

Enfants de 2 à 7 ans : 2 à 3 cuillerées à café.

Enfants de 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert.

Adultes : 2 cuillerées à soupe.

H. BOULAY, Pharmacien,

62, rue de Montreuil — PARIS. (Tél. : Diderot 33-69.)

CALCIBRONAT

Bromogalactogluconate de Calcium.

Combinaison bromo-calcique associant en un seul médicament les effets sédatifs du Br et du Ca à dose efficace. Agissant aussi bien sur le système nerveux central que sur le système nerveux organo-végétatif. Bien toléré; à dose normale, n'amène pas de bromisme, pas de troubles gastriques ou intestinaux, pas d'éruptions cutanées, pas d'action dépressive.

Indications. — Indications de la médication Bromée et Bromurée.

Formes et Posologie :

Comprimés effervescents dosés à 0,45 de Brome : 1 à 4 p. j.

Granulé dosé à 0,45 de Brome par cuillerée à soupe : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Ces doses peuvent être augmentées et au maximum doublées dans des cas particuliers.

Ampoules de 10 cc. (renfermant par ampoule 0 gr. 186 de Brome) et de 5 cc. (dose de Br. moitié moindre) : 1 ampoule de 10 cc. tous les 2 jours, 1 amp. de 5 cc. tous les jours. Voie intraveineuse ou intramusculaire.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALCIGÉNOL

Phosphate tricalcique en suspension colloïdale (avec mouvements browniens).

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 18 fr. 15 le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

CALCIGÉNOL IRRADIÉ

Phosphate tricalcique en suspension colloïdale (avec mouvements browniens)

et « Vitamine D » cristallisée.

(450 unités physiologiques par cuillerée à potage.)

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 21 fr. 35 le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis
COURBEVOIE-PARIS (Seine).

(Tél. : Défense 02-69.)

CALCILÈVE

(Carbonate de chaux Lancosme)

Présentation. — Boîte métal renfermant du Carbonate de chaux précipité à froid, de très faible densité, et de saveur très agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant de l'acidité gastro-intestinale, anti-acide et adsorbant.

Indications. — Entéro-colite acide, diarrhée de fermentations, diarrhée saisonnière et des pays chauds. Médicament de choix complémentaire du traitement spécifique des amibiases chroniques intestinales, troubles digestifs des gros mangeurs, fétidité des selles, déviations du péristaltisme intestinal, hyperkinésie gastrique, régurgitations, pyrosis.

Posologie et mode d'emploi. — *Sauf prescription spéciale du médecin* : Mettre 2 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau ou une tasse de tisane, attendre 7 à 8 minutes en agitant de temps en temps et absorber une heure avant les repas ou au moment des crises douloureuses.

Le CALCILÈVE (Carbonate de chaux Lancosme) est d'une innocuité absolue, il n'y a aucun inconvénient à doubler les doses ci-dessus indiquées.

Prix : 10 fr. 50. (Traitement de 15 jours.)

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

CALCILINE

Forme. — Comprimés, granulé.

Quatre formules : Calciline pure, adrénalinée, méthylarsinée, irradiée.

Composition :

Pure.		Irradiée.	
Ph. de chaux tri.....	0,35	Os frais épiph.....	0,05
Car. de chaux	0,07	Ergostérine	0,0005
Fl. de calcium	0,005	Lait sec irradié.....	0,10
par comp. ou mes. de granulé.		Levure de bière pulv.....	0,10
		Citron et orange.....	0,05
		par mesure de granulé.	

Formule méthylarsinée : 0,005 méthyl de soude. Formule adrénalinée : IV gouttes ad. au 1/1 000^e.

Indications. — Anémie, Lymphatisme, Maladies des os, Croissance, Convalescence, Grossesse, Carie dentaire.

Doses. — 2 comprimés ou une mesure (granulé) dans un peu d'eau avant les deux principaux repas, 20 jours par mois. Calciline irradiée : *Enfants* : 1 à 2 mesures de granulé à croquer par jour. *Adultes* : 4 mesures.

Prix : Calciline, 14 fr. 40 ; Calciline adrénalinée, 16 fr. 55 ; Calciline méthylarsinée, 15 fr. 50 ; Calciline irradiée, 19 fr. 20.

Laboratoires Gastro-Entérologiques ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 69-13.)

CALCIOCHOLINE

Composition. — Chlorhydrate de choline, Gluconate de calcium, Glycérophosphates de soude.

Indications. — *Tuberculose* dans toutes ses manifestations cliniques et sous toutes ses formes. *Prétuberculose* où la *Calciocholine* donne des résultats constants.

Présentation. — Discrète (le mot tuberculose ne figurant pas sur les conditionnements), en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Posologie. — Une ampoule intramusculaire profonde tous les jours ou tous les deux jours. Peut être faite aussi en injections intraveineuses sans avoir aucun choc à redouter et sous-cutanées (ces dernières parfois douloureuses).

Aucune contre-indication.

La boîte, prix au public : 24 fr. 50.

Laboratoires de l'ANALPYRINE
M. BERTRAND, Pharmacien
NOMEXY (Vosges).

CALCIO DYNAMYL

Le plus pur gluconate de calcium français, le mieux assimilable, en solution à 10 p. 100 de Ca.

Parfaitement toléré par voie endoveineuse et intramusculaire. Les comprimés (à croquer), très agréables au goût, remplacent avantageusement les solutions de chlorure de Ca. Aucune contre-indication.

Indications. — Amaigrissements, Asthénie, Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire et viscérale. Troubles nerveux, Tétanie, Anxiété. Hémorragies. Préparation aux interventions chirurgicales. Otospongiose, Surdit . Toutes les h morragies oculaires, en particulier les h morragies r tiniennes du vitr  et post-op ratoires, les lymph mas, les troubles et corps flottants du vitr .

Formes. — 2 et 5 cc. en boîtes de 12 ampoules. Comprim s en boîtes de 32 comprim s.

Posologie. — Une injection quotidienne ou tous les 2 ou 3 jours, 4   6 comprim s par jour comme r calcifiant, 8   16 comme antih morragique.

Laboratoires du CALCIO DYNAMYL
45, rue Lazare-Carnot — CLAMART (Seine).
(T l. : Mich. 06-41.)

CALCIONAL

Ion Calcium Stabilisé.

Deux formes :

Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.

1 comprimé = 25 cgr. de CaCl^2 naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmodies, tétanies, décalcifications, asthénies).

Doses :

Comprimés : Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants 2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

Ampoules : Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. — Adultes, 1 tous les jours.

Boîtes de 6 amp. ou de 60 compr. Prix : 17 francs.

Assurances Sociales, Classe B.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte-90 — PARIS.)

CALCIUM CORBIÈRE

Composition :

Solution de gluconate de chaux pur à 10 p. 100.

Présentation :

En ampoules de 5 cc. par boîte de 12 et 24 ampoules.

En ampoules de 10 cc. par boîte de 6 et 12 ampoules.

En ampoules de 2 cc. (infantile), boîte de 12 ampoules.

Propriétés :

Tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, Rachitisme, Rhumatismes, Fractures, Hémoptysies, Hémorragies gastriques, intestinales, rénales, Pleurésies, Ascite, Diarrhée des tuberculeux.

Associé au traitement par l'or, le Calcium Corbière atténue les accidents d'intolérance.

Emploi :

Indifféremment en injections intraveineuses ou intramusculaires, indolores.

Une ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Pas de contre-indication à l'emploi.

Prix de la boîte : 21 fr. 50 et 35 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.)

CALCIUM FRANÇAIS J. B.

Solution sans adjuvant de Gluconate de Calcium pur

préparé suivant la technique Jeanson, de Bourran-Crabos.

Mode d'action. — Hémostatique, régulateur des appareils circulatoire, hépatique, nerveux et sécrétoire, excitant de la contraction musculaire.

Indications.

1. *Grossesse, accouchement et allaitement* : Préserve la mère de nausées et vomissements, de la carie dentaire, de l'intoxication hépatique aiguë. Combat l'albuminurie, les crises d'éclampsie, la rétention urinaire, la menace d'avortement par hémorragie, l'hémorragie de la délivrance.
2. *Chez l'enfant* : Détruit les faiblesses et douleurs de la croissance. Combat le rachitisme, la carie dentaire. Réhabilite le taux normal du Ca dans les entérites, l'hémophilie, les accidents convulsifs.
3. *Hémorragies et chirurgie* : a. Rôle coagulant. A employer avant et après l'opération. Avant : la veille et l'heure précédente ; après : le soir de l'intervention.
b. Récalcifie les fractures lentes à consolider.
4. *Action sur les reins* : a. Les décongestionne (lithase rénale).
b. Les régularise dans leurs fonctions (albuminurie).
5. *Action sur le foie* : a. Générateur de glycogène.
b. Antitoxique général.
6. *Action sur le tube digestif* : a. Sur les glandes stomatocales : assimilation des aliments.
b. Sur l'intestin : selles normales.
7. *Dans la blennorrhée* : Tuméfaction décroît immédiatement, douleurs disparaissent à la deuxième journée de traitement.
8. *Dans les salpingites aiguës* : Subaiguës, chroniques, post abortives : les douleurs disparaissent en 5 à 6 jours.

Formes et composition. — Gluconate de calcium chimiquement pur présenté sous forme de :

Ampoules de 2 cc., 5 cc. et 10 cc. pour injections intraveineuses, intramusculaires ou voie buccale.

Cachets de 1 gramme.

Granulé (10 grammes = 1 cachet).

Coffrets standard de cure : 20 ampoules buvables 5 cc. ou 10 cc.

Posologie. — Injections = 10 cc. par jour.

Voie buccale : 3 à 4 grammes.

Prix

Boîte de 10 ampoules	10 cc.....	40 fr.
— 5.....	10 cc.....	23 fr.
— 10.....	5 cc.....	35 fr.
— 5.....	5 cc.....	21 fr.
— 12.....	2 cc.....	28 fr.
Coffrets de 20.....	10 cc.....	55 fr.
— 20.....	5 cc.....	45 fr.
Boîte de 24 cachets.....		20 fr.
Boîte de 125 gr. Granulé à 10 p. 100.....		21 fr.

Remboursable par les Assurances Sociales

Laboratoire des Gluconates

R. DE BOURRAN-CRABOS, Pharmacien

7, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 09-12.)

Fournisseur des Sanatoria et des Hôpitaux.

CALCIUM-PLÉ

Composition. — Gluconate de Calcium pur en solution aqueuse, stable, à 10 p. 100, suractivé par le Magnésium glycérophosphorique (2 p. 100) et par le Manganèse glycérophosphorique (0,02 cgr. p. 100).

Indications. — Anti-choc et spasmosédatif, Récalcifiant, Diurétique, Tonique neuro-musculaire, Anti-infectieux, Auro et Arséno-solvant.

Formes. — *Ampoules* (de 5 cc. ou de 10 cc.) injectables par voie endo-veineuse ou intramusculaire (indolore sans anesthésique). *Poudre* (goût agréable).

Posologie. — Une injection tous les 2 jours ou chaque jour, 2 cuill. à café de poudre par 24 heures.

Prix : La boîte de 10 ampoules de 5 cc. ou bien de 5 ampoules de 10 cc. : 25 francs (remboursable par les Assurances sociales).

Laboratoires J. PLÉ, Docteur en Pharmacie
111 bis, rue de Turenne — PARIS (3°).
(Tél. : Archives 83-52.)

CALCIUM ROSSO

Solution Isotonique à 10 p. 100 de Gluconate de Calcium.

Par injections intraveineuses et intramusculaires.

Le Calcium Rosso est un sel organique de l'Acide Gluconique qui possède toutes les propriétés de l'ion Ca et contient 9,3 de Calcium correspondant à 12,80 de CaO. Ce sel permet l'administration de fortes doses de Calcium sans intolérance ni réactions locales ou générales.

Le métabolisme du Calcium a été, dans ces dernières années, l'objet de profondes études scientifiques, et tous les auteurs sont unanimes à proclamer, d'une façon formelle, la nette supériorité du Gluconate de Calcium sur les Chlorures et tous les sels de Calcium avec anion inorganique.

L'excellente action physiologique du Gluconate de Calcium démontrée par une longue série d'expériences bien conduites, a porté très rapidement à une vaste application thérapeutique dans le *système neuro-végétatif, maladies anaphylactiques, tuberculose, dans l'action hémostatique, récalcifiante et corroborante (inflammation et certaines maladies infectieuses)*.

Par voie veineuse, hypodermique et *per os*, l'administration du Gluconate de Calcium est suivie d'une augmentation du Calcium sanguin. Ce fait démontre que le Ca est directement assimilé et constitue une source d'ions calciques apte à une parfaite nutrition de la cellule. La solution physiologique contenant du Gluconate de Calcium remet en activité le cœur des grenouilles arrêté par le moyen acalcique.

Posologie. — *Traitement d'attaque, à dose massive :* de 1 à 3 ampoules de 10 cc. tous les jours, par injections intraveineuses ou intramusculaires.

Traitement d'entretien : 1 ampoule de 10 cc. tous les jours, en injections intraveineuses ou intramusculaires.

Enfants : de 2 à 5 cc. tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours.

Présentation et prix :

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. pour les enfants : 22 fr. 25.

Boîte de 12 ampoules de 5 cc. : 31 fr. 80.

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 25 fr.

Pour Sanatoria, Hôpitaux et Cliniques, conditionnement en vrac en boîtes de 50 ou 100 ampoules de 2, 5, 10 et 20 cc.

Per os, deux formes : *Granulé* : 25 fr. ; *Sirop* : 22 fr. 25.

Agréé par le Conseil supérieur de santé du ministère de la Marine.

Expérimentation faite au Centre de Phtisiothérapie de l'hôpital militaire de Rochefort.

Enregistré au L. N. C. M.

Produits Biochimiques ROSSO

THURET, Pharmacien,

63, rue de Charonne — PARIS.

CALCIUM-SANDOZ

Composition et propriétés. — *Glucono-galacto-gluconate de Calcium* pour les ampoules, les comprimés eff., le sirop; *gluconate de Ca* pour les autres formes. Teneur en chaux (CaO) du gluconate de Ca : 12,6 p. 100, soit 9 p. 100 de Ca élément. Possède toutes les propriétés physiologiques de l'ion Calcium. Injection intraveineuse sans inconvénients. Injection intramusculaire profonde indolore.

Formes. — Ampoules à 10 et 20 p. 100; Poudre granulée (sans sucre). Comprimés effervescents; Tablettes chocolatées; Sirop.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule de 5 ou de 10 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.
Voie gastrique : par jour, 3 cuillerées à café de poudre granulée ou 3 fois 2 tablettes chocolatées ou encore 2 fois un comprimé effervescent
« Calcium-Sandoz » Sirop : 1 cuillerée à soupe 2 à 3 fois par jour.

Enfants : 1 ampoule de 2 ou de 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.
Voie gastrique : par jour, 2 à 3 cuillerées à café de poudre granulée ou 3 fois une demie à une tablette chocolatée ou bien 2 fois 1/3 à 1 comprimé effervescent. « Calcium-Sandoz » Sirop : 1 cuill. à café ou à dessert 2 à 3 fois par jour selon l'âge.

PRODUITS SANDOZ, B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALCIVITAM

Composition. — Solution de Chlorure de calcium dans des jus de fruits naturels (1 gr. par cuillerée à soupe).

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles du chlorure de Calcium qui sont suractivées par les jus de fruits. Tonicardiaque, reconstituant, anti-hémorragique, stimulant de l'appétit, déchlorurant, adjuvant précieux dans l'accouchement.

Indications. — Hypocalcémie, chlorurémie, prévention d'hémorragie, d'inertie cardiaque ou utérine.

Mode d'emploi. — Se recommande par son goût agréable qui le fait accepter facilement.

De 1 à 4 cuillerées à soupe par jour suivant les cas.

Prix : 19 fr. 15, flacon 240 cc.

Laboratoire des ABATILLES
Route du Moulleau — ARGACHON.

CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée et solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Avitaminoses, assimilation défectueuse du calcium.

Indications. — Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

Forme. — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés. (Dragées et granulés glutinisés ne se dissolvant que dans l'intestin.)

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 dragées ou 2 cuillères à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : *Dragées et Granulés* : 17 fr. 75.

Pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoires des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyspeptique, neutralisant stomacal.

Indications. — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

Emploi et doses. — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonnée aux enfants.

Prix : 15 francs.

Durée moyenne : 15 jours.

Échantillon grandeur normale sur demande :

Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

CALCOZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment, avec un sel de calcium.

Mode d'action. — Chez les insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la Prézymase. (Voir *Prézymase*.)

Indications. — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumatisme, etc...

Mode d'emploi. — Deux à trois dragées au milieu de chaque repas.

Prix : 20 francs.

(20 jours de traitement.)

Laboratoires LEBOIME

1-3-5, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII^e).

(Tél. : Glacière 24-48.)

CALMABY

Composition. — Cachets de Calomel porphyrisé. S. N. Bismuth et Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Active la fonction hépatique, combat la cholémie ; Indiqué dans le Rachitisme tardif, les Infections intestinales, les Ulcérations stomacales. Peut servir comme cure d'entretien. Augmente la tolérance mercurielle ou iodée. Réussit dans l'AÉROPHAGIE.

Mode d'emploi. — Un cachet le matin à jeun et le soir au coucher, 15 à 20 jours par mois. Comme désinfectant intestinal, 3 à 5 cachets par jour pendant quelques jours.

Prix : 19 fr. 70 la boîte de 30 cachets.

En médecine infantile,
employer les comprimés de CALOBIL

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-18.)

CAL-MAG-NA

Forme. — Poudre impalpable, légèrement aromatisée.

Composition. — Sous-gallate et sous-carbonate de Bismuth, carbonate de Magnésium, Bicarbonate de soude, carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal.

Action thérapeutique. — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques qui en résultent. Action prompte et prolongée, sans formation d'acidité secondaire ni de gaz. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

Indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsie, gastralgies, pyrosis, flatulence, atonie gastrique, aérophagie, ulcus gastrique et duodénal, vomissements et nausées de la grossesse.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-4.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Dr en Pharm., 13, rue Pagès — SURESNES (Seine).
(Tél. : Longchamp 16-85 — 16-86.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge
et le Grand-Duché de Luxembourg :

LABORATOIRES SUBSTANTIA
53, rue du Poinçon — BRUXELLES

CALMARINE

Régulateur le plus parfait des dystonies neuro-végétatives, Antispasmodique et analgésique. Médication par excellence de la nausée, de l'anxiété et des phénomènes spasmodiques de toute nature.

Indications. — *Etats nauséeux* : Toutes crises résultant d'un déséquilibre vago-sympathique.

Aérophagie, Vomissements incarcibles de la grossesse, Anxiété, troubles nerveux.

Mal de mer, Mal de train, mal d'auto, mal d'avion, mal de montagne.

Composition. — *Belladone* (Antispasmodique et modérateur des sécrétions).

Adrenaline (Tonicardiaque, antidépressive, antitoxique et antinauséeuse).

Cratægus (Sédatif du système nerveux cardiaque et vasculaire).

Phényl-Ethyl-malonyl-urée (Antispasmodique, sédatif du système nerveux).

Ergot de Seigle (Sédatif du sympathique).

Chlorh. de diméth.-amino-benzoyl-pentanol (Analgésique).

Présentation. — Deux formes : comprimés, Suppositoires.

Posologie. — *Adultes* : 3 comprimés par jour jusqu'à cessation des troubles, suivant avis du médecin. Au moment des crises 3 comprimés ou 1 à 2 suppositoires.

Enfants : 1 à 2 comprimés ou 1 suppositoire.

Laboratoires MATO, J.-B. DUPEYROUX, Pharmacien
95, rue Lecourbe — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 27-13.)

CALMINAL

Cachet antinévralgique et antirhumatismal, d'action analgésique rapide et intense.

Pour le traitement de toutes les affections douloureuses : Migraines, Céphalées, Névralgies : faciales, dentaires, maux de tête. Rhumatismes, Grippe, Fièvres, Insomnies (ainsi que les troubles de la menstruation).

Formule, 1 cachet contient :

Diméthylaminophényldiméthylpyrazoloniédiéthylmalonylurée.....	0 gr. 40
Monobromhydrate de quinine	0 gr. 10
Guarana Paullinia sorbilis	0 gr. 25
Excipient, Q. S. pour	1 gr. 00

Le **Calminal** réalise l'application thérapeutique des plus modernes conceptions pharmaceutiques sur l'action des substances à effet analgésique. Il manifeste un effet particulièrement rapide et intense contre toutes les affections douloureuses, *quelles qu'en soient les origines*, sans provoquer de phénomènes secondaires toxiques.

Le **Calminal** possède également un effet antithermique et antirhumatismal qui en élargit considérablement le champ d'action.

L'usage en est recommandé pour tous les états fébriles, douleurs musculaires de nature grippale dues aux refroidissements et également contre les phénomènes douloureux d'origine nerveuse : céphalées, brûlures, entorses, fractures, etc.

Posologie. — De 1 à 4 cachets par jour. Un seul cachet de **Calminal** est suffisant pour éliminer toutes les algies, *quelles qu'en soient les causes*.

La dose habituelle est de 1 cachet, dose qui peut être éventuellement répétée une heure après. Il est recommandé de faire suivre l'absorption du cachet par une boisson chaude.

Non toxique, très bien toléré, d'une action extrêmement rapide.

Prix : la boîte de 12 cachets : 12 francs.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd.

Produits Biochimiques ROSSO

THURET, Pharmacien,

63, rue de Charonne — PARIS.

CALMOBRO-NIEL (ex KALMOBROL)

(Spécialité absolument française.)

Composition. — Extrait de bouillon bromure liquide à base de bromure de sodium très pur.

Doses. — 1 cuillerée à café = 1 gr. de bromure de sodium.

Indications. — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc., etc.)

Mode d'emploi. — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

Prix : 18 francs, le flacon de 30 doses.

Laborat. S. A. R. L. au capital de 100 000 fr.

C. CHAMARD et R. NIEL

Ex-Inspect^r des pharmacies. Docteur en pharmacie.

3, rue Royet — LYON-CALUIRE.

(Tél. : Burdeau 23-31.)

CALMOCARDINE LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

Sulfate de quinine.....	0,05
Gardénal.....	0,005
Sulfate de spartéine.....	0,01
Bromure de camphre.....	0,025
Extr. de crataegus.....	0,015
Extr. de passiflora.....	0,015
Extr. de valériane.....	0,015

Actions thérapeutiques. — Sédatifs des fibres musculaires et du système nerveux.

Spécifique des palpitations.

Indications. — Palpitations de cœur de toutes origines, Eréthysme cardiaque, Arythmie extrasystolique, Douleurs de l'angine de poitrine, Anxiétés cardiaques des névrosés et des surmenés.

Mode d'emploi. — Une dragée tous les 1/4 d'heure jusqu'à quatre, puis toutes les heures jusqu'à huit par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 21 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours A. Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35).

CALMOPELVINE

Médication idéale de toute algie de la sphère pelvi-uro-génitale.

Composition. — Extrait de belladone, Extrait thébaïque, Camphre, Extrait d'anémone, Extrait d'hamamélis, Chlorhydrate de para-amino-benzoyl-diéthyl, Amino-éthanol, Onguent hydrargyrique double, Calmopelvine (Thiosulfonates de sodium).

Propriétés. — Aucune toxicité, aucune irritation pour les tissus, administration facile, très puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

Indications. — Blennorrhagies aiguës, cystites aiguës, blennorrhagies chroniques, prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, adénome, rétention, cancer de la vessie, endoscopie, affections du rectum et toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Introduire dans le rectum un suppositoire tous les matins ou tous les soirs en suivant les indications du médecin traitant.

Laboratoires CALMOPELVINE-CALMOVARINE
192-194, rue Saint-Denis — PARIS (II^e).
(Tél. : Gutenberg 41-01.)

CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Extrait Belladone, Jusquiame, Piscidia, Analgésine.

Insomnies, Convulsions, Hémorroïdes, Prostatites, Règles douloureuses, Coliques hépatiques, néphrétiques, Ante et post-partum, etc. 1 à 3 par 24 heures.

3 dosages ;

Bébés (1 à 5 ans) — Enfants — Adultes (au-dessus de 15 ans)
Boîte de 6.

CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

	3 dosages	Bébés jusq. 5 ans	Enfants 5 à 15 ans.	Adultes
Bromhydrate de quinine ..		0 gr. 035	0 gr. 07	0 gr. 10
Sulfate de quinine		0 gr. 065	0 gr. 13	0 gr. 20
Pyramidon		0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Phénacétine.....		0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Caféine		0 gr. 005	0 gr. 02	0 gr. 05

Pour un suppositoire.

Tous les états fébriles, un matin et soir.

Boîte de 6 :

Enregistrés au Lab. de Cont. des Médicaments sous les n^{os} 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Échant. : Laboratoires des CALMOSUPPOS
La MOTHE-SAINT-HÉRAY (Deux-Sèvres).

CALMOVARINE

Suppositoires analgésiques et sédatifs.

Composition. — Extractum viburnum Prunifolium, Extractum belladonæ, Novocaïnum, Extractum opii, Pomatum hydrargyricum gallicum, Extractum artemisiæ officinalis, Beurre de cacao.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique presque immédiat. Aucune toxicité. Aucune irritation pour les tissus. Administration facile. Décongestionnant fondant et cicatrisant.

Indications. — Métrites, Salpingites, Salpingo-ovaires, Dysménorrhées, Règles douloureuses, Ovaires sclérokytiques, Adhérences douloureuses, Hémorroïdes, Fissures anales, Spinctéralgies, Spasmes douloureux. Toutes affections et complications des appareils génitaux et urinaires chez la Femme, Douleurs du petit bassin, Blennorragie, Cystite, Prostatite, Affection de l'appareil urinaire chez l'Homme.

Posologie. — Introduire dans le rectum, tous les matins ou tous les soirs, un Suppositoire suivant avis du médecin.

Cas très douloureux : Un suppositoire matin et soir.

Laboratoire CALMOVARINE

192-194, rue St-Denis — PARIS (II°). Gut. 85-65.

CALSÉDINE

Composition. — Produit à base de Ca, Mg et Phosphore.

Ne renferme aucune substance toxique ; ni barbituriques, ni alcaloïdes. Pas de Bromures.

Action. — Hypnotique ou sédatif suivant les doses et le mode d'emploi.

Elle calme, en ne faisant intervenir que les ions minéraux de l'organisme. Elle fait dormir en utilisant un mécanisme naturel du sommeil.

Doses. — **Sédation nerveuse :** 1 à 2 comprimés 2 ou 3 fois par jour aux repas, ou *une* cuillerée à café de granulés pour *un* comprimé.

Somnifère : 4 comprimés à la fois (1 comprimé par 17 kg. de poids du sujet) 20 minutes environ avant l'heure habituelle du sommeil, dilués dans un peu d'eau, ou de liquide légèrement alcoolisé, bière, eau rouge, etc.

Si cette dose n'est pas suffisante, l'augmenter ou, s'il y a réveil avant la fin de la nuit, renouveler la même dose.

Indications. — Tous les états d'irritabilité nerveuse, toutes les insomnies dites nerveuses ; surmenage cérébral, génital ; excitations émotives, inquiétudes, angoisses ; excitation due au thé, café, tabac, alcool, etc.

Spasmes avec prédominance de l'élément névropathique.

Entéronévrose spasmodique, coelialgies ; Pollakiuries où prédominent facteurs nerveux ou réflexes.

Dans les prurits, d'origine nerveuse, les bouffées congestives de la ménopause ; dans les poussées hypertensives de l'hypertonie artérielle ; dans certains spasmes rythmiques du sommeil.

D'une façon passagère, la **Calsédine** diminue la fréquence du pouls et abaisse les deux tensions maxima et minima.

Prix : 17 fr. 65 le tube de 50 comprimés.

Prix : 18 fr. 65 la boîte de granulés.

Laboratoire GERDA

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

CALYPTOL CHARPENTIER

Dispersion aqueuse d'Eucalyptol à 10 p. 100.

Indications. — Suppurations bronchiques et pulmonaires, Abscès du poumon, Gangrène pulmonaire, Dilatation des bronches, Asthme et Emphyseme, Grippe, Coqueluche, Rougeole.
Toutes Affections des voies respiratoires.

Posologie. — De 1 à 2 ampoules par jour (ampoules de 2 et 5 cc.).

Formule :

Eucalyptol.....	0,50
Ethylsulfate de soude.....	0,02
Excipient eau distillée	5 cc.
pour une ampoule.	

Laboratoire E. CHARPENTIER

7, rue du Bois-de-Boulogne — PARIS (XVI^e).
(Tél. Passy 55-46.)

CALYPTOPHÉDRYL

Forme. — Sirop.

Composition :

Camphosulfonate d'éphédrine.....	7 gr.
Camphosulfonate de soude	15 gr.
Racine aconit	10 gr.
Drosera	50 gr.
Grindélia.....	50 gr.
Feuilles de belladone.....	12 gr. 5
Essence d'eucalyptus déterpénée.....	5 gr.
Essence de menthe déterpénée.....	2 gr. 5
Propanone	0 kg. 250
Sulfo-gaicolate de potasse.....	0 kg. 250
Benzoate de soude	0 kg. 100

Pour 100 centimètres cubes.

Formule. — Asthme, coqueluche, emphyseme, grippe, bronchite aiguë et chronique, pneumonie, toux spasmodiques, et toutes les affections des voies respiratoires.

Posologie. — *Enfants* : 3 cuillerées à café.

Adolescents : 3 cuillerées à dessert.

Adultes : 3 cuillerées à soupe par 24 heures (enfants à partir de 3 ans).

Prix au public : 19 fr. 25.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

CAMFORMINE

(Camphosulfonate d'Hexaméthylène-Tétramine.)

Composition. — Résulte de la combinaison d'une molécule d'acide camphosulfonique avec une molécule d'Hexaméthylène tétramine.

Corps chimiquement défini, cristallisable, soluble dans l'eau, solution à 10 p. 100.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant tonique du cœur, action diurétique, anti-infectieuse, rétablit la tension, règle les mouvements intestinaux.

Indications. — Spécifique de toutes défaillances cardiaques : choc nerveux ou opératoire, syncopes, infections, hémorragies, cardiopathies, fléchissement sénile.

Est particulièrement indiquée dans les endocardites infectieuses, gripes, infections puerpérales, typhoïdes, pneumonies, chocs quelle qu'en soit la cause.

Présentation. — *Doses* : Ampoules de 2 cc., de 5 cc. et de 10 cc.

Injection intramusculaire ou intraveineuse de 2 et de 5 cc. et plus, suivant les indications. Pas de contre-indications. Pas d'intolérance. Action rapide et puissante.

Solution à ingérer. — Dans les affections chroniques; les convalescences, chez les vieillards : 100 à 120 gouttes en trois fois dans la journée.

Prix :	{	Ampoules de 2 cc., la boîte de 10	16 fr. »
		Ampoules de 5 cc., la boîte de 10	21 fr. 30
		Ampoules de 10 cc., la boîte de 4	18 fr. 15
		Gouttes, le flacon	16 fr. »

Laboratoire ARMORIL

7, rue de l'Armorique PARIS-(XV^e). (Tél. : Suffren 53-70.)

CAMPHOCALYPTOL

Indications. — Affections pulmonaires et maladies infectieuses. Grippe et complications, *Coqueluche*, Bronchites aiguës, chroniques, *abcès du poulmon*, Pneumonie, Tuberculose, Accidents pulmonaires anesthésiques.

I. CAMPHOCALYPTOL INJECTABLE

Ampoules de 2 cc. Ampoules de 5 cc.

Camphocalyptol simple non gaïacolé.

Une ampoule de 2 cc. contient :

Goménol, Eucalyptol	ãã	0 gr. 10
Camphre		0 gr. 20
Acide phénique		0 gr. 01
Excipient		Q. S.

Camphocalyptol gaïacolé.

Même formule avec, en plus, gaïacol, 0 gr. 10.

Une ampoule de 5 cc. contient :

Formule simple, formule gaïacolée : mêmes doses $\times 2,5$.

Emploi. — En injections intramusculaires profondes ; par jour : 1 cc. à 5 cc. et plus selon âge et gravité. Le Camphocalyptol s'emploie aussi en lavements : une ampoule dans lait ou huile tièdes.

Boîte 10 ampoules de 2 cc.....	19 fr. 20
— 6 ampoules de 2 cc.....	12 fr. 80
— 6 ampoules de 5 cc.....	19 fr. 20

II. CAPSULES DE CAMPHOCALYPTOL

A base de : codéine, éphédrine, eucalyptol camphré, terpinol. Capsules glutinisées : de 3 à 8 par jour *avant* les repas.

Le flacon pour 7 jours environ : 13 fr. 30.

III. SUPPOSITOIRES DE CAMPHOCALYPTOL

Pour adultes, pour enfants.

S. Adultes	Créosote émulsionnée	0,25
	Eucalyptol	0,03
	Camphre.....	0,03
	Stovaine	0,005

S. Enfants : le tiers environ des doses ci-dessus.

Un suppositoire matin et soir.

Suppositoires adultes ou enfants, la boîte : 16 fr.

L. N. C. n^{os} 314.38 et 39 ; 314.41 à 314.43.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 14-14.)

CAMPHODAUSSÉ

(Camphre soluble dans l'eau.)

(Camphosulfonate de soude.)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection bien tolérée et ne provoquant pas les réactions locales dues au véhicule huileux.

Indications. — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

Formes: a) Camphodausse.

b) Camphodausse spartéiné.

Mode d'emploi. — 1 à 10 cc., une ou plusieurs fois par jour, par voie *hypodermique* ou *intramusculaire*. Le Camphodausse simple peut être injecté par voie intraveineuse également.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

CAMPHOGÉNINE

Analeptique en solution isotonique de :

Campho-sulfonate de soude,

Sulfate de spartéine et formiate de tétraméthyl-ammonium.

Ce sel, récemment introduit dans la thérapeutique, possède une triple action : Cardiotonique, Neurotonique et stimulante des fonctions endocriniennes.

L'action sur le cœur a une grande analogie avec celle de la Caféine, du Strophantus, de la Strychnine ; elle est aussi constante et sûre, mais moins brutale, et son emploi est indiqué :

En cas d'urgence : dans toutes défaillances.

En cures prolongées : dans toutes dépressions.

La Camphogénine, un complexe d'un emploi extrêmement fréquent, facile, effectif, inoffensif, dans : Toutes maladies infectieuses, aiguës ou chroniques, toutes anémies, asthénies, atonies, cardiopathies, dépressions générales, nerveuses ou organiques, convalescences.

Indications thérapeutiques. — Cardiotonique d'action rapide sur le cœur et la circulation ; Stimulant des fonctions organiques des centres nerveux et respiratoires, ainsi que des sécrétions endocriniennes, Insuffisances cardiaques, Colapsus, Lypothymies, Cardiopathies, Anémies, Asthénies, Déficiences organiques et endocriniques, Neurasthénies, Maladies infectieuses, Tuberculose pulmonaire, Prophylaxie des accidents opératoires.

Posologie. — La *Camphogénine* s'emploie en injections sous-cutanées, intramusculaires, à la dose journalière de une ampoule *pro die* selon les indications du médecin traitant et les techniques habituelles.

L'injection est indolore et ne donne lieu à aucune réaction.

Présentation et prix :

Boîte de 12 amp. de 2 cc. : 22 fr. 25.

Boîte de 12 amp. de 5 cc. : 31 fr. 80.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd.

Produits Biochimiques ROSSO

THURET, Pharmacien,

63, rue de Charonne — PARIS.

CAMPHO-PNEUMINE

Antiseptique des voies respiratoires.

Formule :

Gaïacol.....	0,10
Niaouli	0,10
Eucalyptol	0,10
Phénol.....	0,02
Camphre	0,20
Huile. Q. S. pour.....	2 cc.

La *Camphopneumine* apaise la toux, soulage la dyspnée, renforce la défense de la muqueuse bronchique et raréfie les sécrétions.

Présentation-doses. — 1° *AMPOULES* de 2 cc. pour injections intramusculaires. Boîtes de 12 ou boîtes de 6.

Adultes : 1 à 2 ampoules par jour.

Enfants : 1/2 à 1 ampoule par jour.

2° *SUPPOSITOIRES* : 1 à 2 par jour (boîtes de 10).

Indications. — Gripes, bronchites, pneumonie, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, coqueluches, infections secondaires chez les tuberculeux.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

CAMPHOSTYL LACROIX

Composition. — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

Avantages. — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Injection parfaitement indolore grâce à son pH = 7.

Indications. — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

Formes pharmaceutiques. — 1° *Camphostyl simple*.

A. *Ampoules* — 1° Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 : 2° boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 : 3° boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50.

Pour le corps médical, en boîtes de 50 et 100 ampoules.

B. *Gouttes*. — XX à CXX gouttes par jour.

2° *Camphostyl spartéiné*. — A. *Ampoules*. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,05 de Spartéine.

B. *Gouttes spartéinées* XX à LXXX gouttes par jour.

3° *Camphostyl strychniné*. — Ampoules uniquement. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,001 de Strychnine.

Echantillon sur demande.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

<i>Camphostyl simple</i> :	{	Ampoules de 1 cc.	Prix : 15 fr. 60	la boîte de 12
		— de 2 cc.	— 18 fr. 75	— 12
		— de 5 cc.	— 18 fr. 75	— 6
<i>Camphostyl spartéiné</i> :	{	Gouttes.....	— 15 fr. 60	
		Ampoules.....	Prix : 12 fr. 50	la boîte de 6
		—	— 20 fr. 40	— de 12
<i>Camphostyl strychniné</i> :	{	Gouttes.....	— 16 fr. 65	

Ampoules uniquement : 12 fr. 50 la boîte de 6; 20 fr. 40 la boîte de 12.

Laboratoires LACROIX

V. MEROBIAN et fils, Successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII°) Tél. : Nord 54-57.

CAMPHROLYSE

Présentation. — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc., et en flacons stilligouttes.

Principes actifs. — *a.* Camphrolyse simple : campho-sulfonate de soude liquide. — *b.* Camphrolyse spartéine : campho-sulfonate de soude liquide, spartéine. — *c.* Camphrolyse caféine : campho-sulfonate de soude liquide, caféine (benzoate de soude).

Indications. — Tous les états de faiblesse ou de collapsus cardiaque, Suite de choc traumatique ou chirurgical, Collapsus cardiaque, Imminence de collapsus dans les états infectieux, Gripes ou fièvres typhoïdes, etc., les Pneumonies, les Broncho-pneumonies grippales, Syncopes, Septicémie, les Crises d'angine de poitrine et d'œdème pulmonaire.

Mode d'emploi. — *a. Adultes* : 1 à 4 ampoules par jour en injections sous-cutanées, ou 1 à 2 ampoules par jour en injections intraveineuses, ou XXV à C gouttes par jour de la solution dans un peu d'eau sucrée. — *b. Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour en injections sous-cutanées, ou 1 ampoule par jour en injection intraveineuse, ou X à L gouttes par jour de la solution dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé du camphre naturel soluble dans l'eau (Campho-carboxylate d'ammonium), de diffusion rapide, sans réaction locale ni action secondaire, injections indolores.

Indications. — Les mêmes que celles des huiles camphrées (excitant du cœur et des centres nerveux, renforcé dans ses formes associées soit par la spartéine, soit par la spartéine et la strychnine : troubles cardio-vasculaires, états de choc, crises respiratoires, collapsus, maladies infectieuses) et de l'alcool camphré (analgésique et antiseptique : angines, prurits, brûlures).

Formes pharmaceutiques. — A. *Camphydryl simple*, à 5 p. 100 de principe actif, isotonisé.

1. Ampoules de 1, 2 et 5 cc. : 1 ou 2 par jour.
2. Comprimés effervescents, à 0 gr. 10 : 2 à 4 par jour.

Gargarismes : 1 ou 2 pour un verre d'eau.

B. *Camphydryl spartéiné.*

1. Ampoules de 2 cc. (0,03 spartéine base) 1 ou 2 par jour.
2. Ampoules de 5 cc. (0,05 spartéine base) 1 ou 2 par jour.

C. *Camphydryl strychno-spartéiné.*

1. Ampoules de 2 cc. (0,015 spartéine base et 0,001 strychnine).
2. Ampoules de 5 cc. (0,02 spartéine base et 0,002 strychnine).

Camphydryl simple :

Ampoules de 1 cc., boîte de 10.....	16 fr. 15
— 2 cc., — 10.....	18 fr. 20
— 5 cc., — 10.....	30 fr. 15
Comprimés, flacon de 50.....	18 fr. 20

Camphydryl spartéiné :

Ampoules de 2 cc., boîte de 10.....	21 fr. 35
— 5 cc., — 5.....	21 fr. 35

Camphydryl strychno-spartéiné.

Ampoules de 2 cc., boîte de 10.....	20 fr. 80
— 5 cc., — 10.....	33 fr. 30
— 5 cc., — 3.....	13 fr.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS (V^e).

Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.

CANOL

Composition :

Poudres végétales, sans aucune addition de corps d'origine chimique.

Lawsonia	0,35235
Chimaphila	0,1425
Aphloïa	0,005
Lawsotanine	0,00015

Pour un cachet.

Absolument inoffensif, aucune contre-indication.

Le Canol noircit les urines au début du traitement, ne s'accumule pas, peut être employé indéfiniment sans danger.

Indications :

Spécifique de l'Albuminurie. Infections des voies urinaires et rénales.

Albuminurie gravidique.

Néphrites.

Pyélo-néphrites.

Lithiase rénale. Colibacillose.

Cystites.

Hématuries. Diabète rénal.

Forme pharmaceutique :

Boîte de 30 cachets de 0,50 environ.

Posologie : Dose moyenne.

Adultes : 4 à 6 cachets par jour.

Enfants : 1 à 3 cachets par jour.

On peut augmenter la dose jusqu'à dix cachets par jour dans les cas graves ou compliqués.

Prix de la boîte de 30 cachets : 15 fr. 60.

Correspondance et échantillonnage :

Laboratoire du CANOL

MAIZET (Calvados).

J. GAUDIN, Pharmacien.

Dépôt général : O. C. P. Paris.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 1426-1.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

CANTÉÏNE BOUTEILLE

Forme. — Élixir.

Composition :

Cratægus.....	XXV gouttes.
Passiflore.....	0 gr. 50
Hamamélis.....	XXX gouttes.
Salix Alba.....	0 gr. 025
Excipient : Q. s. par cuillerée à café.	

Indications. — Eréthisme cardiaque, Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs, Ménopause, Neurasthénie, Mélancolie, Déprimés, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 04-02.)

CAPARLEM

La thérapeutique protectrice du foie.
Préventive et curative des affections hépatopancréatico-biliaires.

I. Sa formule. — *Huile de Haarlem d'origine*, pure et vraie, Hétéropolyvalente, à base de distillat du *Juniperus Oxycedrus*, spécifique hépato-vésiculaire, fluidifiant de la bile et bilio-sécréteur. Le plus fidèle et le plus doux cholérétique et cholécystokinétique.

II. — Ses indications thérapeutiques fondamentales. — *a. Foie.* — Cholécystites chroniques lithiasiques et non lithiasiques, douloureuses ou non. Calculs de transit et calculs sédentaires. Angiocholites et Angiocholécystites, Séquelles de Cholécystectomies, Asthme hépatique et Bile noire, Foie grippal, Amibiases et Lambliosés vésiculaires. Colibacillocholies.

b. Reins. — Lithiases rénales et toutes variétés de Pyélo-néphrites, Uricémie, Goutte, Gravelle, Colibacilluries, Rein atone.

III. — Sa posologie habituelle. — *Cure d'entretien* : une à deux capsules au milieu des deux principaux repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

IV. — Ses avantages. — Titrage rigoureux, Efficacité officiellement reconnue, Pureté extrême des composants, Efficacité thérapeutique cliniquement expérimentée.

La seule huile de Haarlem sans mauvais goût ni renvois désagréables après l'ingestion. — Prix de vente modique.

Prix : 18 francs.

**Les Laboratoires Lorrains
de Produits purs.**

ÉTAIN (Meuse).
(Tél. : 74.)

CAPSULES BRUEL

A l'Éther Amyl Valérianique.

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Éther Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux, jusqu'au spasme douleur des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnagogue.

Doses. — 3 à 10 capsules par jour.

Fabrication, vente en gros et échantillons.

H. RIVIER, Pharmacien

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 22-46.)

CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

- 1° Calme l'irritation et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).
- 2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyl-lique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

Posologie :

Sirop : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

Capsules : 3 à 4 par jour : 10 ans : 1 à 2.

Prix : 16 fr. 05

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CAPSULES HAARLEM BARDET

(Capsules Bardet)

Huile de Haarlem VRAIE, PURE, D'ORIGINE.

Composition. — Chaque capsule contient X gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la *seule* maison fabriquant la véritable huile.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique et décongestif des voies hépato-biliaires et rénales. Cholagogue puissant, fluidifiant la sécrétion biliaire.

Principales indications thérapeu-tiques. — Lithiase biliaire, Ictère, Coliques hépatiques, Angiocholites, Cholécystites, Asthme hépatique.

Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Pyélonéphrites, Goutte, Arthritisme.

Posologie. — Affections aiguës : 2 à 4 capsules par jour. Affections chroniques et cures d'entretien : 1 à 2 capsules par jour.

A absorber au cours des repas.

Laboratoire National de Contrôle : N° 518-3.

Échantillons et Littérature :

LABORATOIRES BARDET

fondés en 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CAPSULES HENRY

La potion de Chopart, formule du Codex, est une médication héroïque, mais de goût particulièrement intolérable.

Les *Capsules Henry*, permettant au malade l'absorption facile de ce médicament, le prescripteur obtiendra une action balsamique remarquable pour la blennorrhée, la blennorrhée et la cystite, du fait d'une meilleure observation de la prescription.

9 à 12 capsules par jour.

La boîte de 50 capsules : 17 fr.

PRODUITS DU DOCTEUR HENRI PHILIPPE
36, quai Fulchiron — LYON.

CAPSULES HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

Voir :

HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.
(Tél. : Provence 49-77.)

CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue.

Forme. — Capsules de 0 gr. 20 spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

Composition. — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

Indications. — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagie. Innocuité absolue en cas de grossesse.

Posologie. — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 14 fr. 40.

Pharmacie SEGUIN

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

CAPSULES KUCHNER

au Mécaptol.

Affections bronchiques et pulmonaires.

Composition. — Héléline crist., Gaïacol crist., Eucalyptol crist., Codéine et Chl. Thébaïque.

Action thérapeutique. — Calment la toux, modifient et tarissent l'expectoration. Propriétés fébrifuges et antidyspnéiques très prononcées.

Indications. — Bronchites simples et chroniques, Toux émétisante des tuberculeux, Toutes affections des voies respiratoires.

Posologie. — Trois à six capsules par jour en trois fois.

Prix de vente : 14 fr. 50.

Laboratoires L. HINGLAIS

ÉPERNAY (Marne).

Tél. : 106.

CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (extr.) 0,001, Belladone (extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpène 0,012, Eucalyptol 0,02, Thiocol (Sulfogaiacolate de potasse) 0,04, par capsule.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux opiniâtres, bronchites chroniques, laryngites, asthme, catarrhe, etc.

Laboratoires H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

CARB (Granulé)

Charbon activé et catalytique.

Pouvoir absorbant élevé et titré.

Indications thérapeutiques. — Médication absorbante et antitoxique. Aérophagie, Hyperchlorhydrie. Infection intestinale. Syndrome entéro-rénal toxique et infectieux. *Intoxications*, *Entérites*.

Posologie.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café.

Dose massive dans les intoxications aiguës.

Le flacon : 17 fr. 70.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-51.

DR^s A. GRIGAUT et A. BOUTROUX

Pharmaciens

Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CARBAGOL MARINIER

Composition :

Charbon animal, Charbon végétal, Charbon activé (par procédé spécial évitant complètement toute impureté chimique : chlorure de zinc, arsenic, etc.). Argent colloïdal.

Formes :

GRANULÉ friable légèrement aromatisé.
CACHETS (exempts de sucre).

Indications :

Tous les troubles gastro-intestinaux. Entérococolites banales ou muco-membraneuses et leurs conséquences. Toutes diarrhées. Irritations et infections intestinales. Colibacillose. Syndrome entéro-rénal. Intoxications alimentaires. Auto-intoxications.

Posologie :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas avec un peu d'eau ou de tisane.

Enfants : 1/3 à 1/2 dose.

Cachets : 1 cachet = 1 cuillerée à café de granulé.

Prix du flacon de granulé ou de la boîte de 30 cachets : 18 fr. 65.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les N^{os} 48-2 et 48-3, le « CARBAGOL » peut être légalement prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires G. MARINIER

23, rue Ballu,
PARIS.

CARBALCALOIDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

La Carbatropine. — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 18 fr. 50.

Le Carbarsèno. — C + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 19 fr. 50.

La Carbémétine. — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 24 fr. 60.

Le Carbalga. — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

La Carbésérine. — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 19 fr. 50.

La Carbocarpine. — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 19 fr. 50.

Laboratoires MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

CARBARGYRE

Charbon végétal activé et Argent associés en un complexe colloïdal.

Propriétés. — Antiseptique intestinal puissant, aucune toxicité, absorbant, antitoxique, anti-infectieux.

Ne provoque jamais d'argyrisme.

Indications thérapeutiques. — *Colibacillurie, Syndrome entéro-rénal. Infections intestinales. Intoxications. Fermentations. Colites. Diarrhées.*

Deux formes :

Cachets : 1 cachet contient :

Argent colloïdal.....	0,02
Charbon actif titré	0,48

Granulé : 1 cuillerée à entremets contient :

Argent colloïdal	0,02
Peroxyde de magnésium ..	0,04
Urotropine	0,08
Charbon actif titré	1

Le **CARBARGYRE** se prend en général avant les repas.

Posologie. — Dose moyenne par 24 heures :

Adultes : granulé : de 2 à 3 cuillerées à entremets ; cachets : de 2 à 5 cachets.

Enfants : de 2 à 3 cuillerées à café.

Cachets : la boîte de 30 cachets : 18 fr. 70.

Granulé : le flacon de 170 gr. : 18 fr. 70.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. Laborde 08-51.

D^{rs} A. GRIGAUT et A. BOUTROUX
Pharmaciens

Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

Composition. — 1/2 mgr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de mgr. d'atropine par cuillerée à café.

Indications. — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

Formes. — Granulé dosé à 5 mgr. par 100 gr., soit 1/4 de mgr. par 5 gr. (cuillerée à café).

Poudre et cachets.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dosage spécial pour enfants:

1/10 de mgr. par cuillerée à café.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

CARBOBEL

Granulés au goût agréable.

Deux formules. — Boîte rouge : simple.

Boîte bleue : benzonaphtolé.

Composition. — Charbon animal chimiquement pur — hexaméthylène tétramine pur — citrate de magnésie, avec ou sans benzonaphtol.

Indications. — Gastrites, aigreurs, inflammation des voies intestinales, biliaires et urinaires.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas, à prendre comme dessert. (Si possible ne pas mélanger à du liquide.)

Laboratoires du CARBOBEL

Dépositaires généraux pour la Belgique, le Congo Belge et le Grand-Duché de Luxembourg.

PECEBE

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

CARBO-BISMUTH ADRIAN

Ne contenant que du Carbonate de Bismuth chimiquement pur, légèrement sucré et menthé.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Indications thérapeutiques. — Forme pratique, active et inoffensive pour le traitement des affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin :

■ Hyperchlorhydrie, Ulcérations de l'estomac,
■ Hémorragies intestinales, Fièvre typhoïde.

Médication antidysentérique et antidiarrhéique, pansement gastrique.

Posologie. — 5 à 20 comprimés par jour, suivant les cas et suivant avis du médecin, soit à jeun, soit avant ou après les repas.

Le flacon : 13 fr. 30.

Société Française de Produits Pharmaceutiques
Anc^e ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CARBO-COMBROSMOL

Médication végétale des infections gastro-intestinales et biliaires.

Composition. — Combretum, Buchu, Saponaire, Charbon végétal activé.

Forme. — Granulé fondant, aromatisé.

Propriétés. — Par le *Buchu* attaque l'élément infectieux hépatobiliaire ; par la *Saponaire* neutralise et élimine les toxines ; par le *Combretum* sollicite du foie un effort sécrétoire qui aide à l'élimination des éléments infectieux et toxiques ; par le *Charbon activé* adsorbe les bactéries et les toxines intestinales.

Indications. — Hépatites, ictères infectieux, angiocholites, cholécystites, *colibacillose*. Fermentations gastro-intestinales, auto-intoxication, états diarrhéiques, aérophagie.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, à chaque repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences,
59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

CARBOGENASE

Granulé.

Composition. — Extrait de Belladone, Citrate de soude, Hexaméthylènetétramine, Lactose, Carbonate de magnésie, Charbon dans excipient aromatisé.

Indications. — Aérophagie, Fermentations intestinales, Douleurs stomacales, Dermatoses par auto-intoxications, Affections urinaires.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café à la fin de chaque repas.

Prix : 15 fr. 60.

Laboratoire RICHER, Docteur en Ph^{ie}
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de
Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

CARBOÏODURES FRAUDIN

Composition. — Iodure chimiquement pur, fixé sur du charbon activé, utilisé comme véhicule.

Granulé friable, d'un goût agréable, contenant 0 gr. 33 d'iodure par cuiller à café.

Deux formes : 1. Carboïdure à l'iodure de potassium.
2. Carboïdure à l'iodure de sodium.

Propriétés. — L'iodure fixé sur le charbon est seulement libéré en milieu alcalin (intestin). *La libération est intégrale*, mais lente, ne causant ni intolérance stomacale, ni iodisme.

Indications. — Toutes celles de l'iodure de potassium : artériosclérose, arthritisme, affections cardio-vasculaires, asthme, etc.

Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN

4, avenue Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

(Tél. : Molitor 02-62.)

CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale
hépatique et rénale.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon activé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

Indications. — Auto-intoxications gastro-intestinales, Colibacilloses, Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

Formes. — 1° Boîte de 30 cachets ;
2° Poudre avec cuiller-mesure.
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

Doses. — *Adultes* : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — *Enfants* : 2 à 6 mesures *pro die*.

Prix : 16 fr. 50

CARBOLACTYL BILIÉ

Composition. — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

Indications. — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabète par Dyshépatie, Colibacilloses, Artériosclérose par intoxication.

Forme. — Boîte de 30 cachets.
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

Doses. — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Prix : 17 fr. 50

Échantillons et Littérature sur demande :

Laboratoire DENISOT

19, rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

CARBOLAXINE

Composition. — Graines sélectionnées de *Psyllium* enrobées de charbon activé (ACTICARBONE pur) 25 p. 100 et poudre de Belladone 0 gr. 015 par cuillerée à soupe.

Propriétés. — Rééducateur intestinal, désinfectant énergique, antispasmodique.

Forme une gelée épaisse, riche en ACTICARBONE, qui pansela muqueuse intestinale, s'oppose au dessèchement des selles et absorbe les toxines de fermentation.

Indications. — Coprostase et conséquences toxiques. Entérocrites. Spasmes de l'intestin, Diarrhée, Fermentations, Colibacillose, etc.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour avant les repas. 1 cuillerée dès amélioration. Puis : doses décroissantes. *Enfants* : par cuillerée à café.

Prix : 17 fr. 10. (Boîte traitement de 15 jours.)

Laboratoire du MARUBOR

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).
(Tél. : 1-59.)

CARBOLIN MIDY

Carbolin simple. — Boîte verte : 15 fr. 60. Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé.

Carbolin composé. — Boîte rouge : 16 fr. 65. Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé, Extrait de bile, Ferments intestinaux, Diastase du Codex, Extrait Bourdaine spécial.

Propriétés thérapeutiques :

Carbolin simple. — Régulateur physiologique de l'intestin, pansela muqueuse intestinale, absorbe les gaz, supprime les spasmes gastro-intestinaux.

Carbolin composé. — Stimulant physiologique de l'intestin, contrôle la digestion, assure la rééducation motrice des intestins paresseux.

Indications :

Carbolin simple. — La Coprostase et toutes ses conséquences. Aucune contre-indication. S'associe à toute médication complémentaire.

Carbolin composé. — Constipation chronique, Atonie intestinale, une selle par jour, sans spasmes, sans diarrhée.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café avant les repas. Mettre les graines sèches dans la bouche et les avaler avec une gorgée de liquide, sans les croquer.

Durée du traitement : 10 jours.

Remboursé à 80 p. 100 aux Assurés Sociaux (Catégorie B)

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

CARBOMUCIL

(Normacol + Charbon).

Préparation associant le pouvoir adsorbant d'un charbon activé aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Avantages. — Assure l'action du charbon tout le long du tractus digestif, les grains de CARBOMUCIL ne libérant la poussière de charbon que peu à peu, au cours de leur gonflement très progressif.

Permet en particulier l'action du charbon dans les côlons et le rectum, en s'opposant par le noyau mucilagineux à la dessiccation du contenu de ces organes (le charbon n'agit qu'en milieu humide).

Indications. — Tous états digestifs avec fermentations anormales. Aérophagie.

Emploi. — Par cuillerée à café, à la fin ou en dehors des repas. Mettre le granulé sec dans la bouche et l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 13 fr. 85.

Laboratoire NORGAN

PIERRE ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-00.)

CARBONAL MAGNÉSIEN

Charbon médicinal superactif

Ed. Urbain

Association du charbon végétal superactif *Ed. Urbain* avec 0 gr. 20 d'hydrate de Magnésie.

Indications — Fermentations stomacales, hyperacidité, affections ulcéreuses et cancéreuses de l'estomac, aérophagie.

Aucune contre-indication.

Posologie. — Un cachet au milieu ou à la fin des repas avec une gorgée d'eau ou de tisane refroidie.

CARBONAL PRINCEPS

Charbon Médicinal Superactif

Ed. Urbain.

Charbon végétal superactif *Ed. Urbain* pur.

Ne contient aucune trace de soufre et de produits cyanurés : ne renferme aucune substance minérale toxique, chauffé à sec ne dégage aucun produit empyreumatique.

Indications. — Intoxications, diarrhées, fièvre typhoïde et paratyphoïde, dysenterie, *suites opératoires* (gaz des opérés).

Aucune contre-indication.

Posologie. — Un cachet à la fin de chaque repas avec un peu d'eau ou d'infusion peu chaude.

Prix : la boîte de 30 cachets, 13 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 365-2 et 365-3.

Laboratoires du CARBONAL

14, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine.)

(Tél. : Défense 10-27.)

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément: le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum*: dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun; dans les *Golites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies: *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON
(anciennement, 3, rue Sébastien-Gryphe).

CARBONATE DE CHAUX ADRIAN

Composition :

Carbonate de chaux pur, légèrement sucré et menthé.

Propriétés :

Alcalin, saturant de l'acidité gastrique, anti-fermentescible, eupeptique.

Indications :

Hyperchlorhydrie, gastralgies, fermentations acides, dyspepsie.

Présentation :

Comprimés dosés à 25 centigrammes.

Posologie :

2 à 4 comprimés une heure avant le repas et autant après le repas, si besoin.

Prix : Le flacon, 12 fr. 80.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CARBONÉSIE

Cachets et Granulé

Composition. — Charbon activé, charbon animal, charbon végétal, magnésie calcinée légère, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux.

Indications. — Gastro-entérites, fermentations intestinales, entérocolites, intoxications et auto-intoxications, diarrhées, colibacillose et ses conséquences.

Avantages :

- 1° Activité maximum vis-à-vis de toutes les toxines grâce aux 3 charbons, à parties égales.
- 2° Ne constipe pas, grâce à la magnésie.
- 3° Ne contient aucun corps chimique irritant ni toxique.

Posologie :

Cachets : Un ou deux après chaque repas.

Granulé : De goût très agréable : 1 à 3 cuillerées à café après chaque repas.

Prix :

Boîte de 30 cachets	17 fr. 20.
Boîte de 100 gr. de granulé.....	17 fr. 20.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

CARBOQUINOL

Comprimés à base de :

Sulfate neutre d'oxyquinoléine.	0 gr. 03
Hydrate de magnésie	0 gr. 05
Charbon végétal	0 gr. 10

Indications :

Colibacillose (syndrome entéro-rénal de Heitz-Boyer).

Gripes intestinales.

Tous les troubles *intestinaux, biliaires et urinaires*.

Avantages. — Antiseptique plus puissant que produits à base d'*Hexaméthylène-tétramine*.

Agit dans tous les milieux (acide, alcalin ou neutre), sans irriter les muqueuses.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 comprimés aux principaux repas.

Enfants : 1 à 2 comprimés aux principaux repas.

Prix : 15 francs la boîte de 60 comprimés, pour quinze jours de traitement.

Laboratoire RAVALEC

HERBLAY (Seine-et-Oise). — Tél. : 83.

CARBOREXYL

Estomac-Intestin.

Principes actifs:

Charbon de peuplier léger et poreux à l'état d'extrême division, simple ou associé à l'Urotropine, au Benzonaphtol ou à la Belladone.

Composition:

Pour répondre aux exigences de la thérapeutique nous mettons à la disposition du corps médical 4 formules :

Carborexyl « S » (simple) chaque comprimé = 1 gr. de charbon.

Carborexyl « F » (forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine.

Carborexyl « NF » (naphto-forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine et 25 cgr. de Benzonaphtol.

Carborexyl « B » (Belladone) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 1 cgr. d'extrait et 1 cgr. de poudre de belladone.

Forme:

Comprimés friables, agréables au goût.

Indications:

Hyperacidité, Hypersécrétion, Dyspepsie, Aérocolie, Spasmes douloureux, Dilatation d'estomac, Syndrome entéro-rénal et entéro-hépatique, Colibacillose, Cholécystite, Diarrhée, Intoxication exogène et endogène.

Remarque importante :

Par sa composition, le *Carborexyl Belladone* trouve plus spécialement ses indications dans les cas de gastro-pathies douloureuses, spasmes du côlon et la constipation qu'ils provoquent. Etant donné son pouvoir toxique, il ne devra être employé que sur ordonnance du médecin.

Posologie :

1 à 3 comprimés par jour, à diminuer ou à augmenter suivant les indications du médecin traitant.

Mode d'emploi :

Croquer ou, de préférence, laisser fondre le comprimé dans la bouche.

Prix :

Carborexyl S	} La boîte 15 francs.
Carborexyl F	
Carborexyl NF	
Carborexyl B	: La boîte 16 francs.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion

A. CHATAIN, Docteur en pharmacie.

Ex-Interne en pharmacie des Hôpitaux de Lyon.

Diplômé de Bactériologie.

Dépôt général : 57, rue Pierre-Corneille — LYON.

(Tél. : Lalande 41-81.)

CARBOS

Composition. — Le premier charbon animal activé obtenu chimiquement pur, sans Sulfures ni Cyanures.

Forme. — *Comprimés* de 1 gr. *Granulé* à 60 p. 100, soit 3 gr. de charbon par cuillerée à café.

Indications. — Dyspepsies gastro-intestinales avec flatulences, Fermentations, Putréfactions, Infections intestinales aiguës et chroniques, Empoisonnements, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

Posologie. — *Comprimés* : 3 à 5 avant ou après les repas. *Granulé* : 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 16 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Autorisé pour A. S.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
(Tél. : 30.)

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR
D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocolites, Diarrhées intenses.

Formes. — Granulé, poudre et cachets.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS
(Tél. : Gobelins 23-90.)

CARBOTRIGON

Synonyme Biotrignon Hépatique.

Composition :

Charbon végétal *activé*,
Extrait mou de fenu grec **désodorisé**,
présentés en granulé friable.

Propriétés :

Allie le pouvoir adsorbant et antitoxique du charbon activé aux propriétés stimulantes, nutritives et apéritives du fenugrec.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 cuillerées à café par jour, avant les repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

(Tél. : Ségur 79-58.)

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure.

Principe actif du *Strophantus gratus*.

Présentation et posologie :

1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique à

2 p. 1 000 (XXV gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : X à XXX gouttes par jour.

Doses moyennes : L à C gouttes par jour.

2° *Voie intraveineuse.* — Boîte de 8 ampoules

titrées telles que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/2 à 1 cc. p. injec.

Indications. — Insuffisances cardiaques avec importante dilatation ventriculaire et rythme régulier. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaïne**.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV°). (Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : *Agent général* : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

CARDIOFLORINE

(Dragées roses cardio-néphrotropes).

Priorité. — La barbiflore (*Orthosiphon stamineus*) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale, *Adonis vernalis* et Scille.

Propriétés. — Diurétique cardiotonique. Désintoxicant et uréopoiétique de grande valeur. Remplace et continue l'action des digitaliques. Ne s'accumule pas.

Indications. — Insuffisances cardiaques et cardio-vasculaires, Insuffisance rénale, Artériosclérose, Hypertension, Œdèmes de toute étiologie, Troubles valvulaires, Syndromes neuro-cardiaques, Essoufflement, Obésité, Oliguries, etc.

Posologie. — 1 à 6 dragées dans les intervalles des repas, en moyenne 3 par jour.

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA » MONTE-CARLO

« La Barbiflore en thérapeutique ».

CARDIOPHYLLINE

Composition :

Aminophylline	0,10
Adénosine.....	0,001
Extrait myocardique.....	0,05

Propriétés. — Les composants de la cardiophylline concourent à faire de ce produit le traitement de choix des angoissés du cœur et des cardio-rénaux grâce à leur action vaso-dilatatrice sur les coronaires, antalgique cardiaque et diurétique.

Indications. — Toutes les algies cardiaques ; Angine de poitrine ; Aortites ; Palpitations, spasmes vasculaires ; Dyspnées, Asthme ; Ascites ; Œdèmes.

Présentation et posologie. — Boîte de 30 globules (3 à 6 globules par jour).

La Cardiophylline ne s'accumulant pas dans l'organisme peut être prescrite longtemps sans inconvénient.

Elle n'a pas de contre-indications.

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. Nord 19-52).

CARDIOR

Introduction de l'or
en thérapeutique cardio-vasculaire.

Composition. — Or métallique rendu soluble par photolyse ; alcoolature de sumbul ; alcoolature d'uva-ursi.

Forme. — Gouttes.

Indications. — *Abaisse la tension artérielle d'une façon progressive et durable, sans les accidents attachés à une chute trop rapide. Combat l'artériosclérose et les troubles vaso-moteurs liés à l'hypertension. Stimule la fonction rénale.*

Aucune contre-indication.

Posologie. — VIII à X gouttes dans un peu d'eau pure loin des repas. Traitement prolongé sans inconvénient.

Admis par les A. S.

Laboratoires ROBIA

M. ROBILLIART, Pharmacien — LILLE.

CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

Définition :

La Cardiosthénine constitue un tonicardiaque antispasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

Formule :

Chaque capsule contient :

Extrait de Strophantus	0 gr. 0005
Sulfate de Spartéine.....	0 gr. 02
Extrait de Cratægus Oxyacantha.....	0 gr. 05
— stabilisé de Valériane.....	0 gr. 05

Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goitre exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-artériosclérose, Urémie.

Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Prix : 16 francs.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et C^{ie}

Laboratoire de Pharmacologie Générale

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

CARDIO-STREPTINE

Vaccin polyvalent pour la Prémunition de la maladie rhumatismale et de ses complications cardiaques.

Corps microbiens + lysats + anatoxine.

Posologie. — 1 injection sous-cutanée tous les 6 à 8 jours aux doses progressives de $\frac{1}{4}$ de cmc.

$\frac{1}{2}$ cmc. — 1 cmc. — 1 cmc. $\frac{1}{2}$.

Prix. Les 4 ampoules de 2 cmc. : 42 fr. 60.

Littérature et échantillons aux

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS

(Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes)).

CARDIRÈNE

Composition par cachet. — Digitale stabilisée 0,035, Scille 0,035, Buchu 0,22, Phosphate de soude 0,15, Théobromine recristallisée 0,30.

Forme. — Cachets.

Indications. — Tonique du cœur, Diurétique puissant, Maladies du Cœur et des Reins, Artériosclérose, Albuminurie, Hydropisie.

Action rapide et de longue durée sans fatigue de l'Estomac ni accoutumance.

Doses. — 2 à 3 pendant 5 jours, puis 1 pendant 10 jours. Cesser 10 jours et reprendre le traitement.

Prix : 18 fr. 70 la boîte de 24 cachets.

Durée de la boîte : 20 à 25 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle dans le n° 1403-2.

L. ROBERT, Pharmacien

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : 0-70.)

CARDITONE

Propriétés thérapeutiques. — Cardiopathies valvulaires ; Insuffisance cardiaque, Hyposystolie, Asystolie, Hypotension essentielle.

Composition :

Extrait de Strophantus	0 gr. 001
Sulfate de Spartéine.....	0 gr. 02
Extrait de Muguet	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé de.....	0 gr. 35

Mode d'emploi. — 2 à 5 comprimés par jour suivant prescription médicale.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

Tél. : Aut. 81-45 (deux lignes groupées).

CARDOSOL

Composition par 100 grammes.

Berberis vulgaris.....	0,4138
Carduus marianus	0,4229
Chelidonium majus	0,4653
Fumaria officinalis.....	0,4080
Hydrastis Canadensis.....	0,4850
Mentha piperita	0,3930
Mercurialis annua.....	0,3765
Taraxacum	0,5355
Glycérine.....	4,5000
Soluté alcalin.....	92

Propriétés thérapeutiques. — Calme et décongestionne.

Indications principales. — Lithiase biliaire, Rénale, Intestinale ; Coliques hépatiques ou néphrétiques, Insuffisance hépatique ou rénale, Angiocholite, Cholécystite, Cholémie, Ictère, Cystite, Pyélonéphrite calculeuse, Rhumatisme biliaire.

Mode d'emploi. — Se prend par verre à porto :

1^o Le matin au réveil ; 2^o Vers 9 heures ; 3^o Vers 16 heures ; 4^o Le soir au coucher.

Prix. — Le flacon : 16 fr. 90.

Laboratoire du CARDOSOL

Michel BAGROS, Pharmacien,

32, rue Mortinat — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 34-23.)

CARÉNA

L'aminophylline française.

THÉRAPEUTIQUE CARDIO-RÉNALE

Composition. — Aminophylline synthétique pure de fabrication française (théophylline-éthylènediamine).

Action pharmacologique. (Voir *Aminophylline*.)

ANTALGIQUE CARDIAQUE,
DIURÉTIQUE ATOXIQUE
EUPNÉIQUE.

Dilate les vaisseaux coronaires, lève les spasmes coronariens, assure une meilleure nutrition du myocarde et accroît le débit systolique.

Augmente la diurèse. « Lève les barrages » et soulage le travail du cœur dans les syndromes rénaux avec complication cardiaque associée.

Indications : Douleurs et oppressions des cardiaques.

Angine de poitrine. Infarctus du myocarde.

Aortites, Arythmies, Ascites et Œdèmes.

Oliguries des maladies infectieuses.

Dyspnées, Asthme, Cheyne-Stokes.

Avantages : *Rapidité d'action par voie digestive.*

Ni mercure ni scille. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Posologie :

Comprimés : dosés à 0 gr. 10 d'aminophylline.
1 ou 2 comprimés, 3 à 4 fois par jour, à la fin des repas.

Boîtes de 40 et de 200 comprimés.

Gouttes : 1 goutte = $\frac{1}{2}$ centigramme d'aminophylline.

X à XXX gouttes dans un peu d'eau, 3 à 4 fois par jour, après les repas.

Suppositoires : dosés à 0 gr. 40. Un ou deux suppositoires par jour.

Ampoules. (Voir *Caréna injectable*.)

Remboursable par les Assurances Sociales à 80 %.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, bd de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60.)

CARÉNA-CALCIUM

Théophylline calcique française

La théophylline calcique possède toutes les propriétés et indications de la théophylline-éthylène-diamine (Voir *Aminophylline* et *Théophylline*); mais son absorption intestinale est plus lente et, si son action est moins rapide, ses effets sont plus persistants.

L'ion-calcium augmente les propriétés diurétiques et toni-cardiaques de la théophylline.

Caréna-Calcium est indiqué chez les malades dont le tube digestif est délicat et chez les hyperchlorhydriques.

Présentations :

Comprimés : 3 à 8 comprimés par jour.

Ampoules intraveineuses (10 cc.) : 1 ampoule par jour.

CARÉNA INJECTABLE

L'aminophylline française injectable.

Indications. — *Tous les cas d'urgence :*

Infarctus du myocarde, crises graves d'angine de poitrine, œdèmes aigus du poumon (*Caréna + Ouabaïne*), anasarques des cardio-rénaux, dyspnées cardiaques, dyspnées des urémiques, oliguries infectieuses (*goutte à goutte intraveineux*).

<i>Caréna</i>	{	<i>Ampoules de 2 cc., contenant 0 gr. 50 d'aminophylline ; injecter en plein muscle $\frac{1}{2}$, 1 ou 2 ampoules par jour.</i>
<i>Intramusculaire</i>		
(Cas habituels).		

<i>Caréna</i>	{	<i>Ampoules de 10 centimètres cubes contenant 0 gr. 25 d'aminophylline ; injecter très lentement. en 3 minutes environ.</i>
<i>Intraveineux</i>		
Cas spéciaux).		

On peut utiliser par voie intraveineuse une demi-ampoule de *Caréna* intramusculaire diluée dans 10 cc. de sérum glucosé.

CARÉNA-OUABAÏNE

Toutes les indications de l'Ouabaïne.

Propriétés. — L'association *Caréna-Ouabaïne* augmente l'énergie du cœur tout en assurant une meilleure nutrition du myocarde par la dilatation des coronaires. *Caréna-Ouabaïne* soulage la dyspnée et déclenche la diurèse.

Indications. — Toutes les formes d'insuffisance cardiaque.

Asystolie des aortiques. Œdème aigu du poumon.

Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.

Cœur des vieillards : traitement d'entretien.

Posologie. — *Comprimés* contenant 5 centigrammes de *Caréna* et 1 milligramme d'*ouabaïne*. 4 à 10 comprimés par jour.

Ampoules intraveineuses contenant 10 centigrammes de *Caréna* et un quart de milligramme d'*Quabaïne*.

Injecter une demi à 2 ampoules, lentement, dans la veine, en suivant toutes les directives des traitements par l'*Ouabaïne*.

Remboursables par les Caisses d'Assurances Sociales à 80 p. 100.

Société d'Applications Pharmacodynamiques
39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Invalides 43-60).

CARNINE LEFRANCO

Composition. — Suc Musculaire de viande de bœuf crue concentrée à froid sans addition de sang. Contient tous les ferments vivants, vitamines et antitoxines, de la viande crue.

Propriétés. — Reconstituant énergétique reminéralisant, recalcifiant.

Indications. — Toutes les anémies, tuberculose, convalescence, troubles de la croissance, rachitisme, lymphatisme.

Présentation et posologie. — Carnine ordinaire en flacons (650 grs. 325 grs. environ). Carnine concentrée en ampoules, 10 ampoules buvables de 10 cc., 2 à 3 ampoules ou cuillerées à soupe par jour dans un liquide froid ou tiède (eau naturelle ou gazeuse, lait, bouillon, etc.).

Remarque. — La Carnine Lefrancq peut être employée chez le nourrisson en la mélangeant au lait tiède, à la dose de deux cuillerées à café ou une ampoule.

Remboursable aux ASSURANCES SOCIALES

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

CAROTTASE

Composition. — Poudre de carottes fraîches stabilisées à froid. 1 gr. de carottase = 4 gr. de carotte fraîche. Aliment végétal renfermant des sels minéraux naturels complètement assimilables, des substances albuminoïdes, des hydrates de carbone, de la cellulose ultra-divisée et des vitamines A, B, C.

Forme. — Poudre.

Indications. — Favorise le développement des enfants et des nourrissons, excite l'appétit, active la croissance, stimule les fonctions de la nutrition et régularise les fonctions intestinales.

Doses. — Après 2 mois, 1 pincée dans chaque biberon (0 gr. 50). — Après 3 mois, 1/2 cuillerée à café. — Après 6 mois, 1 cuillerée à café. — Après 8 mois, de 2 à 4 cuillerées à café.

Pour conserver à la Carottase toute son efficacité, *ne jamais faire cuire*, la délayer avec du lait bouilli et refroidi, puis l'ajouter au biberon, bouillies ou panades déjà préparées.

Pour les produits à base de poudres de légumes frais (carottes, tomates, épinards), voir également VÉGUVA et VÉGUMINE.

Durée moyenne de consommation : 1 mois.

Société anonyme des Établissements WANDER
CHAMPIGNY-sur-MARNE (Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

CASCARA ÉPARVIER

« Pilules ÉPARVIER »

Forme. — Pilules dosées à 0,10 d'extrait de Cascara pur, *sans aucun drastique.*

Action. — Laxatif doux, *ne donnant pas de coliques.*

Indications. — Constipation de différentes origines et notamment d'origine hépatique. Laxatif de choix pendant la grossesse et l'allaitement.

Posologie. — 2 pilules le soir, *même si l'on a été à la selle dans la journée.*

Efficacité sûre. Accoutumance nulle.

Laboratoires ÉPARVIER

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON.

(Tél. : 150-21.)

CASCARA MIDY

A base de *Cascara Sagrada* naturel.

Pilules dosées à :

0 gr. 10 d'extrait hydro-alcoolique codex de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

0 gr. 20 de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Doses et mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Prix : 9 fr. 90.

Durée du traitement : un mois.

Remboursé à 80 p. 100 aux Ass. Soc. (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

CASOL

Présentation. — Sirop.

(Voir LUDIN.)

Laboratoires REY

DIJON,

(Tél. : 22-12.)

CASSILAX

Traitement de la constipation.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Bourdaine, Podophyllin, Aloïne, Extrait de belladone, Ferments lactiques, Entérokinase, Séné, Agar-agar.

Indications. — Rééducateur de l'intestin, Entérites chroniques, Dermatose, Intoxication gastro-intestinale. Laxatif doux, non irritant. Sans accoutumance.

Posologie. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-29.

A. DJIAN, Pharmacien de 1^{re} classe
137, rue de Belleville — PARIS.

CASTANOL

Coqueluche. Toux des ganglionnaires.

Toux quinteuses rebelles.

Composition. — Extraits de feuilles de châtaignier iodé, de Drosera, d'Anémone, de Grindelia, de Balotte.

Aucun produit chimique,

Aucun toxique.

Délicieux au goût,

Fortifiant iodotannique de choix.

Posologie :

Enfants : au-dessous d'un an : quatre 1/2 cuillerées à café par jour.

—	de 1 à 2 ans :	3 cuillerées à café par jour.	
—	de 2 à 4 ans :	4	— à café —
—	de 4 à 8 ans :	4	— à dessert —
—	de 8 à 12 ans :	3	— à soupe —

Adultes : 4 cuillerées à soupe.

Prix : 16 fr. 50.

Pierre LACHAISE, Docteur en Pharmacie
9, place Municipale — TULLE (Corrèze.)

CATALYL

Solution de Chlorure de Magnésium pur associé au Chlorure de Calcium dans un liquide physiologique spécial. Activité intense, Toxicité nulle, Stabilité.

Seule préparation Magnésienne de goût vraiment agréable.
Suppression sur les conditionnements et la littérature de toute allusion au cancer.

Indications :

Asthénies, Surmenages, Hépatisme, Paludisme, Sénilité prématurée, Dermatoses, Prostatites, Diabète, adjuvant puissant des traitements opothérapiques.

Mode d'emploi :

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun, dans demi-verre d'eau ou de lait sucrés ou non. Dose variable.
Une cuillerée à café = 0 gr. 50 de MgCl² anhydre + 0 gr. 10 de Chlorure de Calcium.

Prix : 17 francs.

Laboratoire du MAGSALYL

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE.
(Tél. : Italie 16-91.)

CATAPLASME DU D^r LELIÈVRE

Antiseptique instantané, émollient, résolutif.

Approuvé par l'Académie de Médecine de Paris.

Avantages et indications. — Il est *instantané et économique*. Plus de manipulations compliquées, plus de linges.

Il est *antiseptique et résolutif*. — Abscesses, furoncles, anthrax, panaris.

Il est *anesthésiant*. — Contusions, entorses, brûlures, engelures, eczémas, zona.

Il est *antiphlogistique et émollient*. — Ecchymoses, épanchements, hydarthrose.

Il est *décongestif*. — Laryngites aiguës, faux croup et toutes inflammations.

Il est *inaltérable et remplace tous les pansements humides*

Mode d'emploi. — Soumettre le cataplasme ou un morceau de cataplasme à une faible quantité d'eau tiède ou chaude jusqu'à parfait gonflement, l'appliquer sur la partie malade et recouvrir d'imperméable.

Comme *véhicule*, ce Cataplasme accepte et retient facilement les substances médicamenteuses les plus variées : laudanum, arnica, etc.

On obtient un *Cataplasme sinapisé* en le saupoudrant de farine de moutarde au moment de l'application.

Prix : la pochette de 5 catap. : 8 francs.

E. BOULLE, pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-Interne des hôpitaux. — Lauréat de la Faculté de Paris

19, rue de la Porte-Trivaux — CLAMART (Seine.)

(Tél. : Michelet 15-70.)

CATHACIDE

(AMPOULES)

Curatif des États acidosiques.

Fixateur (par voie indirecte) des sels de calcium.

Propriété thérapeutique :

Neutralise l'acidose humorale pathologique, cause de la déminéralisation et des différentes manifestations liées à une rupture (vers l'acidose) de l'équilibre général acido-basique.

Composition

Solution injectable de citrate neutre de soude pur, en milieu aqueux (5 o/o), convenablement stérilisée.

Mode d'action :

Le Cathacide, introduit dans l'organisme, soit par voie hypodermique, soit par voie intraveineuse, se transforme par oxydation de la partie organique (ion citrique) en *carbonate de sodium*, développant ainsi dans l'intimité des tissus la faible alcalinité suffisante pour neutraliser, d'une manière efficace, progressive et durable, l'acidité pathologique. A noter que la plupart des manifestations acidotiques s'accompagnent des symptômes de *déminéralisation*. En effet, aussi longtemps que le terrain demeure acidotique, aucune fixation de sels de chaux ne peut se produire. Cette constatation, qui explique l'échec des traitements habituels, montre qu'il convient avant tout de neutraliser l'acidose pathologique. La fixation des différents sels (que l'alimentation normale suffit largement à fournir) se produira ensuite normalement.

Indications :

États légers d'Acidose. Carence minérale, rachitisme et déminéralisation, eczéma infantile, gourme, retard de dentition, carie dentaire, troubles de la puberté, lymphatisme, surmenages intellectuels et physiques, convalescences.

États chroniques d'Acidose. Ulcères gastriques et duodénaux, états allergiques en général, urticaire, maladie de Recklinghausen, déficience calcique, ostéomalacie, ostéophytes, vomissements de la grossesse, états pré-tuberculeux, etc...

États graves d'Acidose. États anaphylactiques, syndromes hémorragiques, anémies graves, néphrites aiguës, choc post-opératoire, brûlures étendues, coma diabétique, etc...

Posologie :

États légers (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ou 2 ampoules hypodermiques de 2 cc. par 24 heures.

États chroniques (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ampoule intraveineuse de 5 cc. (ou 2 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

États graves 2 ampoules intraveineuses 5 cc. (ou 4 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

Nota :

Dans tous les cas, le traitement doit être prolongé jusqu'à complète satisfaction confirmée.

L'efficacité et la rapidité d'action dépendent du stade d'acidose au cours duquel le traitement est instauré.

En général, la cure de Cathacide se traduit, au début, par une période de légère lassitude (1^{re} décade) suivie d'améliorations sensibles qui ne cessent de s'accroître (vitalité accrue, euphorie, augmentation de poids, raffermissement des tissus, etc...); ces résultats sont faciles à contrôler par les moyens habituels : pesées périodiques, analyses d'urines, taux de viscosité sanguine, etc...

Avantages :

L'injection est indolore. Ni réaction locale ou générale, ni contre-indication, ni accoutumance.

Prix et Formes :

Coffret	20 ampoules hypodermiques de 2 cc.....	Frs. 26.50
Boîte	10 — 2 cc.....	18.75
—	10 — intraveineuses 5 cc.....	29.50
—	5 — 5 cc.....	18.75

Laboratoires UROCLASE

G. BERTIN, Pharmacien

95, rue de Prony — PARIS (17^e). Tél. Galvani. 76-86.

CAVÉFORM

Simple ou benzonaphtol

Granulé ou cachet.

Composition :

Charbons :	Granulé par cuiller à café.	Cachet.
Animal exempt de cyanogène.....	0 gr. 50	0 gr. 25
Végétal activé.....	0 gr. 50	0 gr. 25
FORMol naissant.....	0 gr. 20	0 gr. 10

(Hexaméthylènetétramine.)

Avec ou sans Benzonaphtol..... 0 gr. 20 0 gr. 10

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique interne. Très puissant adsorbant des alcaloïdes, bactéries, toxines, gaz, poisons minéraux.

Indications. — Infections intestinales, urinaires et biliaires. Auto-intoxications. Colibacillose. Cystite. Diarrhée. Entérites. Empoisonnements aigus alimentaires. Fermentations intestinales. Mauvaise haleine. Urticaire.

Mode d'emploi. — Après chaque repas : 1 cuillerée à café de granulé ou 1 à 2 cachets.

Présentation pharmaceutique et prix :

Granulé friable : 13 francs le flacon.

Cachets : 15 francs la boîte de 30.

D. RAQUET, Pharmacien Supérieur.

Licencié ès sciences,

114, rue Solférino — LILLE.

CÉDOSEPTOL

Médication anti-infectieuse

Composition :

Sulfate de manganèse.....	0,071	Sulfate de fer.....	0,072
cuivre.....	0,028	— calcium.....	0,104
magnésium.....	0,091	Camphre.....	0,077

Pour 1 cc. quantité en milligrammes.

Solution huileuse de catalyseurs métalliques associés au camphre et dissous en combinaison organique lipodique.

La dilution extrême de ses constituants le rend parfaitement osmosable et rapidement dissocié *ad intra*. Action extrêmement efficace.

Forme : Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. en boîte de 6 et de 12.

Capsules glutinisées (étui de 20). Pommade en pot de 30 et 90 grammes.

Indications : Pneumonie — Broncho-pneumonie — Congestion — Pleurésie — Endocardite — Phlébite — Péritonite — Typhoïde — Fièvre puerpérale — Grippe — Méningite — Maladies éruptives — Scarlatine — Rougeole — Streptococcies — Staphylococcies — Erysipèle — Diphtérie — Encéphalite récente — Rhumatisme infectieux — Arthrite rhumatismale.

Posologie : En injections intramusculaires profondes, faites très lentement (aiguille 9/10e) une piqûre matin et soir.

Dans les cas graves : une piqûre de 5 cc. toutes les 3 heures jusqu'à cessation de la fièvre. Jamais de complication.

Diphtérie et tétanos : dans ces cas-là, sans préjudice du *sérum spécifique*, on injectera deux ampoules de Cedoseptol par jour comme puissant adjuvant et *préservatif* des séquelles habituelles.

Pommade pour les pansements dans les plaies infectées.

L. N. C. M. N° 1024-1. — Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoire des HORMOMETALIONS

50, avenue Jacqueminot, MEUDON (Seine et-Oise). (Tél. : Obs. 13-33.)

CELLARGOS

Antiseptique intestinal.

Composition. — Cellocarbone (charbon spécial de coton activé). Argent colloïdal et Bismuthate d'oxybenzopyridine.

Antiseptique, absorbant, sans toxicité.

Indications. — Infections intestinales, Diarrhées estivales, Syndrome entéro-rénal, Colibacilloses. Fermentations, Entérites, Colites.

Posologie. — Prendre 1 ou 2 cachets avant ou après chaque repas principal.

Présentation. — En boîte de 30 cachets pour un traitement de 10 à 15 jours.

Prix : 13 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél : Carnot 78-11.)

Bande plâtrée CELLONA

(Bande **Platrix** à prise rapide.)

Forme. — Plâtre adhérent à la tarlatane, d'où présentation du plâtre en nappe. Bandes de 2 et 4 mètres de long sur 10-12-15-20-25 et 30 centimètres de large. (Largeur de 40 et 50 centimètres sur demande spéciale.)

Avantages :

- 1^o *Transport des bandes* : Encombrement réduit, légèreté.
 - 2^o *Confection du plâtre* : Propreté ; à l'immersion, la bande est totalement imprégnée d'eau en 3 à 5 secondes ; rapidité de par la quantité de plâtre apportée par la bande.
 - 3^o *Masse constituée* : Plâtre à prise rapide d'excellente qualité, permettant un modelage parfait et accusant une résistance à la rupture et au choc, à la flexion, double de celle obtenue avec un plâtre courant, d'où : légèreté des appareils constitués, poids et encombrement réduits de moitié.
- En fin, aspect extérieur lisse et brillant.

Mode d'emploi. — Immerger verticalement la bande, pendant 4 secondes environ, dans l'eau, sans addition saline. Exprimer légèrement et envelopper circulairement ou longitudinalement, en lisant la masse à chaque apport de plâtre. Pour parfaire le moulage, on peut, avant la prise du plâtre, envelopper la masse d'une tarlatane apprêtée et lisser une ultime fois à la main en apportant sur la masse un peu de plâtre. À cette fin, exprimer à fond une bande immergée et essorée.

Indications. — Tous les cas médicaux chirurgicaux nécessitant l'immobilisation.

S'emploie pour la confection des attelles et des négatifs orthopédiques, etc...

Laboratoires FISCH (S.A.R.L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS : 104, Fg Poissonnière (X^e) — (Tél. : Trudaine 92-52.)

CELLUCRINE

Régénération sanguine par un principe spécifique globulaire.

Tonique général.

Indications. — Toutes les anémies, Déficiences organiques, aucune contre-indication.

Présentation. — Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif.

Posologie. — 2 à 3 dragées ou plus par jour suivant indication du médecin.

Prix. — La boîte de 30 dragées : 20 francs.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaug. 11-23.)

CELLULAX

Laxatif antitoxémique physiologique à base de celluloses végétales ; de présentation agréable.

Composition. — Ni drastiques, ni cathartiques.

Son de blé 20 p. 100 : Laxatif sélectionné, stabilisé, déshydraté, désamidonné. (Travaux du prof. Fiessinger.)

Lactose 20 p. 100 : Antitoxique, antifermentescible. (Travaux des auteurs américains.)

Gélose pure 6 p. 100 : Emollient, absorbe quinze fois son poids d'eau. Aucune autre substance médicamenteuse.

Indications. — Constipation chronique et rebelle ; atonie intestinale, dystonie gastrique, ptoses, aérocolie ; colites membraneuses, entérocolites, colibacilliose, dermatoses, migraines, mauvaise haleine, grippe à forme intestinale.

Présentation. — Granulés sans odeur et de goût délicat.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café, à la fin des repas.

Enfants : au-dessous de 10 ans, une cuill. à café après le repas du soir.

Cure de dix jours par mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 733-7.

Laboratoire BIOPHARMAX

40, Quai Jeanne-d'Arc — CHINON (Indre-et-Loire). (Tél. : 131.

CÉPAÏNE

Spécifique certain de toutes les toux, bronchites, laryngites, affections respiratoires, pulmonaires.

Composition. — Gelsemium sempervirens, Lobelia Inflata, Drosera rotundifolia, Cepallium, Erysimum, Aunée, Myroxylon, Balsamum; Sulfogalacolate de Potasse, Phosphate de Codéine, Organes frais (poumon, glandes surrénales, hypophyse).

Indications. — Toux spasmodiques, coqueluchoïdes, catarrhales; rhumes; Bronchites aiguës, chroniques, hémorragiques; enrrouements; coryza; laryngites; trachéites; gripes; angines; douleurs intercostales; points de côté; tuberculose, etc...

Posologie. — *Enfants*: jusqu'à 1 an II gouttes 6 fois par jour dans un peu de lait, d'eau, de tisane sucrés ou non.

De 1 an à 3 ans 5 gouttes 6 fois par jour.

— 3 ans à 8 — 10 — —

— 8 — 15 — 15 — —

Adultes 20 — —

La conservation de la Cépaïne est indéfinie, elle ne s'altère jamais. Elle présente sous un volume réduit et peu encombrant la valeur de trois grands flacons de sirop pour la toux. Sa préparation demande plus de trois mois.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LORMEAU
27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

CÉPHALGI-LYSINE

DU

DOCTEUR L. DELALBRE

EX-GRAINS CÉPHALGIFUGES

PRÉPARATION

PHYTOTHÉRAPIQUE ET OPOTHÉRAPIQUE
AU

JASMIN DE VIRGINIE

CURATIVE

DES

NÉVRALGIES REBELLES

ET

ALGIES RHUMATISMALES

(articulaires-musculaires-viscérales)

pour

médication synergique végétéo-organique

AVEC ACTION ÉLECTIVE SUR LES
NERFS CÉPHALIQUES

(trijumeau-facial)

PRÉSENTÉE sous forme de PILULES

- COMPOSITION -

Poudre de racines de Gelsémium sempervirens	0 gr. 04
Poudre de racines d'Aconit napel	0 gr. 01
Poudre d'écorce de racines de Piscidia erythrina	0 gr. 04
Extrait mou de Quinquina jaune	0 gr. 04
Cholestérine pure	0 gr. 01
Poudre de Fole	0 gr. 03
Poudre de Rate	0 gr. 02
Extrait mou de Colombo, Gentiane, Quassia amara, aa	0 gr. 01
Pour 1 pilule.	

Excipient spécialement étudié - Enrobage soluble dans l'eau.

NOTA. - Le Gelsémium sempervirens ou Jasmin de Virginie, arbuste grimpant à fleurs jaunes, surtout employé en Amérique contre les névralgies, est la base de la *Céphalgi-Lysine*.

- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES -

Toutes douleurs tenaces de toutes régions.

----- TRÈS RARES CONTRE-INDICATIONS -----

- MODE D'EMPLOI ET DOSES -

La Céphalgi-Lysine se prend généralement 1/4 d'heure avant les repas.

Les pilules s'avalent avec un peu d'eau ou bien à sec.

On peut aussi les ingérer écrasées et mélangées à de la confiture.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

ADULTES :

1 pilule 1/4 d'heure avant chacun des 3 repas (matin, midi et soir)
pendant 20 jours consécutifs - Cesser 10 jours pour reprendre s'il y a lieu.Pour la durée du traitement et pour doses supérieures,
se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS : 2 pilules par jour (matin et soir).

ENFANTS (au-dessus de 8 ans) : 1 pilule par jour.

PRIX AU PUBLIC : 25 fr. 00 LE FLACON de 60 pilules

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

P.-L. DUMONT, Pharmacien

2, Rue Claude Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11 et 22-68.)

CÉRÉBRINE FOURNIER

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

Cérébrine simple. — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

Cérébrine bromée. — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles et les tranchées utérines.

Cérébrine bromo-iodée. — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

Cérébrine iodée. — Névralgies rhumatismales.

Cérébrine quiniée. — Courbature, grippe infectieuse.

Dose. — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Prix. — 15 francs le flacon.

Lab^{re} de la Cérébrine Fournier

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 50-57.)

CÉRÉBRO-LIPASE

Comprimés.

Médication reconstituante opothérapique.

Composition. — Cerveau total de taureau fraîchement abattu, substances blanche et grise. Jusquiame, Méthylarsinate disodique.

En comprimés kératinisés et glutinisés solubles au contact de la sécrétion pancréatique et duodénale.

Indications. — Etats prétuberculeux, Anémies, Asthénies, Grossesse, Dépression cérébrale, Surmenage, Convalescence, Déficiences sexuelles.

Action. — Stimulant général de l'organisme et de ses fonctions : circulation, nutrition, respiration. Excitant de l'assimilation et de l'hématopoïèse. Accroissement de résistance et d'euphorie.

Posologie. — *Adultes* : 2 comprimés par jour, 10 jours par mois ; durée moyenne du traitement : 3 mois.

Enfants : (à partir de 10 ans seulement), 1 comprimé tous les deux jours.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires H. YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS.

(Tél. : Odéon 56-67.)

CÉRÉBRON

Antitoxine cérébrale.

Traitement des états neurasthéniques et des maladies nerveuses.

Lipides et cholestérine en solution huileuse.

Deux formes. — Ampoules de 2 cc. par injections sous-cutanées, Capsules pour médication interne.

Action thérapeutique et usages :

Le Cérébron apporte aux cellules nerveuses les éléments de défense utiles pour lutter contre les toxines ; c'est, de plus, un excellent tonique du système nerveux. Prescrit surtout dans la neurasthénie quelle qu'en soit la cause, chez les personnes dont l'état physique est affaibli en même temps que leur résistance nerveuse ; l'anémie cérébrale, les troubles de la mémoire, l'affaiblissement intellectuel consécutif même à certaines lésions du système nerveux.

Posologie, mode d'emploi. — Une ou deux ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

Capsules, 6 par jour, 2 capsules avant chacun des trois repas.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré, Paris.

CÉRÉBROSTHÉNINE DALIN

Formes. — Gouttes acides, cachets et dragées neutres.

Compositions :

	Gouttes	Cachets	Dragées
Méthylarsinate de soude.....	0.015	—	—
Acide phosphorique.....	0.30	—	—
Vanadate de soude.....	0.001	0.001	0.0003
Nucléinate de Manganèse.....	0.05	0.05	0.017
Sulfate de Strychnine.....	0.001	0.001	0.0003
Glycérophosphates {	chaux.....	0.15	0.05
	magnésie.....	0.10	0.035
	fer.....	0.15	0.05
Carbonate de chaux.....	—	0.48	0.016

Indications. — Toutes les maladies déficitaires ou par carence organique, asthénies, anémies, lymphatisme, neurasthénies, maladies consomptives, gripes, convalescences, tuberculose.

Posologie :

Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas. — De 12 à 18 ans : 1 goutte par année d'âge.

Cachets : 1 cachet avant chacun des deux principaux repas.

Dragées : 2 dragées le matin, midi, soir, avant les repas.

De 12 à 18 ans : 1 dragée seulement avant les repas.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Échantillons sur demande :

C. DALIN, Pharmacien de 1^{re} classe
49, quai Saint-Vincent — LYON (1^{er}).

(Tél. : B-36-32.)

CÉRÉOSSINE DEHAUSSY (Simple)

Reconstituant physiologique.
Minéralisateur complet.

Os frais : Os longs d'animaux en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. Vitamines D naturelles).

Phytophosphine : dosée à 21 % de phosphore organique extrait des graines de céréales.

Sels minéraux : Silice, Manganèse, Fer (hémoglobine).

Extrait parathyroïdien : Fixateur des sels minéraux.

Aucune contre-indication : ni Adrénaline
ni Surrénale.

Indications :

États prétuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescences, Surmenage.

Posologie :

Cachets : Adultes, 2 cachets. *Enfants*, 1 cachet.

Comprimés : Adultes, 2. *Enfants*, 1.

Poudre : Adultes, 2 cuill. à café. *Enfants*, 1 cuill. à café. *Nourrissons*, 1/2 cuill. à café.

Granulé fondant : Adultes, 4 cuillerées à café. *Enfants*, 2 cuill. à café. *Nourrissons*, 1 cuill. à café.

Prix :

La boîte de 40 cachets : 17 fr. 10

Granulé et poudre : 17 fr. 70

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CÉRÉOSSINE IRRADIÉE

(Céréossine survitaminée.)

Vitamine D titrée biologiquement,
Associée au complexe organo-minéral « Céréossine ».
Triple contrôle : chimique, spectrophotométrique, biologique,

Indications :

Rachitisme, Pré-rachitisme, Croissance, Tuberculose,
Déméralisation accentuée chez la femme enceinte et
la nourrice. Fractures, Chirurgie osseuse.

Posologie :

Cachets : prix 23 fr. 55.

Chaque cachet contient une quantité de Vitamine D pure
correspondant à 2 600 unités internationales.

Adultes : 2 à 3 par jour.

Enfants : 1 par jour.

Granulé fondant : prix 21 fr. 35.

Cent grammes de granulé fondant contiennent une quan-
tité de Vitamine D pure correspondant à 40 000 unités
internationales.

Adultes : 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 2 cuillerées. *Nourrissons* : 1 cuillerée à café
par jour.

Conservation :

Dans les cachets, la vitamine D cristallisée pure est
incluse en un granule à noyau gras recouvert d'une cou-
che de sucre glace.

Dans les granulés, la vitamine D est enrobée en un véhi-
cule stéarique additionné d'un réducteur.

Dans l'une et l'autre forme, la conservation de l'activité
de la vitamine D est donc parfaitement assurée.

CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

Par cachet 0,020 de méthylarsinate de soude.

Posologie : *Adultes* : 2 cachets.

Enfants : 1 cachet.

Prix : 17 fr. 10

CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

Posologie. — *Adultes* : 2 cachets.

Prix : 17 fr. 10

Laboratoire DEHAUSSY
50, rue Nationale — LILLE.

CERINIL

Neutro-toxine des Terres Rares.

Composition. — Chlorure de cérium, chlorure de sodium, bromure de radium (traces), eau bidistillée.

Propriétés thérapeutiques. — Agglutine le B. de Koch, neutralise les toxines, provoque l'oxydase permanente du sang. Augmente dans des proportions considérables le pouvoir défensif de l'organisme.

Indications. — Tuberculoses : pulmonaire, ganglionnaire, osseuse, cutanée, Pré-tuberculose. Anémie, scrofule, chlorose.

Posologie. — Voie buccale, dose progressive de V à XXX gouttes par jour, avant les repas.

Prix : 31 fr. 20 le flacon de 40 cc. environ.

Laboratoires DECHATRE-LEBAS,
Pharmacien

20 bis, rue du Sergent-Godefroy
MONTREUIL-PARIS. (Tél. : Avron 14-69.)

CÉTHOCAL

Formules du Dr LEMAY, pour l'emploi thérapeutique d'un complexe Cerium-Thorium-Calcium, pour le traitement des dermatoses.

POUDRE ET PÂTE CÉTHOCAL

Dermatoses, Eczémas, Lupus, etc...

Hygiène des Bébés et de la peau.

Incolores, Inodores et sans Corps Gras :
10 fr. 70.

GOUTTES CÉTHOCAL

Adjuvant interne de tout traitement des dermatoses. XV à XX gouttes au début des repas : 16 fr.

AMPOULES CÉTHOCAL

Psoriasis, Désensibilisation, Asthmes : 26 fr.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS (XII^e).

CHARBONS FRAUDIN

Composition. — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés doués d'un grand pouvoir absorbant, avec :
1° le Naphtol B.

CHARBON FRAUDIN NAPHTOLÉ

Granulés sphériques aromatisés à la menthe, à l'anis ou sans arôme, contenant 0 gr. 10 de Naphtol B par cuiller à café.

Pouvoir désinfectant considérable.

Indications thérapeutiques. — Gastro-entérites, Grippe intestinale, Intoxications de toute nature.

2° la Belladone.

CHARBON FRAUDIN BELLADONÉ

Granulés vermicellés fondants aromatisés à la menthe, contenant un centigramme d'extrait mou de Belladone Codex par cuiller à café. Sédatif, Antispasmodique, Modérateur des sécrétions.

Toutes les indications de la Belladone. Particulièrement dans les troubles intestinaux toxi-infectieux avec constipation. Tolérance absolue.

3° Sans principe médicamenteux.

CHARBON FRAUDIN SIMPLE

Granulés : D'un grand pouvoir absorbant, contiennent 3 grammes de charbon végétal par cuiller à café. Aromatisés à la menthe, à l'anis ou sans arôme.

Indications thérapeutiques. — Dyspepsies flatulentes, Aérophagie.

Comprimés : 0 gr. 75 de charbon sans sucre par comprimé. Recommandé aux diabétiques.

Dragées : 0 gr. 20 de charbon par dragée aromatisée au cacao. Spécialement indiquées dans la thérapeutique infantile.

Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN
4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).
(Tél. : Molitor 02-62.)

CHARRIER

L'Eau Minérale Naturelle Vivante.

Cette eau ne ressemble à aucune autre eau minérale, ni dans sa composition, ni par son action.

Eau froide (8°), à pH très bas : 4,2 non gazeuse, très digestive, très légère et très agréable à boire, à jeun et aux repas.

Pureté rare (23 milligrammes de résidu sec par litre), soit une eau 20 à 60 fois plus pure que les eaux de diurèse les plus réputées, donc *l'eau unique pour laver le rein et l'organisme.*

Acide silicique libre : 40 % de sa minéralisation totale, donc *l'eau la plus antiarthritique des eaux connues.*

Super-radioactivité : 12,5 millimicrocuries de radon (gaz émanation du radium) par litre d'eau (*Institut du Radium, P^r Lepape, du Collège de France, etc.*). Donc l'eau vivante par excellence.

Cuivre : 1 centième de milligramme par litre d'eau (*Académie de Médecine*). Donc l'eau de désintoxication certaine.

Action Diurétique et Antiseptique remarquable (désintoxication générale, arthritisme, goutte, rhumatismes, toutes **Colibacilloses**). Active et régularise les fonctions du **Rein** et de la **Vessie**, de l'appareil digestif et de ses annexes, de l'intestin ; elle facilite l'élimination de l'**Acide urique**, la disparition de l'**Albuminurie** et la diminution de l'**Urée** dans le sang.

EAU DE CHARRIER à LAPRUGNE (Allier). (Tél. : 2 à Laprugne.) et 24, avenue de l'Opéra — PARIS. (Tél. : Opéra 74-58.)

CHASVERS MICHEL

Composition. — Le « CHASVERS MICHEL » est à base d'essence de chêne de Jérusalem.

Action. — Assure la destruction rapide de tous les vers intestinaux (Lombricoïdes, Oxyures, Ascarides, etc.)

Présentation. — Chasvers Michel *adultes* : en capsules renfermant 0,20 d'essence (prix au public : 5 francs). Chasvers Michel *enfants* : en perles renfermant 0,10 d'essence (prix au public : 5 francs).

Posologie :

Chasvers Michel adultes : de 15 à 18 ans, une capsule le matin à jeun trois jours consécutifs.

Au-dessus de 18 ans : deux capsules le matin à jeun trois jours consécutifs.

Chasvers Michel enfants : de 8 à 12 ans, une perle le matin à jeun trois jours consécutifs.

De 12 à 15 ans : deux perles le matin à jeun trois jours consécutifs.

Enregistré au Lab. nat. de cont. des médicaments.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (Meurthe-et-Moselle).

CHÉLIBILE

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Produit se différenciant des préparations analogues par addition de Chélidoïne.

Formule. — Oléate de soude, Extrait de bile, Extrait de boldo, Podophyllin, Extrait Belladone, Chélidoïne.

Indications. — *Embarras gastrique*, Insuffisance hépatique, Drainage biliaire, Antisepsie hépatique et intestinale, Ictère, Coliques hépatiques.

Posologie :

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Enfants : 2 à 3 par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 882-5.

A. COUSIN

Pharmacien de 1^{re} classe
à ESTISSAC (Aube).

CHELICYNE

Médicament des Troubles hépto-vésiculaires.

Composition :

Borate de soude.....	2 gr.
Chélidoïne, Ext. fl.....	5 —
Combretum, Ext. fl.....	15 —
Cynara scolymus, Ext. fl.....	15 —
Ononis Spinosa, Ext. fl.....	15 —
Excip. Glycériné aromatisé	Q. S. P. 100 cc.

Indications. — Toutes les maladies du Foie et de la Vésicule : Hépatites, Insuffisance hépatique, Diabètes, Cirrhoses avec ou sans ascite, Anasarque, Lithiase biliaire, Angiocholécystites, Ictères, etc..

Forme. — Solution concentrée. Le flacon : 18 fr. 70.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans une infusion chaude (fumeterre de préférence), à prendre 3 fois par jour, avant les repas matin, midi et soir, ou deux heures après.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Dépôt général :

Laboratoires BORDELAIS,
47, rue Maleret — BORDEAUX.

CHÉLOÏDINE

Pommade résolutive et calmante à base de Thiosinamine, salicylate de soude et chlorhydrate d'amylène.

Dépourvue de toute toxicité.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer gros comme une noisette sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12)

CHENANTHOL

(Vers intestinaux.)

Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Trichocéphale, etc.

Seule présentation officinale, dosée en volume, de l'essence pure américaine de Chenopode, suivant les prescriptions de la *Fondation Rockefeller*.

Posologie et mode d'emploi. — Capsules dosées en volume et non en gouttes (1/4 de cc. par capsule) : On donne une capsule par 3 années d'âge : maximum . 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Il est recommandé en cas d'infection profonde de renouveler le traitement au bout de 10 jours pour obtenir une cure radicale.

Prix de vente : 18 francs.

Boîte de 12 capsules pour la double cure complète.

Laboratoire L. HINGLAIS
ÉPERNAY (Marne). — Tél. : 106.

CHIBROMERCUROBROME

Dérivé Bromé de la Fluorescéine Mercurique. Puissant antiseptique
(50 fois plus que l'Argyrol à 5 p. 100).

Pour l'Ophtalmologie :

En pommade, à 1 p. 100.

En collyre, à 1 p. 100 (adultes) (en instillations uni ou biquotidiennes).

En collyre, à 1 p. 100 (nouveau-nés) (deux gouttes dans l'œil de l'enfant à la naissance).

Pour Chirurgie :

En solution, à 2 p. 100 (flacon de 30 grammes) (pour badigeonnages, comme puissant désinfectant du champ opératoire).

Pour plaies infectées, plaies suppurées (abcès, furoncle, flegmon, anthrax). Pour les lavages chirurgicaux, diminuer plus ou moins la dose d'eau.

Pour Gynécologie :

En solution, 2 p. 100 pour désinfection préventive de l'accouchement, badigeonnage externe et interne, ovules, ampoules, etc.

Pour médecine générale

Examen dans toutes les maladies des femmes, en badigeonnage.

Solution 2 %, flacon de 30 grammes. **Ovules**, boîte de 6.

En injections vaginales par ampoules, 1 % 1 cc., boîte de 12.

Maladies des voies urinaires, pour blennorrhagies, en désinfection du canal de l'urètre. **Solution 2 %**. **Collutoire**.

En **ampoules injectables** 1 cc. 1 p. 100, par voie veineuse, pour infections généralisées, Septicémie, etc., boîte de 12.

En **collutoire** pour gorge et oreilles.

Laboratoire **H. CHIBRET**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Fd (P.-de-I.)

Voir à Collyres **CHIBRET** et à Pommades **CHIBRET**.

CHLOCCI

(Le chlore occit les cocci.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

Composition. — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25).

Indications. — Petite et grande chirurgie. Pansements humides, lavages. Gynécologie. Urologie.

Doses. — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections; 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

Prix : 5 francs.

Laboratoire **ADAM**
Docteur en pharmacie
GRANVILLE (Manche).

CHLOMAG

Composition. — Chlorure de Magnésium. Bromure de Magnésium. Peroxyde de Magnésium.

Indications. — Tonique du système nerveux faisant disparaître la fatigue nerveuse. Action remarquable sur la peau ; guérison de l'Acné, amélioration des Psoriasis et des Prurits. Véritable préventif des Néoplasmes et des Tumeurs. Résultats efficaces dans le Rhumatisme chronique et dans les manifestations de l'Arthritisme.

Posologie. — 2 comprimés par jour, les prendre le matin à jeun avant le premier déjeuner dans un demi-verre d'eau.

Pour obtenir un résultat rapide dans la lutte contre l'Arthritisme et le Rhumatisme, il est nécessaire de renouveler la dose avant le repas du soir.

En flacon de 45 comprimés. Prix : 14 fr. 55.

L. N. C. 428-2.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 18-54.)

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Toni-sédatif nervin, d'innocuité longuement éprouvée, préférable aux uréides et opiacés.

Tous les mérites de la synergie chloral-brome et de l'état dissous.

Pas d'accoutumance.

Composition :

Liquide sucré représentant en milieu dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas les muqueuses (formule du D^r Dubois), 0 gr. 40 chloral, 0 gr. 60 bromure, par cuiller à soupe.

Posologie :

Insomnie : 1 à 2 cuillerées à soupe ou à café suivant l'âge. Névralgies, névroses, psychoses, malaises des hypertendus, tous troubles essentiels ou symptomatiques du système nerveux : chorée, épilepsie, coqueluche, dysménorrhée, etc. : 1 à 6 cuillerées à soupe ou à café selon l'âge, dans les 24 heures.

Prix : Flacon 24 francs. — 1/2 flacon : 14 fr. 60.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-3.

DURIEZ, 20, place des Vosges — PARIS.

CHLORALGINE

Formule :

Hydrate de chloral	15 gr. 35
Antipyrine	4 gr. 60
Chlorure de magnésium anhydre	1 gr. 20
Thymol	0 gr. 15
Arsénical d'appellation acide méta- aceylamino-paraoxyphénylarsinique..	0 gr. 76
Excipient pour 100 gr.	

Particularité. — Contient un Arsénical, de la série des Arsénobenzènes, stabilisé en solution.

Action. — Antiseptique, calmant, hémostatique, cicatrisant, spirillicide, *bactéricide*.

Indications :

1° Affections de la gorge : angines, laryngites, amygdalites, etc.

2° En stomatologie : abcès, pyorrhée alvéolaire, etc., et après toute intervention.

Présentation. — En 2 flacons :

G. M. : 13 fr. 50 — P. M. : 9 francs.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un grand verre d'eau bouillie tiède en Gargarismes ou Bains de bouche, 3 fois par jour.

Laboratoires de la CHLORALGINE

6, cours V.-Hugo — CAVAILLON (Vaucluse) (Tél. : 3-74).

CHLORALOSANE

(« Chloralose pur, exempt de parachloralose. »)

Propriétés. — Hypnotique non toxique, inaltérable. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Pas d'action nocive sur le cœur, le rein, les voies digestives.

Peut être prescrit aux femmes pendant la grossesse, aux vieillards, aux enfants.

Indications. — Insomnies nerveuses, de fatigue, de surmenage. Insomnies des cardiaques, des dyspeptiques, des neurasthéniques.

Auxiliaire des anesthésies générales, adjuvant aux cures de désintoxication (alcoolisme, morphinomanie).

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant le coucher et au moins 1 heure 1/2 après le repas.

Avant l'anesthésie générale : 2 comprimés la veille, ou 2 heures avant à la place de la piqûre de morphine-scopolamine. Après l'opération : 2 comprimés.

Présentation :

Flacon de 20 comprimés à 0 gr. 15.

Produits R. A. L. Spécialisés
Établissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 99-51 à 57.)

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten, inattaquable par le suc gastrique.

Composition. — Chloramine T 0 gr. 05.
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indications thérapeutiques. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc.

D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection de l'intestin (Fétidité des selles, etc.), sans porter atteinte à aucune de ses fonctions digestives.

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Prix : 12 fr. 80.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

CHLORAMMONIC

Acidifiant.

Composition. — Chaque dragée glutinisée contient 0 gr. 50 de chlorure d'ammonium.

Indications. — Le chlorure d'ammonium est l'acidifiant le plus énergique. Par conséquent, son emploi est indiqué dans toutes les affections exigeant la modification de la réaction des humeurs tissulaires dans le sens acide. Colibacillose. Lithiases rénales. Toutes les alcaloses. Asthénies dues au déséquilibre acido-basique, Epilepsie essentielle.

L'acidification des liquides tissulaires par le Chlorammonic renforce l'action des diurétiques mercuriels (Novurit).

Posologie. — En général, 6 à 9 dragées par jour, à raison de 2 ou 3 dragées avant chacun des principaux repas.

En association avec le Novurit, 9 à 12 dragées par jour, uniquement pendant les deux jours qui précèdent chaque administration de Novurit (3 ou 4 dragées au cours de chacun des trois principaux repas).

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. LEFEBVRE, Pharmacien

25, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Composition. — Chlorure d'éthyle pur.

Propriétés et indications. — Anesthésie locale, névralgies, art dentaire, anesthésie générale.

Formes. — *Flacons verre* : 10 gr., à vis ; 15, 30, 50 gr., à vis et à clapet. Fermeture à clapet très pratique. — *Flacons métal* : 50 et 100 gr., fermeture à vis et à clapet ; appareils automatiques pour l'art dentaire. — *Appareils jets variables*, capillaires et pulvérisateurs. — *Bidons* de remplissage 500 gr., 1 et 2 kg.

Anestile Bengué. — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°. Anesthésies locales, névralgies.

Narcotile Bengué. — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale. Flacons verre 50 gr. gradués, à gros jet, fermeture à clapet. Ampoules scellées de 1, 2, 3 et 5 cc., pour anesthésies générales.

Chlorure de méthyle pur. — Siphons de 250 gr., 500 gr. et 1 kg. Utilisation par pulvérisations au jet.

Indications. — Sciatiques rebelles, Lumbagos rebelles, Douleurs ataxiques.

Particularité. — Liquides inflammables.

Prix. — Suivant nature des récipients.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,

Pharmaciens,

16, rue Ballu, PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 85-60.)

CHLORIDIA

Pepsine — Chlorhydro — Cocaïnée — Chloroformique.

Indications. — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

Forme et dose. — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

Prix : 18 fr. 75

Laboratoires des PRODUITS DANNEC'H

BRUN ET MARTINEAU

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e). Tél. : Arch. 87-44.

R. du C. Seine 218-670.

CHLORYPEPSINE

Comprimés.

Combinaison stable de HCl « ionisé » et pepsine.

Formule. — Chaque comprimé correspond à :

HCl dilué officinal.....	V gouttes.
Pepsine titre 100	0 gr. 25

Action physiologique. — La Chloripepsine agit selon le moment de son absorption :

Avant ou au *début* du repas : stimule la sécrétion gastrique (HCl libre), complète et assure la digestion pepsique (HCl + pepsine), régularise le réflexe pylorique, agit sur les fermentations.

Après le repas, dans l'hyperchlorhydrie, son HCl libre déclenche une sécrétion de mucine qui protège la muqueuse et supprime la sensation de brûlures.

Indications thérapeutiques. — Insuffisances gastriques, Dyspepsies hypopeptiques, Hypo et anachlorhydrie, Pyrosis, Fermentations.

Posologie. — *Adultes*: de 1/2 à 3 comprimés généralement avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou coupée de vin.

Nourrissons: commencer par 1/2 comprimé.

Prix. Le tube de 25 comprimés : 16 francs.

· **Laboratoires BOUTROUX**

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e). Tél. : Laborde 08-51.

CHLORO-CALCION

Forme : Solution.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr. CaCl_2 .

Indications :

Recalcifiant : Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Toutes hémorragies ; et comme *préventif* des hémorragies post-opératoires.

Diurétique déchlorurant : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite, Œdèmes.

Mode d'emploi et Doses :

Dans de l'eau sucrée, avant les repas.

Chez les enfants au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;

XX gouttes par année comme *hémostatique* ;

X à C gouttes comme *anti-albuminurique* ;

L à CC gouttes contre les *accidents sériques* ;

3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

Chez les adultes :

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;

L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;

3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-sérique*.

Laboratoires MICHELS

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

(Tél. Galvani 73-50, 51.)

CHLOROFORME ADRIAN

Composition. — Chloroforme chimiquement pur, préparé spécialement pour l'anesthésie. Répond entièrement aux conditions de pureté exigées par le Codex français.

Indication. — Anesthésie générale.

Présentation :

a. Ampoules de 15, 30, 60 gr.

b. Flacons de 30, 60, 125, 250, 500 gr. et 1 kilog.

Prix : Flacon de 30 gr. : 7 fr.

— 60 — : 12 fr.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 15 gr. : 6 fr. 40.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 30 gr. : 10 fr. 65.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 60 gr. : 14 fr. 90.

Société Française de Produits pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CHLORO-MAGNÉSION

Composition. — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes — 1 gr. 20 $MgCl^2$ — 0 gr. 50 $CaCl^2$.

Indications. — Asthénie, Régulation de la sécrétion biliaire, Instabilité intestinale (notamment enfants et nourrissons), Désensibilisation, Urologie, Dermatologie (Verrues, Papillomes, Cancer), Tremblements.

Emploi. — Dix jours sur quinze :

Adultes : XV gouttes avant chacun des 2 principaux repas ou XXX gouttes le matin à jeun.

Enfants : 3 fois V gouttes.

Nourrissons : 3 fois III gouttes.

Accidents Sériques. — **Urticaires** : C gouttes en 4 ou 5 fois dans la journée pendant 3 à 5 jours.

Enfants : LX gouttes.

Laboratoire National de Contrôle n° 27-1

Prix : 14 fr. 60.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple. — PARIS. (Tél. : Roq. 49-22.)

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,

Docteur en Pharmacie.

CHLOROPHYLLE

DU DOCTEUR DAVID-GALATZ

Chlorophylle sodico-magnésienne cristallisée.
Solution concentrée à 10 % en ampoules de 5 cc.

Propriétés biologiques:

Cyto-régulateur. — Cyto-freinateur.

Actino-catalyseur.

Sensibilise les néoplasmes aux effets des rayons X.

Indications:

TOUS LES CANCERS

Cancers inopérables. — Cancers radio-résistants.

Cancers récidivants après traitement chirurgical
ou radiothérapique.

Toxémie asthénisante du cancer. Cachexie cancéreuse.

Lupus. Ulcères (adjuvant des U. V.).

Mode d'emploi:

Une ampoule chaque jour par voie intraveineuse (diluée et injectée lentement) pendant 12 à 15 jours. Pour les cancers superficiels ou accessibles, injecter 1 à 2 ampoules intratumorales avant radiothérapie.

Compléter la cure par l'administration quotidienne de 3 fois XX gouttes de PHYLLA. (Voir PHYLLA.)

Produits biochimiques spéciaux de la

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, Bd. de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e) (Invalides 43-60.)

CHLORUMAGÈNE

Formule du Dr Martin du Thell.

Forme. — Poudre.

Composition. — Hydroxyde de magnésium pur
Codex de densité constante sans odeur ni saveur.

Propriétés. — Au contact du suc gastrique formation de chlorure de magnésium pur à l'état naissant à l'exclusion de tout autre sel halogène (fluorure, bromure, iodure); de ce fait aucune contre-indication.

Régulateur de l'intestin convenant à tous les âges.

Indications. — Toutes les indications du chlorure de magnésium. Déficience de la cellule nerveuse. Troubles du sympathique. Hypertension artérielle. Constipation habituelle, entérites, etc.

Doses habituelles. — Une cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 18 fr. 70 pour un mois.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

CHLORURE D'AMMONIUM BRÉANT

Comprimés glutinisés.

Composition. — Chlorure d'ammonium pur, comprimés à 0,25 et glutinisés.

Indications. — Acidifiant urinaire énergique, antilithiasique, adjuvant de la vaccinothérapie anticolibacillaire dans les manifestations urinaires.

Posologie. — 4 à 8 comprimés par jour. Avaler sans croquer à chacun des repas.

Prix du flacon : 15 fr. 60.

LABORATOIRE D'ANALYSES BRÉANT

11, rue de Clichy — PARIS.
(Tél. : Trinité 23-84.)

CHLORURE DE MAGNÉSIUM ADRIAN

Composition :

Chlorure de magnésium anhydre : 0 gr. 121 pour un comprimé dragéifié.

Propriétés :

Tonique général et nervin, préventif des néoplasmes, régulateur des fonctions digestives et hépatiques.

Indications :

Asthénie, surmenage, convalescence, épuisement, neurasthénie, troubles digestifs, dermatoses, verrues, thérapeutique antinéoplasique.

Présentation. — Comprimés.

Posologie et mode d'emplol. — 2 à 10 comprimés par jour.

Prix : 21 fr. 30 le flacon.

**Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CHLORURE D'ÉTHYLE ADRIAN

Composition. — Chlorure d'éthyle préparé spécialement pour les anesthésies locales et générales.

Indication. — Anesthésies locales et générales.

Présentation et prix :	a. La boîte de 2 ampoules de	1 cc. : 3 fr. 70.
	— 2 —	2 cc. : 4 fr. 25.
	— 2 —	3 cc. : 4 fr. 75.
	— 2 —	4 cc. : 5 fr. 30.
	— 2 —	5 cc. : 6 fr. 40.
	b. La boîte de 1 ampoule de	10 cc. : 5 fr. 30.
	— 2 —	10 cc. : 7 fr. 95.
	— 6 —	10 cc. : 17 fr. 55.
	— 10 —	10 cc. : 27 fr. 70.
	— 1 —	25 cc. : 7 fr. 95.
	c. La boîte de 6 ampoules de	1 cc. : 9 fr. 05.
	— 6 —	2 cc. : 9 fr. 60.
	— 6 —	3 cc. : 10 fr. 65.
	— 6 —	4 cc. : 11 fr. 70.
	— 6 —	5 cc. : 13 fr. 85.
	— 6 —	25 cc. : 31 fr. 95.
	— 10 —	25 cc. : 63 fr. 90.
Tube métal de 50 grammes : 16 fr. 50.		

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e). (Tél. : Archives 97-80, 81, 82).

CHOCOCHAUX

Recalcifiant, Hémostatique.

Composition. — Gluconate de Calcium enrobé dans un mélange de cacao malt et sucre.

Présentation. — Tablette de 16 divisions. Chaque division contient 1 gr. 50 de gluconate de calcium.

Indications. — Toutes les déficiences calciques de l'enfant et de l'adulte.

Médication adjuvante de la cure néoplasique par le Barcan.

Posologie. — 1 à 4 divisions par jour.

Prix. — Tablette de 16 divisions : 17 fr. 50.

Remboursé par les A. S.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs de l'Assistance Publique et du Ministère des Colonies.

79, rue de Paris, à SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 02-78.)

CHOCYNOL

Comprimés cholagogues et cholérétiques atoxiques.

Association des extraits stabilisés d'Artichaut et de Boldo aux Extrait Biliaire purifié et Extrait Hépatique total : 5 centigrammes de chaque par comprimé glutinisé et dragéifié.

Indications. — *Toutes insuffisances hépatiques.* Troubles circulatoires s'y rattachant. Insuffisance cardiaque, Hypertension, Cirrhoses infectieuses, toxiques, etc.

Troubles biliaires. — Lithiases, Ictères, Coliques hépatiques, Prurits, Migraines, Asthmes, etc. Auto-intoxications, Arthritisme, Dyspepsie d'origine hépatique, Paludisme, Foie des Coloniaux.

Présentation médicale. — La boîte (48 comprimés glutinisés) : 16 francs. (Soit 8 à 12 jours de traitement.)

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour répartis aux repas. **Aucune toxicité.**

Spécialité remboursée aux Assurés sociaux.

Prix : 16 francs (au 11 Février 1938).

Laboratoires du « CHOCYNOL »

G. et J. HUYGHE, Pharmaciens

BRAZEY-EN-PLAINE (Côte-d'Or). (Tél. : 19).

CHOLAGOL

Insuffisance Hépto-Intestinale.

Présentation. — Granulé fondant d'un goût agréable (Cholagogue antiseptique et antitoxique).

Formule :

Calomel.....	0,05
Peptone de Witte.....	5,50
Sulfate de magnésie desséché.....	25 gr.

Indications. — Toutes les fois qu'à un titre quelconque il faudra drainer foie et tube digestif, produire une sécrétion et excrétion biliaire plus active, une exonération intestinale plus complète.

Ictères, Subictères, Angiocholites, Cholémie.

Lithiase hépto-intestino-rénale, Constipation.

Migraines, Amaigrissements, Vertiges.

Posologie. — Une cuillerée à café, à dessert ou à soupe, demi-heure avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau.

Rester couché sur le côté droit pendant ce temps.

Laboratoires REBOUL

E. MAZARS, pharmacien.

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

CHOLAL

Ampoules buvables.

Traitement causal de la Lithiase biliaire. Préventif et curatif

La Lithiase biliaire est provoquée par la floculation et la coagulation de la mucine, entraînant ensuite la cristallisation de la cholestérine. La cause déterminante de ce phénomène réside dans une tendance acidosique de l'ambiance hépato-biliaire.

Composition et mode d'action. — Les complexes ioniques minéraux de Cholal sont de vrais proto-colloïdes qui, par catalyse, corrigent le déséquilibre acido-basique par action sur le terrain humoral et tissulaire, et ramènent l'ambiance hépato-biliaire à la faible alcalose physiologique ; leur mécanisme d'action peut se comparer, par certains points, à celui d'une eau minérale prise à la source.

Sous cette action, l'ambiance, redevenue physiologique, s'oppose à la formation de concrétions nouvelles ; en même temps, on constate que les calculs existants se désagrègent lentement et sont ensuite éliminés. A la différence des cholagogues ou des cholérétiques habituels, Cholal est un modificateur du terrain et constitue de ce fait le traitement causal de la lithiase biliaire, aussi bien préventif que curatif.

Indications. — *Lithiase biliaire* : Congestion du foie. Coliques hépatiques. Ictère. Constipation d'origine hépatique. Troubles hépato-biliaires, etc...

Posologie. — L'efficacité de *Cholal* se traduit toujours dès la première quinzaine par différents symptômes qui rendent son traitement facile en clientèle (bien-être remarquable, éclaircissement du teint, atténuation et disparition des divers troubles).

Bien entendu, pour être vraiment curatif, ce traitement devra être prolongé. En pratique, la posologie optima devra prévoir :

1° Traitement d'attaque :

a. *Cas général* : durant un mois au minimum, une ampoule Cholal par jour à prendre le matin à jeun dans un verre d'eau une demi-heure environ avant toute ingestion.

Au besoin, ce traitement sera prolongé (pas d'accoutumance). Exiger la persévérance.

b. *Cas particuliers* : il est exceptionnel que le traitement normal ne soit pas toléré de façon absolument parfaite. Toutefois, si le médecin traitant juge préférable d'instaurer d'abord un traitement atténué, il lui suffira de prescrire un jour de Cholal pour deux ou trois jours de repos.

Le praticien pourra ainsi tâter la sensibilité du sujet, s'assurer par avance de son état exact et fixer ensuite, en toute connaissance de cause, le moment où le traitement normal pourra être entrepris.

2° Traitement d'entretien :

Par la suite, prescrire un traitement d'entretien, avec décades alternées de cure et de repos.

Après satisfaction confirmée, on conseillera (pour éviter les récidives) une cure de printemps et une cure d'automne comportant au début de ces saisons 2 ou 3 décades de Cholal séparées par des repos équivalents.

N. B. — Pas de régime spécial. Une alimentation variée est à conseiller. Toutefois, faire usage du vin avec modération, proscrire l'alcool et en général éviter tous excès.

Pas de contre-indications permanentes, ni intolérance, ni accoutumance. Le Cholal est inoffensif et sans saveur.

Présentation et Prix de Vente.

Coffret Cholal 30 ampoules (modèle normal).....	36 fr. 50
Boîte — 10 — (petit modèle).....	18 fr. 75

Laboratoires UROCLASE

G. BERTIN, Pharmacien, 95, rue de Prony — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Galvani 76-86.)

CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.
*Réalisation en thérapeutique journalière de
l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

Forme. — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

Indications. — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

Prix : 14 francs.

VINCENT, pharmacien.

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

CHOLÉFLUINE

Forme. — Granulé soluble, agréable au goût.

Composition :

Sulfate de magnésie	28 gr.
3 Peptones (Viande, Poisson, dite de Witte)	9 gr.
Hyposulfite de soude	4 gr.
Extrait de Boldo	2 gr. 50
Sucre parfumé. Q. S. pour	100 gr.

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiase biliaire, Ictère, Insuffisance hépatique et ses conséquences, Intoxications alimentaires, Dermatoses récidivantes, Migraines, Urticaires, Troubles digestifs variés.

Contre-indication (temporaire). — Cholécystites aiguës.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède. Se coucher ensuite 10 minutes sur le côté droit.

Particularités :

Polyvalence peptonique sélectionnée au maximum :

1° Peptone de viande.

2° Peptone dite de Witte.

3° Peptone de Poisson.

Activité cholagogue renforcée par extrait de Boldo, **Action antifloculente et anti-anaphylactique par Hyposulfite de soude.**

Prix : 19 fr. 20.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).
(Tél. : Louvre 53-16.)

CHOLÉFLUINE

Forme. — Comprimés.

Composition :

Sulfate de magnésie.....	0,20
Peptone de viande.....	0,03
Peptone de poisson.....	0,03
Peptone dite de Witte.....	0,03
Hyposulfite de soude	0,05
Extrait sec de boldo	0,01
Extrait sec d'artichaut	0,02
Excipient.....	Q. S. pour 1 comprimé.

Mêmes composants que le granulé, avec, en plus, *extrait d'artichaut*.

Mêmes indications. — *Traitement d'entretien après traitement d'attaque par la Choléfluine granulée, anti-anaphylactique.*

Posologie. — 2 matin, midi et soir avant manger.

Pour diabétiques : 9 comprimés pris le matin 1/2 heure avant manger remplacent 2 cuillerées à café de *Choléfluine granulée*.

Prix : 19 fr. 20.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).
(Tél. : Louvre 53-16.)

CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf, capsules dosées à 0 gr. 20.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Opothérapie biliaire.

Indications. — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

Prix : 15 fr. (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

CHOLÉINE LACTIQUE

Opothérapie biliaire et ferments lactiques.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

Indications. — Congestion du foie, Lithiase, Cholécystite, Acholie, Ictères, Hépatites, Cirrhoses, Cholémie, Phénomènes gastro-intestinaux, Constipation, Colite muco-membraneuse, Arthritisme.

Prix : 15 fr. (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

CHOLÉLYSE

Médicament spécifique et préventif de la Colique Hépatique et de la Lithiase Biliaire, à base d'Acide oléique pur, d'après les études du Dr ARTAULT DE VEVEY.

Mode d'emploi. — La CHOLÉLYSE, en capsules dosées à 0,50 d'Acide oléique, se prend à jeun, pendant 10 jours par mois par mesure préventive dans les cas de coliques mensuelles, ou en cas de crises, 2 à 3 capsules d'un coup, dose qu'on peut renouveler un peu plus tard.

Prix : 19 fr. 50.

Préparé par

L. CARBOU, Pharmacien

8, rue Jean-du-Bellay — PARIS (IV^e).

(Tél. : Odéon 39-09.)

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. — Extrait de Combretum. Extraits biliaires boldine et boldo.

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique, Eupeptique, Antitoxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas.

Prix : 12 fr. 50.

Flac. : 15 jours de traitement environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-3.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 12-63.)

CHOLÉO-FLUASE

 **Composition :**

Sulfate de magnésie desséché	28 gr.
Peptone purifiée	5 gr.
Charbon activé	2 gr.
Surrénine	1 gr. 6
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

Forme. — Granulé fondant.

Indications. — Agent cholagogue énergique. Traitement des troubles digestifs spéciaux d'origine hépatique. Migraines, vertiges, nausées, Urticaire, etc.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau tiède ou une infusion, 1/2 dose pour les enfants.

Prix : 18 fr. 50.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1107-2.

E. VERDON

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8).

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003.

Doses et mode d'emploi. — 6 dragées par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir, en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Propriétés thérapeutiques. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — *Entérocolite muco-membraneuse*, angiocholite, cholémie familiale.

Prix : 17 fr. 70.

**Société Industrielle de Thérapeutique
Scientifique Appliquée**

**Laboratoires du Dr Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Forme : Comprimés. Formule nouvelle avec **Boldo total.**

Composition :

Boldo total.....	0,035
Entérokinase	0,05
Ferments lactiques sélectionnés...	0,005
Pancréatine	0,10
Extraits biliaires dépigmentés.....	0,10
par comprimé.	

Dose :

Adultes : 4 à 6 par jour, 1/2 heure avant les repas.

Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

Indications. — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques. Diarrhées estivales. Troubles de la peau.

Prix : 14 fr. 90.

Échantillons sur demande.

Laboratoire DAGUIN, à SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 00-27.)

CHOLÉOLAX COLAS

Association des trois Cholagogues vrais.

Forme. — Granulés friables, aromatisés à la vanille, agréables au goût.

Composition. — Huile d'olive vierge, Sulfate de magnésie desséché, Peptones.

Propriétés thérapeutiques. — Draine la vésicule biliaire, Décongestionne le foie, Combat la constipation et les fermentations, sans irriter l'intestin.

Indications. — Infection et stase vésiculaires, Cholécystites aiguës et chroniques, Atonie de la vésicule, Hépatisme, Congestions actives et passives du foie, Constipation chronique et ses complications.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun pur ou dans un peu d'eau. *Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 17 fr. 05.

Laboratoires Robert COLAS

Docteur en Pharmacie.

133, rue Lecourbe — PARIS.

(Tél. : Vaugirard 48-10.)

CHOLÉOPEPTINE

Le plus actif des Cholagogues.

Présentation. — Granulé soluble.

Composition. — Salicylate de soude, Peptone, Sulfate de Magnésie, Urotropine et Charbon activé.

Propriétés. — Augmente de plus de 50 p. 100 la sécrétion biliaire, facilite la dissolution des calculs vésiculaires.

Indications. — Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Rétention, Ictère, Herpès, Migraines rebelles, Urticaires, Nausées, Asthénie d'origine hépatique. Utilisé avec succès dans le Zona.

Aucune contre-indication. Pas d'intolérance.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ; 10 jours par mois.

Dans le Zona, faire prendre en plus une cuillerée à café après les repas de midi et du soir.

Enfants : De 1/2 à 1 cuillerée à café, le matin à jeun.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires MARCEL LOGEAI

Docteur en pharmacie.

24, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Suffren 03-38.)

CHOLÉO-ZYMATINE

Composition. — Peptones associées (Viande, Poisson, Lait, Œuf, Gluten), Formine (à faible dose), Sels de magnésie, Artichaut, Zymatine.

Propriétés. — Décongestionnant hépatique, Pansement intestinal, Cholagogue alcalin, Laxatif doux, Antiémétique, Antichoc.

Indications. — Affections hépato-biliaires, Anaphylaxies, Dermatoses, Troubles du sympathique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau (chaude de préférence) ou une cuillerée à café avant les repas.

Une boîte contient 8 jours de Traitement à 3 cuillerées à café par jour.

Laboratoires LESCÈNE

58, rue de Vouillé — PARIS (XV^e) Tél. Vaug. 08-19.
et LIVAROT (Calvados).

CHOLÉRÈNE (comprimés)

Médication cholagogue.

Drainage des voies biliaires.

Solubilisation du Cholestérol de la bile.

Formule. — 1 comprimé *glutinisé* contient :

Extrait de boldo	0,01
Extrait de Romarin.....	0,02
Extrait d'Artichaut.....	0,02
Bile dépigmentée et décholestérinée	0,05
Oléate de soude	0,20

Indications thérapeutiques. — Insuffisance hépatique. Ictère catarrhal. Etats congestifs du foie. Coliques hépatiques. *Lithiase biliaire*. Cholécystites.

Posologie. — De 2 à 4 comprimés par jour avant les repas.

Cure d'entretien : 2 comprimés le matin à jeun.

La boîte de 45 comprimés : 18 fr. 70.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-51.

D^{rs} A. GRIGAUT et A. BOUTROUX, pharmaciens
Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CHOLERGINE

Médication Antitoxique,

Colloïdes et Lipoïdes. Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.

Soc. de Thérapeutique (1911-1912). — Académie de Médecine (1911). — Soc. Inter. de la Tuberculose (1911). — Académie des Sciences (1912). — Soc. de Biologie (1911). — Congrès de l'Ass. Fr. p^r l'Av. des Sciences (1911). — Soc. de Pathologie Comparée (1913-1914), etc... Deux formules : Cholergine simple, Cholergine camphrée.

Forme. — Ampoules injectables de 2 cc.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine.

Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection.

Injecter lentement.

Propriétés. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 26 fr 65.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 11-86.)

CHOLOFLUOL

Composition :

Sulfate de magnésium anhydre	20
Sulfate de sodium anhydre.....	2
Citrate trisodique	2
Bicarbonate de soude.....	1
Benzoate de soude	5
Chlorure de sodium	1
Chlorure de magnésium anhydre	0,50
Saccharose. Q. S.....	100 gr.

Propriétés. — Cholagogue, antiseptique des voies biliaires, stimulant et régularisateur des fonctions hépato-vésiculaires.

Indications. — Insuffisance hépatique, ictères, cholémie familiale, cholestyite, angiocholite et toutes infections des voies biliaires.

Présentation. — Granulé friable, entièrement soluble et sans goût.

Prix : 17 fr. 50 le flacon de 110 grammes.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillères à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède, 1/2 heure environ avant le petit déjeuner.

Laboratoire F. LAGARCE

Docteur en Pharmacie

13, place de la Nation — PARIS.

(Tél. : Diderot 61-05.)

CHOPHYTOL-ROSA

Cristallisé injectable.

Boîtes de 6, 12 et 25 ampoules de 5 cc.

Médication préventive et curative de la Rétention azotée, de la Polysclérose et de l'Oligurie, à base du *principe actif cristallisé* de Cynara frais (artichaut), isolé par G.-E. ROSA en 1933. (6 ampoules correspondent à plus de 1 kilo de suc de Cynara *frais*.)

Propriétés. — *a.* Stimule la cellule hépatique ;
b. Stimule l'épithélium rénal (active l'élimination uréique et la diurèse).

Indications. — Troubles hépato-rénaux :

- 1° Dysfonctionnement et Insuffisance hépatiques : Hépatites subaiguës et chroniques, Cirrhoses au début, Foie cardiaque, Congestion du foie et Hépatisme, Foie colonial, Ictères, etc...
- 2° Surcharge cholestérinique des tissus : Polysclérose artérielle et Athéromes, Artérites, Hypercholestérolémie, Xanthélasma, Troubles oculaires, etc...
- 3° Dysfonctionnement et insuffisance du rein : Oliguries diverses (maladies infectieuses : Grippe, pneumonie, etc.), Néphrites aiguës infectieuses ou toxiques, Manifestations du brightisme, Azotémie « d'alarme », Néphrites hypertensives, Infiltrations séreuses (Œdèmes, Ascites, Pleurésies, etc.).
- 4° Traitement pré-opératoire et post-opératoire, particulièrement chez les Hépatiques, les Insuffisants rénaux à azotémie et Constante d'Ambard élevées (Adénomes prostatiques, Tuberculose et Lithiase rénales, Fibromes utérins et Kystes ovariens).
- 5° Manifestations anaphylactiques cutanées de l'insuffisance hépatique (Urticaire, Prurigo des enfants, Eczémas, Dermatoses prurigineuses ou non). Manifestations générales de la diathèse neuro-arthritique. Sert de complément à l'auto-hémothérapie.

Posologie et mode d'emploi. — Traitement moyen de 12 à 25 *injections intraveineuses, intramusculaires* profondes ou *hypodermiques* (légère sensibilité par cette voie) à raison d'une à deux pi-

gûres tous les jours ou tous les deux jours. Les ampoules se prennent également *per os*. Cure complémentaire de *dragées* ou de *gouttes* de *Chophytol* ou de *dragées* de *Cynurool*. 1/2 dose ou dose entière chez les enfants suivant l'âge.

N. B. — Les premières injections s'accompagnent souvent d'une légère élévation de l'azotémie, *sans gravité* ; ce phénomène ne doit pas surprendre, car il traduit la transformation, en un produit azoté d'élimination facile (l'urée), des substances azotées en rétention tissulaire. D'ailleurs, simultanément, la diurèse augmente, le pouvoir concentrateur du rein s'améliore et le débit uréique s'élève parallèlement, *ce qui ramène rapidement la Constante d'Ambard et l'Azotémie vers la normale*.

En ce qui concerne la cholestérinémie, les phénomènes sont absolument superposables. La preuve de l'amélioration du métabolisme cholestérinique est fournie par l'augmentation, dans des proportions considérables, du *pouvoir cholestérolytique* du sérum. De ce fait, il s'effectue une véritable « mobilisation » (hypercholestérinémie transitoire) de la cholestérine tissulaire en surcharge, dont l'élimination est ainsi facilitée (*hypcholestérinémie secondaire, en fin de cure*).

S'abstenir dans les cas de lésions rénales incurables médicalement (Tuberculose rénale bilatérale, Cancer, Néphrite chronique, azotémique et hypertensive ou œdémateuse à la période terminale, Anurie calculeuse). Le *Chophytol injectable* n'agit que si le foie est encore capable d'être stimulé et si le pouvoir concentrateur du rein permet l'élimination uréique. C'est en effet une médication de stimulation et non de remplacement.

RÉF. SC. : *Gaz. Hôpitaux, Soc. de Thérap., Soc. méd. des Hôpitaux, Presse médicale* ; Dr Picart, *Thèse Paris 1935* ; Dr Albrecht, *Thèse Paris 1937* ; Dr Blouet, *Thèse Paris 1937*, etc...

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale et admise aux Assurances Sociales.

Laboratoires ROSA

**« La Feuille fraîche d'Artichaut
en Thérapeutique »,**

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 09-63.)

CHOPHYTOL-Gouttes. CHOPHYTOL-Dragées.

Le *Chophytol* est à base d'extrait de *Cynara* frais (Artichaut), préparé s. l. f. G.-E. Rosa (100 cc. de gouttes ou 200 dragées correspondant à 2 kilos de suc de *Cynara* frais). Stimulant de l'épithélium hépatique et rénal, il exerce des actions cholérétique et diurétique, et modifie le métabolisme du cholestérol et des corps azotés (urée).

Actions et indications :

- a. Action tonique et cholérétique : Toutes les insuffisances hépatiques aiguës ou chroniques, Hépatonéphrites et Hépatites diverses, Ictères, Cirrhoses à leur début, Congestions active et passive du foie, Surmenage hépatique des pléthoriques et des coloniaux, Excès de bonne chère, Angiocholites et Choleseystites, Urticaire et Accidents sériques, et dans tous les cas où une maladie générale ou des états diathésiques ont un retentissement ou une étiologie hépatiques.
 - b. Action sur le métabolisme du Cholestérol, par augmentation du pouvoir cholestérolitique du sérum, avec mobilisation et élimination des déchets tissulaires cholestériniques : Polysclérose artérielle, Athéromes et Artérites, Hypercholestérimies de l'âge mûr et de la vieillesse, Précipitations oculaires cutanées ou autres, États diathésiques à pouvoir cholestérolitique négatif.
 - c. Action diurétique : Oliguries des néphrites aiguës ou chroniques, Oliguries des maladies fébriles, des Congestions pulmonaires et de tous les états infectieux à retentissement rénal, Oliguries au cours des infiltrations séreuses et tissulaires d'origine cardiaque, rénale ou autre (Œdèmes, Ascites, Pleurésies, etc...).
- Anuries des intoxiqués, des brûlés, des infectés, des opérés.
- d. Action sur le métabolisme des corps azotés toxiques, avec transformation en urée et élimination : Insuffisance rénale aiguë ou chronique, Rétention azotée, Azotémie d'alarme de Widal et états préurémiques, Constante d'Ambard élevée, Dysfonctionnement uréogénique d'origine médicale ou chirurgicale, Néphrose lipoïdique et certaines albuminuries.

Quelques indications particulières :

En pédiatrie : Troubles digestifs (vomissements de type acétonémique, digestions difficiles) ou cutanés (Prurigo strophulus, Urticaire, Eczéma), en rapport avec l'insuffisance fonctionnelle du foie.

En chirurgie : Traitement pré- et post-opératoire des insuffisants hépatiques et des rénaux à Constante d'Ambard et azotémie élevées. Évite les inconvénients de l'hyperazotémie et de l'oligurie ou l'anurie secondaires aux interventions.

Enfin, au cours de manifestations anaphylactiques ou diathésiques générales, où le rôle d'une déficience hépatique peut être incriminé.

Posologie. — X gouttes correspondent à 1 dragée.

Adultes : 40 à 120 gouttes par jour en 2 ou 3 fois aux repas dans un peu de liquide sucré ou non ; 6 à 12 dragées par jour dans les mêmes conditions. Cure de 10 à 20 jours par mois.

Enfants : 1/4 ou 1/2 dose suivant l'âge. Les dragées peuvent être écrasées et mélangées aux aliments (purée, confitures). Il est préférable de donner des gouttes.

Nourrissons : X à XX gouttes par jour.

Étant donnée l'absence de toxicité, ces doses peuvent être augmentées et modifiées suivant l'acuité des symptômes.

Présentation :

1/2 flacon, flacon et triple flacon.

Étui de 60 dragées et triple étui de 180 dragées.

N. B. — La richesse en principe actif du *Chophytol*, sous toutes ses formes, permet au praticien d'obtenir toujours une action rapide et constante.

Les formes perorales (dragées et gouttes) peuvent être utilisées soit isolément soit parallèlement à la forme injectable.

Spécialités légales de prescription exclusivement médicale et admises aux Assurances Sociales.

Laboratoires ROSA

« La Feuille fraîche d'Artichaut
en Thérapeutique »,

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).

(Tél. Etoile : 09-63.)

CHROMOMERCUROL CLARS

Oxymercurifluorescéine dibromée disodique 1 p. 100.
Marque Française.

Présentation. — 1. Solution, flacon de 30 cc.
2. Pommade dermatologique, tube de 30 gr.
3. Pommade ophtalmologique (excipient spécial).

Indications. — *Antiseptique général*, à l'avantage de la teinture d'iode, sans en avoir les inconvénients.

Dermatologie : dermatoses suintantes = solution.
Dermatoses sèches = pommade dermatologique.

Urologie, gynécologie : solution, en instillations ou badigeonnages (urétrites, cystites, vaginites).

Ophtalmologie : pommade ophtalmique. Toutes infections oculaires.

O. R. L. : otites, angines.

Laboratoire CLARS

18, rue Saint-Sulpice — PARIS.
(Tél. : Danton 01-29.)

CHRONICYSTINE MANOR

Présentation et composition. — Dragées glutinisées de sulfate de Magnésie anhydre à 0 gr. 50, correspondant à 1 gr. de sel cristallisé Codex.

Indications. — Toutes les affections nécessitant un drainage biliaire intensif et pour lesquelles il est impossible ou difficile de le faire par sondage duodéal : Constipations, Cholécystites, Colites, Migraines, Ictères, etc...

Doses. — 4 à 6 dragées le matin à jeun.

Remarque. — On fait généralement suivre le drainage par la Chronicystine de la désinfection et désensibilisation par l'Hépatostimuline Manor. (Voir ce mot).

Prix : 15 francs.

Laboratoires MANOR

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (Saône-et-Loire)
(Tél. : 35.)

CHRYSLMIODE AGUETTANT

Complexe antibacillaire Injectable.

Cette méthode de traitement a fait l'objet d'une communication parue dans le Lyon Médical du 31 juillet 1932.

Composition. — Principes balsamiques cholestérine-or-iode-bromure de Radium en solution huileuse.

Action. — Antibacillaire ; elle s'attaque à toutes les localisations de façon plus constante et mieux supportée que chacun de ses constituants employé isolément à forte dose.

Le radium exalte l'action totale.

Indications. — Bacilliose pleuro-pulmonaire ; hémoptysies ; lésions bilatérales, localisations méningées et diverses (Péritonite, adénopathies, ostéites) ; lésions cutanées ; grippe (préventif des complications pulmonaires).

Contre-indications. — Tares viscérales ; bacillooses rénales.

Dose. — 1/2 cc., puis 1 à 2 cc. tous les deux jours.
Injections intramusculaires.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

CHRYSÉMINE

(Pyréthrines Carteret.)

Propriétés thérapeutiques. — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

Indications. — Employée dans tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, trichocéphales, lamblias, amibes, etc.), elle est également indiquée dans le traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire : diarrhées à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, troubles nerveux dus aux toxines vermineuses, etc.

Formes. — Gouttes (*enfants*). Perles glutinisées (*adultes*). (Équation d'équivalence : 1 perle = XL gouttes.)

Administration. — Les perles s'absorbent les unes après les autres dans une gorgée de liquide. Les gouttes se prennent dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits, des confitures, etc.

Posologie. — *Ascaris, Trichocéphales, tous Helminthes, Amibes, Lamblias, tous Protozoaires.* — *Adultes* : 5 perles. — *Enfants* : L à CL gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos d'une semaine.

Oxyures. — *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : L à CL gouttes, suivant l'âge. (XL gouttes pour un an, augmenter progressivement à raison de X gouttes par année d'âge.) A prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeaisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysémine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

Tænia. — *Adultes* : 12 perles. *Enfants* : 200 à 300 gouttes suivant l'âge. A prendre le matin à jeun pendant deux jours consécutifs. Diète hydrique la veille et régime alimentaire réduit les 2 jours de cure. Purgation saline ou huileuse le second jour 3 heures après la dernière dose.

Prix de vente au public : *Perles* : 23 fr. *Gouttes* PM. : 14 fr. GM : 23 francs.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél. : Opéra 43-79.)

CIBALGINE

Diallylmalonylurée

Diméthylaminophényl-diméthyl-pyrazolone.

ANALGÉSIQUE SÉDATIF.

Calmant du système nerveux. Analgésique et sédatif sans opium, sans aucune substance du tableau B. Atténue ou fait disparaître toute sensation douloureuse.

Indications. — Toutes les algies : Migraine, Névralgies, Courbature, Torticolis, Sciatique, Douleurs dentaires, Angines, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc. Très efficace aussi dans les douleurs dysménorrhéiques.

Comprimés — Gouttes — Ampoules.

Doses. — 1 à 4 comprimés, XX à C gouttes, 1 à 2 ampoules, par 24 heures.

Flacon de 15 comprimés.

Flacon (gouttes).

Boîte de 5 ampoules.

Boîte de 20 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

CIMALVOL

Composition :

Gaïacol synthétique	0,05
Terpinol	0,05
Eucalyptol	0,05
Goménol	0,05
Essence bourg. sapin	0,03
Essence serpolet	0,02
Goudron de Norvège	0,10

Pour une capsule.

Propriétés. — Antiseptique des voies respiratoires, antispasmodique, calmant de la toux, modificateur sécrétoire, expectorant.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, pneumonies, gangrène pulmonaire, tuberculose, séquelles d'intoxication par les gaz, grippe, emphysème, asthme.

Présentation et prix. — Un étui de 50 capsules : 10 fr. 50.

Posologie et mode d'emploi. — Avaler sans croquer 2 capsules matin, midi et soir.

Prix : 10 fr. 50.

Laboratoires F. BAYLOT,

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 38-31.)

CINALOSE

Deux formes :

- 1° *Ampoules* : boîte de 10 ampoules injectables de 3 cc.
 2° *Suppositoires* : boîte de 10 suppositoires.

Composition :

Cinnaméine du Baume du Pérou..	0 gr. 03
Lipoïdes spléniques.....	0 gr. 007
Camphre	0 gr. 09
Lécithine.....	0 gr. 10
Cholestérine	0 gr. 04
Lipoïdes hépatiques	0 gr. 007

par Ampoule ou Suppositoire.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de combat de tous les états de carence. Traitement antitoxique des états infectieux. Agent leucocytaire et phagocytaire. Facteur d'augmentation de poids au cours de la collapsothérapie.

Indications :

- 1° Dans tous les cas d'infections aiguës (voies respiratoires, fièvres éruptives, maladies infectieuses, septicémies) ;
- 2° Dans les différentes formes de la tuberculose pulmonaire, adénites, lupus, laryngites, tuberculose osseuse et rénale ;
- 3° Dans toutes les infections anergisantes et les états de dépression : séquelles de grippe ;
- 4° Dans les périviscérites.

Posologie. — 1° *Ampoules* : *Adultes* : Traitement d'attaque : 1 à 2 ampoules par jour en injections intramusculaires.

Traitement d'entretien : 1 ampoule tous les deux jours.

Enfants : 1/2 ampoule par jour ou tous les deux jours.

2° *Suppositoires* : Un suppositoire tous les deux jours, avec un repos de six jours après le dixième.

Enfants : 1/2 suppositoire tous les deux jours.

La forme suppositoire permet un traitement d'administration plus facile, tout en conservant à la préparation sa haute valeur thérapeutique.

Prix : Ampoules ou Suppositoires : 26 fr. 70.

Laboratoires de CINNAMATHÉRAPIE

C. ROUX, Docteur en Pharmacie

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).

Tél. : Alésia 12-55.

CINARASCOL

Forme. — A. *Gouttes* ; B. *Pilules*.

Composition. — Extrait fluide spécial de feuilles fraîches de *Cynara Scolymus* (artichaut) soluble, épuré, hyperconcentré (procédé du professeur Quirin et Dagonnot). XL gouttes = 1 pilule = 0 gr. 35 de cet extrait.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, lithiasse biliaire, hépatite, cholécystite, ictère, hypercholestérinémie, dermatose, arthritisme, urémie.

Drainage hépatique et rénal d'innocuité absolue.

Doses. — A. *Gouttes* : XL à CXX gouttes (1 à 3 fois le contenu du compte-gouttes joint).

B. *Pilules* : 1 à 3 pilules à la fin de chacun des deux repas.

Prix : Pilules : 18 fr. 50. Gouttes : 20 francs.

Chaque boîte pour une durée de 20 à 30 jours.

Durée moyenne du traitement : 3 mois.

Laboratoires DAGONNOT
CANNES.

CINASCOL

Toutes affections du *Foie* et de l'*Intestin*.

Composition. — *Pour 1 dragée* :

Extrait de Bucchu.....	0,03
Extrait de Boldo	0,03
Ext. Scolym. Cinara sec	0,07
Evonymine	0,02
Bile dépigmentée et décholestérinée ...	0,07
Oléate de sodium.....	0,07

Forme. — Dragée à noyau mou glutinisée.

Indications. — Insuffisance hépatique, constipation, cholécystite, Entéro-colite muco-membraneuse, ictères, intoxications.

Doses. — 2 à 4 dragées par jour. Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Prix : 16 fr. 50.

Enregistré au L. N. de C. sous le n° 1081-1.

G. BAETZ, Pharmacien.
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
(Tél. : n° 21).

CINEYL

Composition. — Association de silicate de calcium, magnésium, fer, manganèse et codéine.

Indications. — Médicament de défense antibacillaire, Affections pulmonaires chroniques, Bronchites récidivantes, Toux, Grippe.

Présentation. — Comprimés.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires GRYSA

C. LÉTANG

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Paris.
7, rue Saint-André — LE MANS.

CINNESTÉROL

Adjuvant indispensable dans la lutte antibacillaire. Complément du pneumothorax artificiel. Action préservatrice intense chez les lymphatiques, asthéniques, affaiblis et surmenés. Relève les forces des convalescents des maladies infectieuses sévères.

Présentation. — Solution huileuse en ampoules de 5 cc.

Posologie. — Action antiseptique respiratoire : 1 à 2 ampoules par jour. Action antibacillaire : double dose.

Prix. La boîte : 23 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1766-4.

Laboratoires LAUGIER

56, rue St-Lambert — MARSEILLE.

CINNOZYL

Composition. — Solution huileuse de :

Cinnamate de benzyle.....	0. 05
Cholestérine.....	0. 10
Camphre.....	0. 125
Huile d'olive pure.....	5. cc.

Pour une ampoule.

Propriétés. — Par les actions biochimiques de la cholestérine, du camphre, du cinnamate de benzyle, augmente la cholestérimie et la résistance à l'infection tuberculeuse.

Indications. — *Tuberculose pulmonaire* dans toutes ses formes cliniques. Adjuvant précieux à la cure de pneumothorax artificiel. *Tuberculosos extra-pulmonaires* : Adénites tuberculeuses, tuberculosos osseuses, génito-urinaires, péritonéales, cutané-muqueuses. Fistules tuberculeuses. *Prétuberculose*, cure préventive chez les prédisposés : Enfants lymphatiques, scorofuleux, malades asthénisés, affaiblis, anémiés, en état d'anergie. *Convalescence* des maladies infectieuses et infections graves.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores sans aucune réaction.

Adultes : 5 à 10 cc. par jour, cures de 20 à 25 injections. Repos de 10 à 15 jours, puis reprise du traitement.

Enfants : Jusqu'à 4 ans : 1 à 2 cc. chaque jour, en augmentant progressivement les doses.

De 4 à 12 ans : Dose moitié moindre que celle de l'adulte.

Au-dessus de 15 ans : Mêmes doses, même technique que pour l'adulte.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

CIPROMAROL

Composition. — Cupressus semperv. Equisetum Arvense. Capsella Bursæ Pastoris. Æsculus Hippocastanum. Hamamelis V.

Indications. — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

Mode d'emploi. — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

Prix : 12 fr. 80.

LANDRIN et C^{le}

12, rue de la République
PUTEAUX (Seine).

CIRVOSE

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base d'extraits végétaux (marron d'Inde, berberis, piscidia, cyprès, hamamelis), d'extraits organiques (hypophyse, surrénale, thyroïde), de citrate de soude et phényléthylmalonylurée.

Propriétés. — Vaso-constricteur énergique, tonique et régulateur du système veineux et du système artériel collatéral, modificateur de la nutrition générale, fluidifiant du liquide sanguin et sédatif doux.

Indications. — Traitement des troubles de la circulation (bouffées de chaleur, lourdeurs de tête, troubles congestifs, fourmillements et refroidissements des extrémités, sensation de doigts morts, crampes, engelures, etc.). Retour d'âge chez la femme. Affections veineuses (varices, hémorroïdes, phlébites, accidents de la puberté et de la ménopause). Hypertension et hyperviscosité sanguine.

Présentation. — Boîte de 50 comprimés.

Posologie. — 2 à 3 comprimés avant les deux principaux repas. (Pour la femme, cesser 5 à 10 jours par mois au moment des règles.)

Prescription. — 1 boîte de comprimés *Cirvose Falvy*.

Les Laboratoires A. FALVY

Pharmacien licencié ès-sciences, ex-interne lauréat des hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 18-26.)

CITRALIN

Granulé entièrement soluble.

Composition :

Sulfate de magnésie	21 gr. 40
Citrate de soude trisodique	18 gr. 60
Boldine	0 gr. 004
Excipient	Q. S. pour 100 gr.
Contenance de l'étui : 110 gr.	

Propriétés thérapeutiques. — Antivisqueux, anticoagulant, cholagogue laxatif, excitant de la sécrétion hépatique.

Indications. — Gastralgie, Dyspepsie, Insuffisance hépatique, Etats lithiasiques, Diathèse arthritique, Goutte, Diabète, Régulateur vasculaire, Etats pléthoriques, Pneumonie.

Forme et mode d'emploi. — Granulé : 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun ou 1 cuillerée à café avant chacun des repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD
10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Marcadet 37-98.)

CITRA-QUINT

Granulé anticoquelucheux soluble.

Formule :

Citrate de soude.....	8 gr.
Bromure de sodium.....	6 gr.
Extrait de drosera Dausse.....	0 gr. 08
Extrait de grindelia Dausse.....	0 gr. 04
Extrait de thym Dausse.....	0 gr. 025
Excipient	Q. S. p. 100 gr. de saccharine.

Action. — Antivomitif puissant, sédatif des quintes.
Antiseptique bronchique.

Indications. — Coqueluche. Toux spasmodiques.
Toux émétisantes.

Mode d'emploi. — 6 mois à 1 an : une demi-cuillerée à café 4 fois par jour.

à 4 ans : 1 cuillerée à café 6 fois par jour.

à 15 ans : 1 cuillerée à dessert 6 fois par jour.

Laboratoires CORTEEL

74, rue de La Fère, SAINT-QUENTIN (Aisne).

CITRHEMOL

Forme et Composition. — Granulé friable soluble dans l'eau, aromatisé au citron, renfermant un gramme de citrate de soude par cuillerée à café (2/3 citrate monosodique, 1/3 citrate trisodique).

Indications. — Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Hyperviscosité sanguine, Hypertension, Rhumatismes, Goutte et toutes manifestations arthritiques, Intolérance gastrique des enfants, Vomissements, Pneumonie.

Posologie :

2 à 4 cuillerées à café par jour chacune dans un verre d'eau tiède de préférence avant ou pendant les repas, selon les indications.

Contenance : 125 grammes, soit 25 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire national du Contrôle des Médicaments.

Laboratoires de la REXACARBINE

LAVIT (Tarn-et-Garonne).

CITRILEX

Granulé.

Hyperviscosité sanguine. Troubles de la Circulation. Arthritisme, Gastralgie.

Indications. — Troubles circulatoires ; Hypertension ; Rhumatisme, Goutte ; Gastrite ; Dyspepsie ; Vomissements ; Hyper et Hypochlorhydrie ; Insuffisance Hépatique ; Constipation ; Migraines.

Formule.

Citrate monosodique	10 gr.
Citrate trisodique.....	5 gr.
Oléate de soude	1 gr.
Urotropine	0 gr. 50
pour 100 gr. de granulé.	

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, le matin à jeun ou 1 cuillerée avant les principaux repas.

Enfants : moitié de la dose.

Faire dissoudre dans 1/2 verre d'eau ou infusion tiède.

Prix : 18 fr. 65.

Laboratoires E. SOULIÉ

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS.

CITROCARBINE

Antisepsie digestive.

Composition. — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude, 10. — Charbon animal, 90.

Action. — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

Avantages. — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

Indications. — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Se fait aussi en comprimés.

Prix : 16 fr. 90

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e). Aut. 71-98.

CITROCHOLINE

Granulé de goût agréable.

Cholagogue. Décongestif.

Composition. — Citrate de soude 10, Hexaméthylène-tétramine 5, Sulfate de magnésie desséché 20, Lactose 30, Saccharose au citron. Q. S. p. 100.

Indications. — Affections hépatiques, Troubles digestifs, Lithiase, Affections urinaires, Hypertension, Viscosité sanguine, Varices, Phlébites, Arthritisme : Rhumatismes et Goutte.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café le matin, dans un demi-verre d'eau tiède.

Enfants (à partir de 5 ans) 1/4 ou 1/2 cuillerée.
Le flacon : 19 fr. 25.

Laboratoires FAURE et LAGENTE

MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59).

CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

Forme. — Granulés à saveur agréable.
Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique-comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

Dose. — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

Indications. — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 16 fr. 90

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

Aut. 71-98.

CITROLARGOL

Argent. sol. et Citrate de Soude.

Action. — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude.

Indications. — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et C^{1e}, Pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

CITRONEMA

Les applications des Citrates et du Magnésium. Granulé soluble, de goût agréable, contenant 10 p. 100 de bicitrate de Magnésium.

Indications. — Viscosité sanguine, Hypertension artérielle, Gastralgies, Vomissements, Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Goutte, Rhumatisme.

Doses moyennes :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Nourrissons : 1/3 à 1/2 cuillerée à café par jour.

Prix au public : 17 fr. 15.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer. — SAINT-MANDÉ
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

CITROPAÏNE DU Dr FONTAL

Composition :

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal (ext. de carica papaya).

Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, troubles digestifs du nourrisson, vomissements, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

Forme et Posologie :

Granulé : de 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Comprimés : de 6 à 9 par jour.

Cachets : de 2 à 3 par jour.

Enfants : 1/2 ou 1/4 des doses.

Laboratoires JICEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V^e).
(Tél. : Odéon 14-89.)

CITROPEPTOL

Poudre isotonisante du contenu stomacal.

Régulateur des fonctions hépatiques et intestinales.

Diurétique.

Composition :

Citrate de soude	0,25
Phosphate de soude	0,15
Sulfate de soude anhydre	0,10
Sucre de lait pulvérisé	4,50
Huile volatile de citron	Q. S. pour 1 sachet.

Indications. — Digestions lentes, pénibles, Ballonnement, Somnolence après les repas, Gaz de fermentation, Aérophagie, Constipation.

Posologie. — *Doses moyennes* : 2 sachets par jour, aux repas.

Échantillons :

Laboratoire R. FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

CITROSE-VICHY (Limonade)

Limonade purgative à base d'eau minérale de Vichy, parfumée avec les sucres de fruits (orange et citron).

Composition. — Cette limonade, préparée avec les sels de fruits associés au *sel naturel de Vichy*, constitue un excellent purgatif d'un goût très agréable et d'une conservation parfaite.

Elle n'occasionne jamais ni coliques, ni nausées. Sa composition, par bouteille de 200 cc. répond à la formule suivante :

Sel de Vichy : 34,64 ; Sirop sucre : 33 ; Sel essentiel de tartre : 30,92 ;
Ess. de citron : Q. S. ; Ess. d'orange : Q. S. ; Acide citrique : 0,25 ;
Eau saturée de gaz naturel de source : Q. S.

Mode d'emploi. — Prendre le matin à jeun au réveil :

Laxatif : Un verre à bordeaux ou un demi-verre.

Purgatif : Un verre ordinaire ou un demi-verre suivant le tempérament.

Pour les enfants : Moitié ou tiers de la dose des adultes suivant âge, tempérament et avis du médecin.

Dépôt : Laboratoires NOGUÈS,
7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

CITROSODINE LONGUET

Réalise la médication citratée sous 2 formes :

Comprimés à 0 gr. 25.

Granulé à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

Vomissements des nourrissons (1 comprimé par biberon), et des femmes enceintes (4 à 6 comprimés 3 ou 4 fois par jour).

Hyperacidité gastrique et dyspepsie : 3 ou 4 comprimés ou 1 cuillerée à café de granulé 2 ou 3 fois par jour.

Hypercoagulabilité sanguine : Etats pléthoriques, Stases veineuses, Phlébites, Thromboses, Pneumonies, 4 à 8 comprimés ou 1 à 2 cuillerées à café, granulé 4 à 8 fois par jour suivant indications.

Le flacon de comprimés ou de granulé : 16 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

CLEAROL

Pour bains oculaires.

Composition. — Hydrolat d'Hamamélis borosalicylé adrèphédriné (sans caustique).

Propriétés. — Antiseptique, Calmant, Décongestionnant et Tonique des conjonctives et des paupières.

Indications. — 1° *Toutes inflammations et infections oculaires externes, Conjonctivites, Blépharites, Dacryocystites, Orgelets, Kératites, etc.*

2° *Tous états inflammatoires professionnels (cinéastes et personnes exposées à des radiations lumineuses intenses ou prolongées).*

3° *Hygiène oculaire, Prophylaxie des poches palpébrales, Conservation de la blancheur de la sclérotique, de l'éclat et de la pureté du regard.*

Mode d'emploi. — Etendre le *Clearol* de moitié d'eau chaude en utilisant l'œillère qui accompagne chaque flacon et y baigner l'œil pendant quelques minutes.

Les bains d'œil au *Clearol* calment, décongestionnent et soulagent toujours.

Formuler : *Clearol*, un flacon.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

CLEINOL

Élixir reconstituant. Goût très agréable.

Composition. — Phosphore organique assimilable, Méthylarsinate de soude, Glycérophosphates, élixir à base de plantes aromatiques et digestives.

Indications. — Anémies, Chlorose, Asthénie, Anorexie, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences.

Flacon de 310 cc. Prix : 18 francs.

Durée moyenne : 10 jours.

Posologie :

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café ou à dessert par jour, selon l'âge.

Adolescents et adultes : 1 cuillerée à soupe matin et soir au début des repas.

Laboratoires du CLEINOL

LAVIT (Tarn-et-Garonne).

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

Composition. — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

Posologie. — *Usages médicaux* : 1 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

Usages chirurgicaux : 5 et 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Sterilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

Avantages. — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

Comprimés : tubes de 20 et 60 comprimés à 0 gr. 25.

Poudre : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

Échantillons médicaux sur demande :

**Laboratoire Pharmaceutique
DAUFRESNE**

42, rue Thiers — LE HAVRE.

COAGULÈNE ET HÉMO-COAGULÈNE

CIBA

HÉMOSTATIQUES PHYSIOLOGIQUES.

A base d'extrait hématique total, renfermant les substances coagulantes du sang, et particulièrement des plaquettes sanguines. Accéléralant la coagulation, ils permettent de juguler les hémorragies inaccessibles, de tarir les hémorragies en nappe et de corriger les déficiences sanguines des diathèses hémorragipares.

Deux formes : Hémo-Coagulène et Coagulène :
Hémo-Coagulène, *forme injectable*, en ampoules de 5 cc. (Voie hypodermique : injection intramusculaire. Voie intraveineuse).

Coagulène, *forme buvable*, en flacons-ampoules de 20 cc. (Voie buccale et applications locales).

Indications. — Hémorragies en général. Hémoptysies, Hématémèse, Melæna, Métorrhagies, Purpura, etc. Traitement de l'Hémophilie, de l'Hémogénie et des états hémorragipares. Prévention des Hémorragies opératoires et post-opératoires, en particulier lors des amygdalectomies, prostatectomies, avulsions dentaires.

Doses :

Hémo-Coagulène (injectable) : Une ampoule tous les jours ou tous les deux jours. En cas d'hémorragie grave, injecter de 1 à 4 ampoules par jour. Chez les enfants, posologie proportionnée à l'âge : 1/4 ou moitié de celle ci-dessus.

Coagulène (buvable) : *Adultes :* 2 à 5 flacons-ampoules par 24 heures. *Enfants :* 1 à 4 flacons-ampoules par 24 heures.

Le contenu des flacons-ampoules étant absorbé avec un peu d'eau ou une tasse de bouillon, suivant le goût du malade.

Poudre de Coagulène, pour préparation extemporanée de solutions, stérilisables par ébullition, qu'on utilise localement en tamponnements ou pulvérisations.

Boîte de 6 ampoules Hémo-Coagulène.

Boîte de 5 ou de 2 flacons-ampoules buvables Coagulène.

Flacons de 2 et 5 gr. poudre de Coagulène.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
 (Tél. : Moncey 43-26.)

COBRATOXINE (KATOX)

Composition. — Le *Katox* est une Cobratoxine nouvelle à dynamisme auto-renforcé s'utilisant à doses très faibles. Innocuité absolue. Technique simplifiée.

Indications. — Toutes Algies rebelles ; pas d'accoutumance ou toxicomanie. Effets sédatifs de longue durée, par modification du terrain nerveux. S'emploie en injections sous-cutanées ou en injections intradermiques. La voie intradermique est préférable : action plus rapide et plus durable, aucune réaction ni focale ni générale, courte durée du traitement (parfois une seule journée).

Posologie. — Variable selon les individus : en intradermiques, utiliser uniquement le *Katox Intra* ; en hypodermiques, débiter par 1/2 cc. de *Katox* n° 1.

Présentation. — Trois séries de 8 ampoules de 2 cc. (séries 0, 1, 2). L'augmentation du titrage est fonction du volume injecté. Chaque série : 72 fr. Le *Katox Intra*, 8 amp. de 1 cc. 50 fr.

COBRALLYRE

Cobratoxine non injectable en ampoule collyre.

Affections oculaires (Kératites, Iridocyclites, Hypertensions, etc.).

Affections naso-pharyngées (Rhume des foins, Coryza, Sinusites, Ozènes, etc.). L'ampoule de 10 cc. environ ; 22 fr.

Laboratoire de la COBRATOXINE

87, rue Denfert-Rochereau — PARIS (XIV°).

(Tél. : Odéon 29-35.) (Adr. télégr. : Cobrattox Paris.)

COCAÏNE MIDY

Pastilles de Cocaïne chloroborates.

Chaque pastille contient :

Stovaïne	0 gr. 001
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 001
Biborate de soude	0 gr. 025
Chlorate de potasse	0 gr. 075

Doses et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx : Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs, professeurs).

Prix : 10 fr. 70.

Durée du traitement : 10 jours.

Remboursée à 80 p. 100 aux Ass. Soc. — Catégorie A.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

CODÉPHRYL DUFOUR

Traitement des affections des voies respiratoires.

A base de : Terpene, Bromhydrate de codéine, Baume du Pérou, Chlorure d'ammonium, Emétine, Chlorhydrate d'Ephédrine, Seigle ergoté.

Propriétés. — Fluidifiant et expectorant par la Terpene, le Benzoate de soude, l'Emétine, l'Ergot du seigle. Calmant par le Bromhydrate de codéine.

Antiseptique par le Baume du Pérou et le Chlorure d'ammonium.

Vagotonique par le Chlorhydrate d'Ephédrine.

Indications. — Toux, Bronchites, Asthme et toutes affections des voies respiratoires.

Posologie:

Toux, bronchites sèches : 2 à 6 comprimés par jour.

Toux avec expectoration : 4 à 8 comprimés par jour.

Échantillon sur demande.

Le tube de 30 dragées : 16 francs.

Laboratoire de L'ÉDISTOL

H. DUFOUR, pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret). (Tél. : 21-28.)

CODÉRAX

Composition. — Chaque comprimé renferme : Codéine, 2 cgr. Terpene et Sucs résineux pulvérisés de Styrax Benzoin, aa 0,10.

Forme. — Comprimés pouvant être absorbés par les diabétiques ; conservation indéfinie.

Indications. — Sédatif des toux les plus rebelles : toux d'irritation, spasmodiques, quinteuses, nerveuses, toux des fumeurs, laryngites, trachéites, bronchites.

Insomnies : 2 comprimés au coucher.

Maladies d'estomac : 1 comprimé après le repas contre la gastralgie.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer ni croquer.

Dose. — 6 comprimés par 24 heures au maximum.

La boîte de 20 comprimés : 11 fr. 50.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 86-76.)

CODOCOL

Calmant de la Toux.

Composition. — Association de Thiophénolate de Codéine, Cinnamate de soude, Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

Avantages. — Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gaïacol.

Indications. — Trachéites, Bronchites aiguës et chroniques, grippe, pré tuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — 4 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

CODOFORME

Composition. — Comprimés enrobés constitués par une nouvelle combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent dans l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur. Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme, IV gouttes ; teinture d'aconit et belladone, aa V gouttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indications. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropathiques). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

Posologie. — 5 comprimés p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à partir de 5 ans) 2 à 3 compr. par 24 heures. Avaler sans sucer ni croquer. L'étui (4 à 5 jours de traitement).

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).
(Tél. : Danton 13-20.)

COLARSÉNOL

Collutoire inaltérable au Novarsénobenzol.

Indications :

Angines de Vincent, rouges, pultacées, lacunaires, à streptocoques, herpétiques, pseudo-membraneuses.

Diphtéries ; adjuvant du traitement par le sérum, désinfection du rhino-pharynx chez les porteurs de germes.

Pyorrhée alvéolo-dentaire, stomatites et gingivites.

Mode d'emploi. — En applications sur les amygdales ou les gencives. En gargarismes.

Prix : { Le flacon de 30 cc 16 fr. 50
 { Le flacon de 20 cc 11 fr. »

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1226-1.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil, JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59).

COLARSÉNOL

Pommade nasale.

Composition :

Novarsénobenzol 1 gramme.

Chate d'éphédrine 1 —

Essences de Pin, de Cèdre,
 de Géranium. aa 1 —

Excipient Q. S. P. 100 grammes.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Désinfection du Rhino-Pharynx des porteurs de germes diphtériques.

Mode d'emploi. — Introduire gros comme un pois dans chaque narine plusieurs fois par jour.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil — JOINVILLE-LE-PONT
 (Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

COLAVÉ

Extrait spécial de Kola suractivé par addition de 1 p. 100 de caféine pure.

Forme. — Granulé fondant.

Indication. — Stimulant musculaire et nerveux, Tonique général, Régulateur du cœur, Convalescence, Dépression physique.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.
Durée du flacon : 12 à 15 jours.

Prix : 16 fr. 25.

Enregistré au laboratoire national de contrôle sous le n° 1107.

E. VERDON

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 8.)

COLCHICINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

La **Colchicine pure** cristallisée a été découverte par A. Houdé (1887).

Propriétés. — Augmente fortement les sécrétions. Excitant du sympathique. Modérateur des échanges nutritifs.

Indications. — *Spécifique* de la *goutte* : Accès aigus ou manifestations subaiguës ou larvées (rhumatismes goutteux).

Posologie :

Accès aigu : 3 granules le premier jour en 3 fois (1 à 2 heures d'intervalle).

2 granules le deuxième jour et jours suivants.

Traitement en 4 jours environ (ne pas dépasser 7). Cesser dès sédation, ou en cas de diarrhée.

Manifestations subaiguës (ou comme préventif) :
1 à 2 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

COLCHI-SAL MIDY

Composition. — Chaque capsule contient :

1/4 de mmg. de colchicine pure dissoute dans 0 gr. 20 d'Essence de Wintergreen (obtenue par fermentation et distillation de l'écorce de *Gaultheria procumbens*).

Propriétés. — Le COLCHI-SAL MIDY réunit dans une seule médication :

- 1° Les propriétés thérapeutiques de l'Essence de Wintergreen : *Anal-gésique, Antinévralgique, Antirhumatismale.*
- 2° Les propriétés thérapeutiques de la Colchicine : *Spécifique de l'accès de goutte articulaire aiguë, et de toutes les manifestations douloureuses de la goutte typique et larvée.*

Indications. — Accès de goutte, Rhumatisme goutteux, toutes névralgies, névrites et myalgies d'origine goutteuse. Lumbagos et sciatiques. Le COLCHI-SAL MIDY doit être essayé dans tous les cas de sciatique rebelle ; il réussit souvent là où tout a échoué.

Forme. — Capsules.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 16 capsules par jour, par prises fractionnées (2 à 3 capsules par prise).

Prix : 21 fr. 35.

Durée du traitement : 8 à 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

COLIBACINE

Thérapeutique Biochimique de toutes les manifestations provoquées par le Colibacille.

Composition :

Citrates de soude monosodique et trisodique, agents de leucocytose.

Acide nucléinique d'origine végétale, agent d'hyperleucocytose. L'acide nucléinique de la Colibacine est solubilisé par catalyse.

Chlorure de magnésium, agent de conservation des leucocytes.

Présentation. — En ampoules buvables pouvant être également utilisées en lavements.

La boîte de 7 ampoules : 25 fr.

Laboratoire COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 45-01.)

COLIFLORINE CARRION

Vaccin coli-entérococcique pour ingestion.

Composition. — Émulsion de colibacilles et d'entérocoques à 2 milliards de germes par cc. (soit 10 milliards par ampoule), obtenue à partir de souches multiples.

Forme. — Ampoules de 5 cc.

Indications. — Infections intestinales aiguës et chroniques. Auto-intoxications d'origine intestinale. Syndrome entéro-rénal, entéro-hépatique etc. Septicémies et fièvres prolongées d'origine indéterminée. Vaccination préopératoire (appendicectomie, etc.).

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule *per os*, le matin à jeun, et une ampoule 2 heures après le repas du soir. (Enfants : demi-dose.) Dans les cas chroniques, une ampoule par jour pendant une ou plusieurs semaines.

Présentation et prix. — La boîte de 12 ampoules : 28 fr. 10.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

COLISEL

Composition. — Charbon animal et végétal ; chlorure de magnésium ; carbonate de chaux ; poudre titrée de Belladone.

Présentation. — Granulé, Poudre.

Propriétés. — Traitement actif des affections de l'intestin. Par son pouvoir absorbant et neutralisant supprime les fermentations et l'action nocive des toxines.

Indications. — Sédatif antispasmodique de choix, entérites et surtout entérocrites aiguës ou chroniques, associées ou non à d'autres maladies du tube digestif (gastro-entérite, appendicite chronique, cholécystites) ou à des affections des voies urinaires (syndrome entérorénal, pyélonéphrites à colibacilles).

Posologie. — 1 cuillerée à café matin, midi et soir après les repas dans un peu d'eau.

Laboratoires J. LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON.
(Tél. : Ent. 01-41.)

COLITIQUE

Vaccin curatif anticolibacillaire.

**Adopté par le Ministère des Colonies
et par les Hôpitaux de Paris.**

Indications. — Toutes les manifestations du syndrome provoqué par le colibacille.

Double action par son émulsion microbienne et par son principe lysant.

Formes : *Buccale, la plus active.* Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.
Injectable (10 ampoules de 1 cc.).

Filtrat, pour applications locales (6 amp. de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules, 26 fr. 75 ; 5 ampoules, 14 fr.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

COLI-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

2 formes : Injectable, buvable.

Composition. — Lysat de Colibacilles (souches variées).

Indications. — Pyélonéphrites, Colibacillooses.

Posologie. — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.)

1^{re} injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours, puis tous les 2 jours. *Coli voie buccale* (non injectable) ampoules de 3 cc. 1^{er} jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée; 2^e jour : 3/4 d'ampoule; ensuite une ampoule par jour pendant 8 à 10 jours.

Présentation. — 1^o Coli-Vaclydun injectable en boîtes de 6 ampoules de un centicube. 2^o Coli-Vaclydun buvable. — En boîtes de 10 ampoules de 3 centicubes.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

COLLARGOPHÉDRINE

Solution d'éphédrine naturelle associée aux sels d'argent indolores.

Composition :

Sulfate d'éphédrine naturelle.....	0 gr. 50
Nuclargyl (protéose argentique indolore à 20 p. 100 d'argent).....	0 gr. 45
Nitrate de para-aminobenzoyl diéthylaminoéthanol (Nitrate de novocaïnium).....	0 gr. 20
Argent colloïdal (Collargolum)	0 gr. 15
Camphre	0 gr. 01
Huile essentielle de Melaleuca viridiflora rectifiée.....	0 gr. 015

Pour 100 grammes.

Présentation. — En flacon-ampoule compte-gouttes.

Action. — Décongestion, antiseptie de la muqueuse nasale, sans irritation, ni douleur, anesthésique, excitant de la rénovation cellulaire.

Indications. — Collargophédrine est indiqué dans toutes les affections nasales : cataracte nasopharyngien, coryza spasmodique, coryza, sinusite, rhinite, rhume des foins, végétations, céphalée, rhino-pharyngite, œdème du pharynx et de l'épiglotte, états asthmatiques et dans les maladies infectieuses : état grippal, rougeole, scarlatine, angine, érysipèle, oreillons et toutes fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En instillation ou en pulvérisation :

Enfants : 1 à 5 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.

Adultes : 5 à 10 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.

Prix : 18 fr. 75.

En pulvérisation : 2 à 3 fois par jour.

Pulvo-Collargophédrine. — Flacon avec Pulvérisateur spécial.

Prix public : 25 francs. Flacon de recharge : 15 fr. 50.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (X^e),

COLLOBACILLINE DU D^r GRIMBERG

(Extrait bacillaire colloïdal).

Indications. — Toutes les tuberculoses externes, articulaires, osseuses, cutanées, péritonéales, épидидymaires, rénales, etc., fistulisées ou non (à l'exclusion de la tuberculose pulmonaire).

Présentation :

Comprimés de 0 gr. 0001. Commencer par 1 comprimé par jour, puis 2, 3, 4, 5 suivant la tolérance du malade.

Ampoules de 1 cc. Cinq concentrations :

A, B, C, D, E. Commencer par 0 cc. 1 de la concentration A et augmenter progressivement de 0 cc. 1 à chaque injection. Deux injections par semaine.

Prix : 50 fr. la boîte de 6 amp. ou 75 comp.

Laboratoire des COLLOVACCINS

74, rue Blanche — PARIS. - (Tri. : 55-13.)

COLLOBIASE DE SULFHYDRARGYRE

Teneur en Soufre-Mercure colloïdal par centimètre cube environ
1/4 de millig. de Soufre et 1 millig. d'Hydrargyre.

Ampoules de 2 centimètres cubes.

Aspect. — Pseudo-solution de teinte gris bleu.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Médicament anti-syphilitique de toutes les périodes de la maladie. Le soufre qu'il contient augmente l'activité du Mercure et explique l'action articulaire du médicament dans certains accidents spécifiques, tel le rhumatisme déformant.

Ce médicament est un des mercuriels les mieux supportés.

Mode d'emploi. — En injection, de préférence par voie intraveineuse ou intramusculaire.

Posologie. — Voie intramusculaire : injection tous les jours ou tous les deux jours. Débuter par 1/2 cc. soit 1/4 d'ampoule ; augmenter de 1/2 cc. chaque fois pour atteindre 2 cc., dose à maintenir jusqu'à la fin du traitement (c'est-à-dire la dixième injection).

Par voie intraveineuse : procéder de même manière, mais par 1/4 de cc., c'est-à-dire 1/8 d'ampoule à la fois, jusqu'à 2 cc.

Opérer dans les deux cas par séries de 10 injections, avec 15 jours de repos entre chaque série.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — (Tél. : Turbigo 63-40.)

COLLOCRINE

Composition. — Synergie polyendocrinienne iodo-protéique et métaux colloïdaux catalyseurs.

Présentation unique. — Dragées.

Indications. — Rétablit le bon équilibre endocrinien. Troubles de la ménopause et de la puberté. (Par sa combinaison iodée et endocrinienne, réussit particulièrement dans les troubles circulatoires et nerveux de la ménopause.) Aménorrhée, Ovariectomie, **Obésité**, Sénilité précoce.

Convient aux deux sexes.

Posologie. — 3 à 8 dragées par jour (le matin à jeun et 20 minutes avant les repas).

Étui de 100 dragées : 22 francs.

Durée moyenne des unités ventes : 1 mois.

Laboratoire de la COLLOCRINE

M. Gadreau, Dr en Ph^{ie}, Ex-Int. des Hôp. de Paris
155, bd Aristide-Briand — SAVIGNY-SUR-ORGE
(Seine-et-Oise). — (Tél. : Juvisy 398.)

COLLOIDINE LALEUF

Composition. — Extrait total pluriglandulaire associé à l'Iodalbumine.

Propriétés et indications. — Remédie à la violation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'Iodalbumine, favorise la combustion intra-organique.

Toutes les affections dues à une carence endocrinienne, et principalement l'obésité, sont justiciables du traitement à la COLLOIDINE.

Formes. — Comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 4 dragées par jour, suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Durée moyenne des unités de vente : 30 à 50 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 100 dragées : 27 francs.

Laboratoires **LALÉUF**

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

COLLOÏDOGÉNINE

du Docteur BAYLE

Opothérapie splénique intégrale.

Nature. — Extrait total de rate.

Formes. — 1° Colloïdogénine injectable (ampoules de 5 cc.).

2° Colloïdogénine sirop.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale).

Indications. — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

Anémies, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.

Convalescences, grossesses pénibles, amaigrissement, rachitisme, neurasthénie, déminéralisation, déficiences organiques.

Action. — Augmentation rapide des hématies (50 p. 100) et des leucocytes.

Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100).

Progression rapide des forces et du poids.

Cicatrisation des lésions (visible à la radio), disparition des bacilles de Koch.

Emploi et doses. — Séries de 12 injections (intramusculaires dans la fesse ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Après chaque série 8 jours de repos. Pendant les 22 jours de chaque série, le sirop de colloïdogénine est donné en même temps (4 cuillerées à soupe par jour aux repas). Dans les anémies et les convalescences le sirop suffit.

Doses chez l'enfant. — Au-dessus de 5 ans, injecter 5 cc. Au-dessous de 5 ans, injecter 1 cc. par année d'âge.

Colloïdogénine sirop : 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 3 ans, 4 jusqu'à 5 ans, 1 à 2 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 à 3 jusqu'à 10 ans, ensuite 3 à 4.

Laboratoires CHAIX


8 et 10, rue Alphonse-Bertillon (ancienne rue de l'Orne) — PARIS (XV^e).

(Téléphone : Vaugirard 16-11.)

COLLOSOUFRE

Composition. — Soufre colloïdal vrai et stable à gros grains amicroniques, à réaction neutre et à charge électrique forte.

Propriétés. — Complément naturel des cures thermales et hydrominérales sulfureuses.

Indications. — Anémie pernicieuse, bacilloses, rhumatisme chronique, diabète, artériosclérose, néphrites aiguës et chroniques, ictères infectieux, cirrhoses, auto-intoxications, dermatoses d'origine interne, pneumonies, pharyngites, laryngites, bronchites chroniques, coryza. 

Présentation et prix :

Cachets : 25 francs la boîte de 25 cachets.

Granulé : 15 francs le flacon de 150 grammes.

Posologie. — 1 cachet midi et soir, ou trois cuillerées à café de granulé par jour.

Les Laboratoires Lorrains de Produits purs.

ÉTAIEN (Meuse). — (Tél. : 74.)

COLLOVACCINS

Collobacilline. — Extrait bacillaire colloïdal du
Dr A. Grimberg.

Voir Collobacilline.

Collovaccins injectables :

N° 22. Antistaphylococcique.

N° 23. Antistreptococcique.

N° 24. Antigonococcique.

N° 25. Anticolibacillaire.

N° 26. Thyphoïdes.

N° 27. Entérites.

N° 28. Antipyogène.

N° 29. Pulmonaire.

N° 30. Antiblennorragique.

N° 31. Gynovaccin.

N° 32. Préopératoire.

Injections intramusculaires.

Prix : 25 francs la boîte de 6 ampoules.

Collovaccins pansements :

N° 2. Antiblennorragique.

N° 3. Gynovaccin.

N° 4. Furoncles, anthrax.

N° 5. Rhinites, sinusites.

N° 6. Colibacillaires.

N° 7. Plaies infectées. (Collo-chir.)

N° 8. Infections puerpérales.

Prix : 20 francs la boîte de 3 ampoules.

Suppovaccins (suppositoires vaccins).

N° 40. Prostatites, rectites.

N° 41. Métrites, salpingites.

N° 42. Colibacilluries.

N° 43. Typhoïdes.

Ovules : Gynovaccin-ovules.

Prix : 25 francs la boîte de 6.

Laboratoire des COLLOVACCINS

74, rue Blanche — PARIS (IX°).

COLLUNOVAR

Collutoire au Novarsénobenzol.

Affections du Rhino-Pharynx.

Indications. — Médication préventive et curative de toutes les angines. Angine de Vincent. Affections amygdaliennes. Pyorrhée alvéolo-dentaire, Stomatites, Gingivites. Affections nasales.

Formule :

Novarsénobenzol	1 gr.
Citrate sodique	5 gr.
Niéraline 1/1 000.....	0,50

Pour 100 cc.

Posologie. — En badigeonnage léger sur les amygdales ou sur les gencives.

En gargarisme ou bain de bouche, à la dose d'une 1/2 cuillerée à café par verre d'eau tiède.

En gouttes nasales : 5 à 6 gouttes, 2 fois par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

Tél : Longchamp 04-61

COLLUSULFAR

Collutoire au Sulfarsénol.

Formule :

Sulfarsénol	5 gr.
Excipient. Q. S. pour.....	100 cc.

Solution stabilisée de Sulfarsénol de forte concentration qui lui assure une grande puissance antiseptique et une action antimicrobienne remarquablement polyvalente.

Indications. — Angine aiguë, Angine de Vincent, Stomatites, Gingivites.

Mode d'emploi. — En badigeonnages : 4 par jour.

En bains de bouche : 1/2 cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau tiède.

Formes :

Flacons. Grand modèle, de 30 cc. Petit modèle de 15 cc.

Prix de vente au public :

Flacons. Grand modèle : 16 francs. Petit modèle : 8 fr. 55.

Laboratoires de Biochimie médicale.

Ch. DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

COLLUTOIRE MEXYL

**A l'Arsénobenzol pentavalent 5 p. 100
et Stomacaine 3 p. 100**

(antispirillaire et calmant).

Traitement de toutes les Angines, Gingivites, Stomatites, Pyorrhée.

Agit rapidement sur l'élément microbien.

Agit rapidement contre la douleur.

L'arsénobenzol pentavalent employé assure une stabilité réelle à la solution.

La Stomacaine (chlorhydrate de paramino-benzoyldiéthylamino-éthanol), succédané de la cocaïne, de toxicité 10 fois moindre, anesthésie par contact sur lésions et irritations des muqueuses.

Badigeonnages et gargarismes. Bains de bouche.

Flacons de 30 gr. Prix : 17 fr. 50.

L. N. C. M. n° 574-7.

Laboratoires MEXYL
6, rue des Dames — PARIS.

COLLUTOIRE TRÉPALLIX

Composition. — Solution stabilisée de lactate de mercure à 0 gr. 60 pour 100 grammes.

Action. — Celle résultant de la composition même du lactate de mercure (acide lactique et mercure).

Cette préparation, tout en utilisant au maximum les puissantes propriétés anti-infectieuses et désinfectantes, du lactate de mercure, réalise le double avantage : de conserver indéfiniment cette qualité sans subir aucune altération ; de n'entraîner à l'usage aucun accident toxique local ou d'ordre digestif.

Indications. — *Toutes les angines aiguës non-diphthériques* : angines érythémateuses simples, angines érythémato-pultacées, angines herpétiques, angines du fuso-spirillaire de Vincent, etc..., stomatites toxiques ou infectieuses, gingivites.

Posologie. — Se prescrit en badigeonnages, attouchements, gargarismes, bains de bouche.

Angines aiguës : 2 à 4 badigeonnages par 24 heures ou 2 à 3 gargarismes par jour (40 à 50 gouttes dans un demi-verre d'eau bouillie).

Stomatites : 2 ou 3 attouchements légers sur le pourtour des gencives et au contact même des lésions.

Enfants : La moitié des doses ci-dessus indiquées.

SYNTHESIS

R. L. MATHIVAT

Docteur en Pharmacie — Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

66, rue de la Pompe — Paris.

(Tél. : Trocadéro 30-52 et 32-91.)

COLLUTOIRE V.-E. DOUMER**Formule:**

Bleu de méthylène V.-E.	
Doumer.....	1 gr.
Résorcine.....	0 gr. 20
Excipient glycériné. Q. s.	
pour	100 gr.

Indications. — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

COLLYRE ROSE

Formule :

Camphre	0 gr. 01
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	0 gr. 02
Sulfate de zinc	0 gr. 04
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.	0 gr. 50
Eau distillée.....	10 gr.
Safranine, Q. S. pour colorer.	

Indications. — Larmoiement, Blépharites, Cils collés, Conjonctivites des vieillards et des enfants, Herpès de la cornée.

Posologie. — II à III gouttes, trois fois par jour.

COLLYRE BLEU

Formule :

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 002
Stovaïne	0 gr. 02
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.	1 gr.
Eau distillée.....	10 gr.

Indications. — Toutes conjonctivites, Blépharites, Kératites, Ulcérations de la cornée.

Posologie. — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour.

COLLYRE BLEU IRRADIÉ

Formule :

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 004
Stovaïne	0 gr. 02
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.....	1 gr.
Eau distillée.....	10 gr.

Indications. — Toutes celles du Collyre bleu. Mais son efficacité est renforcée par l'application des Rayons ultra-violet et l'action tonifiante exercée sur les tissus, surtout dans les cas de *Blépharites par avitaminoses*.

Spécifique de la kératoconjonctivite phlycténulaire.

Posologie. — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour.

Flacons-ampoules compte-gouttes de 15 cc.

Laboratoires LAITER

P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie

52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS

(Tél. : Flandre 00-55.)

COLLYRES CHIBRET

(Chibrocollyres)

En ampoules compte-gouttes, contenant 10 cc. de liquide, pouvant se maintenir aseptique, ne modifiant pas la tension oculaire ni l'accommodation.

Chibroargyrol, Chibrocollargol, Chibrococaïne, Chibroprotargol, Chibroargent (Azotate), Chibrobleu (spécial), Chibroatropine, Chibroatropine et Cocaïne, Chibrohomatropine, Chibronovocaïne, Chibropilocarpine, Chibropilocarpine-Adrénaline, Chibrocuivre, Chibrozinc, Chibrozinc et Novocaïne, Chibroésérine, Chibroésérine et Adrénaline, Chibrofluorescéine, Chibroborate de Soude et Adrénaline, Chibroiodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Chibrocyanure de Mercure, Chibromercurobrome.

Collyres en ampoules de 1 cc. (pour *nouveau-nés*).
Chibromercurobrome, Azotate, Argyrol.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à

Laboratoire CHIBRET

5, rue Saint-Hérem, CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme). (Tél. : 33-36.)

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.
Marque déposée « Optima ».

(Voir à *Chibromercurobrome* le libellé spécial.)

COLPOPHILE

Paquets de poudre soluble.

Formule :

Cérasine, Saponine, Acide Orthoxybenzoïque, Tétraborate de Soude, Sulfate d'alumine et de Potasse, Bicarbonate de soude, Parfum Q. S. pour 1 paquet.

Posologie :

- 1° Un paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède ;
- 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 3° Obstétrique, 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 4° Hygiène masculine ou Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 ou 1 litre d'eau en compresses ou lotions.

Prix :

La boîte de 30 paquets : 18 fr. 70.

RICHER, docteur en Pharmacie

45, faubourg Saint-Denis, 1, rue d'Enghien — PARIS
(Tél. : Provence 34-87.)

COLTÈNE

Composition. — A base de Coaltar solubilisé, chloralé, mentholé et aromatisé.

Propriétés et indications. — Antiseptique et anesthésique pour soins de la bouche, de la gorge et du nez.

Posologie et mode d'emploi. — Le Coltène s'emploie à la dose de XX gouttes par verre d'eau chaude, en bains de bouche, en gargarismes ou en pulvérisations.

Dans tous les soins dentaires post-opératoires, après les extractions, dans les abcès, les fluxions dentaires et les plaies de la bouche, les gingivites, les stomatites, les angines, les amygdalites, les pharyngites et tout autre état inflammatoire de la muqueuse bucco-pharyngée.

Comme dentifrice, quelques gouttes dans un demi-verre d'eau froide.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt et vente en gros :

J. BLANCHARD, Pharmacien de 1^{re} classe
PONT-DE-VAUX (Ain).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1195-2.

COLUVAL

Collyre polyvalent.

Neutralisant, antiseptique, angiotonique
et astringent.

Composition. — A base d'eaux distillées d'Hammamelis Virginica, de Fenouil, de Rose, de Sureau ; d'acide borique et de borate de Soude.

Indications. — Toutes les infections de l'œil : conjonctivite, orgelets, blépharite, chalazions, kératite et kérato-conjonctivite, iritis, kérato-iritis, irido-cyclite, dacryocystite.

Le Coluval présente un pH = 8,5.

Mode d'emploi. — Bains oculaires, instillations, compresses.

Prix : Le flacon avec œillère (200 cc. env.) : 15 francs.
Le double flacon sans œillère (400 cc. env.) : 23 fr. 50

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
Tél. : Galvani 84-41.

COMBEY-LAX

le délicieux laxatif.

Véritable confiture liquide absorbée comme une friandise par les enfants.

Composition exclusivement végétale aux sucres de fruits et plantes rafraîchissantes (Pomme de reinette, Cassia, anis vert, fenouil, coriandre, bourrache).

Action très douce, sans coliques et sans accoutumance, chez les nourrissons, les enfants, les adultes (femmes enceintes ; opérés, convalescents et tous les organismes délicats).

Doses :

Enfants du 1^{er} âge : 1/3 ou 1/2 cuillerée à café.

Enfants au-dessus d'un an : une cuillerée à café ou une cuillerée à dessert.

Adultes : une ou deux cuillerées à soupe.

Doses variables suivant les indications du médecin traitant.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires COMBEFREYROUX

134, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Oberkampf 51-10.)

COMBRETINE

Extrait fluide de Combretum Rambaultii H.

« *Le plus actif des cholagogues.* »

Professeur ROBIN.

Indications. — Coliques hépatiques, Congestion du foie et de la Vésicule biliaire, Crises douloureuses du foie, Insuffisance hépatique, Ictère et Cholémie.

Dyspepsies réflexes, Migraines, }
Vertiges, Prurit, Constipation, } d'origine hépatique.

Forme. — Extrait fluide.

Posologie. — XXX à LXXX gouttes par jour, à prendre en 3 fois au début des repas.

Avantages. — Action douce, constante et rapide sur les diverses fonctions du foie. Jamais toxique. Cholagogue d'une remarquable activité. Agit plus sûrement que le boldo et sans déterminer d'accoutumance.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 199-4.

Laboratoire BROCHON

202 bis, rue de Paris — CLAMART (Seine).

(Tél. : Mic. 00-62.)

COMITIOL

Formules. — Faible. Normale. Forte.

Chaque comprimé contient : Tartrate-borico-potassique, 0 gr. 50 + Phényl-éthyl-Malonylurée.

0 gr. 01 par comprimé, formule faible.

0 gr. 02 par comprimé, formule normale.

0 gr. 03 par comprimé, formule forte.

Indications. — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Anger, Pectoris, Angoisses.

Avantages. — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Ethyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

Doses. — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

Enfants : 1/3 de comprimé par année d'âge et par jour. Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITIOL.

Prix.	Formule faible.	Formule normale.	Formule forte.
Boîte de 10 jours.	13 fr. 10	17 fr. 45	19 fr. 65
— 30 —	32 fr. 80	43 fr. 75	54 fr. 70

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous les n^{os} 309-1, 309-2, 309-3, 309-4.

Pharmacie GRORICHARD

12, place de la Révolution — BESANÇON.

COMPOSÉ GMET

Tonique aux effets précoces et durables.

Composition. — Kola - coca - quinquina, sans addition d'alcool ni de caféine, ni de strychnine.

Propriétés. — Tonique général et nerveux. Effets *immédiats* mais *durables*.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, convalescences, suites de couches, d'opérations, fatigue, surmenage, prétuberculose, Asthénies.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant les repas, une ou deux fois par jour. (En cas de tachycardie, ajouter une cuillerée à café de Cratægus Gmet, régulateur cardiaque).

Le flacon pour 1 mois : 27 doses.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.)

COMPRESSES GRASSES "ONCTUA"

Composition :

Para-Isopropylmétacrésol	0,35
Phenolum salicylicum	0,75
Oleum cacao	10
Paraffinum	15
Cera Alba	7
Adeps lanæ	7
Vaselinum	Q. S. p. 100 gr.
Baume du Pérou	1 %

Indications. — Tous pansements de brûlures, ulcères, furoncles, anthrax, abcès, escarres. Plaies diabétiques.

Présentation et prix. — Carrés de tulle grec de 10 × 10. Compresses grasses de 10 × 10 ne séchant pas, s'enlevant rapidement, évitant l'arrachement des bourgeons d'épidermisation.

La boîte de	6 compresses :	9 fr.
—	12	— 14 fr.
—	20	— 22 fr.

Adresser les demandes :

Dépôt général **Établissements ÉCHARD-GILLIER**
Pansements
L'ARBRESLE (Rhône).

LORIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

N° 1. Bébés, la boîte de 2 : 18 francs.

N° 2. Enfants, la boîte de 2 : 22 francs.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et-L.). (Tél. : 45.)

COMPRIMÉS D'ALIBOUR

Composition. — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre dans les mêmes proportions que la formule d'eau d'Alibour faible. 1 comprimé dissout dans 100 gr. d'eau donne l'eau d'Alibour.

Indications. — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des flueurs blanches, impétigo, ecthyma.

Action. — Antiseptique d'usage courant, prophylactique, hygiénique, anticatarrhal.

Dose. — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyme.

Prix : 12 fr. 50 la boîte de 36 comprimés.

Société industrielle de thérapeutique scientifique appliquée,

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis.**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

COMPRIMÉS « GALAC »

Ferment lactique titrant 50 % de culture pure de Bacille bulgare.

Antiseptique gastro-intestinal.

Traitement spécifique et inoffensif des Gastro-Entérites infantiles, Infections Gastro-Intestinales Dermatoses.

Chaque flacon porte UNE ÉTIQUETTE PRÉCISANT LA DATE DE FABRICATION, GARANTISSANT AINSI LA DURÉE D'ACTIVITÉ REELLE ET INCONTESTABLE DU MÉDICAMENT.

Adultes : 2 à 3 comprimés ; Enfants : 1 à 2 comprimés. Trois fois par jour, délayés dans un peu d'eau bouillie, avant les repas.

Prix du flacon de 60 comprimés : 11 francs.

Prix du flacon de 20 comprimés : 4 fr. 50.

Laboratoires LAMBERT

Place du Châtelet — ORLÉANS.

(Tél. : 34-50.)

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, flueurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Prix : 10 fr. 70.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.
(Tél. : Littré 26-92.)

COMPRIMÉS KLÉOS

Indications. — Maladies nerveuses infantiles (épilepsie, convulsions, douleurs de dentition, terreurs nocturnes). Comprimés n° 1 : Coqueluche.

Forme. — Comprimés solubles.

Comprimés Kléos aux polybromures n° 1.

Comprimés Kléos à la Phényléthylmalonylurée, n° 2.

Comprimés Kléos aux tartrates borico-potassiques et sodiques n° 3.

Posologie. — 1 comprimé par jour et par année d'âge dissous dans un liquide quelconque.

Avantages. — Dosage rigoureux, produits purs et stables.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous les N°s 963-1, 2 et 3.

Prix : 14 francs.

Traitement : 3 semaines environ.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GUÉRET

2, rue des Cordeliers, MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret).

COMPRIMÉS NICAN

Par comprimé :

Chlorhydrate d'Éthylmorphine (Dionine N. D.), 0 gr. 01.
Benzoate de soude 0 gr. 25, Extraits Serpolet et Coqu: l'cot
 (du sirop de Desessartiz), Extraits Aunée et Marrube.
Sédatif de toutes les toux, *fluidifiant* et *expectorant*.
 Complément pratique des **Gouttes Nican**, pour le
 traitement ambulatoire.

Bronchites saisonnières, Toux persistantes, Séquelles
 de Rhumes, Trachéites irritatives, Mucosités bron-
 chiques.

Quand le rhume « traîne » et contre l'habitude de tousser.

Posologie. — *Adultes et adolescents :*

2 à 4 comprimés par jour dans les formes aiguës.

1 à 2 comprimés par jour, ou le soir au coucher, dans les
 formes chroniques.

Tube de 20 comp. pour 5 à 10 jours de traitement.

Prix : 13 fr. 90.

Voir **Gouttes Nican** à base de Codéine et Bromoforme.

Laboratoires **CANTIN**

PALAISEAU (Seine-et-Oise.)

COMPRIMÉS ORTHO-MALLEVAL

Composition :

Paraminobenzoate de butyle.....	0,0045
Guimauve (rac. pulv.)	0,0135
Aldéhyde méthylprotocatéchique	0,0000006
Gomme et saccharose. Q. S. pour 1 comp. de 0 gr. 30.	

Propriétés. — Puissant anesthésique local.

Aucune toxicité. Léger antiseptique.

Indications. — Toutes affections douloureuses des
 voies aériennes et digestives supérieures : Stoma-
 tites, Angines, Pharyngites, Toux incoercibles,
 Certains cas de Gastralgies et d'Ulcus gastriques.

Mode d'emploi. Posologie. — Laisser fondre
 lentement les comprimés dans la bouche, ou, si
 on veut agir sur l'estomac, les avaler avec un peu
 d'eau.

10 à 20 comprimés par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 911-1.

Laboratoire des Produits Ortho-Malleval

34, r. du Plat, 9, r. Sala - LYON - Tél. : Franklin 00-92.

COMPRIMÉS PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspondant à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Streptococciques, Staphylococciques et pyocyaniques.

Indications thérapeutiques. — Abscesses, Phlegmons, Anthrax, Panaris, Furoncles, Sycosis, Orgelets, Pyodermites, Impétigo, Intertrigo, toutes les affections à germes Pyogènes

Présentation. — En boîte de 36 comprimés.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas pendant 9 jours. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Voies Respiratoires 0,05, Excipient Q. S. pour 1 comprimé de 0,50.

Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange, liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Voies Respiratoires.

Présentation. — En boîte de 36 comprimés.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Angine, Bronchites, Broncho-pneumonies, Grippe.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas pendant 9 jours. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

PROBIOS INTESTINAL

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal.

Indications thérapeutiques. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases, Dysenteries bacillaires et tous états toxi-infectieux intestinaux.

Présentation. — En boîte de 36 comprimés.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas, pendant 9 jours. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e). (Tél. : Turb. 40-83.)

COMPRIMÉS DE PROTO-GAMBIER

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable : le même que celui du Gambéol, du Ganderma et du Salvatyl.

Propriétés. — 1° Antiseptique, désinfectant et désintoxicant des voies gastro-intestinales ; laxatif et purgatif.

2° Cholérétique et cholagogue.

3° Vermifuge, diurétique et diaphorétique.

Indications. — Embarras gastriques, infections et fermentations gastro-intestinales, gastro-entérite infantile, grippe intestinale, dysenterie, fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, coli-bacilliose, constipation.

Hypersécréteur et hyperexcréteur biliaire.

Ictères, cholécystites, angiocholites, hépatites, cirrhoses, etc.

Cholémie familiale et toutes affections hépato-biliaires.

Dosages. — Comprimés à 1 mgr., à 1 cgr., à 5 cgr.

Chaque comprimé porte sur l'une de ses faces son dosage ; et sur l'autre une rainure en croix permettant de le diviser en 4 parties égales.

Présentation. — Ils sont délivrés en boîtes de 3 tubes : 2 en verre, 1 en aluminium contenant chacun 15 comprimés. Prix. Tous dosages. La boîte : 14 francs (30 jours de traitement en moyenne).

Le tube en aluminium permet le transport facile des comprimés pour toute personne vaquant à ses occupations en dehors de chez elle.

Doses moyennes et mode d'emploi. — Sous réserve des indications particulières du médecin traitant, les *Comprimés de Proto-Gambier* s'emploient habituellement aux doses suivantes :

1° 1 mgr. à 2 mgr. par jour, chez les enfants de moins d'un an (soit 1 à 2 comprimés, dosés à 1 mgr.), suivant l'âge.

2° 1/4 cgr. à 1 cgr. par jour, chez les enfants d'un à 4 ans (soit 1/4 à 1 comprimé, dosés à 1 cgr.), suivant l'âge.

3° 1 cgr. à 3 cgr., par jour, chez les enfants de 4 à 7 ans (soit 1 à 3 comprimés, dosés à 1 cgr.), suivant l'âge.

4° 2 1/2 cgr. à 15 cgr. au-dessus de cet âge (soit 1/2 à 3 comprimés, dosés à 5 cgr.).

Diminuer les doses de moitié si la médication doit être poursuivie plus d'une semaine sans interruption.

Prendre chaque comprimé (ou fragment de comprimé) dans une cuillerée à café, ou avec une gorgée d'eau alcaline (Eau de Vals, Eau de Vichy, ou, plus simplement, eau ordinaire additionnée d'une pincée de Bicarbonate de Soude).

Adoptés par le ministère de la Santé Publique.

Laboratoires du GAMBÉOL

J. Gautier, 藥, 毒, pharmacien de 1^{re} Classe.

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

Fournisseur des Ministères de la Santé Publique, de la Guerre.
de la Marine et des Colonies.

(Tél. : Défense 17-67.)

COMPRIMÉS PURGOS

Les **Comprimés Purgos**, aux sels concentrés de Vichy, de magnésie et de soude, ont été créés pour remplacer l'Eau Minérale de PURGOS dans tous les cas où il est difficile et même impossible de se la procurer, par exemple au cours d'un voyage, en excursions, et dans les pays lointains.

Composition. — Les **Comprimés Purgos**, dissous dans un peu d'eau minérale de Vichy, offrent toutes les qualités de l'eau minérale purgative et reproduisent exactement tous ses principes actifs.

Chaque comprimé représente en sels cristallisés :

Sulfate de soude	4 gr. 248
Sulfate de magnésie	0 gr. 747

Propriétés. — Les **Comprimés Purgos** ont une action toute particulière sur les voies digestives.

Indications. — Ils sont indiqués dans tous les cas d'atonie des voies digestives, dyspepsies, embarras gastriques, constipation chronique, maladies du foie, etc.

Dose purgative : 4 à 6 comprimés }
 Dose laxative : 2 à 3 comprimés } le matin à jeun.

En tubes de 24 comprimés : dans toutes Pharmacies.

Dépôt : **Laboratoire NOGUÈS**
 7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

COMPRIMÉS RECAL

Propriétés. — Reminéralisant. Recalcifiant.

Indications. — Décalcification, carie dentaire, lymphatisme, rachitisme, fatigue, surmenage, grossesse, allaitement, dépression nerveuse, convalescence, neurasthénie, prétuberculose, déminéralisation, consolidation des fractures, phosphaturie, scrofule, chlorose, anémie, diabète, tuberculose.

La boîte de 50 comprimés : 19 fr. 50.

COMPRIMÉS RECAL — PUBERTÉ

Formule F.

Ils ne s'adressent qu'aux fillettes ou jeunes filles de 9 à 18 ans (troubles de la croissance).

La boîte de 50 comprimés : 23 fr. 50.

COMPRIMÉS RECAL — PUBERTÉ

Formule M.

Ils ne s'adressent qu'aux garçons ou jeunes gens de 10 à 18 ans (troubles de la croissance).

La boîte de 50 comprimés : 22 fr. 50.

Les **Comprimés Recal — Puberté-Formule F** et les **Comprimés Recal — Puberté-Formule M** sont deux spécialités distinctes, qui constituent chacune un complexe endocrino-minéral à la fois reminéralisateur particulièrement puissant et médication *spécialement destinée à l'époque de la puberté*.

Composition :	Comprimés Recal.	Comprimés Recal, Puberté, formule F.	Comprimés Recal, Puberté, formule M.
Chlorure de magnésium sec	0 gr. 0023	0 gr. 0023	0 gr. 0023
Poudre de surrénale.		0 gr. 008	0 gr. 008
Poudre de thyroïde.		0 gr. 01	0 gr. 01
Fluorure de calcium	0 gr. 01	0 gr. 01	0 gr. 01
Poudre d'ovaire ...		0 gr. 025	
Orchitine			0 gr. 025
Hydrocarbonate de magnésie léger...	0 gr. 05	0 gr. 05	0 gr. 05
Diphosphate tricalcique.....	0 gr. 15	0 gr. 25	0 gr. 25
Carbonate de calcium	0 gr. 30	0 gr. 13	0 gr. 13
Arrow-root	0 gr. 155		

Laboratoires FLEURY, Arcachon Tél.: 124.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences

Docteur en Ph^{cie}, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents

Au sel Vichy-État.

Médication Alcaline pratique et économique.

Mode de présentation. — Les « Comprimés Vichy-État », présentés sous forme de pastilles effervescentes, permettent de préparer par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

Indications. — L'usage des « Comprimés Vichy-État » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

Posologie. — 3 à 4 Comprimés Vichy-État pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

Le flacon de 100 comprimés Vichy-État.

Prix en France : 6 fr. 40.

Georges PRUNIER et Cie

4, rue de la Coutellerie — PARIS — (Tél.: Arc : 00-35)
et Pharmacies.

CONES Solubles Antiseptiques RENDELL

Antiseptique extrêmement puissant sans aucune action caustique ou irritante.

Forme. — Les « cônes » sont des ovules de forme particulière facilitant leur utilisation et assurant leur conservation aseptique.

Composition. — Dichlorhydrate d'Iso-octyl-hydrocupréine ; Sulfate neutre de Quinine ; Sulfate d'Orthoxyquinoléine.

Indications. — Action spécifique sur les bactéries et les protozoaires des voies génitales féminines.

Prévention et traitement de toutes les infections d'ordre gynécologique.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Le cône introduit, avant le coucher, dans le vagin, doit y demeurer pendant toute la nuit.

Échantillon gratuit sur demande.

Prix : 25 francs la boîte de 12 cônes.

Dépôt général RENDELL

61, rue Damrémont — PARIS (XVIII°).
(Tél. : Montmartre 31-14.)

CONTINOL

Composition. — Association d'Ergot de Seigle, de Rhus aromatica et de Quinquina rouge.

Comprimés contenant 10 centigrammes d'extrait fluide d'Ergot, 10 cgr. d'extrait fluide de Rhus et 40 cgr. de poudre de quinquina rouge.

Propriétés. — Modificateur du système neuro-végétatif par l'Ergot et la Rhus. Tonique de l'état général par le Quinquina.

Indications. — Incontinence d'urine diurne ou nocturne.

Présentation. — Boîte contenant 45 comprimés, suffisante pour 1 mois de traitement.

Posologie. — Dose moyenne 2 à 4 comprimés par jour suivant l'âge.

Prix : 16 fr. 60.

Laboratoire **MASSON**

2, place de la Porte-des-Ternes — PARIS (XVII°).
(Tél. : Etoile 08-65.)

CONTRACIDE NORGAN

Constitution. — Mucilage finement divisé, en association avec une faible proportion de citrate de chaux.

Indications. — Tous les troubles de l'estomac provoqués par une acidité excessive de ses sécrétions ou de son contenu, depuis hyperchlorhydrie légère jusqu'aux ulcères constitués.

Mode d'action. — N'est pas un saturant chimique. Agit par fixation de l'acide, à la manière de la Mucine, mais d'une façon plus marquée.

Avantages. — Le Contracide retient l'acide fixé dans l'estomac et ne le restitue pas dans l'intestin. Il exerce ainsi un véritable drainage et l'acide peut être retrouvé dans les selles.

Par ses propriétés physiques, il réalise le meilleur pansement de la muqueuse.

Son action rapide contre l'élément douleur.

Emploi. — *Troubles légers* : 1/2 ou 1 cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.

Ulcères : 1/2 ou 1 cuillerée toutes les heures. Faire prendre le Contracide sec en conseillant de l'avaler à l'aide d'un peu de liquide.

Prix : 18 fr.

Laboratoires **NORGAN**.

P. ALEXANDRE, Pharmacien,
41, rue de Rome — PARIS (VIII°).

CONVALBAÏNE

Toni-cardiaque.

Composition. — Association de Convallamarine (glucoside du muguet) et d'Ouabaïne.

Comprimés contenant 1/2 cgr. de Convallamarine et 1 mgr. d'Ouabaïne.

Propriétés. — Toni-cardiaque. Stimule d'autant plus puissamment le tonus du myocarde que les actions, synergiques, de la Convallamarine et de l'Ouabaïne se renforcent.

Indications. — Toutes les déficiences du myocarde :

Grande asystolie, Insuffisance ventriculaire gauche, Petite insuffisance cardiaque, Insuffisance cardiaque des myocardites chroniques, Insuffisance ventriculaire droite, Myocardites des maladies infectieuses aiguës, Arythmie extra-systolique, Tachycardies.

Présentation. — Boîte contenant 36 comprimés, suffisante pour un mois de traitement.

Posologie. — Dose moyenne 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 21 fr. 50

Laboratoire PERRIER

12, rue Henner — PARIS (IX^e)

(Tél. Trinité 51-03)

COPHED

Siróp calmant non hypnotique.

Asepsie des bronches.

Traitement spécifique des Voies respiratoires.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 451-26.

Composition. — Association : Codéine, Ephédrine, Dionine, Belladone, Drosera, Sulfogaïacolate de Potassium.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Grippe, Laryngites, Pharyngites, Trachéite, Emphysème, Asthme, Coqueluche, Rhume des foins, Rhinites spasmodiques.

Posologie. — Le *Siróp Cophed* est d'un goût très agréable qui le fait accepter par les estomacs les plus délicats ; il peut être pris pur ou dans une infusion pectorale.

Les doses moyennes, sauf prescription spéciale du médecin traitant, sont les suivantes :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants (au-dessus de 6 ans) : 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

G. ROUSSEAU, pharmacien de 1^{re} classe.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

COPREX (Dragées de)

Laxatif très doux, garanti sans phénolphtaléine :

Son de grains d'orge, Sulfate de magnésie (à cette dose il agit en provoquant un léger flux de bile), Chlorure de magnésium (principe rééducatrice des eaux de Châtel-Guyon), Extrait spécial de Cascara. *Cholagogue prudent.*

Deux formes :

1° Coprex : dragées ordinaires : une ou deux dragées, 1/2 heure de préférence *avant* l'un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit.

2° Coprex : dragées demi-dose : (représentant la moitié des dragées ordinaires), particulièrement recommandé aux personnes âgées, délicates, aux enfants, convalescents, opérés, accouchées. Prendre une dragée *à la fois* ou deux si l'effet est insuffisant.

La boîte vente pour un traitement de cinq semaines.

Prix : 10 fr. 40.

Laboratoires du FEMINADÈNE
120, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

COQUELICÔNES

Suppositoires contre la toux

Extrait de coquelicot, eucalyptol ozonisé, droséra.

AVANTAGES. — Evitent fatigue de l'estomac et perte de l'appétit. Fluidifiants, antiputrides et antiseptiques, Exempts d'héroïne, de morphine, d'extrait thébaïque, de dionine, de bromoforme, ils ne provoquent pas de torpeur. Effet rapide, tolérance parfaite, aucune toxicité.

INDICATIONS. — La toux, quelle qu'en soit la cause, depuis le simple rhume ; maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires, toux émetisantes, toux nerveuses, *coqueluche*, toux chez les diabétiques, *sédatif par excellence de la toux des tuberculeux.*

Formes. — Trois formes : Coquelicônes pour adultes
Coquelicônes pour enfants, Coquelicônes pour bébés.

Posologie. — Coquelicônes pour adultes, pour enfants ou pour bébés : 1 à 4 par jour (l'absence de toxicité permettrait de doubler cette dose).

Prix : 17 fr. 25 la boîte de 12.

Pharmacie DUC
24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII°).
(Tél. : Etoile 11-96.)

COQUELUCHYL

Baume

Baume aux essences pénétrantes de Cyprès (action préventive et curative spécifique de la coqueluche), Serpolet, Eucalyptus, Méléaleuca, Pin et Camphre ; véritable bain balsamique, application pratique de la méthode de Milne.

Son véhicule gras spécial permet la pénétration par la peau qui absorbe par dialyse les principes antiseptiques, plus rapidement et plus sûrement que par la voie digestive, que l'on a souvent intérêt à ménager.

Indications. — Le Baume Coqueluchyl est indiqué dans le traitement de la coqueluche, des affections broncho-pulmonaires de l'enfant et de l'adulte, dans la prophylaxie et le traitement des maladies infectieuses et en particulier de la grippe.

Mode d'emploi. — A tous les âges, faire de larges applications sur le thorax matin et soir.

Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

Le tube : (35 gr.).

Inscrit au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1244-7.

Laboratoire R. et M. GUIGNARD

Docteurs en Pharmacie et en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS.

(Tél. : Central 01-35.)

COQUELUCHYL

GOUTTES

(Exclusivement végétal.)

Gouttes à base d'extraits végétaux, *Euphorbia helioscopia* (réveille-matin, antispasmodique non toxique dont l'action vis-à-vis du Bacille de Bordet et Gengou est véritablement spécifique), *Ephedra*, *Grindelia robusta*, *Drosera*, *Crataegus*, *Passiflore*, *Coquelicot*, *Serpolet*, *Saule blanc*.

Indications. — Le Coqueluchyl est employé contre la coqueluche, dont il arrête l'évolution et évite les complications, et dans tous les cas de toux opiniâtre.

Le Coqueluchyl, non toxique, non irritant pour les voies digestives, n'a pas de contre-indication et peut être prescrit aux nourrissons.

Forme. — Gouttes concentrées.

Mode d'emploi et doses. — Dose habituelle dans les vingt-quatre heures :

Jusqu'à un an : 4 fois X gouttes.

De 1 à 3 ans : 4 à 6 fois XV gouttes.

De 3 à 12 ans : 4 à 6 fois XXX gouttes.

Au-dessus 4 : à 6 fois XL gouttes.

A prendre dans un peu d'eau ordinaire ou sucrée, ou de tisane.

Le flacon (30 cc.)

Inscrit au Lab. Nat. de Contrôle des Médic. sous le n° 1244-7.

Laboratoire R. et M. GUIGNARD,

Drs en Phie et en Médecine, 38, r. du Louvre — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 01-35.)

CORAMINE

Diéthylamide de l'acide pyridine-b-carbonique.
CIBA

CARDIO-TONIQUE EUPNÉIQUE.

Tonique du cœur, stimulant de la respiration et de la circulation.

Préparation aqueuse, très fluide. S'injecte facilement, n'est pas douloureuse et se résorbe rapidement. Action prompte et énergique. Bien tolérée par la voie buccale, elle permet d'instituer une médication cardiotonique intercalaire entre les cures de digitale ou de strophantus. Aucune toxicité,

Possibilité de traitements très prolongés.

Indications. — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

Gouttes. — *Ampoules.*

Doses. — Voie buccale XX à G gouttes par 24 heures.
— parentérale 1 à 8 cc. —

Flacon (gouttes)

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 5.

— de 20 ampoules de 1 cc. 5.

— de 5 ampoules de 3 cc.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Bd de la Part-Dieu — LYON. (Tél.: Moncey 43-26.)

CORÉÏNE

Mucilage pur, sans adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal. Rien de commun avec les gommés.

La Coréïne est un mucilage pur, indigestible, indestructible.

Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

Formes. — Granulé, Paillettes, Semoule.

Doses :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix :	{	Granulé, 22 francs. Grand mod., 103 francs.	
		Paillettes, 20 francs.	— 93 francs.
		Semoule, 16 francs.	

La Coréïne est admise par l'Assistance publique et aux Assurances sociales.

Pour absorber la Coréïne.

Paillettes. — Le matin, mettre dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et verser dessus un peu de lait... ou de café au lait à raison de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.

Mélanger *vivement* et absorber *de suite* comme un potage.

A midi et le soir, mélanger la paillette avec quelques cuillerées de purée de légumes, de compote, de potage.

Granulé et Semoule. — Se prennent comme tous les granulés.

Pansements intestinaux Coréïnés.

3 à 4 cuillerées à soupe dans 1 litre d'eau bouillante en battant continuellement avec un agitateur en verre pendant quelques minutes. Laisser reposer 1/4 d'heure. Ajouter eau bouillie chaude pour obtenir émulsion semi-liquide. Introduire dans l'intestin avec tube d'écoulement *large*. Régler le débit avec une *pince* au lieu de robinet.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

COROSÉDINE

Médication de la douleur cardiaque.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition :

Aminophylline (Vaso-dilatateur des artères du cœur et des reins).

Chlorhydrate de papavérine (Antispasmodique).

Phényléthylmalonylurée (Sédatif du système nerveux).

Aminopyrine (Analgésique).

Propriétés thérapeutiques :

Calme les douleurs cardiaques : en empêchant l'ischémie du myocarde, par vaso-dilatation des coronaires.

Tonifie le muscle cardiaque par une meilleure irrigation.

Augmente la diurèse par vaso-dilatation des vaisseaux, du rein.

Calme la dyspnée, par action sur le centre respiratoire et par action toni-cardiaque.

Indications :

Les coronarites.

Les cœurs douloureux : Angine de poitrine. Infarctus.

Palpitations. Algies cardio-thoraciques.

Les douleurs aortiques.

Les cœurs défaillants : Insuffisance ventriculaire gauche — Distension cardiaque des hypertendus — Cœur sénile.

L'insuffisance cardio-rénale et réno-cardiaque.

La dyspnée cardio-rénale : D. d'effort, D. paroxysmique et asthme cardiaque, D. périodique et Scheyne-Stokes.

Posologie :

Deux comprimés 2 ou 3 fois par jour, au début des repas.

Les cures prolongées constituent le meilleur traitement préventif des crises douloureuses.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

CORTIODE

Régulateur des fonctions cardio-vasculaires.

Composition. — Association d'iodaseptine (42 p. 100 d'iode) et d'iodure de sodium (84,6 p. 100 d'iode) réalisant une dose d'iode élevée, sans risques d'intolérance.

Propriétés thérapeutiques. — Fait baisser la tension artérielle, tonifie le cœur, dont il régularise et intensifie les contractions. Modifie rapidement le pouls bref et tardif.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension, Cardiopathies rhumatismales, Cardiosclérose, Ozène, Emphysème, Mycoses. Toutes les indications de la thérapeutique iodée intensive.

Présentation. — **Posologie :**

Ampoules de 5 cc. (0 gr. 250 d'Iodaseptine, 0 gr. 221 d'Iodure de sodium). 1 à 2 ampoules par 24 heures, en injection intraveineuse ; exceptionnellement intramusculaire. Jamais d'intolérance.

Solution à ingérer. — XX gouttes = 0,050 d'Iodaseptine et 0,0443 d'Iodure de Sodium.

Dose. — XXX à L gouttes 2 fois par jour au début du repas. Séries de 12 jours par mois.

Prix : La boîte de 10 ampoules 5 cc., 30 francs.

Le flacon, 21 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS. (Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

CORYPHÉDRINE

Association d'acide acétylsalicylique (0 g. 50) et de Sanédrine (0 g. 015) pour un comprimé.

Indications. — Affections saisonnières des voies respiratoires supérieures.

Coryza aigu. Rhume des foins. Trachéo-bronchite grippale ou non. Névralgies post-opératoires.

Présentation. — Tubes de 20 comprimés.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 comprimés par jour par doses régulièrement espacées ; faire déliter les comprimés dans un demi-verre d'eau.

Prix de vente :

Le tube de 20 comprimés.... 7 fr. 30

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

CRATÆGOL

Composition et propriétés thérapeutiques. — Préparation qui, sous une forme essentiellement assimilable, représente le complexe chimique, intégral et définitif, des principes actifs de l'Aubépine (*Cratægus Oxyacantha*). C'est donc à elle seule que doivent recourir les praticiens désireux d'utiliser les propriétés tonocardiaques, hypotensives et antispasmodiques remarquables que de nombreux expérimentateurs (Jennings, Clément, Reilly, H. Huchard, H. Leclerc, L. Rénon) ont reconnues à ce médicament.

Indications et posologie. — Sa posologie est la suivante : comme **hypotenseur et cardiotonique**, XXX gouttes par jour, en trois fois, aussi longtemps que l'exigera l'état de la circulation : comme **équilibrant du système nerveux**, XX gouttes matin et soir : enfin une dose massive de XL à L gouttes au coucher permettra de bénéficier de ses vertus hypnotiques.

Prix : 14 francs.

Ne pas confondre avec la teinture d'aubépine.

Laboratoire G. BOULET

14, rue Eugène-Delacroix — PARIS (XVI^e).

CRATÆGUS GMET

Très agréable au goût.

Composition :

Extrait total sans alcool ni sucre du *Cratægus oxyacantha* correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés :

Régulateur du système neuro-végétatif hypotenseur-cardiotonique sédatif psychique. Plus actif que les préparations alcoolisées.

Indications :

Tachycardie, arythmies, éréthisme cardiaque, plexalgies, cardialgies, prurit, céphalées, vertiges. Tous les troubles neuro-psychiques consécutifs aux soucis, surmenage, déceptions, inquiétudes; névroses sexuelles. Puberté, menstruation, ménopause. Psychasténie, manie avec ou sans idées délirantes d'origine réflexe. Agitation post-opératoire. Phobies. Enfants instables, difficiles ou agités. Réaction sympathique des cures thermales, etc.

Posologie :

Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou de lait.

La dose peut être triplée et exceptionnellement quintuplée dans les grandes agitations (psychoses). Très efficace contre insomnie des angoissés. Aucune toxicité. Remplace avantageusement les barbituriques toujours dangereux. Utile pour les tuberculeux.

Le flacon de 135 cc.

Pour un traitement prolongé, conseiller : *Cratægus Gmet*, un « carton cure » (le contenu de 6 flacons pour le prix de 4).

Laboratoire GMET

(Dr. A. LOROT, Pharmacien)

27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

CRAYON THOMAS

Complexe antidouleur de forme pratique et ne tachant pas. Association de l'iode à tous les calmants.

Composition. — Iode, Soufre, Menthol, Essence de térébenthine, Salicylate de Méthyle.

Indications. — Douleurs articulaires aiguës et chroniques, Goutte, Lumbago, Névralgies, Sciatique, Entorses, Foulures, Courbatures, Torticolis, Contusions, Courbature grippale, Douleurs tabétiques, Réactions glandulaires, Adénopathies.

Mode d'emploi. — 3 à 5 applications par jour, précédées ou suivies de nombreuses compresses d'eau chaude et salée (une poignée de sel par litre) pour la formation de sels alcalins dont l'action est indiscutable. Faire des applications successives suivies de massages progressifs (éviter les muqueuses et les plaies).

Prix : 14 francs.

Laboratoires du DONAGOL
PÉRONNE (Somme) — Tél. 32.

CRÉAGÉNOL

Médication reconstituante et tonique.

Composition. — Inositophosphate de chaux et de magnésie. Acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux et hypophosphite de manganèse. Gluconate de chaux, en granulé sucré.

Indications. — Convalescences et états anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme, Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

Mode d'emploi :

Adultes : une à deux cuillerées à café, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

Enfants : une cuillerée à café, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût agréable.

Prix : 17 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Carnot 78-11.)

CRÉDONE DEHAUSSY

Méthyl-acétyl-phényl-diméthyl-oxamyl-hydrazide.

Communication à l'Acad. des Sciences du 12 nov. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 23 déc. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 6 janv. 1930.

Communication à la Soc. chimique de France
du 24 janvier 1930.

Indications :

Algies : Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Algies cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.

Etats infectieux : Grippe, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

Nervosisme : Insomnie, Agitation, Anxiété.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1 à 2 cachets par jour.

De préférence avec une infusion ou un verre d'eau

Boîte, 12 cachets : Prix : 9 fr. 65

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CRÈME MEGÈVE

Crème *très hydratée* à base d'alcools cholestériniques (éléments inodores donnant à la Lanoline son pouvoir absorbant), stable, neutre, inoxydable.

Peut servir de crème de ville, aussi bien que de crème de sports (montagne, mer).

Traitement ou prévention des coups de soleil, brûlures au 1^{er} degré, zona, érythème, dermites professionnelles ou médicamenteuses.

Principales présentations :

Petite boîte contenant	30 gr.
Grande boîte contenant	100 —
Tube	60 —
Tube.....	30 —

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie,

Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET
(Tél. : Pereire 57-41.)

CRÈME RÉSOLUTIVE

 du Dr RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à actions fortement vasoconstrictive et analgésique :

(Hamamelis, Noix vomique, Arnica, etc.)

Propriétés. — Calme la Phlébaldgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique, entorses, fractures.

Mode d'emploi. — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en vaporisation.

Prix : 12 fr. 80 et 17 fr. 60.

Laboratoires du Dr R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 65-97.)

CRÉOFORMINE

Spécifique de la toux et de l'expectoration.

Composition. — Tannocréosoforme, 0,20. Phosphate de gaïacol, 0,05. Bromoforme, III gouttes. Codéine, 0,01.

Forme. — Comprimés glutinisés, digérés seulement dans l'intestin.

Indications. — Grippe, Toux catarrhales, nerveuses et spasmodiques, Coqueluche, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Éctasie bronchique, Entérite tuberculeuse.

Mode d'emploi. — De 4 à 8 comprimés par jour. *Enfants* : 1/2 doses.

Avaler sans croquer.

Le traitement le plus actif et le plus économique (30 comprimés par boîte).

Prix : 15 francs.

Laboratoire de la CRÉOFORMINE

18, rue de Jouvence — DIJON (Côte-d'Or).

CRÉOFRUITS

Composition. — Créosote associée au Thio-col et au chlorure de Calcium, dissous dans des jus de fruits naturels.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les propriétés de la Créosote, désinfecte l'arbre pulmonaire, stimule l'état général, désinfecte le sang et est indiqué dans toutes les tuberculoses.

Indications. — Réalise l'imprégnation calcichlorocréosotée, préopératoire ou prévient l'infection pulmonaire dans les meilleures conditions de goût et de digestibilité. Adénopathie trachéobronchique.

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 15 fr. 55, flacon 210 cc.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

CRÉOSITOIRES

Méthode d'imprégnation créosotée par voie rectale à base de **Créosote de hêtre pure et éteinte**.

Suppositoires actifs et non caustiques.

Composition :

	Adultes.	Infantiles.
Créosote pure éteinte.	0 gr. 50 (XX g ^{tes})	0 gr. 125 (V g ^{tes})
Extrait thébaïque	0 gr. 015	Néant.
	P. 1 suppositoire adulte.	P. 1 supposit. enfant.

Indications. — Toutes les affections pulmonaires aiguës ou chroniques de l'adulte et de l'enfant, Bronchites, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Absès du poumon. Prophylaxie des complications pulmonaires grippales, rubéoliques et des accidents anesthésiques. Destruction des oxyures.

Prix : Adultes : 15 fr. 90. Infantiles : 12 fr. 70.

Posologie. — 1 à 3 par jour suivant avis médical.

Laboratoires MARGEX

Docteur P. LAURENT, Pharmacien,

13, rue Mélingue — PARIS (XIX^e).

(Tél. Botz. 56-44.)

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène-Créosote. Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (95 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieure à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous quatre formes :

- 1° *Créosoforme-Poudre*, pour saupoudrage des plaies.
- 2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
- 4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Prix : 1° 18 fr. 15 ; 2° 18 fr. 15 ; 3° 18 fr. 15 ; 4° 18 fr. 15.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

CRÉO-SUPPO-CAMPBRE

Traitement des affections bronchiques.

Imprégnation créosotée par voie rectale.

Formule :

<i>Adultes :</i>	Créosote pure. XV gouttes	0 gr. 40
	Camphre	0 gr. 05
	Véhicule spécial	Q. S. pour 1 suppositoire.
<i>Enfants :</i>	Créosote pure. VIII gouttes	0 gr. 20
	Camphre	0 gr. 03
	Véhicule spécial	Q. S.
<i>Nourrissons :</i>	Créosote pure III gouttes	0 gr. 075
	Camphre	0 gr. 015
	Véhicule spécial	Q. S.

Indications. — Dans les affections respiratoires, toutes les Hyper-sécrétions bronchiques, et toutes les fois qu'il s'agira de tarir un élément catarrhal en soutenant le cœur trop souvent fatigué par une toux incessante.

Préventif des complications pulmonaires, anté et post-opératoires.

Bronchites aiguës en fin d'évolution, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysème pulmonaire.

Antisepsie respiratoire, si utile après toute infection, Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Rougeole.

Dans la pré-tuberculose et la tuberculose non évolutive.

Laboratoires REBOUL

E. MAZARS, Pharmacien 62, av. de Paris — VILLEJUIF (Seine).

CRÉSENTYL

Le CRÉSENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr. Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminthique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité.*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRÉSENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (*Lambli*a, *Balan*tidium, etc.). Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRÉSENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin.

MODE D'EMPLOI. — Désinfection intestinale :
4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas, pendant 10 jours.

Vermifuge : *Adultes*, 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Enfants, 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2-3 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours.

Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 13 francs.

Laboratoires des ANTIGÉNINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr
PARIS (V^e).

(Anciennement, 43, rue Tournefort.)

(Tél. : Gobelins 26-21.)

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI^e).

CRÉSOLARGOL

Suppositoires.

Médication créosotée par voie rectale.

	Adultes.	Enfants.
Créosote de Hêtre {		
purifiée..... {	0,50	0,25
Argent colloïdal..... {	0,02	0,01

par suppositoire.

Indications. — Traitement et protection des Voies respiratoires : grippe, bronchite, états fébriles, toutes affections pulmonaires. Sans intolérance et sans contre-indication ni causticité.

Présentation :

En boîtes de 8 suppositoires : 17 francs.

Doses :

1 à 2 suppositoires par jour.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403.

Laboratoire HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 04-71).

CRÉSOPHANYL

du Professeur Carrière

Ester des acides crésotique et phénylcinchoninique.

Indications : Goutte, Rhumatisme goutteux, Rhumatisme aigu, Rhumatisme chronique, Sciatique, Lumbago, Analgésique.

Associe en un seul composé chimique défini les effets particulièrement appréciés de l'acide phénylcinchoninique et la médication homosalicylique.

Posologie : Dose moyenne : 0 gr. 50 à 1 gr. 50 par jour, 2 à 6 cachets.

PRODUITS STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRÉSOPIRINE

des Professeurs G. CARRIÈRE et E. GÉRARD

Acide Acétyl-Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

Indications. — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

Posologie. — *Douleurs rhumatismales, névralgies* : Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets d'un gramme dans la journée.

Insomnie : Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets d'un gramme dans une tasse d'infusion de tilleul.

Rhumatisme articulaire aigu, fébrile : Se conformer à l'avis du médecin qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 8 gr. par jour.

Grippe : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

Produits « STÉNÉ »

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRÉSOTANOL

Traitement externe de la douleur.

Composition. — Crésotinate de Butyle et Crésotinate de Propyle à parties égales.

Indications. — Toutes les formes de rhumatisme aigu et chronique, sciatique, zona, névralgies de toutes sortes, douleurs musculaires, lumbago, torticollis.

Présentation. — Le CRÉSOTANOL est présenté sous forme de gouttes pour usage externe.

Mode d'emploi. — Employer exclusivement à l'extérieur. On verse X à XX gouttes de CRÉSOTANOL pour une surface de la grandeur de la paume de la main, on étale avec le doigt, on recouvre de suite avec un imperméable, soit taffetas gommé ou une feuille de gutta-percha et on recouvre d'une couche de ouate qu'on fixe avec une bande. Renouveler le traitement 2 ou 3 fois par jour.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRINEX

Gouttes - Dragées - Ampoules.

Composition. — Extrait ovarien total standardisé.
Contient toutes les hormones ovariennes.

Gouttes : Solution hydro-alcoolique. 1 cc. (VL gouttes) correspond à 0 gr. 30 de glande fraîche.

Dragées à croquer : 1 dragée = V gouttes.

Ampoules injectables : Solution aqueuse isotonique, indolore, 10 unités Doisy-Curtis par cc.

Indications. — Insuffisances ovariennes, Troubles menstruels, Dysménorrhées, Oligoménorrhées, certaines Aménorrhées, Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale, Affections générales par insuffisance ovarienne, Obésité, Eczémas, Prurits, etc., certaines Stérilités.

Avantages. — Actif par voie buccale à faibles doses. Contient toutes les hormones de l'ovaire : hormones métaboliques (Anselmino et Hoffmann), hormone de stimulation hypophysaire (Marlow). Provient exclusivement d'ovaires frais d'animaux jeunes.

Contrairement aux folliculines, *Crinex* agit en stimulant l'ovaire ou en remplaçant *intégralement* sa sécrétion (castration).

Posologie. — Pendant les 20 jours qui suivent les règles ou leur époque présumée, ou pendant les 10 jours qui les précèdent (dans certaines oligoménorrhées, dysménorrhées), prescrire :

Gouttes : dose moyenne optimum : XV à XXX gouttes par jour, en 2 ou 3 prises, 1/2 heure avant les repas, dans un demi-verre d'eau ou sur un morceau de sucre que la malade laissera fondre lentement dans la bouche (absorption *per linguam*).

Suivant le résultat :

Maintenir la dose initiale,

L'augmenter progressivement, jusqu'à XLV, L ou LXX gouttes,

Ou, au contraire, la ramener à V ou X gouttes.

Croquer soigneusement les dragées.

Ampoules injectables : Tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours, suivant les cas, injecter par voie sous-cutanée, 1 ampoule seule ou en autohémocrinothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Prix :

Le flacon (12 à 25 jours).....	20 fr. 80
Le double flacon.....	37 fr. 50
40 dragées.....	10 fr. 60
80 dragées.....	20 fr. 80
La boîte de 6 ampoules.....	22 fr. 90

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV^e).
(Tél. Alésia 28-51.)

CRINEX-OREX (AMBO)

Médication ambohormonale

basée sur l'ambocrinie physiologique des gonades.

Composition. — *Crinex*, extrait ovarien total standardisé, et *Orex*, extrait orchitique total standardisé : deux flacons distincts dans un seul étui.

Mode d'action. — L'ambocrinie des gonades (sécrétion physiologique mâle et femelle des glandes génitales) explique pourquoi nombre de dysfonctionnements ovariens relèvent d'une insuffisance double. Ces dysovaries qui sont peu influencées ou parfois même aggravées par une opothérapie sexuelle monohormonale (ovarienne ou orchitique) cèdent, au contraire, rapidement au traitement ambohormonal.

Indications :

- 1° *Insuffisance totale de l'ovaire* (ménopause, castration).
- 2° *Retards de puberté* : Aménorrhées primitives et les troubles concomitants.
- 3° *Troubles génitaux, psychiques ou généraux, d'origine ovarienne*, rebelles à l'opothérapie monoglandulaire (ovarienne ou orchitique).
- 4° Tous les cas où l'origine homologue ou hétérologue de l'insuffisance ovarienne n'est pas déterminée et qui exigent un *traitement rapidement actif*.

Posologie. — *Orex* { X à XV gouttes de chaque
 Crinex { produit 1/2 heure avant les
 repas, dans 1/2 verre d'eau ou sur un morceau de
 sucre que la malade laissera fondre lentement dans
 la bouche (absorption per linguam).

Traitement de 20 jours par mois, dans l'intervalle des règles ou de leur époque présumée. Suivant les résultats, augmenter ou diminuer simultanément ou séparément les doses des deux produits.

Prix. — L'étui *Crinex-Orex (Ambo)* (13 à 20 jours) :
 20 fr. 80

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV^e).
 (Tél. Alésia 28-51.)

CRINHÉMOL

Composition. — Association endocrino-médicamenteuse. Extraits hépatique, orchitique, splénique. Fer. Arsenic. Acide phosphorique. Manganèse. Magnésium.

Indications. — Tonique général et nerveux. Hématopoiétique. Anémies de toute nature (médication pathogénique n'excluant pas les indications étiologiques). Asthénies. Convalescences. Anorexies. Déficiences fonctionnelles. Etats alcalésiques.

Forme. — Ampoules buvables.

Posologie. — Deux ampoules par jour. Doses spéciales pour enfants et adultes. Préparation spéciale pour les tuberculeux (*Crinhémol T* sans fer ni arsenic). Prise quotidienne pendant 8 à 10 jours. Intervalles de même durée entre chaque cure.

Prix : 19 fr. 20 et 32 francs pour adultes (10 à 15 jours de traitement) ; 14 fr. 95 et 27 fr. 75 pour enfants (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

CRINOCARDINE LALEUF

Composition. — Crinocardine simple :

Extraits concentrés spéciaux de :

Myocarde, Pancréas, Foie, Rein, Muscle strié.

Associations diverses :

Crinocardine Digitalique.

— Strophantique.

— Digitalo-Strophantique.

— Scillitique.

— Apocynique.

— Spartéinée.

Propriétés et indications.

Troubles cardio-vasculaires de toute origine, Insuffisances cardiaques, Oppressions, Œdèmes, Spasmes, Angines de poitrine, etc.

Tous états de déficience organique complexe : Anémies, Surmenage, Convalescences, Dépressions physiques et nerveuses, etc. Insuffisances hépatiques.

Formes.

Ampoules buvables et comprimés dragéifiés

Posologie et mode d'emploi.

1 ampoule (ou 5 comprimés) le matin, à jeun, dans un peu d'eau, pendant 10 jours consécutifs. Si nécessaire une seconde ampoule (ou 5 comprimés) au cours de la journée.

Durée moyenne des unités de vente.

10 jours.

Prix de vente au public :

Boîte de 10 ampoules de 12 cc. (simple ou composée) :
34 francs.

Étui de 50 comprimés (simple ou composée) :
22 fr. 50.

Laboratoires LALEUF

Georges DUQUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

CRINOFLUX

Gouttes

Complexe ovaro-végétal Byla-Dausse stabilisé.

Composition. — Suc d'ovaires frais **Byla**, Intrait de Marron d'Inde **Dausse** à 20 p. 100, Alcoolatures Anémone, Arnica, Noix vomique, Extraits Américains Cupressus, Viburnum à 10 p. 100.

Indications. — Traitement sûr et efficace de toutes les déficiences de l'appareil circulatoire. Très puissant régulateur du débit veineux, Anti-hémorroïdal remarquable, Sédatif utérin, Traitement des maladies de l'utérus et de ses annexes.

Posologie. — XX gouttes, 2 fois par jour, avant les repas. Dose pouvant être triplée sans inconvénients, dans certains cas aigus.

Prix : 18 fr. 50 le flacon pour 25 jours de traitement. Enregistré au laborat. de Contrôle n° 1364-6.

Laboratoires du CRINOFLUX

41, rue Germain — LYON.

CRINO-MENSTRYL

Régulateur des fonctions ovariennes.

Forme. — *Comprimés* (Ovaire, Folliculine, Lobe antérieur d'hypophyse).

Étui de 40 comprimés : 22 fr. 90.

(4 à 6 comprimés par jour du 7^e au 22^e jour du cycle menstruel.)

Ampoules : 2 ampoules de lobe antérieur d'hypophyse 0 gr. 25, soit en hormones gonadotropes environ 25 U. Zondeck et Asheim.

2 ampoules de benzoate de dihydro de folliculine à 5 000 U. I. : 29 fr. 10.

Le lobe antérieur d'hypophyse s'injecte généralement du 3^e au 8^e jour après la fin des règles.

La folliculine, du 10^e au 18^e jour après la fin des règles.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes, Aménorrhées, Oligoménorrhées, Dysménorrhées, Puberté, Ménopause, Migraines, Obésité, Stérilité, Leucorrhée.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

CRINOPANCRINE

Synergie endocrino-végétale, hypotensive et antispasmodique.

Forme. — Dragées.

Action. — Traitement de l'hypertension artérielle et de ses conséquences. Médication d'action constante et sûre favorisant l'équilibre du système vago-sympathique.

Composants. — Extrait de Pancréas désinsuliné (correspondant à 125 de son poids de substance fraîche), Chlorophylle, Nitrite de Sodium, Extrait sec de Scille (abaissement progressif du taux de l'Urée), Extrait sec d'Aubépine, Extrait mou de Belladone (0 gr. 0013 par dragée) (aucune adjonction de barbiturique).

Indications. — Hypertension artérielle, Angine de Poitrine, Spasmes vasculaires, Troubles visuels, Vertiges, Excitabilité, Angoisse, Emotivité, Insomnie nerveuse.

Posologie. — 3 à 6 dragées par jour avant les repas. — Traitement d'attaque : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des grandes hypertensions : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des hypertensions moyennes : 3 dragées par jour. Troubles névro-pathiques : 3 à 6 dragées par jour. — D'une innocuité absolue, les cures de CRINOPANCRINE peuvent être prolongées sans inconvénient.

Inscrit au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 586-16. Admis aux Assurances sociales.

Prix : 17 fr. 50 (tube de 60 dragées).

(Littérature et échantillons.)

Laboratoires DORANTOWICZ

17, bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e). — (Tél. : Roquette 14-12.)

CRINO-SÉRUM

dénommé { **CRINO-ENFANT**
de 0 à 10 ans
CRINO-ADULTE
à partir de 10 ans.

Le **CRINO-ENFANT** réalise l'opothérapie infantile pluri-glandulaire de la première enfance. Il est le régulateur par excellence du développement physique et mental des nouveau-nés et des enfants.

Les principaux éléments actifs qui le composent sont des extraits de thyroïde para thyroïde, thymus, hypophyse, surrénale, médullaire, hépatique auxquels est adjoint du glycéro-phosphate de magnésie.

Mode d'emploi :

De 0 à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 3 à 6 ans : 3 cuillerées à café par jour.

De 6 à 10 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 17 fr. 50.

Le **CRINO-ADULTE** s'emploie à partir de 10 ans. C'est un tonique de conception nouvelle équilibrant nerveux et circulatoire de deux sexes. Excellent tonique cérébral en raison des extraits de cerveau et de moëlle contenus dans sa formule.

Doses. — 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 21 fr. 30.

Laboratoire MOURÉ (P. COTARD, Pharmacien).

5 bis, bd des Italiens, passage des Princes — PARIS (II^e).

CRINO-STHÉNYL

Complexe endocrinien des « glandes de l'énergie ».

Surrénale, Hypophyse, Glandes génitales, Foie, Parathyroïde, Thyroïde.

Formes :

Étui : 40 comprimés : 20 fr. 80.

(3 à 6 comp. par jour au milieu des repas.)

Sirop : flacon de 180 grammes : 20 fr. 80.

(1 cuillerée à dessert = 2 comprimés.)

Ampoules inj. 6 ampoules de 2 cc. : 20 fr. 80.

(1 ampoule par jour.)

Indications. — Asthénies, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences, Enfants instables, Inattention scolaire.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

CRINO-TENSYL

*Régulateur de la tension artérielle,
de la circulation et de la nutrition générale.*

Parenchyme rénal ..	0,15	Phényléthylmalony-	
Pancréas désinsuliné.	0,10	lurée	0,005
Glandes génitales	0,30	Papavérine	0,003
Iode organique.....	0,01	Aminophylline	0,02

Prix. — Le tube de comprimés : 20 fr.

Posologie. — *Cure normale* : 2 comprimés au début de chacun des 3 repas, pendant 3 semaines.

Cure d'entretien : 1 comprimé au début de chacun des 3 repas, 15 jours par mois.

Indications. — Hypertension artérielle. Artério-sclérose et Pré-sclérose. Troubles circulatoires et Spasmes vasculaires. Pléthorisme et Obésité. Troubles de la Ménopause et de la cinquantaine.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

CRISALBINE

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Teneur en or : 37 p. 100.

Indications :

Tuberculose pulmonaire.

Adénopathies tuberculeuses, Lupus, Arthrites infectieuses, Asthme.

Présentations. — Ampoules contenant 0 g. 02, 0 g. 05, 0 g. 10, 0 g. 15, 0 g. 20, 0 g. 25, 0 g. 35, 0 g. 50 de poudre cristalline ; une ampoule d'eau bidistillée est jointe à chaque dose.

Posologie et mode d'emploi. — Injections intraveineuses d'une solution à 5 p. 100 préparée extemporanément, en débutant par 0 g. 05 ou 0 g. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade. Asthme et arthrites 0 g. 02 à 0 g. 05. Prix de vente (suivant dosage et conditionnement).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

CRUXOL

Adjuvant complet de croissance des Enfants
Médication polyglandulaire et polyvitaminique
des Adultes et Personnes âgées.

Composition. — Hormone du lobe antérieur de l'Hypophyse agissant en corrélation avec les extraits endocriniens : Thymus, Thyroïde, Orchytique, Surrénal agissant à doses conjuguées.

Les 4 vitamines (unités actives).

Les sels minéraux de croissance.

L'extrait de Boldo (insuffisance hépatique).

Présentation :

Trois préparations suivant l'âge.

1° Cruxol Bébé :

En neige fondante pour les nourrissons, agissant en milieu neutre.

Préparation vitaminée avec sels minéraux lab ferment et papaine destinée aux nourrissons et jusqu'à 2 ans.

Prescrire. — Ne pas donner de jus de fruits acides. Mettre dans la bouche du bébé ou faire dissoudre dans quelques gouttes d'eau et donner au bébé avant chaque tétée ou biberon une dizaine de petits granulés neige fondante. Augmenter suivant le nombre de mois, la dose à utiliser dans les 24 heures allant de $\frac{1}{2}$ à 2 cuillerées à café.

La boîte : 22 fr. 50.

2° Cruxol granulé :

Pour les enfants de 2 ans à 7 ans, en tube métallique.

Prescrire. — Une cuillère à café de granulé à croquer avant chacun des 2 principaux repas.

Traitement à suivre pendant 20 jours de suite par mois, puis repos de 10 jours et reprendre le traitement (quelques mois).

La boîte : 24 fr. 50.

3° Cruxol (ampoules buvables), en boîte de 2 séries de 6 ampoules, à partir de 7 ans.

Prendre dans $\frac{1}{4}$ de verre d'eau sucrée le contenu d'une petite ampoule avant le repas de midi, et le contenu d'une grande ampoule avant le repas du soir.

Traitement à suivre pendant quelques mois : au début, trois semaines de suite sans interruption ; puis une semaine sur deux, sauf autres indications médicales.

La boîte : 27 fr. 50.

Laboratoire MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 37-45.)

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique, Analgésique.

Adoptée par les Ministères de la Guerre, de la Marine et par l'Assistance publique.

La **Cryogénine Lumière** représente le médicament antipyrétique-analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux de toute origine.

La **Grippe** ne résiste pas à l'administration, à doses suffisantes, de **Cryogénine Lumière**.

Elle permet d'éviter les bains froids dans la **Fièvre typhoïde**.

Contre le **symptôme douleur**, la **Cryogénine Lumière** exerce une action nette, rapide, durable.

Aucune accoutumance ni accumulation.

Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.

Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.

Il n'existe aucune contre-indication.

Son innocuité absolue en fait le médicament de choix chez les enfants.

Indications :

Fièvre, Grippe, Douleurs, Névralgies, Dysménorrhée.

Formuler :

Un tube de comprimés à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

Une boîte de cachets à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

Doses :

Adultes : 1 à 6 comprimés ou cachets à 0 gr. 50 par jour et davantage en cas de besoin.

Enfants (doses moyennes) :

De la naissance à 15 mois, 0 gr. 10.

De 15 mois à 3 ans, 0 gr. 15 à 0 gr. 25.

De 3 ans à 5 ans, 0 gr. 25 à 0 gr. 40.

De 5 ans à 15 ans, 0 gr. 40 à 0 gr. 75.

A partir de 15 ans, 0 gr. 75 à 2 gr.

Ces doses peuvent être dépassées.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

CRYOSAN

Composition. — Soufre combiné et dissimulé, térébenthine du pin purifiée, huile pyrogénée du *Juniperus oxycedrus*.

Propriétés. — Antiseptique, cytophyllactique, antiprurigineux désodorisant, cicatrisant.

Indications. — Eczéma sous toutes ses formes, psoriasis, lichens, mycoses diverses, herpès, urticaire et toutes dermatoses prurigineuses.

Présentation et prix. — 15 francs le flacon de 15 grammes.

Mode d'emploi. — Faire trois applications par jour à l'aide du pinceau joint au flacon.

**Les Laboratoires Lorrains
de Produits purs.**

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Antiseptique argentique, stable, atoxique.

Constitution. — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent, sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrisme. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

Indications. — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas.)

Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antiseptie générale.

DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNÉCOLOGIE, OPHTALMOLOGIE

Formuler : Usage interne : Etois de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Usage externe : Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

Gynécologie : Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Ophtalmologie : Ampoules collyre dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100 de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE : 45, rue Villon — LYON.

CRYPTHERMOL DEHAUSSY

Médication antisypilitique dissimulée.

Préparation à base de mercure permettant le traitement masqué ou ambulatoire de la syphilis et de l'hérédo-syphilis sans troubles gastro-intestinaux, même en cas d'intolérance hydrargyrique (Sirop et granulés de goût agréable, pilules glutinisées).

Dosage

Sirop : par cuillerée à soupe.

Iodure de potassium..... 1 gr.

Biiodure de mercure..... 0 gr. 01

Pilules : par pilule.

Iodure de potassium..... 0 gr. 20

Biiodure de mercure..... 0 gr. 002

Granulé fondant : par cuillerée à café.

Iodure de potassium..... 0 gr. 005

Biiodure de mercure..... 0 gr. 0005

Posologie :

Adultes : *Sirop* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour. — *Pilules* : 5 à 10 par jour.

Enfants : *Granulé* : 1 an : 1 ou 2 cuillerés à café par jour.

5 ans : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

10 ans : 5 à 10 cuillerées à café par jour.

Sirop. Prix : 19 fr. 15

Pilules. Prix : 16 fr. 05

Granulés. Prix : 16 fr. 05

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale. — LILLE

CRYPTHIOL

Composition. — Nouveau composé organique soufré, dérivé de la série aromatique, ni toxique, ni irritant.

Forme. — Capsulines glutinisées.

Action. — *a.* Par le pouvoir catalytique du soufre non oxydé, le CRYPTHIOL active la désintégration des albuminoïdes jusqu'à leur terme final : l'urée, et accélère l'oxydation des déchets nuisibles de l'organisme.

b. Par son action élective sur la cellule hépatique, le CRYPTHIOL constitue un puissant cholagogue et stimule les fonctions uropoïétique et glycémique du foie.

Indications. — Insuffisance hépatique, États congestifs du foie, Lithiases biliaire et rénale, Goutte, Obésité, Rhumatisme chronique, et en général toutes les affections provenant d'une carence soufrée de l'organisme ou d'un métabolisme défectueux.

Posologie. — 2 à 4 capsulines par jour, un peu avant les repas.

Prix : l'étui de 30 capsulines, 15 fr. 60.

Durée moyenne de l'étui : 10 jours.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

(Tél. : Pereire 14-08.)

CRYPTOSOTE NEDA

Composition :

Antiseptique pulmonaire.	{	Créosote	0,05
Sédatif de la toux.			
Modificateur des sécrétions bronchiques.	{	Eucalyptol	0,01
Hémostatique, cicatrisant..		Tannin	0,05
Balsamique.....		Benjoin	0,05
Enrobage. {	Insoluble dans l'estomac.		Par dragée.
	Soluble dans l'intestin.		

Propriétés. — Antiseptique et tonique des voies respiratoires.

Par son enrobage, la créosote n'irrite pas l'estomac.

Indications. — Bronchites, bronchites aiguës et chroniques, trachéites, congestions pulmonaires, asthme, tuberculose, catarrhes.

Présentation. — Boîte normale 60 dragées : 15 francs pour un traitement de 15 jours.

Boîte triple : 180 dragées : 30 francs.

Posologie. — 2 dragées au milieu de chacun des 2 repas.

Laboratoires DANEY

134, cours de Verdun — BORDEAUX (Gironde).
(Tél. : 27-10.)

CRYPTOTOXYL

du Docteur Louis Bignon, de Vichy.

Composition : Oléate, palmitate, ricinoléate de soude, bile.

Indications : Neutralisation des toxines microbiennes et de la morphine.

Mode d'emploi : Dose utile 4 pilules par jour.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRYSIODAL

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

Indications. — Pré-tuberculose et tuberculose.

Présentation. — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;

2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

Doses et mode d'emploi. — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

Prix { intraveineux, 31 fr. 20. la boîte de 6 amp.
 { intramusculaire, 26 fr. la boîte de 6 amp.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens.

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

CUPRANINE

(Au sulfate de cuivre chimiquement pur.)

Indications. — Toutes staphylococcies. Dermatologie, Gynécologie

Formes. — *Pommade faible* à 2 p. 1 000 (2 pour mille). Acné rosacée, impétigo, sycosis, eczéma, brûlures, escarres, ulcères non infectés, plaies chirurgicales, zona.

Pommade forte à 20 p. 1 000 (20 pour mille), Furoncles, Anthrax, Acné juvénile, Ecthyma ; eczéma séborrhéique, Papillomes, Favus, Trichophyties, Brûlures, plaies et ulcères infectés, Bubons, chancres mous.

Comprimés : effervescents, à 0,05. *En gynécologie* : Métrites, leucorrhée. Hygiène intime : 1 à 2 comp. pour 2 litres d'eau.

Ampoules ; pour injections intraveineuses : de 5 cc. à 0,005 par cc. Anthrax, Furonculose, Suppurations profondes, Lymphangites Streptococcie ; 1 à 2 ampoules, 1 à 2 fois par jour. *Enfants* : 1/2 ampoule par jour.

Pratiquer l'injection avec une aiguille fine, aspirer un peu de sang dans la seringue. *Ne pas s'arrêter au léger coagulum brun qui peut se produire*, et injecter lentement.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE VICHY

P. V. LÉGER — ST-POURCAIN (Allier).

CUPRASE

du Docteur GAUBE du GERS contre le cancer.

Cuivre colloïdal albumonique. Guérit souvent, arrête toujours l'évolution du cancer. Une forme : ampoule de 5 cc. pour injections sous-cutanées.

Action thérapeutique et Usages. — Préconisée pour la décancérisation dans toutes les formes.

La *Cuprase* possède de remarquables propriétés contre les néoplasies anciennes ou récentes, ulcérées, quel qu'en soit le siège.

Elle arrête le développement des tumeurs malignes ; elle est capable de supprimer avec le temps les tumeurs et les ulcères malins.

Posologie et Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, une ampoule de 5 cc. tous les 4 jours, d'abord, puis après la 4^e injection, une ampoule tous les 5, 6, ou 7 jours suivant tolérance.

Le *Cuprase* n'est point toxique.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré, Paris.

CUPRAZUROL

Composition. — Collyre à base de :

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 002
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.....	1 gr.
Stovaïne	0 gr. 05
Chlorhydrate d'Ethylhydrocupréine (optochin)	0 gr. 10
Eau distillée.....	10 gr.

Indications. — Conjonctivites granuleuses, Trachomes, Kératites granuleuses, Catarrhe printanier, Larmoiement.

Instillations indolores.

Disparition rapide de la douleur due aux granulations

Mode d'emploi. — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour. Dans les milieux contaminés continuer longtemps le traitement contre la conjonctivite ou la kératite granuleuses, si tenaces, et sujettes à rechutes.

Prix : 17 fr. 40, 1 flacon-ampoule compte-gouttes de 15 cc.

Laboratoires LAITER

P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie

52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS.

(Tél. : Flandre 00-55.)

CUPREMONE « F »

**Médication Hormonale (folliculine) associée
au complexe végétal CUPREMONE**

Composition. — Extraits Anémone, Cupressus, Cratœgus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sénéçon, Viburnum.

Folliculine purifiée rigoureusement titrée : 2.500 unités physiologiques par 100 cc. de préparation.

Deux gouttes de *Cuprémone F* correspondent à une unité physiologique de Folliculine.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de choix des désordres génitaux et des troubles de la circulation sanguine.

Activité par voie buccale.

Forme et mode d'emploi. — Prendre XL à LXXX gouttes par jour, au début des 2 repas, dans un peu d'eau sucrée, 20 jours par mois, en dehors des règles.

Durée de l'unité de vente : 1 semaine environ.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Danton 81-53.)

CUPREMONE SIMPLE

Composition. — Extraits fluides préparés dans le vide et d'action toujours égale et constante (Anémone, Cupressus, Cratœgus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sénéçon, Viburnum).

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des troubles de la circulation sanguine.

Indications. — Régulateur et stimulant circulatoire. Inflammations et dilatations veineuses : Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Ulcères variqueux. Dépresseur et sédatif vasculaire : disparition des réactions douloureuses dues aux phénomènes congestifs. Sédatif utérin.

Forme et mode d'emploi. — XX à XXX gouttes avant les deux principaux repas dans un peu d'eau sucrée. Hémorroïdes : L gouttes.

Durée : 2 semaines.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS (V°).

(Tél. : Danton 81-53.)

CUPRESSIODE FAVROT

Gouttes.

Spécifique des maladies de la cinquantaine chez l'homme.

Formule :

Iode assimilable.....	1 gr. 50
Ext. fl. Cupressus stabilisé...	5 gr.
— Marron d'inde stabilisé.	5 gr.
— Gui stabilisé.....	10 gr.
— Aubépine stabilisé.....	2 gr. 50
— Genêt stabilisé	2 gr. 50
Alcoolature d'anémone	2 gr. 50

Excipient : Q. S. pour 100 gr.

Prix : 13 fr. 50.

Indications. — Troubles fonctionnels cardio-vasculaires. — Hypertension. — Artério-sclérose. — Angine de poitrine. — Spasmes divers.

Posologie :

XX à XXX gouttes à la fin des 2 repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires Dr H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

CUPROBALT

Composition. — Association de Silicates de manganèse, fer, cuivre, nickel et cobalt.

Indications. — Diabète sous toutes ses formes. Toutes ses complications. Pas d'intolérance, ni d'incompatibilités.

Présentation. — Dragées.

Posologie. — Dose moyenne : 2 dragées avant chacun des 2 repas principaux. Dans les cas graves, cette dose peut être doublée.

Laboratoire GRYSA

C. LÉTANG, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Paris.

7, rue Saint-André — LE MANS.

CUPROFORMINE

Composition. — Sulfate de cuivre pur, Trioxyméthylène, Perborate de soude, Excipient effervescent.

Mode d'action. — Par sa haute teneur en cuivre associé au trioxyméthylène et au Perborate de soude, la *Cuproformine* est un antiseptique puissant dans toutes les affections à streptocoques, à staphylocoques, et autres germes pathogènes.

Indications et Mode d'emploi.

1° En *Gynécologie*, hygiène intime, prophylaxie et traitement des affections septiques des organes génitaux : en injections, 1 comprimé pour 2 lit. d'eau.

2° *Antiseptique général et Dermatologie*, Plaies de toute nature, Ulcérations, Panaris, Pyodermites, Eczémas, Furoncles, etc., en lavages, applications, compresses : 1 comprimé pour 1 ou 2 litres d'eau.

Présentation. — Comprimés très effervescents, d'odeur agréable, et ne tachant pas le linge.

Laboratoire YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS (V°).

CUPROSTÉNOL

« MÉTÈRE »

Indication :

Chimiothérapie active des néoplasies cellulaires. Tumeurs malignes de toute origine tissulaire. Leucémies myéloïdes ou lymphatiques. Maladie de Hodgkin. Septicémies à streptocoques.

Composition :

Cuivre et Magnésium en solution huileuse colloïdale contenant :

Cuivre.....	0,12 mgr.
Magnésium	0,03 mgr. par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intra-musculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. En même temps prendre 2 capsules par jour de Cuprosténol-capsules par la bouche.

Au bout de 5 semaines, arrêter le traitement quelques jours et refaire une nouvelle série s'il est nécessaire. Autres formes : Cuprosténol-pommade et Cuprosténol-cire pour les ulcérations cutanées.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

CUPROXIL

Désinfectant gynécologique et urinaire.

Composition. — 100 grammes contiennent :

Boro-Salicylate de soude.....	53,39
Sulfate de cuivre desséché.....	12,51
Chlorate de potassium.....	34,100

Propriétés. — Désinfectant gynécologique, Microbicide, Décongestionnant, Désodorisant.

Indications. — 1° Hygiène intime quotidienne.

2° Traitement des Leucorrhées en général, des Vaginites, Vulvites, Vulvo-Vaginites, Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, etc...

3° Blennorrhagie.

Avantages. — Antiseptique puissant, non caustique, ne tache pas le linge, d'odeur agréable (parfumé à l'eau de Cologne). Action décongestionnante et sédative. Sensation de bien-être.

Forme. — Poudre blanche, entièrement et rapidement soluble dans l'eau tiède, à laquelle elle communique une légère teinte vert clair.

Mode d'emploi. — Lavages, injections et irrigations tièdes (y compris la période des règles). Faire dissoudre le contenu d'une mesure dans 2 litres d'eau.

Emploi général. — Désinfectant général en lavages externes, notamment en gargarismes.

Flacon d'environ 50 doses.

Produits POLYPHARMA

Concess^r° L. BRUN, Ph^{en} — 92, rue Bobillot, — PARIS (XIII^e).

CURAMIDA CHAPELLIER

Composition. — Sirop de sucres frais de géraniums, Rudbeckias, Tropéolon M, fleurs de Marronniers d'Inde iodés, Phosphate monocalcique, Iodure de Calcium, Sirop Antiscorbutique et Chicorée Cposée.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour (3 ans, 5 ans, 10 ans).

Indications. — Puissant tonique déterminant la fonte des **grosses amygdales** et la disparition des **végétations adénoïdes** des enfants.

Cure complète: 2 flacons de 3 à 7 ans.

3 flacons au-dessus de 7 ans.

Prix du flacon 1/2 litre : 27 fr. 50.

Laboratoire A. CHAPELLIER
CHAMPAGNAC-LE-VIEUX (Haute-Loire).

CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

Composition. — Association rationnelle de :
Phénacétine, Théine, Analgésine bicarbonatée.

Indications. — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

Posologie. — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 1 fr. 20. — 6 cachets : 6 fr. 45.

Enregistrée au L. N. C. M. sous le N° 32-1.

Laboratoire

de la **CURATINE BRUNET**

23, rue des Ecouffles — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 35-17.)

CUROGÈNE

Élixir antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

Indications. — Sédation de la douleur : Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes. Sciatiques, Dysménorrhée, Douleurs post-partum, Grippe, etc.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
2 cuillerées à café ; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

Enfants au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 17 fr. 20.

Le flacon de poche : 6 francs.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD, O. * * *

145, rue Yves-le-Coz — VERSAILLES.

CUROZEMA

Médication opo-sérothérapique rationnelle des dermatoses chroniques et récidivantes et des états *arthritiques*.

Composition. — Sérums activés et organes frais de jeunes animaux.

Indications. — Eczéma et eczématides, Prurits localisés ou généralisés, Prurigo, Urticaires, Maladie de Quinck, Psoriasis, Impetigo, Acné, Certaines formes de Névrodermites et de Sclérodermites, Lichen.

Présentation. — Dragées en flacon de 90 (le grand flacon) ; de 40 (le flacon).

Mode d'emploi et doses :

Traitement d'attaque. — 9 dragées par jour prises par 3, à jeun, une heure avant les repas, pendant 10 jours.

Traitement d'entretien. — 4 dragées par jour, pendant 10 jours.

Prix : Le grand flacon : 30 fr. — le flacon : 18 fr.
Voir également " OPOSERO VALTRY "

Laboratoires VALTRY

J. MAHEU, pharmacien de 1^{re} classe,

Docteur en médecine, Docteur ès sciences,

Membre de la Société de Pharmacie.

122, Champs-Élysées — PARIS (Tél. : Élysées 28-12).

CUSCUTINE FOULON

Indications. — Laxatif doux, très actif. Stimule les sécrétions intestinales et décongestionne le foie.

La Cuscutine peut être prise pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes menstruelles, etc...

Composition. — La CUSCUTINE est composée d'extraits végétaux : Cuscute, Séné, Aloïne, etc.

Posologie. — Une à 2 pilules au repas du soir.

L'étui de 40 pilules : 6 fr. 25.

Echantillons gratuits.

Laboratoires FOULON

12, boulevard Saint-Martin — Paris (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

CUTIGÉNOL

Pommade cicatrisante.

Composition. — Vitamines, hormones, insuline.

Indications. — Plaies, Brûlures, Ulcérations et Engelures, Dermatoses chroniques et toutes les lésions atones ou torpides.

Mode d'emploi. — Appliquer à l'aide d'un pansement qu'on laissera au moins 24 heures. Le premier sera même laissé 48 ou 72 heures, selon la gravité du cas ou le degré d'infection.

Présentation. — Le tube : 18 fr. 70.

Laboratoires du CUTIGÉNOL

Echantillons : Laboratoires du Dr Debat, 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

CUTISANINE

Pour toutes irritations de la peau, crevasses, fissures, coups de soleil, plaies atones, eczémas, intertrigos, transpirations abondantes ou fétides, etc...

En poudre *la boîte.* 15 fr.

En pâte *le tube.* 9 fr. 50.

Laboratoire R. B. D.

Dr J. WILLOT, Pharmacien.

37, rue du Vieil-Abreuvoir — ROUBAIX
(Nord.)

CUTOBRONCHYL

Forme. — Pommade exempte de matières grasses en tube.

Mode d'action. — Absorption intégrale des substances médicamenteuses par la peau grâce à son Excipient à base d'Extraits opothérapiques de peau animale, renfermant :

- a. Du Cholestérol, favorisant l'absorption des médicaments à travers les couches grasses de la peau.
- b. Des Diastases et des Hormones actives de la peau.
- c. Un composé de Magnésie, catalyseur animal.

Substances médicamenteuses actives. — Camphre, Gaïacol, Acide Cinnamique et Salicylique, Essences stabilisées.

Indications. — Traitement des maladies des voies respiratoires et circulatoires, par médication cutanée au moyen d'extraits opothérapiques et catalysants de la peau.

Mode d'emploi. — Enduire deux à trois fois par jour, alternativement, la poitrine, le dos ou une autre partie du corps. Effectuer une bonne friction, afin d'obtenir une absorption complète et rapide.

Prix : 10 francs. Durée moyenne de traitement, d'un tube : 8 jours.

Laboratoires G.-R. STROHL

G. HORNUS, Pharmacien

2, rue Sédillot — STRASBOURG (Bas-Rhin).

(Tél. : 43-64.)

CUZINARGOL

Seule solution stable d'argent, de cuivre et de zinc permettant une destruction spécifique complète de toute la flore microbienne urinaire. Gonocoques (argent), Staphylocoques et Streptocoques (cuivre et zinc).

Traitement des blennoragies aiguës et surtout chroniques et des métrites.

Quatre formes :

- 1° *Ampoules* de 10 cc. pour injections uréthrales. Blennoragies récentes.
- 2° *Solution*, 1 cuillère à soupe pour 2 litres d'eau. Blennoragies après 48 heures. Métrites.
- 3° *Pommade* non grasse en tube canulé. Blennoragies chroniques.
- 4° *Ovules*. Métrites.

La boîte de 6 ampoules	25 fr.
Le flacon de solution	20 —
Le tube de pommade	15 —
La boîte de 6 ovules	18 —

Laboratoire COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-01.)

CYANHERMINE

pour traitements antisyphilitiques
à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur)	0 gr. 01 cgr.
Sérum isotonique	2 cc.

Propriétés :

La Cyanhermine, étant une solution à 1/200 en sérum isotonique, réalise le maximum de tolérance.

Mode d'emploi :

Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 12 francs.

Laboratoire National de Contrôle n° 339-5.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).
(Tél. : Suffren 12-63.)

CYCLITON « ROCHE »

Analeptique central et stimulant de la circulation sanguine.

Composition. — Diéthyl-amide de l'acide 3,5 diméthylisoxazol-4-carbonique.

Propriétés. — Action analogue à celle du camphre, bien qu'étant d'une constitution tout à fait différente.

Indications. — Insuffisances circulatoires, Affections aiguës de l'appareil respiratoire, Intoxications par les narcotiques, Collapsus, etc.

Posologie et modes d'emploi. — 1 à 2 ampoules de 2 cc. et plus toutes les 2 heures par voie sous-cutanée, intramusculaire ou endoveineuse, XX à XL gouttes (1 à 2 cc.) par voie buccale ou 2 à 5 comprimés.

Présentation. — Le Cycliton « Roche » est présenté sous trois formes :
Ampoules de 2 cc. dosées à 25 p. 100. — Solution dosée à 25 p. 100. —
Comprimés dosés à 0 gr. 10.

Ampoules (boîte de 6) ; comprimés (flacon de 20) ; solution (flacon 15 cc.).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N°s 504-86 (ampoules), 504-87 (solution), 504-88 (comprimés).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Arch. 91-10.)

CYNABILINE

Médication végétale et opothérapique associées destinée au traitement des déficiences entéro-hépatiques.

Composition. — Principes actifs de l'artichaut frais (plante fraîche stabilisée), du Kinkéliba, du Romarin et du Boldo. — Extrait désalbuminé et délipoidé de foie frais. — Extrait de bile. — Citrate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Stimule la cellule hépatique, la sécrétion et l'excrétion biliaire, supplée par ses extraits d'organe aux déficiences momentanées. — Régularise la fonction hépatique par l'artichaut. — Analgésique et tonique par le Kinkéliba et le Romarin. — Décongestif vésiculaire par le citrate de soude.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire. — Ictères. — Lithiases. — Hépatisme tropical. — Constipation. — Intoxications. — Hépatites. — Hépatomégalie. — Cirrhoses diverses. — Hypotonies entériques. — Prurits. — Asthénies.

Présentation. — Liquide sirupeux aromatique de saveur agréable.
Le flacon : 20 fr. 30.

Posologie. — Une à cinq cuillerées à café par 24 heures dans un peu d'eau ou de vin avant les repas.

Laboratoire de PHARMACOLOGIE APPLIQUÉE
rue Frédéric-Chevillon — ALLAUCH (B.-du-Rh.).

CYNARA (Artichaut)

Edgard-Rosa.

En 1927, les Laboratoires Rosa introduisaient dans la thérapeutique courante les premiers produits *per os*, à base d'un extrait de **Cynara** frais (Artichaut):

Chophytol-Rosa (dragées et gouttes).

Cynurol-Rosa (dragées).

En 1933, **G. Edgar-Rosa** isolait à l'état cristallisé le principe actif du **Cynara** frais que les Laboratoires Rosa ont spécialisé sous le nom de :

Chophytol-Rosa cristallisé injectable.

De nombreux travaux et Communications scientifiques ont consacré la valeur thérapeutique de ces produits.

Voir donc, à leur rubrique, ces trois spécialités qui constituent la gamme complète des applications du **Cynara** frais en thérapeutique hépatique et rénale.

Laboratoires ROSA

“ La Feuille fraîche d'Artichaut en thérapeutique ”

11, rue Roger-Bacon
PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 09-63.)

CYNÉFLUINE

du Docteur Moity.

Granulé soluble à base d'extrait d'artichaut.
Drainage biliaire idéal, Cholagogue, Cholérétique, Spécifique hépato-biliaire rationnel, Tonique du foie.
Anti-anaphylactique.

Formule :

Peptone de viande 2 ; Peptone d'œuf 2 ; Peptone de poisson 2 ; Peptone de fibrine 2 ; Hyposulfite de soude 2,50 ; Extrait total d'artichauts 5 ; Sulfate de magnésie 25 ; Sucre glace Q. S. p. 100.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café de granulé le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède ; se coucher ensuite dix minutes sur le côté droit.

Dans les eczémas, migraines, névralgies, urticaires, prendre en plus une cuillerée à café vingt minutes avant les repas.

Prix : 16 fr. 50. Boîtes de 125 grammes.

Peuvent être prescrits aux Assurés sociaux.

Laboratoire du D^r J.-O. MOITY

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie,
ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE

CYNUROL-ROSA (DRAGÉES)

Antiurique, antiseptique et diurétique.

Spécifique des diathèses précipitantes et des infections des appareils hépato-biliaire et urinaire et des troubles humoraux complémentaires.

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — *Extrait de feuilles fraîches d'artichaut (Cynara).*
Uva-Ursi, Urotropine et Salicylate double de Phényle-Pipérazine.

Indications. — a. *Maladies diathésiques* : Rhumatisme, Arthritisme, Urémie, Uricémie et Goutte, Polysclérose, Lithiase biliaire et urinaire, etc.

b. *Affections vésico-rénales* : Cystite, Urétrite, Pyurie, Colibacillurie, Oxalurie, Prostatite, Oligurie, etc.

c. *Maladies infectieuses* (parallèlement au traitement spécifique) : Grippe, Angine, Fièvres diverses, etc.

d. Et toutes les fois où il faut réaliser une action antiurique, antiseptique ou diurétique (complément de la cure hydrominérale).

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Cure de 10 à 20 jours par mois. Chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose). Etui de 60 dragées.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale et admise aux Assurances Sociales.

Laboratoires ROSA,

« La Feuille fraîche d'Artichaut en thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 09-63.)

CYPROVEINOL

**Millefeuille-Ficaire-Cupressus
sans Hamamélis ni Marrons d'Inde.**

Indications. — Congestions prostatiques, Congestions veineuses ; Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Ulcères variqueux, Troubles de la Puberté et de la Ménopause.

Deux formes :

Gouttes : 30 gouttes 2 fois par jour dans un quart de verre d'eau bien sucrée.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

La boîte de 12 suppo : 16 fr. 50.

Le flacon (traitement 25 jours) : 16 fr. 50.

Laboratoire DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-07.)

CYSTOCONE

Suppositoire.

Composition. — Association de l'Acide Cyclopentenyl-allylbarbiturique avec son sel d'Ephédrine et la Belladone totale.

Action. — Antalgique, Antispasmodique, Décongestionnant des organes du petit bassin.

Indications. — Chez l'homme : Cystites, Prostatites et Urétrites aiguës et chroniques. — Chez la femme : organes génito-urinaires, Angoisse et douleurs pré et post-opératoires de l'appareil urogénital.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 suppositoires CYSTOCONE par 24 heures, de préférence le matin au réveil et le soir au coucher, autant que possible après l'évacuation de l'intestin.

Adolescents : au-dessus de 15 ans : 1 suppositoire CYSTOCONE le soir au coucher.

Prix :

La boîte de 6 CYSTOCONE : 16 fr. 65.

La boîte de 18 CYSTOCONE : 37 fr. 45.

Société Industrielle de thérapeutique scientifique appliquée,

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

CYSTOFLORINE

(Dragées bleues néphro-pyélotropes).

Priorité. — La barbiflore (Orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale. Hexaméthylène-tétramine. Chlorure de tétraméthylthionine. Camphre monobromé.

Propriétés. — Diurétique antiseptique et sédatif, *médication spécifique des affections génito-urinaires*. Décongestif des organes pelviens. Antiinfectieux chromothérapique (colore l'urine en vert). Désintoxicant général.

Indications. — Cystites, Néphrites, Pyélo-néphrites, Bactériurie et Pyurie, Colibacillose, Oligurie, Urétrites, Hémorroïdes, Prostatisme, Métrites et Annexites, Écoulements muqueux ou muco-purulents, etc. *Chez l'enfant* : Enurèse, Rougeole, Scarlatine, etc.

Posologie. — *Adultes* : 5 à 10 dragées par jour avant les repas. *Enfants* : depuis 1 dragée (tolérance parfaite).

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

**PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »
MONTE-CARLO**

« La Barbiflore en thérapeutique ».

CYTOBAUME

Composition. — L'ommade chlorurée magnésienne au stéarate d'ammonium.

Propriétés thérapeutiques. — Cette préparation réunit les deux indications principales pour la médication de l'épiderme et du derme : cytophylaxie des éléments cutanés en un milieu toujours acide à pH constant voisin de l'acidité habituelle de la peau.

Indications. — Dermatoses, eczémas, psoriasis, érythème, érythrasma, prurits séniles, prurits périnéaux. Néoforations de la peau, bénignes ou malignes, radiumdermites et radiodermites, mycoses unguéales, crasse des vieillards, fragilité et taches des ongles, piqûres d'insectes, coups de soleil, brûlures causées par l'héliothérapie. Préserve de la piqûre des aoûtats.

Mode d'emploi. — En applications fréquentes par léger massage sur la région à traiter, en particulier le soir au coucher. (Le Cytobaume ne tache ni le linge, ni les draps.)

Prix : 16 francs le pot.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et Cie

Laboratoire de Pharmacologie Générale

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.).

CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue. (Vitamines A et D.)

Formes :

1° *Gouttes* : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.)

2° *Granulé* : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

Indications. — Anémies, avitaminoses, adénopathies, croissances, rachitisme, inappétence.

Posologie :

Gouttes. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

Gouttes. Adultes :

XXX à XL gouttes. A prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

Granulé. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Granulé. Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix. <i>Gouttes</i> :	14 fr. 05.	} Traitement.
<i>Granulé</i> :	15 fr. 60.	

pour 8 à 10 jours.

Laboratoires MARTIN

25-27, rue du Commandant-Rivière,
COLOMBES (Seine). (Tél. : Charlebourg 03-62).

CYTO-CHOLINE

Composition :

Chlorhydrate de Choline pur.....	2 centigr.
Sérum chloruré isotonisant.....	2 centileubes.

Indications. — L'injection de **Cyto-Choline** peut être associée aux divers traitements chimiothérapiques et collapsothérapiques de la tuberculose.

Elle est indiquée chaque fois qu'une lésion tuberculeuse est en cause, que la localisation soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, que l'évolution soit aiguë ou chronique.

Mode d'emploi. — La **Cyto-Choline** s'emploie en injections sous-cutanées, pratiquées avec les précautions aseptiques habituelles, au niveau de la cuisse, tous les deux jours.

Comme il s'agit d'une médication ayant pour but de modifier le terrain, elle doit être poursuivie pendant plusieurs mois, sans interruption.

Résultats. — Associée à la cure hygiéno-diététique, la **Cyto-Choline** favorise le développement du processus de sclérose cicatricielle chez les tuberculeux pulmonaires, et détermine chez ces malades une amélioration des symptômes fonctionnels.

Dans les tuberculoses extra-pulmonaires, les résultats de ce traitement ne sont pas moins remarquables.

Traitement pour 24 jours.

Boîte de 12 ampoules : 21 fr. 50.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes, 27 — PARIS (XVII^e).

(Téléphone : Carnot 78-11.)

CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arsénée.

Le CYTO-MANGANOL constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

Indications. — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

Dose. — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les 2 jours pour les *adultes* ; une ampoule de 2 centicubes pour les *enfants*. Traitement pour 18 jours.

Présentation :

Cyto-manganol pour adultes.

Boîte de 12 ampoules de 5 cc. : Prix : 23 fr. 50.

Cyto-manganol infantile.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. : Prix : 17 fr.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

CYTOPAN

Forme. — Vin composé de goût agréable.

Composition :

CYTOPAN Simple : Acide phosphorique, teinture de noix vomique, kola.

CYTOPAN F : même composition que CYTOPAN Simple, avec extrait fluide spécial désodorisé de Fenugrec.

Indications. — Toutes décalcifications, pré-tuberculose, faiblesse générale, asthénies de toute nature, surmenage physique et intellectuel.

CYTOPAN F : celles du CYTOPAN Simple et plus spécialement amaigrissement, anémies grossesse, lactation, faiblesse générale.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir, avant les repas. Enfants au-dessus de 8 ans 1 cuillerée à café.

Laboratoire J. LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

(Tél. : Ent. 01-41.)

CYTOPEPSAL

Composition :

Pepsine	0 gr. 10
Sulfate neutre d'atropine.....	0 gr. 00125
Eau bi-distillée.....	1 cc.

Ampoules de 2 cc.

Indications. — Ulcères digestifs et duodénaux, Dyspepsies douloureuses hyperacides.

Posologie. — S'emploie par série de 12 injections intramusculaires profondes, 3 la première semaine, 1/4 d'ampoule, 1/2 ampoule et 3/4 d'ampoule. Continuer à raison de 3 injections d'une ampoule de 2 cc. par semaine.

La boîte de 12 ampoules pour 4 semaines de traitement.

Prix : 20 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél.: Carnot 78-11.)

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition :

<i>Cacodylate de soude chimiquement pur.</i>	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine</i>	<i>Un milligramme.</i>
<i>Sérum isotonisant chloruré</i>	<i>Cinq centicubes.</i>

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose. Neurasthénie. Asthénie post-grippale, Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Traitement pour 18 jours.

Prix : 22 francs.

Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 14 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

CYTO-SIROP

Propriétés thérapeutiques. — Adjuvant rationnel de la croissance.

Indications:

- A. *Générales* : Toutes les périodes de croissance de l'enfant sain.
B. *Particulières* : Débilité congénitale et retards de croissance. Paresse intellectuelle et inertie cérébrale. Incontinence nocturne des urines. Troubles liés à la diathèse lymphatique.

Avantages:

- 1° *Composition judicieuse* : Nucléinate de Soude, Glycérophosphate de Soude, Alcoolat de cacao, extrait fluide de Kola.
2° *Aucune contre-indication.*
3° Goût très agréable.

Posologie. — Avant ou après les repas :

- De 2 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café.
De 6 à 9 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert.
De 10 à 15 ans : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Prix : 17 francs.

Laboratoire des **SPÉCIALITÉS CABASSON,**

A. GROS-CAVALIER, Pharmacien.

183, rue de Rome — MARSEILLE.

DABOÏNE

Hémostatique local (Usage Externe).

Solution stérile en eau distillée de venin de vipère Daboïa.

Indications. — Toutes les hémorragies et tous les saignements du domaine de la petite chirurgie, de l'oto-rhino-laryngologie et de la stomatologie. Tous saignements en nappe.

Mode d'emploi. — En applications locales.

Présentation :

Boîte de 2 ampoules de 2 cc.....	18 francs.
Boîte de 4 ampoules de 2 cc	32 —
Flacon compte-gouttes de 20 cc. .	53 —

Laboratoire R. GALLIER

38, boul. du Montparnasse — PARIS (XV^e).
(Tél. : Littré 98-89.)

Pagenau

DAMICOL

Cholagogue - Cholérétique.

Composition :

Peptone de foie.....	0,18
Sulfate de magnésie anhydre.....	0,63
Extrait de bouillon aromatisé..	Q. S. P. 1,80

Indications. — Congestion hépatique, Ictère, Lithiase biliaire, Cholécystites, Insuffisances hépatiques, Cholémie, Dyspepsies réflexes, Constipation, Migraines, etc.

Dosologie et mode d'emploi. — Faire dissoudre 1 ou 2 comprimés de Damicol dans une tasse d'eau bouillante. Absorber le consommé ainsi obtenu le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

« Le petit déjeuner de l'hépatique. »

Présentation. — Boîte de 20 comprimés pour 10 jours de traitement.

Prix : 16 francs.

[Remboursement aux Ass. Soc. — Catégorie B.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, r. de Vaugirard - PARIS (VI^e). - (Tél : Lit. 68-22, 23 et 24.)

DÉCHOLESTROL

Cure de décholestérinisation.

Composition. — Sels alcalins anhydres, sulfate de magnésie desséché, à faible dose, hexaméthylène-tétramine 1 p. 100.

Propriétés. — Stimule et draine le foie, augmente le pouvoir cholestérolitique du sérum sanguin, aide à la résorption des scléroses.

Indications. — *Toutes les manifestations de l'Hépatisme* (cholémie, lithiase, insuffisance hépatique, migraines, urticaire, prurit, eczéma, dyspepsie hépatique).

Toutes les manifestations de l'arthritisme. Hypertension artérielle, diabète, goutte, obésité, artériosclérose ; surdité et troubles oculaires des scléreux, xanthome, xanthélasma des paupières, arc sénile, cataracte.

Mode d'emploi. — Un paquet matin et soir, 1/4 d'heure avant les repas, dans un 1/2 verre d'eau ordinaire ou minérale tiédie, de préférence, pendant 12 jours par mois.

Laboratoire national de contrôle, n° 1219-1.

Prix : 17 francs.

Établissements Pharmaceutiques

M. et P. LEDENT — MONTREUIL-SUR-MER
(Pas-de-Calais). (Tél. : 1-60.)

DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

Action. — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

Indications. — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

Prix : 19 francs.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Laborde 08-00.)

DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium.

Stimulant biologique général

par hyperminéralisation magnésienne.

Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

Indications thérapeutiques particulières. — Asthénie et fatigue générale. Surmenage, Convalescence des maladies infectieuses, Dépression de certains malades devant être opérés. — Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires. — Tremblements séniles ou autres : Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes — Troubles cardiaques par hypervagotonie. — Affections de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné, Verrues. — Adénome prostatique. — Lésions du type précancéreux et prophylaxie du cancer.

Mode d'emploi et doses. — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

La boîte de 48 comprimés. Prix : 18 fr. 65.

La boîte de 96 comprimés. Prix : 32 francs.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et C^{ie}

Laboratoire de Pharmacologie Générale

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gutenberg 27-03.)

DELCAÏNE ROQUES

Chlorhydrate de pseudococaïne droite.

Cocaïne aneuphorique par double isomérisation stéréochimique.

Trois fois plus active, trois fois moins toxique que la cocaïne officinale. N'est pas un stupéfiant, ne figure pas au tableau « B ».

Emploi. — Anesthésie locale, régionale. Anesthésie par instillations, par contact. Endoscopies (bronchoscopies, gastroscopies).

Forme. — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 %, en ampoules de 1, 2, 5, 10, 50 cc. pour anesthésie locale, régionale. Ampoules spéciales pour l'anesthésie buccale et laryngopharyngée : Delcaïne « 838 ».

Flacons de 15 cc. et 50 cc. à 5 % et 10 % et Bonain à la Delcaïne pour anesthésie par contact. Delcaïne en poudre, flacon de 2 gr., tube de 0 gr. 50.

Les ampoules de Delcaïne ne contiennent pas d'Adrénaline.

Établissements ROQUES

36, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

PARIS (IV^e). — (Tél. : Turbigo 62-00, 62-01.)

DÉMORPHÈNE

Désintoxication rapide par les émulsions de lipides végétaux des morphinomanes, cocaïnomanes, opiomanes et tous intoxiqués (Procédé de MM. Delaville et R. Dupouy, Ac. de Médecine, 25 mars 1934).

Admis par le Service de la Santé de la Marine. Autorisation Ministérielle du 26 octobre 1936.

Durée du traitement.

4 à 6 jours suivant le degré d'intoxication.

Disparition, au cours de la cure, de l'état de besoin si pénible et si redouté des malades.

Caractéristiques:

La morphine ou ses succédanés étant liposolubles (travaux d'Overton) se fixent rapidement sur la substance nerveuse riche en matières grasses et s'y intègrent en remplacement d'un des constituants normaux de cette substance.

Le **Démorphène** qui est une émulsion huileuse composée d'huile d'olives ricinée et lécithinée met en liberté le toxique fixé sur le système nerveux, le dissout et prend sa place dans la substance nerveuse.

Mode d'emploi:

Le **Démorphène** s'administre en injections intramusculaires, à raison de 25 cc. pro die, chaque injection étant de 5 cc. Avoir soin de bien agiter chaque ampoule avant usage. A ces injections on associera deux injections quotidiennes d'insuline de 15 unités chacune (augmentation des échanges nutritifs) deux injections de 2 cc. d'huile camphrée spartéinée. Aux vagotoniques on fera prendre 0,05 à 0,06 cgr. d'éphédrine par jour et on leur injectera avant les deux principaux repas une ampoule d'hypophyse et d'adrénaline. Chez les sympathicotoniques on remplacera l'éphédrine par de la génésérine (L à XC gouttes par jour) et l'hypophyse adrénalinée par des sels de calcium. Pour favoriser le repos du malade on donnera des sédatifs du système nerveux (**Eunéryl**) à petites doses matin et soir. Une bonne évacuation intestinale sera assurée par des pilules laxatives et diaphorétiques (cascara, évonimine, podophyllin, pilocarpine).

Chaque boîte d'ampoules est accompagnée d'un schéma indiquant de façon précise la marche à suivre.

La boîte de 10 ampoules de 5 cc. 150 fr.

Laboratoire BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS.

(Tél. : Anjou 61-61.)

DENISOLINE

Lotion colloïdale au Soufre électro-négatif.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne les tissus sanguins sous-épidermiques ; apporte au derme le soufre déficitaire et rend la peau souple, ferme et saine.

Indications. — Acné sous toutes ses formes. Etats séborrhéiques, Pityriasis.

Mode d'emploi. — Une application le soir à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Laisser sécher.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens.

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

DENTOCHRYSLINE LUMIÈRE

Traitement aurothérapique curatif de la Pyorrhée alvéolo-dentaire (Paradentose), des stomatites ulcéreuses, des gingivites expulsives et des infections buccales en général.

La Dento-chrysline Lumière est constituée par une pâte à laquelle est incorporé un composé aurique spécial (aurothiopropanol sulfonate de Calcium) composé, qui possède un index thérapeutique des plus élevé, capable d'exercer une action remarquable, aussi bien sur l'infection locale que sur les processus métaboliques tissulaires.

L'absorption d'un composé aurique de cette nature, au niveau des gencives et des alvéoles dentaires, telle qu'elle est obtenue avec la Dento-chrysline Lumière, dont le taux de solubilité a été spécialement réglé à cet effet, complète heureusement la destruction des germes « in situ » par une imprégnation profonde, qui favorise la défense de l'organisme et la restauration des tissus mortifiés.

La Dento-chrysline Lumière réalise donc pour la première fois, seule ou associée à l'Allaurol Lumière, le traitement complet, à la fois local et général, de la Pyorrhée alvéolo-dentaire (maladie paradentosique), affection organique, liée à un état général défectueux.

Mode d'emploi. — Brosser les dents avec l'Allaurol Lumière, Pâte dentifrice médicale à base d'or. — Prendre la pâte Dento-chrysline Lumière sur la pulpe de l'index et masser la gencive doucement, jusqu'à absorption. Les applications en nombre variable (plusieurs fois par jour, selon la gravité) doivent être quotidiennes. Dans les cas simples, le traitement est continué pendant un mois environ. En cas de suppurations importantes ou chroniques, le nombre des applications consécutives peut être porté à 70 ou 80.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON

DENTOMA

Pâte Dentifrice

Spirillicide par son sel arsenical stable,
Microbicide par le chlorétone, Neutralise
l'acidité buccale génératrice des caries,
par la magnésie.

Exempte de pierre ponce. L'abrasif utilisé
est de l'alumine qui ne raye pas l'émail mais
blanchit admirablement les dents.

Indications. — Pyorrhées, gingivites, sto-
matites. Hygiène quotidienne de la bouche
et des dents, Prévient la carie dentaire.

Le tube : 6 fr. 90.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

DENTOVAL

**Solution saline, alcaline,
antiseptique, décongestive
pour tous les soins de la bouche.**

Employé comme dentifrice, remplace
poudre, pâte et tout autre produit
pour les dents.

Spécifique de la Pyorrhée.

Dépôt :

**PHARMACIE ANGLAISE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées —
PARIS.

DÉPURATIF CHAUVIN

(aux hyposulfites)

Principes actifs. — Hyposulfites de soude et de magnésie, extraits de badiane et d'anis vert. (Solution glycinée ne contenant ni iode, ni iodures, ni substances végétales dites à tort dépuratives.)

Action. — Réducteur, modificateur du tissu humoral, antianaphylactique, désensibilisant, antitoxique.

Mode d'emploi et posologie. — *Adultes* : Une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau ou d'eau additionnée de vin blanc, 2 fois par jour avant chacun des deux principaux repas. *Enfants* : de 5 à 7 ans, 1/3 de la dose ; de 7 à 14 ans, 1/2 dose ; à partir de 15 ans, dose normale.

Indications. — Affections cutanées, Eczémas, Furonculose, Urticaires, Intoxications du foie y compris intoxications thérapeutiques (comme préventif et comme curatif). Facilite la chrysothérapie et les traitements antisyphilitiques, qu'il rend inoffensifs. Ne fatigue pas l'estomac comme cela se produit pour les hyposulfites en cachets ou en comprimés. Son goût est facilement accepté par les malades, surtout si on ajoute un peu de vin blanc.

Prescription. — Peut être prescrit aux diabétiques. Prescrire ainsi : un Dépuratif Chauvin. (Les médecins qui n'aiment pas le mot « dépuratif » peuvent prescrire cette spécialité sous la dénomination : *Désensibilisant Chauvin*)

Prix : 17 fr. 10.

Établissements Alfred CHAUVIN
(Laboratoire des Tubes Blache)
AUBENAS (Ardèche).

DÉPURATIF SALGANYL

Dépuratif exclusivement médical.

Indications. — Lymphatisme, Dermatoses, Prurits, Arthritisme, Furonculose, Affections du foie, Infections, Intoxications.

Forme. — Elixir peu alcoolisé de goût agréable présenté en deux modèles, un normal (12 jours de traitement), un réduit destiné aux enfants (15 jours de traitement).

Composition. — Bardane stabilisée, Boldo, Salsepareille, Sulfate de manganèse, Iode en faible quantité sous forme de composé iodotannique : Chlorure de magnésium, Acide phosphorique.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe pour les adultes, une à café pour les enfants, pur ou dans un peu d'eau avant les deux repas.

Prix : 20 francs.

Modèle réduit : 12 francs.

Inscrit au Laboratoire national du Contrôle des médicaments sous le n° 1438.

Laboratoires GAMES

2, place de la Salamandre — NIMES.

DÉPURIODE

du Dr Roger Weber.

Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.

Une cuillerée à soupe contient
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

Formule. — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé : ââ 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium 16 gr. 70. Pour 1.000 cc.

Indications. — Furunculose, clous, anthrax, orgclets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses.

Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité.

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardits chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstitielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofulé, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

Mode d'emploi et posologie. — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

Adultes (dose moyenne) : 1 cuillerée à soupe. Contre artériosclérose et hypertension : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 cuill. à café.

Prix du flacon : 20 francs.

Laboratoire Angelini

61, rue de Seine — PARIS (VI^e).

(Tél. : Danton 92-73.)

DÉPUROGÈNE

Composition. — A base d'extraits d'Artichaut, d'Salsepareille, de Ficaire et de Citrate de Soude.

Propriétés. — Épurative et Décongestive, selon la méthode du Dr A. Chaix, de Vichy. Puissant agent de décongestion et d'élimination de l'Urée et de la Cholestérine du sang.

Indications. — États pléthoriques, variqueux, hémorroïdaires, hypertendus.

Urémie, Diabète, Goutte, Rhumatismes, Artériosclérose.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.

Tube : 60 pilules.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

DÉPUROGÈNE « T »

Composition. — A base d'extraits d'Artichaut de Salsepareille, de Ficaire et d'extrait hépatique spécial.

Propriétés. — Épuratif et décongestif de l'organisme féminin, selon la méthode du Dr A. Chaix, de Vichy.

Indications. — Traitement par excellence de tous les troubles de la ménopause et des troubles congestifs dus à la stase veineuse et à l'intoxication du sang.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.

Boîte 60 pilules.

Laboratoires de LA LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

DERCUSAN

Chloramine T 1,50 p. 100 en véhicule hydrocarburé.

Antiseptique cicatrisant.

Propriétés. — Antiseptique, cicatrisant, désodorisant des sécrétions fétides, épidermisant, antiparasitaire.

Indications. — Abscesses, adénites suppurées, blessures, brûlures, crevasses, chancres, désinfection des plaies, ecthyma, leucorrhée, parasites cutanés, processus septiques, suppurations, tumeurs de la peau, ulcères de toutes sortes et variqueux.

Facilité d'application. Action antiseptique constante. Non-adhérence des pansements. Non irritant quoique puissant bactéricide.

Prix au public :

Petit tube	6 fr. 25
Grand tube	12 fr. 50
Tube clinique	31 fr. 20
Canule Dercusan pour l'injection de l'antiseptique dans les cavités....	18 fr. 70

Laboratoires SASSE

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

DERMACIDE PORCHER

L'abus des savonnages — *toujours alcalins* — détruit l'acidité naturelle de la peau et de certaines muqueuses, rendant celles-ci facilement infectables.

D'autre part, les acides diminuent les démangeaisons tandis que les alcalins les exacerbent (Darier).

Dermacide est un substitut réellement acide du savon (pH moyen 3,5).

Caractéristiques. — 1° Il contient à l'état libre : Acide Acétique 0,60 ; Tartrique, 1,10 ; Salicylique, 0,25 ; Benzoïque, 0,20 p. 100.

2° Son Acidité ionique (pH moyen 3,5) — *il rougit le Tournesol bleu* — est proche l'acidité naturelle de la peau (pH 4,5) ;

3° Il s'emploie, nettoie et mousse comme le savon ;

4° Les pouvoirs Antigénétique et microbicide de **Dermacide** liquide sont effectifs aux concentrations aqueuses respectives de 2 à 4 p. 100.

Indications. — Infections de la peau, du cuir chevelu, de la muqueuse vaginale.

Epidermomycoses en général, Eczémas, Eczématides, Intertrigos des plis — Prurits sous toutes ses formes — Séborrhées grasses — Acnés — Psoriasis — Pyodermites (furoncles, impétigos, etc...).

Métrites, Vaginites, Prurits Vulvaires.

Mode d'emploi :

Dermacide liquide : l'employer comme agent de nettoyage et en lotions épidermiques, coupé de 1 à 6 fois son poids d'eau, laisser en contact quelques minutes, rincer ensuite à l'eau.

Cuir chevelu : nettoyage avec 2 cuillerées à bouche pour 1/4 de litre d'eau tiède — rincer à l'eau.

Injectons vaginales : 1 à 2 cuillerées à bouche pour 1 litre d'eau.

Dermacide pain. — Remplace le pain de savon dans tous les usages.

Dermacide pâte. — Sans corps gras, sèche rapidement et s'enlève à l'eau ; complète l'action des deux autres formes.

Traitement. — *Supprimer complètement l'usage des savons*, le remplacer, comme Agent de nettoyage, par **Dermacide** pain, ou liquide.

Sur les lésions accentuées, compléter, après quelques jours, le traitement ci-dessus par des applications de **Dermacide pâte**.

Sur la face, les lésions subaiguës, les plis, toujours débiter par lotions de **Dermacide** liquide coupé de 4 à 6 fois son poids d'eau. Les premières applications déterminent parfois, pendant quelques minutes, des sensations de picotement qui disparaissent à la deuxième ou troisième application. Augmenter progressivement la concentration.

Sur les peaux sèches (dépourvues de graisse), ne pas employer **Dermacide**, à moins de faire suivre son usage d'applications de crème de lanoline.

Dermacide pain. — Boîte de 1 pain : ; de 3 pains :

Dermacide pâte. — Tube :

Dermacide liquide. — Flacon : — GM :

Assurances Sociales : Catégorie B.

Laboratoire PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e) Arch. 69-03.

DERMATHORIUM

Pommade se composant de terres radioactives à activité uranique : I, terres rares (titane, lantane, néodyme, etc.), produits organiques (acide salicylique, résorcine, huile de cade), produits minéraux (soufre, oxyde de zinc).

Le Dermathorium est un complexe jouissant de propriétés antiseptiques (acide salicylique, soufre), kéraroplastiques (résorcine, titane), analgésiques et sédatives (acide salicylique), qui convient à toutes les manifestations cutanées morbides.

Indications. — Le Dermathorium est utilisé dans toutes les affections de la peau : Eczéma, Acné, Prurits divers, Psoriasis, Intertrigo, Ichthyoses, Lichens, Ulcères, Epithéliomas cutanés.

Mode d'emploi. — Enduire chaque soir, après nettoyage soigné, les parties atteintes d'une couche assez épaisse de Dermathorium Rhemda, protégé ou non par un pansement.

Prix au public : 1 tube : 14 fr. 50.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien,

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068 B.

DERMODULCIS LAGOUTTE

Composition et forme. — Pâte neutre en tube aseptique à base de : oxyde de zinc, amidon, huile de noyaux, lanoline et vaseline pure : aa p. e.

Actions thérapeutiques. — Isolante, adoucissante, astringente, siccatrice. S'étend facilement et s'enlève aisément.

Indications. — Erythèmes, Eczémas aigus ou chroniques, Dermite aiguë de natures diverses. Radio-dermites, Prurigo, Impétigo, Herpès, Séborrhée, Dartres, Ulcères des jambes, Crevasses, Pansements chirurgicaux, Fistules, Anus artificiel.

Mode d'emploi. — En onction matin et soir.

Prix du tube de 60 gr. : 12 francs.

Son efficacité est heureusement complétée par la **DERMODULCIS** (Poudre) adhérente, infermentescible, adoucissante.

Prix de la boîte : 8 fr. 50.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35).

DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube,
(Extr. de hêtre).

Propriétés. — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

Indications. — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres) ; du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards, verrues plates séniles).

Impétigo, Herpès : Tricophyties (herpès circinné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 12 francs.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (chologogue et diurétique), le **Raiforyl** (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 13 fr. 50.

Laboratoires de la DERMOFAGINE

15, pl. Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER
(Pas-de-Calais.) (Tél. : 537.)

DERMO-GÉNÉSINE

DU DOCTEUR L. DELALBRE

EX-DERMO-RHINHISTOL

CRÈME

Opothérapique et Chimiothérapique
RÉGÉNÉRATRICE DE LA PEAU

à haute teneur en

Extrait embryonnaire total et Vitamines liposolubles A, D, E, F.

COMPOSITION —

Extrait embryonnaire total.....		8 gr.	
Huile de foie de Flétan.	2 gr.	Oxyde de zinc.....	2 gr.
Huile de germes de blé..	0 gr. 75	Chlorure mercurieux par vola-	
Acide linoléique pur....	0 gr. 25	tilisation, Camphre, etc....	1 gr.
		pour 100 gr.	

Excipt^l spécial^l étudié avec Vaseline, Lanoline, Essences aromatiques.

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

Épidermisation certaine dans toutes altérations ou pertes de substance de la peau et des muqueuses accessibles.

— Domaines des applications : —

Dermatologie.

Oto-Rhino-Laryngologie.

Traumatologie.

Chirurgie.

— SOINS DU VISAGE —

Gynécologie.

PRIX AU PUBLIC : 21 fr. 00 LE TUBE de 40 gr.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

P.-L. DUMONT, Pharmacien,

2, rue Claude Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

DERMOLIVE

Composition. — Pommade à base du support actif : *Oléostat* (nom déposé), Huile d'olive *Vierge* solidifiée et saturée par procédé catalytique associé synergiquement aux acides benzoïque et borique, Kérosène et essences.

Propriétés. — L'Huile d'olive, support actif, garde ses qualités naturelles et agit par sa vertu extraordinaire de pénétration et sa richesse en vitamines,

Indications. — Toutes les dermatoses (eczéma, zona, acné, furonculose). Cicatrisation de toutes les plaies (brûlures, engelures).

Mode d'emploi. — Bien nettoyer la partie malade. Appliquer *Dermolive* qui fond aussitôt et imprègne profondément le tissu atteint. Recouvrir d'une compresse stérilisée de préférence. Renouveler matin et soir.

Grand tube. — Petit tube.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.
19, rue de Pontevès — MARSEILLE.

ARNOUX-BERENQUIER, Pharmacien.

(Voir *Boldolive*, *Suppolive* et *Sulfolive*.)

DERMORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

Composition. — Pommade à base de **Bromure de Radium** associé aux meilleurs topiques usuels (soufre, camphre, Pix betulina, oxyde de Zn).

Propriétés. — Action particulière du Radium sur les réactions inflammatoires locales.

Accentuation des propriétés de chacun des topiques, par radioactivité induite.

Le DERMORADOL calme l'irritation et la douleur dès la première application. **Cicatrise rapidement toutes les dermatoses.**

Indications. — Acné, brûlures, eczémas, érythèmes, furoncles, herpès, impétigo, prurits, plaies atones, psoriasis, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer 2 ou 3 fois par jour la quantité de pommade nécessaire pour recouvrir complètement la partie malade.

Établissements LABORADIUM

25, rue Friant — PARIS.

(Tél. : Vau. 25-07.)

DERMOSE ANTI-IMPÉTIGINEUSE

(Pâte de Hodara)

Formule :

Oxyde de plomb	14
Précipité blanc	14
Acide borique	14
Oxyde de zinc.....	14
Véhicule gras	44

Indications. — Impétigo, Acné, Affections cutanées torpides et infectieuses, Furoncles, Eczémas des fosses nasales, Pyodermites.

Prix au public : Tube : 12 fr. 50.

Laboratoires SASSE

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

DERMOSPLÉNINE

Extrait désalbuminé aqueux de rate.

Communication à la Société Médicale des Hôpitaux (Paris, 5 décembre 1930).

Eczémas secs et suintants, aigus et chroniques.

Prurits — Urticaires — Œdème de Quincke.

Ampoules de 2 centicubes correspondant à 25 gr. de rate fraîche de veau.

Mode d'emploi. — *Injection intramusculaire.* —

Commencer le traitement par l'injection de 2, 3, 4 ou même 5 ampoules à la fois selon la gravité du cas traité ; une injection tous les 2 jours ; dès que le prurit est nettement atténué et que les lésions cutanées commencent à s'effacer, l'on peut réduire la dose à 1, 2 ou 3 ampoules, également tous les 2 jours.

Références cliniques et échantillons :

Liposplénine du D^r Groc.

J. OLIVE, pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-94.)

DERMYLÈNE VAILLE

Composition. — Liquide à base de vératrol et d'acide salicylique en solution sursaturée (2 p. 100) dans un excipient non gras.

Indications. — Dermites et Epidermites microbiennes ou parasitaires (érythème fessier du nourrisson, intertrigo, impétigo, mycoses, etc.), Prurits, Psoriasis, Syco-sis, etc.

Mode d'emploi. — Humecter les parties malades à l'aide d'un tampon de coton imbibé de *Dermylène* et laisser sécher sans recouvrir. Deux à six fois par jour.

Prix : 16 francs.

Admis par les Assurances sociales.

Laboratoires VAILLE

1, rue du Puits-de-l'Ermite — PARIS (V^e).
(Tél. : Port-Royal 18-77.)

DERPHYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-39.

Forme. — Poudre.

Composition. — Stéarates métalliques.

Propriétés dermatologiques. — Infermen-tescible, hydrofuge, antiseptique, isolante.

Indications. — Toilette des nourrissons et des alités, dermites, intertrigo, prurits, macérations, urticaire, impétigo, dartres, piqûres d'insectes, coups de soleil.

Présentation. — Boîte poudreuse.

La boîte poudreuse de 100 grs : 9 fr. 90.

La boîte de recharge de 330 grs : 15 fr. 60.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Lab. 62-30.)

DÉSARTYL

Hypotenseur végété-polyhormonique.

Composition. — Gui, Hépatine, Pancréine, Pulmine.

Dose. — 3 ou 4 dragées par jour (de préférence avant les repas) amènent un abaissement rapide et durable de la tension artérielle. — Les symptômes alarmants sont immédiatement amendés.

Indications. — Hypertension artérielle, troubles de la ménopause, menaces d'hémorragie cérébrale chez les pléthoriques, troubles oculaires et auditifs provoqués par l'hypertension.

Prix : Le tube de 36 dragées : 19 fr. 15.

Ce produit peut être prescrit pour les Assurances Sociales.

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du Dr Paul Cantonnet).

Traitement principal d'attaque :

1° Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 41 fr. 60.

Traitements adjuvants et de maintien :

Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : Le flacon avec pulvérisateur : 62 fr. 40, seul : 26 fr.

Trachéol : Le flacon : 20 fr. 80.

Seringue spéciale pour injections trachéales : 70 fr.

Pilochlorine : Pilules, le flacon : 26 francs.

Traitement forme bronchitique :

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 41 fr. 60.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

DÉSINTEX

Médication hyposulfiteuse rationnelle

Désintoxicant. Désensibilisant. Correcteur humoral. Générateur de glutathion.

Comprimés glutinisés et dragéifiés d'hypo-sulfites de magnésium et de sodium chimiquement purs.

Inattaquables par le suc gastrique, les comprimés ne sont décomposés qu'en milieu intestinal, où ils sont absorbés en libérant des ions S instables, à l'état naissant et actifs.

Maximum d'efficacité, aucune intolérance gastrique.

Indications. — *Vecteur de soufre* : toutes dermatoses, acné, séborrhée, eczéma, herpès, etc.

Maladies de la nutrition : affections articulaires et péri-articulaires, rhumatismes chroniques, goutte, diathèse arthritique. Affections hépatiques : insuffisance, ictères.

Désensibilisant : dermatoses de sensibilisation, accidents sériques, urticaire, prurits. Manifestations anaphylactiques diverses (migraines, chocs, asthme), etc.

Désintoxicant : Intoxications alimentaires, médicamenteuses et professionnelles. Facilite la fonction rénale et hépatique au cours des traitements par les sels d'or, de Bi, Hg, As et évite les incidents.

Troubles psychiques, angoisse, instabilité émotive, déséquilibre du vague.

Posologie. — Avaler, sans sucer ni croquer, 2 ou 3 dragées avant les trois principaux repas.

Innocuité absolue.

Durée du flacon : 10 jours en moyenne.

Laboratoire M. RICHARD

AUBENAS (Ardèche).

DEXOPLASMA

Opothérapie anti-anémique.

Composition :

Extrait de foie	0 gr. 03
Extrait de rate	0 gr. 03
Extrait de groseille	0 gr. 01
Nucléinate de manganèse	0 gr. 015
Nucléinate de cuivre.....	0 gr. 0025
Sérum, hémoglobine, glycérine. Q. S. p	5 cc.

Indications. — Anémies de toutes natures (médicales et chirurgicales), Chlorose, Asthénie, Surmenage, Convalescence, tous états dépressifs.

Présentation. — Deux formes :

Ampoules buvables de 5 cc. — Sirop. (goût agréable).

Posologie :

Ampoules buvables : 1 à 3 ampoules par jour selon âge.

Sirop : Adultes : 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

— *Enfants* : 5 cuillerées à café par jour.

(Peut être pris pur ou dilué dans un peu d'eau.)

Prix { Ampoules (12 ampoules de 5 cc.) : 24 francs.

{ Sirop : 19 fr. 75.

{ Ampoules (vrac) : 36 fr. 25 (la boîte de 25 amp. vrac)

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Lon 04-61).

DEXTROSOL

Indications. — Toutes les indications du glucose et notamment tous états d'hypoglycémie et d'acidose ; insuffisance hépatique, cirrhose, lithiase et affections allergiques (asthme, prurigo, etc...) ; myocardites, angine de poitrine ; maladies infectieuses (diphthérie, coqueluche, encéphalite, pneumonie, typhoïde), intoxications (alimentaire, barbiturique, etc...), toxémies gravidiques, morphinisme ; ulcères gastriques et duodénaux ; néphrite et pyurie ; surmenage. Sucre de choix dans l'alimentation des enfants. Administration pré et post-opératoire.

Mode d'emploi. — A incorporer aux boissons (eau, thé, café, lait, jus de fruits) et aux plats.

Adultes : 50 à 400 gr. par jour.

Tolérance parfaite de quantités importantes, en raison du faible pouvoir sucrant.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par biberon de 100 gr.

Sucrer les aliments avec 5 à 10 p. 100 de *Dextrosol*.

Enfants : 10 à 20 gr. par kilog. du poids.

Prix : 7 francs la boîte de 250 gr.

Société des PRODUITS DU MAÏS

29, rue de Berri — PARIS.

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'anti-pyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

Doses. — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix au public : 27 fr. 50, pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien.

21, rue Chaptal — Paris (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

DIABÉTOSAN

Comprimés.

Insulinoïde végétal obtenu par dialyse de germes d'une espèce sélectivement cultivée d'orge, et dont la germination est conduite dans des conditions de temps et de température rigoureusement déterminées, sans aucune autre association chimique ou organique (*C. R. Académie des Sciences*).

Propriétés thérapeutiques. — Action hypoglycémiante constante et prolongée. Diminution parallèle des taux de sucre sanguin et urinaire.

Indications. — Diabètes moyens et légers. Hyperglycémie, Polydipsie, Polyurie. Meilleure utilisation des substances hydrocarbonées. Dermatoses. Cures d'engraissement. Adjuvant de l'insuline dans les diabètes graves permettant le remplacement d'un quart ou d'un tiers environ des unités d'insuline.

Posologie. — *Adultes* : 8 à 12 comprimés par jour, en trois fois au cours des repas.

Enfants : demi-doses.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

DIADERMINE

Crème.

Excipient pour pommade. Crème de toilette.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

Indications. — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure*. *Touchers*, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.

Massages, Soins de la peau. Brûlures, Engelures, Gercures du sein. Erythème fessier du nouveau-né.

Prix de vente au public : Pot : 7 fr. 75 ; Tube : 5 fr. 50

DIADERMINE U. V.

Crème.

A base de crème Diadermine et desels de quinine. Empêche la photo-sensibilisation de la peau par les rayons ultra-violets.

Indications. — *Évite, supprime les coups de soleil* (supprime la douleur en quelques minutes. Fait disparaître l'érythème en 24 heures).

Protection de la peau au cours des traitements par rayons ultra-violets ou rayons X (empêche la radiodermite).

Mode d'emploi. — *Avant.* Enduire la partie à protéger d'une légère couche de Diadermine U. V.

Après. — Mettre sur l'érythème une couche épaisse de Diadermine U. V. Panser sous gaze stérilisée.

Prix de vente au public : Grand tube : 20 francs ; Tube moyen : 8 fr. 50.

DIADERMINE B. B.

Poudre.

Poudre minérale hygiénique stérilisée à 125° (complément de la crème Diadermine pour les soins de la peau).

Présentation. — En boîtes poudreuses hermétiques (en aluminium) et stérilisées.

Indications. — Toilette des nouveau-nés : érythème fessier. *Adultes* : toutes irritations de la peau, intertrigo, dermatoses. *Feu du rasoir*, transpiration.

Prix de vente au public : la boîte 6 fr. 50. Recharge 4 fr. 25.

Conditions spéciales au Corps Médical.

Remise 40 p. 100.

Echantillons sur demande à :

BONETTI Frères

60, rue Étienne-Dölet. — MALAKOFF (Seine).
(Tél. : Alésia 24-01 et 24-02.)

DIAGNOTHORINE

Solution colloïdale à 25 p. 100 d'Oxyde de Thorium pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Indications. — L'étude des contours des segments du tube digestif est obtenue par l'emploi de la GÉLOBARINE (Voir *Gélobarine*). La DIAGNOTHORINE révèle les *plis de la muqueuse* dans tous leurs détails.

Présentation. — Flacons de 60 cm³.

Posologie et mode d'emploi. — Pour un examen : en général 2 cuillerées à soupe, à faire ingérer par petites gorgées au moment de l'examen, le malade n'ayant rien absorbé pendant les 8 heures précédentes.

La Diagnothorine peut également être administrée par voie rectale pour l'examen des plis de la muqueuse du gros intestin.

Prix de vente : Le flacon de 60 cm³. : 16 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

DIAL

Diallylmalonylurée

CIBA

HYPNOTIQUE ANTINERVEUX.

Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, même par son usage prolongé.

Indications. — Insomnie nerveuse en général : agités, émotifs, surmenés. Etats d'excitation psychique et de nervosisme. Agitation démentielle.

Doses. — 1/2 à 2 comprimés (au coucher pour les insomnies du soir ; au réveil pour celles du cours de la nuit).

Tube de 12 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIALYL

Dissolvant urique.

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 14 fr. 05 le flacon

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

(Tél. : Auteuil 20-21.)

DIASES

Composition. — Farines fraîches diastasées non stérilisées renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber.

Grâce à une prédigestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité. Elles assurent une alimentation rationnelle, sans aucun surmenage des organes digestifs.

Les repas de Diases, prédigérés pendant leur cuisson, conviennent aux organismes les plus délicats.

Variétés :

Diasé Cacao : Diasé de gourmandise pour déjeuners et goûters.

Diasé Céréale : Donne des bouillies très fluides pour l'alimentation au biberon. Convient à tous les estomacs délicats. Ne contenant aucun condiment, elle est naturellement fade et doit être accommodée selon le goût du consommateur.

Diasé légumineuse : Permet de préparer instantanément des potages excellents dont la condimentation peut être complétée suivant le goût de chacun.

Boîtes
de
300 grs net,
1 kilo
net,
et
3 kilos
net.

Indications :

Bébés : au moment du sevrage.

Enfants : pendant la période de croissance.

Adultes : tous régimes.

Mode d'emploi. — Délayer parfaitement et à froid 3 fortes cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diasé dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant ; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit : elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

PROGIL, Sté An. au capital de 50 000 000 fr.

10, quai de Serin — LYON (IV^e).

(Tél. : Burdeau 85-31.)

Laboratoires à RIS-ORANGIS (S.-et-O.).

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant intensif.

Composition et formes.

Diastogène simple. — Elixir (légèrement alcoolisé). Arsine, stimulant de la nutrition. Nucléine manganésifère, catalyseur nutritif, excitant des centres hématopoïétiques.

Kola fraîche stabilisée, toni-cardiaque, éliminateur des toxines et des déchets de la nutrition.

Adultes : 2 verres à liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Indications. — Reconstituant type, le plus agréable.

Diastogène F. (Cachets).

Complexe Diastogène (Arsines, nucléine manganésifère, kola fraîche) plus Fenugrec *total*, inclus en un comprimé glutinisé parfaitement toléré.

Adultes : 1 à 3 cachets par jour, *au milieu des repas*.

Indications. — Convalescences, asthénies avec amaigrissement, diabète.

Il existe une forme Diastogène F cachet, non arsénié.

Diastogène granulé hépato-splénique.

Application pratique de la méthode de Whipple : extrait titré de foie frais et de rate fraîche associés au complexe Diastogène (non arsénié) renforcé par addition de phosphore organique extrait des graines de céréales.

Adultes : 4 cuill. à café par jour.

Enfants : 10 ans : 2 à 3 cuill. à café par jour ; 5 ans : 1 à 2 cuill. à café ; 1 an : 1/2 à 1 cuill. à café par jour.

Indications. — Convalescence de l'enfant. Anorexie, Asthénies.

Prix : 18 fr. 20

Laboratoire DEHAUSSY
50, rue Nationale — LILLE.

DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Elixir (très agréable).

Contiennent toutes les vitamines
et hormones des glandes fraîches.

L'activité des ferments digestifs : *Pepsine, Pancréatine* et *Diastase* dépend de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : viandes, graisse, légumes, féculents, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du foie, du pancréas et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

Doses. — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'élixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'élixir dans de l'eau sucrée.

Prix : Taxe d'état comprise.

Elixir : 18 francs. — *Pilules :* 14 fr. 40.

Laboratoires du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

DIATHERMIE

A. Diathermie médicale.

- 1° Troubles de la circulation artérielle et veineuse ;
- 2° Douleurs thoraciques d'origine pleurale et douleurs abdominales : gastralgies, entéro-colite, épiploïtes et périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;
- 3° Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies
- 4° Névralgies et névrites ;
- 5° Trophicité des tissus : paralysies, poliomyélite.

B. Diathermie chirurgicale. Diathermo-coagulation.

Utilisée pour la destruction de nombreuses lésions en dermatologie, en gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en ophtalmologie, ainsi qu'en chirurgie générale.
Vente et location de tous appareils et accessoires à :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV°).

(Tél. : Littré 90-13.)

DIATHÈS

« MÉTÈRE »

Indications. — Contre toutes les manifestations de l'Arthritisme. Rhumatisme. Asthme. Rhume des foins. Goutte. Fibromes. Obésités. Troubles hépatiques et circulatoires. Eczémas.

Composition. — Solution huileuse colloïdale de Manganèse et de Fer contenant 0,13 mgr. de Manganèse et 0,03 mgr. de Fer par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. Prendre en même temps 2 capsules par jour de Diathès-capsules par la bouche. Au bout de 5 semaines arrêter quelques jours et refaire une nouvelle série s'il est nécessaire. Associer une opothérapie appropriée à chaque cas.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Molitor 03-91.)

DIATOL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Anhydricum titanicum, Zincum peroxydatum (titre 50), Pulvis Diatomei lavée, stérilisée, calibrée, anhydre, Talcum.

Propriétés. — Le *Diatol* pâte neutre très poreuse active le « restitutio ad integrum ».

Indications. — Eczémas suintants, prurigineux des membres inférieurs pré ou post-ulcéreux. Toutes dermatoses irritées.

Mode d'emploi. — Après détersion à l'éther, appliquer en couche de un demi-centimètre d'épaisseur sur toute la surface des lésions. Le pansement doit être fait en évitant l'emploi du coton.

Demander les brochures des Docteurs P. et
R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczéma pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

DIBROMOTYROSINE « ROCHE »

Composition. — Dérivé bromé de la tyrosine dont l'action sédative complète et consolide l'action en quelque sorte spécifique de la diiodotyrosine. Ne provoque aux doses thérapeutiques aucun phénomène de bromisme.

Indications thérapeutiques. — Renforce la diiodotyrosine contre les symptômes nerveux du Basedow. Remplace les bromures dans toutes leurs indications.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par jour.
Tube de 20.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 504-79.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

4 p. 100 d'iode total.

Dont 3 p. 100 d'iode libre.

Avantages :

- 1° *Toxicité abaissée* : des lapins de 2 kg. tolèrent 20 cc. par jour.
- 2° *Causticité supprimée*, car l'iode est adsorbé. Phénomène comparable à l'action du charbon sur les toxines intestinales.
- 3° *Activité augmentée* du fait de la division colloïdale.

Le Dicaliode est l'iodique des *petites doses*, parce que *très actif*.

Le Dicaliode est l'iodique des *hautes doses*, parce que *très actif et facilement toléré*.

Mode d'emploi. — Se prescrit en cc. ou par gouttes dans du lait, avant ou pendant les repas. 1^{re} cc. = XXXVI gouttes.

Indications. — Dicaliode à petites doses : 1 à 2 cc. par jour. Goître. Enfants : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliode à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. *Hypertension*. Affections du cœur et des vaisseaux, de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphysème, coqueluche, tuberculose). Affections de la peau : eczéma, psoriasis.

Dicaliode à hautes doses : 5 à 10 cc. et plus par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Prix : 19 fr. 75.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, pl. V.-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

Bruxelles :

LE MARINEL, pharmacien

4, Avenue Orban.

DICODÉINE LAFRAN

Indications. — Toux rebelles et toutes affections broncho-pulmonaires. Efficacité rapide.

Composition. — Codéinéméthylcodéine : 0,013 ; Aconit : 0,01 ; Belladone : 0,02 ; Terpène : 0,055 ; Benzoate de soude : 0,08 ; Glycyrrhizine et Excipient : Q. S. p. 1 comprimé dragéifié.

Posologie. — Doses pour 24 heures :

Adultes : de 5 à 6 dragées.

Enfants : de 10 à 15 ans : 4 dragées ; 5 à 10 ans : 2 à 3 dragées. A prendre entre les repas avec un peu d'eau ou une tisane.

On peut également les sucer.

Littérature et Échantillons aux Docteurs seulement.

Prix : 14 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 36-78.)

DIDIAL

Diallylmalonylurée et éthylmorphine.

CIBA

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE.

N'est pas au tableau B.

Un comprimé contient : Diallylmalonylurée : 0 gr. 11 ; Éthylmorphine : 0 gr. 015.

Pouvoir narcotique prononcé et action nettement analgésique, d'où indication lorsque l'insomnie est sous la dépendance de la douleur ou de l'anxiété.

Indications. — Toutes les insomnies relevant de la douleur ou de l'anxiété : Algies, Traumatismes, Tabes, Cancer. Agitation maniaque, Excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas, dans les autres cas.

Tube de 12 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIEMENAL

Indications. — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobinurique.

Composition. — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

Mode d'emploi. — Dans le Paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinurique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 17 francs (en France).

Laboratoire J. DEPRUNEAUX
18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).
(Tél. : Tremblay 12-04.)

DIÉNOL

Indications. — Broncho-pneumonie, Rougeole, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Infections septicémiques et tous états toxi-infectieux médicaux et chirurgicaux.

Composition. — Métaux colloïdaux, FeMn, obtenus par électrolyse.

Forme :

1° *Pour injections* : Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules ;

2° *Pour emploi par voie rectale* (V. R.) : Tubes-doses de 40 cc. en boîtes de 6 tubes, ou par tube isolé.

Mode d'emploi :

En injection hypodermique (indolente) ou intraveineuse : une ampoule toutes les 12 heures environ.

Par la voie rectale, on donnera par 24 heures :

Adultes et enfants au-dessus de 5 ans : 3 tubes-doses (à 6 heures d'intervalle environ).

Enfants de 2 à 5 ans : 2 tubes-doses (à 10 heures d'intervalle environ).

Enfants de 0 à 2 ans : 1 tube-dose.

Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois, le tube à donner dans les 24 heures sera administré en deux fois (1/2 tube chaque fois) à 7 ou 8 heures d'intervalle, en se servant d'une poire.

Il n'y a absolument aucun inconvénient à augmenter ces quantités. La réduction des doses, indiquée suivant l'âge, est uniquement pour ne pas administrer un volume de liquide disproportionné avec la capacité intestinale du jeune malade.

Prix de la boîte de 6 ampoules injectables : 15 fr. »

Prix de la boîte de 6 tubes-doses (voie rectale) : 29 fr. 15

Prix de la boîte de 1 tube isolé (voie rectale) : 4 fr. 70

Prix d'un nécessaire d'accessoires (voie rectale) : 5 fr. 85

J. DEPRUNEAUX

Pharmacien de 1^{re} classe

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Tremblav 12-04.)

DIGALÈNE « ROCHE »

Digitale totale injectable.

Composition. — Tous les glucosides de la feuille de digitale pourpre titrée d'après les prescriptions du Comité d'Hygiène de la S. D. N.

Propriétés. — Toute l'activité thérapeutique des préparations digitaliques.

Indications. — Toutes les indications des préparations digitaliques chaque fois que le cœur faiblit, même chez les enfants.

Posologie et modes d'emploi. — *Doses faibles* ou d'entretien cardio-tonique : *Adultes* : XX gouttes. *Enfants* : I à V gouttes.

Doses moyennes ou sédatives : *Adultes* : XX à XL gouttes ou I à 2 ampoules (voie intramusculaire). *Enfants* : V, X à XV gouttes.

Doses fortes ou antiasystoliques : *Adultes* : LX à CLXXX gouttes, 3 à 6 ampoules (intramusculaires ou endoveineuses). *Enfants* : V à XX gouttes et même I à 2 ampoules (cas d'urgence).

Ampoules (boîte de 6) ; solution (flacon de 15 cc.).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 504-9 (ampoules), 504-11 (solution).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

DIGASTRINE

(Cachets)

Composition. — Benzoate de naphtol, Charbon spécial, Poudre de belladone stabilisée.

Mode d'action. — Sédatif, absorbant, antiseptique ; stimulant de la sécrétion gastrique, antispasmodique.

Indications. — Aérophagie, dyspepsies, embarras gastrique, fermentations intestinales, entérocolite, crampes de l'estomac, spasmes du cardia, de l'estomac, du pylore. Entérospasmes, constipation spasmodique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cachets à la fin de chaque repas. Prix : 15 francs.

Laboratoire de la DIGASTRINE

M. DELORME, pharmacien

11, r. St-Agricol, AVIGNON (Vaucluse) (Tél. : 1-00.)

DIGESTIF HARVEY

Benzonaphtol	50 centigr.
Carbonate de chaux	25 —
Salicylate de bismuth	25 —
Hydrate de magnésie	50 —
Pepsine extractive	10 —
Maltine	05 —
Sucre anisé	6 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de l'acidité gastrique et des fonctions digestives.

Formes. — Granulé d'un goût agréable, pouvant être croqué.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Entérites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau, après chaque repas, Avant d'absorber le granulé, le laisser pendant vingt minutes en contact avec l'eau.

Prix au public : 10 fr. 40 la boîte de 90 grammes.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences.

101, avenue Paul-Doumer,

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). (Tél. : 124.)

DIGESTONIC

Composition. — Citrate de soude, Phosphate de Bismuth, Fluorure d'Ammonium, Macération hydroglycérique de *Sedum telephum* et de *Gonolobus condurango*.

Forme. — Elixir.

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative s'exerçant sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse gastrique. Calme le spasme, Action anti-émétique. Pouvoir antiseptique s'opposant aux fermentations. Supprime la constipation.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques, hyperchlorhydrie, spasme du pylore, irritations gastriques douloureuses, motrices et sécrétoires, vomissements du début de l'ulcus, fermentations gastriques par stase, constipation.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de tisane. Répéter la dose jusqu'à cessation de la douleur. Adjonction d'un régime le cas échéant.

Prix : 19 francs le flacon de 80 cc. environ.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

DIGEX

Antigastralgique, réalisant la saturation totale de l'acidité stomacale.

Composition. — Carbonates de chaux, soude et magnésie, Kaolin pur lavé, Magnésie hydratée, Phosphate tricalcique, crème de tartre, *peroxyde de magnésie*, condurango, fenouil, acide acétyl-salicylique. Sucre de lait.

Forme. — Paquets.

Indications. — Dyspepsies, aigreurs, brûlures d'estomac, ballonnements, nausées, vertiges, crampes, ulcères gastriques et duodénaux.

Doses :

Un à deux paquets après les repas. Durée du traitement : quinze jours.

Prix : 16 francs.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403-7.

Laboratoire REIVILO

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot. 04-71).

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque.
Association digitaline-ouabaïne.

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien)
X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Boîte de 8 ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours).

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonocardiaques ont échoué.

Remarques importantes. — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

(Cardibaïne,

Spasmosédine, Théoxanthine, etc.)

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

DIGICARDINE DIGICARDINE QUININÉE

Chaque pilule de *Digicardine* contient :

Poudre de feuilles de digitale stabilisée. 2 cgr. 5
Scille 3 cgr.
Théobromine chimiquement pure. 5 cgr.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Insuffisances cardio-rénales, Rétentions chlorurées ou azotées avec ou sans hypertension, Cardiopathies aiguës et chroniques, Retentissement cardiaque des maladies infectieuses.

Posologie. — *Dose asystolique*: 10 pilules par jour pendant 4 jours.

Dose hyposystolique: 2 à 4 pilules par jour pendant 10 jours.

Dose eusystolique: 1 ou 2 pilules par jour pendant 10 jours, une ou deux fois par mois.

Prix. — La boîte de 36 pilules : 15 fr.

Chaque pilule de *Digicardine quininée* contient :

Poudre de feuilles de digitale stabilisée.....	0 gr. 01	Extrait de belladone...	0 gr. 01
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 10	Arséniate de strychnine.	0 gr. 001
		Glycérophosphate de chaux.....	0 gr. 05

Indications. — Arythmies, Extrasystoles, Tachycardies, Eréthisme cardiaque, Palpitations.

Posologie. — 2 à 10 pilules par jour.

Prix. — La boîte de 36 pilules : 20 fr.

Laboratoires IMMUNOS, 8, avenue des Sources — NICE.

DIGIFOLINE

CIBA

PRÉPARATION DIGITALIQUE TOTALE.

Extrait digitalique contenant l'ensemble des glucosides cardioactifs de la feuille de digitale.

Stable, d'action constante, toujours bien tolérée.

Rigoureusement dosée.

Indications. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules), et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale.

Formes pharmaceutiques :

Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles.

Ampoules de 1 cc. = 10 cgr. poudre de feuilles.

Tube de 25 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIGI-LANATINE OU LANATINE

Soluté au millièrme du Totum Digitalique de Digitalis Lanata.

Cinquante gouttes = Un milligramme. = 1 cc.

Remplace avantageusement et plus sûrement la poudre et l'infusé de la feuille de Digitale.

Soluble dans l'eau, d'où élimination plus rapide et accumulation moindre.

Action rapide, Constante, Durable, Action physiologique constante et continuellement contrôlée, Ralentit, Renforce, Régularise le cœur, Provoque la diurèse, Réduit les œdèmes, Insuffisance cardiaque, Endocardite, Myocardite, Péricardite, Soutient admirablement le cœur dans tous les états infectieux, Médication spécifique du Cœur gauche.

Posologie :

Cardiotonique : V à X gouttes par 24 heures.

Sédatif : X à XX gouttes par 24 heures.

Antiasystolique : jusqu'à C gouttes par 24 heures.

A haute dose : 2 mgr. par 24 heures (X gouttes toutes les heures).

Diurétique puissant.

Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cc. Prix : 20 fr. 80.

Ampoules au 1/10 et au 1/4 de milligramme intraveineuse et intramusculaire.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

DIGILANIDE

Totum digitalique cristallisé.

Complexe cristallisé isomorphe des glucosides initiaux (A, B, C) du *Digitalis lanata*.

Avantages. — Toutes les propriétés d'une macération de feuilles fraîches de digitale qui serait parfaitement préparée, toujours identique, d'activité constante.

Le Digilanide est remarquablement toléré par la voie gastrique, les voies intraveineuse, intramusculaire et rectale. Son action est plus rapide que celle des autres digitaliques et ses effets diurétiques plus nets. Sa posologie est plus maniable, son élimination plus facile en cas de surdosage.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques.

Dosage. — 1 mgr. = 400 unités grenouille = 3 unités chat.

Formes. — *Gouttes* : 1 cc. = un demi-milligr. = XL gouttes du compte-gouttes normal. *Dragées* dosées à un quart de milligr. *Suppositoires* dosés à un demi-milligr. *Ampoules* de 2 et de 4 cc. : 1 cc. = 0 mgr. 2.

Posologie :

Voie gastrique. — *Solution.* Dose forte : $\frac{3}{4}$ de cc. ou XXX gouttes, 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours. Reprendre si nécessaire au bout de 8 à 10 jours.

Dose moyenne : $\frac{1}{2}$ cc. ou XX gouttes, 3 fois par jour pendant 8 à 10 jours.

Dose faible (dose d'entretien cardiotonique) : $\frac{1}{4}$ de cc. ou X gouttes, 3 fois par jour.

Dragées : dosées chacune à $\frac{1}{4}$ de milligr. — 2 dragées correspondent à XL gouttes ou 1 cc. de la solution gastrique.

Dose moyenne : une dragée, 3 fois par jour.

Voie rectale. — *Suppositoires* : un à deux par jour.

Voie veineuse. — Une ampoule de 4 cc. par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler, s'il y a lieu, après 5 à 8 jours ou remplacer par l'administration gastrique ou rectale.

Voie intramusculaire. — Une ampoule de 2 cc., 1 à 2 fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

DIGI-MIAL-BAINE

Composition :

Cinquante gouttes contiennent :

1/3 de mgr. de Digitaline cristallisée ;

2/3 de mgr. de Ouabaïne cristallisée.

Ralentit, renforce, régularise le Cœur. Provoque la Diurèse. Réduit les Œdèmes. Insuffisance cardiaque. Endocardite-Myocardite. Péricardite. Soutient admirablement le Cœur dans tous les états infectieux. Médication spécifique du Cœur gauche.

Posologie.

Cardiotonique : V à X gouttes. par jour.

Sédatif : X à XV gouttes par jour

Anti-asystolique : jusqu'à LX gouttes dans les 24 heures.

Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cc. Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

DIGISTABILINE

Gouttes - Pilules au 1/10^e mlg. et au 1/4 mlg.

Ne peut être prise que sur prescription et sous contrôle médical.

Indications. — Déficiences du myocarde, Arythmie complète, Hyposystolie et asystolie, Asthénie des pyrexies infectieuses générales et pulmonaires.

Composition. — La *Digistabiline* en « gouttes » et en « pilules » renferme, non altéré, le complexe glucosidique de la digitale fraîche.

Mode d'emploi. — La préparation liquide est logée en compte-gouttes. Elle peut être facilement dosée. — VII gouttes de *Digistabiline* correspondent à 1/10 de gr. de feuilles de digitale fraîches, ou 1/10 de milligr. de digitaline crist.

Pharmacie Centrale de Belgique

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

DIGITALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

Indications. — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

Formes. — Granules roses au 1/10^e de milligr., flacons de 50.

Solution au 1/1000^e, flacons de 10 et 5 cc.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 18-67.)

DIGITALINE-MIALHE

Soluté au millième de Digitaline Cristallisée.

Cinquante gouttes = 1 milligramme.

Supériorité incontestable sur toutes les préparations de Digitalis Purpurea.

Action rapide, Constante, Durable.

Pureté chimique, Action physiologique constante et continuellement contrôlée. Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes (employée dans les hôpitaux depuis 1839).

Préparée uniquement par les **Laboratoires Mialhe**.
Ralentit, renforce, régularise le cœur. Provoque la diurèse. Réduit les œdèmes, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, péricardite. Soutient admirablement le cœur dans tous les états infectieux.
Médication spécifique du cœur gauche.

Doses :

Cardiotonique : III à IV gouttes par jour.

Sédatif : V à X gouttes par jour.

Antiasystolique : jusqu'à L gouttes dans les 24 heures.

Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cmc. Prix : 20 fr. 80.

Ampoules au 1/10 de milligramme.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e). (Tél. : Richelieu 35-10.)

DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila (1872), Prix Desportes (1904),
de l'Académie de Médecine de Paris.

La Digitaline Nativelle, principe actif pur,
cristallisé et invariable de la digitale
pourprée, ralentit, renforce et régularise
le cœur, provoque la diurèse et réduit les
œdèmes.

Indications. — Insuffisances cardiaques —
Cardiopathies valvulaires — Myocardites
— Asthénie cardiaque (maladies infec-
tieuses et opérations) — Arythmies —
Fibrillation et Flutter auriculaires.

Formes. — *Solution* au 1/1.000, *Granules*
au 1/10 de mg. *Ampoules* au 1/4 de mg.
pour injections intramusculaires.

Doses.

Per os : Dose faible (d'entretien) : 1/2 mg.
en 5 jours.

Dose moyenne (de soutien) : 1 mg. en 5 jours.

Dose forte (d'attaque) : 1 mg. 1/2 à 3 mg.
en 10 jours (jusqu'à saturation).

Injectons : 1 cc. d'une ampoule matin et
soir le premier jour, puis 1 cc. d'une am-
poule par jour les 3 ou 4 jours suivants.

Ampoules. Prix : 19 frs., 50.

Granules. — : 14 frs., 50.

Solution. — : 19 frs., 50.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

DI-iodo-TYROSINE BYLA

Composition. — Di-Iodo-tyrosine = acide aminé iodé contenant 58 p. 100 de son poids d'iode organique.

Indications thérapeutiques. — Tous états d'hyperthyroïdisme, notamment maladie de Basedow et certains troubles de la ménopause (bouffées de chaleur, métrorragies, etc...) liés à une suractivité de la thyroïde.

Nous attirons également l'attention sur la **Di-Bromo-Tyrosine Byla** (acide aminé bromé, contenant 47 p. 100 de son poids de brome organique) qui remplace avantageusement, parce que plus assimilable, les bromures dans toutes leurs indications. La **Di-Bromo-Tyrosine Byla** s'associe à la **Di-Iodo-Tyrosine Byla** contre les troubles nerveux du Basedow.

Présentation, Posologie. — Comprimés de Di-Iodo-Tyrosine Byla à 0,10. Comprimés de Di-Bromo-Tyrosine Byla à 0,25. Boîtes de 20 comprimés ; un à trois comprimés par jour.

Prix : 21 fr. 85.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

DIIODOTYROSINE « ROCHE »

Médicament biochimique synthétique
de la maladie de Basedow.

Médicament stable possédant toutes les propriétés essentielles et directement utiles de l'iode inorganique (solution de Lugol) et n'offrant aucun risque d'iodisme.

Indications thérapeutiques. — Tous les états hyperthyroïdiens ; tous les symptômes basedowiens.

Posologie. — 1 à 3 comprimés dosés à 0 gr. 10 par jour. (Tube de 20 comprimés.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-59.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

DINITRA

Animateur des combustions cellulaires.

Dinitrophényl-lysidine pure.

Moins toxique que la thyroxine.

Plus actif que l'opothérapie.

Permet des traitements prolongés.

Dinitra active l'oxydation des réserves, élève le métabolisme basal, favorise l'élimination des déchets organiques, sans action secondaire sur aucun organe.

Communication à l'Académie de Médecine: Professeur Pouchet (18 février 1936.)

Thèses: E. Rivierez, « Contribution à l'étude de l'alpha-dinitrophénol 1. 2. 4. » (Paris 1935).

P. Rothea, « L'alpha-dinitrophénol 1. 2. 4, accélérateur des combustibles cellulaires » (Paris 1935).

Jacques Bell, « La thérapeutique dinitrée », (Paris 1937).

OBÉSITÉ

Dinitra est le médicament des obésités d'origine *exogène* (sédentarité, polyphagie), *Opo-Dinitra* étant réservé aux obésités d'origine *endogène* (insuffisance glandulaire, hypométabolisme, ménopause, syndrome adiposo-génital). Voir **Opo-Dinitra**.

Posologie classique. — 1 comprimé par 10 kilos de poids (dose à atteindre progressivement).

Dose maxima : 10 comprimés par jour.

RALENTISSEMENTS DE LA NUTRITION ARTHRITISME

Hypothermies. Hyposphyxies. États dépressifs.

A faible dose : 2 à 4 comprimés par jour.

(Dose non amaigrissante).

TOLÉRANCE REMARQUABLE

Dinitra respecte le cœur, le foie et les reins.

Prudence chez les albuminuriques et diabétiques.

Comprimés dosés à 0 gr. 036. (B^{tes} de 60 et 300 comp.)

Ampoules injectables de 5 cc. (1/2 cc. = 1 comprimé).

Remboursable par les Assurances Sociales à 80 %.

Société d'Applications Pharmacodynamiques
39, B^d de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).
(Invalides 43-60.)

DIOCAMPHINE BORNE

Association synergique *Dionine Borne* (codéthyline)
Camphre.

**Sédatif analgésique tonocardiaque
à prédominance sympathique**

Dyspnée, Toux rebelles, Angor, Eréthisme cardiaque, Spasmes, Vomissements incoercibles, Algies, Distonies douloureuses, vago-sympathiques, Insomnies, Anxiété, Agitation.

Formes :

Diocamphine Gouttes (X gouttes = 1 centigr. *Dionine Borne*) ;

Diocamphine Comprimés (1 comprimé = 1 centigr. *Dionine Borne*) ;

Diocamphine Suppositoires (1 suppositoire = 3 centigr. *Dionine Borne*) ;

Diocamphine Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 2 centigr. *Dionine Borne*, 20 centigr. Camphre soluble) ;

Diocamphine chirurgicale, Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 4 centigr. *Dionine Borne*, 20 centigr. Camphre soluble ; 2/10 mmgr. Scopolamine HBr.)

Doses :

Faibles : X gouttes, 1 comprimé, 1/2 ampoule.

Moyennes : XX gouttes, 2 comprimés, 1 ampoule
1 suppositoire.

Fortes : XL Gouttes, 4 comprimés, 2 ampoules ou
mieux, 1 ampoule chirurgicale concentr. double.

Une, deux ou trois fois par jour si besoin.

Médicaments enregistrés au Laboratoire national de
Contrôle remboursés par les Assurances sociales.

Laboratoires BORNE

Fournisseurs de l'Assistance Publique et du Ministère
des Colonies

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 02-78.)

Échantillons à volonté pour votre trousse d'urgence.

DIONINE BORNE

Composition et présentation. — Dragées que l'on peut sucer, croquer ou avaler (légère amertume), dosées chacune à 1/2 ctgr. de **Dionine** (Méthyl Codéine, ou codéthylène), chimiquement pure, ne contenant plus aucune trace de morphine libre.

Sans accoutumance. Tableau A, toxicité très faible.

Remède spécifique symptomatique de toutes les Toux.

Analgésique, Antispasmodique, Hypnotique très doux.

Posologie. — *Adultes: Selon le Codex.*

Doses maxima pour 24 heures : 20 ctgr. (40 dragées).

Doses maxima pour une prise : 5 ctgr. (10 dragées).

Faire prendre les dragées 2 par 2, trois à six fois par jour selon l'effet désiré. Pour les enfants de 5 à 12 ans diminuer les doses de moitié.

Prix : 16 francs la boîte de 40 dragées.

Voir à **Thiosédal** : Association **Thiocol Dionine**, sirop et comprimés.

Voir à **Diocamphine** : Association **Dionine camphre**.

Laboratoires de la DIONINE BORNE

Fournisseurs de l'Assistance Publique et du Ministère des Colonies

SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Pl. 02-78.)

DIONOL (SIROP)

Composition. — Méthylcodéine (1 cgr. par 5 cc. de Sirop Dionol). Hydrolat de laurier-cerise, Benzoate de soude, Sève de Pin d'Arcachon.

Propriétés. — Spécifique de la toux. Sédatif, Hypnotique.

Indications. — Grippe, Bronchite, Congestion pulmonaire, Pneumonie, Asthme, Emphyseme, Coqueluche, Phtisie, Tuberculose laryngée, Insomnie.

Posologie. — *Ne se prend que par cuillerées à café.*

1 cuillerée à café = 1 centigramme de méthylcodéine.

Adultes :

Toux : 4 à 8 cuillerées à café à répartir dans la journée.

Insomnies : 2 à 3 cuillerées à café au coucher.

Enfants :

Toux : 2 à 4 cuillerées à café à répartir dans la journée.

Insomnie : 1 à 2 cuillerées à café au coucher.

Présentation et prix : Sirop, 1 flacon de 125 cc. : 16 fr. 80 pour un traitement de 5 à 8 jours.

Laboratoires FLEURY. — ARCACHON. Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences.

Docteur en Pharmacie,

Lauréat du Ministère de la Santé publique.

DIORINE

(Granulés.)

Présentation. — En boîte métal.

Principes actifs. — Pipérazine, Benzoate de soude, Carbonate de lithium, Urotropine, Bicarbonate de soude, Acide tartrique.

Indications. — Dissolvant de l'acide urique, antiseptique urinaire et biliaire, arthritisme, obésité, rhumatismes goutteux.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine.

Mode de présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0 gr. 25.

Mode d'action. — La « Dioséine Prunier » diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

Prix en France : 13 fr. 85 le flacon de 75 comprimés

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

DISMINE FAVROT

Capsules glutinisées — Granulé.

Composition. — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma crenata*) } $\bar{a}\bar{a}$ 0 gr, 05
et Salicylate de Phényle.

Propriétés et indications thérapeutiques. — *Antiseptique urinaire, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

MODE D'EMPLOI

Forme capsule. — Prescrite à la dose de 6 à 9 capsules par jour prises dans une gorgée d'eau à raison de 3 au lever, 3 au déjeuner et 3 au coucher.

Forme granulé. — De préférence avant les repas, prendre 3 à 4 cuillerées à café par jour, et absorber ensuite un peu d'eau.
La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

DISONYL

Composition. — Extrait pancréatique désinsuliné.
Phényl-éthyl-malonylurée. Trinitrine.

Propriétés. — Médication sédatrice et régulatrice du système neuro-végétatif.

Indications. — Troubles fonctionnels cardio-vasculaires : Tachycardies, Extrasystoles, Algies cardiothoraciques, Palpitations, Dystonies neurovégétatives, Anxiétés, Insomnies nerveuses, Vertiges, Aérophagies, Céphalées.

Forme. — Boîte de 60 dragées pour un traitement de 10 à 20 jours.

Posologie. — 2 à 6 dragées par jour à prendre 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 18 fr. 75.

Remboursement aux Assurés Sociaux :
Catégorie B.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littre 68-22, 23 et 24.)

DITHIORAL

Dithiosalicylate de magnésium R. A. L.

Propriétés. — Antirhumatismal, analgésique, antitoxinique.

En un seul composé chimiquement défini, réalise simultanément les médications *salicylée* et *soufrée*.

Le Dithioral est très bien supporté par l'estomac.
Pas d'intolérance, pas d'action secondaire.

Indications.

Rhumatismes aigus, chroniques, déformants.

Algies : Sciatiques, Lumbagos.

Néuralgies : dentaires, faciales.

Migraines.

Mode d'emploi.

Dose usuelle : 1 à 2 comprimés par jour.

Dose d'attaque : 2 à 6 comprimés espacés dans la journée, accompagnés d'un peu de liquide.

Présentation.

Boîte de 20 comprimés à 0 gr. 50

Produits R. A. L. Spécialisés
Établissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Elysées 99-51 à 57.)

DIURÈNE

(Extrait total d'*Adonis vernalis*.)

Formes. — Liquide ("Ordinaire" et "Concentré").
Pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. — Agit rapidement sans accumulation. — Non toxique. — Prolonge l'action digitalique. — Provoque une diurèse abondante.

Contient tous les principes actifs de l'*Adonis*.

Indications. — Myocardites. — Néphrites chroniques non hypertensives. — Cardiopathies avec lésions orificielles. — Dyspnée. — Œdèmes.

Posologie :

Diurène ordinaire : 2 à 6 cuill. à café	} par jour.
Diurène concentré : 1/2 à 2 cuill. à café	
Diurène pilules : 4 à 12 pilules	

Prix de vente au public :

Liquide : 18 fr. 50 ; pilules : 15 francs.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 43-79.)

DIURÉPHÉDRINE

Élixir.

Chl. Ephédrine naturelle.....	2 cgr.
Iodure de Sodium et Caféine.....	30 cgr.
Teinture Adonis Vernalis.....	X gouttes.

Par cuillerée à café.

Action. — Antispasmodique, Bronchodilatateur, Bronchosécréteur, Toni-cardiaque, Diurétique.

Indications. — Traitement de fond, Asthme bronchique, Emphysème, Asthme intriqué, Oppression, Bronchites chroniques, Catarrhe, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Suites de grippe, Insuffisance cardiaque, Urémie, Gazés, Toux.

Posologie. — Trois cuillerées à café par jour, matinée, après-midi, soir (à diluer dans un peu de liquide).

Voir également : **Garéphédrine**, **Éphédrasmine** et **Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 20 francs le flacon de 25 cuillerées à café environ.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

DIURÉTIQUE GMET

Composition. — Extrait *total*, liquide et sans alcool de la pulpe d'oignon cru.

Propriétés. — Diurétique puissant et jamais contre-indiqué. Aucune toxicité.

Indications. — Oliguries diverses : Pneumoniques, cardio-rénaux, brightiques, gripés, etc. Ascites et tous épanchements séreux. Rhumatismes.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu de liquide. Ces doses, en général suffisantes, peuvent être augmentées dans les grandes oliguries.

Le flacon de 210 gr.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

DIUROBROMINE

Composition :

Théobromine pure isotonisée et recristallisée.

Forme :

Cachets de 0 gr. 50.

Indications :

Toutes affections où l'on doit assurer la diurèse.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 14 fr. 35.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON
(Tél. : Parmentier 31-29.)

DIUROCALCINE GRÔS

Association Calcium-Théobromine.

Indications. — Diurétique cardio-rénal.

Propriétés. — Pouvoir diurétique exalté.

Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité et tolérance parfaites.

Posologie. — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 12 fr. 50 les 24 comprimés à 0 gr. 50.

Durée moyenne : 8 jours.

DIUROCALCINE IODURÉE

Indications. — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

Dose. — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de Potassium, 0 gr. 10 associé à 0 gr. 50 de DIUROCALCINE.

Prix : 15 fr. 60 (durée moyenne : 8 jours).

Laboratoire GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 60-55.)

DIUROCARDINE

Composition. — Digitale titrée et stabilisée totale, Scille décathartiquée, Théobromine isotonisée, Buchu.

Propriétés. — Diurétique puissant et sûr. Affections cardiaques et rénales.

Forme. — *Cachets* : chaque cachet correspond à 1/20 de milligr. de *Digitaline cristallisée*.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Cardiopathies, Tachycardie, Arythmie, Myocardite, Œdèmes, Albuminurie, Ascite, Urémie.

Doses. — Cas aigus : 2 à 5 cachets par 24 heures.

Dose cardiotonique. — 2 cachets par jour pendant 10 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Dose cardiotonique d'entretien. — 1 cachet tous les 2 jours, pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 18 fr. 45.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

DIUROCYSTINE

Composition. — Benzo-camphorate de Lithine, Terpene, Castoreum.

Forme. — Cachets.

Indications. — Antisepsie des voies urinaires, Cystites aiguës ou chroniques, Urétrites, Catarrhe vésical, draine vessie et canal en fin de blennorragie. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 cachets par jour selon les cas.

Boîte : 30 cachets. — Prix : 18 fr. 45.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT
9, avenue Jean-Jaurès — LYON
(Tél. : Parmentier 31-29.)

DIUROPHYLLINE

Diurétique rénal et Cardio-rénal.

Mieux toléré et plus actif que la *théobromine*.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition :

Aminophylline (Vaso-dilatateur des artères du rein et toni-cardiaque)..... 0,10

Extrait stabilisé de Scille (Diurétique azoturique). 0,02

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique puissant et complet.

Diurétique aqueux.

Diurétique déchlorurant par action sur les vaisseaux du rein et par action toni-cardiaque.

Diurétique azoturique.

Indications. — Insuffisance rénale.

Néphrite chlorurémique et hydropigène; avec rétention du sel, cedème, ascite.

Néphrite azotémique avec élévation du taux de l'urée sanguine.

Oligurie des maladies infectieuses, des intoxications, des cardiopathies.

Posologie. — 3 à 4 comprimés par jour, avant de manger ou entre le repas.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 52-73.)

DIUROPHYTE

Extrait total d'Orthosiphon stamineus.

Extrait total d'Humulus lupulus (Houblon).

Préparés par un procédé spécial, présentés sous forme de solution concentrée sucrée et aromatisée à l'orange.

Propriétés. — Diurétique végétal atoxique, ne contenant ni alcool, ni produit chimique.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, diluées dans de l'eau, ou même plus suivant avis du médecin. A prendre au moment des repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Ségur 79-58.)

DMELCOS

Stock-vaccin antichancrelleux.

Émulsion de bacilles de Ducrey (225 millions par cm³), injectable exclusivement par la voie veineuse.

Indications. — Traitement du Chancre mou et de ses complications : Bubon, Phagédénisme, Paralyse générale (pyrétothérapie).

Présentations et mode d'emploi. — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intraveineuse tous les trois ou quatre jours.

■ Prix de vente

La boîte de 6 ampoules : 35 francs.

CUTI-DMELCOS. — Diagnostic du chancre mou par intradermoréaction. Ampoules de 1/4 de cm³, titrées à 450 millions de germes par cm³. (boîtes de 5 ampoules).

Prix de vente :

La boîte : 10 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

DOGASTRO

Présentation. — Granulés en boîtes métal.

Principes actifs. — Pepsine amylacée, pancréatine, belladone pulvérisée, S. N. de bismuth, kaolin, carbonate de chaux, bicarbonate de soude, malt, essence d'anis.

Indications. — Hypersécrétion, Hyperacidité, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Gastrites aiguës ou chroniques, Gastralgies. Pyrosis, Brûlures et aigreurs de l'estomac,

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, à la fin de chaque repas ou au moment des douleurs.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

Composition. — Carbone-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

Formes. — Poudre, granulé et comprimés.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive. — Voir fiche *Ænophos*.

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Lactophosphite. Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

Propriétés. — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récurrence post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix.

La boîte de poudre <i>Doloma</i>	17 fr. 15
— granulé <i>Doloma</i>	18 fr. 70
— 10 ampoules <i>Doloma</i>	18 fr. 70
— 100 comprimés <i>Doloma</i> ..	19 fr. 20

Communications : à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer, juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à :

Laboratoire général d'Études Biologiques
S. A., 29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42)

DOLOTENSINE

Médication spécifique et régulatrice du tonus artériel cérébral et céphalique.

Hypotenseur, Sédatif, Antigrippal.

Forme. — *Gouttes*. Durée du flacon : 20 jours.

Composition. — Complexe végétal associé à une dose « dynamisée » de trinitrine, Veratrum viridé, Aconitum napellus, Gelsemium, Cimicifuga, Glonoinum.

Indications. — 1° Hypertension artérielle et tous désordres dynamiques de la circulation cérébrale. (Vertiges, Bourdonnements, Mouches volantes, Confusion, Amnésie, etc.)

2° Migraines, Névralgies multiples, Algies de la nuque.

3° Etats fébriles : Grippe, Rougeole.

Posologie. — Dose unique pour les adultes : XV gouttes dans un 1/2 verre d'eau à prendre en plusieurs fois durant chaque repas

Prix : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle.

Laboratoires A. CLANCHE

VARs (Charente).

DOLPYC

Thérapeutique, thermogène et révulsive.

Composition. — Alcaloïdes totaux de piments desolanées, Chloroforme. Essences de serpolet, lavande, thym, géranium.

Avantages. — Puissant révulsif et sédatif, d'odeur agréable, dont on peut aisément doser l'action. Ne détermine aucune irritation de la peau.

Indications et mode d'emploi. — Dans tous les cas où une révulsion est indiquée : Rhumatismes articulaire, aigu et chroniques, Sciatiques, Lumbagos, Points de côté, Pleurites, Entorses, Sequelles de fracture, Contusions.

Appliquer sur la région douloureuse une très légère couche de Dolpyc recouverte d'un carré de flanelle ou de coton cardé. Action renforcée par la chaleur humide (compresses chaudes).

Présentation et prix. — 11 fr. 50 le tube pour 20 applications environ.

Recommandation importante : Eviter le contact du Dolpyc avec les muqueuses et les parties sexuelles.

Laboratoires René KROTOFF

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII°).

(Tél. : Marcadet 6196.)

DOLYSINE

Goutte. — Rhumatismes. — Névralgies.

1° *Cachets.* — Acide phénylcinchoninique, 0 gr. 50.
Puissant dissolvant de l'acide urique.

Doses. — De 1 à 4 grammes par 24 heures, puis doses décroissantes. Pas d'accoutumance. A prendre aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline (eau de Vichy).

La boîte de 12 : 9 fr. 50.

2° *Topique.* — Chloral, Chloroforme, Menthol, Ether amylosalicylique en solution étherée aromatisée. Badigeonnages suivis d'enveloppements.

Le flacon : 9 fr. 50.

3° *Pommade.* — Même formule que ci-dessus avec excipient gras pour onctions douces et applications.

Le tube : 9 fr. 50.

Enreg. au Laboratoire N°1 de contrôle N° 1612-1-2-3.

M. ROCHEREAU, Pharmacien
ex-interne des Hôpitaux de Paris
SALBRIS (Loir-et-Cher).

DONAGOL

Chlorure de zinc électrolytique.

Spécifique gynécologique pour injections.

Indications. — *Affections gynécologiques* (Leucorrhée métrite du col, avec ou sans ulcération, Vaginite, Vulvite, Ulcérations néoplasiques du col, Infections gonococciques, Sécrétions fétides, Ecoulements mucopurulents).

Soins pré ou post-partum. — *Hygiène intime journalière.*

Forme. — Comprimés dosés à 0,50 de ZnCl^2 pur.

Mode d'emploi. — 1 comprimé par litre d'injection (à prendre très chaude et en position couchée).

N. B. — Demandez-nous des échantillons de DONAGOL liquide (solution de ZnCl^2 à 45 p. 100) pour attouchements vaginaux, spécifique du traitement des Erosions et Ulcérations du Col. Bien sécher la lésion attouchée et ne pas laisser de tampon à demeure.

Prix très modique : 16 francs. la boîte de 48 comprimés.

Laboratoires du DONAGOL

PÉRONNE (Somme). — (Tél. : 32.)

DO.SA.NO.SAL

DOuce amère, **SA**ponaire, **NO**yer, **SAL**separeille.

Formule du Dr MARTIN DU THEIL

Forme. — *Granulé soluble.*

Composition. — Ce granulé contient par cuillerée à café : Extraits de douce-amère, 0 gr. 09696; de saponaire, 0 gr. 04848; de noyer, 0 gr. 07272; de salsepareille, 0 gr. 19292.

Dosage constant, titrage toujours identique.

Propriétés. — Diaphorétique, diurétique.

Indications. — Tous états congestifs et troubles circulatoires : Hypertension, Ménopause, Varices, suites de Phlébite.

Doses habituelles. — 1 cuillerée à café 2 fois par jour en se levant et en se couchant dans eau ou tisane.

Cures de 2 mois environ à prolonger suivant le cas.

Prix : 21 fr. 15 pour 10 jours.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

[DOSOTOL

Présentation. — Capsules-doses en gélatine.

Composition. — Paramino-benzoate de butyle, résorcine, excipient aromatisé.

Indications. — Affections congestives de l'oreille : *Otites, Otalgies.*

Sédatif, Antiseptique, Non irritant, Non toxique.

Mode d'emploi. — *Enfants et adultes :*
Couper l'extrémité de la capsule et, la tête étant inclinée, injecter par pression le contenu dans le conduit de l'oreille malade.

Laboratoire J. LAROZE

CHARENTON (Seine).

(Tél. : Ent. 01-1.)

DOSURINE (TROUSSES)

Les Examens d'Urine et le dosage des éléments anormaux (**Sucre Albumine, Acétone**) sont grandement facilités par l'emploi des **Trousses Dosurine**

qui, en assurant à ces examens la plus grande précision scientifique, permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousses se présentent sous 4 modèles :

- 1^o **Trousse Index** « La Dosurine », qui permet de déceler la présence de l'*Albumine* ou du *Sucre*.
- 2^o **Trousse A** « La Dosurine », destinée à doser l'*Albumine* contenue dans l'urine.
- 3^o **Trousse D** « La Dosurine », destinée à doser la quantité de *Sucre* (Glucose).

Prix de chaque Trousse : 33 fr. (franco par poste : 34 fr. 75).

Ampoules de renouvellement

La boîte de 10..... 14 fr. 75 (par poste : 16 fr. 20)

La boîte de 20..... 28 fr. 50 (par poste : 30 fr. 10)

- 4^o **Trousse AC** « La Dosurine », qui permet de déceler et doser l'Acétone.

Prix de la Trousse AC : 95 fr. (franco : 99 fr.).

Ampoules de renouvellement :

La boîte de 12 Ampoules pour 6 Recherches... 15 fr. (Par poste : 16 fr. 45)

La boîte de 8 Ampoules pour 4 Dosages... 24 fr. (Par poste : 25 fr. 60)

Remise de 25 % à MM. les Docteurs.

(Envoi franco notices sur demande.)

LA DOSURINE 16, rue Charlemagne — PARIS (IV^e).
Chèques Postaux N^o 1352.39 Paris. (Tél. : Archives 71-92.)

DRAG-BIL

Le laxatif physiologique.

Composition :

Extrait sec stabilisé de feuilles d'artichaut.....	0 gr. 050
Extrait de romarin.....	0 gr. 025
Oléate de soude.....	0 gr. 025
Phénolphtaléine.....	0 gr. 065
Agar-agar.....	0 gr. 045

Propriétés thérapeutiques. — « DRAGUE » les canaux biliaires et permet à la bile de s'écouler normalement. Combat la constipation. Désinfecte l'intestin. Agit mécaniquement sur le péristaltisme intestinal.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Posologie. — 1 ou 2 comprimés à avaler, après le repas du soir de préférence. Ne pas croquer, ne pas sucer.

Prix : 11 fr. 80.

Laboratoire GERAUDEL
3, rue Watteau — COURBEVOIE

DRAGÉCALCION

Dragées de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosées à 0 gr. 25 par dragée.
4 dragées = 1 gr. de Chlorure de Calcium.

Avantages. — 1° Efficacité accrue par absorption *progressive*. 2° Agréables à prendre, elles évitent le goût écœurant des solutions et des gouttes. 3° Tolérance parfaite de l'estomac.

Indications. — Toutes les indications du Chlorure de Calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme *re-calcifiant, antispasmodique, antianaphylactique*, contre les engelures, on préfère les *doses faibles* : 1 dragée au début de chaque repas avec une gorgée d'eau et une entre chaque repas (6 par jour), pendant 20 jours par mois, à continuer longtemps.

Comme *hémostatique, antialbuminurique, déchlorurant, antisérique*, on préfère les *doses fortes* : 20 dragées par jour pendant 5 jours avec repos de 10 jours.

Non toxique, son emploi peut être continué avec avantage pendant des mois.

Prix : 17 fr. 25 la boîte.

DRAGÉCALCION GRANULÉ

Granulé de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosé à 0,25 par cuillerée à café : 2 cuill. à entremets = 1 gr. de chlorure de calcium.

Indications. — Pour les petits *enfants* et pour tous ceux qui ne peuvent avaler les dragées : toutes les indications du Chlorure de calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme ci-dessus : une cuill. à café = 1 dragée.

Prix : 17 fr. 25 la boîte.

Pharmacie DUC

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 11-96.)

DRAGÉES BENQUÉ

Composition. — Menthol, Borate de soude, Cocaïne ou Menthol, Borate de soude (sans cocaïne).

Propriétés et indications. — Antiseptiques et anesthésiques sans sécheresse. Affections de la gorge, Pharyngites, Laryngites, Angines. Bien-faisantes dans les affections de l'estomac et contre les vomissements de la grossesse.

Forme. — Dragées.

Posologie. — 6 à 8 dragées par jour (laisser fondre dans la bouche).

Prix : 5 fr. 20 la boîte.

Laboratoires du Docteur BENQUÉ et Fils,
Pharmaciens
 16, rue Ballu — PARIS (IX^e).
 (Tél. : Trin. 85-60.)

DRAGÉES BONDONNEAU

Traitement de l'obésité et de l'arthritisme.

Composition :

Sels de la Source Bondonneau.....	0 gr. 10
Extrait mou aqueux de fucus vésiculosus.	0 gr. 05
Poudre de Cascara-Sagrada	0 gr. 05
Iodure de potassium.....	0 gr. 05

Pour une dragée.

Propriétés thérapeutiques. — Favorise l'oxydation des graisses en activant la production du ferment lipolytique. Aucun retentissement sur l'état général.

Indications. — Obésité. Toutes les manifestations de l'arthritisme.

Dosés. — 3 à 6 dragées par jour, au milieu des repas.

Prix : 14 francs les 60 dragées.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 537-1.

G. BRIENS, Docteur en Pharmacie
 20 et 22, rue de la République — LYON (Rhône).

DRAGÉES DU D^r GELINEAU

Flacons de 100 et de 50 *dragées*.

Composition. — Bromure de potassium associé à l'arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques. — Épilepsie, Affections nerveuses.

Posologie. — Par dragée :

Kbr	1 gr.
Arsenic	1 milligr.
Picrotoxine	1/2 milligr.

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.
(Doses supplémentaires en cas de besoin.)

Littérature et échantillons sur demande.

Prix au public : Le flacon de 100 dragées : 22 fr. 90.

Laboratoire J. MOUSNIER-DELERME

Nouvelle adresse :

28, rue Velpeau — ANTONY (Seine).

(Tél. : 225.)

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer).

Propriétés. — Associent les qualités anti-spasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de « Sirop ».)

Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

DRAGÉES HÉPATO-RÉNALES GROS

Composition. — Extrait mou de feuilles d'artichaut, Extrait mou d'orthosiphon Hexaméthylènetétramine, Salicylate de phényle, Salicylate de pipérazine.

Propriétés. — Diurétique, antiurique, sédative, antiseptique.

Indications. — Rhumatisme, arthritisme, uricémie, goutte, cystite, colibacillurie, maladies infectieuses.

Forme. — Dragées.

Doses. — 4 à 10 dragées par 24 heures, à prendre au milieu des repas.

Prix : 18 francs.

Durée moyenne de l'unité : 10 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille—CLERMONT-FERRAND.
(Tél. 60-55.)

DRAGÉES LEBRUN TONI-CARDIAQUES

Composition.

Strophantus total.....	0,01	pour une dragée.
Sulfate de Spartéine..	0,01	— —
Caféine pure.....	0,05	— —
Ext. de Scille.....	0,04	— —
Benzoate de lithine...	0,15	— —

Propriétés thérapeutiques. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque, Asystolie, Maladies mitrales, Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck, PARIS (XVI^e).

DRAGÉES LUMEVAL

(Drageval)

Sédatives, antispasmodiques.

Composition. — Pilules glutinisées renfermant :

Extrait stab. de Valériane.....	} ãã
— — Passiflore.....	
— — Cratægus.....	
Butylethylmalonylurée.....	0 gr. 03

Indications. — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

Posologie. — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 27-2.

Prix : 17 fr. 60 l'étui de 42 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS.

(Tél. : Roq. 49-22.)

Descouraux et Fils, Pharmaciens

Docteur en Pharmacie.

DRAGÉES MANNET FERRO-ERGOTÉES

Composition :

Ergot de Seigle	5 cgr.
Fer	10 —

Par dragée.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire MANNET

LOUDUN (Vienne).

(Tél. : 134 Loudun.)

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, *du surmenage intellectuel, des dépressions physique, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). —

Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Formule B. Spéciale pour diabétiques.

Prix : 15 francs.

Laboratoire « YSE »

H. Chatelut, pharmacien

65, rue Louis-Blanc — PARIS (X^e).

DRAGÉES VICHY-AMAIGRISSANT

du Dr Blancher.

Action double. — Régulateur glandulaire et intestinal.

Formule :

Hypophyse ant.	0,001	Podophyllin	0,005
Thymus	0,01	Cascara désamérisé.	0,02
Ovarine	0,01	Ext. Jusquiame .	0,005
Fucus vesiculosus	0,02	Poudre Digitale...	0,01

pour 1 dragée gluténisée à 0,30.

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour aux repas.

Indications. — Obésité par insuffisance glandulaire associée à une constipation plus ou moins aiguë. (Cas fréquent chez la femme.)

Prix :

Flacon (40 dragées) : 20 francs.

Cure de 3 flacons (coffret) : 50 francs.

(Durée moyenne d'un traitement : six semaines.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1008-4.

Laboratoires BLANCHER-VICHY

DRAGUROL

Diurogène Hépaté et Cardio-rénal
Azotémique - Cholérétique.

Composition. — Par cuillerée à café :

<i>Ext. fl. Orthosiphon</i>	0.65	Extrait mou Artichaut...	0.16
Extrait fl. Adonis Vernalis..	0.25	Extrait mou s.am. Cascara	0.01
Formine Lambiotte	0.20	Excipient aromatisé.....	Q. S.

Action thérapeutique. — Provoque une Diurèse abondante, prompte. Draine et excrète tous *déchets organiques* (urée, acide urique, sables, calculs, chlorures, cholestérine, etc.) et *toxines* (états infectieux). Ménage l'épithélium vésico-rénal. Stimule la fonction an itoxique et d'activation du foie. Augmente la sécrétion biliaire. Normalise l'activité hépaté-entéro-rénale. Abaisse le taux d'urée sanguine.

Indications. *Tous troubles du Métabolisme de l'eau d'origine rénale, hépaté-rénale, cardio-rénale* (lithiasiques, congestifs ou infectieux) consécutifs à une crise aiguë ou nécessitant une cure de fond. *Azotémie, Cardiopathies, Obésité, Affections néphro-pyéliques. Oliguries. Albuminurie. Diathèse neuro-arthritique, Arthritisme. Dermatoses rebelles. Ictères.*

Toutes Lithiasés. Rétentions ou Insuffisances excrétrices.

Avantages. — Forme : *Liquide* (action rapide et sûre). Saveur agréable. Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Ni effets secondaires, ni contre-indications, n'irrite jamais.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, sucrée ou non. — *Enfants* : 1/2 dose.

Prix : 18 francs le grand flacon.

Laboratoires du SIÈCLE.

13, rue Boinod, PARIS (XVIII^e).

DRAINOBILINE

Forme. — Granulés.

Composition. — Peptone, Citrate de Magnésie, Bicarbonate de soude, Boldo, Camomille.

Indications. — Affections du foie et des voies biliaires. Troubles digestifs d'origine hépatique.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun.

Prix : 19 francs.

Ce granulé d'un goût exquis draine les voies biliaires en douceur.

Laboratoires **ELSSE**

Ph. CHAVANNE, Docteur en Pharmacie
FONTAINE-GRENOBLE (Isère).

DRAINOBYL

du Docteur L. Lafay

Agent de drainage des voies biliaires. Synergie hépatophile de formule toute nouvelle. Pas de contre-indication.

Forme. — Granulé effervescent, soluble, de goût agréable (limonade).

Composition :

Catalyseur nickel	0,01
Catalyseur cobalt.....	0,01
Teintures de boldo, romarin, pissenlit, combretum.....	5
Hexybrésorcine.....	0,03
Chlorétone	0,05
Salicylate de soude	6
Benzoate de soude	6
Bicarbonate de soude	10
Excipient. Q. S.....	100

Indications. — *Cholagogue, Antispasmodique, Sédatif, Spécifique de la crise aiguë et des affections douloureuses de la vésicule biliaire, Traitement de toutes les carences hépatiques.*

Coliques hépatiques, Crises douloureuses du foie et des reins, Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiase, Ictère, Cholécystites, Insuffisances hépatiques ; foie des coloniaux, des paludéens, des amibiens, Insuffisance hépatorenale, tous les troubles d'origine hépatique.

Posologie. — *N. B.* Le granulé *Drainobyl* ne doit se prendre que dissous dans un peu d'eau.

Chroniques : 1 ou 2 cuillerées à café le matin à jeun, 10 jours par mois.

Affections douloureuses des voies biliaires, Ictère : plusieurs cuillerées à café par doses fractionnées.

Crise aiguë : 1 ou 2 cuillerées à café tous les quarts d'heure, jusqu'à sédation des douleurs.

Enfants : à jeun, suivant l'âge, 1 quart à 1 cuillerée à café dans 1 quart de verre d'eau.

Durée d'une boîte : environ 10 jours de traitement.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur L. LAFAY

LECOQ et FERRAND, Pharmaciens,

54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence

PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 21-06.)

DRAINOLCHOL

Agent de drainage des voies biliaires.

Stimulant des fonctions hépatiques.

Sédatif des spasmes biliaires.

Désensibilisation.

Forme. — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur très agréable.

Composition :

Peptones de viande.....	2 gr. 500
— de poisson.....	0 gr. 500
— d'œuf.....	0 gr. 166
Extrait total de jaborandi.....	0 gr. 333
Extrait sec d'artichaut.....	0 gr. 830
Chlorure de magnésium.....	0 gr. 333
Sulfate de magnésie P. C.....	16 gr.
Lactosérum.....	30 gr.
Pour 100 gr. de saccharure.	

Indications :

- 1° *Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires :* Insuffisance hépatique, Cholémie, Congestion du foie, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystite chronique, Angiocholites.
- 2° *Troubles dyspeptiques d'origine hépatique :* Somnolences post-prandiales, Dyspepsies secondaires, Vertiges et nausées, Inappétence, Constipation.
- 3° *États anaphylactiques d'origine alimentaire :* Prurit et urticaire, Œdème de Quincke, Migraine, Rhume des foins, Asthme, Dermatoses.

Particularités. — Le plus actif et le plus doux des médicaments de drainage biliaire, parce que sans action drastique sur l'intestin. Par son *Jaborandi*, évite toute réaction violente. Par son *Lactosérum*, agit à la fois sur l'évacuation biliaire et sur la diurèse.

Posologie :

Adultes : Le matin, à jeun, une demi-heure avant toute alimentation, deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède. Cette dose peut être portée, suivant indication médicale, jusqu'à 4 et 6 cuillerées à café.

Enfants : demi-dose ou quart de dose selon l'âge.

Prix : 20 fr. 80.

Traitement de 20 jours, soit 2 cures.

Laboratoires CADUCIA

Y. JUND, Pharmacien.

95, rue de Vaugirard — PARIS (VI°)

(Tél. : Littré 90-60.)

DRINAL

Cachets. Comprimés.

Composition :

<i>Pour</i> <i>1 cachet :</i>	{	Aspirine	0,30
		Pyramidon.....	0,10
		Phénacétine.....	0,10
		Caféine	0,05
		Poudre de Dower.....	0,03
		Poudre d'aconit.....	0,005
		Carb. de chaux	0,10
<i>Pour</i> <i>1 comprimé :</i>	{	Aspirine.....	0,30
		Acétanilide	0,10
		Caféine	0,05
		Phényléthylmalonylurée...	0,01

Indications et doses. — *Cachets* (en boîte de 10) :

Grippe, fièvre, rhumatismes, etc., 2 à 4 par jour,
Comprimés (en tube de 15) : Névralgies, migraines :
douleurs, maux de dents, etc., 2 à 4 par jour.

Prix. — 9 francs.

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 1082-1.

A. MIRONNEAU, pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres). (Tél. : 18.)

DROSOL

Gouttes.

Composition. — Drosera, Grindelia, Lobélie, Terpène, aromatisées à l'orange.

Indications. — Coqueluche, toux rebelle, asthme, bronchites, gripes, laryngites, trachéites, toux spasmodique.

Mode d'emploi. — Prendre *loin des repas* (1 heure avant ou 2 heures après).

Posologie :

Nourrissons : II à X gouttes, trois fois par jour.

Enfants : XV à L gouttes, — — — — —

Adultes : LX gouttes et plus, — — — — —

Coqueluche : mêmes doses, mais augmenter d'une goutte par prise, tous les jours, le deuxième jour de traitement.

Ne pas dépasser 100 gouttes pour les enfants le premier jour de traitement.

Prix : 15 francs.

Laboratoires JEAN BOUTES

rue Clément-Ader — MURET (Haute-Garonne).

DRYCO

Lait sec. — Activé par les rayons ultra-violet.

Analyse approximative :

Matières grasses	12 p. 100.
Sucre de lait	46 —
Matières azotées.....	32 —
Sels	7 —
Eau	3 —

Indications. — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

Pour nourrissons : digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

Pour adultes : régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

Doses. — Dilution normale : une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée (6 à 7 gr.) et 50 gr. d'eau bouillie chaude.

A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

Préparer sans cuisson.

Prix : 5 fr. 50, 15 fr. 50 et 62 francs.

Société Française du Lait Sec DRYCO

5, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 59-09.)

DUNA-CAÏNOL

Pommade sédative.

Principe Actif. — *Duna-Caïne* L. P.

Excipient. — Constitué par une graisse animale à pénétration rapide et intégrale, dépourvue de toute action irritante.

Indications. — Pommade sédative des douleurs de la peau et des muqueuses : prurit anal et vaginal, prurit sénile, prurit diabétique, hémorroïdes, brûlures, urticaire, zona, radiodermite, plaies cancéreuses, algies, démangeaisons.

Contre-indication. — Eczémas évolutifs et toutes affections dermatologiques non justiciables d'un traitement par les anesthésiques.

Mode d'emploi. — *S'il y a plaie*, appliquer une compresse enduite de *Duna-Caïnol*.

S'il n'y a pas plaie, onction plus ou moins prolongée avec le *Duna-Caïnol* et laisser en place une compresse enduite de pommade.

Prix : 13 fr. 50.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17 rue de Berri — PARIS (VIII^e).

DUNA-PHORINE

Sels organiques de Morphine.

AMPOULES

3 Formules, 3 Modes d'Action.

La *Duna-Phorine*, préparée avec des acides organiques expérimentalement choisis, permet :

- 1° De régler la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux selon le but poursuivi ;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alcaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses ;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables.

Indications :

Duna-Phorine rapide (phényl-propionate de morphine) : action presque immédiate. Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, analgésies pré-opératoires, crises d'asthme.

Duna-Phorine lente (gluconate de morphine) : action moins immédiate, mais très prolongée. Zonas, hémoptysies, douleurs néoplasiques et tabétiques, grandes algies.

Duna-Phorine mixte (phényl-propionate et gluconate de morphine) : action à la fois immédiate et prolongée.

SUPPOSITOIRES

Une seule formule.

Mêmes indications que les suppositoires de Morphine, avec tous les avantages de nos sels spéciaux.

Formes :

Ampoules : boîtes de 7 ampoules correspondant à 1 ou à 2 centigr. de chlorhydrate de morphine.

Suppositoires : boîtes de 6 suppositoires dosés à 0 gr. 005 de morphine base hydratée à l'état de sels organiques.

Posologie :

Ampoules : *Duna-Phorine lente* ou *rapide* ou *mixte* à 1 ou 2 p. 100.

Une boîte de 7 ampoules : 1 ampoule par jour.

Deux boîtes 7 ampoules : 2 ampoules par jour, etc...
(Produit du tableau B.)

Suppositoires : 1 à 3 suppositoires par jour (*prescription ordinaire*).

Prix :

La boîte de 7 ampoules à 1 p. 100.....	19 fr. 25
— 7 — à 2 p. 100.....	24 fr. 50
La boîte de 6 suppositoires	18 fr. »

Les Laboratoires BRUNEAU et Cie

17, rue de Berri — PARIS (XIII°).

DYCHOLIUM

Composition. — Ampoules de 5 cc. contenant 1 gr. de déhydrocholate de soude et comprimés de 0 gr. 30 d'acide déhydrocholique.

Propriétés. — *Cholérétique* (non cholagogue), désensibilisant, diurétique.

Indications :

En injections intraveineuses: Ictères par angiocholite, cholédocite, ictères par hépatite prolongés, suites d'interventions portant sur les voies biliaires avec ou sans drainage externe. Toutes maladies par sensibilisation: intolérances médicamenteuses, accidents sériques... oligurie d'origine cardiaque (employé seul ou associé aux diurétiques mercuriels, dont il potentialise les effets).

En comprimés: Pour compléter les cures par voie veineuse. Tous les phénomènes de petite insuffisance hépatique: cholémie, démangeaisons, céphalée, somnolence post-prandiale, selles décolorées. Constipation. Lithiase biliaire à toutes les phases de son évolution. Ictères.

Posologie. — Ampoules: Une injection de 1 à 2 gr. tous les jours ou tous les deux jours pendant 6 à 10 jours. *De 5 à 15 ans: une ampoule de 5 cc.*

Comprimés: 2 à 9 comprimés par jour, à prendre au début des repas du matin, de midi et du soir, pendant 10 jours par mois. De 2 à 15 ans: de 1 à 6 comprimés.

Diminuer les doses en cas de diarrhée.

Médicament rigoureusement atoxique. Prévenir le malade d'un goût amer transitoire apparaissant pendant l'injection intraveineuse.

Boîte de 6 ampoules.

Tube de 20 comprimés.

Société Générale d'applications thérapeutiques

« THÉRAPLIX »

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

DYNAMOGÉNINE du Docteur Chaboud.

Extrait Fluide Américain.

Composition :

Quinquinas, 11 gr. ; Kola 8 gr. 8 ; Noix vomiques, 1 gr. 55 ; Arrhéнал, 0 gr. 12 ; Acide orthophosphorique, 0 gr. 12 ; Cannelle, 0 gr. 33 ; Vanille, 0 gr. 12 ; Cacao, 0 gr. 75 ;
pour 100 cc. de véhicule (alcool à 60° et glycérine).

Propriétés. — Tonique énergique, Puissant fortifiant, Régénérateur puissant du sang et des muscles.

Indications. — Anémie, Chlorose, Surmenage, Neurasthénie, Convalescence de maladies graves (gripes, bronchite, pneumonies, etc.), suites de couches, pré-tuberculose, faiblesse générale, manque d'appétit.

Posologie. — Un quart d'heure avant chacun des deux principaux repas, dans la valeur d'un verre à bordeaux de vin sucré ou d'eau sucrée : *Adultes* : Une cuillerée à café. *Enfants*, au-dessus de 8 ans : 1/2 dose.

Suspendre pendant une dizaine de jours entre chaque flacon.

Durée. — La cure normale est de trois flacons. Le flacon dure dix jours environ. Prix : le flacon 15 francs.

(Peut être prescrit aux assurés sociaux).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1540-1.

Laboratoires de la DYNAMOGÉNINE

RUMILLY (Haute-Savoie) — Tél. : 40.

Bureau de Correspondance : Boîte postale 33.

AIX-LES-BAINS (Savoie).

DYNOSTHÈNE

Comprimés.

« La cure magnésienne rationnellement conduite par adjonction d'un complexe polyminéralisé équilibré et assimilable. »

Indications. — Tous les états de carence magnésienne :

1° Atonie du tube digestif, congestion hépatique, constipation atonique.

2° Syndromes neuro-dépressifs (Psychasthénie, angoisse, surmenage intellectuel, débilité génitale).

3° Convalescence des maladies infectieuses asthéniantes (grippe, fièvre typhoïde, etc.).

4° Prophylaxie du cancer. Puissant modificateur du terrain (prévention des récidives post-opératoires).

Composition. — Complexe phospho-magnésien polyminéralisé.

(Chl. de Magn. Magnésie calcinée, Glycéroph. de Magnésie, Glycéroph. de Ca., Phosphore organique, Nucléinate de fer et Manganèse.)

Forme et Posologie. — 1 boîte de 45 comprimés.

2 à 4 comprimés par jour avant ou pendant les repas, de préférence le matin et à midi.

Traitement. — Ininterrompu pendant quelques semaines (aucun inconvénient à être continué pendant plusieurs mois).

Adjuvant des cures thermales (Vichy, Vittel, etc...)

Aucune contre-indication.

Prix : 19 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Ph^a. 183, rue de Rome — MARSEILLE.

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,
extrait de porc vivant.

Procédé du D^r HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café *avant* chaque tétée ou prise d'aliments.

Adresser toutes demandes :

Laboratoire

de Physiologie du PUIITS-d'ANGLE

Le Puits-d'Angle — LE CHESNAY (S.-et-O.).

Dépôt pour la France :

Laboratoires CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

Représentant pour la Belgique :

M. MICHAUD

23, rue Plantin — BRUXELLES.

DYSPNÉ-INHAL

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foins, Coryza spasmodique, Obstruction nasale, Gaz de guerre.

Composition. — Solution pour pulvérisation buccale d'adrénaline stabilisée et activée à dose infinitésimale.

Avantages. — Supprime toute crise, même violente en quelques secondes. Supprime les piqûres. Innocuité permettant l'application aux jeunes enfants.

Mode d'emploi. — Quelques gouttes dans l'atomiseur spécial de poche. Au moment de la crise faire une pulvérisation dans la bouche en aspirant. La crise cesse instantanément.

Prix : Pulvérisateur : 36 francs.

Liquide (pour 2 mois) : 16 francs.

Prix spécial au médecin pour usage personnel.

A. FOURTON, Docteur en Pharmacie

38, rue du 11-Novembre

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).

(Tél. : 31-21.)

DYSTHÈNE

Médication tonique et régulatrice, complexe phosphorique et magnésien.

Indications. — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale, Inaptitude au travail.

1° Forme gouttes :

Emploi et doses. — *Adultes* : XL gouttes au total par jour, en deux fois, aux repas, dans un peu d'eau.

Vieillards : XXX gouttes au total par jour.

Enfants : de 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour.

— 12 à 16 ans : XII — —

— 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 18 francs.

2° Forme élixir :

Emploi et doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe à chacun des repas de midi et du soir.

Vieillards : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : de 16 à 18 ans : 1 cuillerée à café. Au-dessous de cet âge, prendre uniquement le DYSTHÈNE-GOUTTES.

L'élixir peut être absorbé pur ou partie égale d'eau.

Prix : 18 francs.

Durée moyenne : 15 à 20 jours.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine). (Tél. : Grésillons 00-15.)

DYSTONINE

(Comprimés)

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Ethyl-phényl-malonyl-urée	0,01
Extrait de <i>Cratægus</i>	0,05
Bromure de Calcium	0,10
Poudre de Parathyroïdes.....	0,0003

Propriétés. — Sédatif et régulateur des troubles neuro-végétatifs, cardio-tonique, antispasmodique.

Indications. — Tous troubles et dérèglements du système vago-sympathique : Emotivité, Anxiété, Nervosité, Angoisses, Dépressions, Insomnies.

Aérophagie, Dyspepsies nerveuses, Entérocrites spasmodiques, Spasmes cardio-vasculaires. Angor. Troubles endocriniens notamment de la menstruation et de la ménopause.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour en plusieurs fois, de préférence avant les repas.

Prix : 16 fr. 65 la boîte de 40 comprimés.

Laboratoires CHATRON

PLOMBIÈRES-LES-BAINS (Vosges)

et 45, rue Cambronne — PARIS (XV°).

Tél. : Ségur 26-79.)

EAUX-MÈRES

Eaux chlorurées, bromofodurées, sodiques et magnésiennes. Un litre d'eau contient 322 grammes de sels provenant de la concentration des eaux salées naturelles par la chaleur après extraction de la majeure partie du chlorure de sodium et conservant dans de fortes proportions des chlorure de potassium, sulfate de sodium, sulfate de magnésium, sulfate de calcium, chlorure de calcium, carbonate de calcium, silicate de sodium.

Indications. — 1° Maladies de l'enfance : lymphatisme, scrofule, rachitisme, scoliose, séquelles de paralysie infantile, anémie ;

2° Maladies de la femme : aménorrhée, dysménorrhée, fibrome utérin, métrite, salpingite, ovarite.

Contre-indications : tuberculose pulmonaire, affections organiques du cœur, néphrite chronique, maladies aiguës et affections cancéreuses.

Présentation et prix. — 1° Sels pr bains en paquets de 2 kgs : 9 fr. 20 ;

2° Eaux-mères pour bains et irrigations vaginales, compresses pansements, en bouteille de 1 litre, environ : 5 francs ;

3° Eaux-mères concentrées pour injections vaginales, en boîte de 6 ampoules de 20 cc., stérilisées : 18 francs.

Durée du traitement : 21 jours environ.

Pour tous renseignements s'adresser au Directeur
de l'Établissement Thermal
DE SALIES-DU-SALAT (Haute-Garonne).

ECZÉDA

Ichtyosalicylé.

Pommade polyréductrice, doit à son excipient :

Son pouvoir absorbant.

Ses qualités d'épidermisation.

Ses propriétés antitoxiques.

Indications. — *Dermatoses suintantes et prurigineuses* : Eczémas sous ses différentes formes ; Érythèmes, Prurits ; Eczéma et Érythème fessier des nourrissons — *Brûlures. Engelures. Plaies.*

Assurances Sociales : Catégorie B.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux
PARIS (IV^e). Tél. : Arch. 69-03.

ECZOSEC PORCHER

Pâte adhésive sans corps gras. Sèche rapidement.
Ne tâche pas. S'enlève à l'eau.

Véritable pansement dermatologique ne nécessitant l'emploi ni de bandes, ni de gaze, ni de poudre.
Protège la peau et permet la perspiration.

Mode d'emploi. — Etendre en couche mince, mais homogène, et laisser sécher simplement. *Ne jamais mettre de pansement, ni poudrer.* Renouveler chaque jour l'application après avoir enlevé la couche précédente avec un tampon d'ouate imbibé d'eau.

Indications. — Eczémas secs. Dermites, Prurits.

Préservatif et curatif des différentes formes d'Erythèmes : Erythèmes solaires, Erythèmes des nourrissons Erythèmes provoqués par le vent, les reflets de la neige, les piqûres d'insectes.

Dans les *Dermatoses suintantes*, complément de l'Eczéda comme pansement de jour.

Eczosecs spéciaux : *Ichtyolé* (Dermites eczémateuses).
Benzoïque (Dysidroses parasitaires).
Sulfocamphré (Affections acnéiques).

Assurances Sociales : Catégorie C.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e).

Tél. : Arch. 69-03.

ÉDISTOL

Composition. — Acide borique, tartrique, citrique ; menthol, huile de Pinus sylv., gaiacol, terpinéol, pinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antiseptie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — *Gargarismes* et bains de gorge : 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations : 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

Vaporisations : 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal : 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Échantillon sur demande.

Prix : G. M., 15 fr. 25 ; P. M., 10 fr. 50.

Laboratoire de l'ÉDISTOL

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe,

Anc. interne des hôp. de Paris,

40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret). (Tél. : 21-28,

EDRICAMPHRE

Forme pharmaceutique et composition. — Ampoules de 2 cc. de solution aqueuse correspondant à 2 cgr. d'*Ephédrine naturelle* et 20 cgr. de *Camphre*. (Boîte de 5 ampoules.)

Propriétés et avantages. — L'EDRICAMPHRE est le médicament type de la *défaillance du cœur périphérique*. Facilité de l'injection sous-cutanée. Indolence absolue, diffusion et absorption rapide. Pas de rétention ni d'abcédation.

Indications thérapeutiques. — Tous états *hypotensifs* (choc toxique, infectieux ou traumatique).

Avant, pendant et après les *interventions chirurgicales*.

Accidents sériques et post-opératoires.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 ampoules par jour en injections *sous-cutanées* ou intramusculaires.

Prescription. — 1 boîte ampoules EDRICAMPHRE FALVY.

L'EDRICAMPHRE existe également sous la forme *gouttes* (même composition) pour instillations et pulvérisations nasales et pour l'usage interne (XX à XL gouttes 3 à 5 fois par jour) dans l'asthme, le coryza spasmodique et les états allergiques.

Les Laboratoires FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Étoile 18-26.)

ÉDUCTYL

Suppositoire antidyschésique « sui generis ».
Procédé de Fabrication Breveté. S. G. D. G.

Mode d'action. — Dégagement lent dans le rectum de gaz carbonique (méthode du Professeur Ch. Glaesner), ce qui déclenche promptement le réflexe dilatateur.

Avantages particuliers. — 1° Remplace les purgatifs et les lavements ; 2° Ménage le tube digestif ; 3° Emploi propre et aisé.

Indications. — Toutes formes de constipation rectale ou rectosigmoïdienne, surtout chez les dyschésiques habituels, les hémorroïdaires, les congestifs pelviens, et chez les constipés occasionnels : infectieux, opérés, parturientes, malades alités de tout ordre.

Posologie. — Un suppositoire au moment voulu ; un deuxième une demi-heure après dans les cas opiniâtres.

Boîtes de 6	7 fr. 50
— de 12	13 fr.
— de 25	23 fr. 50

Littérature et échantillons.

Laboratoire GEWA

32, rue Assalit — NICE (A.-M.). Tél. : 814-61.

EFFLOZONE LABOCIP

L'Oxygénothérapie intégrale à la disposition du médecin.

*Solution oxygénifère agissant par libération lente
de 2 volumes d'oxygène atomique,*

Composition :

Ozonide de Terpènes..... 4,00 \ pour 100 gr.
Chlorure de Sodium..... 0,50 \ d'eau distillée.

Caractéristiques. — *L'Efflozone Labocip* est une solution aqueuse isotonique d'ozonide terpénique stabilisé, exempt d'alcool, saturé d'oxygène ionisé, se dégageant *extrêmement lentement* par simple dissociation moléculaire à la température de 37°.

Aucune formation de composés de substitution ou produits de combinaison toujours toxiques, caustiques, irritants et congestionnants. Par conséquent, aucun parallèle possible avec les autres antiseptiques, l'eau oxygénée, tous les persulfates et peroxydes en particulier.

Action thérapeutique. — Antiseptique, Tonique, Décongestionnant Cicatrisant, Bactéricide, Désodorisant.

Présentation et posologie. — 1° *Solution aqueuse pour usage externe.*

a. **Angines microbiennes,** Affections stomatologiques, Antisepsie et Cicatrisation rapide après extractions dentaires (une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède en gargarisme ou bains de bouche).

b. **Affections O. R. L.,** Chirurgie, Désinfection des Plaies, Ulcères, Gangrène, Cancres, Champs opératoires, etc. (une cuillerée à soupe dans 1/2 litre d'eau ou sérum physiologique).

c. **Affections gynécologiques** (injections lentes d'un litre d'eau à 38° additionné de une à deux cuillerées à soupe et en tamponnements pur ou dilué à 50 p. 100).

Prix de vente : Grand modèle (250 cc.), 17 fr. 50 ; petit modèle (125 cc.), 11 fr. 50.

2° *Solution spéciale pour usage interne :*

a. Désinfectant remarquable du trajet digestif.

b. Modificateur des échanges nutritifs, régularisateur de l'équilibre vago-sympathique et du pH, éliminateur des déchets par combustion accélérée (apport d'O. atomique combinable, suivi d'une notable augmentation de décharge azotée).

Troubles digestifs : Maladies de la nutrition, arthritisme, diabète, amaigrissement dû à un défaut d'assimilation, asthme (X à XX gouttes dans un peu d'eau sucrée 1/4 d'heure au moins avant les repas).

Prix : 15 francs le flacon pour traitement de 25 jours environ.

3° *Forme injectable (ampoule de 2 cc.).*

En injections intramusculaires profondes.

Mêmes indications que pour la forme interne, mais offrant l'avantage d'une action plus énergique et plus rapide. En outre, pneumonie-broncho-pneumonie, pré-tuberculose.

Prix : 20 francs la boîte de 12 ampoules d'*Efflozone Labocip* et de 12 ampoules d'eau bidistillée à mélanger dans la seringue extemporanément.

EFFLOZONE CONCENTRÉ

(Glycérine efflozonée Labocip pour toutes applications externes, mêmes indications générales que ci-dessus.) A employer dilué dans 10 à 40 parties d'eau ou de sérum physiologique.

Prix : Flacon 50 gr. avec compte-gouttes, 22 fr. 50.

Tous échantillons sur demande même par téléphone.

Spécialités pharmaceutiques LABOCIP

S. COUTIERE-BAZILLE,

Docteur en pharmacie,

19, boulevard du Parc, à NEUILLY (Seine).

(Tél éphone : MAILLOT 81-91).

EGIDOL

Vaccin polyvalent en comprimés.

Entérites, colibacilluries, Staphylococcies.

Mode d'emploi. — Un comprimé à chaque repas, quinze jours par mois.

Prix de la boîte de 30 comprimés :
12 francs.

DURSENT, Pharmacien

74, rue Blanche — PARIS (IX^e).

EKTAL

Formes. — Granulé et comprimé.

Formule. — Peptone viande, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, fluorure de magnésium, tartrate de potasse et de soude.

Indications. — Congestions du foie et de la vésicule, cholécystite chronique, syndrome entéro-hépatique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe de granulé ou 5 comprimés le matin à jeun.

Prix : 17 fr. 70.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Mon. 33-86.)

EKTOGAN BOCQUILLON

A base d'un peroxyde de zinc spécialement préparé, dont la partie active a pour formule $2 (\text{Zn}^{\circ} \text{C}^{18} \text{O}^{35} \text{H}^{32})$, l'Ektogan-Bocquillon dégage d'une façon lente et continue de l'Oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec les tissus ou les sécrétions organiques (sang, pus, transpiration, etc...).

Indications. — Chirurgie, Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Obstétrique, Gynécologie, Soins des nouveau-nés.

EKTOGAN-POUDRE pour désinfection, désodorisation et cicatrisation, avec action desséchante de toute plaie. Traitement de l'Hyperhidrose.

Prix : le flacon poudreur : 16 francs.

EKTOGAN-POMMADE pour cicatrisation et traitement des dermatoses et brûlures.

Prix : le tube : 14 fr. 40.

Pansements à l'**EKTOGAN** : gaze, mèches (largeur 1 cm., 2 cm. 5 et 5 cm.), ekto-plaste, ovules, pâte occlusive pour ulcères variqueux.

Laboratoire des PEROXYDES MÉDICINAUX

12, rue Lamartine — PARIS. (Tél. : Trudaine 09-64.)

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine carbonique.

Indications. — Rhumatismes musculaires ou articulaires, aigus ou chroniques, goutte, sciaticque, lumbago, etc.

Mode d'emploi. — 4 cachets par jour (2 avant chaque repas) pendant 4 jours.

Repos 4 jours.

Présentation :

Boîte. G. M. de 32 cachets dosés à 0 gr. 20 : 17 fr. 05.

Boîte. P. M. de 16 cachets dosés à 0 gr. 20 : 9 fr. 10.

Durée moyenne des unités vente :

G. M. : 12 jours. — P. M. : 4 jours.

Laboratoires de Biochimie médicale.

CH. DESGREZ

Docteur en pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

ÉLASTOPLASTE

Forme essentielle. — Bandes de 1 et 2 m. $1/2$ de long et de 3 à 30 centimètres de large.

Composition. — Sparadrap adhésif, élastique, résultant de l'association d'une bande élastique (genre orêpe) et d'une masse adhésive au ZnO .

Formule A : Entièrement enduite (occlusive).

Formule B : Partiellement enduite.

Formule C : Ajourée.

Formule S : Bandes enduites sur la moitié de leur largeur.

Indications :

Contention des plaies. Pansements aux articulations (toutes largeurs). Extensions continues (formule A ou B : 2 m. $1/2 \times 6$ et 8 cm).

Traitements des ulcères variqueux (formule A : 2 m. $1/2 \times 8$ cm).

Prévention et Traitement abortif des phlébites chirurgicales et péri-phlébites.

Redressement des pieds bots (formule A ou B : 2 m. $1/2 \times 3$ cm)

Luxations, entorses, bandages de soutien, etc...

Autres présentations :

Elastodoigts : noir ou chair.

Elastoplaies : existe en 4×4 cm. — 6×4 cm — 6×6 cm, etc...

Sparaisa : Pansement élastique en largeur, portant une compresse au DermatoI dans le sens de la longueur; existe en 4, 6 et 8 cm. de large.

Elastovaccin : Protecteur après vaccination.

Elasto-yeux : S'adapte à la forme de la tête.

Elastocapsil : Emplâtre élastique au Capsicum.

Elastofuron : Emplâtre au Vigo, élastique et poreux.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence : 104, Frg Poissonnière — PARIS (X^e). (Tél. : Trudaine 92-52.)

ÉLATINE BOUIN

Provient du traitement du Goudron de Sapin de Norvège.

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Dose et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphyseme, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyérites, gravelle).

Prix : Le flacon 12 fr. 80.

L. N. C. n° 474-3. Ass. Soc. Catégorie B.

Laboratoire FAGARD

LONS-LE-SAUNIER (Jura).

ÉLECTRARGOL

Composition. — Argent colloïdal électrique à petits grains, isotonique et stabilisé, titrant 0,40 0/00.

Propriétés. — Antimicrobien, leucocytogénétique, sans toxicité
Anti-infectieux polyvalent local et général.

Indications. — Septicémies, Pneumopathies graves, pleurésies, méningites aiguës, maladies générales, infectieuses, suppurations et infections en chirurgie générale, urologie, gynécologie et obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

Forme et mode d'emploi.

1° *Ampoules* : de 1, 2, 5, 10, 25 cc., pour injections intramusculaires ou intraveineuses.

Doses variables suivant la gravité des cas : de 5 à 50 cc. et plus par jour.

2° *Ampoules compte-gouttes stérilisées* de 25 cc., pour instillations nasales et oculaires.

3° *Ampoule* de remplissage du flacon compte-gouttes.

4° *Flacons stérilisés* de 50, 100, 250 cc., pour pansements, lavages, injections locales.

5° *Pommade* : Tubes de 30 grammes.

6° *Ovules* : Boîtes de 6 ovules.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ELGINE JULIEN

Comprimés.

Composition :

Collargol argent colloïdal	0,05 cent.
Benzoate de soude	0,40 —
Formine.....	0,20 —

En comprimés glutinisés.

Indications. — Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 1/2 dose. Avaler avec une infusion.

Prix : 13 fr. 35. — Boîte gratuite sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris,
105, rue de Rennes — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 80-76.)

ÉLIXIR BONJEAN

Composition. — Éther et plantes aromatiques.

Mode d'action. — Tonique puissant des voies digestives.

Indications. — Troubles de la digestion par hypofonction, gastropathies d'origine nerveuse, diarrhée de l'adulte et des enfants, choléra infantile, grippe intestinale.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur après les repas ou au moment des douleurs. Renouveler une demi-heure après.

Enfants : Demi-dose.

Prix :

Le flacon : 19 fr. Le demi-flacon : 10 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

ÉLIXIR DÉRET

Composition. — Solution vineuse d'iodure double de tanin et de mercure (0 gr. 0275 d'iode et 0 gr. 005 de Hg par cuillerée à soupe).

Propriétés. — Absence d'accidents d'hydrargyrisme grâce à la présence du tanin ; innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhées).

Indications. — Antisypilitique doux, convenant aux personnes qui ne peuvent supporter un traitement mercuriel ou arsenical interne. Particulièrement recommandé chez les enfants.

Traitement d'entretien de la syphilis et de l'hérédo-syphilis par voie buccale chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes.

A ses propriétés d'agent thérapeutique mercuriel, l'Elixir Déret ajoute celle d'être un *tonique* actif.

Posologie

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

A prendre en deux fois, dans un verre à liqueur gradué, pour éviter la réaction qui se produirait sur le métal de la cuiller, doses pouvant être doublées en cas de besoin.

Forme. — Flacons de 300 cc.

Permet le traitement d'entretien dissimulé.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ÉLIXIR DUCHAMP

Assurances Sociales. Accepté par la Commission.

Composition. — Extrait d'eaux de Foie de Morue, Quinquina, Arrhéнал et Phosphates, Cacao vanillé.

Propriétés thérapeutiques. — D'un goût exquis, apéritif puissant, reconstituant énergique, tonique et hématopoiétique, l'*Elixir Duchamp* remplace avantageusement l'huile de foie de morue, les amers et les fortifiants.

Indications. — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle, Manque d'appétit, Grippe, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence, Lymphatisme, Scrofule, etc.

Dose. — 1 verre à liqueur (enfants, 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Prix : 24 fr. 50 le flacon de 350 cc.

Laboratoires **RENÉ de GRAUWE**, ⚗, ⚙, ✚
Pharmacien de 1^{re} classe.

La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS.

ÉLIXIR DUCRO

Agent dynamique aux oranges amères et phosphore assimilable.

Tonique antianorexique : asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuillerée à soupe ou 1 verre à liqueur, selon l'âge, pur ou étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

Eupeptique, euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

Action d'épargne : pneumonie, grippe, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuillerée à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les 2 heures.

Prix : le flacon, 18 fr. 20.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-2.

DURIEZ

20, place des Vosges. — PARIS.

ÉLIXIR DU DOCTEUR MIALHE

Pepsine ou pancréatine.

Préparation. — Suc gastrique ou pancréatique complet. Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années. (*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique ou pancréatique fait défaut : Dyspepsies, Douleurs nerveuses, Digestions lentes et difficiles, Vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur immédiatement après le repas.

Demi-dose pour les enfants.

Conservation : 5 années.

Contenance 250 cmc. Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires MIALHE

8, r. Favart — PARIS (2^e). (Tél. : Rich. 35-10.)

ÉLIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications thérapeutiques. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au début ou à la fin de chaque repas.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. sous le N° 544-1.

Prix : 23 fr. 50.

Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

ÉLIXIR GODFRIN

Formule. — Teinture de simarouba, 7 gr. 50 ; Teinture de grenadier, 7 gr. 50 ; Elixir parégorique, 12 gr. : Sirop de cachou, 40 gr. pour 125 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Antidysentérique, astringent, sédatif.

Indications. — Diarrhées de toute nature, Entérites et entéro-colites, Dysenteries amibienne et bacillaire.

Mode d'emploi. — *Cas aigus.* — Prendre toutes les 2 heures : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe. — *Enfants de plus de 10 ans* : 1 cuillerée à dessert. — *Enfants de 6 à 10 ans* : 1 cuillerée à café. Ne pas donner au-dessous de 6 ans.

Cas chroniques. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, loin des repas.

Prix : 10 francs.

C. MAURY, Pharmacien de 1^{re} classe.

6, rue de Paris — JOINVILLE-LE-PONT

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 117-1.

(Tél. : Gravelle 20-50.)

ÉLIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

Spécialement préparé pour combattre l'*insuffisance gastrique* dans toutes les formes de l'*Hypochlorhydrie*.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs. Son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Indications. — Insuffisances gastriques, Hypochlorhydrie, *Aérophagie*, Régime déchloruré, Vomissements de la grossesse et de la tuberculose, Gastro-entérites, Ptoses gastriques, Inappétence, etc...

Posologie. — Un verre à liqueur pur ou coupé d'eau, après chaque repas.

Prix : 23 francs.

Laboratoire MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX.)

(Tél. : Trudaine 37-45.)

ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Titrage. — Par cuillerée à soupe : 0,01 Bi-iodure de mercure. — 0,05 Iodure de potassium.

Originalité. — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un goût très agréable, et une parfaite tolérance pour l'estomac.

Présentation dissimulée. — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

Posologie. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour au début ou au milieu des repas.

Enfants de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 — —

A prescrire. — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

Indications. — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

ÉLIXIR MANNET FERRO-ERGOTÉ

Composition :

Ergot de Seigle 5 cgr.

Fer..... 10 —

Par cuillerée à café.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires MANNET

LOUDUN (Vienne).

(Tél. : 134 Loudun.)

ELIXIR eupnéique MARTIN MAZADE

Composition. — Iodure de Caféine stable, 0 gr. 25 par cuillerée à café.

Posologie. — *Etats aigus* : 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée, de café, de lait.

Etats chroniques : 1 cuillerée à café le matin avant le petit déjeuner.

Propriétés thérapeutiques. — Antiasthmatique, Diurétique, Toni-Cardiaque, Respiratoire.

Indications. — Emphysème, Asthme, Artériosclérose, Dyspnées, Néphrites, Angine de poitrine, Affections cardio-rénales, Maladies infectieuses, Obésité, Bronchites chroniques.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Médic. sous le n° 643-1.

Prix : 18 fr. 75 le flacon de 185 cc. environ.

Laboratoire MARTIN MAZADE

Pierre SUIFFET, Docteur en Pharmacie.

SAINT-RAPHAEL (Var).

(Tél. : 0-40.)

ÉLIXIR RODI

Traitement arsenico-mercuriel dissimulé.

Formule. — Contient par cuillerée à soupe :

Iodure d'arsenic.....	0,005
Iodure d'Hg	0,01
Iodure de K	0,25

Dans un véhicule de goût agréable, « non alcoolisé ».

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe au milieu des 2 principaux repas dans un peu d'eau.

Enfants (très bonne tolérance) : 1 cuillerée à café par jour en 2 fois pour les nourrissons.

Ensuite, 1 cuillerée à café par 3 ans d'âge.

Indications :

Traitement complémentaire et d'entretien de la S. acquise ; traitement facile de la S. héréditaire des enfants ; traitement efficace des S. tertiaires grâce à la présence d'iodures ; traitement dissimulé (Dépuratif tri-iodé) de toutes les formes : S. conjugale, cas douteux, traitement discret dans les affections évoluant sur terrain syphilitique ou hérédosyphilitique (dermatoses, eczéma, ulcères variqueux, incontinence d'urine, migraines, épilepsie, rhumatismes, etc.).

Se prescrit généralement par cure de 20 jours (2 flacons) tous les 3 mois.

Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires FABIU

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 87-85.)

ÉLIXIR SPES DU D^r GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Composition de l'Elixir. — Iodure double d'Arsenic et de Mercure
Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au **Sirop de Gibert**.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

l.....	0,008	} correspondant à {	0,01 Biiodure Hg. 0,005 Iodure As.
Hg.....	0,006		
As.....	0,001		

Très agréable à prendre.

Indications. — *Syphilis et Hérédo-syphilis*. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

Doses : {
Nourrissons : 1 demi-cuillerée à café par jour.
De 1 à 3 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.
De 3 à 7 ans : 2 cuillerées à café par jour.
De 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.
De 15 à 20 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

A prendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du **verre gradué** qui accompagne chaque flacon.

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'**Elixir Spes** ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 21 fr. 30.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél.: Marcadet 37-98.)

ELKIN (Dragées, Granules).

Bile, Soufre, Pancréatine.

Sans aucun drastique.

Indications thérapeutiques. — **Digestions incomplètes**, Somnolence, Ballonnement, **Douleurs Post-Prandiales**, Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépato-biliaire, Insuffisance pancréatique, Dermatoses hémoclasiques, Rougeurs de la face, Urticaire, Eczéma, Acné juvénile.

Présentation et Posologie. — Pour les **Adultes**:
Forme **dragées** (à 0,05 par pilule dragéifiée), une ou deux pendant ou après les deux principaux repas. (Avaler sans croquer.)

Pour les **Enfants**: forme **granules** (à 0,01 par granule), deux à quatre par repas (à prendre dans un dessert : compote, confitures, etc.).

La boîte de 40 dragées ou 60 granules : 16 fr. 50.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél.: Littré 54-07.)

EMBROCAN

Embrocation *au tiers* d'essence de térébenthine sans aucune addition de rubéfiant.

Composition. — Essence de térébenthine pure, une partie. — crème de savon, 2 parties. Ne dessèche pas l'épiderme, ne rancit pas.

Massage, frictions, applications.

Aussi agréable à employer qu'un Cold-Cream.

Le révulsif le plus efficace et le mieux toléré.

Térébane. — Solution mère à 66 p. 100 d'essence de térébenthine.

Embrocane et *Térébane* sont miscibles à l'eau en toutes proportions.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SAPORTA

59, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 02-27.)

EMBROCATION ROSSO

Résolutive et analgésique, stimule la circulation périphérique complète toute massothérapie.

Formule :

Essence de térébenthine.....	50 cc.
Trichlorodiéthylméthane.....	5 cc.
Camphocarbonate d'ammoniaque.....	4 cc.
Emulsion d'albuminoïde, Q. S. pour.....	100 cc.

Donne vigueur, souplesse et élasticité aux muscles. Supprime radicalement : Fatigues, crampes, engourdissements. Accroît la contractilité musculaire, augmente les moyens physiques.

Mode d'emploi :

I. *Entraînement et sports.* — Verser un peu d'Embrocation Rosso dans la paume de la main et frictionner légèrement les membres jusqu'à l'obtention d'une sensation de chaleur et de bien-être. La même opération répétée au cours de l'entraînement ou en vue d'un effort empêche toute crampe musculaire douloureuse et élimine la rigidité et l'engourdissement.

II. *Rhumatismes, Névralgies, Lumbago, Entorses, Foulures.* — Frictionner la région douloureuse deux à trois fois par jour et la recouvrir de coton cardé.

Dans les entorses et foulures, appliquer en outre un pansement sec compressif (bande élastique). Si la douleur est très vive, augmenter le nombre d'applications.

III. *Refroidissements et coups d'air.* — Frictionner énergiquement la poitrine et la région dorsale avec un linge imbibé d'Embrocation Rosso.

Usage externe.

Prix : Le flacon de 210 gr. : 15 francs.

Produits Biochimiques ROSSO. — THURET, Pharmacien, 63, rue de Charonne, — PARIS.

EMBRYHORMONE

Cure de revitalisation et de rajeunissement.

Forme. — Ampoules buvables.

Composition. — Association d'hormones embryonnaires et d'hormones désalbuminées de glande interstitielle, glandes surrénales, glande thyroïde, extrait hépatique en solution phosphorique catalysée par le chlorure de zinc et de manganèse.

Propriétés. — Tonique très puissant qui assure un relèvement rapide des forces physiques et intellectuelles, produit un état d'euphorie et entraîne un véritable rajeunissement de l'organisme.

Recommandé dans tous les cas de *déficience organique*, d'*asthénie*, de *déséquilibre nerveux*, d'*impuissance*, de *fatigue cérébrale*, d'*anémie* et de *surmenage*.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour pendant 10 jours par mois.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 403-49.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

EMBRYOCYTOL

Comprimés renfermant la totalité des produits organiques et minéraux de l'embryon de poulet.

Embryothérapie des cas légers. Cure complémentaire de l'*Embryol*.

Indications. — Toutes les déficiences organiques. Troubles endocriniens. Dépression nerveuse. Fatigue. Inappétence. Amaigrissement. Convalescence. Sénilité précoce.

Posologie. — 6 comprimés par jour, deux avant chaque repas. Demi-dose pour les enfants jusqu'à 10 ans (avaler sans croquer).

Prix du flacon de 42 comprimés de 50 cgr. : 18 francs.

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure).

(Tél. : 14-54.)

EMBRYOL

Méthode de Carrel pour la culture des tissus « in vitro »
adaptée à la thérapeutique humaine.

Jus embryonnaire *frais* d'embryons de poulet renfermant l'hormone
stimulante à l'état vivant.

EMBRYOL BUvable

Boîte de 10 amp. 5 cc. (1 unité-embryon par amp.) Prix : 48 fr.

Adultes : 2 amp. par jour dans eau froide 1/4 d'heure avant repas.

Enfants jusqu'à dix ans : Demi-dose.

Opérés : voie rectale, 3 doses de 5 amp. dans 30 cc. sérum
physiologique (matin opération, 1 heure et 4 heures après).

EMBRYOL INJECTABLE

Boîte de 5 injections intramusculaires de 10 cc. Prix : 35 fr.

Adultes et enfants : Déficiences organiques et endocriniennes : série
de 10 injections (1 inj. par jour). Maladies anaphylactiques : série de
15 injections (1 inj. tous les 2 jours).

Nourrissons : Demi-dose.

Indications de ces 2 formes : Déficiences organiques : anémies,
asthénies, déséquilibre nerveux, troubles endocriniens et sympathiques,
insuffisance du myocarde, convalescence, choc opératoire, maladies
anaphylactiques.

EMBRYOL PANSEMENTS :

Boîte de 3 amp. de 10 cc. (2 unités-embryon par amp.) Prix : 30 francs

Indications. — Plaies atones, ulcères.

Laboratoires **LA BIOMARINE**

DIEPPE (Seine-Inférieure).

(Tél. 14-54.)

EMBRYONA PROBIOS

Présentation. — En boîtes de 8 flacons-ampoules et 4 flacons ampoules.

Principes actifs. — Extraits secs d'embryons de poulets, de veaux et de moutons. Application thérapeutique des propriétés vivifiantes des tréphones embryonnaires (de bovidés, ovidés, gallinacées).

Indications. — *Chez le nourrisson et l'enfant :* Tous les troubles de développement musculaire, squelettique ou intellectuel, Amyotrophies, Paralyse, Rachitisme, Retard de la marche ou de la parole, Athrepsies, Cachexies, Anémies et états prétuberculeux.

Chez l'adulte des deux sexes : Toutes les déviations des fonctions physiologiques, Insuffisances digestives, Instabilité mentale, Sénilité précoce (vieillesse prématurée), Aspect vieillot du visage, Atrophie et taches cutanées, Rides précoces, Fatigabilité anormale.

Chez les femmes : L'Acné de la puberté, Dysménorrhées, Incommodités de la ménopause normale ou provoquée chirurgicalement.

En chirurgie, traitement préventif et curatif du choc opératoire.

Mode d'emploi. — A prendre en poudre ou délayée dans un peu d'eau ou de bouillon avant les repas.

Adultes : 2 à 4 flacons-ampoules par jour.

Enfants : 1 à 2 — —

Nourrissons : 1 — —

Pour le traitement préventif du choc chirurgical, 3 flacons-ampoules dissous dans 200 cc. de sérum artificiel en lavement à garder. Renouveler 5 heures après l'opération la dose précédente en lavement et de même 24 et 36 heures après l'opération.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

EMGÉ LUMIÈRE

Prophylaxie et traitement de tous Troubles liés à un état d'instabilité humorale.

L'**Emgé Lumière** correspond à la formule $S^2 O^3 Mg$. Son action est complexe, nous vous l'exposons ci-dessous :

Sous la forme de Comprimés :

- Il est le médicament des maintes Constipations.
- Il est indiqué dans les Diarrhées post-prandiales ;
- Il est particulièrement efficace dans les insuffisances hépatiques ;
- Il réalise une médication des manifestations anaphylactiques, luttant contre l'instabilité humorale ;
- Il est un antiseptique bronchique pulmonaire ;
- Il est le médicament type des Toxémies d'origine intestinale ;

Il permet de réaliser la reminéralisation magnésienne, et maintient ou rectifie l'équilibre neuro-végétatif. En résumé, les comprimés d'**Emgé Lumière** sont essentiellement régulateurs des fonctions digestives.

Ampoules d'**Emgé Lumière**, pour injections **Intra-musculaires**, est un stimulant des fonctions endo et exocriniennes du foie, mais il est surtout un médicament anti-choc omnivalent.

C'est la médication type de toutes les manifestations dites arthritiques. — Elles exercent une action directe sur l'équilibre humoral. — En injections **intra-veineuses**, c'est une médication héroïque des états dépressifs de la cyclothymie. — Indications particulières en **psychiatrie** (Epilepsie, Manie, Accès anxieux).

Indications. — Tous états d'instabilité humorale (anaphylaxie), Insuffisance hépatique et pancréatique, Désintoxication par formation de sulfo-conjugés atoxiques.

Formuler. — Une boîte de comprimés d'**Emgé Lumière**, dosés à 0 gr. 60.

Une boîte de 3 ampoules de 10 cc. d'**Emgé Lumière**, à 10 p. 100.

Doses. — 1 à 4 comprimés par jour (avalés tels quels avec un peu d'eau) au milieu des repas.

De l'injection intra-musculaire quotidienne à 3 ou 4 par semaine. Aucune réaction locale ni générale.

Injection intra-veineuse, 1 tous les deux jours (administrer lentement).

Laboratoires LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

EMPLATRES ROGÉ-CAVAILLÈS

Caoutchoutés, Adhésifs (formule de l'hôpital Saint-Louis).

Oxyde de zinc : Eczémas torpides, Lichénisation.

De Vidal : Furoncles, Impétigo, Folliculites.

Huile de cade : Psoriasis, Dermatoses squameuses.

Prix : 11 fr. 75.

Colopastre. — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

Gaze anadhère. — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 65-97.)

Détail : Phie 116, boulevard Haussmann, et toutes pharmacies.

ENCYTAL CORDONNIER

Association de Fer, Manganèse, Vanadium en combinaison organique, et d'extrait hépatique, de glandes surrénales, de rate.

Présentation. — Sirop de goût agréable (durée moyenne 15 jours, 18 francs).

Indications. — Toutes les anémies, tous les états de fatigue. Donc : accidents de la puberté des jeunes filles, Convalescence des malades et des opérés, États pré-tuberculeux.

Action contrôlable par le Laboratoire : la valeur globulaire évolue vers l'unité.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café 2 fois par jour, dans un liquide quelconque.

Prescription. — Encytal Cordonnier un flacon.

En dépôt chez tous les Droguistes.

Préparé par le

Laboratoire d'applications biologiques (Labiola)

P. CORDONNIER, Pharmacien

52, rue de Cambrai — LILLE.

Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

ENDOCAÏNE-ADRIANINE

Composition :

Association de l'adrénaline physiologique pure et du para-aminobenzoyldiéthylaminoéthanol (Novocaïnum).

Indications :

Anesthésique employé principalement en chirurgie dentaire.

Présentation et prix. — 2 formes :

- a. Ampoules de 1 cc. contenant 1 cgr. d'endocaïne, et 1 goutte d'adrianine.
- b. Ampoules de 1 cc. contenant 2 cgr. d'endocaïne et 1 goutte d'adrianine.

La boîte de 6 ampoules : 7 fr. 95.

— 12 — : 11 fr. 70.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ENDOCARBONE ERCE

Composition. — Suspension colloïdale de charbon végétal activé à 1 p. 100.

Propriétés et avantages :

- 1^o Produit chimiquement neutre ;
- 2^o Hautes qualités physiques : adsorption, absorption, charge électro-nique, rayonnement ;
- 3^o Tamisage sélectif. Préparation soignée.

Indications. — *Action anti-infectieuse :*

- a. Infections générales : Septicémies, Fièvre puerpérale, Méningite, Tétanos, Colibacillose, etc...
- b. Infections locales : Lymphangites, Phlébites, Cholécystites, etc.
- c. Affections dermatologiques : Erysipèle, Furunculose, Eczéma, Anthrax.

Action anti-toxique : Coma barbiturique.

Forme. — Ampoules de 5 cc.

Posologie. — *Adultes :* doses croissantes, 3, 4, 5 cc. Cas graves : 2
3 injections de 5 cc. par 24 heures.

Enfants : doses croissantes, 1, 2, 3 cc.

Prix : 18 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE,

1, avenue de Villars — PARIS.

ENDOLACGÉNINE

Composition. — Extrait total de glandes mammaires en activité et de placenta.

Propriétés. — Détermine une rapide excitation sécrétoire de la mamelle suivie d'une activité régulière et constante. Provoque dès le 2^e jour une turgidité de la mamelle suivie 3 ou 4 jours après d'une sécrétion lactée très nette.

Posologie :

3 comprimés du 1^{er} au 6^e jour ;

6 comprimés du 7^e au 12^e jour ;

9 comprimés du 13^e au 18^e jour.

Ensuite diminuer la dose graduellement selon la tolérance individuelle.

A prendre en trois doses avant les repas.

Présentation : flacons de 50 comprimés.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des Hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

ENDO-OVARINA

Composition. — Extrait total concentré d'ovaire.

Propriétés. — Compense chez la femme l'insuffisance ovarienne. Est recommandée en particulier à l'époque de la puberté et pour corriger les troubles de la ménopause. Elle fait disparaître les malaises dont souffre la femme : migraines, règles douloureuses, etc., et permet de rester très longtemps jeune.

Présentation :

Ampoules : en boîte de 6 amp de 1 cc.

Comprimés : en boîtes de 50.

Solution : en flacons de 60 grammes.

Posologie :

Solution : De XX à XXX gouttes par jour.

Comprimés : De 4 à 8 par jour.

Ampoules : 1 injection de 1 cc. par jour.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des Hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

ENDOPANCRINE

Insuline Française présentée sous forme liquide
pour injections hypodermiques.

Endopancrine tube de 5cc. Chaque cc. titré à 20 unités cliniques.
Endopancrine 40 : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.
Endopancrine 5 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unités cliniques.
Endopancrine 10 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 10 unités cliniques.
Endopancrine 20 : boîte de 10 ampoules de 1 cc. titré à 20 unités cliniques.
Endopancrine-Protamine-Zinc : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.

Indications : Diabète et ses complications — Acidoses — Vomissements incoercibles de la grossesse — Dénutrition chez l'adulte et chez l'enfant — Troubles trophiques des nourrissons — Insuffisances hépatiques — Artérites oblitérantes — Troubles Parkinsoniens — Ménorrhagies d'origine ovarienne — Ulcérations chroniques — Furunculose chronique.

Dose du début dans le diabète : 20 unités cliniques. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Endopancrine : 16 francs. — Endopancrine 40 : 30 francs.

Endopancrine 5 : 13 francs — Endopancrine 10 : 22 fr. 50.

Endopancrine 20 : 30 francs. — Endopancrine-Protamine-Zinc : 40 francs.

Demandez nos notices :

« La thérapeutique du diabète par l'Insuline. »

« Les applications de l'Insuline en dehors du diabète. »

Pour recevoir, à titre d'échantillon gracieux, le modèle de vente, en faire la demande en indiquant exactement le dosage que l'on désire utiliser.

Laboratoire de l'Endopancrine

48, rue de la Procession — PARIS (15^e). (Tél. : Ségur 26-87.)

ENDOTHYMUSINE

Extrait de thymus injectable délipodé
et désalbuminé.

Indications. — Retard de croissance de l'enfant, arrêt de croissance du nourrisson, achondroplasie, ectopies testiculaires, troubles des règles chez la jeune fille, syndromes d'obésité dystrophiques de la période prépubère.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 centimètre cube
Chaque centimètre cube = 1 gr. de thymus frais. Prix : 19 fr. 50.
— — — = 3 gr. de thymus frais. — : 25 fr. 50.
— — — = 5 gr. de thymus frais. — : 32 francs.
— — — = 10 gr. de thymus frais. — : 48 francs.
— — — = 20 gr. de thymus frais. — : 69 francs.

Conduite du traitement. — Série de 12 injections à raison de 3 par semaine. *Adultes* : commencer par 5 gr., faire 10 gr. si nécessaire. *Enfants* : commencer par 1 gr., faire 3 gr. si nécessaire. Intervalle d'un mois entre les deux séries pendant lequel il est bon de donner 2 cachets par jour de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50. Pour les enfants indociles qui ne supportent pas les piqûres, remplacer celles-ci par 2 cachets de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50 de poudre de thymus avant les principaux repas.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e). (Tél. Ségur : 26-87.)

ENDOXIDINE

Traitement de l'obésité
par l'opothérapie embryonnaire.

Composition. — Extrait embryonnaire séché dans le vide et pulvérisé. Ne contient pas de thyroïde.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Stimule les combustions organiques et provoque l'utilisation des réserves adipeuses. Détermine une diminution progressive du poids sans provoquer le moindre trouble. Constitue le traitement de choix pour les malades ne supportant pas les préparations thyroïdiennes.

Posologie:

4 comprimés	par jour	pendant la première semaine.
6	—	— la deuxième —
8	—	— la troisième —
10	—	— la quatrième —

Ne pas dépasser la dose de 10 comprimés par jour.

A prendre avant les repas : la moitié de la dose au repas de midi et la moitié au repas du soir.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

ÉNÉSOL

Composition. — Salicylarsinate de mercure (38,46 % de Hg. métal et 14,4 0/0 de As sous forme dissimulée).

Propriétés. — 70 fois moins toxique que le biiodure. Ne donne pas de phénomènes de stomatite. Indolence de l'injection. Activité spéciale accrue du fait de l'arsenic. L'élément arsenical, d'autre part, agit comme antitoxique à l'égard du mercure que l'on peut administrer à doses plus fortes sans accidents.

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations, surtout cures d'entretien. Syphilis tertiaires et Syphilis anciennes. Psoriasis.

Posologie. — Doses moyennes : 2 cc. correspondant à 0 gr. 06 d'Enésol par jour.

Doses massives ou de saturation : Injections intramusculaires de 4 à 6 cc. (soit 12 à 18 centigr. d'Enésol), tous les 2 ou 3 jours. Injections intraveineuses de 2 à 10 cc. (soit 6 à 30 centigr. d'Enésol), selon le sujet, l'urgence et la gravité, tous les 2 ou 3 jours.

Formes. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. d'une solution dosée à 0 gr. 03 par cc.

Collyres d'Enésol à 0 gr. 03 d'Enésol par 10 cc. : Affusions ou instillations oculaires de quelques gouttes d'Enésol plusieurs fois par jour (Complications oculaires de la syphilis).

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ÉNIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

Propriétés thérapeutiques. — L'*Éniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants.* 1 à 2 comprimés par jour.

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Prix : 15 francs.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

(Tél. : Opéra 30-50.)

« Sel de fruit » **ENO** « Fruit Salt »

Poudre fine, entièrement soluble dans l'eau avec effervescence. Ne contient ni sucre, ni édulcorant, ni sulfates alcalins.

Très agréable à prendre.

Indications :

Troubles de l'appareil digestif. Régularise le fonctionnement de l'estomac. Active les digestions paresseuses (ballonnements, malaises après les repas). Modère l'hypersécrétion pathologique (brûlures, renvois acides). Particulièrement efficace dans les écarts et changements de régime, dans les vomissements simples ou gravidiques.

Sur l'intestin, action laxative, douce et régulière, très indiquée chez les femmes enceintes et les enfants.

Affections du foie. Soulage cet organe en favorisant ses sécrétions.
Arthritisme, goutte, obésité, éruptions cutanées, migraines. Contribue à l'élimination des déchets toxiques qui, dans ces affections, encombrant l'organisme.

Doses :

Adultes : 1 cuiller à café dans un verre d'eau, le soir au coucher ou le matin au réveil.

Enfants (à partir de 6 ans) : 1/3 et 1/2 cuiller.

Prix : 14 fr. 25 et 25 francs. Durée : 3 et 6 semaines.

Laboratoire LACOMBE

Rue Barbès — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-48.)

ENTÉRARGOL

Spécifique puissant de toutes les affections intestinales

Composition. — Association d'Argent Colloïdal, Sulfate Neutre d'Oxyquinoléine et Magnésie légère.

Propriétés. — Bactéricide et Antiseptique Intestinal, Stable, Atoxique, ne constipe pas, n'irrite pas.

Indications thérapeutiques. — Entérite, Diarrhées, Dysenterie, Affections à colibacilles, Typhoïde, Grippe intestinale. Diarrhées des nourrissons et des enfants, Maladies infec. des voies urinaires.

Présentation.

Granulé : *Nourrissons* dès le premier âge et *Enfants* jusqu'à huit ans. Pilules : *Enfants* à partir de huit ans et *Adultes*.

De 10 à 15 jours de traitement. Prix : 17 fr. 70.

Posologie. — *Nourrissons* : Dès le premier âge et jusqu'à 6 mois : 1 cuillerée à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une journée.

De 6 à 18 mois : 1 cuill. et demie à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une jour.

Enfants : De 18 mois à 4 ans : 1 à 2 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour.

De 4 ans à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour. À faire prendre avant les tétées ou repas.

Enfants à partir de 8 ans : 1 à 2 pilules avant chacun des principaux repas.

Adultes : 2 à 3 pilules avant chacun des principaux repas. Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires PHOSMA, Marcel FRÉMONT, docteur en Médecine de la Faculté de Bordeaux, Ph^{en} de 1^{re} classe. 143, cours de la Somme — BORDEAUX

ENTÉRASPIRINE SANOVA

Synergie médicamenteuse plus active que l'aspirine seule et sans dommage pour l'estomac et le cœur.

Formule pour une dragée :

Bromhydrate de quinine	0,03
Pyramidon	0,02
Aspirine	0,35
Caféine	0,02

En deux noyaux solubles l'un dans l'estomac et l'autre dans le duodénum.

Le Bromhydrate de quinine tonifie l'estomac, — la caféine le cœur, — l'aspirine n'est mise en liberté que dans l'intestin.

Indications. — Antithermique, antirhumatisme, antialgique, anti-infectieuse et tonicardiaque.

Doses. — 1 ou 2 comprimés, jusqu'à 6 ou 8 par jour, de préférence aux repas.

Pourquoi prendre 0,50 d'aspirine si 0,35 suffisent.

Pourquoi prendre 1 gr. d'aspirine si 0,70 font mieux.

Prix : 8 francs.

Produits SANOVA
Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 04-49.)

ENTÉRIODE

Comprimés combinés d'IODE et d'hydrocarbures de Carbone donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'IODE NAISSANT.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant désinfectant intestinal.

Facile à absorber, ne provoquant ni irritations ni iodisme. Spécifique de toutes les entérites et plus particulièrement des entérites infantiles.

Posologie.

Nourrissons : 3 fois par jour 1 comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

Enfants : 3 fois par jour 2 comprimés à la fin des repas.

Adultes : 3 fois par jour 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de 3 semaines à 1 mois, renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Prix : 18 fr. 75

Laboratoires de l'Entériode

39, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 65-16.)

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du prof. DANYSZ, de l'Institut Pasteur.

Indications. — *Maladies des voies digestives* : Pharyngites chroniques, dyspepsies de sensibilisation, constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, colites, entérocolites, dysenteries microbiennes (Shiga, Flexner, etc.). Appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

Asthme, Rhume des foies, Emphyseme, Dyspnée provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

Maladies de la peau : Eczémas, Eczéma variqueux, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), Maladie de Quincke, Psoriasis, Prurigo de Hébra, Furunculose, Acné juvénile, Folliculites, Sclérodémie, etc.

Affections du foie : Insuffisances hépatiques. Cholécystites aiguës ou chroniques non lithiasiques.

Colibacillose, Cystites à colibacille.

Certaines formes de rhumatismes aigus ou chroniques, troubles de la ménopause.

Certaines migraines, neurasthénies,

Et dans tous les cas de *Dysharmonie endocrinienne*, soit par excès, soit par insuffisance.

Deux formes. — 1^o Ampoules à injecter ; 2^o Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 30 francs.

Durée moyenne du traitement des unités de vente :

Au début du traitement 10 à 20 jours ; ensuite 15 à 30 jours et plus, suivant indications du médecin traitant.

Lab. DUCATTE, 10, rue Barbette — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 78-10.)

ENTÉROBYL DEHAUSSY

En une seule prescription réalise effectivement :

Le drainage médical des voies biliaires ;
La désinfection atoxique de l'intestin et de la bile évacuée.

La désensibilisation de l'organisme.

Composition :

Cholérétiques et cholagogues : Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Polypeptides.

Antiseptiques : Hexaméthylènetétramine, Charbon animal pur.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme), Ictère, Cholémie familiale.

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire : Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit.

Posologie et Formes. — Granulé. Cachets.

Drainage biliaire : 1 à 4 cuillerées à café ou 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

Cure d'entretien : 1 à 2 cuillerées à café, ou 1 à 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

Prix : 17 fr. 70

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE

ENTÉROCOCÈNE CARRION

Vaccin entérococcique buvable.

Composition. — Emulsion d'entérocoques de Thiercelin, 2 000 millions de corps microbiens pour 1 cc. d'eau physiologique (soit dix milliards par ampoule).

Forme. — Ampoules de 5 cc.

Indications. — Grippe, infections gastro-intestinales et généralisées (Entérites coloniales).

Posologie et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 3 ampoules 2 fois par jour, avec un peu d'eau ; le matin à jeun et 2 heures avant le repas du soir.

Enfants : Demi-dose.

Nourrissons : Une ampoule par jour en plusieurs fois.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 22 fr. 90.

La boîte de 6 ampoules : 14 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

ENTÉRODAUSSE

et

ENTÉRODAUSSE CALCIQUE

(Antisepsie du tube digestif.)

Granulé se présentant sous deux formes :

1^o **Entérodausse magnésien** (à base de Phosphate de soude et Hydrate de Magnésie) pour les constipés, applicable aux troubles suivants :

a. Affections gastriques : Gonflements, Flatulences, Aérophagie, Digestions difficiles, Haleine fétide, langue saburrale.

b. Affections intestinales — Putréfaction et fermentation intestinales : selle fétides, Entérites sèches, Aérocolie, Rectocolites graves, Sigmoïdites avec fausse diarrhée, Syndromes entérorénaux (infection rénale et vésicale d'origine intestinale, colibacillose), Appendicite chronique).

2^o **Entérodausse calcique** (à base de sous-gallate de Bismuth et Carbonate de chaux) pour les diarrhéiques :

Mêmes indications que précédemment, bien que plus spécialement applicable aux entérites et colites diverses.

Dose et mode d'emploi. — Ce sont les mêmes pour les deux produits : Entérodausse simple et calcique.

Chez les adultes : 1 à 2 cuillerées à café au début de chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

Chez les enfants : demi-dose.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — (Tél. : Turbigo 63-40)

ENTÉROFAGOS

Bactériophages intestinaux polyvalents.

Composition. — Bouillon filtrat de bactériophages actifs contre les microbes que l'on trouve dans les infections intestinales.

Dose. — Ampoules à ingérer, 2 par jour, dans un peu d'eau bicarbonatée de préférence.

1 ampoule par jour pour les *enfants*.

Les bactériophages se distinguent par la rapidité de leur action et leur innocuité absolue.

Pas de réaction thermique, pas de choc.

Indications. — Entérites, colites, dysenteries bacillaires, typhoïdes, paratyphoïdes, diarrhées de type varié, constipation, fermentations intestinales, colibacilloses diverses, syndrome entérorénal d'Heitz-Boyer.

Remplace avantageusement les ferments lactiques.

Prix : la boîte de 10 ampoules : 21 fr. 50

la boîte de 5 ampoules : 11 fr. 95

Ce produit peut être prescrit pour les Assurances sociales.

**Laboratoire de Biologie médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

ENTÉROHÉPATINE

Rééducateur opo-physiologique de l'intestin.

Composition. — Ext. fl. intestinal. Extr. fl. pancréatique. Extr. fl. hépatique. Extrait salicaire, Teinture Belladone. Acide lactique.

Indications. — Toutes formes d'Entérites, Diarrhées, Dysenteries indigènes ou exotiques. Atonie intestinale.

Mode d'emploi et présentation :

Flacon pour *adultes* : 3 cuillerées-mesure par jour.

Flacon pour *enfants* (compte-gouttes) : II gouttes par année d'âge, 3 fois par jour.

ENTÉROHÉPATINE SB.

Même formule, moins la Teinture de Belladone.

Mêmes indications, mêmes doses.

Le flacon : 17 fr. 65.

Laboratoires Henri FOUCHER

77, boulevard de Grenelle — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 11-45.)

ENTEROMUCINE

Composition. — Mucine pure, neutre et stérile obtenue à partir des muqueuses intestinales et adaptée à la thérapeutique de la constipation et des entéro-colites.

Propriétés. — Régulateur naturel : laxatif idéal qui permet l'hydratation rapide et le cheminement normal des fèces.

Protecteur mécanique et protecteur chimique fixant les ions acides ou alcalins nuisibles au bon fonctionnement de l'intestin ou irritants pour la muqueuse.

Avantages. — L'*Entéromucine* est supérieure : *a.* aux laxatifs drastiques ou salins très irritants ; *b.* aux mucilages végétaux qui se digèrent et augmentent les fermentations ; *c.* aux poudres inertes et à l'huile de paraffine qui gênent l'assimilation et provoquent souvent des irritations graves ; *d.* aux celluloses indigestibles (son) qui raclent l'intestin, d'où des désastres chez les colitiques.

L'*Entéromucine* est particulièrement remarquable par la douceur de son action.

Indications. — Constipation simple et des colitiques, Colites, Entérites, Entérocolites.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café de granulé à chacun des 2 principaux repas.

Prix. — Modèle normal, granulé adultes et semoule pour enfants : 23 francs ; quadruple modèle : 77 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

ENTÉRO-PANSEMENT

du Docteur ZIZINE

Protection, désinfection de la muqueuse intestinale.

Composition. — Deux formules :

Simple. — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Lactose.

A l'ipéca. — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Ipéca.

Forme. — Granulé fondant aromatisé.

Propriétés thérapeutiques. — Diarrhées de l'adulte et de l'enfant. Infections et intoxications intestinales ; leurs conséquences. Fermentations intestinales ; ballonnement abdominal. Dermatoses d'origine intestinale. Colites infectieuses et parasitaires. Entérite des pays chauds. Entérocolite. Colibacillose (localisations hépato-vésiculaires et rénales).

Propriétés thérapeutiques spéciales à l'ipéca. — Amibiase, Dysenteries à Protozoaires.

Posologie. — *Adultes* : de 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, à jeun ou au repas (à croquer ou délayer dans un peu d'eau).

Enfants : de 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

Prix de la boîte : 19 fr. 75.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie,
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux,
Lauréat des Facultés de Médecine
de Paris et de Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

ENTÉROSALICYL

(Admis par l'Assistance Publique et le Ministère de la Marine.)

Salicylate de soude en capsules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin.

Suppression totale de toute irritation gastrique.

Composition. — 2 dosages : *Normal*, 0 gr. 50 par capsule ; *Infantile*, 0 gr. 25 par capsule.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu et ses complications, Goutte, Algies rhumatismales, Sciatique, Maladie de Basedow, Syndromes infectieux, Désensibilisant, Cholagogue.

(Dans les cas graves de R. A. A., compléter par Glucosalyl, en injections intraveineuses. Dans les Rhumatismes chroniques : Sulfosalyl *per os*, et Histalgine, en piqûres intradermiques.)

Fosologie. — Celle du Salicylate de soude. Jusqu'à 15 grammes et plus par 24 heures.

Enfants : 1/2 à 1 gramme par année d'âge.

De préférence, pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-7 (1 et 2).

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatisme SAREIN

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. Jasmin 00-37.)

ENTÉROSEPTYL

Phosphate de B trinaphtyle, 0 gr. 05 par comprimé ou par cuillerée à café de granulés.

Indications. — Diarrhées saisonnières, Intoxications alimentaires (gibier, crustacés, champignons), Entérites, Ictères, Urticaire, Colibacillurie, Rougeurs postprandiales, Fétidité d'haleine, Syndrome entéro-uro-génital.

Avantages. — Ne se décompose que dans l'intestin, n'irrite pas l'estomac, ni hépato-toxique, ni déminéralisant comme les ferments lactiques. Peut se prescrire aux enfants, de préférence sous la forme de « granulés ».

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour en dehors des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café de granulés par année d'âge et par jour.

Prix : le flacon de comprimés ou granulés : 13 fr. 50.

Laboratoires de L'ENTÉROSEPTYL

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 35-51.)

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Vaccin antitypho-colique polyvalent
Immunisation antityphique par voie gastro-intestinale.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-coli-bacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants. S'emploie à titre curatif et préventif.

Propriétés :

Durée de l'immunité variable selon les individus : elle est en général de deux à trois ans. En période d'épidémie et en cas de séjour dans les régions contaminées, renouveler l'immunisation au bout d'un an. Efficacité de même ordre que celles des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée, mais aucune contre-indication, pas de réaction, rien à changer aux occupations habituelles ni au régime normal.

Le procédé le plus simple, le plus inoffensif d'immunisation et de traitement contre la Fièvre typhoïde, les Fièvres paratyphoïdes (A et B). Efficacité attestée par des rapports officiels et de nombreuses observations. Plus de 500.000 expériences sans un seul échec.

Pas de contre-indication, pas de réaction.

Doses. — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.

Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

Formuler : Une boîte de 28 pilules d'Entérovaccin Lumière.

VACCINOTHÉRAPIE CURATIVE

L'Entérovaccin Lumière est également utilisé avec succès à titre curatif, dans le traitement des états typhiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution. L'employer à la même dose.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

ENTÉRO-VACLYDUN

Lysat vaccin du Docteur DUCHON

Composition. — Entérocoques, Colibacilles, Staphylocoques et Streptocoques, Lysat-vaccin intestinal à employer par voie *buccale*.

Indications. — Infections intestinales communes, Entérites, Colites, Diarrhées estivales, Diarrhées infantiles, Syndrome entéro-rénal, états appendiculaires, auto-intoxications intestinales, etc.

Posologie. — *Adultes* : 1 ampoule par jour dans 1/2 verre d'eau sucrée le matin à jeun.

Enfants : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre en 3 fois dans la journée.

Nourrissons : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre par cuillerée 1/2 heure avant les tétées.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.)

ENTÉRO-VIOFORME

Iodochloroxyquinoléine.

CIBA

ANTISEPTIQUE INTESTINAL.

Agent chimiothérapique d'action hautement spécifique dans les dysenteries infectieuses ou parasitaires, aiguës ou chroniques. Non toxique et non irritant. Son usage peut être prolongé aussi longtemps qu'il est nécessaire par périodes de traitement de 10 à 12 jours.

Indications. — *Dysenteries parasitaires et infectieuses* : dys. amibienne, dys. bacillaire, suites de dysenteries. Infections à *Balantidium* et *Lambliia*. Dysenteries et diarrhées d'origine non définie, Colibacillose et helm.

Doses. — *Cas aigus* : 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour aux repas pendant dix jours, puis suspension et reprise. *Cas chroniques* : 1 ou 2 comprimés par jour, trois ou quatre jours par semaine.

Prophylaxie : 1 comprimé tous les deux jours.

Tube de 20 comprimés

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

ENTÉROXIN

Composition. — Vaccin buccal polyvalent (cultures stérilisées de *B. Coli*, entérocoque, staphylocoque et corps microbiens en suspension).

Présentation. — Ampoules de 10 cc., en boîtes de 8 ampoules.

Mode d'emploi. — 1 à 2 ampoules dans 1/2 verre d'eau froide sucrée, 3/4 d'heure avant le petit déjeuner, 10 à 20 jours par mois. Aucune contre-indication.

Littérature et échantillons :

Laboratoires LECLERC S. A.

10, rue Vignon — PARIS.

ENZYPAN

Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs : Pepsine, Diastase, Trypsine, Lipase et Bile associées.

Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, ou se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan, la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particule par particule pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique, que détruit par le suc intestinal dès leur arrivée dans le duodénum.

Doses. — 2 ou 3 dragées pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie, certaine ou probable, prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin des repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Laborde 08-00.)

ÉPANAL

Régulateur du déséquilibre vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonylurée	0 gr. 02
Extrait hydroalcoolique de cratægus ...	0 gr. 03
— — — de valériane	0 gr. 03
— — — de passiflore ...	0 gr. 02
— — — de saule blanc..	0 gr. 02
— — — de ballote	0 gr. 02
Poudre de marjolaine.....	0 gr. 02
Hexaméthylène tétramine.....	0 gr. 03

Par comprimé dragéifié et glutinisé.

Principales indications. — Tics, Chorée, Epilepsie, Névrose, Mélancolie, Anxiété, Hyperémotivité, Vertige, Insomnie, Tachycardie.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour.

Prix : le tube de 40 comprimés : 16 fr. 65.

Laboratoires E. BOUCHARA

47, rue de Bretagne — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 94-65.)

ÉPHASMA

Médication pathogénique de l'asthme.

S'attaquant à tous les facteurs de la crise : Sympathique par l'éphédrine.

Parasympathique par la belladone.

Bulbaire par la lobélie et l'euphorbe.

Cardio-pulmonaire par l'iodure de caféine.

Bronchique par le benzoate de soude.

Traitement de la crise. — Un à deux comprimés dès l'apparition des signes avant-coureurs. Trois comprimés dans les 24 h.

Traitement de fond. — Un comprimé par jour, 10 à 20 jours par mois.

Prendre le comprimé finement écrasé dans une tasse d'infusion ou dans un peu d'eau bien sucrée. — Comprimés : 18 fr. 20.

Prix : Sirop : P. M. 20 fr. 80 — G. M. 25 fr.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

ÉPHÉDERMINE BÉRAL

Crème-pâte sans graisse à l'Éphédrine naturelle zincique.

Mode d'emploi. — En application comme une pâte et autant que de besoin.

Indications. — Toutes affections cutanées prurigineuses. Eczémas suintants. Dermatoses allergiques, Hémorroïdes, etc.

Prescrire : ÉPHÉDERMINE BÉRAL. Un tube.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de L'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRAFÉINE BÉRAL

Deux formes : comprimés et ampoules.

3 centigrammes d'Ephédrine naturelle et 5 centigrammes de Caféine par comprimé ou par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'Ephédrine et des Ephédroïdes, mais avec, en plus, l'action diurétique et toni-cardiaque de la Caféine, d'où suppression des palpitations, de toute action déprimante sur le myocarde, et des troubles de la miction.

Les comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE sont particulièrement indiqués chez les sujets hypocardiotoniques enclins aux palpitations, et chez les sensibilisés vésico-rénaux.

1 à 2 comprimés d'Ephédraféine dans les 2 heures précédant l'accès.

Les ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, pour injections sous-cutanées ou veineuses sont particulièrement indiquées, avant les interventions et les rachianesthésies pour éviter les chocs et crises hypotensives.

1 à 2 cc. 10 minutes avant l'intervention ou au moment des chocs.

Prescrire :

Comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 16 francs.

Ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 22 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL

Ampoules de 2 cc. dosées à 3 cgr. d'Éphédrine Béral par centicube.

Pour injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses :

1 à 4 centicubes par jour. S'emploient aussi en pulvérisations nasales, et pour autres applications externes de l'Éphédrine.

Prescrire : ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL.

Une boîte : 10 francs ; grande boîte : 18 fr.

Laboratoire de L'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRASMINE

Pulvérisations nasales.

Solution physiologique.

Sulfate éphédrine naturelle	2 p. 100
Adrénaline physiologique	1 p. 10.000

Action. — Décongestion prolongée de la muqueuse nasale. Inhibition des ramifications terminales du sympathique.

Indications. — Obstruction nasale, Asthme, Rhume des foins, Rhinites, Sinusites, Coryza, Coryza spasmodique, Catarrhe, Laryngites, Affections congestives du rhino-pharynx, Migraines. Infections grippales.

Mode d'emploi. — Pulvérisations, tamponnements ou instillations.

Voir également : **Garéphédrine, Diuréphédrine**
et **Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 15 francs le flacon pour un mois environ.

Pulvérisateur spécial de poche : 25 francs.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

ÉPHÉDRICONES BÉRAL

Suppositoires contenant chacun :

Chl. sulf. d'éphédrine nat. Béral . .	0 gr. 03
Excipient correctif.	2 gr.

Pour introduire dans le rectum dans les heures précédant l'accès d'asthme.

**Toutes indications
de l'éphédrinothérapie.**

Formuler : Ephédricones Béral, une boîte.

Prix : 16 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE BÉRAL (Grains d')

Grains dosés à 1 cgr. d'Éphédrine naturelle Béral par grain. Entièrement solubles.

Les mieux appropriés à l'éphédrinothérapie fractionnée, notamment chez les intolérants et pour la prophylaxie des chocs thérapeutiques (injections arsenicales, sériques ou autres).

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 10 grains par jour : 1 grain toutes les 3 ou 4 heures, le jour et le lendemain de l'injection choquante. Peuvent être dissous dans un peu d'eau.

Prescrire : GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL. Un flacon. Prix : 14 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL
194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE naturelle BÉRAL

Produit français intégral.

Formes pharmaceutiques spécialisées :

- Grains d'Éphédrine Béral.** Dosés à 1 cgr. d'éphédrine par grain, 14 francs.
- Éphédroïdes Béral.** Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine naturelle, 14 francs.
- Éphédraféine Béral.** Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. de caféine, 16 francs.
- Éphétropine Béral.** Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine-caféine et hyosciamine-barbiturique, 18 fr.
- Éphédromel Béral.** Sirop mellité à 1/2 cgr. d'éphédrine par cuillerée à café, 15 francs.
- Éphéiodine Béral.** Élixir de Lobélie à 3 cgr. d'Iodé-éphédrine, par cuil. à café, 20 francs.
- Éphédrampoules Béral.** Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine par cc. Boîte de 10 : 18 francs.
- Éphédraféine injectable Béral.** Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine + 5 cgr. caféine par cc., 22 francs.
- Spartophédrine Béral.** Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. spartéine par cc., 16 francs.
- Adréphédrine Béral.** Ampoule à 1/4 mgr. d'adrénaline et 3 cgr. d'éphédrine par cc., 16 francs et 22 francs.
- Éphédrisol Béral.** Hydrolat d'éphédra à 3 et 5 p. 100 d'éphédrine, 16 francs et 20 francs.
- Éphédroprises Béral.** Poudre à priser à 3 cgr. d'éphédrine par prise, 15 francs.
- Éphédermine Béral.** Gelée-pâte sans graisse à 2 p. 100 d'éphédrine, 14 francs.
- Nasophédrine Béral.** Pommade nasale (huile gélifiée) à 3 p. 100 d'éphédrine, 12 francs.
- Oléophédrine Béral.** Huile d'éphédra à 1 et 2 p. 100 d'éphédrine, 12 francs et 15 francs.
- Mydriédrine Béral.** Ampoule-colyre à 4 p. 100 d'éphédrine, 22 francs.
- Clearol.** Bain oculaire à l'hamamélis adréphédriné, 16 francs.
- Rhinodrops Béral.** Capsules nasales à l'huile d'éphédra chlorétonée, 11 francs.
- Éphédricones Béral.** Suppositoires à 3 cgr. d'éphédrine. 16 francs.

(Voir annonces concernant chacun des produits.)

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE HOUDÉ

(Chlorhydrate d'Éphédrine naturelle.)

Propriétés. — Sympathicotrope. Excitant du centre respiratoire bulbaire. Relâche les muscles lisses de la paroi bronchique. Hypertenseur par vaso-constriction périphérique. A petites doses, ralentit et soutient le cœur. Tonique général. *Antianaphylactique.*

Avantages. — Non modifiée par les sucs gastro-intestinaux, comme l'adrénaline, ce qui permet de l'employer *per os*.

Indications :

- a. *Essentielles*: Asthme sous toutes ses formes. Dyspnée. Urticaires.
- b. *Secondaires*: Rhume des foins. Dysménorrhée. Réactions sériques. Hypotension permanente d'allure idiopathique. Myasthénies et myopathies. Syndromes vagotoniques. Enurésie.

Présentation. — Granules à 1 cgr. de chlorhydrate d'Éphédrine naturelle.

Posologie et mode d'emploi. — *Asthme.* 2 à 3 granules le plus près possible du début de la crise.

Répéter cette dose 25 minutes après, si pas d'amélioration nette.

Traitement de fond : même dose, le matin au réveil et le soir vers 4 heures.

Hypotension permanente: 4 granules par jour en 3 fois, par séries de 10 à 12 jours.

Urticaire : 3 à 6 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. — (Tél. : Nord 40-58.)

ÉPHÉDRISOL BÉRAL

Hydrolat d'Éphédra à 3 p. 100 d'Éphédrine naturelle, sans adjonction d'anal-gésiques.

Pour **pulvérisations** nasales, préventives et curatives des crises d'asthme, du rhume des foins et contre les coryzas, rhinites, sinusites, céphalées et surdités catarrhales, etc...

(Éphédriseur BÉRAL, pulvérisateur de poche, étui métal : 26 francs.)

Prescrire ÉPHÉDRISOL BÉRAL, un flacon : 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRIVAÏNE

Solution aqueuse d'Éphédrine naturelle associée au nitrate de para-aminobenzoyl diéthylaminométhanol et aux essences antiseptiques

Action. — Décongestion, Antisepsie de la muqueuse nasale, Asthme, Coryza, Rhumes des foins, Sinusites, Affections congestives du rhino-pharynx, Infections grippales.

Composition :

Sulfate d'Éphédrine naturelle	0,75
Nitrate de para-aminobenzoyl-diéthylaminométhanol.....	0,30
Sérum isotonique stabilisé, saturé d'essences aromatiques et antiseptiques Q. S. pour	100 gr.

Prix au public : 18 fr. 75.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Diffusion strictement médicale.

Enregistré au Lab. national de Cont. des Médicaments. N° 888.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

ÉPHÉDROCURE

Pommade nasale.

Formule. — Chlorhydrate d'éphédrine : 1 gr. ; Chlorhydrate d'amylène : 0,20 ; Soufre précipité : 0,25 ; Métadioxyphénol : 0,30 ; Camphre : 0,40 ; Sulfo-ichtyolate d'am., 0,25 ; Baume du Pérou : 1,50 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 1 gr. ; Excipient non mentholé, Q. S. pour 10 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza, rhinite, ozène, sinusite, affections des voies respiratoires.

Présentation. — Tube avec embout spécial à injection nasale.

Enfants et adultes : Introduire 2 à 4 fois par jour gros comme un pois de la pommade dans chaque narine.

Prix au public : 12 fr. 0.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous le n° 888-6.

Solution huileuse :

Formule. — Ephédrine base : 0,50 ; Paraforme : 0,40 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 2,60 ; Myrtol : 0,30 ; Huile essentielle de lavande vraie : 0,55 ; Métadioxyphénol : 0,12 ; Huile d'olive médicinale neutre et stérilisée, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza, sinusite, céphalée, ozène, prophylaxie de l'asthme et de l'emphysème (en pulvérisations ou en instillations).

Présentations :

a. **Ephédrocure Huile.** — Flacon de 30 cc. (à compte-gouttes nasal intérieur) pour instillations. *Enfants et adultes :* III à VI gouttes dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

Prix : 18 fr. 75.

b. **Pulvo-Ephédrocure.** — Flacon (avec pulvérisateur spécial). En Pulvérisations : 3 à 4 fois par jour dans chaque narine.

Prix : 25 francs. Flacon de recharge : 15 fr. 50.

Enregistrés au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous les n°s 888-5.

Rhino-Capsules :

Même formule que la solution huileuse (L. N. C. M. 888-9).

Indications. — Traitement préventif de la grippe, du coryza, du rhume des foins, de la sinusite, de l'asthme et de toutes les affections du rhino-pharynx.

Présentation. — Boîte de 20 capsules nasales longues.

Enfants : 1/2 capsule dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Adultes : 1 capsule dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

Prix au public : 14 fr. 05.

Comprimés :

Forme A. — 0,015 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée par comprimé.

Forme B. — 0,025 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée par comprimé.

Indications. — Asthme, Rhume des foins, Rhinites, toux spasmodiques, Bronchites chroniques, Etat d'hypotension.

Prix : Forme A, 13 fr. 90. Forme B, 16 fr. 05.

Enregistrés au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous les n°s 888-7.

(Publicité exclusivement médicale.)

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

ÉPHÉDROÏDES BÉRAL

Comprimés à 3 centigr. d'Éphédrine naturelle Béral.

Indications. — Toutes celles de l'Éphédrine naturelle.

Posologie et mode d'emploi. — Débuter par un Éphédroïde pris dès les premiers symptômes avant-coureurs de l'accès d'asthme ou dans les 2 heures précédant cet accès. Renouveler la dose si l'effet est insuffisant. La dose utile une fois établie (elle est souvent de 2 Éphédroïdes), donner cette dose en une fois lors des accès ultérieurs.

En période de crise, prendre préventivement un Éphédroïde le matin.

Chez les hypocardiotoniques et les sujets enclins aux palpitations, remplacer les Éphédroïdes par les comprimés d'Éphédratine qui évitent les palpitations.

En cas d'insomnie ou d'agitation, remplacer les Éphédroïdes par les comprimés d'Éphédroïne qui contiennent les correctifs appropriés.

Prescrire : Éphédroïdes Béral, un flacon : 14 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDROLÉNOL

Huile non irritante pour les fosses nasales.

Composition : Éphédrine base, camphre, huiles essentielles sélectionnées, véhicule huileux neutralisé et stabilisé par un procédé original.
Se fait à 1 % et à 1/2 % d'éphédrine.

Présentations et mode d'emploi:

Flacon d'huile à 1 %.

Instillations, pulvérisations : 17 francs.

Capsules nasales à 1 %.

Instillations 17 francs.

Flacon d'huile à 1/2 % (éphédro-lénol dédoublé).

Instillations, pulvérisations } 17 francs.
Injections intratrachéales }

Capsules nasales d'huile 1/2 %.

Instillations 17 francs.

Ampoules d'huile 1/2 % de 5 cc.

Injections intratrachéales.. 17 francs.

Pommade (excipient spécial sans vaseline), tube à canule : 12 fr. 65.

Indications:

Coryza, rhinites atrophiques et hypertrophiques, ozène ; sinusites, pharyngites, rhume des foins, végétations adénoïdes et en général toutes les altérations aiguës ou chroniques de la muqueuse nasale.

Asthme. Augmentation de la résonance de la voix chez les chanteurs. L'Ephédro-lénol dédoublé donne des résultats remarquables en médecine infantile. Il peut être employé même chez les nourrissons.

Caractéristiques:

Préparation agréable, non irritante, non toxique.
(Anciennement aux Laboratoires Merlet, à Boulogne.)

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

ÉPHÉDROLYPTOL

Composition :

Solution **aqueuse** d'essence d'eucalyptus de sulfo-camphonate de soude et de Ch^{te} d'éphédrine.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. renfermant 0,01 d'éphédrine pour injections intramusculaires.

Indications :

Toutes les affections aiguës ou chroniques broncho-pulmonaires, Catarrhe bronchique, Asthme, Pneumonie, Bronchopneumonie.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, calmant de la toux et de l'oppression, médicament antigrippal.

Laboratoire MERLET

24, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-91.)

ÉPHÉDROMEL BÉRAL

Sirop mellité contenant un demi-centigramme seulement d'Éphédrine naturelle Béral par cuillère à café.

Indications. — Application de l'éphédrinothérapie à la médecine infantile. Asthme infantile, Coqueluche, Énurésie. Toux spasmodiques des enfants et des adultes.

Posologie.

Jusqu'à 6 ans, 2 à 8 cuillerées à café.
6 à 12 ans, 2 à 8 cuillerées à dessert.
Adultes, 2 à 8 cuillerées à soupe.

Prescrire : ÉPHÉDROMEL

Un flacon : 15 francs.

Laboratoire de L'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRO-RHINOL

à l'Éphédrine végétale lévogyre.

Forme. — Pommade et Solution huileuse.

Composition. — Ephédrine végétale chl., Novocaïne, Linalol du Bois de Rose, Excipient aromatisé.

Indications. — Coryza et Coryza spasmodique, Rhinites congestives, Sinusites, Rhumes des foins, Céphalée d'origine nasale.

Mode d'emploi. — *Pommade* : 3 fois par jour ou plus, gros comme un pois dans chaque narine.

Solution huileuse : En instillations. *Adultes* : V à X gouttes 3 fois par jour dans chaque narine.

Enfants : I à III gouttes, 2 fois par jour.

En pulvérisations avec le pulvérisateur spécial Éphédro-Rhinol.

Prix : Pommade, 13 francs. Solution, 15 fr. 10.

Vaporisateur et solution : 25 francs.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

ÉPHÉIODINE BÉRAL

Élixir de Lobélie à 3 centigr. d'Iodéphédrine par cuillerée à café.

La plus efficace des préparations éphédriques dans les Périodes intercalaires de l'Asthme et contre les Bouffées asthmatiformes des Catarrheux bronchiques et des Emphysémateux.

Dilate les bronches, facilite l'expectoration, soulage toujours. S'applique à tous les cas.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et au début des accès.

Prescrire : ÉPHÉIODINE BÉRAL

Un flacon : 20 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉTROPINE BÉRAL

Comprimés contenant chacun 3 cgr. d'éphédrine associée à hyosciamine, caféine et acide barbiturique.

Contiennent tous les correctifs électifs des effets secondaires de l'Éphédrine.

Sont tout particulièrement indiqués contre l'asthme rebelle avec agitation ou insomnie.

Constituent la préparation de choix pour l'administration de l'Éphédrine le soir, en prévision d'accès nocturnes.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés dans les 2 heures précédant l'accès.

Prescrire : ÉPHÉTROPINE BÉRAL, une boîte.

Prix : 18 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ÉPHOLÉINE

Forme pharmaceutique et composition. — Huile éphédrinée au centième (éphédrine *naturelle* chimiquement pure) avec addition d'acétone-chloroforme et orthoforme. (Flacon de 20 grammes.)

Propriétés. — Vaso-constricteur local à action non irritante, diffusible et durable.

Avantages. — *Décongestionnant* de la muqueuse nasale, outre ses indications particulières, l'Epholéine remplace l'adrénoléine dans les cas d'intolérance individuelle à l'adrénaline.

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foins, Coryza spasmodique, Rhinites congestives.

Mode d'emploi. — En instillations (III ou IV gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour ou en pulvérisations). Chez l'asthmatique, l'ordonner *préventivement*.

Prescription. — Un flacon *Epholéine Falvy*.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél.: Etoile 18-26.)

ÉPHYDION

Éphédrine..Dionine.

Composition. — Association synergique d'Ephédrine naturelle, Dionine, Belladone, Benzoate Na, Drosera et Grindelia. Sous forme de comprimés glutinisés qui se dissolvent dans l'intestin et respectent intégralement l'estomac.

Action thérapeutique. — Antispasmodique, Anti-dyspnéique, Analgésique, Hypnotique léger, Ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — Sédatif puissant de toutes les formes de la toux (Spasmodique, Quinteuse, Coqueluchoïde, Emphysémateuse, Névropathique, Réflexe). Calme remarquablement la toux des tuberculeux et leur assure sans fatigue stomacale repos et sommeil.

Posologie. — Éphydion comprimés : 5 comprimés par jour. 6 à 8 dans les toux rebelles. Grands enfants : 2 à 5 comprimés par jour.

Gouttes Éphydion. — Un cc. ou XXX gouttes = un comprimé. *Enfants* : 2 gouttes par année d'âge 5 à 8 fois par jour.

Sirop Éphydion. — 3 à 4 cuillerées par jour.

Laboratoires du Docteur LAVOUÉ
RENNES (Ille-et-Vilaine).

ÉPICRAL

Ἐπικρασις, action de tempérer les humeurs, et *Ἐπικραταῖος*, fortifier. **Solution iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée** (1 mgr. Arséniate Soude, 2 mgr. Iode organique, 6 mgr. Lactate mercurique, etc..., par cuillerée à soupe).

D'emploi très commode, de saveur très agréable, parfaitement toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

Originalité. — Formule bien spéciale, très active et sans aucun inconvénient, avec lactate mercurique (sel de mercure le mieux toléré), Arsenic, Iode (doses très faibles), citrate de soude (rôle très important), etc...

Propriétés thérapeutiques. — Antisypilitique, tonique, agit très favorablement sur les sécrétions (glandes endocrines, foie, muqueuses...) et sur la circulation (diminue la viscosité sanguine, abaisse la tension, etc.).

Augmente l'appétit et améliore toujours l'état général.

Indications. — Toutes les manifestations de l'Hérédo-syphilis, prophylaxie pendant la grossesse, traitement d'entretien. Ses résultats sont tout particulièrement remarquables dans les troubles endocriniens et de croissance, dans les affections hépatiques, nerveuses et circulatoires. Comme il est tonique, qu'il agit très favorablement sur les sécrétions et la circulation, et que son emploi améliore toujours l'état général, il est très souvent prescrit, avec profit, en dehors de toute manifestation spécifique.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. *Adolescents* : 2 cuillerées à dessert à 2 cuillerées à soupe par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enregistré au Lab^{re} Nat^l de Contrôle des Médicaments sous le n° 699-2.

Prix : 17 fr. 75.

Laboratoires G. LAMBERT O. *, Docteur en Pharmacie
Rue de la Paix — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54.)

ÉPIPALINE

Pommade vitaminée

Augmente la défense naturelle de la peau et active la réparation des tissus.

Compositions. — Huile de Flétan (33 %) particulièrement riche en Vitamines A et D.

Excipient composé exclusivement de produits d'origine animale et végétale, de tolérance parfaite.

Propriétés. — Action puissante due à sa pénétration facile dans l'intimité des tissus :

1° Décongestionnante et sédative.

2° Régénératrice et cicatrisante.

3° Anti-infectieuse par la vitamine A (sans adjonction d'aucun antiseptique).

Indications. — Lésions cutanées banales, dermites aiguës, intertrigo, érythème des nourrissons, crevasses du sein.

Brûlures de quelque origine qu'elles soient.

Radiodermites accidentelles ou thérapeutiques.

Plaies atones, ulcérations chroniques, ulcères variqueux.

Affections gynécologiques, ou obstétricales.

Affections anales, hémorroïdes, fissures douloureuses.

Affections rhino-pharyngées.

Enregistré au Laboratoire de contrôle sous le N° 1050-4.

Prix de vente : Le tube 12 fr.

Laboratoire du Docteur JOUVE

16 bis, rue Dufrenoy — PARIS (XVI^e) (Troc. : 69-87.)

ÉQUISÉTOL

Médication végétale des déficiences fonctionnelles du foie.

Composition. — Prêle, Romarin, Artichaut, Eucalyptus, Polypode, Saponaire.

Forme. — Granulé fondant, aromatique, agréable.

Propriétés. — Stimulant rationnel et doux de la fonction hépatique, ne provoquant jamais de réaction douloureuse vésiculaire.

Indications. — *Insuffisance hépatique*, congestion chronique du foie, cholémie familiale, états gastro-hépatiques, cholélithiase.

Posologie. — 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, avant les repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences,

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

ÉRANOL

Iode colloïdal physico-chimique à micelles de sens électropositif.

La première préparation d'iode présentée sous la forme micellaire.

L'*Éranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode non combiné, en milieu aqueux, à l'état colloïdal (mouvements browniens), non caustique ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Éranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa haute teneur en iode (10 p. 1 000), sa parfaite tolérance (enfants, vieillards) et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Résultats thérapeutiques inégalés. Jamais d'iodisme.

Indications. — Toutes celles de la médication iodée : Lymphatisme, Hypertension, Arthritisme, Rhumatismes, Prétuberculose, Tuberculoses torpides, Mycoses, Basedow, Goitre, Angor, etc.

Forme. — Flacon, avec compte-gouttes.

Mode d'emploi et Posologie. — Pendant les repas ou entre les repas, dans du vin, de l'eau rougie et toute boisson.

Adultes : XX à L gouttes et plus, deux fois par jour.

Enfants : II à V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

Nourrissons : II à V gouttes *pro die*.

Laboratoire de L'ÉRANOL

45, rue de l'Échiquier — PARIS (X^e).

(Tél. : Provence 48-40.)

ERCERHINOL

Composition. — Argent colloïdal électrique.

Propriétés. — Bactéricide puissant. Traitement pratique, rapide et propre.

Indications. — Grippe, Infections broncho-pulmonaires, Catarrhe naso-pharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

Forme. — Ampoule nasale de 25 cc. avec tétine. Ampoule de rechange de 25 cc., sans tétine.

Posologie. — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

Prix. — Ampoule complète : 18 francs ; Ampoule de rechange : 13 francs (8 jours de traitement).

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
1, avenue de Villars — PARIS.

ERGÉPATINE

Médication hépatique de drainage et de désintoxication
des voies digestives.

Peptone de viande purifiée.....	2 gr. 14	Extrait mou de Boldo ..	0 gr. 28
Peptone de poisson.....	1 gr. 28	Extrait sec d'Artichaut.	0 gr. 20
Peptone d'œuf.....	0 gr. 85	Salicylate de soude.....	1 gr. 70
Sulfate de magnésie deséché	14 gr. 20	Charbon animal décyannuré	2 gr. 28
Extrait mou de Genièvre	0 gr. 28	Podophyllin	0 gr. 028
		Sucre parfumé Q. S. p.	100 gr.

Granulé fin, agréable, très soluble. Prix : 18 francs.

Contenance de la boîte 125 gr. env.

Particularités. — Association des 3 peptones au Sulfate de magnésie, au Salicylate de Soude, et aux extraits végétaux (boldo, artichaut, genièvre) ; antiseptique (charbon) et laxatif.

Emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin et à midi.

Indications. — Maladies du Foie et des voies biliaires. Intoxications. Anaphylaxie. Maladies de la peau. Urticaire. Migraines. Constipation par insuffisance biliaire.

Agréable au goût, indiqué chez la femme et chez les enfants.

J. C. ARNAULT
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (Oise).
O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

ERGOPHOS

Principes actifs. — Ergostérine irradiée, Acide orthophosphorique, Phytosphosphine (sel calco-magnésien de l'acide anhydro-oxyméthylène diphosphorique).

Indications. — Carences vitaminiques D (Rachitisme), Carences phosphocalciques (Ostéomalacie, tétanie, caries dentaires, fractures à consolidation lente, état pré tuberculeux).

Formes : A = *Solution* concentrée.

B = *Gouttes* (enfants de 1 an à 8 ans).

Mode d'emploi :

Solution : 1 cuillerée à café à chacun des 2 principaux repas, diluée dans un grand verre d'eau mélangée ou non de vin, sucrée de préférence.

Gouttes : III gouttes par année d'âge, à chacun des 2 principaux repas, comme ci-dessus.

Prix :	{	Solution	19 fr.
	{	Gouttes	16 fr.

Durée du traitement : 15 à 20 jours.

Laboratoires S. A. R. L. au capital de 100 000 fr.

C. CHAMARD et **R. NIEL**
 Ex-Inspecteur des Pharmacies Docteur en Pharmacie
 3, rue Royet — LYON-CALUIRE
 Tél. : Burdeau 23-31.

ERGORONE

Solution glycéro-alcoolique de vitamine D cristallisée titrée à 12.000 unités internationales par cm³, soit 400 unités pour une goutte.

Indications. — Rachitisme, Spasmophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse. Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant.

Présentation et posologie. — Flacons de 15 cm³.

Nourrissons : III à IV gouttes par 24 heures.

Enfants : VI à X gouttes par 24 heures.

Adultes : X à XX gouttes par 24 heures.

Prix de vente : Le flacon : 17 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
 21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
 (Tél. : Balzac 22-94.)

ERGOTINE BONJEAN

Contient les principes actifs de l'ergot de seigle extrait par un procédé spécial.

(Procédé Bonjean, approuvé par l'Académie de médecine.)

Indications thérapeutiques. — Hémorragies de toutes natures : utérines, pulmonaires, gastro-intestinales. Fibromes, Hémorroïdes, Métorrhagies, Hémoptysies, Rétentions urinaires.

Formes. — Ampoules injectables indolores de 1 cc. dosées à 0 gr. 15 d'Ergotine Bonjean par ampoule, et correspondant à 1 gramme d'ergot de seigle.

Dragées : Chaque dragée correspond à 0 gr. 15 d'extrait mou ou 1 gramme d'ergot de seigle.

Extrait mou : pour préparations magistrales.

Solution : XV gouttes correspond^t à 0 gr. 15 d'Ergotine.

Posologie. — *Adultes.* — Ampoules : suivant le succès de son action (1 à 4 par jour). La boîte de 6 amp. : 17 fr. Dragées : 4 à 6 par jour avant chaque repas.

Le flacon de 30 dragées : 15 fr. 50.

Solution : XV gouttes, 4 à 6 fois par jour.

Le flacon de 30 grammes : 12 fr. 50.

Enfants : 1/2 dose.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 29-29.)

ERYSULFURE ÉON

Composition. — Monosulfure de Sodium à odeur et saveur dissimulées, Erysimum, Aconit, Goudron. Sirop stable, facile à prendre.

Propriétés. — H² S assainit l'arbre respiratoire ; régularise les sécrétions, les active et les fluidifie, ce qui facilite l'expectoration, ou les diminue si elles sont exagérées.

Indications. — Fragilité ou irritation chronique des voies respiratoires supérieures et moyennes.

Soins de la Gorge. Rhino-pharyngites. Spécifique de l'enrouement et de l'extinction de voix.

L'Erysulfure pourra réussir dans certaines formes de toux et bronchites persistantes, de catarrhes, d'asthme. Permet de combattre la fréquence des Rhumes ; les suites de grippe, de coqueluche.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Jeunes gens : 1 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour. Si possible avec une boisson chaude et une heure avant ou deux heures après les repas.

Enregistré au L. N. C. M. et autorisé pour Assurances Sociales.

Prix du flacon : 18 fr. 75.

Laboratoire ÉON, à DINAN (Côtes-du-Nord).

ÉRYTHÉMA

(Pommade)

Médication rationnelle des épidermes lésés.

Composition. — Pommade à base de Calcium, Magnésium et Extrait d'Aunée.

Indications. — Toutes lésions de l'épiderme, Dermatoses aiguës et chroniques, en particulier : Érythèmes des nourrissons, Crevasses des seins, Eczémas, Prurit, etc...

Présentation. — Pommade en tube.

Posologie. — Une application matin et soir.

L'Érythéma ne tache pas.

Laboratoires de l'ÉRYTHÉMA

139, rue Jean-Jaurès

MAISONS-ALFORT (Seine).

(Tél. : Entrepôt 13-97.)

ÉRYTHRA

Chimiothérapie élective de la ROUGEOLE

Lactate d'amidopyrine pur à pH = 3,2.

Solution titrée : 1 goutte = 1 cgr.

Antithermique puissant, bien toléré par les enfants, même à dose élevée, sans action secondaire sur le rein.

Indications :

ROUGEOLE

Fièvres éruptives, saisonnières, septiques.

Arrête la poussée fébrile,

Abrège l'évolution,

Évite les infections secondaires.

(Thèse Boz, Paris, 1933.)

TYPHOÏDE

plus pratique que les bains froids, abaisse efficacement la température, augmente la résistance de l'organisme. (Thèse Bernard, Paris, 1935.)

GRIPPE

Néuralgies, migraines, lumbagos.

Zona, rhumatisme articulaire aigu.

Le plus maniable des antithermiques.

Posologie. — Administrer dans de l'eau sucrée ou de l'eau gazeuse.

Rougeole :

Enfants : IV gouttes par année d'âge. } toutes les
Adultes : L à LXXX gouttes. } 4 heures.

Typhoïde :

Enfants : IV gouttes par année d'âge. } toutes les
Adultes : L à LXXX gouttes. } 8 heures.

Grippe, pyrexies, algies :

Enfants : I à II gouttes par année d'âge. } toutes les
Adultes : XXX à LX gouttes. } 6 heures.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales.

Société d'Applications Pharmacodynamiques
39, B⁴ de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).
(Invalides 43-60.)

ÉTHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN

Composition. — Éther sulfurique pur à 66° du Codex français.

Indication. — Anesthésique général.

Présentation et prix :

a. Ampoule de 50 gr. : 13 fr. 85.

— 100 — : 19 fr. 15.

b. Flacon de 50 gr. : 6 fr. 90.

— 100 — : 11 fr. 70.

— 125 — : 13 fr. 85.

— 250 — : 21 fr. 30.

Société Française de Produits Pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ÉTHYL-PNEUMINE « LERSAM »

Spécifique des affections pulmonaires aiguës.

Composition. — Solution d'alcool éthylique pur à 33 p. 100 en milieu glucosé isotonique.

Forme pharmaceutique. — Ampoules de 10 cc.

Indications thérapeutiques. — *Traitement efficace de toutes les pneumopathies les plus graves : pneumonies, broncho-pneumonies, congestions pulmonaires, bronchites, abcès du poumon, gangrène pulmonaire.*

Maladies infectieuses et complications pulmonaires : septicémies, fièvres puerpérales, coqueluche, grippe, etc.
Traitement des intoxications barbituriques.

Doses. — *Adultes : Cas graves : 20 à 40 cc. par voie intraveineuse ou intramusculaire, répétées tous les jours.*

Cas moyens ou légers : 10 cc. par voie intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours.

Enfants : Au-dessous de 6 ans : 5 cc.

Au-dessus — : 10 cc.

Prix. — La boîte de 6 ampoules : 23 fr. Admis aux A. S.

Échantillons, Littérature :

Laboratoires INGÉ

14, rue Maublanc,
PARIS (XV^e).

EUBINE

Composition. — Chlorhydrate de dihydrooxycodénone.

Propriétés. — Remplace la morphine. Absence d'accoutumance. Quatre fois moins toxique. Injection indolore.

Indications. — Toutes douleurs, cancer, tuberculose, coliques hépatiques et néphrétiques, douleurs fulgurantes et crises gastriques du tabès, névralgies, sympathalgies.

Son action est particulièrement favorable dans les crises douloureuses accompagnées de vomissements.

Présentation :

- 10 ampoules à 2 centigrammes.
- 10 ampoules à 1 centigramme.
- 10 suppositoires à 2 centigrammes.
- 20 cachets à 2 centigrammes.

Les ampoules et les cachets sont inscrits au tableau B. La prescription des suppositoires est libre.

Posologie et mode d'emploi :

Chirurgie : Injecter $\frac{3}{4}$ d'heure avant l'opération une ampoule de 2 centigrammes, et $\frac{1}{4}$ d'heure avant une ampoule de 1 centigramme.

Laboratoire KOEHL Y

18, rue de Ménilmontant — PARIS
(Tél. : Ménil. 63-95.)

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique broncho-pulmonaire).

Formules et posologies:

AMPOULES	Ampoules de 1 cc. (Par ampoule.)	Ampoules de 2 cc. (Par ampoule.)	Ampoules de 5 cc. (Par ampoule.)
Eucalyptol.....	0 gr. 20	0 gr. 40	1 gr.
Gaïacol.....	0 gr. 025	0 gr. 05	0 gr. 125
Ac. phénique..	0 gr. 01	0 gr. 02	0 gr. 04
Camphre.....	0 gr. 10	0 gr. 20	0 gr. 25

La solution injectable existe également sous forme *non gaïacolée*.

Pour injections intramusculaires profondes :

Adultes : 1 à 5 cc. par jour.

Enfants : 1 à 3 cc. suivant l'âge et le cas.

CAPSULES	SIROP	SUPPOSITOIRES
Eucalyptol. .. 0,10	Essence déterpénée d'eucalyptus. 0,025	Eucalyptol ... 0,12
Gaïacol 0,025	Phénol - sulfonate de sodium 0,15	Ac. phénique. 0,01
Ac. phénique.. 0,005	Campho-sulfonate de sodium 0,25	Camphre..... 0,05
Camphre..... 0,012	Gaïacol-sulfonate de potassium... 2,50	Gaïacol..... 0,05
Éther 0,012	Codéine..... 0,10	Codéine..... 0,01
Codéine 0,005	Bromoforme . 0,10	Larocaïne... 0,001
Bromoforme .. 0,005	Teinture de :	
Pour une capsule.	Belladone. } aa 0,50	Pour un suppositoire.
	et Aconit. }	
	Pour 100 grammes.	
6 à 9 par jour, soit :	<i>Adultes</i> : 4 cuillerées à	<i>Adultes</i> : 1 à 4 par
2 à 3 à chaque repas.	soupe par jour.	jour.
	<i>Enfants</i> : par cuillerée	<i>Enfants</i> : 1 à 2 par
	à café ou à dessert	jour.
	suivant l'âge et le cas.	

Indications. — *Toutes les Affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, certaines formes de Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses, Coqueluches, Absès du poulmon.*

Dans le traitement de la Coqueluche chez le nourrisson et l'enfant : émulsionner le contenu d'une ampoule de 2 cc. dans 1/2 verre d'eau de guimauve et donner chaque jour en lavement à conserver.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

EUCHOL INJECTABLE

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 5 cc.

Composition. — Complexe actif retiré de l'extrait de *Cynara Scolymus Euchol* 0 gr. 15 par ampoule de 5 cc.

Nota. — Ce corps est l'un des principes actifs de l'*Euchol* qui se trouve dans le commerce sous forme de comprimés depuis de nombreuses années. Il a fait l'objet dans notre laboratoire d'une étude attentive d'extraction et de dosages définis, suivie d'une expérimentation physiologique rigoureuse d'abord sur cobayes et lapins, puis sur l'homme par plusieurs médecins des hôpitaux de Paris.

Provoquant des shoks à l'état naturel, ce corps a été légèrement modifié chimiquement et est devenu de ce fait tout à fait inoffensif tout en conservant ses propriétés thérapeutiques.

Propriétés thérapeutiques. — Ce corps active les fonctions du foie par contact immédiat et sanguin avec cette glande.

Comme conséquence de son action tonique cellulaire hépatique, signalons l'élimination plus intense de l'urée sanguine et la diurèse uréique.

Il augmente le pouvoir dissolvant du sérum sanguin vis-à-vis du cholestérol et évite ainsi le premier stade de la sclérose des parois artérielles.

Indications. — Insuffisance hépatique à syndrome hépato-rénal ; Cirrhose avec ascite ; Cholémie familiale ; Lithiase biliaire et rénale ; Migraines hépatiques ; Hypercholestérinémie ; Hypertension ; Brightisme ; Petite urémie de Widal.

Posologie. — Une injection intramusculaire, en général tous les deux jours (prendre six comprimés d'*Euchol* pendant le jour intercalaire).

Nota. — L'*Euchol injectable* peut être donné aussi par voie buccale ou en lavement.

Voie buccale.

Une ampoule par jour.

(Jusqu'à 10 ans) une 1/2 ampoule.

Voie rectale.

Adulte : Deux ampoules.

Enfants : Une ampoule (à ajouter à une décoction de guimauve).

L'*Euchol injectable* (remboursable par les Assurances Sociales) est fabriqué par le

Laboratoire MORELLET, à Bagnoles-de-l'Orne.

J. MORELLET, ancien interne
des Hôpitaux de Paris.

EUCHOL MORELLET

Comprimés.

Composition. — Extrait stabilisé sec de cynara. (artichaut), 0 gr. 30 par comprimé.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés :

Tonique hépatique cellulaire.

Cholérétique.

Décongestionnant des voies biliaires.

Abaisse le taux de l'urée dans le sang.

Lutte contre les dépôts tissulaires de cholestérine.

Diurétique puissant.

Remarque. — L'EUCHOL ne contient toujours que de l'artichaut. Il est le *premier* et il a été le *seul* jusqu'à fin 1933 à ne contenir que de l'artichaut.

Posologie. — 4 à 6 comprimés à avaler par jour. Dose de 2 comprimés au moment des repas.

Indications :

Ictère catarrhal.

Cholécystite et angiocholite.

Toute insuffisance hépatique.

Cholémie familiale.

Cirrhose.

Lithiase biliaire et rénale.

Coliques

Congestions

Migraines

Constipation

Intoxications

Urticair

Arthritisme

Cholestérinémie.

Etats uricémiques, hypertension.

8 à 11 jours de traitement par boîte.

Enregistré sous le n° 336-1 au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (remboursable aux Assurances Sociales).

Laboratoire MORELLET

J. MORELLET, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Paris.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
BAGNOLES-DE-L'ORNE (Orne).

EUGLYMA

Forme. — Solution titrée de chlorure de magnésium pur, de goût agréable.

Composition. — XXXV gouttes renferment 0 gr. 60 de chlorure de magnésium pur.

Indications. — Asthénies, Dépressions neuromusculaires, Dermatoses, Lésions du type précancéreux, Prophylaxie du cancer, Affections dues au mauvais fonctionnement des voies digestives, biliaires et rénales.

Particularités. — Mauvais goût du chlorure de magnésium absolument masqué.

Posologie. — XXXV gouttes midi et soir, avant le repas dans un demi-verre d'eau.

Échantillons sur demande.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreux — PARIS (II^e).

(Tél. : Louvre 53-16.)

EUGYNOL GRANDVAL

Composition :

Association d'extraits d'Hydrastis-Hamamelis-Viburnum Gossypium.

Propriétés thérapeutiques. — Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les palpitations et provoque l'élimination des toxines.

Vaso-constricteur par excellence ; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la femme.

L'Eugynol permet d'enrayer la formation des Varices ; soit au moment de la grossesse, soit au retour d'âge.

Il rétablit la régularité des règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

Indications thérapeutiques. — Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorragies, Flux sanguins de toute nature, Eruptions diverses, etc.

Dose. — XV à XX gouttes avant chaque repas. On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 10 fr. 65. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12, 14, rue Féry — REIMS. (Tél. : 31-63.)

EUNÉRYL

Médication de l'anxiété et des dystonies neuro-végétatives, antispasmodique et tonique.

Composition :

Phényléthylmalonylurée soluble.....	4 grammes.
Hyposulfite de magnésium.....	10 —
Extrait fluide d'Adonis vernalis.....	16 —
Excipient.....	Q. S. pour 100 grammes.
X gouttes — 0,01 de phényléthylmalonylurée.	

Propriétés thérapeutiques :

La phényléthylmalonylurée, obtenue en Solution rigoureusement stable par un procédé spécial, est mieux assimilée et agit à doses plus réduites.

L'hyposulfite de magnésium, régulateur du tonus vago-sympathique, est un stimulant qui permet d'éviter la légère action dépressive de la phényléthylmalonylurée. De plus, grâce à l'antagonisme, existant entre le magnésium et le potassium, le magnésium procure la sédation des phénomènes d'hyperpotassiémie avec décharge d'adrénaline notés chez les émotifs.

Enfin, l'Adonis vernalis, en plus de ses propriétés cardiotoniques et diurétiques, exerce une action sédative sur certains centres moteurs cérébraux et médullaires régissant le système musculaire (Masslow).

Indications :

Dystonies neuro-végétatives, anxiété, hyperémotivité, instabilité, irritabilité, syndrome solaire, légères insomnies, cauchemars, convulsions, etc...

Formes. — Gouttes.

Posologie :

Adultes : L à LXXX gouttes par jour,

Enfants : XV à XXX — — —
en trois fois avant les repas.

Nourrissons : V à XX gouttes.

En lavement : Doubler les doses.

Prix. — Le flacon de 20 grammes (800 gouttes) :
17 fr. 20.

Laboratoires BIOLABO

9, bd, Malesherbes — PARIS (VIII^e). (Tél. : Anjou 61-61.)

EUONYMINE PAUL THIBAUT

Pilules d'Euonymine purifiée, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Evonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

Indications. — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

Posologie. — Pilules dosées à 0 gr. 02 d'Evonymine, de l'*Atropurpureus americanus*, et à 0 gr. 02 d'extrait de boldo — 1 à 4 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

Prix : 9 fr. 65.

Pour un traitement de 15 à 30 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Nota. — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Euonymine Paul Thibault*.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-2.

EUPAVÉRYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine
chimiquement pur.

Indications. — Spasmes viscéraux, Asthme, Coqueluche, Déséquilibres vago-sympathiques.

Présentations :

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.

Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.

Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

Posologie :

Adultes : de 0 gr. 05 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

Enfants : 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

Ampoules. Prix : 15 fr. 60.

Gouttes. Granules. Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

(Tél. : Laborde 16-72.)

EUPEPTIQUE MONAVON

Composition. — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

Pepsine pure	0 gr. 12
Diastase	0 gr. 15

Propriétés thérapeutiques. — Digère les viandes et les féculents.

Avantages. — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

Indications. — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau. Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 20 fr. 75.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : codéine 0,02 + Teinture rac. aconit 0 gr. 20 ; formiate sodique, 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indications thérapeutiques et posologie. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonies, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants, ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

Prix : Sirop : 16 fr. 50 — Prix : Pastilles : 7 fr. 30
(8 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12

A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien,

4, avenue Orban.

EUPHORYL

Dragées. Cachets. Intraveineux.

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

Formule. — Thiosulfate de sodium et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

Indications. — *a.* Dermatoses prurigineuses : Eczémas secs et suintants, érythrodermies, dermites alimentaires, médicamenteuses et professionnelles. Psoriasis, toxidermatoses, accidents de l'aurothérapie.

b. Prurits essentiel, toxique, génital, sénile, parasitaire.

c. Manifestations anaphylactiques : Urticaire, migraines, œdème de Quincke, maladie sérique, chocs anaphylactiques.

Posologie. — *Cas moyens* : 3 cachets ou 6 dragées par 24 heures.

Cas aigus : 1 injection intraveineuse bihebdomadaire avec prise de 2 cachets ou 4 dragées, les jours intercalaires.

Nota. — Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

Prix : cachets : 20 fr. 75 ; dragées : 20 fr. 75 ; intraveineux : 20 fr. 75. et 35 francs.

Laboratoires ANA,

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dor. 52-12.)

EUPHORYL-INFANTILE

Granulé soluble.

Traitement des troubles digestifs de l'enfance et de leurs complications cutanées. Anaphylaxie alimentaire.

Formule. — Thiosulfates alcalins, Citrate de sodium, Lactate de magnésium, en combinaison bromurée silicatée.

Présentation. — Granulé soluble de goût agréable, facilement accepté par les enfants les plus jeunes.

Indications. — L'Euphoryl Infantile est particulièrement indiqué dans trois groupes d'affections infantiles.

1^o *Dermatoses prurigineuses.* — Eczémas secs ou suintants, eczémas dysidrosiformes, eczémas séborrhéiques, séborrhée, dermites médicamenteuses, érythrodermies, toxidermatoses, strophulus, prurits, herpès, trichophyties, pityriasis.

2^o *Troubles digestifs.* — Anorexies, Vomissements, État saburral des voies digestives, Intoxications alimentaires, constipation des nourrissons. Petite insuffisance hépatique.

3^o *Anaphylaxies.* — Urticaire, migraines, œdèmes de Quinke.

Posologie et mode d'administration. — L'Euphoryl Infantile doit être prescrit à la dose de 1 cuillerée à café par année d'âge. Il peut être croqué ou dissous dans une petite quantité d'eau ou de lait. Chez les nourrissons il se dissout aisément dans les biberons.

Prix : 20 fr. 75.

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dor. 52-12.)

EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux et des Dystonies du sympathique.

Forme. — Solution.

Composition. — Une cuillerée à café contient:

Crataegus oxyacantha.....	31 centigr.
Extrait fluide de passiflora incarnata	50 —
Extrait fluide de Paullinia sorbilis	16 —
Extrait mou de Valeriana officinalis	12 —
Alcoolature de Ballota nigra.....	98 —

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Indications. — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie, Angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses, Angoisse de la ménopause.

Propriétés thérapeutiques. — L'Euphytose est antispasmodique par la Ballote. Elle est tonocardiaque par le *Crataegus oxyacantha*. Par la Passiflore, elle est sédative de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au *Paullinia sorbilis* (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'Euphytose, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'Euphytose représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 09-83.)

EUPLASTYL

Forme. — Pommade très pénétrante, demi-grasse, ne formant pas de croûte, et sans odeur.

Indications. — Calmant instantané de tout prurit ou douleur, antiseptique puissant, cicatrisant extraordinairement rapide.

Toutes lésions cutanées : ulcères, brûlures, eczéma secs, prurits, impétigos, etc...

Composition. — Huile de chaulmoogra, sulfo-ichtyolate d'ammoniaque, sulfate de cuivre, para-aminobenzoate de butyle, oxyde de zinc et de titane.

Mode d'emploi. — En couche épaisse sur la lésion.
Le tube normal : 5 fr. 20.

Le triple tube pour dermatoses étendues ou rebelles :
14 fr. 50.

La poudre EUPLASTYL, au prix de 5 fr. 20 la boîte, complète utilement l'action de la Pommade, très efficace pour le poudrage des bébés, pour les dermatoses bénignes et pour la transpiration excessive.

Laboratoire SICA

R. MICHY, Pharmacien,

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).

EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

Dose et mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et le soir, au commencement des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage d'eau, de lait ou de bière.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique, toni-cardiaque et respiratoire.

Indications. — Asthme, Emphysème, Oppressions, Bronchite chronique, maladies du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropisies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suite de la Grippe.

Prix : 18 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Galv. 86-17.)

EUPNOGÉNOL

Forme. — Élixir.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures pour les adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

Prix du flacon : 18 francs.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par le laboratoire de
l'Eupnogénol.

F. VELLAY

Pharmacien de 1^{re} classe

116, avenue Berthelot
VIENNE (Isère).

EUPNOL (Poudre et Pastilles)

Asepsie des muqueuses des premières voies respiratoires (nez et gorge).

Composition. — Menthol, terpinol, eucalyptol, essence de pin sylvestre, acide benzoïque.

Propriétés. — Décongestionnant, désinfectant non caustique, non toxique des fosses nasales, du pharynx et de la trachée.

Indications. — Oto-rhino-laryngologie, rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, trachéites.

Mode d'emploi. — a. Poudre : 1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalations, lavages et gargarismes.

b. Pastilles : Sucrer 8 à 10 par jour.

Prix : Poudre, le flacon : 16 francs.

Pastilles : 5 fr. 90 la boîte.

L. N. C. 314-33 et 34.

Laboratoires ECHÉMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 14-14.)

EUPNOPHÉDROL

Gouttes pour instillations nasales.

Présentation. — Flacon avec compte-gouttes spécial.

Composition. — Ephédrine base, 0 gr. 50 ; Eucalyptol, Goménol, Chlorétone, Essence de lavande, Huile neutralisée, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Coryza, Rhume des foins, Asthme et Asthme nasal, Congestions fluxionnaires avec Migraines d'origine nasale, Sinusites, Rhinites suppurées.

Mode d'emploi. — V à X gouttes dans chaque narine 3 ou 4 fois par jour. Le produit peut également servir en pulvérisations nasales.

Prix. — Le flacon : 14 fr. 40.

L. N. C. n° 314-37.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. Marcadet 14-14.)

EUPULMOL

Traitement par voie rectale des Affections pulmonaires aiguës.

Composition. — Pour 250 cc. : 8 cc. de goménol, 8 cc. d'éther sulfurique, 4 mgr. de strychnine sulf., 4 gr. de camphre, 60 gr. d'huile d'olive stérilisée. Emulsion à la gomme adragante.

Eupulmol réalise une émulsion parfaite du goménol associé aux tonocardiaques.

Eupulmol antiseptique des voies respiratoires. Tonicardiaque. Véritable spécifique des Bronchopneumonies.

Indications principales. — Bronchopneumonie, Pneumonie, Bronchite, Coqueluche.

Posologie. — Jusqu'à 1 an : 2 lavements par jour de 1 cuillerée à soupe ; de 1 à 2 ans : 3 lavements de 1 cuillerée à soupe ; de 2 à 4 ans : 4 lavements de 1 cuillerée à soupe ; de 4 à 6 ans : 3 lavements de 1 cuillerée 1/2 ; de 6 à 10 ans : 3 lavements de 2 cuillerées ; *adultes* : 3 lavements de 4 cuillerées.

L'*Eupulmol* se donne pur, en lavements à conserver, à l'aide d'une petite poire en caoutchouc.

Laboratoires de l'EUPULMOL

CHAVATTE, Pharmacien, rue de France — ROUBAIX.

EUQUINARGOL

Formes :

Suppositoires dosés pour bébés et enfants.

— — — adultes.

Composition. — Euquinine, Analgésine, Collargol, Cinéol.

Propriétés. — Analgésiques, Antiseptiques.

Indications — Tous états fébriles, infectieux et pulmonaires.

Doses. — 1 ou 2 suppositoires par 24 heures, suivant la température.

Prix : *Bébés, enfants* : 11 francs.

Adultes : 13 francs.

Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

EURINASE (Pilules)

Composition :

Hexaméthylène tétramine	0,06
Benzoate de lithine	0,050
Chlorhydrate de tétraméthylthionine ...	0,002
Excipient dont Carbonate de magnésium.	Q. s. p. une pilule

Propriétés. — Antiseptique et désinfectant des voies urinaires, dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Pyélite, pyélonéphrite, colibacillurie, cystite, prostatite, orchite, hypertrophie prostatique, catarrhe vésical, blennorrhagie chronique, pyurie, coliques néphrétiques, lithiase rénale, goutte, rhumatisme chronique, arthritisme, lumbago, colibacillose.

Présentation. — Une boîte de 75 pilules : 20 francs, pour un traitement de 9 à 12 jours.

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour.

Notices et Échantillons sur demande.

SUPPO-EURINASE

Composition :

Novocaïne	0,01	} anti-douleur.
Extrait de belladone	0,02	
Extrait de jusquiame	0,03	
Bleu de méthylène.....	0,04	désinfectant.
Extrait d'hamamélis	0,05	décongestionnant.
Beurre de cacao	Q. s. pour 1 suppositoire.	

Propriétés. — Triple action : anti-douleur, désinfectant, décongestionnant.

Indications. — *Chez l'homme* : Prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, uréthrites, blennorrhagies et leurs complications, orchites, rétrécissements, goutte militaire, douleurs à la miction.

Chez la femme : Métrites, salpingites, métrorrhagies, règles douloureuses, congestions utéro-ovariennes.

Chez l'homme et chez la femme : Néphrites, pyélonéphrites, toutes cystites aiguës ou chroniques, catarrhes de la vessie, colibacillurie, syndrome entérorenal, hémorroïdes, congestion du petit bassin.

Présentation. — Une boîte de 8 suppositoires : 16 francs.

Posologie. — *Etats chroniques* : 1 Suppo-Eurinase, le soir au coucher. *Etats aigus* : un Suppo-Eurinase matin et soir.

Notices, Littérature et Échantillons sur demande.

Laboratoires FLEURY — ARCACHON. Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences.

Docteur en Pharmacie, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

EUSEDYL

Suppositoires.

Composition. — Association de : Chl. de méthylcodéine, 0,03 ; ext. de belladone, 0,01 ; bromhydr. de scopolamine, 0,0002 ; phényléthylmalonylurée, 0,03 et d'ouabaïne crist., 0,0005.

Indications. — Toutes les indications de la morphine. Syndromes douloureux abdominaux et pelviens. Névralgies et Myalgies. Néoplasies. Dyspnée, agitation, insomnie des asthmatiques, emphysémateux et cardiaques. Grande et petite chirurgie.

Avantages. — Prescription facile (aucun produit du tableau B). Aucune contre-indication. (Spécialement indiqué chez les insuffisants cardiaques et rénaux).

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures. *Enfants* au-dessus de 8 ans : par 1/3 ou 1/2 suppositoires.

Prix : 18 fr. la boîte normale de six suppositoires ;
54 fr. la quadruple boîte.

Laboratoire de l'EUSEDYL

32, rue des Vallées — COLOMBES (Seine).
(Tél. : Charlebourg 02-45.)

EUSKINE

1° *Crème EUSKINE* (Crème au Stéarate neutre).
Dermatoses irritables. Constitue une crème excellente d'entretien pour les peaux grasses. Remplace avantageusement la vaseline dans ses applications.

2° *Baume EUSKINE faible* (Pommade à l'Ichtyol et goudroline).

Dermatoses subaiguës, eczéma subaigu, eczématides, eczéma variqueux, eczéma anal et vulvaire, eczéma artificiel des mains.

3° *Baume EUSKINE fort* (Pommade au camphre, soufre, goudroline et ichtyol).

Dermatoses sèches, torpides, non inflammatoires.
Eczéma chronique plus ou moins lichénifié.

Tubes de 10 fr. 40.

Laboratoire RICHÉ

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis. — 1, rue d'Enghien
PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée.)

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et dose. — *Comme sédatif* : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 fr. 25.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX°).

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle.

Formule. — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Muscle cardiaque	0 gr. 50
Parenchyme rénal	0 gr. 50
Iodotyrosine	0 gr. 05
Scille	0 gr. 06
Scammonée.....	0 gr. 04

Pour un comprimé.

Doses et mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, athéromateux, néphrite chronique hypertensive, cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension qu'il compense en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

Prix : 22 francs.

14 rue de Clichy — PARIS (IX°).

ÉVATMINE CARRION

Médication adrénalino-hypophysaire de l'asthme.

Composition. — Solution injectable renfermant 1 demi-milligramme d'adrénaline naturelle, associée à l'extrait d'hypophyse.

Forme. — Ampoules de 1 cc.

Indications. — Crise d'asthme, Toux spasmodique.

Contre-indication : hypertension notable.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire au moment des crises 3 à 4 ampoules dans les 24 heures s'il est besoin. S'assurer que l'injection n'est pas poussée dans un vaisseau.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules 1 cc. : 16 fr. 65.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

ÉVINE

Poudre soluble Évine.

Antiseptique, parfumée, alcaline, détersive, décongestionnante, sédative, cicatrisante, non caustique. Ne tache pas.

Indications. — Hygiène intime et journalière de la femme. Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, suivant doses.

Posologie. — 1^o Hygiène féminine : 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède, en injections et lotions ; 2^o Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres eau bouillie (injections, lotions, compresses), précieux adjuvant aux pansements médicaux ; 3^o Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie) ; 4^o Hygiène masculine 1 paquet pour 1 litre d'eau bouillie en bains et lotions ; 5^o Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 litre d'eau bouillie tiède (bains, lotions compresses).

Ovules Évine.

Puissamment antiseptiques et non irritants, cicatrisants, décongestionnants, désodorisants, fondent à 36^o,5. Ne tachent pas.

Indications. — Toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Un ovule le soir au coucher. Au préalable, prendre une injection avec une solution de Poudre Évine dans de l'eau bouillie tiède. Renouveler cette injection le matin au lever.

Prix : Poudre : 16 fr. 10. — Ovules : 18 fr. 75.

Laboratoires ÉVINE

15, boulevard des Batignolles — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Europe 35-63.)

ÉVOLAXINE

(Le laxatif de la Femme.)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses lipoides ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son mucilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaires, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

Indications. — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatoses, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

Doses. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 13 fr. 55.

Enregistré au L. N. C. M. — Numéro 111-4.

Laboratoires du D^r LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences,

Ancien Chef de Laboratoire, Faculté de Médecine de Paris.
40, rue de Bellechasse — PARIS. (Tél. : Invalides 78-44.)

ÉVONYL

Composition. — Extraits biliaires de glandes intestinales, Évonymine, Fucus, agar-agar, ferments lactiques, podophyllin, belladone, etc., en milieu ergostérique irradié donnant à la synergie médicamenteuse un coefficient supérieur pour sa valeur thérapeutique.

Propriétés. — Laxatif doux, absolument certain. Cholagogue de premier ordre. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

Indications. — Constipation aiguë ou chronique. Insuffisance hépatique, cholécystites, lithiases biliaires, hypertension.

Forme. — Tablettes dragéifiées.

Posologie. — Adultes : Deux tablettes le soir au repas (à avaler sans mâcher).

Enfants : Une tablette.

Prix au public : 15 francs pour un mois.

Laboratoires FLUXINE

Produits Bonthoux

Edm. JOËT, Pharmacien
VILLEFRANCHE (Rhône).

EXENTÉROL

Composition. — Pansement-vaccin intestinal constitué par le mélange extemporané d'une ampoule de vaccin (contenant 65 milliards de bacilles coli, entérocoques, Gærtner, Proteus, Fæcalis, Lactis) et d'une mesure de granulé mucilagineux spéciaux.

Présentation :

Adultes : boîte de 8 ampoules de 10 cc. et 8 doses de granulé mucilagineux : 28 fr. 10.

Enfants : boîte de 8 ampoules de 5 cc., et 8 doses de granulé mucilagineux : 20 fr. 80.

Propriétés. — L'*Exentérol* assure un contact prolongé du vaccin et de la muqueuse. Il favorise d'autre part l'acheminement des matières fécales, évitant ainsi les fermentations intestinales qui accroissent l'infection.

Indications. — Entérites, entérocolites, infections intestinales, syndromes entéro-rénaux, colibacilloses, auto-intoxication.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour.

Échantillons:

Laboratoires du D^r DEBAT,
60, rue de Monceau — PARIS.
Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

EXHEPA

Extrait de foie en poudre.

Agrémenté de goût de bouillon.

Indications. — Anémie pernicieuse et autres genres d'anémie grave, Tuberculose, Convalescence.

Forme. — Tubes contenant l'équivalent de 100 grammes de foie frais.

Boîtes de 5, 10, 20 tubes.

Mode d'emploi. — Délayer la poudre dans un liquide froid ou mieux tiède, mais jamais bouillant.

Posologie. — De 1 à 4 tubes par jour suivant les cas.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX
(Tél. : 80-989).

Dépositaire pour la France et Colonies :
Jean DEDIEU, Pharmacien
39, rue Fondaudège — BORDEAUX

EXOBOL

Guérison de la constipation.

Deux formes : **Émulsion, Comprimés.**

1° Forme émulsion. — Emulsion d'huile de paraffine pure, de goût extrêmement agréable, d'action certaine.

Ne produit aucune action irritante, aucun suintement.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour à prendre au milieu des repas.

Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

2° Forme comprimés. — Mucilages, extrait spécial de foie, boldo et diacétyldioxyphénylisatine, action sûre, ne provoquant pas de coliques ni d'accoutumance.

Posologie. — 1 à 4 comprimés au milieu du repas du soir ou avant de se coucher.

Enfants : moitié ou tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

EXOMÉTALION

Syphilis et Hérédo-syphilis.

Composition :

Sulfate de mercure.....	0,3154
— — cuivre.....	0,0280
— — manganèse	0,0085

Pour 1 cc. quantité en milligrammes.

Solution huileuse de catalyseurs métalliques Cu, Mn, associés à Hg.

Formes : ampoules de 5 et de 2 cc., en boîte de 6 et de 12 Capsules (étui de 20). Elixir. Pommade en pot de 30 et 90 grs. Huile pour injections intrarectales en lavements de 10 cc. à garder de 5 à 6 heures.

Indications. — Gomme, Maux perforants plantaires, Tabes incipiens, Aphasie, Dystrophies osseuses.

L'Exométalion est d'une action remarquable sur les accidents tertiaires et hérédo-spécifiques.

Posologie. — Au début des deux principaux repas, pendant 10 jours, une capsule ou une cuillerée à soupe d'Elixir, arrêt de 5 jours avant de recommencer une autre dizaine. Tous les deux jours, un lavement d'huile à garder 5 à 6 heures, ou piqure intramusculaire de 2 ou de 5 cc. faite très lentement avec aiguille 9/10. Pansement des plaies avec la Pommade.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1024-5.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires des Hormométalions,

50, avenue Jacqueminot — MEUDON (S.-et-O.). (Tél. : Obs. 13-33.)

EXSUGYL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Anhydricum titanicum, Zincum peroxydatum (titre 50), Amylum tritici, Pulvis diatomei, Talcum.

Propriétés. — Poudre éminemment absorbante, anti-prurigineuse, microbicide.

Indications. — Eczémas suintants rebelles, toutes dermatoses avec exosérose, Dermite par irritation.

Mode d'emploi. — Sous forme de compresses de gaze matelassées d'*Exsugyl* dans les affections suintantes.

Demander les brochures des docteurs P. et R. BOURGGRAFF :

Ulères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

EXTENSOPLAST

Albuplast élastique.

Bandes adhésives extensibles en largeur ou en longueur, recouvertes d'une masse adhésive identique à celle de l'Albuplast.

Se présentent en bandes de 1 mètre ou 2 m. 50 de long et de toutes largeurs de 2 à 30 centimètres de large.

Peuvent être livrées :

- | | |
|--|--|
| 1° Entièrement enduites | { extensibles en lar-
geur ou en lon-
gueur. |
| 2° Partiellement enduites (striées) .. | |
| 3° Perforées | |

Indications. — Pansement des ulcères variqueux. Pansements aux articulations. Prévention et traitement de luxations, entorses. Renforcement des articulations (sports d'hiver).

Le type extensible en largeur se prête particulièrement à l'utilisation dans les cas ci-dessus.

Dimensions les plus usuelles : 1 m. \times 3, 1 m. \times 5, 1 m. \times 7, 2^m,50 \times 5, 2^m,50 \times 7, 2^m,50 \times 10 cc.

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie,
Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET
Tél. : Pérelre 57-41.)

EXTRAIT DE BILE LEFRANÇO

Composition. — Extrait sec et soluble de bile de bœuf intégrale, concentrée dans le vide et à froid.

Action. — Les extraits biliaires possèdent une double action:

Hépatique : « Les vrais cholagogues et les meilleurs sont la bile et les sels biliaires » (Professeur Loeper).

Intestinale : La bile agit sur la motilité de l'intestin et sur les sécrétions, elle favorise la formation du bol fécal et son évacuation.

Indications. — *Constipation* : Par sa double action, l'extrait de bile réalise le drainage hépato-intestinal idéal ; c'est le laxatif physiologique par excellence, le seul qui ne soit pas irritant pour la muqueuse. Constipation atonique avec hypocholie.

Insuffisance biliaire : Inappétence, nausées, pesanteur épigastrique et asthénie postprandiale.

Présentation. — Globules glutinisés dosés à 0 gr. 10 d'extrait sec de bile totale correspondant à plus de dix fois son poids de bile fraîche.

Posologie. — 6 à 12 globules par jour, de préférence 10 à 15 minutes avant les repas.

Remboursable aux ASSURANCES SOCIALES

Laboratoires LEFRANÇO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.
Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 4 fr. 15, verre compris.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

EXTRAIT HAMYD

Composition. — Mélange en proportions définies de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Condurango Gmet.

Propriétés. — Vaso-constricteur. Décongestif pelvien et vasculaire. Sédatif gastrique.

Indications. — Tous les troubles de la circulation veineuse. Tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.). Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies réflexes. Constipation des femmes enceintes.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau 1 ou 2 fois par jour.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

EXTRAIT HÉPATIQUE LEFRANCO

Composition. — Extrait intégral de tissu hépatique desséché dans le vide et à froid. Seul extrait renfermant les globulines actives du tissu hépatique et les principes antitoxiques du Foie.

Indications. — Toutes les insuffisances de la cellule hépatique :

- a. Troubles de la fonction biliaire : Ictères, Cholécystites, Cirrhose biliaire, Cholémie.
- b. Troubles de la fonction antitoxique : Dermatoses, migraines, arthritisme, intoxications alimentaires, psychoses autotoxiques ou hétérotoxiques, manifestations anaphylactiques...
- c. Troubles de la Crase sanguine : Hémorragies, hémogénie, hémophilie purpura...
- d. Cirrhoses d'origine toxique ou infectieuse.
- e. Intolérances médicamenteuses.

Présentation. — Globules glutinisés, dosés à 0 gr. 25 d'extrait correspondant à plus de dix fois son poids de tissu hépatique.

Posologie. — 4 à 8 globules par jour, au cours des repas de préférence.

Remboursable aux ASSURANCES SOCIALES

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, av. de Metz. — ROMAINVILLE (Seine). (Tél. : Nord 19-52.)

EXUBYLE

Agent de drainage des voies biliaires. Désensibilisant.

Forme. — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur agréable.

Composition. — Association de peptones (de viande, de poisson, de fibrine), de sulfate de magnésie, d'hyposulfite de soude et d'extrait d'artichaut et de boldo.

Indications. — *a.* Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires : Insuffisance hépatique et biliaire, cholécystite subaiguë, chronique avec ou sans calcul, ictères, congestion du foie, cirrhose.

b. Troubles digestifs d'origine hépatique : Dyspepsies, gonflement, vertiges, nausées, somnolence après les repas, constipation.

c. Etats anaphylactiques d'origine alimentaire : Eczéma, prurit, œdème de Quincke, migraine, asthme, certaines dermatoses, etc...

Particularités. — Cholagogue puissant sans action irritante sur l'intestin.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café le matin à jeun, 1/2 heure avant toute alimentation, dans un demi-verre d'eau tiède.

Prix : 18 francs.

Laboratoire PHYSIA

R. PAULY, Pharmacien,

7, Rond-Point Mirabeau — PARIS (XV^e).

FA-NER-VAL

Facit-nervum-valldum.

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Granulé.

Composition. — Ce granulé contient par cuillère à café : Arrhénal, 0,025 ; teinture de noix vomique, 0,10 ; glycérphosphate de soude, 0,333 ; extrait hyd. alcool. de quinquina jaune, 0,0666 ; extrait aq. de quinquina rouge, 0,0666.

Indications. — Toutes les dépressions du système nerveux et les troubles du grand sympathique.

Doses habituelles. — 1 cuillère à café, 2 fois par jour avant les repas. Cures de 4 semaines séparées par un intervalle de 8 jours.

Prix : 21 fr. 15 pour 8 jours.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 25-51.)

FANGO - FISCH

Forme : présenté :

En poudre et ramené à l'état de boue par addition d'eau. Sous forme de Cataplasme prêt à l'emploi.

Mode d'emploi :

En application directe sur la peau à des températures variables. Par applications du cataplasme amené par immersion dans l'eau bouillante, à la température appropriée.

Indications. — Affections chroniques douloureuses musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

Contre-Indications. — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Présentation et prix :

En paquet de : 1 kg. 500 : 17 fr. 05. 4 kg. 500 : 47 fr. 95.

Pour Clinique et Hôpitaux, prix spéciaux sur demande, par 100, 1.000 kilogs, etc.

En cataplasme :

A = 15 × 40 cm. (rectangulaire) 21 fr. 30.

B = 25 × 40 cm. (rectangulaire) 26 fr. 60.

C = 20 × 40 cm. (rectangulaire) 26 fr. 60.

Centre d'Applications à Paris.

« Au Centre Français de Médecine et de Chirurgie »

12, rue Boileau — PARIS (XVI^e).

(Renseignements sur demande.)

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

(Tél. : Trudaine 92-52.)

FANTINE ADOUE

Composition. — Farine alimentaire. Non étuvée. Vivante. Cuticule, Embryon, Phosphore végétal. Ni lactée, ni maltée, sucrée.

Vitamine B. — La cuticule du grain contenue dans Fantine Adoue.

1° Agit comme « facteur de l'appétit ».

2° Evite l'Amidonisme. L'amande du grain n'est bien assimilée qu'en présence de cuticule.

3° Evite les carences salines.

4° Evite la carence en cellulose (constipation).

Variété. — Nous changeons les farines à chaque fabrication. 16 formules qui passent successivement, évitant l'accoutumance et l'inappétence.

Deux formes. — Sans vous inquiéter de cette succession formulez simplement :

Ou Fantine Adoue sans cacao.

Uniquement céréales. Nourrissons.

Ou Fantine Adoue légèrement cacaoitée.

Céréales et légumineuses. Enfants, Femmes enceintes et nourrices, Vieillards, Tuberculeux.

Pharmacies : La boîte : 11 francs.

FANTINE ADOUE

36 bis, rue Scaliger — BORDEAUX.

(Téléphone : 64-53.)

FARINE MALTÉE VIAL

Autodigestive

Composition. — Aliment de premier ordre, riche en éléments azotés et en phosphates naturels assimilables.

Formule. — Composition centésimale en poids :

Farine de riz.....	49 gr. 5
Farine de malt.....	5 gr. 5
Farine de maïs.....	5 gr. 5
Poudre de cacao.....	3 gr. 9
Sucre de canne.....	35 gr. 6
Vaniline.....	0 gr. 35

Propriétés. — Les principes nutritifs des différentes farines entrant dans la composition de la Farine Maltée Vial ayant été rendus solubles pendant la préparation, cet aliment se digère de lui-même, sans fatigue pour l'estomac.

Indications. — Facilite le sevrage dès le plus jeune âge ; recommandée pendant la dentition et la croissance ; prescrite aux estomacs délicats et à toutes les personnes présentant des troubles de la digestion et de l'assimilation.

Dose. — Pour les enfants élevés au biberon, délayer une cuillerée à bouche de farine dans la quantité de liquide (eau ou lait) indiquée pour remplacer la tétée. Pour les enfants au-dessus de un an, la proportion pour une bouillie est de une cuillerée à bouche de farine pour cinq à six cuillerées de lait ou d'eau. Pour les adultes, délayer la quantité de farine suivant la consistance désirée pour le repas.

Prix : 12 fr. 80 la boîte.

Spécialités PHARGENE — VIAL et Cie

Laboratoire de Pharmacologie Générale

8, rue Vivienne — PARIS (11^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

FARINES DE RÉGIME BLOCH

Pures, Variées, Riches en Phosphates,
Blutées au minimum.

Farines de Céréales :

Crème de Riz, d'Orge, d'Avoine, de Blé vert.

Farines de Légumes :

Farine de Pois, de Lentilles, de Haricots.

Farines de Fruits :

Farine de Châtaignes, Farine de Bananes.

Semoules : de Blé, de Riz, d'Avoine.

Flocons : d'Avoine, d'Orge.

Rapidoats : Petits flocons d'Avoine. Cuisson 5 minutes.

Blokao : Déjeuner de suralimentation à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone aromatisés au cacao.

Riz — Tapiocas — Féoules — Arrow-Root

Indications thérapeutiques. — Alimentation des enfants, régime des Dyspeptiques et Entéritiques, Constipés, Nerveux, Anémiés et Surmenés.

Laboratoire des Établ. AUG. BLOCH et FILS

à TOMBLAINE, près NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Fondés en 1811.

Médaille d'or : Paris 1867-1878-1892. — Bruxelles 1888.

FARINES HEUDEBERT

pour les enfants et le régime.

Crèmes de céréales pour les premières bouillies.

Normales : { Crème de froment grillé, d'une digestibilité totale.
Soupe d'Heudebert.
Farine lactée.
Crèmes d'orge, de blé vert, de maïs.

Rafraîchissantes : Crèmes d'avoine, de seigle, de sarrasin.

Antidiarrhéiques : Crèmes de riz, arrow-root.

Farines de légumineuses. — Farines de pois, haricots, lentilles, fèves, soja.

Farines de fruits. — Farines de bananes, de châtaignes.

Toutes ces farines sont absolument pures. Du fait de leur préparation spéciale, elles contiennent tous les éléments utiles de la graine, et sont d'une très grande digestibilité.

Farines maltées. — Soupe d'Heudebert maltée, arrow-root maltée.
Crèmes d'orge, d'avoine, de blé vert, de riz, maltées.

Flocons. — D'avoine, d'orge, de blé vert, de riz.

Indications. — Sevrage, alimentation des enfants, des dyspeptiques, des entéritiques.

Produits de régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, Chemin-Feuillat — LYON (Rhône).

FÉCULYSE

Composition. — Diastase de céréales associée à une protéine alimentaire neutralisant l'acidité stomacale.

Formule : Pouvoir diastasique 1,2
 Matières azotées. Caséine 13,3
 Matières minérales Cl Na 3,3
 Lactose 55,2
 Excipient aromatisé au café. Q. S. pour 100 grammes.

Principe. — 1° Faire digérer les hydrates de carbone en suppléant, par l'action des diastases, à la déficience partielle ou totale du ferment salivaire ;

2° Diminuer l'acidité gastrique en excès et permettre à la diastase son action maximum.

Indications. — Dyspepsies des hydrates de carbone, hyperchlorhydrie, flatulence, fermentations intestinales, suralimentation (tuberculeux, nourrices). Régimes post-opératoires. Mastication insuffisante résultant d'une dentition défectueuse.

Mode d'emploi. — La FÉCULYSE se prend dans un liquide froid ou chaud (50° environ), tel que : café, lait, infusion (menthe de préférence) ou eau.

Doses : *Adultes* : Au petit déjeuner et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à soupe.

Dans les cas d'Hyperchlorhydrie : prendre une cuillerée à dessert avant et après chaque repas et au moment des crises.

Enfants : Le matin et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à café — ou plus, selon l'indication du médecin.

Prix : 16 francs

Laboratoires Diéto-Pharmaceutiques.

Charles HEUDEBERT Fils, Pharmacien

4, rue Lamartine — NANTERRE (Seine).

FÉLAMINE

Association d'acide cholique cristallisé pur et d'hexaméthylène-tétramine.

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par hypocholie, insuffisances hépatiques.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 0 gr. 30.

Posologie. — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1° Cas aigus et subaigus : 3 à 6 dragées ; 2° Cas chroniques : 3 à 4 dragées par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII°).

FÉLISÉDINE

Médication synergique complète, à la fois régulatrice et sédative, des Dystonies du Sympathique et des Insomnies.

Formule :

Extrait de Cratægus	0,05
Chlorhydrate de Papavérine	0,01
Phényléthylmalonylurée	0,015
Bromhydrate de Quinine	0,02
Extrait de Boldo	0,01
Extrait d'Anémone.....	0,03
Extrait de Valériane stabilisée	0,05
par comprimé.	

Indications. — *Nervosisme, Emotivité, Etats anxieux, Psychasthénie, Surmenage, Troubles cardiaques, Palpitations, Tachycardie, Troubles de la Ménopause, Insomnies.*

Posologie :

1° *Comme équilibrant du système nerveux* : 3 à 6 comprimés par jour.

2° *Contre l'insomnie* : 3 à 4 comprimés le soir.

L'étui de 30 comprimés : 18 francs.

L'étui de 140 comprimés : 60 francs.

Laboratoires du Docteur LAVOUÉ
RENNES

FÉMINADÈNE (Dragées de)

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phényléthylmalonylurée.

Indications. — *Nervosité féminine dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale.*

Anxiété, émotivité, dépression, subagitation, insomnies, etc...

Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches.

Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

Doses. — 4 dragées par jour, en moyenne. La boîte de vente contient un traitement de deux semaines.

Laboratoires du FÉMINADÈNE
120, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

FEMINOL

Deux formes :

GOUTTES

Indications. — *Troubles neuro-endocriniens liés à un dysfonctionnement ovarien.* Traitement *per os* de tous les troubles gynécologiques en association avec le *Féminol-Injection*. Complément des traitements opothérapiques, dont il catalyse l'action en assurant un drainage actif de l'organisme féminin.

Posologie. — X gouttes 2 à 3 fois par jour loin des repas dans un peu d'eau pure.

INJECTION

Propriétés. — Antiseptique. Cicatrisant. Non caustique.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques. Antiseptique local pendant la grossesse et après l'accouchement.

Posologie. — LX gouttes dans 2 litres d'eau bouillie tiède ou chaude en injection vaginale quotidienne.

Laboratoires ROBIA

M. ROBILLIART, Pharmacien — LILLE.

FENUCALCIUM

Forme. — Cachets.

Formule. — Hémoglobine, Phytosphosphine, Proxalate de fer, Carbonate de Manganèse, Poudre de Colombo, Poudre de Quassia, Poudre de Prêle, Lactate de chaux, Poudre de Rhubarbe, Magnésie hydratée, Fluorure de calcium, Poudre de noix vomique, Poudre de gentiane, Phosphate tricalcique, Arrhénal, 0,015, Poudre de Fenugrec.

Indications. — Anémie, Amaigrissement, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Manque d'appétit, Tuberculose, Etats pré-tuberculeux.

Posologie. — Un cachet au début des trois repas. Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 884-4.

Prix : 21 fr. 30.

Laboratoire HOOQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI°).
(Tél. : Diderot 04-71.)

FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuillée et désodorisée. Contenant tous ses principes actifs : phosphates organiques, lécithine, calcium, fer et manganèse organiques.

Propriétés. — Stimulant puissant de l'appétit. Agent d'augmentation de poids. Producteur d'énergie et de forces.

Indications. — Tous les cas d'amaigrissement : maigreur habituelle, amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, amaigrissement chez les nerveux, stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

Mode d'emploi. — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulé et d'élixir.

Dose journalière moyenne : 4 cachets ou dragées pour les adultes. : *Elixir* : 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants, 2 cuillerées à soupe pour adultes. *Granulé* : 2 à 4 cuillerées à café pour les enfants.

Boîte de 100 cachets. Boîte de 36 cachets.
Tube de 50 dragées. — Elixir. — Granulés.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

FENUROBUR

Cachets et granulé.

Puissant agent de l'augmentation du poids, excitomoteur et reconstituant.

Formule :

Fénugrec désodorisé.....	0,90
Poudre de rate	0,014
Poudre de surrénale	0,002
Oxyde de magnésium.....	0,083
Pour 1 cachet n° 50 ou 10 gr. de granulé.	

Mode d'emploi. — 3 à 6 cachets par jour au milieu des repas.

Granulé : 3 cuillerées à café par 24 heures pour les enfants, 3 cuillerées à soupe par 24 heures pour les adultes.

Amaigrissement, Convalescences, Asthénies, Croissance.

Prix : 19 francs la boîte de 50 cachets.
18 francs le flacon de granulé.

Durée moyenne de la boîte vente : 15 jours.

Échantillons et littératures :

Laboratoire ABARNOU

72, avenue Thiers — LE MANS.

(Tél. : 15-56.)

FER BRAVAIS

Assurances Sociales.

Accepté par la Commission.

Formule. — Ions de Fer catalysé actifs.

Composition. — Solution colloïdale de Fer à 30 p. 1 000 et de Manganèse catalyseur à 0,50 p. 1 000.

Propriétés thérapeutiques. — Fer pur (infiniment divisé, puisque colloïdal), accompagné de son catalyseur naturel, le Manganèse (mêmes proportions que dans le sang) ; donc Fer assimilable sans nécessiter de réactions internes.

Indications. — Appauvrissement du Sang et toutes ses conséquences : Anémie, Chlorose, Débilité, Dysménorrhée, Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille, Incontinence d'urine, Leucorrhée, Neurasthénie, etc.

Dose. — X à XX gouttes (I goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée. Vingt gouttes de Fer Bravais contiennent 3 centigr. de Fer et $\frac{1}{2}$ milligr. de Manganèse.

Examen du sang avant et après le traitement par le Fer Bravais.

(Moyenne de très nombreux cas.)

	Avant.	Après.	Augmen- tation.	Diminu- tion.
Globules rouges	3.500.000	4.500.000	30 %	
Globules bl . .	7.150	6.500		10 %
Hémoglobine.	60 %	85 %	40 %	

Prix : 24 fr. 50 le flacon pour un mois.

17 francs le $\frac{1}{2}$ flacon pour 15 jours.

Lab^{res} René de GRAUWE,   ,

Pharmacien de 1^{re} classe,

La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS

FERMENT DEP

Toujours à l'état de vie latente (d'après la méthode Deperdussin).

Composition et propriétés. — Ferments lactiques sélectionnés, acquérant à un très haut degré les propriétés antagonistes des ferments lactiques, vis-à-vis d'autres espèces bactériennes pathogènes.

De plus, la régénération cellulaire se fait d'une façon remarquable. Sont mis à l'état de vie latente et se conservent indéfiniment sans s'altérer. Reviennent à la vie avec toutes leurs facultés dès que sont réunies les conditions propres à leur reviviscence — chaleur et humidité — réalisées parfaitement par le milieu intestinal, le contact des plaies, muqueuses, etc.

Formes et Indications. — *Comprimés* : Infections gastro-intestinales. *Poudre insoluble* : Plaies de toute nature.

Poudre soluble : Plaies très profondes, plaies variqueuses, cystites gastro-entérostomies et tous endroits inaccessibles à la poudre insoluble.

Ampoules : buvables et injectables — forme la plus active : infections profondes (otites, sinusites, etc.) difficiles à atteindre.

Ovules : pour soins gynécologiques

Le Ferment Dep est toujours vivant au moment de son emploi.

Grâce à ses cinq formes, le Ferment Dep atteint le microbe pathogène partout où il se trouve.

Prix :

Boîte de 60 comprimés 1/2 gr.....	18 fr. 75
— Poudre soluble en flacon.....	22 fr. 90
— Poudre insoluble en flacon.....	18 fr. 75
— 10 ampoules de 5 cc.....	29 fr. 15
— 6 Ovules.....	18 fr. 75

FERMENT DEP

P. FALIU, 44, rue Taitbout, PARIS (IX*) — (Tél. : Trinité 40-46.)

FERMENTÉRYL

(Boîte de 50 comprimés.)

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base de :
1° Ferments (ferments lactiques, entérokinase, levure de bière) ;

2° Extrait végétal (bardane stabilisée) ;

3° Médicaments chimiques antiseptiques et anti-infectieux (bi-oxyde d'étain, orthoxyquinoléine, paraminophényl sulfamide).

Propriétés. — Dépuratif, régulateur de la leucocytose, antiseptique bactéricide et antitoxique à titre préventif et curatif.

Indications. — Intoxications intestinales. Troubles généraux d'origine digestive ou infectieuse, asthénie, colibacillose. Maladies cutanées (furunculose, urticaire, érysipèle, etc.). Maladies d'origine microbienne (pneumonie, fièvre puerpérale, grippe infectieuse, cachexie, etc.). Maladies des voies urinaires. Plaies infectées.

Mode d'emploi. — 6 à 9 comprimés par jour (2 à 3 au début de chacun des repas. Pour les enfants 2 à 5 comprimés par jour.

Prescription. — 1 boîte de comprimés *Fermentéryl*.

Les Laboratoires A. FALVY

Pharmacien licencié ès sciences ex-interne lauréat des hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII*).

(Tél. : Étoile 18-26.)

FERMENT PUR DE RAISIN

du Professeur Jacquemin.

(*Exposition Pasteur, Strasbourg 1923,*

Hors concours, Membre du Jury).

Immunisation et Désintoxication générale de l'Organisme.

Source de Diastases et de Vitamines.

Indications physiologiques. — Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la Nutrition et de la Croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Thérapeutique. — Furonculose, Maladies de la Peau, Dyspepsie, Entérite, Diabète, Gripes, Rhumatismes, Insuffisances endocriniennes et Nutrition.

Posologie. — 1 flacon pour une cure de 3 semaines à prendre 1/2 heure avant les repas.

Prix : 36 francs.

Littérature et échantillons à :

INSTITUT JACQUEMIN

à MALZEVILI E-NANCY (Meurthe-et-Moselle).

FEROGL

Composition. — A base de composés ferriques, extrait de fèves de Saint-Ignace et traces d'arsenic.

Propriétés. — Fortifiant sans alcool, ne constipe pas.

Indications. — Anémies, asthénie, amaigrissement, déminéralisation, rachitisme, scrofule, tuberculose.

Aucune contre-indication.

Prix : 18 francs.

Posologie. — *Adultes :* 1 cuillerée à soupe, matin et soir avant les repas. *Enfants :* 5 à 10 ans : 1 cuillerée à café, 10 à 15 ans : 1 cuillerée à dessert midi et soir, avant les repas.

Laboratoire Central de la Bastille

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 38-31.)

FER-OVARINE VITALIS

(Pilules)

Contre anémie et insuffisance ovarienne.

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Indications. — Anémie, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée, Anorexie.

Deux pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois. Prix : 16 fr. 65 la boîte.

FERANDRINE VITALIS

(Dragées) 2 à 5 par jour.

Composition. — P. orchitique, fer, manganèse, hypophyse.

Indications. — Infantilisme, troubles de la puberté, Fatigue de l'adolescence, Paresse intellectuelle, Impuissance en général, Énurésie, etc...

Chez la femme : Carence sexuelle, Troubles complexes de femmes privées de maternité, ménopause. La Férandrine chez la femme est une médication de remplacement.

Prix : 16 fr. 65 la boîte.

Échantillons et notices documentaires.

Laboratoires BEAULIEU

40, bd de Charonne — PARIS. — (Tél. : Diderot 34-55.)

FERROPHYTINE

CIBA

MÉDICATION PHOSPHO-MARTIALE.

Sel ferrique neutre colloïdal de l'acide inosito-hexaphosphorique, contenant 7,50 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, ces deux éléments associés en une combinaison très assimilable.

Stimulant de l'hématopoïèse et de la nutrition.

Médicament type des états anémiques et chloroanémiques accompagnés de dénutrition.

Parfaite tolérance.

Indications. — Toutes affections déglobulisantes.

Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance défectueuse.

Doses. — *Adultes* : 1 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

Boîte de 30 cachets.

Flacon de granulé.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

FERROXYLINE

Hémostatique à base de Ferripyrine.

Formes :

1° Gaze imprégnée stérilisée à 120°, pliage accordéon, en boîtes de fer scellées.

Pour les opérations d'O. R. L., gaze spéciale de 1 m. \times 0,015 à prescrire sous le nom de *FERROXYLINE O. R. L.*

2° Ouate imprégnée non stérilisée.

Indications :

Gaze : soit en chirurgie, soit en O. R. L., soit en gynécologie, assure une hémostase instantanée sans adhérer à la plaie.

Ouate : petites plaies hémorragiques, épistaxis et après l'application des sangsues.

Laboratoires ÉPARVIER

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON.

(Tél. : 150-21.)

FERYDAL

Composition. — Fer Colloïdal assimilable.

Trois formes. — Enfants, Adultes, Gouttes concentrées suractivées.

Indications.

Enfants : Anémie du Nourrisson et de la seconde enfance, Anorexie, Nervosisme, Insomnie, Convalescence des maladies aiguës, Anémie Paludéenne.

Adultes : Anémies, Paludisme, Hémorragies, Grossesse, Traitement ferrique pré-natal, Convalescences, Dépressions nerveuses, Prurit.

Doses.

Forme « Enfants ». A donner aux tétées ou aux repas :

De 6 mois à 18 mois : 2 ou 3 cuillerées à café.

De 18 mois à 3 ans : 3 ou 4 cuillerées à café.

A partir de 3 ans : 2 cuillerées à dessert.

Forme « Adultes » :

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Adultes : 2 cuillerées à soupe.

Le *Ferydal* se prend pur ou dans un peu d'eau gazeuse (eau de Seltz, limonade), au début des repas.

Forme « Gouttes » (permettant un traitement prolongé plus actif et plus avantageux).

Enfants : A donner aux tétées ou aux repas, dans le biberon ou un peu d'eau sucrée.

De 6 mois à 18 mois : XV gouttes 2 ou 3 fois par jour.

De 18 mois à 3 ans : XV gouttes 3 ou 4 fois par jour.

De 3 ans à 10 ans : XXX à XXXV gouttes 2 fois par jour.

Adolescents : XL gouttes 2 fois par jour.

Adultes : LX gouttes 2 fois par jour.

(A prendre dans la boisson : eau, vin, bière.)

Durée moyenne du traitement de l'unité de vente (gouttes) :

Enfants : 15 à 25 jours. — *Adultes* : 10 à 12 jours.

Prix :

Forme <i>Enfants</i>	18 fr.
— <i>Adultes</i>	20 fr.
— <i>Gouttes</i>	18 fr.

Laboratoire L. ROY

29, avenue Charras — CLERMONT-FERRAND.

FILHOSA

Pâte escharotique de FILHOS

Traitement de la métrite endocervicale.

Pâte homogène non grasse ayant toutes les propriétés déshydratantes du caustique de Filhos (chaux vive : 1 ; potasse caustique : 5).

Facile à manier et de conservation indéfinie.

Guérit les endocervicites chroniques les plus rebelles.

Evite la sténose consécutive à la cautérisation au crayon comme celle produite par un fragment détaché et abandonné dans la cavité cervicale.

Permet au malade de continuer ses occupations.

Seul traitement local indiqué après les applications :
injections vaginales avec les comprimés :

GYNOSTER

et application quotidienne d'un

FILHOSOVULE

Laboratoires Robert COLAS, Doct^r en Ph^{ie}.

133, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 48-10.)

FILTRAXYL

Pâte-vaccin pour massage des gencives, à base de filtrats microbiens de streptocoques, staphylocoques, entérocoques, bacilles pyocyaniques, provenant d'infections buccales.

Traitement des Pyorrhées aiguës, Stomatites, Gingivites tenaces.

En massage des gencives 3 fois par jour.

Prix. Le tube : 10 fr. 15.

 L. N. C. M. N° 574-6.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS.

FIXASE

Reminéralisateur effectif.

Présentation. — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

Composition. — Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice *sous forme utilisable.*

Posologie. — *Adultes et enfants* : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : $1/2$ ou $1/4$ de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : $1/4$ de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

Indications. — Enfants, Adolescents, Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.

Prix : 14 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-1.

FIXASE IRRADIÉE

(Fixase + Vitamine D cristallisée.)

Titrée à 1000 unités internationales par *Cachet* ou cuillerée à café de *Poudre*.

Poudre : Même posologie que la FIXASE.

Cachets : *Adultes et Adolescents* : 3 par jour.

Enfants : 1 à 2 par jour.

Prix :

Poudre : 20 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

Cachets : 20 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 10 jours.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n°s 342-3 et 4.

Laboratoire PARET

28, rue Guibal — MARSEILLE.

FLAVUROL

Dibromoxymercurifluorescéine.

Antiseptique puissant.

Pommade à 1 p. 100. — Intertrigo, Impétigo, Ecthyma
Eczémas infectés, Staphylococcies cutanées, Sycosis
Balanites, Ulcérations de toute nature.

Solution à 2 p. 100. — Désinfection pré-opératoire,
abcès, furoncle, anthrax, ulcérations de toute nature,
plaies opératoires suppurantes, phlegmons, fistules,
otorrhées aiguës et chroniques, suppurations auricu-
laires, etc...

Solution à 1 p. 100. — Traitement des urétrites, cys-
tites, pyélonéphrites, vaginites, métrites, antiseptie
obstétricale, ophtalmologie.

Crayons, bougies et ovules à 1 p. 100. — Traitement
des métrites et des vaginites.

Bougies à 1 p. 100. — Traitements des urétrites aiguës
et chroniques, des rétrécissements de l'urètre, des
prostatites.

Pilules. — Traitement des colibacilloses, diarrhées et
toutes infections intestinales.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

FLÉTAGÈNE

Huile de foie de Flétan.

Composition. — Huile de foie de Flétan, concentrée, raffinée, d'une
pureté absolue, renfermant 22.500 u. i. de vitamine A et 1.300 u. i.
de vitamine D par gramme.

Avantages. — Activité supérieure, sous un faible volume, à celle de
l'huile de foie de morue. Concentration en vitamines A et D. Tolé-
rance parfaite du tube digestif. Aucune saveur désagréable. Bien
acceptée par les enfants en toute saison.

Indications. — Etats de carence vitaminique, Troubles de l'ossification,
Rachitisme, Caries dentaires, Troubles de la croissance, Décalci-
fication de la gressesse et de l'allaitement, Lymphatisme, Scrofule,
Adénopathies, Chloro-anémie, Convalescences, Prétuberculose,
Bronchites, Surmenage, Amaigrissement.

Présentation. — Gouttes.

Posologie :

Enfants au-dessous de 5 ans ..;	II à V gouttes par jour.
— de 5 à 15 ans	VI à X —
Adultes	XV à XX —

en 2 ou 3 fois, aux repas, dans du lait, du jus de fruit ou du potage

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires SUJAL

J. LAFARGE, Pharmacien

62, rue de la Brauderie — CHATEAUROUX (Indre).

FLÉTASE

Succédané de l'Huile de Foie de Morue particulièrement riche en Vitamine A. Huile de Foie de poisson raffinée, présentée sous forme de solution huileuse (25.000 unités intern. de Vit. A par cm³.)

Indications :

Enfants : Croissance retardée ou insuffisante. Troubles digestifs, anorexie, états ganglionnaires, infections chroniques du rhino-pharynx et des bronches.

Adultes : Convalescences, Grossesse, Anémie.

Présentation et Posologie. — Flacons de 10 cm³.

Enfants au-dessous de 5 ans : I à V gouttes par jour.

Enfants à partir de 5 ans : V à X gouttes par jour.

Adultes : X à XX gouttes par jour.

Prix de vente :

Le flacon : 14 fr. 35.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

FLÉTOBIOL

Composition :

Complexe : d'huile de foie de Flétan (Halibut) (vitamines A et D), biologiquement activée par un apport de vitamine D naturelle; d'extrait de Malt (vitamine B); de jus d'orange et de citron concentrés (vitamine C).

Le Flétobiol comporte des teneurs en vitamine A (minimum 500 unités internationales par cc.) et en vitamine D (minimum 100 unités internationales par cc.) lui conférant des effets de croissance et antirachitique *au moins équivalents à ceux d'un volume égal d'huile de foie de morue.*

Avantages :

Le Flétobiol est supporté sans inconvénient par les estomacs les plus délicats.

Est absorbé avec plaisir par les enfants et les adultes, grâce à son goût très savoureux.

Peut et doit être pris à toute époque de l'année.

RECONSTITUANT COMPLET

(Vitamines A, D, B, C.).

« Flétobiol » remplace l'huile de foie de morue et ses succédanés.

Indications :

Enfants : Croissance difficile, troubles de la dentition, rachitisme, manque d'appétit, rhumes, convalescence après maladies de l'enfance, etc.

Adultes : Anémies, convalescence, pré tuberculose, grossesse, etc.

Posologie :

Enfants : de 1 à 3 ans : une cuillerée à café par jour ;
de 3 à 5 ans : deux cuillerées à café par jour ; ensuite ;
une à deux cuillerées à dessert par jour.

Adultes : 2 à 3 cuillères à dessert ou à soupe par jour.

(Flétobiol est employé dans la plupart des hôpitaux de Paris et de province.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 442-7.

Le produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances Sociales.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire du FLÉTOBIOL

DARRASSE, Pharmacien,

13, rue Pavée — PARIS (1V°).

(Tél. : Turbigo 84-40.)

FLETONIC

Tonique. Reconstituant.

Spécialement préparé pour les enfants.

D'un goût agréable, accessible aux estomacs les plus délicats.

A base d'huile de Flétan (vitamines A et D), Extrait de Malt, Vitamines B et sels minéraux en combinaison organique; Ph, Ca, Mg et lécithines végétales.

Indications. — Rachitisme. Troubles de la Croissance. Décalcification (caries dentaires). Surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — 2 à 5 ans : 1/2 cuillerée à 1 cuillerée à café; 5 à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café; au-dessus de 10 ans : 1 à 3 cuillerées à dessert par jour à prendre avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires UNIS-SPES

14, rue Demarquay — PARIS.

(Tél. : Nord 71-64.)

FLETYOL

POMMADE

Calmante. Cicatrisante.

A base de Carotène, Ergostérol irradié, Huile de Chaulmoogra, Oxyde de titane, Oxyde de zinc, Oxyde jaune de mercure, Amidon, Bol blanc, Sulfoichtyolate d'amon.

Très active (Vitamines A et D et huile de Chaulmoogra). Régénère rapidement les tissus, active la cicatrisation, n'adhère pas au pansement, calme le prurit, inodore.

Indications. — Plaies de toutes sortes, Ulcères, Brûlures, Acné, Eczéma, Psoriasis, Hémorroïdes.

Prix : 15 francs le tube d'environ 45 gr.

SUPPOSITOIRES

Mêmes constituants principaux. — Contient, en outre, Antipyrine et Belladone.

Action. — Calmants, décongestionnants, hémostatiques.

Prix : 18 francs la boîte de 10 suppositoires.

Laboratoires NOVITA

REICHSHOFFEN (Bas-Rhin).

Robert HOH, Pharmacien.

FLORHÉPATINE

Calmant et antispasmodique, puissant diurétique, sans toxique, à base d'extraits végétaux.

Composition. — Ether amyvalérianique, Boldo, Artichaut, Arénaria, Uva-Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana, Genièvre, Menthe dans solution alcalinée glycinée.

Indications. — Etats d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie), Règles douloureuses, Gastralgies, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections du foie en général (Insuffisance hépatique, ictères du foie, paludisme, etc.).

Deux formes.

Solution. — 1 à 4 verres à madère par jour: Crises aiguës; 1 verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à la cessation de la douleur.

Enfants : 1/2 dose.

Prix : 17 fr. 45 le flacon de 500 cc.

Gouttes. — *Adultes* : XXX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un demi-verre d'eau pure ou minérale.

Enfants jusqu'à 5 ans : III gouttes 2 fois par jour et par année d'âge.

Prix : 18 francs.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS
(Tél. : Provence 34-87.)

FLOR-PEYOTL

Régulateur du grand sympathique. Antispasmodique parfait tout en étant un stimulant des systèmes nerveux et musculaire.

Thérapeutique certaine du déséquilibre du sympathique, des états chroniques du système nerveux sous toutes leurs formes, en un mot des états neuro-musculaires déficients : dépression, neurasthénie, myasthénie, mélancolie, fatigue, états spasmodiques et anxieux, nervosisme, insomnie, troubles cardiaques.

Toni-sédatif de choix sans accoutumance, sans accumulation, sans toxicité.

Composition :

Extrait fluide à P. E. de Peyotl.....	35
— — — Passiflore	20
Teinture de Cratægus	10
Excipient. Q. S. pour.....	100

Posologie. — Suivant l'âge et la gravité de l'affection, de X à L gouttes dans un peu d'eau, au début de chacun des trois repas.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Présentation. — Flacon de 30 grammes. Contient pour environ 15 jours de traitement.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur L. LAFAY
LECOQ ET FERRAND, Pharmaciens

54, Chaussée-d'Antin. 69, rue de Provence — PARIS (IX°).
Tél. : Trinité 21-06.

FLUASE

(Gouttes.)

Composition. — Extrait fluide d'Hamamelis, d'Hydrastis, de *Cimicifuga racemosa*, de Marron d'Inde stabilisé, Teinture de noix vomique.

Mode d'action. — Tonique et stimulante par sa Noix Vomique, Vaso-constrictive par son Hamamelis et son Hydrastis, Analgésiante par son Marron d'Inde et son *Cimicifuga*, qui est en même temps un bon tonique cardiaque.

Indications thérapeutiques. — Stases sanguines, Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause et de la puberté, Ménorrhagies, Métrorrhagies, Dysménorrhées, Aménorrhées, Douleurs utérines, Métrites.

Doses et mode d'emploi. — XV gouttes dans un peu d'eau ou de vin sucrés avant les principaux repas. Dans les états aigus, augmenter les doses jusqu'à XXX gouttes trois fois par jour.

Prix du flacon pour un mois et demi de traitement :
15 fr. 60

Laboratoire de Pharmacologie Appliquée
rue Frédéric-Chevillon — ALLAUH (B.-du-R.).

FLUDIOSE

Composition :

Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

Chaque cuillerée à café contient : 1 cgr. 25 d'iodure de manganèse pur et 2 mmgr. 5 de méthylarsinate de soude.

Forme pharmaceutique :

Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

Indications :

Les diverses manifestations du lymphatisme et les troubles de la croissance. Les indications de la *Fludiose* sont toutes celles des préparations iodo-tanniques, mais, par la présence des autres éléments constitutifs, *et en particulier du manganèse*, elle dépasse toutes ces préparations, par son activité et sa rapidité dans ses effets. Elle présente l'avantage d'être de digestion facile, de goût agréable, constante dans sa composition.

La *Fludiose* est le plus puissant succédané de l'huile de foie de morue.

Mode d'emploi et doses :

Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans et *adultes* : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

Pas d'iodisme.

Pas de constipation.

Prescrire : *Fludiose* : 1 flacon.

Prix, le flacon : 17 fr. 80.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).

(Tél. : 0-50.)

Échantillons et littératures à la disposition
de MM. les Docteurs.

FLUIDOBILE

Composition. — Comprimés à base des extraits suivants : Feuilles d'Artichaut-Biliaire-Boldo-Cascara-Chardon Bénéit-Belladone.

Indications. — Insuffisances hépatiques, Insuffisances biliaires, Coliques hépatiques, Ictères, Lithiase biliaire, Congestion du foie.

Migraines, Urticaire, Arthritisme, Maladies de la Peau, Constipation chronique, Hémorroïdes.

Doses et mode d'emploi :

Maladies du Foie. — 1 à 2 comprimés à la fin des deux principaux repas.

Migraine, Urticaire. — 1 à 2 comprimés dès la sensation de malaise.

Constipation chronique. — 2 comprimés le soir en se couchant et, si besoin est, un autre comprimé le matin à jeun.

Maladies de Peau, Hémorroïdes, Arthritisme. — 1 à 2 comprimés le matin à jeun.

Prix au public : 14 francs.

Enregistré au Lab. Nat. de cont. des Médicaments.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (Meurthe-et-Moselle).

FLUOBYL

Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Composition. — Lactosérum ; Citrate de Magnésie ; Peptone de Fibrine sèche.

Indications. — Drainage des voies biliaires. *Maladies du foie* : Ictères ; Cholécystites ; Coliques hépatiques.

Dyspepsies réflexes : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

Maladies rénales.

Posologie : 1 à 4 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher dix minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Suivre le traitement deux semaines par mois.

Prix : 19 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

FLUODYLE

Forme : AMPOULES.

Chaque ampoule renferme:

Fluorure de sodium.....	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude.....	0,15
Sulfate de strychnine.....	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

Mode d'emploi. — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 14 fr. 50.

Forme : GRANULÉ.

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

Indications. — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 14 fr. 50.

Établissements SABATIER

A. EMPTOZ, Pharmacien

10, rue René-Bazin - PARIS (XVI^e). (Tél. : Auteuil 06-40.)

FLUOKOL

Granulé entièrement soluble, aromatisé à la menthe.

Association de cinq peptones (viande, poisson, œuf, lait et blé) et d'hyposulfite et sulfate de magnésie.

Propriétés. — Cholagogue, antianaphylactique complet et cytophylactique.

Indications. — Toutes affections du foie (cholécystite, lithiase biliaire, etc.). Troubles digestifs d'origine hépatique, Anaphylaxie (hyposulfite de magnésie et 5 peptones différentes), Urticaires, Prurits, Migraines, Constipation. Toutes intoxications.

Doses et mode d'emploi. — Comme cholagogue : 1 à 3 cuillerées à café de granulé dans un peu d'eau le matin à jeun.

Comme désensibilisant : une demi-cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Prix : 19 francs la boîte pour 10 à 15 jours de traitement.

Laboratoires LAFFORT, Pharmacien

Licencié ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (Indre-et-Loire). (Tél. : 38.)

FLUOSALYL BEAUGOURDON

Formule. — Solution de fluorures alcalins préparée en partant de l'acide fluorhydrique, soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

Propriétés. — Détruit le tartre dentaire. Antiseptique buccal de premier ordre, ne coagulant pas l'albumine et ne détruisant pas les cellules vivantes.

Usages. — Dans toutes les affections de la bouche et particulièrement dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire* à tous les degrés. Dans les gingivites mercurielles ou bismuthiques les accidents ont un arrêt si rapide que le traitement peut être repris et continué deux ou trois jours après que le FLUOSALYL aura été employé.

Emplol. — A la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède en bains de bouche de cinq minutes.

Dans les cas aigus et en cas d'abcès les séances de bains de bouche devront être répétées 4 à 5 fois par jour.

Employé pour les pulvérisations suivant la méthode Joyeux.

Pour le détartrage mécanique on emploie FLUOSALYL'S PASTE, et brosse à dents FLUOSALYL.

Prix : Liquide : 18 fr. 35. — Pâte : 8 fr. 60. — Brosse : 12 fr.

Laboratoires BEAUGOURDON, pharmacien,
43, avenue Kléber - PARIS (XVI^e). — (Tél. : Passy 83-68.)

FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

Principes actifs. — Sulfonate double de benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : Yohimbehe, marron d'Inde, hamamélis, séneçon, armoise.

Indications. — Troubles propres de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies, hémorroïdes, hypertension artérielle, tendance aux néoplasies, affaiblissement provoqué par l'âge.

Dose. — XXV gouttes 3 fois par jour.

Prix : 14 fr. 95.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine).
(Tél. : Grésillons 05-21.)

FLUXIDIA

Composition. — Teinture de Teskra, Alcoolature stabilisée de marron d'Inde, Hamamélis, Hydrastis, Viburnum, Sénéçon, Iode, Tannin.

Indications. — Traitement des maladies provenant des troubles de la circulation du sang.

Doses. — XXX gouttes deux fois par jour.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

FLUXINE (gouttes)

XX gouttes =
0,01 centigr. d'intrait de marron d'Inde Dausse.
IV gouttes d'alcoolat concentré d'anémone.
IV gouttes de teinture de noix vomique.
en combinaison inaltérable, radioactivée
par les rayons ultra-violet.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Troubles veineux des deux sexes, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux; métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, ménopause, règles douloureuses, certaines névralgies, prostatite, etc.

Mode d'emploi. — X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 francs pour 1 mois.

Laboratoires FLUXINE
Produits BONTHOUX
Edm. JOËT, pharmacien
VILLEFRANCHE (Rhône).

FOLLESTRINE GRÉMY

Hormone folliculaire.

Indications. — Aménorrhée de la puberté, de l'âge adulte et de la ménopause. Hypoplasie utérine. Diabète ovarien. Sclérodermie.

Mode d'emploi. — Tous les jours ou tous les 2 jours, faire une injection intramusculaire, pendant les huit jours qui suivent les règles.

Contre-indications. — La FOLLESTRINE GRÉMY est formellement contre-indiquée au début de la grossesse : elle peut avoir une action abortive à cette époque.

Médication associée. — La FOLLESTRINE GRÉMY et l'OCRÉINE GRÉMY peuvent être employées en médication associée dans le traitement des déficiences ovariennes ; il est nécessaire alors de les administrer de la façon suivante :

Dès la fin des règles jusqu'au 8^e jour environ, FOLLESTRINE GRÉMY : 1 injection intramusculaire par jour ou 6 à 10 granules.

Du 10^e jour jusqu'au 1^{er} jour des règles suivantes, OCRÉINE GRÉMY : 4 à 6 pilules par jour loin des repas ou 1 injection intramusculaire.

Granules (chaque granule équivaut à 250 unités internationales).

Ampoules (chaque ampoule équivaut à 500 unités internationales).

Prix : *Ampoules* : 35 francs. *Granules* : 22 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

FOLLICORMONE BUCCALE HINGLAIS

**Première préparation d'hormone ovarienne active
par voie buccale.**

(Acad. Méd., 27 Janvier 1931.)

(Soc. belge de gyn., Février 1931.)

Activité buccale contrôlée.

Composition. — Solution huileuse, concentrée, d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

Mode d'emploi. — *Trois doses par jour à intervalles de 4 heures au minimum, pendant les repas de préférence.*

Traitement type d'attaque.

40 capsules à doses croissantes :

Matin, midi et soir.	{	pendant 3 jours	: 1	+	1	+	1	;
		les 2 jours suivants	: 2	+	2	+	2	;
		les 2 jours suivants	: 3	+	3	+	3	.

Cures d'entretien.

15 à 20 capsules par mois : 1 capsule matin, midi et soir : pendant 5 à 7 jours.

Date du traitement. — *Quand les règles existent :* les capsules seront toujours absorbées dans les dix jours précédant la date présumée des règles.

Dans tous les autres cas (castration, aménorrhées) : la cure sera régulière et mensuelle (première semaine du mois par exemple).

Dysménorrhées : Commencer 1 ou 2 jours avant le début présumé des règles et poursuivre jusqu'à cessation des troubles (6 à 9 capsules peuvent suffire).

Indications spéciales : Stérilité inexplicée: Vulvovaginite gonococcique. Prurit vulvaire. Troubles nerveux menstruels, Poussée fébrile prémenstruelle des tuberculeuses, etc...

La boîte de 40 capsules pour une cure de
1, 2 ou 3 mois : 42 francs.

Remboursé aux Assurances Sociales (Catégorie B)
80 % jusqu'à 25 fr. et 60 % pour le surplus.

Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS. (Tél. : Anj. 37-14.)

FOLLICULINE CRISTALLISÉE

du D^r ROUSSEL

Voir :

GYNOESTRYL,

BENZO-GYNOESTRYL,

BENZO-GYNOESTRYL 5.

FOLLI-LOBINE

du D^r Fraysse.

Deux formes : Pilules, Ampoules injectables (Voir aussi *Opothérapie du D^r Fraysse*).

Folliculine ovarienne associée aux Hormones du Lobe antérieur de l'Hypophyse. Le lobe antérieur renforce l'action de la folliculine.

Pilules. — Glutinisées, actives par voie buccale, non détruites par l'action des sucs digestifs qui décomposent la folliculine.

1 pilule = 30 unités physiologiques.

Doses : 2 à 6 par jour, espacées dans la journée.

Ampoules. — 20 unités par ampoule : 10 U, Folliculine. 10 U. Lobe antérieur.

Doses : 1 ampoule par jour pendant 6 jours, 10 jours avant les règles.

Indications. — Déficiences ovariennes en général. Troubles menstruels, Puberté et Ménopause.

Pilules. — Deux modèles de flacons : 1 fl. ordinaire ; 1 double flacon.

Ampoules. — Boîte de 6 ampoules injectables de 2 cc.
Traitement : 3 semaines.

Laboratoires du D^r FRAYSSE et Cie

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 12-88

FONDANT DE SOUFRE DAUSSE

Composition. — Collobiase de soufre :
15 mgr. par cuillerée à café.

Présentation. — Fondant blanc d'une saveur sucrée et très légèrement sulfurée.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Modificateur de la nutrition soufrée ; Arthralgies, formes légères du rhumatisme, névralgies, arthritisme, affections cutanées, laryngites, trachéo-bronchites.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, ou plus, suivant indication du médecin.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

FORCIVAL

Aliment nutritif et fortifiant.

Forme. — Farine d'un goût très agréable.

Composition. — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

Propriétés. — Aliment léger et substantiel, reconstituant, reminéralisateur, d'une grande digestibilité.

Indications. — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

Doses. — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait : une cuillerée à soupe pour une tasse.

Prix : { La boîte de 250 gr. : 6 fr. 40.
 { La boîte de 1 kg. : 21 fr. 30.

Laboratoires du FORCIVAL

11 ter, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

FORIOD

Tétraiodophénolphtaléinate de Sodium.

Substance opaque aux rayons X, s'éliminant par les voies biliaires.

Indications. — **Cholécystographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.**

Posologie et mode d'emploi. — Employer l'une des méthodes suivantes :

1° *Voie buccale*: Méthode des doses fractionnées (dite de Sandström), le premier soir prendre 1 flacon de Foriod Poudre composée ; le lendemain, 1 flacon de Foriod Poudre composée en deux prises (la 1^{re} moitié le matin, la 2^e le soir). Examen radiologique le lendemain matin.

2° *Voie intraveineuse*: Solution aqueuse à préparer extemporanément avec le contenu d'une ampoule de poudre cristallisée (2 gr. 40) et 50 à 60 cc. d'eau distillée stérile. Examen de la 8^e à la 24^e heure après l'injection.

Prix de vente :

L'ampoule de poudre : 14 fr. 35. — Le flacon de dragées : 29 francs. —

Le flacon de poudre composée : 25 francs.

Le nécessaire (pour méthode de Sandström) : 46 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

FORMOBENZYL

Désinfecte l'arbre bronchique, tient le cœur, calme la toux.

Composition. — Goménol à 20 %, camphre, orthoformiate d'éthyle.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou subaiguës de l'appareil respiratoire. Bronchites, congestions pulmonaires actives, broncho-pneumonies et pneumonies. Complications respiratoires de la grippe et de la rougeole. Coqueluche. Toux spasmodiques.

Ampoules huileuses. — *Adultes* : 5 cc. *Enfants* : 3 cc.

Posologie. — Injection intramusculaire : 1 ou 2 ampoules par jour.

Voie rectale : une ou deux ampoules par jour en lavement, étendues d'un volume égal d'huile d'olive.

Lavement évacuateur au préalable.

Gouttes. — *Enfants* : par 24 heures : VI gouttes par année d'âge.

Dix ans : LX gouttes ; *adultes* : CXX gouttes.

Boîte ampoules *adultes* 5 cc. : 19 fr. 15.

Boîte ampoules *enfants* 3 cc. : 17 fr. 10.

Forme Gouttes : 17 fr. 10.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

FORMOCARBINE

Composition :

Association du *Charbon animal*, ultradivisé, absolument privé de Cyanogène, à la *Formine* (Hexaméthylènetétramine cristallisée), avec ou sans addition de *Benzonaphtol*. Donc deux formules :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Il est à remarquer que la *Forme Naphtolée* ne provoque jamais de constipation.

Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût, volontiers accepté par les malades, même les plus difficiles.

Le Granulé de Formocarbine n'est pas dur à la dent, fond très bien dans la bouche, se désagrége instantanément dans l'eau.

Propriétés :

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Indications thérapeutiques :

Infections gastro-intestinales. — Dyspepsie, Fermentations, Diarrhées, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales, Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose, Aérophagies, *Intoxications alimentaires*.

Infections biliaires. — Désinfecte par la *Formine* la Vésicule et les canaux en même temps que son *Charbon animal* absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la Veine porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiasse biliaire, Hépatisme.

Infections urinaires. — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, Cystites, Pyélonéphrites, Urétérites, Prostatites, Colibacillurie.

Syndrome entéro-rénal.

Radiologie.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

Dans les grandes crises d'*Aérophagie* ou dans les cas d'*Intoxication alimentaire*, la dose devra être portée à 3 cuillerées à soupe, une toutes les demi-heures.

En *Radiologie* : Pour obtenir l'absorption complète des gaz qui dilatent les organes et gênent l'examen : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans les 48 heures qui précèdent cet examen.

Prescrire :

Formocarbine simple ou *Formocarbine naphtolée* : 1 flacon.

Prix : le flacon : 14 fr. 35.

**Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue Malherbe — BEAUVAIS (Oise).

(Tél. : 0-50.)

Échantillons et Littérature à la disposition de
MM. les Docteurs.

FORMOCARBOS

Composition. — Charbon animal chimiquement pur activé (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson, d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie.

Forme. — Granulé rond anisé.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie, Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines, Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général toutes les manifestations anaphylactiques.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Avant (de préférence) ou après chaque repas.

Prix : 16 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Autorisé pour A. S.

Laboratoires E. MILLET

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

(Tél. : 30.)

FORMOCHOLINE

Drainage des voies biliaires.

Propriétés. — Cholagogue, renforçateur du pouvoir antitoxique du foie, évite l'encombrement de la vésicule biliaire et des canaux excréteurs.

Indications. — Cholécystites, angiocholites, affections hépatiques des pays chauds, maladies de la nutrition, goutte, diabète, obésité, tous syndromes gastriques réflexes et dermatoses sous la dépendance d'un dysfonctionnement hépato-vésiculaire.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin dans un quart de verre d'eau légèrement tiédie.

Présentation et prix. — Granulés : 16 fr.

Durée moyenne du traitement des unités :
10 à 12 jours.

Laboratoires du Dr ADLER

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Arch. 63-27.)

FORMOSALINE HOUDÉ

Discoïdes titrés de 50 centigrammes.

Composition :

Hexaméthylène-tétramine	24 cgr.
Salol	25 —
Arbutine	1 —

Propriétés. — Ajoute à celles de la formine, celles du salol, antiseptique intestinal et urinaire, antithermique et analgésique, et celles de l'arbutine, antiseptique spécialement urinaire.

Indications. — Cystites, néphrites, début d'encéphalite léthargique, cholécystites chroniques, grippe, fièvre typhoïde, etc. (toutes maladies infectieuses). Traitement des plaies sanieuses (antiseptique interne).

Doses. — 4 à 8 comprimés par jour, avant les repas, dans un peu d'eau (comprimés délitescents).

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

FORMULE JACQUEMAIRE N° 60

Composition. — Chaux, fer, manganèse, silice, phosphore en milieu magnésien prépondérant.

Sa formule diffère de la VERRULYSE par des proportions différentes en magnésies (hydroxyde et non chlorure) et l'addition de silicate de soude.

Forme. — Cachets ouvrables, contenant une poudre que, pour les enfants ou adultes ne pouvant avaler les cachets, on peut faire prendre dans un aliment (potage, purée, compote, etc.).

Propriétés. — Reconstituant cellulaire par reminéralisation polyvalente à prépondérance magnésienne. Redresse et élimine toute production cellulaire anormale. Supprime le terrain physiologique dégénéré par déminéralisation, propice à l'anarchie cellulaire et au développement soit des tumeurs malignes, soit des maladies infectieuses. Véritable aliment minéral, subvient à la carence minérale de l'alimentation.

Relève l'état général en huit jours.

Indications. — Toutes les proliférations anormales épidermiques ou des tissus profonds, verrues, papillomes, végétations, kératoses séniles ou autres ; améliore ou freine les tumeurs ; évite le terrain précancéreux.

Toutes les débilités par sub-minéralisation ou déminéralisation. Enfants débiles, malingres. Adultes surmenés et déprimés. Transformations de la quarantaine.

Dermatoses diverses.

Complément de l'alimentation journalière.

Posologie. — 2 cachets par jour au milieu des repas.

Remarques. — Formule Jacquemaire n° 60, comme une formule magistrale, conserve le secret du diagnostic, parce que les boîtes, les conditionnements ne portent que la posologie sans aucune indication. Cette qualité est très précieuse pour la prescription chez les précancéreux. Dans tous les cas, le prétexte de la prescription est la reminéralisation.

Le traitement peut se prolonger indéfiniment, car Formule Jacquemaire n° 60 ne contient que les éléments minéraux qui devraient toujours se trouver dans les aliments.

Prix public : Boîte 80 cachets pour 40 jours : 16 francs.

Laboratoires FLUXINE

Produits Bonthoux

Edm. JOËT, Pharmacien

VILLEFRANCHE (Rhône).

FORNOSE

Pommade nasale sans essences.

Novocaïne, Adréraline, Baume du Pérou,
Ichtyol, Résorcine, Oxyde jaune de Hg,
Excipient fondant.

Cicatrisante, Désodorisante, Non irritante.

Tous états congestifs du nez et de la gorge.

Soins pré-opératoires et post-opératoires.

Furonculose du nez, Ozène, Antisepsie respiratoire.

Étaler comme un pois de pommade à l'intérieur de chaque narine 2 ou 3 fois par jour.

Le tube : 6 fr. 25.

Échantillons.

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (Seine-et-Oise).

(Tél. : Observatoire 01-83.)

FORTITONYL CLARS

Reconstituant, Tonique, Eupeptique.

Fortifiant de l'enfant et de l'adulte.

Ni sucre, ni alcool, ni toxique.

Composition. — Polyglycérophosphates (Ca, Na, Mn, Mg, K) et Papaine en solution concentrée.

Indications. — 1. *Déminéralisations* physiologiques et pathologiques, phosphaturies, rachitisme, lymphatisme, croissance, puberté, grossesse, allaitement, consolidation des fractures.

2. *Asthénies*, fatigue générale et fatigabilité, surmenage intellectuel et physique, convalescences, anémies.

3. *Petites dyspepsies*, *anorexies*, digestions lentes, lourdeurs d'estomac, somnolence après les repas.

Posologie. — *Adultes* : XV à XXX gouttes, 2 fois par jour, au début de chacun des 2 principaux repas dans un demi-verre d'eau.

Enfants : II gouttes par jour et par année d'âge.

Laboratoire CLARS

18, rue Saint-Sulpice — PARIS.

(Tél. : Danton 01-39.)

FORTOSSAN

CIBA

Sel sodique neutre de l'acide
inosito-hexa-phosphorique.

PRÉPARATION PHOSPHORÉE POUR ENFANTS.

Médicament reconstituant et rectificateur de la nutrition spécialement préparé pour la pratique infantile. Très assimilable, parfaitement toléré.

Indications. — Retard du développement et de la dentition. Scrofulose et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de 2 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.
Boîte de 20 à 30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

FORTOSSAN IRRADIÉ

CIBA

PRÉPARATION PHOSPHORÉE AVEC VITAMINE D.

Puissant antirachitique par association de la vitamine D au phosphore organique végétal. La vitamine D développe, dans ces conditions, le maximum de son efficacité thérapeutique sans aucun effet secondaire: ni anorexie, ni diarrhée.

Indications. — Rachitisme, Ostéomalacie, Tuberculose, Prétuberculose, Anémie infantile, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, Caries dentaires:

Doses. — 1/2 à 4 cuillerées à café par jour.
Boîte de 20 à 30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

FOSFOMAGNYL DU D^r CHURCHILL

**Cytophylaxie leucogène. Association
de phosphore et de chlorure
de magnésium.**

Forme. — Comprimés.

Composition :

Chlorure de Magnésium chimique-

ment pur.....	0 gr. 30
Hypophosphite de Magnésie.....	0 gr. 10
Hypophosphite de Chaux	0 gr. 05
Hypophosphite de Manganèse...	0 gr. 02

Posologie. — 4 comprimés par jour. Deux avant le petit déjeuner du matin et un autre avant chacun des deux autres repas.

Si le comprimé est trop gros pour être avalé en entier, le partager en deux. Pour en faciliter l'absorption, il est préférable de l'écraser et de le mélanger avec un peu de café, de potage, ou tout autre liquide, ou mieux encore, dans une cuillerée de confiture ou de miel.

Indications. — Asthénie, Régulateur des fonctions hépatiques, Préventif de l'artério-sclérose, Anémies, Faiblesse générale, Stimulant de l'activité cellulaire.

Produit Français. Prix 22 fr. 35.

**Laboratoire des Produits du
D^r CHURCHILL.**

P. DESCHAMPS, pharmacien.

92, av. de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 74-02.)

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOÏDAL

Colloïde chimiquement défini par Carron, Bourcet et Chevalier. CR. Société thérapeutique, 11 novembre 1925.

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

Formes. — Fosfoxyll sirop : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyll pilules : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Fosfoxyll liqueur : liquide opalin glycéринé menthé spécialement destiné aux diabétiques.

Dosage. — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif. Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium. *Action rapide et régulière.*

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales. Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

Contre-indication. — État congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue de quantité égale d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

Prescrire :

Sirop de FOSFOXYL CARRON (17 fr. 65)

ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON** (15 fr. 50)

ou **FOSFOXYL LIQUEUR** (16 fr. 55)

Chaque flacon ou boîte pour une semaine de traitement.

Laboratoires du FOSFOXYL

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 00-10.)

FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques
assimilables directement.

Modificateurs de la Nutrition
et de la Composition chimique des Tissus.

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électricité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

Dénomination.	Titre.	Mode d'emploi.
CALCOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Ca	13,19 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Calcium.	8,51 % de Calcium.	(Sirop pour enfants.)
MAGNESOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Mg	13,05 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Magnésium.	5,28 % de Magnésium.	...
MANGANOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Mn	12,57 % de Phosphore.	4 à 6 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Manganèse.	11,34 % de Manganèse.	...
CUPROFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) ² Cu	12,57 % de Phosphore.	2 à 4 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Cuivre.	12,77 % de Cuivre.	...

Prix de l'unité : 12 fr. 80.

Littérature et Échantillons sur demande aux
Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 00-10.)

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Urane, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON.

FRANCALCIUM

Calcithérapie.

Composition. — Acétylglycocolate de calcium.

Présentation :

- 1° En solution à 20 p. 100 (sans odeur ni saveur).
- 2° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intraveineuses (boîtes de 2 ou 10 ampoules).
- 3° En comprimés de 15 cgr. (boîte de 45 comprimés).
- 4° *Francalcium B.* (Quinate de Ca). Ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intra-musculaires indolores (boîtes de 2 ou 10 ampoules).

Indications cliniques :

- a. *Indication recalcifiente* : Rachitisme, Retard de consolidation des fractures. Carie dentaire, Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou chirurgicale. Grossesse.
- b. *Indication anti-hémorragique* : Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Hémorragies obstétricales, Troubles hémogéniques (purpuras, etc.).
- c. *Indication de résorption* : Pleurésies, Ascites, Œdèmes des néphrétiques. Diarrhées des tuberculeux.
- d. *Indication anti-choc* : Etats de sensibilisation ou d'anaphylaxie spontanés (urticaire, prurit, asthme, etc.). Etats de sensibilisation thérapeutique consécutifs aux diverses chimiothérapies (arsenic, bismuth, or).
- e. *Indication spasmo-sédative* : Asthénie, Tétanie, Spasmophilie, Eclampsie obstétricale. Etats spasmodiques viscéraux. Maladie de Basedow. Troubles du système nerveux.

Indication anti-rhumatismale : Polyarthrites chroniques.

Posologie :

En solution : 2 fois par jour, avant chacun des 2 principaux repas, dans un peu d'eau sucrée.

	Enfants : au-dessous de 12 ans.	Adultes :
Indication recalcifiente.....	II gouttes par année d'âge.	XL gouttes.
— anti-rhumatismale ...		XL —
— anti-hémorragique ...	VIII gouttes par année d'âge.	CXX —
— anti-choc	XX à LXXV gouttes.	CXX —
— spasmo-sédative	L à C gouttes.	CXX —
	Deux fois par jour, avant les repas.	
Comprimés de 15 cgr. d'acétylglycocolate de Ca	1 comprimé.	2 ou 3 comprimés.
Ampoules de 5 cc. à 10 % pour injections intra-veineuses ...	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. tous les 2 jours.
Aspirez un peu de sang dans la seringue et injecter très lentement.)		
Ampoules de 5 cc. à 10 % pour injections intra-musculaires ...	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. tous les 2 jours.

Ce tableau de posologie est donné à titre indicatif et d'après nos essais cliniques, le médecin traitant étant seul qualifié pour la prescription des doses qui peuvent varier suivant les malades.

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 54-58.)

FRANCOPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

Avantages. — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

Indications. — Fixation des pansements.

Dimensions. — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10-18 cm. de larg. — 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche ; uni ou perforé, ou sur tissu élastique. Réduction de 50 p. 100 au Corps médical.

A. KRAUS, Pharmacien de 1^{re} classe
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix-Rouge.

37, rue Godot-de-Mauroy — PARIS.

Usine à Courbevoie.

(Tél. : Opéra 24-54.)

FRANLAXOL

Granulé mucilagineux, évacuant, non irritant, non putrescible, non digestible.

Composé formé d'un mucilage de lin associé à divers mucilages végétaux purs, spécialement choisis. Il possède la propriété d'augmenter considérablement de volume dès qu'il est placé dans un milieu liquide. Dans le milieu intestinal, il forme une masse volumineuse, onctueuse, égale à environ cinquante fois son volume primitif, qui facilite la libération de l'intestin sans fatiguer sa musculature.

Indications. — A prescrire dans toutes les constipations atoniques ou spasmodiques, dans toutes les stases cœcales ou cæco-ascendantes, sigmoïdiennes ou rectales.

Mode d'emploi. — Mettre le granulé à sec dans la bouche et avaler à l'aide d'une gorgée de liquide.

Adultes : une ou deux cuillerées à café après les repas et suivant les indications du médecin.

Enfants : une cuillerée à café après les repas.

Prix : 18 fr. 15 la boîte de 200 gr. net.

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 54-58.)

FREINOLUTÉINE VOGUEIN

Chaque comprimé renferme 0,05 de Corps jaune privé de sa folliculine et des hormones excitatrices pour ne laisser subsister que ses effets inhibiteurs et freinateurs et 0,005 d'extrait thyroïdien.

Action physiologique. — Son rôle est de déclencher le mécanisme régulateur de la fonction menstruelle. Elle diminue les hémorragies utérines d'origine ovarienne, notamment les ménorragies de la puberté. Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.

Son action n'est pas brusque et se fait surtout sentir au cours des règles qui suivent l'administration du médicament.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas 5 à 6 jours avant l'époque présumée des menstrues.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires VOGUEIN

2, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).

(Tél. : Danton 83-24.)

FRÉNASMA

Eupnéique phyto-hormonique.

Composition. — Éphédrine, Dionine, Pulmine, Surrénine, Spartéine, Lobélie.

Forme. — Comprimés dragéifiés rigoureusement dosés.

Indications. — Asthme bronchique, Bronchites chroniques, Dyspnées, Emphysèmes, Sclérose pulmonaire, Toux spasmodiques, Rhumes des foies, Rhinites spasmodiques, Etats allergiques (urticaire, migraine). Accidents sériques et anaphylactiques.

Posologie. — Sans contre-indications : 3 à 4 comprimés par jour et plus.

Enfants à partir de 5 ans : 1 à 3 comprimés.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-2.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du FRÉNASMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX^e).

(Tél. : Roquette 76-24.)

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

FRÉNOVEX

Traitement des hémorragies utérines.

Médication préventive et curative.

Thérapeutique d'urgence.

Composition. — Extraits de glande mammaire lactante et de corps jaune frais (procédé *Crinex*).

Gouttes: Solution hydro-alcoolique. 1 cc. (XL gouttes) correspond à 1 gr. 5 de glande mammaire lactante et à 0 gr. 08 de corps jaune frais.

Dragées à croquer : 1 dragée = V gouttes.

Ampoules injectables : Solution aqueuse isotonique, indolore. 1 cc. correspond à 2 gr. de glande mammaire lactante fraîche.

Mode d'action. — L'extrait mammaire augmente la tonicité utérine, contracte les vaisseaux sanguins, décongestionne l'endomètre ; il freine la sécrétion folliculaire de l'ovaire (Cherry, Lendle, Aurisicchio).

Le corps jaune possède une action anti-folliculinique spécifique et favorise la nidation de l'œuf.

Avantages. — *Frénovex* agit rapidement par voie buccale.

Son action durable, son innocuité absolue, même à doses élevées et répétées, en font la médication de choix de la plupart des hémorragies utérines.

Indications. — Médication causale et étiologique des ménométrorragies de la puberté et de la ménopause.

Traitement préventif : posologie (I).

Traitement curatif : posologie (II).

Traitement d'urgence : posologie (III).

Polyménorrhées (II). Endométrites hémorragiques aiguës et chroniques (II). Hémorragies par fibromes sous-muqueux et polypes : traitement d'entretien (II) ; traitement d'urgence (III).

Menaces d'avortement, avortements à répétition :
prévention des avortements habituels (II);
avortements imminents (III).

Hyperfolliculinie et ses conséquences (certaines
aménorrhées, crises intermenstruelles, états congestifs prémenstruels, certaines stérilités, fièvres intermenstruelles, mastites chroniques, etc.) :
suivant l'intensité des cas : I ou II.

Table de posologie :

Ne provoquant aucun phénomène toxique, même à très fortes doses, *Frénovex* a une très grande souplesse de prescription. Il peut être administré à des doses variant de XX gouttes à 6 cuillerées à café par jour.

Frénovex doit être pris 1/2 heure avant les repas dans 1/2 verre d'eau, ou sur un morceau de sucre que la malade laissera fondre lentement dans la bouche (absorption *per linguam*).

Les ampoules de *Frénovex* seront injectées par voie sous-cutanée, seules ou en autohémocrinothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Posologie (I) : XXX à XL gouttes, en 2 fois par jour, ou 1 ampoule tous les 2 jours, pendant les 20 jours qui précèdent les règles.

Posologie (II) : L à C gouttes en 2 fois par jour, ou 1 ampoule tous les jours, au moment de l'hémorragie.

Posologie (III) : 1 cuillerée à café toutes les 1/2 heures (1 à 6 cuillerées par jour) ou 1 ampoule en autohémocrinothérapie toutes les heures. 1 à 3 ampoules par jour.

Prix :

Gouttes ou dragées.....	18 fr. 20
Boîte de 6 ampoules.....	31 fr. 20

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV^e).
(Tél. Alésia 28-51.)

FRIGYL

Suppositoires

Anti-infectieux, Antipyrétiques, Analgésiques.

Composition. — Deux formules :

Suppositoires enfants :

Argent colloïdal.....	0 gr. 05
Sulfate de Quinine.....	0 gr. 10
Pyramidon.....	0 gr. 03
Caféine	0 gr. 01

Suppositoires bébés :

Argent colloïdal.....	0 gr. 03
Sulfate de Quinine.....	0 gr. 05
Pyramidon.....	0 gr. 01
Caféine	0 gr. 001

Indications. — Tous cas d'hyperthermie chez l'enfant (Grippe, Rougeole, Scarlatine, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Accidents de la dentition, etc.).

Mode d'emploi. — Suivre les indications du médecin.
Dose moyenne par 24 heures : 1 à 3, suivant l'âge.

Prix : 20 fr. » la boîte de 10.
12 fr. 50 — 5.

Laboratoires FRIGYL

F. MONTANTON, Pharmacien
BUZANÇAIS (Indre). (Tél. : 52.)

FUCOSINE

Traitement efficace de la Constipation habituelle.

Composition. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. 1 à 3 cuillerées à café.

Poudres . 1 à 3 mesures.

Cachets.. 1 à 3 cachets.

A chaque repas régulièrement.

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Prix : 13 fr. 50 la boîte.

Laboratoire L. PROTHIÈRE

55, rue Auguste-Comte — LYON.

(Tél. : Franklin 07-04.)

FUCUS GMET

Composition. — Extrait total, sans alcool, du *Fucus vesiculosus*. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Par son iode naturel régularise la sécrétion thyroïdienne et combat l'obésité.

Indications. — Obésité, Scrofule Arthritisme.

Posologie. — De 1 à 8 cuillerées à café par jour, *progressivement* dans eau ou vin blanc sec de préférence.

Pour traitement prolongé conseiller le « carton cure » : le contenu de 6 flacons standard pour le prix de 4.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

FUCUSOL

Composition. — A base d'algues marines (*Fucus vesiculosus* et *fucus serratus*).

Indications. — Traitement végétal absolument sans danger de l'obésité et de l'embonpoint selon la méthode de Duchesne-Duparcq.

Ne contient ni nitrophénols, ni extrait thyroïdien.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.
2 à 3 cuillerées à café de granulés par jour.

Boîte de 60 pilules.

Boîte de 200 pilules.

Granulés.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS

(Tél. : Archives 44-59.)

FUMIGALÈNE

Composition. — Aconit, essence d'eucalyptus, essence de niaouli, benjoin, menthol.

Indications thérapeutiques. — *Laryngites, Sinusites, Bronchites et toutes Affections du rhino-pharynx.*

Mode d'emploi. — 1/2 à 1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalation, à l'aide de l'inhalateur en carton joint à la boîte.

Présentation. — Le flacon *avec entonnoir carton* pour inhalation : 10 fr.

Laboratoires du FUMIGALÈNE

R. CHARBONNEL, Pharmacien
7, rue du Marché — BLAYE (Gironde).
(Tél. : 74.)

FUROPLAST

Enregistré au Laboratoire national sous n° 540-18.

Traitement des Furoncles par l'emplâtre de Vigo phéniqué. 1
Emplâtre caoutchouté (même masse adhésive que l'Albuplast) maintenant une rondelle de Vigo phéniqué ou — pour être employé quand le furoncle a crevé — un emplâtre au dermatol.

Avantages. — Permet le traitement des furoncles, soit par le docteur, soit par le malade lui-même, si celui-ci doit reprendre ses occupations ou ses déplacements avant achèvement du traitement.

Un *Furoplast élastique* (*Hermoplast*, enregistré sous n° 540-19) est particulièrement indiqué dans le cas de furoncles intéressant les parties du corps où un pansement rigide pourrait difficilement se maintenir.

Présentations :

Boîte ronde métal : 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

Boîte carton : 3 emplâtres Vigo, 3 compresses dermatol.

Elastique (*Hermoplast*) : 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie, Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET

(Tél. : Pereire 57-41.)

GADUAMINE

La GADUAMINE est un extrait opothérapique de foies frais de morue renfermant outre les parties hydro-solubles de la glande vivante, la totalité de l'insaponifiable de l'huile. LA GADUAMINE se caractérise plus spécialement par ses *procédés scientifiques* de fabrication qui en font un produit sans goût ni odeur désagréable, et privé de tous produits de décomposition plus ou moins nocifs.

Action. — La GADUAMINE agit :

Par les principes hydrosolubles du foie, comme anti-anémique et antitoxique.

Par les vitamines naturelles A et D, comme stimulant de la croissance et fixateur du calcium.

Principales Indications. — *Anémies :* anémies pernicieuses, toxiques, post-hémorragiques, infantile ; chlorose. *Etats d'infection chronique :* Adénites, scrofules, lymphatisme, prétuberculose et tuberculose. *Avitaminoses :* Rachitisme, allaitement, suites de couche, croissance.

Mode d'emploi. — *Enfants :* X à XL gouttes. *Adultes :* XL à LX gouttes. A prendre en 2 fois, avant les principaux repas, dans un liquide quelconque (eau sucrée, tisane, bouillon, vin, etc.).

Durée moyenne du flacon : 28 jours.

Prix : 15 francs.

Laboratoires RENARD et C^{ie}

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

(Tél. : Pereire 14-08.)

GADUASE

Tonique et stimulant général d'action rapide et durable. Succédané classique et agréable (sirop framboisé) de l'huile de foie de morue.

Composition :

Hypophosphites de sodium et de calcium (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

Méthylarsinate disodique (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins.

Iode (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable), régulateur du métabolisme et anti-infectieux de premier ordre.

Convient à tous les âges.

La GADUASE active les échanges, réveille les fonctions, prévient et fait cesser rapidement les carences organiques. Ni incompatibilité, ni contre-indication.

Indications. — Anémie, Anorexie, Lymphatisme, Asthénie, Déminéralisations, Convalescences et toutes les insuffisances fonctionnelles.

Posologie. — Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

Nourrissons : 1/2 à 1 cuillerée à café *pro die*.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café.

Adolescents et adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Flacon (210 cc. environ) : 11 francs.

Grand flacon (400 cc. environ) : 17 fr. 50.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

GAÏACAMPHRE

Présentation :

Quatre formes : *Ampoules, Comprimés, Sirop, Suppositoires* :

1° *Ampoules* de 2 et 5 cc.

Solution aqueuse de camphre (camphosulfonate) et de Gaïacol (glycéryl gaïacol) indolore, de résorption rapide, non toxique.

Formule des ampoules :

Ether monoglycérique du gaïacol..... 0 gr. 05

Camphosulfonate de sodium 0 gr. 17

Eau distillée q. s. pour 1 cc.

Correspondant à 0 gr. 10 de camphre et 0 gr. 05 de gaïacol par cc.

2° *Suppositoires* : adultes et enfants.

3° *Comprimés* :

Présentés en enrobage se dissolvant en milieu intestinal seulement.

Formule des comprimés :

Dionine 0 gr. 005

Glycéryl gaïacol..... 0 gr. 10

Camphosulfonate..... 0 gr. 05

Alcoolature de racine d'aconit... III gouttes.

4° *Sirop* : formule du sirop :

Glycéryl gaïacol 1 gr.

Camphosulfonate 0 gr. 2

Teinture d'Aconit 0 gr. 5

Dionine 0 gr. 06

Eau de Laurier-cerise..... 4 gr. 5

Eau distillée et sucre q. s. p. 100 cc.

Indications. — Toutes affections bronchiques ou pulmonaires aiguës, toutes suppurations chroniques pulmonaires.

Préventif des complications pulmonaires d'origine médicale ou chirurgicale.

Prix :

Ampoules : 22 fr. 90 la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

22 fr. 90 la boîte de 7 — de 5 cc.

Comprimés : 14 fr. 05 la boîte de 30 comprimés.

Sirop : 14 fr. 5 le flacon.

Suppositoires : la boîte 16 fr. 65.

Nous préparons aussi le **Gaïacamphre** sous toutes ses formes avec Ephédrine.

Mode d'emploi :

Ampoules : Adultes, de 1 à 4 par jour ; Enfants, 1 par jour ou tous les 2 jours.

Comprimés : Adultes, 3 à 6 par jour ; Enfants, au-dessus de 5 ans, 1 à 3 par jour suivant l'âge.

Sirop : Adultes, 4 à 5 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, au-dessus de 5 ans, 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Suppositoires : un le soir de préférence.

Laboratoires PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES. (Tél. : 923.)

GAÏACOLINE

Solution balsamique, expectorante et sédative pour
toutes les affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques
 à action décongestive, résolutive et antiseptique des états inflammatoires
 de l'appareil respiratoire.

Composition :

Gaïacolsulfonate de Potasse.....	1 gr. 20
Ephédrine chlorhydrate.....	0 gr. 12
Diméthyl oxyquinizine.....	0 gr. 90
Ether benzylbenzoïque.....	0 gr. 20
Ether benzyl-cinnamique.....	0 gr. 20
Caféine.....	0 gr. 20
Sirop de Codéine.....	50 gr.
Elixir de framboise.....	47 gr. 18

Gaïacoline est une solution stable, de goût agréable, non toxique,
 sans risques d'intolérances ;

Elle réalise : la sédation de la toux opiniâtre ; la modification des
 sécrétions bronchiques ; l'antiseptie des voies respiratoires ; la défense
 de l'organisme débilité.

Infections grippales : à toutes périodes et sous toutes formes.

Affections broncho-pulmonaires : Rhumes, Catarrhes, Asthme,
 Emphysème, Laryngites, Pharyngites Bronchites aiguës et chroniques.
Pleurésies, Pneumones spécifiques et aspécifiques : Coqueluche,
 Rougeole.

Posologie. Adultes : De deux à quatre cuillerées à soupe par jour.

Enfants : De deux à quatre cuillerées à café par jour.

A prendre loin des repas.

Prix : Le flacon de 300 grammes : 25 francs.

Produits Biochimiques ROSSO. — THURET, Pharmacien,
 63, rue de Charonne — PARIS.

GAÏARSENAN DUCATTE

Remède de la grippe et de ses complications.

Solution aqueuse de cadodylate de gaïacol chimiquement pur et de
 strychnine.

Deux formes : Ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées, —
 Dragées de 0 gr. 25 pour médication interne.

Action thérapeutique et usage. — Prescrit dans la grippe et ses com-
 plications, dans les formes aiguës (broncho-pulmonaire ; gastro-
 intestinale ou nerveuse), dans la convalescence même après disparition
 complète des symptômes généraux (neurasthénie post-grippale).

Posologie et Mode d'emploi :

Ampoules : Une à deux injections sous-cutanées par jour selon la gravité
 de l'infection.

Dragées : Deux à trois dragées par jour selon le cas.

L'emploi du *Gaïarsenan Ducatte* n'exclut pas les autres médications
 symptomatiques ni l'observation des règles d'hygiène et de prophy-
 laxie. Les injections pratiquées dans la région fessière avec les pré-
 cautions d'usage seront faites très lentement, ce qui les rend indo-
 lores.

Chez l'enfant au-dessous de quinze ans la grippe se différencie peu d'une
 bronchite vulgaire.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré — PARIS.

GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lactosérique.

Forme. — Présentée en tubes scellés de 10 cc.

Indications. — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestive, métrites, vaginites, pansement des plaies.

Mode d'emploi. — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée ;

2° *Enfants* jusqu'à 3 ans ; 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement ;

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Prix de vente : 15 fr. 60.

Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE.

(Tél. : Dragon 12-55.)

GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.

Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil, etc.

Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

Mode d'emploi :

Trois fois par jour, 1 ou 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte simple : 16 fr. 50.

La boîte triple : 42 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 fr.

VILLEFRANCHE (Rhône).

P. PHILIPPE, Pharmacien de 1^{re} classe.

GALAPHOS

L'allaitement maternel à condition qu'il soit *riche et abondant* constitue le régime alimentaire par excellence du nourrisson.

Composition :

Mamelline 1 gr. ; Placentine 1 gr. ; Extrait de Galéga 8 gr. ; Cannelle pulvérisée 1 gr. ; Fenouil pulvérisé 1 gr. ; Nucléinate de manganeuse 0 gr. 50 ; Hexa-inosito-phosphate de Ca et Mg. 4 gr. ;
Excipient... Q. S. p. 100 grammes.

Mode d'action. — Association opo-phyto-chimiothérapique, le *Galaphos* a une action polyvalente.

Galactogène par les extraits opo et phytothérapiques.

Reminéralisante et reconstituante par la présence des ions P, Ca, Mg et Mn.

Indications. — Insuffisance lactée sous toutes ses formes, déficiences organiques consécutives à la grossesse, la maternité et l'allaitement, Asthénies, etc... Aucune contre-indication.

Posologies. — Trois à quatre cuillerées à café par jour à la fin des repas.

Présentation et Prix :

Granulé : le flacon de 100 grammes : 19 fr. 25 ; pour 10 à 12 jours de traitement.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1578-1.

Laboratoire du GALAPHOS

P. Wilson-Carli, Pharmacien de 1^{re} Classe.
92, r. Camille-Pelletan, 2, r. d'Amiens — MARSEILLE. (T. : N. 04-09.)

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde formique.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications. — 1° Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3° Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin toutes les heures ou 1/2 heures.
La laisser fondre lentement dans la bouche.

Prix : 6 fr 40

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

GAMBÉOL

Adopté par le Ministère de la Santé Publique.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier).

Mode d'action. — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

Indications. — Syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes.

Formes et posologie:

1° Cachets à 1 cgr., 2 ou 3 chaque jour (10 jours de trait.).
Prix : 24 francs.

2° Cartouches de pommade blanche pour frictions à 50 %.
Prix : 24 francs.

Adultes : 1 chaque jour (8 jours de traitement).

Enfants : Fractions suivant l'âge (15 jours environ de traitement).

3° Suppositoires adultes à 10 cgr., 1 chaque jour.

Prix : 24 francs (12 jours de traitement).

Suppositoires enfants à 5 cgr., 1 chaque jour.

Prix : 22 francs (12 jours de traitement).

RÉFÉRENCES : Thèses des Docteurs Dugué, Bouilloux, Rouzaud.

Laboratoire du Gambéol — 42, rue Émile-Deschanel.

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Défense 17-67.)

GANDERMA

Pommade renfermant les principes actifs de l'eau d'Alibour associés au principe actif du Gambéol et à l'oxyde de zinc.

Formule:

Protochlorure de mercure léger et dissociable	5 gr.
Sulfate de cuivre anhydre pulv.....	0 gr. 50
Sulfate de zinc pur pulv.....	1 gr.
Oxyde de zinc pur pulv.....	18 gr.
Excipient (Lanoline et Vaseline)....	75 gr. 50

Indications. — Toutes affections et infections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne. Acnés, Dartres, Ecthymas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigo, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites et toutes infections.

Présentation. — En tubes étain imprimés.

Prix : Le tube : 15 francs au public.

Laboratoire du GAMBÉOL

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

42, rue Émile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 17-67.)

GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

Indication.

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, etc. Antispasmodique (méthode des doses réfractées), Angor, migraine, prurits entérocolites, dysménorrhée.

Présentations :

Comprimés à 0 gr. 10 (tubes de 20)	7 fr. 30
— à 0 gr. 05 (tubes de 30)	7 fr. 30
— à 0 gr. 01 (tubes de 80)	6 fr. 25

Doses par 24 heures :

Adultes : 0 gr. 05 à 0 gr. 30.

Enfants : 0 gr. 02 à 0 gr. 10.

Gardénal injectable : ampoules dosées à 0 gr. 04 ou à 0 gr. 20 de gardénal (boîtes de 5 ampoules de 1 cc.).

Strychno-gardénal : dragées dosées à gardénal 0 gr. 05. Sulf. de Strychnine 0 gr. 0003 (Fl. de 40 dragées). Dragées dosées à gardénal 0 gr. 10 et sulf. de Strychnine 0 gr. 0006 (Fl. de 30 dragées). Thyro-gardénal (ass. de gardénal et d'extrait thyroïdien).

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GARÉPHÉDRINE

Comprimés.

(Anciennement **GARDÉPHÉDRINE**)

Chl. Ephédrine naturelle 3 cgr.

Phényléthylmalonylurée..... 1 cgr.

Action. — L'addition de ce sédatif à très faible dose évite les troubles parfois provoqués par l'éphédrine dans les cas d'asthme nerveux (palpitations, tremblements, insomnies).

Indications. — Spécifique de la crise, Asthme essentiel, Asthme nerveux, Asthme infantile, Emphysème, Asthme rebelle, Accès avec insomnie, Rhume des foies, États dyspnéiques, États allergiques, Hypotension, Toux spasmodique, Vertige de Ménières.

Posologie. — Un comprimé avant ou au début de la crise. Répéter après une demi-heure si nécessaire.

De 8 à 14 ans : 1/2 comprimé.

De 2 à 8 ans : 1/4 de comprimé.

Voir également : **Diuréphédrine, Ephédrasmine**
et **Bronchasmine**

Échantillons et Littérature sur demande.

Prix : 16 francs le tube de 20 comprimés.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

GARGARISME DU MONT-DORE DU D^r SALYS

A base de Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications. — Toutes affections de la bouche et de la gorge.

Propriétés. — Antiseptique buccal très actif, mais non toxique, non caustique, parce que ne coagulant pas les albumines.

Mode d'emploi. — En gargarisme une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau tiède. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient. Il peut s'employer pur en badigeonnage comme collutoire.

Prix : 10 francs.

Laboratoire de la **VARILAXINE**
SURGÈRES (Charente-Inférieure).
(Tél. : 59.)

GARGYL

Collutoire, Gargarisme.

Composition. — Guimauve, Mauve, Coca, Salicylate de soude, Résorcine, Phénosalyl, excipient Glycérine.

Propriétés. — Antiseptique, émollient, sédatif.

Indications. — Toutes les affections de la gorge et de la bouche. Amygdalites, Angines, Absès, Stomatites, Gingivites.

Mode d'emploi :

Pur. — En badigeonnage comme collutoire, toutes les 3 heures.

Dilué. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau bouillie tiède pour gargarismes. Très actif et de goût agréable.

Prix : 7 fr. 50.

Laboratoires **R. CHEMINEAU**
VOUVRAY (Indre-et-Loire). (Tél. : 30.)

GASMANYL

Agent régulateur des Fonctions digestives.

Composition :

Carbonate de chaux	7,
Hydrate de magnésie	5
Bicarbonate de soude	3
<i>Génatropine</i>	0,004
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

Forme. — Granulé.

Indications. — Toutes les insuffisances gastriques.
Stimulant des fonctions digestives. Calmant des douleurs stomacales.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par jour après les repas ou au moment des crises douloureuses.

Prix. — 15 francs.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1107-3.

E. VERDON

Docteur en pharmacie

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8.)

GASMAR LEGENDRE

(Comprimés dragéifiés à croquer.)

Composition. — A base de ferments digestifs frais, associés aux sels chimiquement purs de sodium (Bourgel), de magnésium, de bismuth, et à la noix vomique (amer excito-moteur).

Indications. — Véritable *spécifique-digestif* complet.
Dyspepsies, gastralgies, gastrites, insuffisances gastriques, Insomnie gastrique, etc.

Avantages. — Pas de toxicité, ne constipe pas, s'élimine bien. Pas d'accoutumance.

Posologie et mode d'emploi :

Après les repas ou au moment des douleurs.

Adultes . 3 à 10 comprimés par 24 heures.

Enfants : (à partir de 5 ans) demi-dose.

Prix au public : 15 francs (20 jours de traitement).

Laboratoires LEGENDRE et C^{ie}

Section DS — HOUILLES (S.-et-O.).

Dépôt général pour la vente en gros :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle de
Médicaments sous le n° 1045-3.

GASTÉOSE

Comprimés effervescents à base de Sulfate de Magnésie, Sulfate de Soude, Citrate de Soude, Azotate de Potasse.

Dyspepsie, Gastralgie, Infections du tube digestif, Insuffisance hépato-rénale, Fermentations, Constipation, Urticaire, Dermatose.

Posologie :

4 à 6 comprimés par jour dans un grand verre d'eau le matin à jeun et aux repas.

Prix : 15 fr. 60.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23.)

GASTRÉPATINE

Sulfate, citrate, phosphate, bicarbonate de soude,
Sels rigoureusement anhydres.

En faisant dissoudre 2 paquets dans une bouteille d'Eau d'Evian, on réalise la solution de Bourget.

Prescrire un verre à bordeaux le matin à jeun.

La solution est d'absorption facile.

Indications. — Insuffisances glandulaires du tube digestif ; prescription courante dans la thérapeutique du foie, de l'estomac, de l'intestin : hyperchlorhydrie, insuffisance hépatique, dyspepsie, entérites, etc. Contribue au traitement des dermatoses et intoxications intestinales.

Prix : 6 francs.

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

GASTRHÉMA

Méthode de Castle.

Composition. — Extrait de muqueuse d'antré pylorique de porc (opothérapie gastrique anti-anémique).

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc. rigoureusement dosées, d'une saveur agréable, contenant toutes les hormones de l'organe frais.

Indications. — Toutes les Anémies, Asthénies, Anorexies, Hémorragies, Déficiences organiques, Convalescences. Dyspepsies, Hypochlorhydrie, Hypopepsie, Hémogénie.

Sans contre-indications.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour dans un liquide froid, avant les repas.

La boîte de 8 ampoules : 22 francs.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-1.

Admis à l'Assistance publique de Paris.

Laboratoire du GASTRHÉMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX°).

(Tél. : Roquette 76-24.)

GASTRICINE

DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillottes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab. pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

Indications. — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut). Anémie pernicieuse, anémies en général (méthode de Castle).

Mode d'emploi. — A un 1/2 verre d'eau ajouter 1 cuillerée à café de GASTRICINE.

Prendre une gorgée de temps en temps pendant le repas.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 19 fr. 75.

Unité de vente : traitement de 8 à 10 jours.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle, 146-1.

GASTROCALCINE

**Affections de l'estomac, Dyspepsies,
Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Dilatation
de l'Estomac, Ulcères.**

GASTROCALCINE GRANULÉE

1 cuillerée à café contient environ :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
— de magnésie	0 gr. 20
Bicarbonate de soude	0 gr. 20
Sucre anisé, Q. S. pour.....	5 gr.

Par cuillerée à café après les repas et au moment des crises.

Flacon de 40 à 50 cuillerées à café.

GASTROCALCINE BISMUTHÉE

Par dose moyenne (une mesure).

Carbonate de bismuth	2 gr. 50
— de magnésie	0 gr. 30
— de chaux	0 gr. 30
Bicarbonate de soude	0 gr. 25
Kaolin	5 gr.
Bromure de sodium	0 gr. 25
Codéine	0 gr. 005
Extrait de jusquiame	0 gr. 02
Sucre	6 gr.
Essence d'anis Q. s. p. aromatiser.	

Une mesure ou 1/2 mesure selon les cas ou les besoins. 1, 2 ou 3 fois par jour au maximum après les repas ou au moment des douleurs, délayée dans 1/3 ou 1/2 verre d'eau environ.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

GASTROCITRINE

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin.

Forme. — Granulé fondant, agréablement parfumé au citron.

Composition :

Sulfate de soude	10 p. 100
Phosphate de soude	10 —
Carbonate acide de Sodium	15 —
Citrate Neutre de Sodium	15 —

Indications. — Dans tous les troubles gastro-intestinaux se traduisant par :

- 1° Langue saburale et mauvaise haleine au réveil. Vertiges.
- 2° Somnolence après les repas. Migraines.
- 3° Démangeaisons. Urticaire.
- 4° Alternatives de diarrhée et de constipation.
- 5° Intoxications alimentaires. Congestion du foie.
- 6° Inaptitude au travail.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café bien pleines dans un verre d'eau le matin à jeun, et au besoin dans la journée.

Enfants : 1 cuillerée à café rase.

Nota. — Pour obtenir meilleur effet et bien meilleur goût, il est recommandé de faire dissoudre le granulé dans un verre d'eau.

Durée moyenne du traitement : 10 jours.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoire de la GASTROCITRINE
LUC-SUR-ORBIEU (Aude). (Tél. : 6.)

GASTROCLEAN

Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins.

Préconisé par tous les spécialistes de l'estomac, des intestins et du foie.

Gastroclean est le remède spécifique et souverain des Dyspepsies, des Affections gastro-intestinales, de la congestion hépatique et des infections biliaires et auto-intoxications.

Gastroclean neutralise l'hyperacidité gastrique, calme les douleurs stomacales et régularise la digestion.

Dose et mode d'emploi.

(Sans autre indication du Médecin.)

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau de Châtel-Guyon.

(Durée du traitement de l'unité 10 à 12 jours.)

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, r. des Francs-Bourgeois — PARIS — Tél. : Ar. 63-27.
En vente chez tous les Droguistes et Pharmaciens.

GASTRONALDINE

Estomac, Foie, Intestin.

Forme. — Paquets.

Formule. — Hépatine, Rénine, Gastérine, Belladone, Kaolin, Carbonate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate acide de Sodium.

Produits opothérapiques en milieu alcalin bien dosé.

Indications. — Aérophagie, Hyperchlorhydrie, Hyper-sécrétion gastrique, Pyrosis, Brûlures d'estomac, Troubles gastriques d'origine alimentaire ou nerveuse, Ulcération de l'estomac et du duodénum, Insuffisance motrice de l'estomac, Maux de tête, Insomnie, Congestion du foie et des reins.

Mode d'emploi. — Suivant avis du docteur, 2 à 4 paquets par jour au milieu, à la fin ou entre les repas.

Prix : 15 fr. 60 la boîte de 28 paquets.

La demi-boîte 9 fr. 90.

Laboratoires M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 54-69.)

GASTRONIGER

Thérapeutique rationnelle de toutes les lésions de la muqueuse gastro-intestinale.

Composition. — Charbon animal pur, kaolin. — Excipient : Q. S.

Indications. — Ulcères gastriques et ulcères duodénaux, spasme pylorique, *douleurs tardives*, ballonnements, brûlures, vomissements, intoxications intestinales.

Mode d'emploi. — Un paquet délayé dans 1/3 de verre d'eau, pris le plus tard possible, au moins 2 heures, après le repas du soir.

La boîte de 10 sachets : Prix : 17 fr. 05.

Laboratoires COUVERT

11, rue de Mogador — PARIS (IX^e).

GASTROPANSEMENT

du Dr ZIZINE

Pansement polyvalent à base de charbon activé, réalisant la protection intégrale de la muqueuse gastrique.

Forme. — Paquets.

Composition. — Charbon polyvalent activé, très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des ulcères gastriques et des gastro-pathies douloureuses.

Indications. — Hyperchlorhydrie.
Gastrites.
Spasmes du pylore.
Atonie gastrique.
Dyspepsies réflexes.
Ulcères.

Posologie. — Prendre le matin à jeun, et au besoin le soir, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 20 fr. 30.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

GASTROPEPTYL

Formes pharmaceutiques. — 1° Granulé ; 2° Comprimés. (150 gr. granulé environ ou 50 comprimés.)

Composition. — Peroxyde de magnésie, Carbonate de magnésie, Carbonate de calcium, Deuto-carbonate de soude (saturants formule Robin), Papaine et Diastase (ferments végétaux).

Propriétés et avantages. — Calme les douleurs gastriques et facilite la digestion. Il neutralise les acides de fermentation et agit en même temps sur la musculature gastrique en amorçant l'action des glandes stomacales.

Indications. — Dyspepsies gastriques et duodénales, pesanteurs, acidités, brûlures, aigreurs.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café de granulé ou 3 comprimés avant, pendant ou après le repas, dans un peu d'eau, mais de préférence après les repas.

Prescription. — 1 boîte granulé ou 1 boîte comprimés Gastropeptyl.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-Interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

GASTRO-SÉDATIF-ATCIA

Formule :

Citrate de soude	6,57
Bicarbonate de soude.....	6,57
Carbonate de chaux	26,28
Carbonate de magnésie.....	26,28
Hexaméthylènetétramine.....	0,85
Phényléthylmalonylurée.....	0,34
Essence de menthe	0,21
Sucre Q. S. p.....	100 gr.

Le Gastro-Sédatif-Atcia se prend à dose d'une, au besoin deux cuillerées à café, délayées dans un quart de verre d'eau, après chacun des deux principaux repas. En cas de troubles persistants, cette dose peut être renouvelée à tout moment du jour et de la nuit.

Indications. — Toutes affections stomacales : Ulcérations stomacales, Gastralgies, Gastrites, Hyperacidité, Fermentations, Dyspepsie nerveuse, Dyspepsie hypersthénique, Hyperchlorhydrie, Troubles du sympathique d'origine gastro-hépatique :

a. Palpitations, Arythmies.

b. Douleurs avec lenteurs digestives.

c. Anxiété d'origine digestive, Insomnies.

Prix : 15 francs.

Laboratoires COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

GASTRO-SODINE

Composition : par cuiller à café.

	Normale.	B. Bromurée.	C. Citratée.	S. Sulfatée.
Bic. de soude sursaturé	0,80	0,80	0,80	0,20
Phosphate de soude.	0,40	0,40	0,40	0,40
Sulfate de soude.	0,20	0,20	0,20	0,80
Bromure de Sodium.		0,20		
Citrate de soude...			0,40	
Sels desséchés chimiquement purs.				

Propriétés et indications. — Gastro-entérites simples, gastro-entérites neuro-arthritiques, gastro-entéro-hépatites, Troubles circulatoires, Hypertension, Viscosité sanguine.

Forme. — Granulé.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuiller à café le matin dans un verre d'eau de préférence chaude.
Dose supplémentaire sur avis du médecin.

Durée moyenne des unités de vente : 20 jours.

Prix de vente au public : 13 fr. 65.

Laboratoires Gastro-Entérologiques ODINOT
21, rue Violet — PARIS (XV^e). — (Tél. : Ségur 69-13.)

GASTROZYMASE

Composition. — Ferments gastriques naturels.

Indications. — En plus du pouvoir de substitution utilisable en cas d'hypopepsie ou d'apepsie, le système des ferments gastriques (zymases), rassemblés dans la GASTROZYMASE, a la propriété de stimuler les fonctions digestives déficientes et de les régulariser, défendant ainsi l'intestin contre l'envahissement des germes ou toxines pathogènes. Les troubles gastriques, qu'ils proviennent d'hypo ou d'hyperchlorhydrie, d'hypo ou d'hyperpepsie.

Forme. — Comprimés effervescents.

Posologie. — Comme médicament de substitution ou régulateur gastrique : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau au milieu du repas.

Comme stimulant gastrique : 1 à 2 comprimés dissous dans l'eau, 1 heure avant chaque repas.

Prix : 21 fr. 10.

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS.

GASTRUTH

Cachets

Assure la digestion aisée de tous les aliments.

Composition :

Pepsine en poudre Codex.	0 gr. 20	S. N. Bismuth Codex...	0 gr. 20
Pancréatine Codex.....	0 gr. 15	Carbonate de Magnésie..	0 gr. 20
Maltine Codex.....	0 gr. 15	Carbonate de Chaux....	0 gr. 20
Noix vomique pulvérisée.	0 gr. 01	Bicarbonate de Soude...	0 gr. 25

Pour un cachet.

Originalité. — Les cachets GASTRUTH apportent à l'estomac le concours des trois ferments indispensables à une rapide et complète digestion : **pepsine, pancréatine, maltine.**

L'adjonction d'éléments neutralisants ramène l'acidité stomacale à son taux normal. En plus, l'addition de certains éléments neutres (carbonate de chaux, sous-nitrate de bismuth) permet un revêtement de la muqueuse, **VERITABLE PANSEMENT GASTRIQUE.**

Posologie. — Prendre un cachet avant les repas de midi et du soir. Au besoin, prendre un deuxième cachet après un repas abondant et plus lourd qu'à l'habitude.

Indications — Dyspepsies, Gastrite aiguë ou chronique, Hyperchlorhydrie, Hypochlorhydrie, Dilatation d'estomac, Ptose gastrique, Aéro-phagie.

Présentation. — Boîte de 20 cachets.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). (Tél.: Gobelins 36-96.)

GATRAN

Composition. — Le GATRAN désigne soit un *Savon* liquide médicamenteux, soit un *Baume* soluble dans l'eau, à base de Goudron de Norvège et de Ricinoléate de soude.

Le Savon Cadique et le Baume Cadique contiennent en plus de l'Huile de Cade.

Indications. — Pityriasis simplex, Eczéma séborrhéique, Séborrhée, Calvitie séborrhéique.

Desquamations pelliculaires, Psoriasis, Acné, Séborrhée huileuse de la poitrine et du dos.

Mode d'emploi. — En principe, applications chaque soir sur le cuir chevelu de *Baume*; le matin, lavage au *Savon*.

Le savonnage quotidien au GATRAN est recommandé, à titre préventif, contre toutes les affections séborrhéiques.

Présentation. — *Baume* : flacon de 90 cc.
Savon : flacon de 500 cc.

Prix de vente :

Le flacon de Baume GATRAN : 18 fr. 25.

Le flacon de Savon GATRAN : 30 francs.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND
14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt :

Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin — " 5

GAUROL

Nouveau sel phosphoré, calcique et magnésien entièrement assimilable.

Présentation. — 3 Formes: Ampoules injectables de 1 cc. — Comprimés. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique général de l'organisme. — Reminéralisateur. — Recalcifiant.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anémie, Convalescence, Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Affections dentaires, Rachitisme, Troubles de l'ossification, Lymphatisme, Consolidation des fractures.

Mode d'emploi. — 1 ampoule injectable par jour ; 1 à 3 comprimés par jour ; 1 à 3 cuillerées à café de granulé par jour.

GAUROL INTRAVEINEUX

Présentation. — Ampoules de 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique puissant, Recalcifiant, Reminéralisant.

N'est pas caustique comme le Chlorure de Calcium.

Indications thérapeutiques.

En Médecine :

Hémorragies et Anémies qui en résultent.

Epanchements des séreuses.

Tuberculose pulmonaire (Traitement symptomatique de l'asthénie, de l'anorexie, de l'amaigrissement).

En Chirurgie :

Hémorragies : à titre curatif et à titre préventif.

Consolidation des fractures.

Tuberculoses osseuses ou articulaires.

Mode d'emploi. — 1 ampoule tous les 2 jours. Injecter 10 cc. en cas d'urgence.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUOQ

30, rue Armand-Sylvestre — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

GÉCAN

Traitement combiné.

Spécifique de la coqueluche.

Anticatarrahā-Antispasmodique.

Tarit la sécrétion, supprime la quinte. Réunit d'une façon harmonieuse deux traitements directs de la *Coqueluche*.

Indications. — *Sirop du Dr Canac*, asséchant type, diminuant avec sûreté et continuité l'abondante sécrétion catarrhale résultant de l'état coquelucheux.

Gouttes Géha « B », synergie parfaite de médicaments, jugulant spécifique des quintes, symptômes dominants et alarmants de cette maladie.

Présentation. — Se trouve réunit dans une boîte unique : un flacon de *Sirop du Dr Canac*, et un flacon de *Gouttes Géha « B »*. Prix au public : 25 francs.

Mode d'emploi et doses. — Se rapporter aux rubriques : *Sirop du Dr Canac* et *Gouttes Géha*.

Laboratoire Médical « GÉHA »

à PORT-DE-BOUC, près Marseille (B-du-R).

(Tél. : 30.)

GELIDERM

Toutes les affections de l'épiderme.

Composition :

Acide salicylique	}	à 1 gr.
Résorcine		
Chloral		
Acide phénique		

Excipient liquide spécial pour 100 grammes.

Forme : Liquide.

Indications. — Usage externe ; Eczéma, Impétigo, Herpès, Pityriasis, Affections parasitaires, Piqûres d'insectes, etc...

Mode d'emploi :

3 applications par 24 heures avec un tampon de gaze.

Prix. — 15 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1311-1.

Laboratoire GELIA

16, rue Saint-Yon — La ROCHELLE.

(Tél. : n° 2265.)

GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

Préparation dénuée de toute action irritante ou toxique, très opaque, de bonne conservation.

Exploration radiologique du tube digestif.

Mode d'emploi. — Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient (chocolat par exemple).

Prix de vente du flacon de 200 g. : 10 fr. 60.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.

Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

Posologie. — *Traitement des douleurs de l'estomac :* 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique : 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoires LICARDY.

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s.-SEINE.

(Tél. : Maillot 17-75.)

GÉLOK

Tablettes.

Pansement gastrique complet (absorbant, protecteur, neutralisant) :

Formule :

Gélose.....	0,10
Grénétine	0,10
Magnésie hydratée	0,25
Kaolin purifié colloïdal.....	0,25

— Excipient menthé, Q. S. p. 1 tablette de 3 grammes équivalent à une cuillerée à café de poudre.

Tablettes Gélok *belladonnées* même formule + V gouttes de teinture de belladone par tablette.

Présentation. — En étuis de poche de 11 tablettes ;
4 étuis de gélok simple ;
1 étui de gélok belladonné ;
par boîte : 16 francs.

C'est le parfait

traitement ambulatoire
des hyperchlorhydriques
Laboratoire LEURQUIN
DREUX

GÉ LOTANIN CHOAY

Nature. — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissociable dans l'intestin en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.

Indications. — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

Formes pharmaceutiques et posologie :

- 1° Pour *nourrissons* et *jeunes enfants* : Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud.
- 2° Pour *adultes* : Cachets dosés à 50 cgr. : 4 à 8 par jour.

Boîte de 20 paquets. Boîte de 24 cachets.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

GÉLOTUBE 29

Le **GÉLOTUBE 29** contient la pommade prophylactique antivénérienne au cyanure de mercure suivant la formule du D^r GAUDUCHEAU.

Cyanure de mercure.....	0 gr. 125
Thymol	1 gr. 250
Calomel	25 gr.
Lanoline	50 gr.
Vaseline et huile de vaseline.....	24 gr.

Cette pommade est destinée à préserver de la Syphilis et de la Blennorrhagie l'homme qui vient de s'y exposer. Elle est logée dans un petit tube pointu à paroi de gélatine, renfermant une dose et permettant d'introduire une partie du contenu à l'entrée de l'urètre et de distribuer le reste sur les muqueuses externes.

Le **GÉLOTUBE 29** est accompagné d'un mode d'emploi rédigé par le D^r GAUDUCHEAU donnant tous les détails utiles pour accomplir correctement cette mesure d'hygiène. (Voir *Revue d'hygiène*, de 1919 à 1933.)

Prix : Boîte de 6 : 11 fr. 75.

Laboratoire du **GÉLOTUBE 29**

49, rue de Bitché — COURBEVOIE (Seine).

GÉNACIDE

Composition. — Granulé acigène contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique 12 gr. 75

Chlorure ammonique 5 gr.

Ac. phosphorique officinal.... 1 gr. 35

Cinq grammes représentant comme coefficient d'acidité en $\frac{N}{10}$ 150 cc.

Indications. — Alcalose (détectée par le *Papier Réactif Génacide* donnant le pH).
Colibacillose, Asthénie.

Forme. — Granulé.

Dose. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire **MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.
(Tél. : Gobelins 23-90.)

GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux, Entérite muco-membraneuse.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.
Granules au 1/2 mgr. Ampoules à 2 mgr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 19 fr. 50.
Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire **AMIDO**

A. BEUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNÉCARMINE

Association de Phényléthylmalonylurée. Eséridine. Salicylate. Formine. Charbon.

Formule. — 1 cuiller à café de granulé contient : Phényléthylmalonylurée 0 gr. 02, Salicylate Eséridine 0 gr. 001, Charbon animal 0 gr. 50, Charbon végétal 1 gr., Formine 0 gr. 30.

Présentation. — Cachets, Granulé fondant de goût agréable.

Indications. — Entéro-colites, atonie gastro-intestinale, constipation chronique par atonie, troubles digestifs sympathicotoniques et leurs conséquences.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café ou cachets par jour avant les repas.

Prix : Boîte modèle courant : 17 fr. 70. (Durée moyenne : 6 jours.) — Flacon Cure : 41 fr. 60.

Laboratoire **R. THIRODE**

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,

33, Grande-Rue — BESANÇON

(Tél. : 0-37.)

GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg
Salicylate de Génésérine.

Formes. — Granules et dragées au 1/2 mgr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 mgr.

Indications. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours. Le flacon ou la boîte. Prix au public : 19 fr. 50.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 41-65.)

GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueur des tuberculeux.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 milligr.
Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Prix au public : le flacon ou la boîte.
19 fr. 50.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg.

Formes. — Comprimés dosés à 2 centigrammes. Ampoules à 4 et à 10 centigrammes.

Indications:

La douleur : Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies, Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation.

Mode d'emploi. — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

Comprimés : 2 à 4 par jour. — **Ampoules :** 1 à 2 par jour.

Prix : La boîte de 7 ampoules de 4 cgr., 27 fr. 50.

Le flacon de 15 comprimés de 2 cgr., 27 fr. 50.

La boîte de 12 ampoules de 10 cgr. pour cure de démorphinisation, 100 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à un traitement de 7 à 10 jours, à dose journalière maximum.

Laboratoire des Produits Amido

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 41-65).

GÉNOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications.

ÉTATS PARKINSONIENS, Paralysie agitante, Syndromes post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.

Granules au 1/2 mgr.

Ampoules dosées à 3 mgr. et à 1 mgr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération.

Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopolamine à 3 mgr. suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 24 fr. 50.

La boîte d'ampoules : 34 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOSTHÉNIQUES

Ampoules, Granules. Gouttes.

Cacodylate de Génomstrychnine et de Génésérine
Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire, des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémiés.

Formes. — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

Ampoules. — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix au public : 22 francs.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges. — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

Formes. — *Gouttes* : XXX gouttes = 5 milligr.
Granules à 0 gr. 002. *Ampoules* à 0,01.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

Dose injectable : une ampoule par jour.

Le flacon ou la boîte : 17 fr. 50.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GERMIDOR

Germe de blé pur, stabilisé.

Composition :

Vitamines : A (de développement, anti-infectieuse).
B¹, B², B³ (antinévritique, d'utilisation nutritive et cellulaire).

E (de reproduction).

P (d'intégrité dermique).

Phosphates calco-magnésiens directement assimilables, fer, cuivre, lécithines.

Propriétés. — Facteur de stimulation physiologique générale, recalcifant, neurotonique, laxatif.

Indications. — Tous les cas où il faut relever l'état général de façon atoxique : carences vitaminiques graves ou frustes, précarences, déficiences organiques, troubles de la croissance, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescences, notamment à la suite des maladies infectieuses, états prétuberculeux, adénopathies, grossesse, allaitement. Certains troubles des fonctions digestives, constipation (action laxative sans accoutumance), anorexie, colites.

Germidor doit être administré au cours des régimes alimentaires trop stricts (colitiques, hépatiques, cardio-rénaux) ; chez les diabétiques, *Germidor* augmente la tolérance aux hydrates de carbone.

Posologie :

a. *Germidor* entier.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert par jour.

b. *Germidor* pulvérisé : 1/2 doses ci-dessus.

Nourrissons : 1/2 à 1 cuillerée à café à diviser en 3 ou 4 biberons.

Germidor (en germe entier ou pulvérisé) se mélange simplement aux aliments (potage, lait, purées, compotes, eau). Il ne doit jamais être soumis à la cuisson.

Prix : *Germidor* entier :

15 francs la boîte PM (250 grammes environ).

39 francs — GM (1 kg. environ)

Germidor pulvérisé :

17 francs la boîte PM (environ 300 grammes).

Laboratoires du GERMIDOR

GRASSE (Alpes-Maritimes).

GERMINOL

Présentation. — Pastilles en étuis métal.

Principes actifs. — Inositophosphate de chaux et de magnésie, phosphate de manganèse, protoxalate de fer, huile de foie de morue concentrée.

Indications. — Anémies de toutes origines, Retard de croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Amaigrissement, Dépression nerveuse.

Mode d'emploi. — a. *Enfants* : 3 pastilles par jour absorbées dans une gorgée d'eau, ou dans de la confiture, du miel, de la marmelade ou dans le potage.

b. *Adultes* : 6 pastilles par jour absorbées comme ci-dessus.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé dans des extraits végétaux.
Non toxique. Goût agréable.

Indications. — Employée contre la Coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émetisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Gripes pulmonaires, etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Non toxique. Sans action nuisible sur le tube digestif, ce qui en facilite l'emploi même chez les nourrissons.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (XLVI gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé.

Doses habituelles dans les 24 heures : jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes ; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes ; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes ; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes.

Aucune contre-indication.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires LEBEAULT
BESINS et C^{ie}, Pharmaciens
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

GLANDEX PHOSCALCIQUE

Forme. — Granulé.

Formule. — Ergostérine irradiée, Parathyroïdine, Thymusine, Splénine, Hépatine, Surrénine, Gluconate de Chaux, Poudre d'os frais, Moelle osseuse, Acide anhydroxyméthylène diphosphorique (sel phospho-organique).

Indications. — Surmenage, Faiblesse générale, Neurasthénie, Déminéralisation, Prétuberculose, Carence calcique.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.
Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 20 fr. 80.

Autres GLANDEX :

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Glandex Orchitique, Thyro-Ovarien.
Ovarien, Pluriglandulaire M. et F.,
Thyroïdien, Entéroglandex.

Laboratoires M. A. ROUX

58, rue de Maubeuge — PARIS.
(Tél. : Trudaine 54-69.)

GLANDIMBINE LAFRAN

Indications. — Impuissance génitale précoce ou sénile. Dépression morale ou physique.

Composition. — Yohimbine, 0,005 ; Cérébrine, 0,10 ; Orchitine, 0,15 pour un comprimé dragéifié.

Posologie. — (Pour adultes seulement).
Un comprimé le matin, un à midi, un le soir au repas et un au coucher, si nécessaire.
Avaler avec un peu d'eau ou autre liquide.

Littérature et échantillons aux docteurs seulement.

Prix : 30 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 36-78.)

GLANDOCALCYL

Récalcifiant. — Réminéralisateur.

Composition. — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, diphosphate tricalcique et poudre d'os frais.

Indications. — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, héréd. et pré-tuberculose.

Formes. — Pour *adultes* : cachets ; pour *enfants* : granulé.

Doses. — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : *Cachets*, 15 fr. 60 ; *Granulé*, 17 fr. 20

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

GLÉFINA

Puissant reconstituant général de **saveur agréable**.
Parfaitement toléré et assimilé *en toutes saisons*.

Composition. — A base d'extrait d'huile de foie de morue, d'extrait de malt et d'hypophosphites associés.

Propriétés. — Reconstituant énergétique et d'action durable, remplace l'huile de foie de morue dans toutes ses indications.

Est parfaitement digéré, toléré et assimilé l'été comme l'hiver.

Indications. — Toutes déficiences légères ou profondes, anémies, lymphatisme, tuberculose et pré-tuberculose, convalescences post-opératoires, post-gravidiques, etc...

Posologie :

<i>Enfants</i> :	3 à 5 ans :	2 à 3 cuillerées à café par jour.
	6 à 10 — :	2 à 3 — à dessert —
	11 à 15 — :	2 — à soupe —
<i>Adultes</i> :	3	— — —

Gléfina est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 689-4.

Prix du flacon : 21 fr. 20.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Laboratoire du GLÉFINA,
348, rue Saint-Honoré — PARIS.

GLÉSOL

Médication Antistaphylococcique
Complexe colloïdal organo-métallique.

Description. — Capsules glutinisées contenant :
Étain colloïdal, Levurine extractive, Soufre colloïdal,
Ferments lactiques.

En flacon de 50 capsules.

Action thérapeutique. — L'*étain colloïdal* est un puissant antistaphylococcique, très bien toléré ; la *levurine extractive* agit comme anti-infectieux polyvalent et augmente notablement la phagocytose ; le *soufre colloïdal* modifie les réactions cutanées et renforce l'action de l'étain ; les *ferments lactiques* s'opposent aux fermentations putrides.

Indications. — Furoncles, anthrax, abcès, phlegmons, acné, folliculite, orgelets, sycosis, et toutes les affections dues aux staphylocoques.

Doses :

Adultes : 8 à 15 capsules par jour, et doses doubles, si nécessaire.

Enfants : Doses proportionnelles selon l'âge.

Prix : 28 fr. 60 pour 3 à 7 jours de traitement, A. S. B.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

GLOBEXINE

Conception nouvelle de l'opothérapie hématique spécifique. Extrait aqueux total du globule sanguin privé de ses albumines, directement et complètement assimilable. Jamais d'anaphylaxie.

Propriétés thérapeutiques. — Régénération globulaire intensive.

Indications. — Anémies, croissance, grossesse, états infectieux, hémorragies de toute nature. Convalescences.

Forme. — Ampoules buvables 10 cc.

Dose moyenne :

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour. — *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 10 cc. : 18 fr. 50.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29.)

GLOBALOFER « ROCHE »

Composition. — Chaque comprimé contient :

ℓ-Tryptophane	2 mg. 50
Monochlorhydrate de ℓ-histidine	5 mg. 00
Globine	16 mg. 00
Globine ferrique	66 mg. 00
Globine cuprique	3 mg. 30
Globine manganique	6 mg. 60

Excipient : Q. S. pour un comprimé de 15 centigr.

Action. — Thérapeutique équilibrée et totale de l'anémie, représente une *véritable révolution hématologique*, car, pour la première fois, l'hématopoïèse est, grâce à lui, placée sur son véritable terrain : celui du métabolisme (travaux des prof. Fontès et Thivolle).

Indications thérapeutiques. — Toutes les anémies par spoliation sanguine, par hémolyse, par carence martiale. Anémie du paludisme, des infections, des parasitoses intestinales. Anémie du nourrisson, du donneur de sang, etc. *Toutes les indications du fer* (chlorose, puberté, grossesse, allaitement, diarrhées chroniques, etc.). *Toutes les indications de l'acidaminothérapie* (inappétence, maigreur, déficiences organiques, ulcères gastro-duodénaux, etc.).

Aucune contre-indication.

Avantages. — Les comprimés de Globinofer « Roche » sont inaltérables, sans aucune odeur et sans aucune saveur ; ils sont toujours admirablement supportés par le tube digestif et ils permettent, sans aucun inconvénient, un traitement intensif et prolongé.

Posologie et mode d'emploi :

Nourrissons : 2 comprimés par jour dans du lait.

Enfants : 2 comprimés 2 fois par jour dans de l'eau.

Adultes : 2 comprimés ingérés tels quels au moment des 3 repas.

Comprimés. — Flacon de 60.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-80.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

LOBULES FUMOUZE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

Doses. — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 25 par globule.

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 10 par globule.

Indications. — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

Prix : 20 fr. 30.

Durée moyenne de l'unité de vente :
de 1 à 3 semaines.

Établissements FUMOUZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

LOBULES RÉBAUD

Composition.

Éphédrine chlorhydrate.....	0 gr. 15
Arrhénal	0 gr. 03
Iodure de caféine bromuré	7 gr. 20
Extrait sec polygala	0 gr. 12
— — lobélia	0 gr. 03
— — crataegus	0 gr. 12
— mou d'opium	0 gr. 03
— — belladone	0 gr. 03
pour 30 globules.	

Même composition pour la liqueur Rébaud, destinée aux malades ne pouvant avaler les pilules.

Doses. — Deux globules ou XL gouttes, trois fois par jour : avant les repas de midi ou du soir et deux heures après le dîner.

Indications. — Les **Globules Rébaud** suppriment peu à peu les crises d'asthme, l'emphysème, les dyspnées, bronchites chroniques.

Prix : 18 francs.

Pharmacie ARDOIN

33, boulevard Dubouchage — NICE (A.-M.).

GLOBULES ROMON

Médication rationnelle de l'Impuissance.

Deux formes. — Globules glutinisés et ampoules injectables.

Composition. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'yohimbine et au phosphure de zinc pur.

Propriétés. — Puissant stimulant du système nerveux et du système génital. Tonique général.

Indications. — Asthénie, Sénilité précoce, Dépression physique et intellectuelle, Impuissance.

Posologie :

Globules : 4 à 6 par jour.

Ampoules : Une injection tous les deux jours.

Le flacon de 40 globules : 26 fr. 70.

La boîte de 10 ampoules : 42 fr. 65.

Laboratoires ROMON

11 ter, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

GLOTTYL

Composition. — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

Formes pharmaceutiques. — Gouttes et Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

Indications. — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Coqueluches, Toux coqueluchoïdes, Toux spasmodiques et réflexes.

Posologie. — *Gouttes : Jeunes enfants :*
X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises).

Enfants : XX à XXX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour.

Adultes : XL à LX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane.

Dragées : Enfants : 3 à 6 dragées par jour.

Adultes : 6 à 12 dragées par jour.

Durée moyenne des unités de vente :
4 à 6 jours.

Prix : 14 fr. 55.

Remboursement aux Ass. Soc., Cat. B.

Laboratoires R. DENIS

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 75-60.)

GLOXINES

Protéinothérapie spécifique des cancers.

Méthode du D^r Rubens-Duval.

Présentation. — (Voir ci-contre.)

Composition. — Protéines spécifiques extraites de tissus néoplasiques par la méthode et sous le contrôle scientifique du D^r Rubens-Duval, et diluées en solution physiologique.

Propriétés. — Elles renforcent les réactions de l'organisme contre le cancer, dans la mesure où ces réactions, tant locales que générales, existent et peuvent être développées.

Elles améliorent l'état général des malades et exercent à la longue une action locale sur les cellules cancéreuses qu'elles ramènent vers une évolution normale.

Indications. — Les Gloxines préparent et complètent les interventions chirurgicales et les traitements radiothérapiques, dont elles diminuent les risques de récurrence et de métastase.

Elles ne sont à employer seules que lorsque tout traitement local est contre-indiqué.

Posologie. — En moyenne 2 ampoules par jour, à 12 heures d'intervalle. Boire 1/2 heure avant le repas, le contenu d'une ampoule dilué dans un peu d'eau.

Dans les cas à évolution rapide ou comme traitement pré-opératoire, il peut être donné, sans inconvénient, 3 et même 4 ampoules par 24 heures.

Durée du traitement. — Il doit être prolongé sans interruption tant que la guérison ne peut être considérée comme acquise. La continuité du traitement et sa longue durée sont les conditions nécessaires de son efficacité.

Choix des Gloxines. — Employer les GLOXINES extraites d'une tumeur de même variété que celle qu'il s'agit de traiter (voir liste ci-contre).

Pour le traitement des métastases, utiliser les GLOXINES se rapportant au type primitif de la tumeur.

Dans tous les cas où les GLOXINES spécifiques ne peuvent être utilisées, employer les GLOXINES POLYVALENTES (Voir ci-dessous).

LES GLOXINES POLYVALENTES

Présentation. — (Voir ci-contre.)

Composition. — Protéines extraites de tumeurs de types très variés, diluées à parties égales en solution physiologique.

Indications. — Elles sont à employer lorsqu'on ne sait quelles GLOXINES spécifiques prescrire. L'expérience montre que les malades bénéficient de l'extrait qui leur convient et n'éprouvent aucun effet des autres extraits.

Posologie et durée du traitement. — Identiques à celles des GLOXINES. Elles peuvent être également employées en traitement continu et longtemps prolongé.

LISTE DES GLOXINES

O. C. P. Dépositaire général.

- N° 1. *Épithéliomas épidermoïdes* (bouche, langue, lèvres et orifices naturels).
- N° 2. *Estomac* (cancers épithéliaux).
- N° 3. *Gros intestin, rectum* (épithélioma cylindrique).
- N° 4. *Ovaire* (épithélioma wolffien).
- N° 5. *Ovaire* (épithélioma germinatif).
- N° 6. *Peau* (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes cornés).
- N° 7. *Peau* (épithélioma basocellulaire).
- N° 8. *Prostate* (adénomes et épithéliomas).
- N° 9. *Sein* (épithélioma type ordinaire).
- N° 10. *Thyroïde* (épithélioma).
- N° 11. *Utérus-col* (épithéliomas à cellules cylindriques et basocellulaires).
- N° 12. *Utérus-col* (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes).
- N° 13. *Utérus-corps* (épithéliomas à cellules cylindriques).
- N° 14. *Chondrosarcome*.
- N° 15. *Vessie* (épithélioma).
- N° 16. *Vésicule biliaire* (épithélioma).
- N° 17. *Rein* (épithélioma à cellules claires).
- N° 18. *Lymphocytome*.
- N° 19. *Sarcomes* (à petites cellules et à cellules polymorphes).
- N° 20. *Testicule* (séminome).
 - A. *Leiomyome malin*.
 - B. *Parotide* (tumeur mixte).
 - D. *Ovaire* (séminome).
 - E. *Ovaire* (sarcome provenant des cellules à lutéine).
 - G. *Fibrosarcome*.
 - H. *Maladie de Hodgkin*.
 - K. *Sein* (sarcome).
 - L. *Sein* (épithélioma à grosses cellules).
 - M. *Sein* (épithélioma à cellules cylindriques).
 - N. *Testicule* (épithélioma wolffien).
 - O. *Nævome achromique*.
 - P. *Nævome mélanique*.

LES GLOXINES ET

LES GLOXINES POLYVALENTES

sont présentées sous deux conditionnements :

- Boîte de 20 ampoules buvables d'un centicube. 25 fr.
- Boîte de 60 ampoules buvables d'un centicube. 67 fr. 60

Laboratoire des GLOXINES

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Odéon 93-94.)

GLUCALCIUM R X

2 formes : AMPOULES, GRANULE
AMPOULES 5 cc. et 10 cc.

Injectables par voies endoveineuses et intramusculaires. Solution isotonique à 10 p. 100 de Gluconate de calcium pur (13 p. 100 Ca 0 = 9, 3 p. 100 Ca). — Degré cryoscopique : 0,56 — $pH = 6,40$

Prix : 6 amp. de 5 cc. : 22 frs ; 5 amp. de 10 cc. : 25 frs.

GRANULE

Ergostérine irradiée (Vitamine D pure cristallisée. 40 millions d'Unités S. I. au gramme).....	0,005	Parathyroïdes.....	0,01
Gluconate de calcium.....	10	Hypophyse totale.....	0,10
Inosito-hexaphosphate de		Surrénales.....	0,50
Chaux et Magnésie.....	4	Thymus.....	0,20
		Extrait fluide de Kola.....	0,10
		Extrait fluide de Panax	
		Ginseng.....	0,10

Granulé ergostériné, calcium assimilable fixé au moyen des Hormones, Phosphore extrait des graines végétales.

Calciifiant, reconstituant, reminéralisant, Névrotonique, Stimulant de l'activité cérébrale.

Indications : Faiblesse générale, Lymphatisme, Asthénie, Surmenage, Prétuberculose, Tuberculose, Déminéralisation, Phosphaturie, Carie dentaire, Croissance, Fractures, Ossification, Allaitement, Rachitisme, Dentition, Grossesse. **Posologie :**

Adultes : 4 cuillerées à café avant les repas.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : la boîte..... 24 fr. 50

Enregistrés au L. N. C. M., sous les numéros 1814 — 13 et 14

Laboratoires du GLUCALCIUM

P. CLEVENOT, Ph., 8, r. Dubrunfaut, PARIS (12^e). (Tél. Dorian 56-38).

GLUCAMONIX

Composition. — Gluconate d'ammonium
($C^6H^{11}O^7$) NH^4 .

Indications. — Acidification des urines et du sang. Infection urinaire, cicatrisation des lésions rénales. Cystites incrustées, Affections apyrétiques des bronches, Dyspnées, Pneumonies après la crise, Gastrites accompagnant les maladies bronchiques, Névralgies, myalgies, sciaticques. Tétanies rebelles.

Présentation :

Comprimés à 0 gr. 40 : boîte de 40 comprimés.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules (injectables intramusculaires ou intraveineuses et buvables).

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour. — 2 injections par semaine.

Laboratoire du GLUCAMONIX

L. CHAUVIN, Pharmacien

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCOBIOCALCIUM ROSSO

Voir Calcium Rosso.

Chimiothérapie organo-calcique par injections intramusculaires et intraveineuses.

Agréé par le Conseil supérieur de Santé du ministère de la Marine, expérimentation faite au Centre de Phtisiothérapie de l'hôpital militaire de Rochefort.

Enregistré au L. N. C. M.

Fournisseurs des sanatoria et hôpitaux.

Produits Biochimiques ROSSO

63, rue de Charonne — PARIS.

GLUCOCHAUX

Composition :

Gluconate de chaux pur	20 gr.
Inosito phosphate de chaux et Magnésie.	1 —
Formiate de chaux, Hypophosphite de chaux et Magnésie	1 —
Excipient sucré et aromatisé pour	100 —

Formes. — *Granulé et cachets.*

Indications. — Calcifiant organique puissant, indiqué dans tous les cas de déminéralisation et de dénutrition.

Grossesse et allaitement.

Croissance et ossification.

Phosphaturie et carie dentaire.

Fractures, Asthénie et Convalescence.

Doses : *Enfants :* 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 cuillerées à soupe ou 2 à 3 cachets par jour.

Prix :

Granulé : 16 fr. 50 ; cachets : la boîte de 24 : 17 fr. 50.

Durée du flacon : 8 jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle de Médicaments sous le n° 1284-1.

E. DUFOUR, Pharmacien.

AMPLEPUIS (Rhône) — Tél. : 55.

GLUCOCITHINE

Composition.		Présentation
Gluconate de calcium.....	10 grammes	Granulés simples.
Lécithine d'œufs.....	2 —	
Pour 100 grammes granulé.		
Gluconate de calcium.....	10 grammes	Granulés Vitamine D.
Lécithine d'œufs.....	2 —	
Vitamine D.....	80.000 U. I.	
Pour 100 grammes granulé.		
Gluconate de calcium.....	0,10	Comprimés simples.
Lécithine d'œufs.....	0,04	
Pour 1 comprimé.		
Gluconate de calcium.....	0,10	Comprimés Vitamine D.
Lécithine d'œufs.....	0,04	
Vitamine D.....	320 U. I.	
Pour 1 comprimé.		

Indications. — Asthénie, anorexie, surmenage, épuisement nerveux, impuissance fonctionnelle, sénilité, rachitisme, états pré-tuberculeux, tuberculose, phosphaturie, diabète, etc.

Posologie. *Granulés :* Adultes : 2 cuillerées à café pendant le repas.

Enfants : 1 cuillerée à café pendant le repas.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café délayée dans du lait tiède.

Comprimés : { Adultes : 4 à 6 par jour.
 { Enfants : 2 à 3 par jour.

Laboratoire de la **GLUCOCITHINE.**

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCONYL

Composition. — Gluconate de calcium ($C^6 H^{11} O_7$)² Ca.

Indications. — Toutes les indications du calcium soluble découlant de ses propriétés recalciifiantes, anti-hémorragique, diurétique, déchlorurante, antiphlogistique, équilibrante du système vago-sympathique,

Présentation :

Solution à 10 % concentration :

1^o Ampoule de 5 cc. : boîte de 10 ampoules.

2^o — 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

3^o — 10 cc. : boîte de 10 ampoules.

Solution à 20 % concentration :

1^o Ampoule de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

2^o — 10 cc. : — 6 ampoules.

1^o Cachets simples : boîte de 18 cachets.

2^o — à la vitamine D : boîte de 18 cachets.

1^o Granulés simples : boîte de 125 grammes.

2^o — à la vitamine D : boîte de 125 grammes.

3^o — ergostérinés irradiés : boîte de 125 grammes.

Posologie :

Ampoules : 5 à 10 cc. par jour (intramusculaire ou intraveineux).

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Cachets : 1 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1/2 doses.

Laboratoire du **GLUCONYL**

L. CHAUVIN, Pharmacien, 3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCOSALYL

Puissant traitement d'attaque du Rhumatisme articulaire aigu.

Composition. — Chaque ampoule de 10 cc. contient : Salicylate de Soude, 1 gr. ; glucose anhydre, 1 gr. ; thiosinamine, 0 gr. 04.

Indications. — 1° Rhumatisme articulaire aigu et à forme extra-articulaire. Manifestations cardiaques et oculaires rhumatismales ; 2° Maladies nerveuses, Encéphalite léthargique, Poliomyélite, Sclérose en plaques ; 3° Syndromes mentaux fébriles ; 4° Maladies infectieuses.

Posologie. — Injections strictement intraveineuses, Aiguille de 7/10 courte. 1 à 4 ampoules par jour pendant 4 à 5 jours.

Important. — Toujours associer à la médication salicylée intraveineuse la médication salicylée *per os*, soit sous forme Entérosalicyl (Salicylate de Soude pur en capsules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin), soit sous forme Sulfosalyl (Polysalicylates, Soufre et Calcium, associés à l'opothérapie à dose minime). Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-17.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI°).
(Tél. Jasmin 00-37.)

GLUCOSIUM

Composition. — Gluconate de magnésium ($C^6 H^{11} O_7$)²Mg.

Indications. — Sédatif du système nerveux. Antispasmodique (spasmes des voies digestives et biliaires). Désensibilisant. Laxatif doux sans accoutumance. Infection intestinale. Douleurs angineuses. Varices, Prophylaxie des proliférations cellulaires.

Présentation :

Cachets de 1 gr. : la boîte de 20 cachets.

Ampoules 5 cc. : la boîte de 6 ampoules.

Ampoules 10 cc. : la boîte de 6 ampoules.

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson sucrée).

Posologie :

1 à 2 cachets par jour pendant les repas.

2 à 3 injections par semaine.

Pour les ampoules, l'association du Gluconate de Calcium avec le Gluconate de Magnésium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du GLUCOSIUM

L. CHAUVIN, Pharmacien,
3, rue de Vouillé — PARIS (XV°).

GLUCOXYL NACHER

Antidiabétique nouveau par voie buccale.

Composition. — Tasi, plante de la République Argentine, dont l'alcaloïde Morrénine (Arata) augmente la sécrétion des cellules endocrines⁵ et par ses vitamines B2 et B3 favorise puissamment le métabolisme des glucides, Formiate de Quinine, Codéine, Arséniate de soude, Carbonate de lithine (Lab. National contrôle 1027-1).

Propriétés thérapeutiques. — Disparition des céto-acidoses, rétablissement du pH normal du sang, maintien de la réserve alcaline, suppression de la glycosurie, reprise de l'activité physique et intellectuelle, augmentation de la tolérance hydrocarbonée.

Indications. — Diabète (bénin ou grave), Diabète infantile, Grossesse diabétique (peut s'associer à la médication insuliniennne).

Avantages. — Traitement commode. Résultats contrôlables. Pas d'intolérance. Pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — Deux cachets par jour, avant les repas midi et soir.

Prix : Boîte cure 20 jours : 34 francs (40 cachets).
Demi-boîte ; 19 — (20 —).

Laboratoire NACHER,
Pharmacien licencié ès-sciences,
71, boulevard Carnot — TOULOUSE.

GLUQUINIX

Composition. — Gluconate de quinine ($C^{18}H^{11}O_7$)² quinine.

Indications. — Toutes les indications de la quinine avec action renforcée et tolérance parfaite. Paludisme, pneumonie, bronchite, coqueluche, grippe, fièvre récurrente. Rhumatisme aigu, névralgies, pyémie, infection puerpérale. Fièvre typhoïde, dysenterie amibienne, Asthme nerveux, pemphigus, dermatite exfoliatrice. Fièvre des tuberculeux. Infections pulmonaires post-opératoires.

Présentation :

Comprimés à 0,25 : boîte de 20 comprimés.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

— 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson sucrée).

Suppositoires à 0,10. *Bébé* : boîte de 10 suppositoires.

— à 0,20. *Enfant* : boîte de 10 suppositoires.

— à 0,50. *Adulte* : boîte de 10 suppositoires.

Posologie :

La posologie sera calculée en tenant compte de la correspondance suivante :

50 centigrammes de gluconate de quinine correspondent à 37 centigrammes de *chlorhydrate* de quinine représentant 30 centigrammes de quinine *base*.

N. B. — a. Les injections de GLUQUINIX ne solérosent pas les veines.

b. L'association avec le gluconate de calcium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du GLUQUINIX
L. CHAUVIN, Pharmacien,
3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUTINETTES D'ASPIRINE

Composition. — Comprimés glutinisés dosés à 0,25 d'Aspirine.

Avantages. — Suppriment les causes d'irritation possibles de l'estomac avec les cachets et les comprimés, les **Glutinettes d'Aspirine** traversant l'estomac et ne se dissolvant que dans le milieu alcalin du duodénum.

Tolérance gastrique absolue. Rapidité d'action, facilité d'absorption.

Indications. — Toutes celles de l'Aspirine : névralgies, migraines, affections rhumatismales, grippe, fièvre, etc...

Mode d'emploi. — 1 à 12 dans les 24 heures avant les repas ou dans leur intervalle, dans de l'eau, ou en les déglutissant en même temps qu'un peu de salive.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS.

GLUTISALYL

Comprimés glutinisés de 1 gr. de salicylate de soude.

Avantages. — Facilité de posologie, plus de dégoût à l'absorption, plus de troubles gastriques, la désintégration du comprimé se faisant dans l'intestin.

Mode d'emploi. — Les comprimés doivent être avalés sans être croqués.

Prendre dans la journée une cuillerée à café de bicarbonate de soude.

Indications. — Celles du salicylate de soude.

Prix :

50 comp. donc 50 grammes de produit actif : 20 fr. 60.

GLUTISALYL INFANTILE (Comprimés glutinisés de 0 gr. 50 de salicylate de soude).

GLUTIPOLYSALYL (Comprimés glutinisés d'un gram. de salicylate de soude, potasse et chaux).

J. BARAIGE, Docteur en Médecine

Pharmacien de 1^{re} Classe.

24, rue Paul-Bert. — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 21-22.)

GLYCARSOL

Régénérateur de l'organisme, fortifie, tonifie, stimule.

Composition. — Glycéro-Phosphate de Soude, de Manganèse, de Fer ; Triiodure d'arsenic ; Organes frais (moelle rouge osseuse, rate, thymus, muqueuse intestinale). Tolérance absolue, assimilation parfaite. Sa préparation demande environ deux mois.

Indications. — Anémies, Lymphatisme, Convalescence, Inappétence Adénopathie, Tuberculose, Paludisme, etc.

Posologie. — Commencer par 1 goutte matin et soir pour atteindre de :

	6 mois à 18	18 mois à 3	3 ans à 6	6 ans à 10	10 ans à 16	16 ans à 20	20 ans à 30	30 ans à 40	40 ans à 50	50 ans à 60	60 ans à 70	70 ans à 80	80 ans à 90	90 ans à 100
<i>Enfants :</i>	18	—	3	ans	10	—	5	—	5	—	5	—	5	—
	3	ans	à	6	—	16	—	8	—	8	—	8	—	8
	6	—	10	—	20	—	10	—	10	—	10	—	10	—
	8	—	11	—	26	—	13	—	13	—	13	—	13	—
	11	—	16	—	30	—	15	—	15	—	15	—	15	—
<i>Adultes :</i>					40	—	20	—	20	—	20	—	20	—

Dans un peu de lait, d'eau sucrée ou non.

Continuer la dose maximum pendant 7 jours et diminuer de 11 gouttes par jour (1 le matin, 1 le soir) pour descendre à 1 goutte le matin, 1 le soir. Cesser 15 jours et recommencer.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LORMEAU

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,125 centigr. par cuiller-mesure.

Ampoules injectables dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

Doses et mode d'emploi. — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés 2 fois par jour dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Prix :

Comprimés : 15 fr. 60. — *Granulé* : 14 fr. 60.

Ampoules : 16 fr. 65.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

GLYCOBYL

Composition. — Extrait biliaire. — Extrait de muqueuse intestinale (Entérokynase). — Evonymine. — Extrait total d'artichaut. — Héxaméthylène-tétramine. — Charbon activé.

Propriétés. — Stimule et régularise le fonctionnement du foie. — Stimule la sécrétion biliaire. — Fluidifie la bile. — Antiseptique des voies biliaires et de l'intestin. — Laxatif.

Indications. — Congestions hépatiques. — Insuffisance hépatique. — Lithiase biliaire. — Cholécystites. — Dyspepsies intestinales. — Constipation.

Posologie :

Adultes : Dragées, 2 à 4 par jour.

Enfants : Granulés, 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix, le flacon : 14 fr. 75.

Chaque flacon correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

R. C. : Seine 221.745.

GLYCOCARPINE

Éléments actifs. — Nitrate de pilocarpine (2 mmgr. par pilule) ou par X gouttes, associé à de faibles doses d'hamamélis et cimicifuga, et à 0,02 de caféine.

A. — Médication vaso-dilatatrice.

Céphalées et vertiges des artérioscléreux, Hypertension artérielle et ses conséquences, Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. Maladie de Raynaud, Claudication intermittente par spasme artériel, Angor par spasme des coronaires, Glaucome, Mouches volantes, Bourdonnements d'origine circulatoire (seulement).

B. — Troubles vago-sympathiques.

Insuffisance du vague, Freinage du sympathique, Asthme, Coqueluche, Basedow fruste, Pelade.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 2 pilules ou XX gouttes, au début des trois repas.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Echantillons sur demande :

C. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe

49, quai Saint-Vincent — LYON (I^{er}).

(Tél. : B. 36-32.)

GLYCO-M.

Composition. — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution de Thymolate de soude (dose à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria. Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

Propriétés particulières. — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant, et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

Indications. — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite** : 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des foins et végétations adénoïdes** : Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie** : injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

Gencives spongieuses et maladies buccales. — En bains de bouche prolongés, pure, en brassant toutes les parties de la bouche (pendant un quart d'heure). Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur l'antiseptique acide :

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. » attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

LA GLYCO-M. est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant. Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical, et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

Se vend dans toutes les Pharmacies :

En flacons de 100 grammes : **6** francs, modèle de poche.
En flacons de 200 grammes : **11** fr, modèle stilli-goutte.
En flacons de 500 grammes : **18** francs, demi-litre.
En bocal de 3 litres : **80** francs, modèle familial.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 333-2.

Laboratoire GLYCO-M.

Georges Miquel, Pharmacien de 1^{re} Classe.

1, avenue Lowendal — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 16-85.)

Tratamiento de los...

Borax de Souda...

Huile de Pin...

distillée...

le...

Avantages. — La Clavo-Thymolite est...

ment enrichies et donne...

sition saline ont été mises en...

lions...

inité en son pouvoir...

Clavo-Thymolite provoque...

sections multiples et vide les...

est de...

Clavo-Thymolite...

Clavo-Thymolite...

GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRESS et OWEN C^o.

Traitement des affections de toutes les muqueuses.

Composition :

Borate de Soude.....	2 040
Thymol.....	0 037
Menthol.....	0 037
Benzoate de Soude.....	2 040
Bicarbonate de Soude.....	2 040
Cajeputol.....	0 075
Salicylate de Soude.....	0 090
Huile de Pin.....	0 037
Huile de Bouleau.....	0 030
Glycérine, Colorant, alcool, eau distillée	93 574
	<hr/> 100 000

Avantages. — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humoral et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

Action thérapeutique. — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel des sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

Indications. — *Voies digestives* : Catarrhe gastrique et intestinal, Fermentations,

Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

Cavité buccale : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

Pharynx et gorge : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

Voies nasales : Coryza aigu ou chronique, Rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

Yeux : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

Maladies de la peau : Erysipèle, Furonculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

Rectum et région anale : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

Gynécologie et Obstétrique : Pertes blanches, Vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

Pies de toute nature.

Mode d'emploi. — *a)* Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Prix :

100 cc.	7 fr. 50.
250 cc.	14 francs.
500 cc.	22 —
Modèle Hôpital (3 litres) ...	50 —

Remise spéciale au Corps médical.

Établissements WEBER

A. GUILLAUME, Pharmacien

76-78, rue Dareau — PARIS (XIV^e).

GLYPHÉRANOL

Désinfectant du rhino-pharynx et des voies respiratoires en général.
Composition et forme. — 1^o Formule forte : glycére antiseptique soluble dans l'eau à toute température.

En onction : absorbable par voie cutanée.

Essence de lavande.....	0,30	Essence d'Eucalyptus.....	3,50
— de Cèdre.....	0,30	Menthol.....	1,50
— de Pin.....	0,50	Essence de Térébenthine....	1,00
— de niaouli.....	0,50	Glycére spécial.....	Q. S. p. 100

2^o Formule faible : glycére antiseptique immédiatement soluble au contact de la muqueuse nasale (jamais d'obstruction du sinus).

Terpineol.....	0,30	Chl ^{te} d'Éphédrine.....	0,35
Essence de Cèdre.....	0,20	Résorcine.....	0,20
— de Pin.....	0,20	Chl ^{te} d'amyléine.....	0,20
Eucalyptol.....	2,00	Camphre du Japon.....	1,00

Glycére spécial Q. S. p. 100.

Indications thérapeutiques. — Coryza forme aiguë — Rhino-pharyngite — Sinusites — Céphalées d'origine nasale — Rhume des foins — Bronchites — Ganglions infectés.

Posologie. Mode d'Emploi. — 1^o Formule forte: a) inhalation: mettre la grosseur d'une noisette dans un inhalateur avec de l'eau chaude et respirer les vapeurs. b) onguent: faire une application sur le thorax ou les ganglions et recouvrir de coton hydrophile. 2^o Formule faible: mettre dans chaque narine la valeur d'un grain de blé plusieurs fois par jour.

Présentation. — Glyphéranol « Coffret » contient les 2 formules. Prix public 17 fr. 50. Formule forte. Prix public 13 fr. 50

Formule faible. Prix public 6 fr. 25

Laboratoire PRIGNIAU

52, Rue des Cinq-Diamants — PARIS (XIII^e) — (Tél. : Gob. 90-79.)
Inserit au L. N. C. M. Formule forte n° 1 117-4, Formule faible n° 1 117-3.

GMET

(Extraits Gmet.)

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial Gimbert, qui permet d'obtenir une extraction complète sans altérer la plante.

Correspondent tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Se prescrivent tous : en moyenne de 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas ou un peu avant.

Le Diurétique Gmet est prescrit par cuillerées à soupe.

Voir également :

Boldo Gmet.	Kola.
Composé Gmet.	Piscidia.
Cratægus Gmet.	Quinquina Gmet.
Frêne.	Sauge.
Fucus Gmet.	Ulmaire.
Gui Gmet.	Valériane Gmet.
Hamamélis Gmet.	Viburnum.
Hydrastis Gmet.	Diurétique Gmet.
Jugland Gmet.	Extrait Hamyd.

Littérature sur chaque produit et Échantillons sur demande adressée au :

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

Dr A. LOROT, Pharmacien.

Peuvent être prescrits aux Assoc^{es} Sociales, ils sont enregistrés au Laboratoire National de Contrôle sous les nos 1259-1 à 1259-21.

GOMENOL

Nom et Marque déposés.

Essence de *Melaleuca viridiflora* sélectionnée.

GOMENOLÉO et Produits au GOMENOL

Propriétés. — Innocuité absolue, haut pouvoir antiseptique, rapidement diffusible, grand calmant, désodorisant, vivificateur des tissus et action modificatrice, hémostatique, toni-cardiaque.

Action thérapeutique et usages. — A l'intérieur, convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires (bronchites, tuberculose, etc.) et des voies urinaires (cystites, urétrites, etc.). En injections intramusculaires indolores (aiguilles fines) ou intraveineuses. Imprégnation gomenolée dans toutes infections locales ou généralisées (septicémie, etc.). Immunisation préventive.

A l'extérieur, en inhalations et pulvérisations : coryzas, laryngites, bronchites, etc.

Pansements chirurgicaux : brûlures, plaies septiques, ulcères.

Multiples indications, nombreuses formes correspondant aux diverses applications :

Rhino-pharynx. — Gomenol-Rhino, Gomenoléo-Nasal, Vaseline Gomenolée, Gomenol pur en inhalations.

Gorge. — Gomenol-Pâtes, Gomenol-Sirop, Gomenoléo 10 p. 100 en injections trachéales.

Bronches, poumons. — Gomenol-Capsules, Gomenoléo en injections intrapleurales (10 et 20 p. 100), intrabronchiques (20 p. 100) et intramusculaires (20 p. 100).

Intestin. — Gomenol soluble, Gomenoléo 10 p. 100 et 20 p. 100 en lavements profonds, Gomenol-Rectal, Gomenol-Glutinules.

Rein, vessie. — Gomenol-Glutinules, Gomenoléo 10 p. 100 et 20 p. 100 en instillations. Lavages, eau Gomenolée (avec Gomenol soluble).

Plaies, brûlures. — Gomenol-Onguent, Gomenoléo 20 p. 100 et 33 p. 100 en pansements, Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble) pour lavages et pansements humides.

Gynécologie. — Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble), Gomenovules, Gomenoléo (pansements), Gomenol pur (attouchements), Gomenol-Savon.

Grande chirurgie. — Gomenol pur ou Gomenol-Rubéo (champ opératoire), Gomenoléo (Imprégnation gomenolée).

Les Produits sont inaltérables.

Présentations populaires :

Gomenoléo, petit flacon.

Gomenoléo, boîte de 3 ampoules 5 cc.

Gomenoléo-Nasal, tube canule.

Vaseline Gomenolée Prevet, tube canule.

Laboratoire du GOMENOL

François PREVET, docteur en Pharmacie

48, rue des Petites-Écuries — PARIS (X^e). (Tél.: Provence 34-31.)

GONACRINE

Chlorure de 3-6 di-amino-10
méthyl-acridinium (sel neutre).

Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

Indications. — Affections gonococcolques et leurs complications, Septicémies, Méningites, Méli-tococcles, Erythème noueux.

Présentations : boîtes de 10 ampoules à 2 % : 29 fr.
— 3 — 2 % : 11 fr. 70.
— 6 — 0,5 % : 11 fr. 70.

Posologie et mode d'emploi. — Lavages de l'urètre : solutions extemporanées de 1/8.000 à 1/1000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à 2 p. 100.

Pastilles de Gonacrine (boîtes de 40 pastilles), dosées à 0 g. 003 par pastille, destinées au traitement des stomatites infectieuses ou médicamenteuses, gingivites, amygdalites. Prévention des infections à porte d'entrée bucco-pharyngée. Désinfection post-opératoire.

Prix de la boîte de 40 pastilles : 5 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GONAGONE

Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté par les hôpitaux de Paris et de l'armée.

Stock-vaccin polymicrobien renfermant :

Corps microbiens + Lysat microbien + *Anatoxine*.

Indications. — Toutes les infections génito-urinaires de l'homme et de la femme.

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les 3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. progressivement.

Ovules au Gonagone pour pansements vaginaux (Modèle spécial pour enfants).

Prix : 4 ampoules : 21 fr. 30 ; 6 ovules : 21 fr. 30.

Produits Biologiques OARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes.)

GONO-VACLYDUN ET GONARTHRI VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duohon.
Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

GONO-VACLYDUN

Composition. — Gonocoques, Entérocoques, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

Indications. — Urétrites, Complications de la blennorrhagie : Epididymite, Prostatite, etc.

Posologie. — En injections sous-cutanées, 3/4 de centicube le 1^{er} jour, ensuite injections quotidiennes de 1 centicube jusqu'à 12 injections, puis 1 cc. tous les 2 jours.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 centicube.

GONARTHRI-VACLYDUN

Lysat de gonocoques.

Lysat-vaccin riche en antigène, exclusivement destiné au traitement de toutes les formes du rhumatisme spécifiquement déterminé.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS (XXII^e).
(Tél. : Carnot 78-11.)

GOSSYPIOL MAURIN

**Régulateur menstruel sédatif des règles
douloureuses.**

Complexe spécialisé des douleurs « ovo-utérines », le Gossypiol donne un triple effet : antinévralgique, anesthésique, antispasmodique qu'aucun analgésique général ne peut réaliser.

Gossypium-Piscida aa 20 mgr., Cimicifuga, Gelsémium, Virbunum aa 10 mgr., Aconit 23 mgr., Belladone 2 mgr., Digitale 8 mgr., Ch. quinine 10 mgr., Ch. morphine 1 mgr. 3, Ch. cocaïne 1 mgr. 1.

Seize dragées en 4 jours pendant 3^e menstrues à 24 jours d'intervalle ordonnent la périodicité (2 matin et soir).

En deux jours au moment présumé des règles déterminent l'écoulement cataménial et calment toutes douleurs (4 le matin et 4 le soir).

Prix : 15 fr. 10.

Laboratoires JAMMES de GOLBERY
19, rue Brunel — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Galvani 51-31.)

GOTIRA

Composition. — Pâte à base d'extrait de plantes (*Rosa Centifolia*, *Hypericum perforatum*, *Malva Sylvestris*, *Chenopodium*), incorporé à un excipient approprié. Ne contient aucun produit chimique, caustique ou toxique. Odeur agréable. Ne tache pas. Soluble dans l'eau.

Indications thérapeutiques. — Antiseptique et cicatrisant. *Toutes plaies et irritations de la peau*: Acné, Eczéma, Gourme, Herpès, Urticaire, Prurits, Dartres, Crevasses, Engelures, Furoncles, Blépharites, Blessures, Brûlures, Plaies, Ulcères variqueux, Eschares, Hémorroïdes, Prurit vulvaire, Touchers, etc.

Mode d'emploi. — Étendre une petite quantité, plusieurs fois par jour, masser légèrement jusqu'à l'absorption, puis laisser une légère couche en surface. Pour les plaies (ulcères variqueux, eschares), combler la cavité avec Gotira, en étendre autour de la plaie, puis recouvrir d'un pansement sec de gaze et bander.

En pots et tubes.

Agréé par les Assurances Sociales

Enregistré au L. N. de G. des M. sous le N° 1818-1.

Laboratoires RICHOU

L. LEMESLE, Pharmacien

39, rue Taitbout — PARIS (IX^e). (Tél. : Trin. 46-12.)

GOUDROLINE

Composition. — Ce produit est extrait du goudron de houille.

Propriétés. — Agent réducteur doué de propriétés kératoplastiques, il ramollit la couche cornée épaisse et diminue la formation des squames qui entravent la vitalité des cellules de Malpighi et la circulation lymphatique.

Il est fortement astringent, et son action décongestionnante s'exerce tant superficiellement que par pénétration.

Il possède la propriété de faire disparaître rapidement des éruptions prurigineuses tenaces et de modérer le prurit d'une façon durable en agissant sur les terminaisons nerveuses.

Indications. — La Goudroline peut être employée dans tous les états desquamatifs de la peau, et notamment dans toutes affections prurigineuses de l'adulte (eczémas non suintants, parakératose psoriasiforme de Brocq, eczématides, eczémas séborrhéiques.)

Posologie. — La Goudroline peut être utilisée pure ou incorporée à la pommade à l'oxyde de zinc.

Prix. — Le bidon de 125 gr. : 6 fr. 25

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

GOUTTES ANTISPASMODIQUES ADOL

Composition. — Alcaloïdes totaux de la *Bella-*
done, de la *jusquiame*, de la *salsepareille rouge*,
Bromure d'ammonium, Gardénal.

Action thérapeutique. — Synergie médicamenteuse à faibles doses, sous forme liquide. Spécialement aérophagie, vomissements incoercibles, spasmes intestinaux, etc., etc.

Sans contre-indication.

Indications. — Le spasme sous toutes ses modalités.

Mode d'emploi. — XXV à XXX gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée, de préférence avant les repas ou 2 heures après.

Prix : 19 fr. 80 le flacon.
Pour 20 jours de traitement.

Laboratoires ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe.

78, cours de la Liberté — LYON.

(Tél. : Moncey 13-37.)

GOUTTES BERNAMONT

Les *Gouttes Bernamont* (Hamamélis, Marron d'Inde, Noix vomique, Viburnum) complètent le traitement local par la *Pommade Bernamont* dans le cas d'ulcères variqueux et favorisent toujours l'amélioration de tous les troubles de la circulation veineuse.

Indications. — Troubles de la ménopause, Varices, Hémorroïdes, Règles douloureuses, Phlébites, etc.

Mode d'emploi. — On les utilise à la dose de XX gouttes dans 1/2 verre d'eau à chacun des principaux repas.

Prix : Le flacon pour un mois, 13 fr. 50.

Littérature et Échantillons.

Autorisé par les Assurances sociales.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro : 1602-1.

Laboratoires BERNAMONT

87 et 89, rue du Commerce — NEVERS
(Tél. : 0-23 Nevers.)

GOUTTES BRONCHOPHILES ANDRÉ

Composition :

Codéine	0 cgr. 50
Bromoforme	3 cgr. 10
Chloroforme	2 cgr.
Gaïacol.....	2 cgr. 60
Eucalyptol	1 cgr.
Terpinol	5 cgr. 20

Pour une capsule.

Indications. — Toutes affections pulmonaires, toux, bronchites aiguës et chroniques, emphyseme, asthme, grippes.

Posologie. — 2 à 6 capsules par jour.

Prix : 12 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments 556-6.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

GOUTTES DE SERU

Extrait total et concentré des galbules de cupressus sempervirens.

Indications. — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, *hémorroïdes*, varicocèles et des *troubles de la ménopause*.

Dose moyenne. — XXX gouttes avant chacun des deux principaux repas.

Durée moyenne du flacon : 12 jours.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoires TACHOT

103 et 105, rue Saint-Lazare.

(Tél. : Tri. 04-49).

GOUTTES ERYL

Traitement *per os* des affections de la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique.

Composition. — Synergie phytothérapique complète (Euphorbe, Coca, Rubus fruticosus, Aconit Napel, Belladone, Roses de Provins), à base d'Erysimum (Herbe aux Chantres).

Action thérapeutique. — Analgésique, décongestive, Antispasmodique et tonifiante (action élective sur les cordes vocales).

Indications. — Toux quinteuses, rebelles, coqueluchoïdes. Laryngites, trachéites, grippe, coqueluche, bronchites.

Mode d'emploi :

Adultes : XXXV à LX gouttes ; 5 à 6 fois par jour.

Enfants : V à XV gouttes ; 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Durée du traitement : 10 à 30 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

GOUTTES GEHA

Trois formules.

Gouttes Géha.

Codéine.....	0.20	} Soluté Officiel du Codex.
Bromoforme pur.....	2.	
Glycérine à 30%.....	6.	
Alcool à 90%.....	12.	
Alcoolatures racines Aconit.....	2.	
Teinture de Grindelia.....	2.	
Teinture de Drosera.....	2.	

Gouttes Géha (C) (Codéinées). — Même formule, mais sans Bromoforme, pour Adultes et Enfants à partir de 5 ans.

Gouttes Géha (B) (Bromoformées). — Même formule, mais sans Codéine, pour nourrissons et enfants jusqu'à 10 ans.

Indications. — Toux quinteuses, spasmodiques et réflexes. Toux laryngées, Asthme idiopathique, Dyspnée d'origine bronchique, Catarrhe pulmonaire, Toux émétisante, Coqueluche.

En traitement combiné avec le sirop du Dr Canac, comme *spécifique* de la *Coqueluche*, (voir à GECAN).

Présentation. — Flacon de 24 cc. avec compte-gouttes.

Gouttes Géha et Gouttes C : 18 francs et Gouttes B : 14 fr. 75 au public.

Mode d'emploi général et doses. — Dans un peu d'eau sucrée ou de tisane.

Enfants : 2 mois à 1 an : V à X gouttes trois fois par jour ; 1 à 5 ans :

X à XV gouttes trois fois par jour ; 5 à 10 ans, XV à XX gouttes 3 fois

par jour ; 10 à 20 ans : XXV à XL gouttes trois fois par jour.

Adultes : XL à LX gouttes trois à quatre fois par jour dans un peu d'eau.

Laboratoire Médical « GEHA »

à PORT-DE-BOUC, près de Marseille (B.-du-R.). (Tél. : 30.)

GOUTTES LECONTE

Composition. — Orthoformiate d'éthyle, Codéine, Teintures de Grindélia, Polygala, Aconit, Drosera, Belladone, Bryone.

Indications. — Toux spasmodiques, Grippe, Trachéite, Coqueluche.

Posologie :

Adultes : LX gouttes 5 à 6 fois par jour.

16 à 20 ans : XLV à L gouttes 5 fois par jour.

12 à 16 — : XXV à XL — 4 —

6 à 12 — : XV à XXV — 4 —

2 à 5 — : X à XII — 3 —

Échantillons sur demande.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e)

(Tél. : Louvre 53-16.)

GOUTTES LINOBER

Indications. — Toux nerveuse, Trachéite, Pharyngite, Laryngite, Asthme, Coqueluche, Toux quinteuse des vieillards.

Formule :

β-dichloroéthane ...	0 gr. 02
Propanone.	
Teinture de grindelia	} aa q. s. pour L gouttes.
Teinture de drosera.	
Essence de menthe.	q. s. pour aromatiser.

Posologie :

Administrer 3 fois par 24 heures : à chaque fois :						Total pour 24 heures :	
Enfants de 1 an à 2 ans	de 6 à 7 gouttes	de 18 à 21 gouttes					
— 2 — à 3 —	de 9 à 10 —	de 27 à 30 —					
— 3 — à 4 —	de 12 à 15 —	de 36 à 45 —					
— 4 — à 7 —	de 20 à 25 —	de 60 à 75 —					
— 7 — à 14 —	de 25 à 30 —	de 75 à 90 —					
Au-dessus de 14 —	de 40 à 50 —	de 120 à 150 —					
Adultes	de 60 à 70 —	de 180 à 210 —					

Il s'agit de doses moyennes qui peuvent être augmentées ou même doublées sans aucun inconvénient, les gouttes Linober ne contenant aucune substance toxique.

Seules contre-indications : Diabète, Acétonurie.

Mode d'emploi. — Les Gouttes Linober doivent être prises de préférence en dehors des repas.

On peut les absorber directement sur 1 ou 2 morceaux de sucre, ou mieux, diluées dans un peu de liquide, sucré ou non (eau, infusions, etc...).

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

GOUTTES MAGALO

Composition. — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 superactivé par un sel de manganèse.

Mode d'action. — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue ; de goût agréable, bien supporté par l'estomac ; la plus économique de toutes les préparations similaires.

Indications. — Affections du foie et de l'estomac, **asthénies**, verrues, cancer.

Prix : 15 fr. 90.

Durée : 25 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 34-68.)

GOUTTES MALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée, dans un solvant hydroglycériné.

Avantages. — Calmant certain et rapide de toutes les toux. Véritable spécifique de la Coqueluche. Non toxique, même pour les nourrissons. Goût agréable.

Indications. — Coqueluche, toutes les toux.

Posologie :

Doses minima :

Nourrissons : avant 6 mois, III gouttes toutes les 3 heures.

De 6 mois à 1 an : III gouttes toutes les 2 heures.

Enfants : de 1 à 2 ans : VI gouttes toutes les 2 heures.

— — 2 à 4 ans : IX — — —

— — 4 à 6 ans : XII — — —

— — 6 à 10 ans : XV — — —

Adultes : XX à XXX gouttes toutes les 2 heures.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Dans les *bronchites*, *toux nocturnes*, donner une potion expectorante dans la journée et le soir une seule dose massive de Gouttes Malone (XL à LXXX gouttes, chez les adultes, XV à XL gouttes chez les enfants suivant les résultats obtenus).

Prix : 16 francs.

Laboratoires du MALONE

J. VINCENT, pharmacien

ANCENIS (Loire-Inférieure). Tél. : 18.

GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment

1 milligramme de sulfate de strychnine ;

III gouttes d'acide phosphorique officinal.

2 cgr. d'extrait de quina ;

2 cgr. d'extrait de Coca.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, adynamie des convalescents, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Éviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

Gouttes PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin.)

Composition. — Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de Thym, Grassette et Drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

Propriétés. — Action élective spéciale due aux constituants des plantes entrant dans cette préparation.

Indications. — A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

Mode d'emploi. — On donne 2 à 3 fois par jour : aux *nourrissons* I à V gouttes ; aux *enfants*, V à X gouttes, et aux *adultes*, X à XXX gouttes dans un peu d'eau ou tisane.

Laboratoire ZYMA

Dépôt général : Laboratoires LOBRU
92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e),

GOUTTES SAP

Antispasmodique.

Médic. symptom. de la Coqueluche, Bronchites chroniques.

Composition. — *Complexe phytothérapique* (teinture d'aconit, belladone, jusquiame, digitale, droséra, grindélia, eucalyptus, thym, lobélie, québraco) associé au *bromoforme* dissous et à la *créosote de hêtre*.

Avantages. — L'emploi des gouttes SAP, sans codéine, est *absolument inoffensif*, même chez les tout-petits, et la présentation par gouttes permet un *dosage rigoureux* suivant l'âge de l'enfant.

Mode d'action :

- 1° Action *antispasmodique et anticatarrhale* énergique (diminution très rapide des quintes).
- 2° Pouvoir *antiseptique et bactéricide* puissant (entrave la pullulation du Coccobacille de Bordet et Gencou et s'oppose au développement des associations microbiennes secondaires).
- 3° Action *dynamogénique* secondaire de la Créosote.

Indications. — Coqueluche, toux coqueluchoïdes et spasmodiques rebelles de l'adulte et de l'enfant, Bronchites chroniques, Crises dyspnéiques et asthmatiformes, Coryza, Hocquet, Bacillose, etc.

Doses et mode d'emploi. — Donner toutes les 2 heures, dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

Enfants :

Au-dessous de un an	2 gouttes.
De 1 à 2 ans	3 —
De 2 à 3 ans	4 —

Au-dessus, une goutte en plus par année d'âge.

Adultes : XX gouttes 5 fois par jour.

Prix. Le flacon : 15 fr. 50.

Paul AUGIER, Pharmacien,
Ex-interne des hôpitaux de Paris,
2, rue des Lombards — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 09-04.)

GOUTTES TRINA

Solution titrée de citrate *trisodique pur officinal*.

Les GOUTTES TRINA offrent au médecin une solution de citrate *trisodique* titrée et *stable*.

Sa forme liquide et sa concentration permettent un emploi facile et en même temps rigoureusement précis, particulièrement chez les nourrissons.

X gouttes correspondent à..... 0 gr. 20

C — = 5 cc. correspondent à 2 gr.

Action digestive. — Contre les vomissements des nourrissons, V à X gouttes 4 fois par jour avant le biberon ou la tétée.

Action anticoagulante. — Phlébites, thrombo-artérites, pleurésies, etc...

XXX à LX gouttes, 2 à 3 fois par jour.

Action antiacide. — Dans les dyspepsies.

Selon indications médicales.

Flacon avec compte-gouttes spécial : 16 francs.

Prescription autorisée aux Assurés sociaux.

N° 108-4 du Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Préparateur : Robert GRAY, Pharmacien

MONTMIRAIL (Marne). (Tél. : 3.)

GOUTTOLYSINE

Indications. — Rhumatisme aigu et chronique, Rhumatisme articulaire et complications cardiaques, Goutte (accès ou maladie constitutionnelle). Sciatique. Lumbago.

Composition. — A base d'extraits de Bruyère, Hieble, Barbiflore.

NE CONTIENT PAS DE COLCHIQUE
NI AUCUN PRODUIT CHIMIQUE, donc
innocuité absolue sur l'Estomac, le Foie
et les Reins. Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Liqueur très agréable à absorber. flac. 250 gr. : 16 fr. 80.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Laboratoire ALPHA

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) aa 0,025,

Belladone (extrait), 0,01.

Bile 0,02, Erepsine 0,01, Entérokinase 0,01.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 grains
au repas du soir.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif
régulateur de l'intestin ne donnant pas de
coliques, pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, embarras gas-
trique ; les grains de Vals décongestionnent
le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications.

Laboratoire H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

LES GRANIONS

Diastases métalliques de synthèse.

Procédé E. FOUARD, docteur ès sciences.

Propriétés essentiellement nouvelles.

1° Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.

2° Suppression de la réaction du choc.

Communications : Académie des sciences, 7 février 1927.

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926.

Granions			La boîte
As	Paludisme, Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrition, etc. Anorexie, Rachitisme.	Ampoules de 2 cc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.	20.60
Argent simple et double	Infections générales. Angines locales. Septicémie, furunculose, fièvre puerpérale, grippe, sinusites, mastoidites, etc.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses. Ampoules argent doubles de 5 cc.	22.90 20.60
Cuivre	Cancer, angiocholites, cholécystites.	Ampoules de 2 cc. voie buccale.	20.60
Bismuth	Syphilis.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses .	22.90
Mercure	Syphilis.	id.	20.60
Iode	Hypertension, rhumatismes, syphilis, artério-sclérose.	En ampoules de 2 cc. pour infections, en solution pour voie buccale.	20.60 16 frs
Soufre	Sciatique, acné, rhumatismes.	En flacon : voie buccale.	28.60
Or simple et double	Tuberculose, infections générales, locales. Rhumatismes.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses.	28.60
Osmium	Cancer.	Ampoules de 2 cc.	28.60
Magné- sium	Cancer.	injections intraveineuses, intramusculaires, voie buccale.	20.60
Uranium	Cancer.		28.60

Littérature et Échantillons sur demande:

Laboratoires FOUARD

61, rue G.-Lauriau — MONTREUIL (Seine).

M. FOUARD, pharmacien.

(Tél. : Avron 01-42.)

GRANUCHOL

Granulé soluble, agréable au goût.

Formule. — Sulfate de Magnésie, 250 gr.
Hyposulfite de Soude, 35 gr. ; Bromure de
Potassium, 50 gr. ; Orthosiphon Sta-
mineus, 5 gr. ; sucre parfumé au citron :
Q. S. p. 1 000.

Cholagogue complet (cholécystokinétique et
cholérétique) *désensibilisant, calmant total*,
sans affinité végétative spéciale.

Indication. — Hépatisme sous ses formes,
dans toutes ses complications.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires de GRANUCHOL
S. LALLEMAND et Cie, Pharmaciens
42, rue de Paris — PANTIN (Seine).

GRANULÉ CABASSON

Reconstituant biologique rationnel.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte aux organismes jeunes les
principaux éléments constitutifs du squelette, du muscle et du milieu
sanguin sous la forme la plus assimilable et la plus agréable.

Complète cette action minéralisatrice par des éléments stomachiques qui
excitent l'appétit et favorisent l'assimilation.

Indications :

- 1° Croissance.
- 2° Maladies osseuses.
- 3° Grossesse et allaitement.
- 4° Surmenage physique et intellectuel ; convalescences.
- 5° Anorexie et lymphatisme.

Composition. — Aucun élément toxique. *Aucune contre-indication.*
Glycéros de Soude et de Potasse, Phosphate tricalcique, Nucléinate
de fer, Sulfate de Manganèse, Traces d'Iode et Chlorure de
Magnésium.

Posologie. — Granulé à croquer. *Goût très agréable.*

Adultes : 2 cuillerées à café avant ou après chacun des 2 principaux
repas.

Enfants et vieillards : demi-doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON
A. GROS-CAVALIER, Pharmacien
183, rue de Rome — MARSEILLE.

GRANULÉ EDGÈS

Laxatif-désensibilisant.

Composition. — Hydrate de magnésie, lactose, citrate de soude, hyposulfite de magnésium.

Forme. — Granulé fondant, immédiatement soluble, d'un goût très agréable.

Propriétés. — Laxatif par tous ses éléments, désensibilisant par son hyposulfite de magnésium. Excite doucement les fonctions intestinales et biliaires.

Avantages. — Facile et agréable à prendre. Action douce, toujours certaine. Ne provoque jamais de colique, pas plus que de congestion ou d'irritation hépatobiliaire.

Indications. — Constipation, Congestion du foie, Insuffisance biliaire, Manifestations anaphylactiques, troubles gastro-hépatiques.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 13 fr. 90.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en pharmacie, Licencié ès Sciences,

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

GRANULÉ SALICYLÉ DAUSSE

Teneur :

Salicylate de soude..... 0 gr. 60

Bicarbonate de soude..... 0 gr. 20

Par cuillerée à café.

Propriétés et indications thérapeutiques. —

Rhumatisme articulaire aigu, franc, fébrile, seule affection où le salicylate ait une action médicamenteuse certaine.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour ou davantage sur indication du médecin.

Le Salicylate de soude s'éliminant rapidement, il y a intérêt à administrer le Granulé Salicylé par doses fractionnées, prises toutes les 3 heures, de manière à maintenir l'organisme en état d'imprégnation salicylée continue.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

GRANULES CHANTEAUD

(Anciennement Granules dosimétriques.)

Composition :

Granules au milligramme, centigramme, etc., de toute la gamme des produits chimiques, alcaloïdes et glucosides les plus fréquemment employés en thérapeutique.

Présentation :

Flacons de 50 Granules ou boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 Granules.

Doses et mode d'emploi :

A définir et à indiquer par le médecin suivant chaque cas particulier.

Prix de vente, boîte de 200 granules : 12 fr. 50 (taxe comprise).

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien
3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).
(Tél. : Clignancourt 02-28.)

GRANULÉS DE BOURGET

Présentation. — En boîte métal.

Principes actifs. — Sulfate de soude, Phosphate de soude, Bicarbonate de soude, Citrate de soude.

Indications. — Dyspepsie, Aérophagie, Insuffisance hépatique, Constipation, Météorisme et flatulences, Douleurs, Spasmes, Hyperacidité, Vomissements, Affections du foie.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café pour un demi-verre d'eau le matin à jeun ou après les repas, ou au moment des douleurs.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

GRANULES DES VOSGES

Composition. — Aconit, Drosera, feuilles Belladone, Cte Thébaïque et Dioninum.

Indications. — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

Posologie. — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.

Prix: Le flacon de 50 granules : 11 francs.

Laboratoire G. BERNHARD.

11, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 07-86.)

GRANULOCHRYSINE LUMIÈRE

Granulothérapie Chimio-active

La Granulochryisine est une suspension d'aurothioéthane-sulfonate de calcium dans le sérum physiologique.

La solubilité de ce sel est fort réduite, et il a ce caractère particulier qu'injecté par voie intraveineuse il réalise tout ensemble une granulothérapie indifférente comme celle qu'on réalise par exemple avec le carbone, et une granulothérapie chimio-active spécifique du médicament aurique injecté.

C'est, somme toute, une association de la chimio-thérapie aurique et de la thérapeutique par corps étrangers introduits dans le torrent circulatoire.

Présenté en ampoules de 5 cmc. contenant chacune 10⁶ centigrs d'aurothioéthane sulfonate de calcium, dont 1,5 milligr. sont dissous et 98,5 milligr. sont en suspension sous forme de grains.

Le diamètre moyen de ces grains est d'environ 1/750^e de millimètre.

Action complexe. — Solubilité dans le sérum sanguin = 0,02 pour mille.

La Granulochryisine Lumière, dont l'innocuité est assurée, établit la Granulothérapie Chimio-Active par opposition à la Granulothérapie indifférente existant jusqu'à ce jour.

La Granulochryisine Lumière trouve ses indications dans tous les syndromes infectieux.

Injectons intraveineuses (une ampoule de 5 cmc.) par séries d'importance variable, mais pouvant atteindre, voire dépasser, 50 injections. Se vend en boîte de 10 ampoules.

On obtient des résultats optima par des injections quotidiennes.

Innocuité immédiate, pas de dangers secondaires qui pourraient résulter d'un blocage histologique prolongé.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

GRAVIDOSTYL

Composition. — Sérum frais de jument gravide.

Indications. — Thérapeutique biologique polyhormonale :

Chez la femme : des insuffisances ovariennes légères.
Hypoménorrhées, Oligoménorrhées, Troubles de la puberté et de la ménopause, Troubles de la grossesse : état nauséux, vomissements incoercibles.

Chez l'enfant : des déficiences hormonales complexes.
Prématurés, Nourrissons débiles et hypotrophiques, Retard de croissance du squelette, Paresse intellectuelle, Nervosisme.

Forme. — Boîte de 10 ampoules de 6 cc.
Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — 2 ampoules par jour en ingestion ou en lavement. Dans les cas graves : 2 ampoules en injection hypodermique.

Prix : 26 francs.

Remboursement aux Assurés sociaux : Catégorie B.

Laboratoire du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. Littré 68-22, 23 et 24.)

GRAVURAL

Composition. — Urotropine, tartrate de pipérazine, formiate, salicylate et benzoate de lithine.

Forme. — Granulé effervescent.

Indications. — 1^o Affections du foie, lithiase, constipation, tous troubles de la nutrition, arthritisme.

2^o Toutes affections du rein, de la vessie, de l'urètre ; cystites, pyélonéphrites, lithiase, goutte, obésité, rhumatismes, artério-sclérose.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour dans 1 à 2 verres d'eau, 1/2 heure avant ou 1/2 heure après les repas.

L. DURAND, Pharmacien de l'Institut
28, rue de Seine — PARIS (VI^e).

Publicité : Société d'Expansion thérapeutique.
Société anonyme au capital de 20 000 francs.

Siège social : 129, rue de Turenne — PARIS (III^e).
R. C. : 248.921.

GRIPPO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur L. DUCHON

Pour administration par voie buccale (Non injectable).

Composition. — Le Grippto-Vaclydun est un Lysat-vaccin polymicrobien. Hormis l'absence du bacille diphtérique, sa formule est la même que celle du *Broncho-Vaclydun*.

Indications. — Le Grippto-Vaclydun est destiné au traitement des infections trachéobronchiques communes et en particulier de la grippe saisonnière, en dehors de leurs complications.

Posologie. — Le Grippto-Vaclydun doit être utilisé exclusivement par voie buccale.

En principe, quel que soit l'âge, la dose est d'une à deux ampoules par jour. Verser le contenu dans un demi-verre d'eau sucrée ou aromatisée au gré du malade.

Cette solution ainsi préparée sera utilisée au plus tard dans la demi-journée.

L'administration se fera :

Chez les *enfants* : en trois fois, une demi-heure avant les repas.

Chez l'*adulte* : en totalité, de préférence à jeun ou une demi-heure avant les repas. Au besoin prendre 2 ampoules par jour.

Présentation. — Le Grippto-Vaclydun est présenté en boîtes de 10 ampoules de 2 cc. de vaccin à ingérer.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e). (Tél. : Carnot 78-11.)

GUARAPHOS

Fortifiant. Reconstituant. Apéritif.

Composition. — 1 comprimé contient : Cuarana ext., Inositolhexaphosphates de chaux et de magnésie, Glycérophosphates de chaux et de magnésie, Théobroma cacao sucré.

Propriétés. — Régénérateur des tissus musculaires, nerveux et osseux. Tonique général physique et intellectuel, non toxique.

Indications. — Tous les cas de dépression, de surmenage et de fatigue physiques et intellectuels, Anémies, anorexie, lymphatisme, grippe, convalescences, pré tuberculose, croissance, grossesse et allaitement.

Avantages. — Action tonifiante (sans contre-indications) du Guarana associée à l'action reconstituante des phosphates sous forme assimilable. Action synergique, puissante et rapide. Toxicité nulle.

Forme. — Comprimés chocolatés agréables au goût.

Posologie. — Dose moyenne : Croquer 2 comprimés avant chacun des 2 principaux repas. Boire ensuite un peu d'eau ou de vin.

Laboratoire LOBRU

Louis BRUN, pharmacien.

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

GUBLINE

Formule classique de tout médecin contre l'hyperacidité gastrique avec rétention biliaire et constipation.

Bismuth, Magnésie, Phosphate, Charbon suractivé.

Particularités. — Poudre 6 fois tamisée. Pureté chimique. *Sans goût, ni odeur d'officine.* Absence de carbonate et kaolin. *Sature l'excès d'acidité sans produire d'alcalinisation déminéralisante.*

Chimisme. — En présence d'acides divers de l'estomac, se transforme en $MgCl^2 6H^2O$ (chlorure de magnésium à l'état naissant), en CO^2 , chlorure de calcium, acétates de magnésium et de calcium.

Doses. — 1/2 à 1 cuillerée à café avec un peu d'eau à la fin des deux repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1296/3.

Laboratoire LOISEAU

61, boulevard Malesherbes — PARIS.
(Lab. 16-15).

GUÉTHURAL

Formes. — Ampoules, Tablettes, Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchites, Bronchorrhées. Catarrhes, Grippe, etc.

Mode d'emploi :

Ampoules (Solution aqueuse) : Cas aigus : 1 ampoule tous les jours ; Cas chroniques : 3 à 4 ampoules par semaine.

Tablettes : 6 à 8 tablettes par jour.

Granulé : 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas.

Laboratoires PÉPIN ET LÉBOUCQ

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. Défense 09-71.)

GUI GMET

Liquide sans alcool ni éther.

Composition. — Extrait total du *Viscum album* sous forme liquide ; mieux assimilable que les pilules. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Régulateur cardiaque et artériel, Hypotenseur, Diurétique, Vaso-dilatateur.

Indications. — Hypertensions, Cardiopathies artérielles, Artério-sclérose, Anévrysmes, Hémoptysies, Hémorragies, Eclampsie (dans la grossesse fait baisser l'albuminurie).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, 1 ou 2 fois par jour, entre les repas.

Le flacon pour 1 mois.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

GUIGOZ (Lait en Poudre)

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse) est livré sous trois formes
Lait complet ; Lait demi-écrémé ; Lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, conserve indiscutablement toutes ses vitamines et dispense de l'adjonction de jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons.* — Diététique idéale des bébés privés, partiellement ou totalement, du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes: Intolérances lactées. Affections du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Doses. — Une partie (en poids) de Lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Voir : { **Babeurre GUIGOZ.** Lait dextrosé-malté GUIGOZ.
Raviz (lait irradié). Lait déchloruré GUIGOZ.

Littérature et Échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, r. Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). (Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

GUIMELINDE

(Gouttes hypotensives.)

Composition. — Extraits fluides de gui, d'aubépine, d'hamamélis et de marrons d'Inde associés au nitrite de soude.

Propriétés. — Hypotenseur, par action centrale sur les vaso-dilatateurs, action due au gui, à l'aubépine et au nitrite de soude rendu stable par un procédé spécial.

Indications. — Artériosclérose, Hypertension artérielle, Etats congestifs, Vertiges, Bourdonnements, Troubles de la circulation du sang. Toutes affections du système veineux, Phlébites, Varices, Hémorroïdes.

Posologie. — XX gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau, avant le repas. Ces XX gouttes contiennent 1 cgr. de nitrite de soude et correspondent à 0 gr. 10 de plantes sèches.

Laboratoire de la GUIMELINDE

A. VERGER, Pharmacien
ANCENIS (Loire-Inférieure).

GUILOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

Forme et dosage. — Pilules dosées à 0 gr. 05.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour entre les repas, par périodes de dix jours.

Indications. — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

Prix. — L'étui de 60 pilules : 10 fr. 40.
Échantillons et vente en gros :

H. PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON

D^r A. IMBERT, Pharmacien

(Tél. : Burdeau 28-96.)

Dépositaire à Paris.

E. MOREAU, Pharmacien

13, rue des Nonnains-d'Hyères.

(Tél. : Turbigo 87-05.)

GYNARSOL

Poudre antiseptique spécialement créée pour l'hygiène intime de la femme et le traitement des affections génitales.

Composition :

Stovarsol	0 gr. 01
Nitrate de Potasse.....	0 gr. 01
Chlorate de Potasse	0 gr. 10
Chloramine T.....	0 gr. 05
Bicarbonate de Soude Q. S. ...	7 grs.

Indications. — Hygiène journalière de la femme, Leucorrhée, Vaginite, Métrite, Salpingite.

Mode d'emploi. — Pour injections vaginales, un sachet par litre d'eau.

Pour lavages externes un sachet pour 2 litres d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 fr. 65.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-32.

Laboratoires du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 39-44.)

GYNÉCO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur DUCHON

Composition. — Entérocoques, Diplocoques de NEISSER, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

Indications. — Infections communes des organes génito-urinaires, Métrites aiguës, Métrites chroniques, même anciennes, Complications annexielles ou péri-utérines.

Posologie. — En injections sous-cutanées quotidiennes de 1 cc. pour débiter, passer progressivement à la dose de 2 cc. Réduire à 2 cc. tous les 2 jours lorsque l'amélioration clinique sera très franche.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 2 cc.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27 rue Desrenaudes — PARIS

(Tél. : Carnot 78-11.)

GYNEPTA

Composition. — Di-hydro-folliculine ; Méthylarsinate de Manganèse ; Florure de Sodium ; Elixir de jus de Raisin.

Propriétés. — Hormone ovarienne assimilable par voie buccale grâce à un traitement spécial par un élément catalyseur d'hydrogénation. Son action est renforcée par les éléments organiques et minéraux qui lui sont associés et par la richesse du véhicule choisi en diastases et vitamines.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance de la fonction ovarienne : puberté, aménorrhée, dysménorrhée, ménopause et les troubles associés : migraines, palpitations, etc.

Présentation et prix. — *Elixir*, le flacon : 18 fr. 80.

Posologie. — *Adultes* : un petit verre à liqueur avant chaque repas. *Fillettes* : demi-dose.

Admis aux Ass. S. — L. N. C. M. : N° 1142-3.

L'action physiologique du Gynepta a été officiellement reconnue par le Laboratoire National d'Analyse physiologique de la Faculté de Pharmacie de Paris.

Laborat^{res} BOURDOU, FRONTIGNAN (Hérault) Tél. : 21.

GYNERGÈNE

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée, principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle. Produit pur, exactement dosable.

Formes. — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine ; injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1 000. — Comprimés à 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

Propriétés thérapeutiques. — Le Gynergène est l'hémostatique utérin par excellence et le sédatif du sympathique. Effets constants.

Indications. — Toutes hémorragies utérines (atonie utérine, cancer et fibrome). — Les sympathicotonies, migraines, Basedow, tachycardies, atonie gastrique.

Posologie. — 1/4 de cc. à 1 cc. à la fois ; XV à XXX gouttes ou 1 à 2 comprimés, 2 fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

GYNOCALCION

Forme M. — Traitement rationnel des troubles de la *Ménopause* naturelle, chirurgicale ou radiothérapique chez la femme, de l'aménorrhée, de la sclérose utérine.

Forme P. — Traitement des accidents de la *Puberté* chez la jeune fille.

Propriétés. — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douleur ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques (extraits ovarien et orchitique).

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (*hormone gonadotrope*) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

Doses. — *Gynocalcion M.* — 10 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

Gynocalcion P. — 10 à 12 dragées par 24 heures en séries de dix jours par mois.

Effet rapide. Tolérance parfaite.

Prix : 25 francs.

Échantillons, Littérature :

LABORATOIRES CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS. (Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

GYNŒSTRYL

Thérapeutique hormonale de la femme.

Voie intramusculaire : A l'état de benzoate de dihydro-folliculine 1/10 de mgr. par ampoule de 1 cc.

Voie buccale : A l'état de dihydro-folliculine :

1° Solution hydro-alcoolique :

a. En flacon de 10 cc., contenant 1/10 de mgr. d'hormone par centimètre cube (L gouttes).

b. En flacon de 20 cc. contenant 1/10 de mgr. d'hormone par centimètre cube (L gouttes).

2° Comprimés dosés à 1/40 de mgr. d'hormone :

a. Boîte de 40 comprimés.

b. Boîte de 80 comprimés.

Par voie buccale, le *Gynœstryl* doit être administré en 3 ou 4 prises, soit au moment, soit loin des repas.

Prix : Boîte de 6 ampoules de 1 cc. 22 fr. 85

Flacon ou boîte de comprimés (petit modèle). 21 fr. 80

Flacon ou boîte de comprimés (grand modèle). 39 fr.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Voir *Benzo-Gynœstryl* et *Benzo-Gynœstryl* 5.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi - PARIS - (Litré 58-43.)

GYNO-GOUTTES ISCOVESCO

Définition :

Solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant **la totalité des hormones** spécifiques de l'ovaire.

1 cc. correspond à 10 gr. d'ovaire frais.

Posologie :

XXX gouttes par jour (selon les indications du médecin) en deux prises dans un peu d'eau et quelques minutes avant les repas.
20 jours par mois.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 07-90.)

GYNO-LACTOSMOSE

INJECTION ISO-ACIDE DU MILIEU VAGINAL pH : 4,5

L'injection vaginale doit être l'application lente d'un liquide physiologique, ionisé au pH vaginal, pH : 4,5 reconstituant les données du cycle vaginal.

Forme :

Une poudre désinfectante : bacilles lactiques spéciaux.

Un liquide : glucose et acide lactique (à ne jamais employer pur).

Emploi :

1 MESURE DE POUDRE, 1 MESURE DE LIQUIDE PAR LITRE D'EAU
Mélanger dans le bock. Injection lente de 1 litre.

Hygiène féminine, une demi-dose par litre d'eau.

Désinfectant plus puissant que l'antiseptique. Gyno-Lactosmose, n'est jamais irritant, respecte la muqueuse, reconstitue l'état physiologique, maintient le pH normal.

Indications : Toute leucorrhée, vulvo-vaginites, vaginites-séniles, prurit vulvaire, acidification pendant trois jours après les règles, métrites, infections gynécologiques et puerpérales, blennorragie (immédiatement après permanganate), préparation et suites opératoires, électrocoagulation, filhos, ulcérations, suites de couches, néos.

<i>Petit modèle</i> (15 injections).....	18 fr. »
<i>Modèle moyen</i> (22 injections).....	21 fr. 80
<i>Grand modèle</i> (50 injections).....	32 fr. 50

Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE

Bureaux, 26, Bd des Batignolles, PARIS — (Tél. : Marc. 21-14.)

GYNOLACTYL

Bio-Antiseptique gynécologique.

Maintient la cavité vaginale à son pH normal.

Propriétés. — Prévient et guérit, chez la femme, toutes les infections génitales à pyogènes, c'est-à-dire toutes les infections qui s'accompagnent d'une réaction alcaline plus ou moins prononcée. (Un papier de tournesol rouge bleuit légèrement au contact des sécrétions. Un carnet de papiers de tournesol accompagne chaque échantillon de *Gynolactyl*.)

Rendre à la cavité vaginale infectée sa réaction acide normale et salubre est le rôle du *Gynolactyl*.

Indications et posologie. — *X gouttes de Gynolactyl par litre d'injection.*

1° Hygiène intime et quotidienne de la femme : une injection par jour de 2 litres ;

2° Traitement curatif des infections génitales à pyogènes (vulvites, vaginites, vulvo-vaginites des petites filles, cervicites, métrites, salpingites).

Deux injections par jour de 2 litres.

Laboratoire BIGET

Dépôt : Paris, 37, rue Château-Landon — PARIS.

GYNOMÉTINE

Comprimés.

Composition. — Polyoxyméthylène et Perborate de soude, Alun, dans mélange alcalin effervescent.

Posologie. — 1 à 2 comprimés par litre d'eau pour injections vaginales.

Indications. — Antiseptique gynécologique, Métrites, Leucorrhées, etc.

Prix : 15 fr 50 la boîte de 30 comprimés.

Laboratoire RICHER
Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

GYNOPLIX

Composition. — *Stovarsol* (nom déposé) et hydrates de carbone.

Forme. — *Pansement vaginal sec* (comprimés friables renfermant chacun 0 gr. 25 de stovarsol).

Propriétés. — Modificateur du milieu, empêche la prolifération parasitaire, rétablit l'état normal des muqueuses.

Réussit dans les cas où les antiseptiques (hypochlorite, etc.) plus ou moins irritants ont échoué, en favorisant la production d'acide lactique.

Indications. — *Pertes blanches de toutes origines*, entre autres : Leucorrhée due à des troubles généraux ; Leucorrhée due à des irritations ou infections ; Leucorrhée de la grossesse, et, électivement, Vaginites à trichomonas.

Mode d'emploi. — Chaque jour, après toilette de la région, introduire profondément dans le vagin — de préférence le soir au coucher — un ou deux comprimés de *Gynoplax*.

Utiliser deux comprimés ou plus au début, diminuer le nombre de comprimés et espacer les applications dès qu'une amélioration est constatée.

Boîte de 20 comprimés.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
« THERAPLIX »

98, rue de Sèvres, PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

HALIFLÉTOL

Composition. — Huile de foie de flétan pure, titrée, extra-riche.

Avantages. — La plus forte teneur naturelle en vitamines A et D.

100 fois plus active que l'huile de foie de morue. Digestibilité parfaite. Goût agréable.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue (rachitisme, croissance, anémie, toutes déficiences).

Posologie. { *Bébés* : I goutte 2 fois par jour.
Enfants de 3 à 14 ans : III gouttes avant chaque repas.
Adultes : IV ou V gouttes avant chaque repas.

A prendre dans un quartier d'orange, un peu de bière, ou autrement.

Présentation et prix :

15 francs le flacon de 6 cc. (durée minimum : 15 jours).

Laboratoires du D^r NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — Paris (2^e).

(Tél. : Louvre 35-36.)

HAMAMÉLINE ROYA

Principe actif aromatique de

l'Hamamelis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuil. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vaso-constricteur, Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

Dose. — Par cuil. à soupe : 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix : 21 fr. 30.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 08-00.)

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'*Hamamelis virginica*.

Indications. — Maladies du système vasculaire.

Varices, Phlébite.

Hémorroïdes.

Troubles congestifs de la Ménopause.

Artério-sclérose.

Rhumatisme chronique.

1^o **Gouttes concentrées.** — De XXX à LX gouttes par 24 heures. Dans certains cas d'hémorroïdes enflammées C et même jusqu'à CL gouttes *pro die*, ce qui procure un soulagement immédiat ; revenir à la dose d'entretien de LX gouttes par jour.

2^o **Élixir** (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon,

Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

HAMAMÉLIS GMET

Composition. — Extrait total et sans alcool de l'Hamamelis Virginica. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Vaso-constricteur, décongestif d'autant plus puissant que la préparation est sans alcool. Plus actif que les cachets de poudre et les comprimés. Bien préférable aux extraits alcoolisés (teintures, élixirs, etc...).

Indications. — Tous les troubles congestifs ou veineux.

Posologie. — 1 cuillère à café dans un peu d'eau froide (fibromes et hémorragies jusqu'à 6 ou 8 cuillères à café *pro die*).

Prix : Le *flacon* pour 1 mois.

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoires GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.)

HAMAMELIS GRANDVAL

Forme et Composition. — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamelis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arome tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

Indications. — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorragies. — Œdème chronique. — Congestions, etc., etc.

Dose. — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 fr. 50. — Le flacon : 12 francs.
(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12-14, rue Féry — REIMS.

(Tél. : 31-63.)

HARLÉDINE

Capsules Glutinisées.

Formule :

Boldine	un demi-milligr.
Extrait de bile	0,03
Huile de Haarlem vraie	0,18

Propriétés. — Antiseptique et décongestif des voies hépto-biliaires et rénales. Cholagogue.

Indications. — Lithiase biliaire, ictères, cholécystites, coliques hépatiques, coliques néphrétiques, entérites muco-membraneuses, Constipation, Goutte et rhumatisme chronique.

Doses. — Affections aiguës : 2 à 4 comprimés par jour.

Affections chroniques : 1 à 3 capsules par jour (à prendre au moment des repas).

La boîte de 40 capsules : 17 fr. 05.

Laboratoire L. COUVERT

11, rue de Mogador — PARIS (IX^e).

HARLEM PHILIPPE

Kérat-Harlem.

Pilules Kératinisées à l'huile de Harlem vraie, pure et d'origine. Dose : 0 gr. 15 par pilule. Leur Kératinisation, d'après les procédés du Dr H. Philippe, évite les fatigues d'estomac, les renvois désagréables, le mauvais goût, occasionnés ordinairement par le goût spécial de l'Huile de Harlem.

Indications. — Affection du foie, lithiases biliaires ou rénales, ictère, coliques hépatiques ou néphrétiques, pyélo-néphrites, goutte, arthritisme, asthme hépatique, etc.

Posologie. — 1 à 2 pilules par jour au cours des repas ou avant de se coucher.

4 à 6 pilules dans les cas aigus.

Prix : 17 francs.

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, Quai Fulchiron — LYON.

HÉBÉOL

Produit français.

Composition. — Emulsion colloïdale à base d'huile de paraffine (49 p. 100) et Agar-Agar (51 p. 100).

Propriétés. — L'action de la paraffine colloïdale se produit dans la profondeur du bol fécal et le ramollit, se mêle au mucus intestinal en augmentant sa viscosité et son action.

Rétablit la fonction intestinale. Sans irritation, sans suintement. Ne contient ni sucre, ni alcool, ni phénol-phtaléine, ni gomme.

Indications. — Constipation par spasme ou atonie, constipation post-opératoire. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Auto-intoxications. Appendicite chronique. Hémorroïdes. Femmes enceintes. Recommandé aux vieillards et aux enfants.

Prix. Flacon 210 cc. : 15 francs ; de 90 cc. : 8 fr. 50.

Posologie. — *Adultes* : Début de cure : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour ; dose d'entretien : 1 cuillerée à soupe.

Enfants : début de cure : 2 à 3 cuillerées à dessert. Dose d'entretien : 1 cuillerée à dessert. Dans de l'eau, de préférence au repas avant le dessert.

M. REINHOLD, Pharmacien,

20, rue de Rivoli — PARIS (IV^e).

Tél. : Arch. 61-62.

HECTARGYRE

(Sel mercuriel de l'Heotine.)

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules

Posologie :

Adultes : forme injectable. *Ampoule A* : tous les jours.

Ampoule B : tous les deux jours. 15 ampoules pour une

cure. *Per os* : 2 pilules par jour pendant 15 jours ou

LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX

gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès Sciences, Pharmacien de 1^{re} classe.

12, rue du Chemin-Vert,

VILLENEUVE-LA-GARENNE près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

HECTINE

(Benzo-sulfone-paraminophényl-arsinate de soude.)

Spécifique de la Syphilis et succédané du cacodylate de soude.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie, Asthénie, Etats dépressifs, Eczéma des nourrissons.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie:

Adultes : forme injectable. *Ampoule A* : tous les jours. *Ampoule B* : tous les deux jours. 15 ampoules pour une cure. — *Per os* : 2 pilules par jour pendant 15 jours ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).
(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

HÉDÉRYL

Composition. — Pommade au lierre grim-pant.

Propriétés. — Fibrolysant, décongestif, analgésique.

Indications. — Cellulite, arthralgies, ar-thrites, névralgies.

Posologie et mode d'emploi. — En fric-tions et massages, puis onctions sur la région douloureuse. Recouvrir ensuite d'une feuille d'ouate.

Prix : 15 francs le tube de 55 grammes, pour une durée moyenne de 12 jours de traitement.

Laboratoire LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS (VI^e).
Tél. : Littré 13-37.

HÉDOPEPTOL

Composition. — Citrate monosodique, hexaméthylène tétramine, charbon animal.

Propriétés. — Antiseptique gastro-intestinal, urinaire et biliaire.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, dyspepsie, aérophagie, entérite, diarrhée, colibacillose, appendicite chronique, insuffisance hépatique, cholécystite et angiocholécystite, infections des voies urinaires, auto-intoxication et ses conséquences.

Présentation et prix. — Granulé homogène fondant.
La boîte de 80 grammes : 15 francs.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café une demi-heure après les deux repas, midi et soir, avec un peu d'eau.

L'Hédopeptol existe également sous forme de pastilles

Laboratoires SAUNIER

35, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).

Tél. : Jasmin 29-56.

HÉDUSOL

Tonique. Reconstituant.

Elixir au vin de Muscat, d'un goût agréable.
Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments
sous le n^o 957-1.

Composition :

Phosphate de soude	1 gr.
Méthylarsinate de soude	10 cgr.
Extrait fluide de Kola.....	2 gr. 5
Extrait fluide de Quinquina.....	1 gr. 25
Teinture de Gentiane.....	VI gouttes.
Teinture Noix Vomique.....	XII —
Teinture de Cannelle.....	VI —
Teinture de Vanille.....	XII —
Vin de Muscat	Q. S. p. 100 gr.

Indications. — Surmenage. Faiblesse générale. Anémie. Asthénies. Neurasthénie. Troubles de Nutrition et de Menstruation. Affections des Bronches. Convalescence.

Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe midi et soir.

De 12 à 15 ans : 1 cuillerée à dessert midi et soir.

De 8 à 12 ans : 1 cuillerée à café midi et soir.

Le flacon : 16 fr. 60.

LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien, 47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

HÉGANOL

Composition. — Combinaison d'iode, gaïacol, héléline, menthol, codéine, aconit, belladone, lactophosphate de chaux.

Propriétés. — Antiseptique des voies respiratoires, tarit les sécrétions bronchiques et pulmonaires, antispasmodique calmant de la toux, reminéralisant, recalcifiant, stimule la phagocytose.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires bronchites aiguës et chroniques, trachéites aiguës et chroniques, tuberculose.

Présentation. — Sirop agréable, de conservation indéfinie, sans influence néfaste sur l'estomac.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillère à soupe au milieu de chacun des trois repas dans un peu d'eau tiède de préférence.

Enfants au-dessous de 15 ans : une cuillère à café à chaque repas.

Prix : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 650-9, — Assurances Sociales : Catégorie B, remboursée à 80 p. 100.

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

HÉLÉNINE DE KORAB

Composition :

Héléline cristallisée	0,01
Chlorhydrate de morphine.....	5/10 de mg.
Codéine	0,005

La codéine augmente l'action de l'héléline et la prolonge (Renon).

Indications. — Toutes les toux qu'elle calme, toutes les expectorations qu'elle tarit, congestion du larynx qu'elle décongestionne.

Grippe, bronchite, asthme, coqueluche, toux spasmodiques.

N. B. — Pour les cas de bacillose, il est recommandé d'employer la formule créosotée :

Héléline cristallisée	0 gr. 01
Chlorhydrate de morphine.....	5/10 de mg.
Codéine	0,005
Créosote de Hêtre	0,02

Présentation et prix. — 14 francs la boîte de 50 globules.

Posologie. — 6 à 8 globules par 24 heures.

Sirop à l'Héléline de Korab. Action curative et puissante dans la coqueluche.

5 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire R. BOUYSSOU

CHAMBOIS (Orne).

HELQUEROL

Traitement Phytothérapique des troubles de la Circulation
et de la Nutrition.

Forme : Élixir.

Composition. — Synergie phytothérapique hypotensive à base de : Ail et Oignon, Romarin, Raifort, Cannelle, Safran, Badiane, Capillaire.

Indications. — *Troubles de la circulation*, Hypertension, Artério-sclérose, Insuffisance cardiaque, Etats congestifs, Varices et Ulcères variqueux, Œdèmes, Hémorroïdes, Règles (formation et ménopause), Aménorrhée, Dysménorrhée.

Troubles hépatiques et vésiculaires, Ictères, Auto-intoxications, Dermatoses, Migraines, Constipation, Obésité.

Maladies des reins et de la vessie : Anuries, Dysuries, Pyuries.

Arthritisme : Rhumatismes, Goutte, etc.

Troubles des voies respiratoires : Emphysème, Asthme, Bronchites chroniques.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe le matin à jeun 20 jours par mois. Durée moyenne du traitement : 3 mois.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires H. YVRARD
17, rue Soufflot — PARIS.
(Tél. : Odéon 56-67.)

HÉMAGÈNE TAILLEUR

Règle les règles et supprime la douleur.

Forme. — Dragées.

Composition. — Méthylnonylcétone, poudre d'ovaire total et principes vaso-dilatateurs.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée, régulateur du flux sanguin.

Indications et posologie :

1° **DYSMENORRHEE** : 2 dragées dès l'apparition des douleurs ; 1/2 heure après : 2 autres. Maximum : 8.

2° **AMENORRHEE** et **MENOPAUSE** : 4 à 6 dragées par jour.

3° **COLIQUES POST PARTUM** : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 9 fr. 35.

Grand flacon de 30 dragées : 17 fr. 60.

Laboratoire SEVENET

10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mar. 25-23).

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsenicale
phosphorée-strychnique.

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 30 à 40 gouttes par jour.

Enfants : 2 gouttes par année d'âge et par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences. Tous états ganglionnaires, tous états infectieux. Asthme.

Prix : 16 francs.

Laboratoire CHATELUT

65, rue Louis-Blanc
PARIS (X^e)

HEMA-RHEO

Gouttes

(Maladies et troubles de la circulation veineuse)

Composition :

Extrait stabilisé d'Hamamelis.....	30 gr.
Extrait stabilisé de Marron d'Inde.....	15 gr. 74
Alcoolature d'anémone.....	78 gr. 74
Teinture de noix vomique	78 gr. 74
Eau distillée, Glycérine, Alcool.....	Q. S. P. 1 000 gr.

Mode d'action. — Grâce à l'Hamamelis et à l'anémone, elles favorisent la menstruation et en calment les douleurs. Par l'extrait de Marron d'Inde, rendent aux veines leur souplesse et leur calibre normal. Par l'extrait de noix vomique, tonifient les parois vasculaires.

Véritable synergie médicamenteuse augmentant la valeur thérapeutique de chacun des composants et faisant de ce produit le remède idéal dans le traitement des troubles veineux circulatoires.

Indication. — *Toutes affections des veines* : Varices, Hémorroïdes, Phlébites.

Troubles circulatoires : Apparition des règles, règles douloureuses, règles retardées ou supprimées, âge critique, démangeaisons, engelures, rougeurs.

Mode d'emploi. — X à XX gouttes dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour, 20 jours par mois, suivant l'avis du médecin.

Prix : 15 francs.

LABORATOIRES de L'EVOLAX, Pharmacien GUÉRAUD,
27, avenue Victor-Hugo — VALENCE (Drôme) — Tél. 8-67.

HÉMATOÉTHYROÏDINE CARRION

Composition. — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure, ou desséché.

Formes. — Liquide. Comprimés dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

Indications. — Goitre exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse. Insomnie, Hémophilie, Troubles de la ménopause.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

Insomnies : un comprimé au repas du soir.

Présentation et prix. — Le flacon de 120 cc. : 33 fr. 30. L'étui de 24 comprimés : 20 fr. 80.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HÉMATO-IODINE

États lymphatiques et anémiques,

Adénites chroniques.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges

PARIS (IV^e).

HÉMÉDONINE

Solution d'Hématoporphyrine pure selon la formule de Nencki.

Indications. — États de dépression et de fatigue, Vagotonie, États anxieux, Migraines, Stimulant général d'une innocuité absolue.

Présentations. — Deux formes :

Ampoules de 1 cc. et 2 cc. contenant 0 gr. 002 mgr. d'Hématoporphyrine pure par cc.

Gouttes : flacon de 20 cc. contenant 0 gr. 005 milligr. d'Hématoporphyrine pure par cc.

Emploi. — Ampoules, en injections intramusculaires profondes uniquement.

Se vend en boîte de 10 ampoules 1 cc. : 26 fr. 70.

10 ampoules 2 cc. : 42 fr. 65.

1 flacon gouttes : 53 fr. 30.

Laboratoire GIREL

F. JALOT, Pharmacien,

19, rue Godot-de-Mauroy. — PARIS.

HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du P^r E. Maragliano.

Composition. — Sang de bœufs immunisés contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano

25 p. 100

Alcool 14 —

Glycérine 10 —

Eau aromatique 51 —

Indications. — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofuleuse. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

Formes et Posologie. — Simple : adultes : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas). Enfants : une cuillerée à café quatre fois par jour (avant les repas).

Triple : mêmes doses (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 22 fr. 90.

H. PERRIN — 11, quai Saint-Clair — LYON.

D^r A. IMBERT, Pharmacien — (Tél. : Burdeau 28-96).

Dépositaire à Paris ; **E. MOREAU, Pharmacien**
13, rue des Nonnains-d'Hyères — (Tél. : Turbigo 87-05.)

HÉMOCALCINE

Composition. — A base d'extrait de foie intégral inaltérable et métaux ferments, associés à la magnésie et au calcium à l'état de glycérophosphates avec 1/2 mmgr. de strychnine ; sans arsénicaux intolérés, sans vitamines périssables.

Propriétés thérapeutiques. — Donne un pH favorable à la fixation phospho-minérale. N'entraîne pas de constipation.

Indications. — Anémie, Asthénie, Puberté, Dérégulation, Dépressions nerveuses et toxiques.

Formes et mode d'emploi. — 30 petits cachets friables, instantanément dissociés.

Un cachet par jour de 8 à 15 ans avant le repas.

2 à 3 cachets par jour pour les adultes avant le repas.

En cas de contre-indication, formuler : HÉMO-CALCINE sans strychnine. Prix : 18 francs.

Ne contient pas de notice intérieure.

Vous rappelle ANTISUCE et ARTHRIDENT

Laboratoire FERCOCQ, Licencié des sciences

LA VARENNE-SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 03-97.)

HÉMOCALCIOPECTINE

L'Hémostatique rationnel.

Solution antihémorragique de Pectine
et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactisante.

Indications thérapeutiques. — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

Présentation. — Ampoules buvables de 10 cc. Boîtes de 3 et 6 ampoules.

Mode d'emploi. — De 1 à 6 ampoules par 24 heures dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 28 fr. 60.

Boîte de 3 ampoules. Prix : 17 fr. 20.

Dépôt général :

Pharmacie J. ROBERT

J. BOUDIER, Successeur

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

(Tél. : Invalides 39-19.)

HÉMO-CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition. — Soluté de cacodylate de sodium chimiquement pur, fer et strychnine.

Mode d'emploi. — Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, accroît la valeur globulaire.

Indications. — Anémies de toutes origines. Convalescences, Chlorose, Surmenage, Troubles de la croissance et de la puberté.

Présentation. — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Traitement pour 18 jours.

Prix : 23 francs.

Hémo-Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 17 francs.

**Laboratoire pharmaceutique
CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél.: Carnot 78-11.)

HÉMODROME

(Phytothérapie Intégrale.)

Forme. — Liquide à prendre par gouttes.

Composition. — Anémone, Cupressus, Marron d'Inde, Berberis, Thlaspi, Thuya, Souci.

Propriétés thérapeutiques. — Action supérieure à l'hamamélis et similaires. Ne contient aucun produit chimique. Assimilation plus rapide de par sa forme liquide que les produits pris en pilules ou en comprimés.

Indications. — Toutes affections du système veineux : varices, ménopause, règles irrégulières.

Posologie. — XV à XX gouttes 3 à 4 fois par jour dans un peu d'eau.

Prix : 10 fr. 50.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

HÉMODUCTYL

Pilules ou Solution.

Extraits d'hamamelis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

Dose moyenne. — 2 pilules, 1 cuillerée à café de *solution*, matin, midi et soir, avant les repas.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Pilules. Prix : 17 francs.

Solution. Prix : 17 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boul. Bourdon — NEUILLY-s-SEINE
(Tél. : Maillot 17-75.)

HÉMOFLUIDOL

(Dragées)

Fluidifie le sang.

Chaque dragée contient :

Silicate de soude..... 0 gr. 05

Citrate de soude 0 gr. 15

Artériosclérose

Hypertension

Troubles circulatoires

Deux dragées matin et soir avant le repas.

Durée du flacon : 15 jours.

Prix : 20 francs.

Laboratoire LÉONARDON

Docteur en Pharmacie, ANGERS.

Dépositaire général : O. C. P. Paris.

HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

Formes. — Ampoules d'Hémogénol contenant 10 cc. de sérum liquide.

Sirop d'Hémogénol à base de sérum hémopoïétique.

Dragées d'Hémogénol contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

Indications. — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Pulssant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique, recommandé dans les affections hémorragiques et l'*hémophilie*.

Mode d'emploi. — Ampoules d'Hémogénol. — 1 à 3 ampoules par jour, prises par la bouche, dans un peu d'eau sucrée ou en lavement.

Dragées d'Hémogénol. — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

Sirop d'Hémogénol. — Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). — (Tél. : Turbigo 63-40.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine, contient :

- 1° Une hémoglobine physiologique, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3° Les substances minimales du plasma non altérées.

Action :

- 1° Apport d'hémoglobine (fer globulaire).
- 2° Stimulation des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

Indications. — Anémies, Chlorose, Déchéances organiques, Tuberculose, Convalescences, Grossesses, Suites de couches.

Posologie. — Une cuillerée à potage à la fin des deux principaux repas. Doubler dans les cas graves. Pas de contre-indications.

Prix : 20 francs.

DESCHIENS, Docteur en pharmacie

9, rue Paul-Baudry — Paris (8^e). — (Tél. : Élysées 40-26.)

HÉMOLUCYL

Médication citratée combinée à l'Hamamélis et à l'Hydrastis.

Granulé soluble.

Formule :

Extrait d'hydrastis	0,25
Extrait d'hamamélis	1,25
Citrate monosodique	5,00
Citrate trisodique	5,00
Excipient aromatisé, Q. S. pour	100

Indications. — *Hyperviscosité sanguine, Hypertension. Stases veineuses, Varices, Œdèmes chroniques-post-phlébitiques, Troubles de la ménopause.*

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, trois fois par jour, avant les repas (se conformer aux indications du médecin).

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire de l'HÉMOLUCYL

R. MASSOL, Pharmacien de 1^{re} classe

54, avenue de la Bourdonnais — PARIS (VII^e).
(Tél. : Inv. 55-59.)

HÉMOLUOL

Phytothérapie toni-veineuse.

Liquide. Comprimés.

Composition. — *Éléments activés par synergie* ; Thlaspi (Capsella Bursa Pastoris), Berberis, Hamamelis, Quinquina, Viburnum prunifolium, Anémone pulsatille, Marron d'Inde.

Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives, en un *liquide* et en *comprimés*.

Décongestif, tonique, veineux, stimulant des vaso-moteurs centraux, analgésique et sédatif de l'appareil utéro-ovarien.

Indications. — Troubles des fonctions menstruelles. Aménorrhées, dysménorrhée douloureuse, ménopause naturelle et opératoire.

Insuffisances veineuses. — Varices, hémorroïdes, Phlébites, etc.

Liquide. — Prendre 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, 15 jours par mois.

Comprimés. — Avaler deux comprimés au début de chacun des trois repas, 15 jours par mois.

Le liquide et les comprimés ont la même valeur thérapeutique, les mêmes indications et peuvent être employés indifféremment.

Le flacon ou la boîte de 50 comprimés.

Prix : 16 fr. 10.

Laboratoire de l'HÉMOLUOL

11, rue de Mogador — PARIS (IX^e).

HÉMOPANBILINE

Forme. — Comprimés et Solution.

Définition. — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoïétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoides, source de mécomptes.

Composition. — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Chologogues) *Extrait hémopoïétique de Foie*. Hémoglobine et Citrate de fer ammoniacal.

Indications. — Médication hépatique des *Anémies, Chlorose, Convalescence, Etats de déchéance, Ictère hémolytique*.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café, ou 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre avant les repas.

Enfants : demi-dose.

Prix au public :

20 fr. 30 le flacon d'Hémopanbiline liquide.
18 fr. la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

Laboratoires du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

HÉMOPAUSINE

Composition. — Liqueur à base d'Hydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Seneçon, Sels de chaux, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

Action. — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Prix : 12 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-1.

Laboratoire de l'HÉMOPAUSINE

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

HÉMOPECTAL

(Médication antihémorragique.)

Forme pharmaceutique et composition. — Boîte de 3 flacons-ampoules de formule :

Solution de pectine fraîche et stabilisée à 2 p. 100	10
Chlorhydrophosphate de calcium	0,50
Solution titrée de genêt.....	0,20

(Pour 1 ampoule.) — Boîte de 3 ampoules.

Avantages. — Produit très actif, s'employant par voie *buccale* ; pas de contre-indication, pas de toxicité, même pour le très jeune enfant, *pas d'accidents sériques, pas désagréable à absorber.*

Indications thérapeutiques. — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre *préventif avant et après toute intervention sanglante.*

Mode d'emploi. — 3 (enfants) à 6 (adolescents et adultes) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

Prescription. — 1 boîte-ampoules Hémopectal Falvy.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

HÉMO-PHAGOSTHYL

Phagosthyl ferrugineux.

(Pour adultes.)

Formule :

Cacodylate de soude pur	20 centigr.
— de magnésie	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Fer colloïdal	2 centigr.
Soluté chloruré isotonique	5 cc.

Indications. — Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 fr. 90.

Hémo-Phagosthyl Infantile : 12 ampoules de 2 cc.
pour enfants de 8 à 15 ans : 16 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 55-12.)

HÉMOPHILINE PLANCHE

Elixir et Dragées.

Composition. — Elixir, à base de piscidia, hamamélis, viburnum persil, seneçon, tamus, scandix.

Dragées, mêmes plantes fraîches stabilisées sous forme d'extraits obtenus dans le vide.

Tous deux contiennent en plus le catalyseur général de la femme (détecté par analyse vibratoire), ce qui en augmente l'activité et en décuple l'efficacité.

Notre formule ne contient que des plantes qui sont en harmonie vibratoire attractive avec l'organe sur lequel elles agissent d'une façon toujours bienfaisante d'après nos expérimentations.

Indications. — Formation de la jeune fille, de la femme mal réglée, malaises précédant ou accompagnant les époques, régulateur du flux menstruel trop ou pas assez abondant dont il calme les douleurs : aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie, troubles généraux de la ménopause.

Modes d'emploi. — *Elixir* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau, 4 à 5 jours avant l'époque présumée des règles.

Dragées : 8 à 10 par jour, pendant la durée des règles.

Prix : 18 francs.

Laboratoire PLANCHE

Membre de l'Académie de Médecine.

P. SAUVAGE, successeur

2, rue Volney — Paris (II^e).

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques qu'elle qu'en soit l'origine.

Constitution. — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'animaux réfractaires à la tuberculose contient : Hémoglobine dont l'activité oxydase est maxima, sérum sanguin, lipoides des globules rouges, lipoides et ferments des leucocytes.

Indications. — Toutes anémies :

- 1° Toxiques d'origine exogène ou endogène ;
- 2° Infectieuses (convalescences, tuberculose) ;
- 3° Par spoliation sanguine (hémorragies) ;
- 4° Par cachexie néo-plasique.

L'Hémo-plase Lumière fait du sang, stimule toutes fonctions organiques, lutte contre les infections et contre les intoxications.

Procédé le plus efficace de cure de tous états cachectiques. Stimule les défenses anti-toxique, anti-toxinique, anti-microbienne par suractivation hémopoïétique.

Doses courantes. — L'Hémo-plase Lumière peut être administrée par voie buccale, sous forme de granulés, de cachets et de dragées.

Granulés..... de 2 à 6 cuil. à café par jour.

Cachets..... de 4 à 6 par jour.

Dragées..... de 6 à 10 —

Chez les enfants, employer de préférence la forme en granulés : une à 4 cuillérées à café par jour.

Ampoules. — Pour l'administration par voie intramusculaire :

Adultes : 2 ou 3 ampoules de 10 cc. par semaine ;

Enfants : 2 à 10 cc. deux fois par semaine ;

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

HÉMOPYLORE

Opothérapie Anti-anémique.

Reconstituant globulaire.

Composition. — Extrait mixte résultant de la combinaison des méthodes de Whipple et de Castle préparé scientifiquement avec des organes frais, ni réfrigérés ni frigorifiés.

Références scientifiques. — La valeur thérapeutique de l'Hémopylore a été établie par des observations cliniques prises dans les Services de MM. les professeurs Loeper, de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Carrière, de l'hôpital Saint-Sauveur à Lille, Mauriac, de l'hôpital Saint-André, et Cruchet, de l'Hôpital-Hospice des Enfants à Bordeaux. Ces observations sont relatées dans la thèse inaugurale de M. le Dr B. Mouras (Paris, Mars 1937).

Les résultats constatés sont les suivants : augmentation rapide des globules rouges ; augmentation parallèle du taux de l'hémoglobine et du poids ; suppression de l'anorexie ; sentiment d'euphorie. Ni accoutumance ni *hépto-résistance*. Sans contre-indications.

Méthrorragies, Fibromes saignants : Effets hémostatique rapide.

La saveur agréable de l'Hémopylore le fait accepter des malades les plus délicats et en permet l'administration pur, sans véhicule.

Indications. — Toutes anémies graves, essentielles, cryptogénétiques de Biemer de l'*Enfant* et de l'*Adulte*. Toutes convalescences : suite de grandes diathèses ou post-opératoires. Asthénies, Dépressions, Anorexie, Anémies faibles.

Présentation. — Ampoules (buvables non injectables) :

Boîte de 10 ampoules de 5 cc.	42 fr.
Coffret de 30 ampoules de 5 cc.	105 fr.
Boîte de 12 ampoules de 2 cc.	26 fr.
Coffret de 30 ampoules de 2 cc.	52 fr.

Posologie. — Contre les anémies graves et méthrorragies :

- Traitement d'attaque : 4 à 6 ampoules 5 cc. par jour en 2 ou 3 fois.
- Traitement d'entretien 2 à 4 ampoules 2 cc. par jour en 2 fois.
- Durée du traitement 20 à 60 jours à contrôler par examens hématimétriques.

Contre les anémies moyennes et légères :

- Adultes* : 1 à 2 ampoules de 5 cc. par jour ; 2 à 4 ampoules de 2 cc. par jour.
- Enfants* : de 2 à 3 ampoules de 2 cc. par jour suivant l'âge.

Mode d'administration. — L'Hémopylore se prend à n'importe quel moment de la journée, de préférence au commencement des repas, soit pur, soit dans un quart de verre d'eau.

Laboratoires du GAMBÉOL

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

J. GAUTIER, Pharmacien de 1^{re} classe.

42, rue Émile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 17-67.)

HÉMORROÏDINE GOUTTES

Composition. — Hamamelis, hydrastis, intrait de marron d'Inde.

Propriétés. — Régulateur de l'insuffisance veineuse et de ses conséquences.

Indications — L'« Hémorroïdine gouttes » est une préparation rationnelle applicable au traitement des hémorroïdes, avant tout, mais dont peuvent bénéficier d'autres manifestations veineuses, à savoir : *varices, varicocèles, ulcères variqueux, œdèmes phlébitiques.*

Mode d'emploi. — XV gouttes matin, midi et soir, avant les repas, dans un peu d'eau.

Prix : 13 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE POMMADE

Composition. — Adrénaline, paraforme, intrait de marrons d'Inde.

Propriétés. — Spécifique par excellence des hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal, fistules.

Indications. — Arrête les hémorragies, calme les douleurs, décongestionne.

Mode d'emploi. — Faire une application de la pommade matin et soir et après les garde-robes.

Prix : 12 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE SUPPOSITOIRES

Composition. — Adrénaline-paraforme-intrait de marron d'Inde stabilisé.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, analgésiques, calmants.

Indications. — Hémorroïdes internes, fissures, prurit anal, fistules.

Mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, soit le matin au lever, soit le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.**

HÉMOSAMINE (Utéramine)

Composition. — Solution au centième de chlorhydrate de para-oxyphényléthylamine présentée en ampoules de 1 cc., pour injections, et en flacons de 10 cc., pour l'usage interne.

Propriétés. — *Hémostatique, cardio-tonique et utéromotrice.* Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

Indications. — *Obstétrique et gynécologie.* Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.

Médecine interne. Hémophilie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

Mode d'emploi. — On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscle fessier), 1 à 3 cc. et jusqu'à 5 cc. selon les cas. Pour l'usage interne XX à XXX gouttes, trois fois par jour. Pour l'usage externe : En tampons ou pansements imbibés de solution pure ou diluée au 1/5 avec de l'eau stérilisée ou bouillie.

Laboratoire ZYMA

Dépôt général : **Laboratoires LOBRU,**
92, rue Bobillot — PARIS (XVIII°).

HÉMOSTATIQUE COUDERT

Composition. — Tubes scellés de 20 cc. contenant 0 gr. 10 d'émulsine en solution stabilisée.

Propriétés. — Puissant hémostatique, coagulant, tonique, sans toxicité, sans action sur la tension artérielle et la viscosité sanguine.

Indications. — Hémorragies de l'appareil digestif, des affections gynécologiques (fibrome, cancer, métrite), des affections urinaires (rein, vessie, prostate), tuberculeuses, lithiasiques ou néoplasiques. Hémoptysies.

Accidents hémorragiques dus à l'hyporésistance globale (anémie, affections du foie, purpuras hémorragiques).

Préventif et curatif de toutes les réactions sériques d'origines pathologiques, alimentaires ou médicamenteuses (hémorragie intestinale de la fièvre typhoïde, paludisme, réactions sériques, idiosyncrasies médicamenteuses ou alimentaires, urticaire). Spécifique de l'hémophilie, Hémogénie, hémorragies dues à des altérations de la crase sanguine (période de ménopause, règles abondantes, épistaxis rebelles).

Doit être employé dans toute opération chirurgicale susceptible d'entraîner une grosse perte sanguine (ablation des amygdales, végétations adénoïdes), en obstétrique et en stomatologie, prostatectomie (avulsion dentaire).

Posologie :

Curatif : 1 à 8 ampoules par jour suivant la gravité des cas.

Préventif : 1 ampoule la veille, 1 ou 2 ampoules 1 ou 2 heures avant l'opération.

Pour les hémophiles, faire suivre un traitement de 2 ampoules par jour avant l'opération et vérifier les résultats obtenus en faisant un examen du sang (temps de saignement et de coagulation).

Le produit doit être pris dans un liquide froid, pur, ou aromatisé avec du jus d'orange ou de citron.

Présentation et prix :

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. : 20 francs.

Boîtes de 6 ampoules de 20 cc. : 35 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 20 cc. : 60 francs.

Laboratoires COUDERT

13, rue Antoine-Vollon — PARIS XII^e).

(Tél. : Diderot 59-72.)

HÉMOSTATIQUE ERCÉ

Composition. — Suspension lipo-colloïdale et stérile de Thrombase (fibrin-ferment).

Propriétés. — Hémostatique et coagulant énergique (1 cc. de suspension coagule en 20 secondes 20 cc. de sang).

Applications. — Applications externes seulement. « Il ne doit jamais être utilisé en injections. » L'ingestion « per os » réduit d'une façon appréciable le temps de coagulation du sang (hémophilie).

Indications. — MÉDECINE : Toutes hémorragies de pratique courante. Epistaxis, Hémorragies utérines, etc...

CHIRURGIE de l'abdomen. Chirurgie osseuse, gynécologique et urinaire. Prostatectomies, Chirurgie esthétique.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : Epistaxis rebelles, ablations d'amygdales ou végétations, etc.

STOMATOLOGIE ET ODONTOLOGIE : Toutes hémorragies buccales ou dentaires.

Mode d'emploi. — 1° SURFACES SAIGNANTES : applications au moyen d'un tampon de coton stérile. Si l'écoulement est violent, faire une légère pression. — 2° ORGANES CREUX : tamponner au moyen de mèches imbibées d'Hémostatique Ercé.

Formes et Prix :

Boîte de 3 ampoules de 2 cc.....	13 francs.
— 6 ampoules de 5 cc.....	19 francs.
— 6 ampoules de 20 cc.....	38 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRÈRE
1, avenue de Villars — PARIS.

HÉMOSTATIQUE GOY

Formule :

Extrait fluide de seigle ergoté	4
Chlorure de calcium pur	8
Acide citrique	0 50
Sirop d'orties grièche	20
Excipient	67 50

Indications. — Epistaxis, Hématémèse, Hémoptysies, Métrorragies.

Toutes hémorragies (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

Avantage. — La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est complètement masquée par l'excipient spécial.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à café toutes les heures.

Prix : 16 fr. 60.

Durée : 10 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 34-68.)

HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE

Traitement des troubles du Métabolisme calcique
et des Avitaminoses D.

Composition. Vitamine D cristallisée (dosée à 40 millions d'unités standard internationales au gramme), Hémoglobine, sels de chaux, de fer, de manganèse, de fluor.

Soumise à un triple contrôle : chimique, spectrophotométrique et physiologique, l'HEMOSTERINE IRRADIÉE donne toute garantie au point de vue de l'activité de son irradiation et de sa conservation (pratiquement illimitée). Innocuité absolue.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant facteur de reconstitution du taux du calcium et du phosphore sanguin ; recalcifant osseux, antirachitique, fortifiant, reconstituant globulaire, antianémique.

Indications. Rachitisme infantile, ostéomalacie, fractures, tétanie, caries dentaires, retard de la dentition, décalcification (grossesse, allaitement, tuberculose et pré-tuberculose).

Trois formes : Granulés. — Ampoules buvables de 5 cc. (boîtes de 8, 16, 32 ampoules). — Sirop.

Posologie et mode d'emploi. — *Enfants :* Au-dessous d'un an : une demi-cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 1 à 3 ans : une cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 3 à 8 ans : deux cuillerées à café, soit en nature, soit délayées.

De 8 à 12 ans : trois cuillerées à café par jour ou une ampoule sans alcool. Pour le sirop même doses que le granulé.

Adultes : Deux cuillerées à soupe par jour, de préférence au moment des repas ou deux ampoules.

Laboratoire A. DEFFARGE

Docteur en pharmacie.

188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. : 91-609.)

HÉMOSTRA « ROCHE »

Composition. — Solution de tryptophane et d'histidine. Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves (Fontès et Thivolle).

Propriétés. — Apporte directement à l'organisme en proportions rationnellement dosées les principes actifs du foie sans provoquer de dégoût, détermine l'élévation immédiate du taux de l'hémoglobine et du nombre des globules rouges.

Indications. — Toutes les Anémies graves, biernériennes, leucémiques, néoplasiques, tous les états de Déficience organique, Convalescences difficiles, Inappétence, Maladies consomptives, Ulcères, Angine de poitrine, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Voie intramusculaire ou sous-cutanée :* 1 ampoule de 5 cc. ou de 2,5 cc. suivant les cas tous les jours.

Voie intradermique : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours pendant 21 jours.

Ampoules 5 cc., 2 cc. 5, 1 cc. : boîtes de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-13.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

HÉMOSTYL

Composition. — Sérum frais de cheval recueilli sur l'animal en pleine crise de régénération sanguine.

Indications. — Tonique polyhormonal, Hémopoïétique, Hémostatique.

Formes :

- 1° Boîte de 10 flacons-ampoules de 6 cc.
- 2° Coffret de 30 flacons-ampoules de 6 cc.
- 3° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc.
- 4° Coffret de 18 flacons-ampoules de 10 cc.
- 5° Sirop, flacon de 300 gr.

Posologie. — *Anémie* : 1 à 2 ampoules par jour en ingestion ou lavement, ou 2 à 3 cuillerées à potage de sirop. — *Enfant* : demi-dose.

Hémorragies : ingestion ou lavement de 3 ampoules ; application locale.

Hémorragies graves : injection sous-cutanée de 30 cc.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : La boîte : 23 francs

Le coffret : 63 francs

Le flacon de sirop : 23 francs.

Remboursement aux Assurés Sociaux { Ampoules. Catégorie A.
Sirop. — B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL,

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

HÉMOTAL

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

Indications. — Spécifique des maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, tuberculose, surmenage, débilité générale, croissance.

Posologie. — *Adultes.* — Laisser fondre dans la bouche 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

Enfants : 1 cuillerée par repas.

Prix : 15 francs.

Forme Elixir : 17 francs.

<i>Elixir.</i>		<i>Granulés.</i>	
Arrhénal.....	0,07	Hémoglobine cristallisée..	5 gr.
Acide nucléinique	0,20	Glycérophosphate de	
		chaux	5,00
Hémoglobine	5,—	Poudre orchitique.....	0,50
Glycérophosphate de chaux.	5,—	Thyroidine poudre.....	0,20
Suc orchitique	2,—	Méthylarsinate disodique.	0,20
Fluorure de sodium	0,01	Fluorure de sodium.....	0,10
Alcool à 90°.....	20,—	Pour.....	100 gr.
Suc thyroïdien	2,—		
Glycérine	10,—		
Excipient aromatique. Q. S.			
pour.....	100 gr.		

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X°).

HÉMOVÉINE

Comprimés.

Composition. — 1° Extraits secs de Marron d'Inde, d'Hamamélis, de Viburnum, de Cupressus. 2° Poudres d'organe à sécrétion interne : ovaire, thyroïde, hypophyse, surrénale.

Action. — Pharmaco-dynamique multiple : Vasoconstriction et diminution progressive du calibre de la veine, disparition du spasme vasculaire et de la douleur consécutive, sédation utérine, régulation des règles, réapparition rapide du potentiel d'énergie tout en empêchant l'hypertension.

Fait merveille dans tous les cas de stase veineuse.

Indications. — Maladies veineuses en général : Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la fonction ovarienne : Disménorrhée, Métrorragie, Troubles de la Ménopause, Troubles de la circulation générale.

Mode d'emploi. — 6 dragées par jour à raison de 2 avant chacun des trois repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires **BRICHARD** et fils
BAR-LE-DUC (Meuse).

HÉMYPNAL

CIBA

Trichloro-butyl-alcool.

Diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone..

Diallylmalonylurée, Ethyl-morphine.

ANALGÉSIQUE PELVIEN.

Très peu toxique, utilisable pour toutes les douleurs du pelvis.

Suppositoires.

Obstétrique. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine).

Gynécologie. — Dilatations, curetages, pansements douloureux, crises dysménorrhéiques.

Urologie. — Explorations sur le rein, la prostate, l'urètre, la vessie, béniqués, etc.

Chirurgie. — Remplace la morphine après les interventions.

Doses : 1 à 4 suppositoires par 24 heures.

Boîte de 3 suppositoires.

Laboratoires **CIBA** — **O. ROLLAND**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

HÉPACRINE

Du D^r Debat.

Extrait désalbuminé et délipoidé de foie.

Deux formes : buvable et injectable.

Indications. — Les anémies graves, les hémorragies, les anémies post-opératoires, les anémies des paludéens, les insuffisances hépatiques.

La forme injectable est appliquée, de préférence, dans les cas d'intolérance gastrique et d'hépto-résistance ou ceux très graves, exigeant une action immédiate.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 amp. buvables ou 1 à 2 injectables par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules de 3 cc. par jour, ou une ampoule injectable.

Présentation :

Boîte de 6 amp. de 12 cc. (1 amp. = 100 gr. d'organe)	24 fr. 95.
Boîte de 18 amp. de 12 cc	66 fr. 55.
— 12 — de 3 cc. (1 amp. = 25 gr. d'organe).	16 fr. 65.
— 10 — injectables de 2 cc (1 amp. = 10 gr. d'organe; activité de 300 gr. de foie <i>per os</i>).	33 fr. 30.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

HÉPADRAINASE

Médicament réalisant un drainage puissant des voies biliaires.

Composition :

- I. Sulfate de Magnésie pur anhydre.
- II. Peptones d'œuf, de viande, de poissons.
- III. Cholate de Soude.

Indications. — Toutes affections atoniques des voies biliaires et en particulier :

Cholécystite, Cholécystatonie, Congestion hépatique, Insuffisance hépatique.

Mode d'emploi :

Adultes : le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau 1 à 3 cuillerées à café d'Hépadrainase.

Enfants : à partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café.

Prix : 19 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N^o 1059-2.

Laboratoires du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44.)

HÉPAFLORINE

(Dragées vertes hépato-néphrotropes.)

Priorité. — La barbiflore (orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale, Cynara scolymus et extrait total hépatique.

Propriétés. — Diurétique hépatotonique, décholestérinisant, antilithiasique et protéolytique assurant une normalisation progressive des métabolismes déviés et une parfaite épuration de l'organisme.

Indications. — Toutes affections hépatiques ou hépatorénales et les syndromes associés. Cirrhoses, Œdèmes et Ascite, Azotémie, Uricémie, Chlorurémie, Cholestérinémie en excès, Athérome, Hypertension, Lithiases, Arthritisme, Suites d'infections aiguës, Maladies coloniales, etc.

Posologie. — 3 à 9 dragées aux repas, en moyenne 6 par jour.

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

**PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »
MONTE-CARLO**

« La Barbiflore en thérapeutique. »

HÉPAFLUOL

Composition. — Peptone préparée par Witte, sulfate de soude et de magnésie, poudre de réglisse.

Propriétés. — Cholagogue, eupeptique, laxatif, stomachique, désensibilisation.

Indications. — Insuffisances hépatiques, constipation, dermatoses, eczémas, urticaire, asthme, hypertension, gastralgies.

Forme. — Poudre.

Doses. — Comme Cholagogue : une à trois cuillérées à café le matin à jeun.

Comme Désensibilisateur : une demi-cuillerée à café avant les deux principaux repas.

Prix : 16 fr. 65. Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

(Tél. : 60-55.)

HÉPAGLYCÉROL CARRION

Extrait de foie très concentré (méthode de Whipple).

Composition. — Extrait concentré de foie frais additionné de son volume de glycérine.

Forme. — Ampoules de 10 cc. correspondant chacune à 125 grammes de foie frais.

Indications. — Anémie pernicieuse.

Posologie et mode d'emploi. — Par *voie buccale* seulement, 1 à 3 ampoules par jour diluées au gré du malade, dans une boisson quelconque ou dans un aliment en purée.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules de 10 cc. : 67 fr. 60.

La boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 38 fr. 50.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HEPAGYL

Composition. — Extrait de foie frais stabilisé. Chaque ampoule de 10 cc. correspond à 100 gr. de foie frais.

Indications. — Anémies graves, Anémies secondaires consécutives au Paludisme, à la Tuberculose et aux Maladies infectieuses, Insuffisances hépatiques.

Forme. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour.

Enfants : 1 ampoule par jour.

A prendre exclusivement par voie buccale dans un peu d'eau froide, avant les repas.

Prix : 23 francs.

Remboursement aux Assurés Sociaux :
Catégorie B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

HÉPALOMEL VÉDÉ

Affections hépatiques.

1° *Comprimés verts* stimulants des fonctions biliaires (Extrait mou *total* d'artichaut, extrait d'iris versicolor, extrait de combrétum, extrait de boldo).

2° *Comprimés jaunes* complémentaires, antiseptie et action crypto-toxique.

(Palmitate de soude, bile de bœuf dépigmentée et desséchée, calomel.)

Les 12 premiers jours : 3 comprimés verts par jour.

Les 6 derniers jours : 2 comprimés jaunes par jour.

Prix de la boîte : 23 fr. 55 pour un traitement de 18 jours.

Admis aux assurances sociales.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX°).

(Tél. : Roquette 97-46 et 97-47.)

HÉPAMINE MAUCHANT

Ampoules buvables et sirop.

Composition. — Extrait de foie frais associé au tryptophane et à l'histidine, sous forme d'ampoules buvables et de sirop.

Mode d'action. — L'HÉPAMINE MAUCHANT réunit dans une même préparation l'action hémopoïétique de l'extrait de foie à l'action régénératrice des hématies de l'histidine et du tryptophane.

Avantages. — Procédé de fabrication absolument nouveau (congélation fractionnée à très basse température). Conservation intégrale des propriétés curatives.

Indications. — Anémie grave, anémie secondaire accompagnant diverses affections, insuffisance hépatique.

Posologie :

Adultes : ampoules 1 à 3 par jour Sirop. 2 à 6 cuillerées.

Enfants : ampoule 1 — — Sirop 1 à 3 cuil. à soupe.

Prix : { la boîte de 6 ampoules de 15 cc.
21 fr. 35 { le flacon de sirop de 300 gr.

Laboratoire MAUCHANT

J. EURY, Docteur en Pharmacie
GENNEVILLIERS (Seine).

HÉPAMULT

Extrait du Foie.

Réalisation pratique des méthodes de Whipple et de Castle sous une forme nouvelle, solide (granulé dragéifié) qui permet un emploi facile et un prix de revient moindre. 20 grammes d'Hépamult équivalent très sensiblement quant à leur action antianémique à 500 gr. de foie frais. C'est donc la dose quotidienne d'un traitement très énergique, permettant cependant aux fonctions digestives des malades de s'accommoder simultanément de la ration alimentaire que le médecin peut, d'autre part, juger utile.

Doses. — 10 ou 20 gr. par jour (2 ou 4 cuillères-mesure incluse dans la boîte).

Emploi. — Au milieu ou à la fin d'un ou des repas. Ne pas mâcher (amertume). Avaler soit avec une gorgée de liquide, soit mélangé à un peu de potage, purée, confiture, etc...

Prix : 21 francs la boîte pour 5 à 10 jours.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-00.)

HÉPANÈME CARRION

Médication des anémies en général.

Composition. — Association d'extrait concentré de foie, de protoxalate de fer et de phosphate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour, aux repas.

Présentation et prix. — Le flacon de 50 comprimés : 22 fr. 90.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HÉPANOVA

Extrait sec hydrosoluble désalbuminé de foie de veau et de rate.

Traitement des diverses anémies.

Troubles de croissance, Rachitisme, Neurasthénie, Convalescence, Suites d'opérations et de gripes.

10 ampoules buvables de 5 cc. Prix : 36 fr.

Chaque ampoule correspond à :

50 grammes de Foie de Veau.

0 gr. 30 de Rate fraîche.

Mode d'emploi. — Une ampoule avant chaque repas à prendre dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire BIOSEDRA

E. ESTRADER, Docteur en pharmacie.

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23.)

HÉPAPHOS

Reconstituant général.

Composition et forme. — Granulé fondant à base de : Extrait de Foie, Protoxalate de fer, Phosphore végétal, Vitamines.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant âge et indications du médecin.

Indications thérapeutiques. — Anémies légères, Convalescences, Troubles de croissance, Surmenage, Déminéralisation.

Aucune contre-indication.

Prix : 21 fr. 30 (traitement d'une semaine).

Si Anémies graves, prescrire HÉPATROL.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73 et 74.)

HÉPARÉGULINE WANDER

Régulateur des fonctions hépatiques, stimule le foie, draine la bile.

Composition. — Sulfate de magnésie desséché, citrate trisodique, peptones polyvalentes purifiées, extrait d'artichaut désalbuminé, extrait de boldo. Sucre aromatisé.

Forme — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Cholérétique. — Stimule la cellule hépatique, active la sécrétion biliaire, réveille les fonctions glyco-génique, antitoxique, uropoïétique du foie.
Cholagogue. — Provoque l'excrétion biliaire, draine les voies intestinales.

Indications thérapeutiques. — Affections hépato-biliaires. —

Congestion du foie et de la vésicule biliaire, insuffisance hépatique, cholémie, lithiase biliaire, cholécystites médicales, ictères.

Affections intestinales. — Nausées, constipation, entéro-colite.

Troubles généraux. — Céphalées, migraines, vertiges, urticaire, maladies des pays chauds.

Mode d'emploi. — Le matin à jeun, 20 minutes avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau tiède.

Dose curative (10 à 15 jours) : 2 à 4 cuillerées à café.

Dose d'entretien (2 à 3 mois) : 1 à 2 cuillerées à café pendant 3 à 4 jours, puis repos 2 à 3 jours, ensuite reprendre la cure.

Enfants (au-dessus de 3 ans) : 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

P. BASTIEN, Pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine). — (Téléphone : Tremblay 09-78, 09-79.)

HÉPARTICHAUT INFANTILE

Granulé.

Extrait mou d'artichaut	2 gr.
Poudre de foie	2 gr.
Citrate de soude	5 gr.
Citrate d'hexaméthylène-tétramine	0 gr. 50
Manne	5 gr.
Excipient Q. S. pour	100 gr.

De 1/2 cuillerée à café à 3 cuillerées à soupe par jour (de 3 mois à 15 ans), avant les repas.

HÉPARTICHAUT ADULTES

Dragées.

Extrait sec d'artichaut	0 gr. 05
Poudre de foie	0 gr. 10
Bile	0 gr. 05

De 1 à 6 dragées par jour avant les repas. par dragée

Indications. — Toutes les insuffisances hépatiques, Ictères, Cholémies familiales, Disfonctionnement hépatique consécutif aux maladies infectieuses et aux intoxications, Constipation d'origine hépatique et ses conséquences : Migraines, Dermatoses, etc...

Prix : 18 fr. 75 la boîte de 50 dragées ou de 100 gr. de granulé.

Laboratoire R. COUDERT

Ex-interne des Hôpitaux de Paris et des Asiles de la Seine,
19, avenue Payret-Dortail, PLESSIS-ROBINSON (Seine).

(Tél. : Sceaux 1306.)

HÉPASEL

Rééducateur de l'intestin, aucune accoutumance.

Forme. — Poudre dans un tube, goût agréable.

Composition. — Sulfate de Na, 5 gr., Bicarbonate de Na 3 gr., Phosphate de Na 2 gr., Citrate de Na 1 gr., Extraits d'artichaut, de muqueuse intestinale, excipient q. s. pour un tube.

Indications. — Constipation; insuffisance hépatique; lithiase biliaire; toutes infections intestinales; dyspepsie; migraines; rhumatismes; obésité; dermatoses: acné, eczéma; anaphylaxies, etc.

Posologie. — Tous les 2 jours le matin à jeun, le contenu d'un tube à dissoudre dans un demi-verre d'eau tiède sucrée ou non.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LORMEAU

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

HÉPASMAN

Extrait de foie frais préparé selon la méthode de Whipple associé au phosphore et à l'arsenic.

Asthénies. Dépressions. Etats ganglionnaires.

Boîte de 10 ampoules buvables.

Adultes: 2 ampoules par jour 1/4 d'heure avant les repas dans un peu d'eau sucrée.

Enfants: A partir de 1 an, 1 ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée à boire en 2 fois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1750-1.

Laboratoires BIOPHARMAX

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.).

HÉPATHÉMO DESCHIENS

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.

Méthode de Whipple. Technique de Minot et Murphy.

Indications. — Syndromes anémiques, Anémies pernicieuses. Asthénies. Insuffisance hépatique.

Formes thérapeutiques. — Ampoules buvables non injectables, Sirop.

Présentation. — *Ampoules*: 1 ampoule de 10 cc. correspond à 125 gr. de foie de veau frais. 1 ampoule de 3 cc. correspond à 38 gr. de foie de veau frais.

Prix. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 37 fr. 50.

Coffret de 18 ampoules : 100 fr.

Boîte de 10 ampoules de 3 cc. : 30 fr.

Sirop: 1 cuillerée à soupe correspond à 24 gr. de foie de veau frais.

Prix du flacon de sirop de 275 cc. 32 fr.

En raison de sa concentration élevée l'**HÉPATHÉMO DESCHIENS** constitue une médication relativement peu onéreuse.

Posologie. — *Adultes*: Anémies graves : 3 ampoules de 10 cc. par jour. Anémies moyennes : 1 à 2 ampoules de 10 cc. par jour ou 2 à 4 cuillerées à soupe de Sirop. Anémies légères : 1 ampoule par jour ou 1 à 2 cuillerées à soupe de Sirop. Insuffisance hépatique : 1 à 3 amp. de 3 cc.

Enfants: Sirop de préférence ou 2 à 3 ampoules de 3 cc. par jour.

Mode d'emploi. — Les ampoules ou le sirop seront absorbés dans un liquide non alcoolique tiède, de préférence à la fin des deux principaux repas.

Laboratoires DESCHIENS

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Élysées 40-26.)

HÉPATICALCION GRÉMY

Composition. — Chlorure de calcium associé à l'extrait de foie de veau frais, assurant ainsi la production de fibrinogène nécessaire à la coagulation sanguine et la compensation des troubles d'origine vasculaire de la crase sanguine.

Deux préparations en une seule.

Indications. — Prophylaxie opératoire. Hémostase pré et post-opératoire. Hémorragies capillaires, soit post-opératoires, soit médicales, relevant d'un vice de coagulation. Tonification de l'organisme après le choc opératoire. Diurétique. Recalcifiant.

Forme et posologie. — Gouttes.

Enfants jusqu'à 2 ans. V gouttes.

— 9 ans XXV —

Au-dessus de 9 ans et adultes. L —

3 fois par jour.

Prix : le flacon, 18 francs.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

HÉPATIC-EFA DU D^r LECACHEUX

Ampoules buvables et cachets combinés.

SYNERGIE VÉGÉTALE ATOXIQUE

Utilisant les propriétés pharmacodynamiques remarquables d'un élément thérapeutique nouveau :

LA CHÉLIDOÏNE

Action Cholérétique intense, triple de celle de l'artichaut. Action cholécysto-sédative élective par abaissement du tonus vésiculaire. (Cf. prof. Loeper, A. Lemaire, H. Dany : « La méthode stlagmométrique dans l'étude de certains cholérétiques », *Progrès médical*, n° 34, 1932.)

Composition. — Extraits spéciaux de plantes fraîches stabilisées : Eclaire (ou Chélidoïne), Fenouil, Artichaut (Efa).

Propriétés. — Active directement la sécrétion hépatique. Apaise électivement le spasme vésiculaire. Facilite, par ces deux actions conjuguées, le drainage médical de la vésicule. Sédatif profond et régulateur physiologique atoxique.

Indications. — Stase, Rétention, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique constitutionnelle ou acquise et toutes ses manifestations secondaires, spécialement : Migraines, Eczéma.

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 12 ampoules buvables et 12 cachets. 36 fr. 40

Boîte d'essai, 6 ampoules buv. et 6 cachets.. 20 fr. 30

Posologie. — 1 cachet au réveil avec 1/2 verre d'eau (Vichy Grande-Grille de préférence).

1/4 d'heure après prendre le contenu d'une ampoule dans un peu d'eau.

Tolérance absolue.

Laboratoire HÉPATIC EFA du D^r LECACHEUX

Docteur en médecine, licencié ès sciences.

R. BERTHELOT, Pharmacien

16, 18, rue du Château — CARENTAN (Manche).

HÉPATICOL

Granulés fondants.

Composition :

Extrait mou de romarin	1 gr.
— de sauge	0 gr. 50
— de mélisse	0 gr. 50
— de boldo.....	1 gr.
— de Combretum	1 gr.
— de Podophyllum	0 gr. 05
Sulfate de Magnésie	28 gr.
Salicylate de soude	1 gr. 50
Urotropine.....	0 gr. 70
Peptone de fibrine	1 gr. 00
— de gélatine.....	1 gr.
— de viande	1 gr.
Sucre aromatisé	q.s. pr. 100 gr.

Indications. — Excitation de la cellule hépatique. Drainage médical des voies biliaires. Antisepsie hépatique rénale et intestinale. Anaphylactique.

Posologie. — 2 cuillerées à café (ou 10 gr.) le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède. 1 cuillerée à café pour les enfants à partir de 5 ans.

Prix : 19 fr. 25.

Laboratoires Olivéol et Hépaticol ÉTIEVANT

ED. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe,

TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône).

(Tél. : 140-38.)

HÉPATISMINE

Suppléance et stimulation de toutes les fonctions du foie par synergie physiologique.

Composition. — Extraits : biliaire, 0,10 ; hépatique, 0,01 ; pancréatique, 0,01 ; duodénal, 0,01 ; boldo, 0,005, évonimine, 0,005 ; podophylline, 0,005 ; oléate de soude, 0,05 ; urotropine, 0,05, en comprimés glutinisés dragéifiés.

Cholagogue, excitant des fonctions hépatique, vésiculaire, pancréatique et intestinale. Antisepsie biliaire et urinaire. Prophylaxie des maladies dites par ralentissement de la nutrition.

Indications. — Hépatisme, cholémies familiales, insuffisances hépatique et biliaire, constipation, goutte, arthritisme, dermatoses, asthme uricémique, glycosurie, pléthore abdominale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés à chaque repas.

Prix : 17 fr. 50 le flacon de 40 comprimés.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

HÉPATOCARNINE LEFRANCO

Synergie hépatocarnée.

Composition. — Association de la méthode de Whipple et de la Zomothérapie. (Extrait de Foie de Veau Frais et $\frac{1}{2}$ Suc Musculaire de bœuf cru, à haute concentration.) Action synergique des principes musculaires et hépatiques.

Propriétés. — Antianémique par le foie de veau frais, reconstituant général par le suc musculaire cru.

Indications. — Toutes les anémies, pernicieuses, primitives ou secondaires, médicales ou chirurgicales, anémie infantile, lymphadénie, anémie rachitique, anémie des tuberculeux, toutes déficiences permanentes ou transitoires de l'organisme.

Présentation. — Coffret de 20 ampoules buvables de 10 cc. Boîte de 10 ampoules de 10 cc. Présentation spéciale pour enfants.

Posologie. — 2 à 3 ampoules par jour avant les repas dans $\frac{1}{2}$ verre d'eau froide, naturelle ou gazeuse.

- a. *Traitement d'attaque* : 3 ampoules par jour pendant 15 jours.
- b. *Traitement d'intensité moyenne* : 2 ampoules par jour pendant 10 jours. A renouveler après 10 jours d'interruption.
- c. *Traitement d'entretien* : 3 fois par semaine pendant 1 mois, 2 ampoules par jour.

Remarque. — L'Hépatocarnine peut être employée chez le nourrisson en la mélangeant au lait du biberon (au-dessous de 40°), à la dose de 1 à 2 ampoules.

Remboursable aux ASSURANCES SOCIALES

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, av. de Metz. - ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

HÉPATODIAGNOSE

Composition. — Galactose chimiquement pur.

Propriétés et indications :

Ce produit est utilisé pour l'exploration fonctionnelle du foie par la galactosurie provoquée (méthode de Bauer mise au point par divers auteurs français).

Posologie. — Technique du procédé et de l'analyse sur demande.

Prix :

La dose de 40 grammes : 20 fr. 80.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

HÉPATODIASÉ

Composition :

Opothérapie gastro-intestinale associée aux ferments. En comprimés dragéifiés à base de diastase, pepsine, duodénium, orchitine, chlorure de magnésium, bromure de calcium et noix vomique.

Indications :

Traitement rationnel de toutes les affections du tube digestif. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, aérophagie. Décongestif du foie.

Posologie :

Avaler sans croquer deux comprimés après chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

HÉPATOFORMINE

Intoxications Gastro-Intestinales, hépatiques et biliaires.

Présentation. — Granulé fondant sucré, aromatisé. Comprimé dragéifié, non sucré 60).

Composition. — Charbon animal décyanuré, Charbon végétal suractivé, Benzonaphtol traces, Hexaméthylène-tétramine.

Propriétés. — Stimulant énergique de l'activité hépatique et rénale. Antiseptique puissant des voies biliaires urinaires et intestinales. Pouvoir adsorbant et absorbant, l'un et l'autre considérables réalisant le pansement Gastro-Intestinal.

Active le foie (Cholérétique), Draine la bile (Cholagogue), Augmente la Diurèse (Diurétique).

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire, fermentations gastro-intestinales, Aérophagie, Aérocolie, Dilatation d'estomac, Pyélonéphrite des femmes enceintes, Obésité, Ptoses abdominales, Flatulences, Appendicite chronique, Cholécystite, Colibacillose, Dermatoses, Entérites, Auto-intoxications, Empoisonnements, Urticaire, Dyspepsies, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuill. après les repas ; 1 à 3 drag. après les repas, A croquer ou à avaler dans une infusion chaude. — *Enfants*: 1/2 dose.

Durée du traitement 1 flacon : 15 à 20 jours.

Laboratoires Alphonse CHARMAISON

Médailles d'Or et de Bronze.

26, av. de Royat — Chamalières-lès-CLERMONT-FERRAND. Tél. 7.

HÉPATOGENINE

Composition. — Extraits d'artichaut, boldo, bourdaine, noyer.

Présentation. — Pilules (60 par étui).

Indications thérapeutiques. — Traitement des affections hépato-biliaires et des constipations, Migraines, Dermatoses, Troubles digestifs d'origine hépatique, Ictères.

Mode d'emploi. — 3 à 6 pilules par jour.

Laboratoires BOIVERT

MONTGUYON (Charente-Inférieure).

HÉPATOglobine

Composition. — Extrait spécial de foie frais hypophysé.

Chaque ampoule correspond à 100 gr. de foie frais endolysé au sérum de cheval, renforcé par l'addition de :

Hémoglobine	0,30
Extrait d'hypophyse totale	0,05

Forme. — Ampoules buvables de goût agréable.

Indications. — Anémies, Tuberculose, Surmenage, Convalescences.

Doses. — Une à deux ampoules par jour.

Prix : 23 francs la boîte de six ampoules.

Durée de la boîte : 3 à 6 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 1003-8.

Laboratoires CH. VERGELOT

6, rue de Navarin — PARIS.

(Tél. : Trudaine 10-88.)

HÉPATOMAGNÉSION

Toutes affections biliaires, hépatiques et digestives.

Peptone sèche de viande..	4,00	Extrait mou de Boldo.....	0,10
— — de gélatine..	2,00	— — de camomille.	0,10
— — de witte....	3,00	— — de condurango	0,10
Sulfate de magnésie	20,00	— — de maté.....	0,10
Hyposulfite de magnésium.	7,00	— — de noyer.....	0,10

Excipient sucré aromatisé q. s. pour 100 gr.

Indications. — Maladies du foie et des voies biliaires. Congestion hépatique et de la vésicule, lithiase biliaire, ictere, cholécystite chronique, troubles divers d'origine hépatobiliaire, inappétence, nausées, constipation, urticaire, prurit, certaines dermatoses.

Forme. — *Granulé* et *Comprimés* dragéifiés.

La composition des comprimés d'Hépatomagnésion est semblable à celle de l'Hépatomagnésion « Granulé ». La dose de 4 comprimés correspond exactement à une cuillerée à café de granulé.

Posologie. — *Granulé.* — *Adultes* : le matin, à jeun, dans un demi-verre d'eau légèrement chaude ; 1 à 2 cuillerées à café suivant les indications du médecin.

Enfants : Un quart à une cuillerée à café selon l'âge.

Comprimés. — De 2 à 8 dragées par jour selon les indications du médecin, le matin à jeun, ou une heure avant les repas, de préférence avec un demi-verre d'eau.

Prix : 18 fr. 20, taxe comprise.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion.

A. Chatain, Dr en ph^{ie}, Ex-Int. en ph^{ie} des Hôp. de Lyon,
Diplômé de Bactériologie.

Dépôt général : 57, rue Pierre-Corneille — LYON.

(Tél. : Lalande 41-81.)

HÉPATONIA

Présentation. — En tubes de verre scellés de 10 cc., 7 cc., 5 cc. pour adultes.

En tubes de verre scellés de 2 cc. pour enfants.

Principes actifs. — Extrait de foie de veau, Extrait de rate de veau fraîche, Extrait muqueuse gastrique de porc, extrait de glandes surrénales fraîches, Autolysat épuré de levure de bière, Nucléinate de soude.

Indications. — Anémies de toutes origines (Méthode de Whipple) ; Dyspepsies à régime carencé (féculents, pâtes), Neurasthénie, Asthénies de toute origine et particulièrement dans la convalescence des fièvres graves (typhoïde, typhus, rhumatisme articulaire aigu, dysphé-rie, grippe).

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 tubes de 10 cc., 2 à 3 de 7 cc., 2 à 4 de 5 cc. par jour, au début des repas, dans un peu de vin de liqueur, dans le potage, ou suivant les indications du médecin traitant.

Enfants : 1 à 3 tubes de 2 cc. suivant l'âge.

Se fait également sous forme de Granulés.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

HÉPATOPLASMINÉ

Ampoules buvables reconstituantes.

Méthode de Whipple et Castle.

Composition. — Extrait de foie de veau. Antre pylorique. Sérum hémopoïétique.

Formes. — *Adultes* : ampoules buvables de 10 cc. ;

Enfants : ampoules buvables de 3 cc.

Indications. — Anémie sous toutes ses formes ; Déficiences globulaires ; Hémorragies ; Lymphatisme ; Convalescences ; Suites opératoires, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 10 cc. par jour, dans un peu d'eau un quart d'heure avant les repas. *Enfants* : 5 à 10 ans : 1 à 2 ampoules par jour ; au-dessous : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Traitement : 10 jours.

Laboratoire OPOTHERAPIQUE R. FRAYSSE

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Nanterre 12-88).

HÉPATOSODINE

Médication alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'hexaméthylène tétramine. Syndrome hépato-entéro-rénal.

Action. — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

Indications. — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes, Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

Doses. — *Avant une opération* : Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les 10 jours qui précèdent l'intervention.

Troubles gastriques : une cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède à jeun le matin et le soir à 18 heures.

Troubles hépatiques : Une cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.

Constipation : 1 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Prix :

Le flacon : 16 fr. 65.

La boîte triple dose : 37 fr. 45.

**Société Industrielle de thérapeutique scientifique appliquée,
Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

HÉPATOSTIMULINE MANOR

Présentation et composition. — Dragées glutinisées de Salicylate de soude, Urotropine extra recristallisée et Hyposulfite de Magnésie.

Indications. — Cette médication est désinfectante du Foie, des Reins, de la Vessie et de l'Intestin ; anti-anaphylactique et stimulante des sécrétions du Foie, du Pancréas et de l'Intestin. Elle s'applique donc aux Cholécystites chroniques et subaiguës, Ictères, Migraines, Toxémies intestinales, Insuffisance hépatique et toutes ses manifestations, Urticaire, Eczéma, et toutes dermatoses rebelles, Vertiges, Diarrhées post-prandiales, Constipation par insuffisance biliaire, Dyspepsie, Fermentations, Anorexie, etc...

Dose. — 4 à 6 dragées vers 10 heures et autant vers 17 heures.

Remarque : l'effet de ce médicament est d'autant plus grand qu'on aura fait prendre en même temps le matin à jeun 4 à 6 dragées de « Chronicystine Manor », pour fluidifier et drainer la bile. (Voir ce mot).

Prix : le grand flacon pour une cure : 30 fr. (100 dragées).

Laboratoires MANOR

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (Saône-et-Loire).

Tél. : 35.

HÉPATOXANE

1° COMPRIMÉS

Composition. — Curcuma xanthorriza 0 gr. 20 par unité.

Actions pharmacodynamiques. — Cholérétique puissant, cholagogue non brutal, antispasmodique et antiseptique des voies biliaires, décholestérinant.

Indications. — *a.* Lithiase biliaire, Cholécystites et Péri-cholécystites, Angiocholites, Coliques hépatiques et vésiculaires, Ictères, Maladies tropicales du foie, Cellulite et Cholestérolémie.

Insuffisances hépatiques : Congestions, Stases intestinales, Cirrhoses, Urticaires, Migraines, etc.

Avantages. — 1° Activité nette sans porter atteinte à l'intégrité de la cellule hépatique ;

2° absence de toute toxicité ;

3° pas d'accoutumance.

Posologie. — *Dans les crises aiguës :* 1 à 2 comprimés toutes les 3 heures,

Dans les troubles hépato-biliaires : 1 à 3 comprimés le soir.

2° GRANULÉ

Composition. — Curcuma xanthorriza, hyposulfite de magnésium, citrate de Na et complexe opothérapique à doses très faibles.

Actions pharmacodynamiques. — Comme pour les comprimés en plus : désensibilisant énergique et neutralisant gastrique.

Indications. — Comme pour les comprimés ; en plus. Anaphylaxies (Urticaire, Eczéma, Œdème de Quincke) et Affections gastriques.

Posologie. — *Dans les crises aiguës :* 1 à 2 cuillerées à café toutes les 3 heures.

Dans les troubles hépatiques et digestifs : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun.

Dans les anaphylaxies : 1 à 2 cuillerées à café avant les 2 principaux repas.

Enfants : 1/2 dose.

N. B. — Suivre le traitement 10 jours sur 15 au début, puis 10 jours par mois.

Laboratoires d'ACTITHÉRAPIE

Blaise FROSSARD, Pharmacien

81-83, rue de Lille — ROUBAIX.

HÉPATROL BUvable

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.
Méthode de Whipple.

Sans contre-indication. *Adultes et enfants.*

Indications. — Toutes anémies, asthénies.
insuffisances hépatiques.

Formes thérapeutiques. — Ampoules bu-
vables non injectables.

Présentation. — *Ampoules de 10 cc. =*
125 gr. de foie de veau frais.

Boîtes de 6 ampoules : 48 francs.

Coffret de 18 ampoules : 128 francs.

Ampoules de 5 cc. — 1 ampoule = 62 gr. 50
de foie de veau frais.

Boîte de 8 ampoules : 32 francs.

Ampoules de 2 cc. — 1 ampoule = 25 gr. de
foie de veau frais.

Boîte de 12 ampoules : 26 fr. 50.

(En raison de son activité incomparable
l'HÉPATROL est le meilleur marché de
tous les extraits de foie).

Posologie. — *Anémies graves* : Ampoules de
10 cc. associées ou non à l'HÉPATROL
injectable.

Anémies moyennes : Ampoules de 5 cc.

*Anémies légères de l'adulte, insuffisances hépa-
tiques, toutes anémies de l'enfance* : Am-
poules de 2 cc.

Mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour
à prendre dans un liquide quelconque au
début des repas.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau frais entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais.

Indications. — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

Mode d'emploi. — Par voie intramusculaire, injecter chaque jour 1 à 4 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance, puis associer l'HÉPATROL buvable.

En raison de la purification très poussée de l'Hépatrol injectable, ces doses peuvent être très largement dépassées sans crainte d'intolérance.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. — Activité égale à celle de 250 gr. de foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 96 francs.

Boîte de 6 ampoules : 48 francs.

Ampoules de 1 cc. — Activité égale à celle de 125 gr. foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 53 fr. 30.

Boîte de 6 ampoules : 26 fr. 65.

Voir communications :

Société Médicale Hôpitaux, 19 mai 1930 (Aubertin).

Presse Médicale, 20 septembre 1930 (Achard).

Société Dermatologique, janvier 1931 (Pinard).

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

HÉPAVITA

Complexe d'Extraits organothérapeutiques suractivés par synergie et préparés à partir de glandes fraîches.

Indications. — Anémies graves, post-opératoires, post-hémorragiques, pré-tuberculose, Débilité générale, convalescence, chlorose, surmenage, amaigrissement, neurasthénie, troubles de la formation, suites de la tuberculose, du paludisme et des maladies infectieuses, Insuffisance hépatique, Faiblesses.

Action. — Enrichissement du sang en globules rouges et augmentation du taux de l'hémoglobine, rôle antianémique, antihémorragique, antitoxinique.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 10 cc. avant les deux repas dans un demi-verre d'eau pure ou gazeuse, de vin, ou avec une cuillerée de potage ou jus de citron. *Enfants* : 1 ampoule de 5 cc.

2 Présentations. — Ampoules buvables de 10 cc. et 5 cc.

Prix de vente : 20 fr. 30 — Grand coffret de 24 amp. : 64 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 883-12.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

HÉPAX

Liquide.

Composition :

Artichaut extrait mou.....	12 gr.
Polypode ext. fluide.....	10 gr.
Orthosiphon ext. fluide.....	10 gr.
Boldo ext. fluide.....	10 gr.
Combretum ext. fluide.....	10 gr.
Adonis vernalis ext. fluide.....	5 gr.
Peptone polyvalente.....	2 gr.
Chlorure de magnésium.....	1 gr.
Excip. arom.	q. s. p. 100 gr.

Indications : Intoxications et troubles généraux d'origines :

Digestive : anorexie, dyspepsies, constipation.

Hépatique : insuffisance, congestion, ictères.

☐ *Rénale et alimentaire* : insuffisance de diurèse, excès d'urée sanguine.

Dermatoses : prurits, urticaire, anaphylaxie.

Doses. — *Adultes* : De 30 à 50 gouttes, trois fois par jour avant les repas, dans un peu d'eau sucrée, non sucrée ou dans une infusion.

Enfants : Une goutte par année d'âge avant les 3 repas.

Composé d'extraits végétaux sélectionnés, hyperactifs, HEPAX est cholagogue, diurétique, antitoxique.

Laboratoires P. TAVERNIER,

Docteur en Pharmacie

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV^e)

HEPBI

Hépatrol-Bismuth.

Composition. — La première réalisation de l'association bismuth + extrait de foie en solution aqueuse.

1 ampoule 2 cc. = BI 4 centigr. + 30 gr. foie de veau frais.

Propriétés. — Pas d'asthénie bismuthique ni de phénomènes d'intolérance, pas de réaction locale ni d'accumulation, résorption immédiate. Action rapide, évite toute complication rénale. Donne une grande souplesse au traitement, possibilité d'augmenter la fréquence des piqûres et de rapprocher les séries.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Formes. — *Adultes* : Ampoules de 2 cc.

(Boîtes de 12 : 42 fr. 50)

Enfants : Ampoules de 1 cc.

(Boîtes de 12 : 26 fr. 50)

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

HÉPENTÉRYL

Spécifique rationnel des Affections hépatiques et intestinales.

Composition. — Boldine, pilocarpine, podophylline, extrait de belladone, calomel, ipéca, bioxyde de manganèse, hyposulfite magnésie, hypophyse, polypeptones, ext. bile de bœuf.

Présentation. — *Dragées* glutinisées de 0 gr. 40.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 par jour pendant les repas.

Enfants à partir de 6 ans : 2 par jour.

Prix de vente public : 20 francs.

Laboratoires BOUCLY

Grande Place — LOUVROIL (Nord).

(Tél. : 28.)

HEPTYL BOURDOU

TONIQUE VIVANT

Composition :

Glycérophosphate de soude.....	0 gr. 25
Iode Métalloïdique.....	0 gr. 01
Fluorure de sodium.....	0 gr. 01
Chlorure de Manganèse.....	0 gr. 03
Chlorure de Magnésium	0 gr. 03
Matéine (caféine de Maté).....	0 gr. 10
Glucose de raisin.....	8 gr.
Muscat.....	Q. S. pour un verre à madère.

Propriétés. — Stimulant physiologique des diverses fonctions de l'organisme ; tonique du système nerveux et du système circulatoire ; excitant de la nutrition, riche en vitamines B, C et D, l'*Heptyl* favorise l'élimination des déchets et active les sécrétions gastriques et intestinales.

Indications. — Asthénie, Déminéralisation, Anémie. Tous les états où la stimulation des systèmes nerveux, circulatoire, hépatique, urinaire, etc., est nécessaire : convalescence, dyspepsies, obésité, grippe, etc.

Posologie. — Dose avant chaque repas : *Adultes* : 1 verre à madère. *Enfants* : demi-dose.

Prix au public : 18 fr. 80, le flacon de 500 cc.

Admis aux Assurances Sociales.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle
sous le n° 1142-1.

Laboratoires BOURDOU,
FRONTIGNAN (Hérault).
(Tél. : 21.)

HERGENOL

Indications. — Coqueluche, Toux spasmodiques et bacillaires, Asthme.

Composition. — Essences naturelles balsamiques et carbures halogènes, antispasmodiques.

Forme. — Produit volatil, usage externe.

Emploi. — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

Doses. — *Bébés et enfants* : renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

Adultes : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : le flacon stilligoutte : 15 fr. 60.

Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 60-55.)

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antisypilitique, Cholagogue, Antiseptique externe.

Constitution. — Mercure phénol-disulfonate de sodium représente 40 p. 100 de mercure métallique.

Propriétés. — Elimination rapide, sans aucune réaction nocive sur le rein. Son hypotoxité permet à chaque injection intramusculaire d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

Indications et doses.

1° *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée : injections intra-musculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

Boîte d'ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par cc. titrée à 5 centigr. Prix : 16 francs.

b) Par voie stomacale : de 20 à 30 centigr. par jour d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE en dragées.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE. Prix : 8 francs.

2° *Antisepsie.*

a) Chirurgie : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

b) Antisepsie des voies génito-urinaires : Blennorrhagies, injections urétrales, instillations et grands lavages urétraux ou vésicaux, solutions 1 p. 100 et 1 p. 200.

Cystites. Lavages vésicaux, solution à 7 p. 1 000.

Formuler. — Selon le cas :

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

HEXORCÈNE

Hexylrésoroino.

Antiseptique urinaire polyvalent, particulièrement actif contre le colibacille.

Indications. — Infections aiguës et chroniques de l'appareil urinaire : pyélites, pyélonéphrites gravidi-ques, cystites, urétrites, prostatites, infections secondaires de la tuberculose des voies urinaires.

Présentations :

Prix de vente :

Boîtes de 100 capsules..... 58 fr. 50

— 30 capsules..... 23 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — Deux capsules dosées à 0 g. 15, trois fois par jour.

Augmenter progressivement la dose jusqu'à 4 capsules par prise, soit 12 au total.

Poursuivre le traitement au moins 15 jours après l'obtention de la première culture stérile d'urine.

Les capsules doivent être prises à la fin d'un repas.

Société Parisienne d'Expansion chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santalol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogenèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites, Prostatites, Gonococcies, Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites, Diathèse urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS

Prix : (60 globules) 20 francs.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

(Tél. : Gobelins 00-70.)

HIGADOSE

Médication synergique des affections hépatiques, des voies biliaires et rénales.

Composition. — Huile de Harlem pure, Bile dépigmentée et décholestérinée, Oléate de Soude anhydre, chimiquement pur.

Présentation. — Forme capsules (ne se dissociant que dans l'intestin).

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Ictère, Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Cirrhoses atrophiques, Congestion du foie, Coliques néphrétiques, Lithiase rénale, Pyélonéphrites, Cystites, Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.

Posologie. — *Traitement d'entretien* : 2 à 3 capsules par jour.

Traitement des affections aiguës : 6 à 8 capsules par jour.

(Aucune contre-indication. Innocuité absolue.)

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 14-12.)

HIRUDINASE

Association Iode, Citrate de Soude,

Extraits Hirudiniques.

Synergie médicamenteuse active.

Composition et mode d'action. — Iode : décongestif. Citrate de soude : fluidifiant. Extraits hirudiniques : anticoagulants.

Indications. — Tous les troubles circulatoires d'origine :

- 1^o *Veineuse* : varices, varicocèles, oedèmes et ulcères variqueux, hémorroïdes ; Prophylaxie et traitement des phlébites médicales, obstétricales, chirurgicales ;
- 2^o *Sanguine* : hypercoagulabilité sanguine, stases viscérales, congestions passives ;
- 3^o *Endocrinienne* : troubles de la Puberté, de la Ménopause, Aménorrhées, Dysménorrhées, troubles thyroïdiens.

Forme. — Dragées.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour, par prises de 2 dragées au moment des repas.

Prix : 20 fr. 75.

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

Tél. : Dor. 52-12.)

HISTA (HISTAMINE BEYTOUT)

Composition. — HISTA (HISTAMINE BEYTOUT) est la β imidazol-éthylamine, qui provient de la décarboxylation de l'histidine.

L'histamine présente dans l'organisme, en particulier dans le foie, les poumons et le sang, peut apparaître sous l'influence des causes les plus variées. En particulier toute irritation de la peau (rayons ultra-violets, rayons X, bains chauds) fait naître de l'histamine au point d'application.

Histamine et Histidine. — L'histidine qui a pu être utilisée dans le traitement de la douleur n'a pas de pouvoir analgésique *propre*. Il semble actuellement démontré que la valeur analgésique attribuée à l'histidine revient en réalité à l'histamine.

Propriétés. — L'histamine « transmetteur chimique » est surtout remarquable par son *action antalgique importante et constante*. C'est aussi un stimulant de la fibre lisse et un vaso-dilatateur des capillaires et des artérioles.

Réactions histaminiques. — Elles sont de 2 ordres :

1° *Réaction locale*, ou « triade de Lewis », caractérisée par l'apparition au point d'injection des 3 manifestations successives : rougeur locale, aréole rouge de 3 à 7 centimètres, papule urticarienne œdémateuse 2 à 3 minutes après.

2° *Réaction générale* : bouffées de chaleur, congestion du visage, légère céphalée disparaissant au bout de quelques minutes. On peut en éviter l'apparition en faisant coucher le malade pour l'injection et en le laissant allonger 1/4 d'heure après l'injection.

Antagonistes. — L'adrénaline et la tyramine sont des antagonistes de l'histamine.

HISTA INJECTABLE

Présentation et composition. — Ampoules de 1 cc., contenant 0,0005 de bichlorhydrate d'histamine, en solution stable, inaltérable pour injections intradermiques.

Indications. — Rhumatismes chroniques, musculaires et articulaires, Arthralgies, Arthrites.
Névralgies (sciatiques, intercostales, faciales), Névrites.
Myalgies, Lumbago, Torticolis.
Plexalgies, Zonas.

Contre-indications. — Rhumatismes infectieux aigus et poussées évolutives des rhumatismes infectieux.
Déséquilibres tensionnels importants.

Posologie. — 1 cc. par jour en injections intradermiques, *loco dolenti*,

Résultats. — En 3 à 5 jours, sédation des phénomènes douloureux, de la contracture et de l'impotence fonctionnelle.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 19 fr. 20.

La seringue spéciale HISTA : 8 francs.

L'étui de 2 aiguilles spéciales HISTA : 3 fr. 50.

HISTA LINIMENT

Présentation et composition. — Ampoules de 5 cc. pour usage externe, contenant 0,01 de bichlorhydrate d'histamine.

Indications. — Toutes les indications de Hista injectable. Rhumatismes chroniques, arthralgies, névralgies, myalgies, zonas.

Remarque. — *Hista liniment* pour usage externe est aussi actif que *Hista injectable*, cette préparation étant parfois un peu plus rapide dans ses résultats et devant rester de maniement exclusivement médical.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 ampoules par jour en HISTApunctures ou en griffages loco dolenti (ou en frictions).

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules : 26 francs.

HISTA DIMILLI

Composition. — Solution d'HISTA au DixMILLIème, en ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

1 cc. de la solution d'*Hista Dimilli* renferme 0,0001 de bichlorhydrate d'histamine.

Indications. — Traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum. Traitement de la crise ulcéreuse.

Toutes allergies.

Histaminothérapie à doses progressives.

Posologie et mode d'emploi. — Injections sous-cutanées quotidiennes au bras ou à la cuisse, de 1 cc. d'*Hista Dimilli*.

Série de 10 injections.

Observer 8 à 10 jours de repos.

Poursuivre le traitement pendant 2 mois environ.

Résultats. — Le plus habituellement on observe dès la 3^e piqûre une sédation de la douleur, et une disparition de la douleur vers la 8^e injection.

Les autres signes de la crise ulcéreuse disparaissent successivement au cours de la série d'injections d'*Hista Dimilli*.

Prix : 24 francs pour un traitement de 10 jours.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

HISTACLARTYL

La première Histamine indolore sans anesthésique.

Indications. — Spécifique remarquablement efficace du symptôme douleur :

Dose normale. — Rhumatismes, Myalgies, Névralgies, Algies post-traumatiques, Entorses et leurs séquelles, Douleurs zonateuses et post-zonateuses, Prurits, Prurit anal, Prévention des accidents col-lapsus opératoire.

Doses faibles. — Anaphylaxie, Asthme, Urticaire, Œdème de Quincke, Migraine, Crises douloureuses de l'ulcus gastro-duodénal.

Contre-indications. — Poussées évolutives des Rhumatismes infectieux, Hypertension et Hypotension artérielles graves.

Composition. — *Dose normale* : Bichlorhydrate d'histamine : 1/2 mgr. pour 1 cc. Excipient sans anesthésique : Q. S.

Doses faibles : Dixième de mgr. (1/10 mgr. p. 1 cc.) : ampoules roses
Centième de mgr. (1/100 mgr. p. 1 cc.) : ampoules bleues. (Spécifie seulement le taux des doses faibles sur l'ordonnance.)

Mode d'emploi. — Injections intradermiques. Injections profondes. Par séance : 1/2 à 2 cc., dose normale. *Tâter la susceptibilité du sujet avant d'injecter la dose totale.* Injections sous-cutanées : doses faibles.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 1 cc. avec 1 aiguille Clartyl pour injections intradermiques : 25 fr.

Accessoires. — Trousse Clartyl comportant 1 seringue spéciale pour intradermiques et 3 aiguilles inoxydables Clartyl : 20 fr.

POMMADE HISTACLARTYL

Dosée à 2 p. 100 bichlorhydrate d'histamine.

Très active, provoque les mêmes réactions locales que les intradermiques.

Mêmes indications que par la voie intradermique.

Application de l'histamine par ionisation.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau et au savon la région à traiter, la passer ensuite à l'alcool ou à l'éther, appliquer la pommade en couche mince en la faisant absorber par un léger massage. Pour obtenir une action plus violente, frictionner au gant de crin avant l'application.

Présentation. — Pot de 10 grammes : 22 fr.

CLARTYL, « Le Laboratoire de l'Histamine ».

BAPAUME, Pharmacien,

85, avenue de Neuilly — NEUILLY-SUR-SEINE.

(Tél. Maillot 10-06.)

HISTALGINE

Histamine biologique naturelle en solution isotonique à pH 7 stabilisé, pour injections intradermiques indolores.

Toxicité nulle.

Employable également en ionisation et en scarifications.

Composition. — Chaque ampoule de 1 cc. contient : 0 gr. 0005 de Bichlorhydrate d'Histamine en solution glucosée.

Propriétés thérapeutiques. — Action double : analgésique, sédation très rapide de la douleur ; curative, augmentation considérable de la circulation sanguine. Néof ormation et Vaso-dilatation capillaire. Métabolisme cellulaire exalté.

Indications :

1° Rhumatismes chroniques, d'origine glandulaire ou traumatique. Arthroses.

Rhumatismes chroniques d'origine infectieuse. — Arthrites.

2° Algies. Myalgies. Névralgies. Sciatique.

3° Traumatismes. Luxations. Foulures. Entorses, etc.

4° Maladies de sensibilisation : Asthme, Migraines, etc.

5° Maladies neurovasculaires : Artérites, Pelade, Ulcères variqueux.

6° Douleurs dentaires.

Posologie. — Consulter la littérature qui accompagne chaque boîte.

Utiliser une seringue de 1 cc. de préférence divisée au 1/20^e. Aiguille courte de 4/10^e.

Piqûres intradermiques. — 1/2 à 1 goutte aux points douloureux.

Chaque piqûre fait apparaître la Triade réactionnelle de Lewis. 1/2 à 1 ampoule par jour pendant 3 à 10 jours.

Ionisation. — 1 ampoule pour 10 gr. d'eau distillée.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001/18

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN

14, Avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 00-37.)

HISTAMYL

Composition. — Bi-chlorhydrate d'Histamine pur.

Présentations et indications. — En ampoules de 1 cc. à 1/2 mmgr. pour 1 cc. pour injections intra-dermiques disséminées « loco dolenti » à raison d'une goutte à chaque piqûre (6 à 20 pour une séance), en tubes de baume pénétrant à 0 gr. 50 p. 100 en applications-massages quotidiens le soir au coucher ; sous ces deux formes, action remarquable contre les algies rhumatismales, névralgies, sciatique, torticolis, lumbago ; en intra-dermiques : III à VI gouttes contre le prurit anal ou vulvaire, VI à X gouttes contre douleurs post-zonateuses.

Pour désensibilisation : *Histamyl « D »* : boîte de 12 ampoules de 2 cc.

(1^{re} série) : depuis le millionième de mmgr. jusqu'au centième, et.

2^{me} série : 12 ampoules au centième : en sous-cutanées ou intrader-

miques : asthme, urticaire, migraine, chocs anaphylactiques, ulcères gastro-duodénaux.

Les solutions injectables sont parfaitement indolores ; en intrader-

miques et avec le Baume, réaction locale normale dite de Lewis

(rougeur et démangeaisons fugaces). Réaction générale rare avec la

solution au 1/2 mmgr. et tout à fait exceptionnelle avec l'Histamyl

« D ».

Prix : la boîte 6 amp. 1 cc. à 1/2 mmgr. : 16 fr. 60 ; le tube de Baume :

18 fr. 70. ; Histamyl D, chaque série : 25 francs.

Échantillons, Littératures :

Laboratoires J. PLÉ

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3^e).

HISTOGÉNOL

(Médication arsénio-phosphorée organique.)

Puissant reconstituant général.

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

Formes. — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe d'élixir ou une mesure de granulé au milieu de chaque repas, ou 2 comprimés matin et soir, ou une ampoule par jour.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,
12, rue du Chemin-Vert
VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

HISTOGERMA

Reconstituant physiologique. Stimulant de la nutrition.

Composition. — Comprimés dragéifiés à base de lécithine, quinium, nucléinate de soude, extraits opothérapiques (Hypophysaire, parathyroïdien, etc.).

Propriétés. — Tonifie la cellule nerveuse, accélère les échanges nutritifs, augmente le poids du corps et le nombre des hématies.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, dépression nerveuse, surmenage physique ou intellectuel, convalescence pénible, prébacillose, bacillose, grossesse, lactation, affections du cerveau et de la moelle.

Posologie :

10 à 15 ans..... 2 à 3 comprimés par jour.

Adultes..... 3 à 6 comprimés par jour.

Tube de 60 comprimés : 19 fr. 50.

Laboratoires ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

HISTROPA

**Traitement physiologique
des spasmes douloureux de l'appareil digestif
et des cœlialgies.**

Composition. — Solution injectable de Bromhydrate d'Histidine associé en proportions physiologiquement calculées aux Bromhydrates d'Atropine et de Scopolamine, en milieu isotonique.

Présentation. — Ampoules de 2 cc.

Action. — Calme les algies provoquées par les lésions ulcéreuses ou les inflammations du tube digestif ; favorise leur cicatrisation ; calme et fait céder les spasmes viscéraux.

Indications. — *a.* Tous les *spasmes* et toutes les *douleurs* du tube digestif et des viscères : œsophage, cardia, estomac, région pyloro-duodénale, intestin grêle, côlons (typhlocolites, entéro-colites, sigmoïdites, diverticulites, rectocolites, etc.) ; rectum et région anale, appareil urinaire (plexalgies lombaires, rénales, urétrales ou vésicales), appareil biliaire (vésicule et voies biliaires), cœlialgies, coliques hépatiques et coliques pancréatiques, séquelles d'opérations.

b. Toutes les *ulcérations* du tube digestif voient leur cicatrisation accélérée quand on associe les injections intradermiques d'*Histropa* au régime, et au traitement local par le poudrage (D^r Antoine).

c. Enfin, tous les *déséquilibres* du système nerveux vago-sympathique, les cercles vicieux douloureux, les « douleurs-souvenir » des divers viscères, solarite, vagotonie et aérophagie, douleurs des plexus abdominaux, cœlialgies, cœnestopathies diverses.

Contre-Indications. — Cardiopathies, aortite, hyperthyroïdie, Basedow.

Posologie. — Injections intradermiques ou sous-cutanées.

Dose moyenne : 1/2 à 1 cc. par jour ou tous les 2 jours.

Dose maxima : 1 ampoule matin et soir en cas de grande crise.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose selon l'âge.

Prix :

La boîte de 4 ampoules : 26 fr.

— de 12 — : 62 fr. 40.

**Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique
Appliquée**

**Laboratoires du D^r Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

HOLOS

Opothérapie osseuse.

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse. Allaitement, Convalescence, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une promptre reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

Prix : 12 fr. 80

Littérature — Échantillons.

DESCHIENS, Docteur en pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — Paris (8^e). — (Tél. : Elysées 40-26)

HOLOSPLÉNINE

Extrait de rate injectable
Déliplodé et désalbuminé.

Indications. — Anémies, Amaigrissements, Tuberculose, Eczémas chroniques, Erythodermie arsénobenzolique, Pemphigus, Lichen ruber acuminosus, Pityriasis rubra de Hebra, Prurigo simplex, Urticaires récidivantes, Éruption miliaire, Eczéma rebelle, Prurit anal, vulvaire, périnéal, Lichen plan, Psoriasis.

Forme et composition :

Boîte de 6 ampoules de 1 cc. chaque cc. = 30 grs de rate fraîche. Prix : 32 francs.

— 6 — de 1 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche. Prix : 23 fr. 50.

Tube de 6 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche.
Prix : 21 fr. 50.

Conduite du traitement. — Série de 12 à 15 injections de 1 cc. sous-cutanées ou intramusculaires comme suit : 1 injection les 1^{er} et 2^e jours, pas d'injection les 3^e et 4^e jours, ensuite injection tous les 2 jours. L'injection est indolore. Pour les eczémas, ne pas hésiter à injecter les doses fortes : 2 à 3 cc. (c'est-à-dire 30 à 45 gr. de rate) ainsi que dans les dermatoses rebelles.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

HOLOVARINE

Forme et composition. — Cachets ou dragées dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

Avantages. — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes : troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 20 par jour.

Adolescentes : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 20, 16 francs. La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 10, 11 francs.

Laboratoire de L'ENDOPANORINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél.: Ségur 26-87.)

HOPOGAMYL

Composition :

Amylase.....	0,03
Pepsine.....	0,005
Peroxyde Magnésium.....	0,07
Carbonate Magnésie.....	0,07
Bioxyde Manganèse.....	0,15

Pour une tablette aromatisée légèrement à la menthe.

Indications. — *Affections gastro-intestinales. Chlorose.* Mauvaises digestions, aigreurs, fermentations intestinales, entérites, diarrhées rebelles, auto-intoxications.

Présentation. — Tablettes aromatisées *légèrement* à l'essence de menthe.

Posologie. — Sucrer lentement 6 à 8 tablettes par jour après les repas ou à distance des repas suivant avis du médecin.

Echantillon médical sur demande.

Laboratoire de l'HOPOGAMYL

52, place de l'Hôtel-de-Ville — BEAUVAIS (Oise).

L. PLOUCHART, pharmacien.

HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral à base de Peroxyde de Magnésium et de charbon activé, dégageant de l'Oxygène naissant au contact des muqueuses.

Propriétés. — Désinfection et désintoxication du tube digestif avec revivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires.

Pansement interne de la muqueuse stomacale ou intestinale. Propriétés anti-cancéreuses de l'ion magnésium.

Formes. — **HOPOGAN CACHETS** pour digestions douloureuses, mauvaise haleine, intoxications de toute nature (2 à 4 cachets par jour).

Prix : la boîte de 30 cachets : 16 francs.

HOPOGAN PILULES GLUTINISÉES pour action localisée dans l'intestin : entérite, diarrhées (2 à 6 pilules par jour).

Prix : le flacon de 40 pilules : 12 fr. 80.

HOPOGAN PRISE-BÉBÉ contre les diarrhées vertes des nourrissons (1 à 3 paquets par jour).

Prix : la boîte de 20 paquets : 10 fr. 65.

Laboratoire des PEROXYDES MÉDICINAUX

12-18, rue Lamartine — PARIS.

(Tél. : Trudaine 09-64.)

HORDÉNOL

A base d'Hordénine Beytout.

Indications. — Médication héroïque des diarrhées de toutes origines, toutes natures et toutes intensités.

Résultats : Jugule toutes diarrhées aiguës en 48 heures. Aucune contre-indication.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

Les ampoules peuvent également être administrées par voie buccale, quand les injections sont impossibles.

Composition :

Sulfate d'hordénine	0,125
Vanadate de soude	0,002
Triméthylxanthine.....	0,002
Eau distillée.....	Q. S. P. 2 cc.

Présentation et Prix. — Boîte de 6 ampoules : 26 fr. 50.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).

(Tél. : Nord 76-85.)

HORMANTOXONE

Composition. — Extrait contenant intégralement et sous forme stable le principe antitoxique du foie, purifié, concentré et titré biologiquement.

Formes. — Globoïdes pour adultes. Granulés pour enfants. Suppositoires pour jeunes enfants et anorexiques.

Propriétés. — *Supplée* la fonction antitoxique du foie quand elle est déficiente ; la *stimule* quand elle est perturbée.

Indications :

I. *Insuffisance de la fonction antitoxique* du foie, cirrhoses, ictères, hépatisme, lithiase biliaire.

II. *Auto et hétéro-intoxications* : (urémie, intoxications alimentaires et microbiennes, toxicomanies, éthylisme, intoxications médicamenteuses, urobilinémie). Toxémie gravidique, vomissements incoercibles de la grossesse, pré-éclampsie.

III. *Toxi-infections* (adjuvant des sérothérapies spécifiques). Psychoses infectieuses, soins pré et post-opératoires. Cholécystites et péricholécystites.

IV. *Anaphylaxies. Intolérances alimentaires* : Asthme, urticaire, migraines, accidents sériques, strophulus et fièvre des foins.

V. *Dermatoses* : Eczémas, prurits, érythèmes, œdème de Quincke.

VI. *Oliguries.*

VII. *Indications diverses* : (Diabète, albuminurie, rhumatismes chroniques).

Posologie. — Avaler avec un peu d'eau avant chaque repas :

Cas aigus : 2 à 3 globoïdes.

Cas moyens : 1 à 2 globoïdes.

Cure d'entretien : 1 globoïde.

Jeunes enfants ne pouvant pas absorber les globoïdes : 1 cuillerée à café de granulés avalée avec un peu d'eau avant chaque repas ou bien un suppositoire le soir.

Anorexiques : 1 ou 2 suppositoires.

Prix :

Le flacon de 36 globoïdes (8 jours) : 21 fr. 35.

La boîte de granulés (8 jours) : 21 fr. 35.

La boîte de suppositoires (8 jours) : 17 fr. 10.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Galvani 84-41.)

HORMIADYNE

Composition par dragée :

Silicate de Soude pur	0,10
Extrait stabilisé de Gui	0,05
De Muguet.....	0,015
Extrait sec de Cascara	0,015
Bile desséchée	0,035
Thyroidine	0,0025
Poudre de poumon.....	0,02
Poudre de surrénales.....	0,0125

Forme. — Dragées à noyau mou.

Indications. — Médication hypotensive polyvalente, Artério-sclérose, Hypertension, Troubles cardio-vasculaires et toutes complications.

Doses. — 2 à 6 dragées par jour.

Prix : 17 fr. 50 la boîte de 50 dragées.

Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1082-4.

A. MIRONNEAU, Pharmacien
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
 (Tél. : 18.)

HORMOBILINE

Laxatif opothérapique.

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

Composition. — Hormones cœco-appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

Indications. — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

Avantages. — Ne provoque ni dégoût ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

Posologie. — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Clystère : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.

Forme pilulaire : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n°s 586-1 et 586-2.

Prix : 12 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12.)

HORMOCARBOL

Troubles gastro-intestinaux.

Composition :

Charbon animal	5.000
Charbon végétal	10.000
Magnésie hydratée	3.000
Peroxyde de magnésie	1.000
Sulfate de magnésium	0,1638
— — manganèse	0,1278
— — calcium	0,1872
— — cuivre	0,0504
— — fer	0,1296

Pour 100 gr. quantité en milligrammes.

Forme. — Granulés.

Indications. — Aérophagie, Dyspepsie, Hyperacidité, Crampes, Vertiges, Migraines, Somnolences, Nausées, Inappétence, Entérite, Constipation, Intoxication alimentaire, Troubles digestifs d'origine hépatique.

Posologie. — Une cuillerée à dessert ou à café après chacun des deux principaux repas suivant l'intensité du malaise.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1024-7.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires des Hormométalions

50, avenue Jacqueminot, MEUDON.

(Tél. : 1^{er} Obs. 13-33.)

HORMOCLINE

Chlorhydrate de Choline.

Traitement des États Tuberculeux.

Propriétés thérapeutiques. — Le chlorhydrate de choline agit sur le métabolisme du cholestérol, excite les surrénales aux propriétés antitoxiques puissantes et opère ainsi une transformation du terrain biologique se manifestant par un relèvement de l'état clinique général.

Indications. — Toutes les formes de la tuberculose à tous les stades d'évolution, aussi bien dans les formes médicales que dans les formes chirurgicales. Amaigrissements, Asthénies, Anorexies rebelles.

Adjuvant précieux des cures hygiéno-diététiques, Abaissement de la température, diminution des signes fonctionnels, engraissement rapide.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite ; aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée tous les deux jours. Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 2 cgr. de chlorhydrate de choline.

Prix : 25 fr. 50 ; Assur. Soc., Classe B.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.)

HORMOCRINOL « F » et « M »

Une conception nouvelle dans la thérapeutique antiobèse.

L'Hormocrinol, en dehors de ses effets sur l'oxydation des graisses et des mucines, réalise la plus efficace cure de diurèse agissant favorablement sur les troubles du métabolisme de l'eau.

Extraits glandulaires totaux obtenus par dessiccation dans le vide à basse température des organes frais.

Posologie. — Prescrire HORMOCRINOL « F » chez la femme, et HORMOCRINOL « M » chez l'homme.

6 à 8 comprimés par jour à prendre en deux ou trois fois.

Prix au public : 26 francs.

Laboratoires JAMMES de GOLBERY

19, rue Brunel — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Galvani 51-31.)

HORMODAUSSÉ

(Hormonothérapie totale.)

Composition. — Hormones de jeune taureau, de génisse et de jeune bovidé en pleine croissance, associées à un extrait hépatique (méthode de Whipple), à l'hémoglobine et aux diverses albumines globulaires.

Propriétés thérapeutiques. — Il apporte aux organismes affaiblis tous les produits endocriniens qui circulent dans les vaisseaux des animaux jeunes et vigoureux, ainsi que les stimulants de l'hémopoïèse et les matériaux de la régénération des hématies.

Indications. — Toutes les déchéances organiques et les déficits endocriniens, les convalescences, les anémies et les retards de croissance.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour, 30 minutes avant les repas, dans un peu d'eau.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour, dans un peu d'eau.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40)

HORMOFLAVÉINE

Composition :

Hormone spécifique du corps jaune, physiologiquement titrée.

Indications thérapeutiques et posologie :

Aménorrhée, hypoménorrhée (1 injection quotidienne, de préférence du 14^e au 21^e jour de la période intermenstruelle) ; **ménorragies, métrorragies** (1 ou 2 injections tous les jours dans la semaine précédant les règles, ou au cours même de l'hémorragie) ; **stérilité d'origine hormonale** (1 injection quotidienne du 14^e au 28^e jour de la période intermenstruelle). L'Hormoflavéine est spécialement indiquée à partir du 14^e jour après les règles (1 injection quotidienne) chez les femmes qui ont déjà fait un ou plusieurs avortements, pour leur permettre de mener à bien une nouvelle grossesse.

Présentation et mode d'emploi :

Deux titrages (solution huileuse) : Hormoflavéine A (boîtes de 6 ampoules titrées à 100 unités par ampoule) ; Hormoflavéine B (boîtes de 1 ampoule titrée à 600 unités). Injection sous-cutanée profonde, ou intramusculaire).

Prix : Boîte de 6 ampoules A : 57 fr. 20.

Boîte de 1 ampoule B : 57 fr. 20

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

HORMOLÉOL

Opothérapie entéro-hépatique.

Composition. — Extraits biliaries dépigmentés et décholestérinés, Hormones intestinales, Agar-Agar.

Propriétés thérapeutiques. — L'action synergique des éléments composants de l'HORMOLÉOL réalise une médication opothérapique assurant le maximum de résultat :

1^o Intestins : Dans toutes les Constipations où il y a déficience du rythme moteur de l'intestin (insuffisance motrice) et déficience de l'activité glandulaire (insuffisance sécrétoire). Dans les entérites d'origine diverses (muco-membraneuse, paludéenne, etc.).

2^o Foie : Par les extraits biliaries qui entrent dans sa composition, l'HORMOLÉOL est employé utilement dans le traitement des affections de l'appareil biliaire (arrêt, insuffisance ou perversion de la bile).

Avantageusement recommandé dans :

Lithiase biliaire, Insuffisance biliaire, Ictère, Cholémie familiale.

Avantages. — Laxatif doux, non irritant, ne provoquant ni colique ni accoutumance. Sans contre-indication.

Posologie. — A prendre de préférence avant le repas du soir.

Adultes : 1 à 3 dragées par jour.

Enfants : de 6 à 15 ans : 1/2 à 1 dragée par jour.

(Admis aux Assurances sociales.)

Laboratoire de l'HORMOLÉOL

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12.)

HORMOLUTÉINE VOGEin

Chaque comprimé contient 0,05 d'Hormone folliculaire, titrée à 5 U. I., et 0,005 d'extrait thyroïdien.

Action physiologique. — Cet ensemble provoque le stimulus qui déclenche le flux menstruel, supprime les douleurs des règles et les rend plus régulières et plus faciles.

Indications. — On l'emploiera dans tous les cas d'hypo-ovarie où il sera nécessaire de provoquer l'arrivée du flux menstruel, et dans les malaises généraux résultant d'un flux peu abondant, dans l'aménorrhée, la chlorose.

C'est le spécifique de l'insuffisance ovarienne dans la puberté.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas, pendant la semaine devant précéder le flux menstruel.

Prix : Le flacon 15 fr.

Laboratoires VOGEin

2, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).

(Tél. : Danton 83-24.)

HORMONE GONADOTROPE DU D^r ROUSSEL

Composition. — Hormone extraite du sérum de jument grvide.

Propriétés. — Commande dans les deux sexes le développement et les fonctions des glandes génitales.

Indications. — *Chez l'homme :* Cryptorchidie, certaines impuissances.

Chez la femme : Aménorrhée, hypoménorrhée.

Dans les deux sexes : Stérilité, retards de la puberté, Syndrome adiposo-génital.

Formes. — 1^o Boîte de 6 ampoules titrées à 40 Unités-rat Evans (environ 400 unités-souris) et 6 ampoules de solvant à mélanger extemporanément.

2^o Boîte de 2 ampoules de poudre d'hormone et 2 ampoules de solvant.

Posologie. — Série de 6, 12, 18 injections selon les cas (par voie sous-cutanée ou intramusculaire). Repos de quinze jours entre deux séries.

Prix : Boîte de 6 amp. : 62 fr. 40 ; boîte de 2 amp. : 23 fr.

Remboursement aux Assurés Sociaux : Catégorie A.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

HORMONES HYPOTHYROIDIQUES

BYLA

Les Établissements Byla présentent les
produits en pharmacie à base des hormones

physiologiques, en ampoules injectables, physio-

HORMONES DU LOBE ANTÉRIEUR

Gonadotrophine, strophane

Thyroxine, régularise la fonction thyroïdienne

Préparations

crétionnelle

Gonadotrophine, stimule la croissance

HORMONES DES LOBES POSTÉRIEURS

ET INTERMÉDIAIRES

L'hormone, action sur les glandes sécrétrices
après l'écoulement de celles de
l'intérieur (glandes gastriques, intestinales,
vésiculaires, etc.). Anti-hémorragique par

HORMONES HYPOPHYSAIRES BYLA

Les Etablissements Byla présentent, les premiers en France, la série des hormones hypophysaires, **réellement et exclusivement extraites de la glande hypophyse**, en ampoules injectables, physiologiquement titrées.

HORMONES DU LOBE ANTÉRIEUR

Gonadormone, stimule la maturation folliculaire et la spermatogénèse. Son origine hypophysaire la différencie de tous les extraits gonadotropes précédemment utilisés.

Thyormone, régularise le fonctionnement thyroïdien.

Lactormone, provoque ou augmente la sécrétion lactée.

Somatormone, stimule la croissance.

HORMONES DES LOBES POSTÉRIEUR ET INTERMÉDIAIRE

Ocytormone, Action ocytocique (inertie utérine).

Leïormone, action myocinétique sur les fibres lisses à l'exception de celles de l'utérus (atonies gastrique, intestinale, vésiculaire, etc.). Anti-hémorragique par action sur les fibres lisses vasculaires. Action antipolyurique (diabète insipide).

Neurormone, traitement des migraines hypophysaires.

Pituilobine, hormone post-hypophysaire totale.

Gonadormone : 1 ampoule 2 cc. = 10 unités-lapin (boîtes de 6 ampoules).

Thyromone : 1 ampoule 2 cc. = 100 unités-cobaye (boîtes de 6 ampoules).

Lactormone : 1 ampoule 2 cc. = 100 unités-pigeon (boîtes de 3 ampoules).

Somatormone : 1 ampoule 1 cc. = 100 unités-rat (boîtes de 6 ampoules).

Ocytormone : 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Leïormone : 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Neurormone : 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Pituilobine : 0⁵ 1 ampoule 1 cc. = 5 unités internat. (boîtes de 3 ampoules);

0¹⁰ 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules);

B 1 ampoule 1 cc. = 40 unités internat. (boîtes de 2 ampoules);

E 1 ampoule 15 cc. = 5 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Littérature sur demande aux

Établissements BYLA

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).

HORMIOPLASMINE LEFRANCQ

Complexe Hormo-zomique.

Composition. — Extrait hydroalcoolique de lobe antérieur de l'hypophyse, Extrait total de rate fraîche, Suc musculaire concentré de jeunes taureaux.

Propriétés. — Spécifique des troubles de la croissance et des insuffisances glandulaires par l'hypophyse.

Reconstituant général par la rate et le suc musculaire.

Indications. — Retard du développement ; Formation difficile ; Paressse, nonchalance ; Asthénie ; Rachitisme ; Scrofule ; Dermatoses d'origine, auto ou hétérotoxique (eczéma, prurigo, urticaire).

Présentation et posologie. — 10 ampoules buvables de 10 cc. Chaque ampoule doit être diluée dans un demi-verre d'eau froide ou tiède.

Nourrissons : 1 ampoule par jour mélangée au lait du biberon.

Enfants : 2 ampoules par jour.

Adultes : 2 à 4 ampoules.

Laboratoires LEFRANCQ

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52).

HORMOSTHÉNYL

Sirop Hémopoïétique.

Tonique reconstituant.

Hépatothérapie histaminique, Hémopoïétique, Neurotrophique, pour le traitement de tous les états anémiques, Déficiences organiques et fonctionnelles de toutes origines.

Active le Métabolisme général. Stimule l'histogénèse et la fonction régénératrice.

Composition :

Extrait hépatique	2 gr. 920
Histamine (B. Imidazol-éthylamine) .	0 gr. 006
Citrate de fer ammoniacal rouge	1 gr. 670
Sulfate de Manganèse	1 gr. 200
Glycérophosphate de sodium 100/100..	1 gr. 750
Triméthylxanthine	0 gr. 200
Extrait de condurango	2 gr. 500
Solution hydro-alcool sucrée.....	89 gr. 754

Indications. — Anémies, Chloroses, Asthénies, Dépressions nerveuses, Défaillances constitutionnelles, Neurasthénies, Convalescences, Anorexie, Troubles de croissance des adolescents.

Posologie :

Adultes et adolescents : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour pendant ou après les principaux repas.

Thérapeutique Biochimique nouvelle des anémies par supplémentation de l'organisme en acides aminés hématogènes. Apporte directement à l'organisme, en proportions rationnellement dosées, les principes actifs du foie et réactive immédiatement les processus de l'hématopoïèse.

Prix : Le flacon de 300 gr. : 25 francs.

Enregistré au L. N. C. M.

Produits Biochimiques ROSSO

THURET, Pharmacien, sur

63, rue de Charonné — PARIS.

HORMOVARINE BYLA

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

(En ampoules injectables, gouttes, comprimés et ovules.)

Composition. — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

Indications. — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, aménorrhées, hypoménorrhées, dysménorrhées, hypoplasie utérine, troubles de la ménopause, ovariectomie, stérilité, obésité, etc.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les jours, en injection lente, intra-musculaire, ou XV à LXXX gouttes, ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'Hormovarine doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours dans la période qui précède immédiatement la date présumée des règles.

N. B. — Les ampoules d'Hormovarine sont toujours préparées en partant de l'hormone ovarienne intégrale, tandis que nous avons adopté la folliculine cristallisée comme base de nos 3 autres préparations. (Voir aussi Benzoate de di-hydro-Folliculine Byla, amp. à 1.000, 10.000 et 50.000 unités).

Prix :

Ampoules : 57 fr. 20. — *Comprimés* : 20 fr. 80. — *Ovules* : 27 francs. — *Gouttes* : 21 fr. 85.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS. (Tél. : Danton 08-11.)

HORMOVITOL

Puissant tonique et reconstituant cellulaire.

Élixir de goût très agréable à base d'extraits androïques totaux, d'extraits cérébro-médullaires et de nucléines.

Indications. — Asthénie, Amaigrissement, Troubles nerveux, Dépression intellectuelle, Neurasthénie, Convalescence médicale ou chirurgicale, Troubles glandulaires, Surmenage, Phosphaturie.

Doses :

Adultes : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : de 5 à 10 ans, 1 cuillerée à café ; de 10 à 15 ans, 1 cuillerée à dessert.

Prix : 19 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-3.

Laboratoires du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc. — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44.)

Extensive literature

on organic films and
isolated films and

HORMUCLASES

Opothérapie du Docteur Roussel.

Toute leur préparation est effectuée en moins de 4 heures.

La dessiccation est obtenue en 40 minutes, à 0°, par des procédés brevetés.

Les organes frais et les poudres sont constamment maintenus, au cours de la fabrication, à température basse et à l'abri de l'air.

La mise en cachets est opérée mécaniquement, sous gaz inerte (azote).

Les cachets sont livrés dans des tubes de verre, scellés après obtention d'un vide parfait.

Cachets :

Formes simples :

Hypophyse totale	0,05
Mamelle.....	0,10
Orchitine	0,10
Ovaire.....	0,10
Surrénale.....	0,10
Thymus	0,10
Thyroïde	0,025
Thyroïde	0,002

Formes associées. — Toutes les combinaisons d'organes permettant la poly-opothérapie.

Boîte de 36 cachets : prix au public : 21 fr. 30.

Remboursement aux Assurés sociaux :
catégorie B.

Extraits injectables :

Formes simples. — Ampoules de 2 cc. dont le titre en principe actif correspond en organe frais à :

Cœur, 2 gr. ; Corps jaune, 2 gr. ; Cortico-surrénale, 0,50 ; Hypophyse totale, 1 gr. ; Antéhypophyse, 0,50 ; Mamelle, 1 gr. ; Orchitine, 2 gr. ; Ovaire, 2 gr. ; Pancréas, 5 gr. ; Parathyroïde, 0,10 ; Rein, 2 gr. ; Surrénale, 0,50 ; Thymus, 1 gr. ; Thyroïde, 0,50 ; Ampoules de rate de 2 cc. correspondant à

10 gr. d'organe frais ; Ampoules de rate de 5 cc. correspondant à 25 gr. d'organe frais.

Formes associées. — Toutes les combinaisons d'organes permettant la poly-opothérapie.

Boîte d'ampoules d'extraits injectables :

Prix au public : 21 fr. 30.

Remboursement aux Assurés sociaux :
catégorie A.

Complexes d'Hormuclases. — Pour toutes prescriptions comportant des dosages particuliers ou des combinaisons d'organes différents des formes standard, s'adresser à

Laboratoires Thérapeutiques
A. MILLET et GUILLAUMIN
4, rue Richer — PARIS.

Laboratoires du Dr ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

HUILE CAMPHRÉE MANGANÉSÉE

« MÉTÈRE »

Indications :

Toutes les indications de l'huile camphrée.
Anti-infectieux puissant contre septicémies, gripes, encéphalites, poliomyélites. Furunculose, Lymphangites, Phlegmons. Toutes les maladies infectieuses. Adjuvant précieux des sérothérapies spécifiques. Médicament leucogène.

Composition :

Huile camphrée au 1/10^e contenant 0,15 mgr. de Manganèse colloïdal par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. Dans les cas bénins faire une injection tous les jours ou tous les 2 jours. Dans les cas graves on peut faire une piqûre toutes les 3 heures pendant 3 jours consécutifs.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

HUILE DE FOIE DE MORUE

**Médicinale Suractivée
Rhône-Poulenc.**

2 000 unités internationales Vitamine A,
500 unités internationales Vitamine D,
par centimètre cube.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue avec l'avantage d'une posologie réduite, parfaitement supportée.

Arrêt du développement statural et pondéral.

Lymphatisme, adénopathies, convalescences.

Présentation : Flacons de 125 cm³. Prix de vente : 17 fr. 50

Posologie (par 24 heures) :

Première année : XXX gouttes à 1/2 cuillerée à café.

Enfants : A partir d'un an et suivant l'âge : 1/2 à 1 cuillerée à café.

Adolescents et adultes : 1 à 2 cuillerées à café.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

HUILE D'HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly, trois siècles d'existence. Emploie le nom de **Haarlem** sans préfixe ni suffixe qui décèlent la contrefaçon.

Produit de la Société de la véritable Huile de Haarlem.

8, Achterstraat Haarlem (Hollande).

Présentation et prix :

1° *Gouttes* : le flacon de 10 cc. : 2 fr. 95.

2° *Capsules* : la boîte de 36 capsules : 5 fr. 30 ;
la boîte de 108 capsules : 14 fr. 90.

Indications : Multiples, consacrées par l'expérience de plusieurs siècles.

Usage interne : Affections et Infections des divers appareils.

a. *Hépatique* : Congestions et Insuffisances du foie, Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiases, Ictères, Chocs anaphylactiques, Rhumatismes et tous états uricémiques.

b. *Urinaire* : Lithiases, Cystites, Pyélonéphrites, Colibacilluries.

c. *Pulmonaire* : Bronchites, Bronchorrée, Asthme.

Usage externe : Alopécies, brûlures, plaies, piqûres d'insectes, contusions, engelures, crevasses, furoncles.

Posologie et mode d'emploi :

Usage interne : X gouttes ou une capsule 3 fois par jour.

Usage externe : en applications légères.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle sous les n°s 650-4 (*gouttes*) et 650-5 (*capsules*).

Assurances Sociales : Catégorie B, remboursée à 80 %.

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS

(Tél. : Provence 49-77.)

HUILE IODÉE FINIKOFF

CALCIUM INTRA VEINEUX FINIKOFF

Méthode du D^r A. FINIKOFF

pour le traitement des Tuberculoses chirurgicales.

Indications. — Tuberculoses osseuses, articulaires, ganglionnaires, séreuses et cutanées.

Contre-indications. — Tuberculose pulmonaire, tuberculoses viscérales avec dégénérescence amyloïde du foie et du rein, cachexie et septicémie bacillaires, méningites bacillaires.

Forme. — *Huile iodée* à préparer extemporanément : une ampoule d'huile spéciale, une ampoule d'iode en solution au 1/10 en injections intramusculaires.

Chlorure de calcium pour injections intraveineuses. Ces injections ne sont à pratiquer que chez les malades robustes ayant une intégrité viscérale totale.

Remplacer ces injections par la Tricalcine injectable ou *per os* chez tous les autres malades.

Doses et mode d'emploi. — Un prospectus indiquant la posologie accompagne chaque boîte. Il est envoyé sur demande au Corps médical.

Prix de la boîte de	6 ampoules huile.	} 25 fr.
— — —	6 — iode.	
— — —	12 — calcium.	25 fr.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29.)

HUILORHINE

Composition :

Camphre, eucalyptol, résorcine, essences aromatiques et antiseptiques (essence de menthe, etc.); véhicule : huile d'olive neutralisée et stérilisée sans éphédrine.

Propriétés :

Antiseptique et tonique des voies respiratoires supérieures.

Indications :

Toutes affections du rhino-pharynx, coryza, rhinites, sinusites, végétations adénoïdes, désinfectant pré et post-opératoire, prophylaxie des maladies infectieuses.

Posologie et mode d'emploi :

Instillations nasales : V à VI gouttes dans chaque narine matin et soir. Pulvérisations matin et soir.

Prix : 12 fr. 50 le flacon.

Laboratoires Yves CHABROL

29, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 25-85.)

HUMORO-STABILINE

DU
DOCTEUR L. DELALBRE

PRÉPARATION

OPOTHÉRAPIQUE ET PHYTOTHÉRAPIQUE
non toxique

STABILISATRICE DES HUMEURS

pour

MÉDICATION ANTI-CHOC

curative et préventive

DANS LES MALADIES D'INTOLÉRANCE.

PRÉSENTÉE sous 2 formes : PILULES et GRANULÉ

— COMPOSITION —

PILULES		GRANULÉ	
Peptone de viande.....	0 gr. 20	Peptone de viande.....	4 gr.
Extrait de Valériane....	0 gr. 10	Extrait de Valériane.....	2 gr.
Extrait de Muguet.....	0 gr. 05	Extrait de Muguet.....	1 gr.
pour une pilule.		pour 100 gr.	
Excipient spécialement étudié.		Stimulant aromatique... q. s.	
Enrobage soluble dans l'eau.		Excipient : Sucre surfin.	

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES de désensibilisation

1. — CHOCS ANAPHYLACTIQUES :

Urticaire. — Eczéma. — Névralgies. — Coryza. — Asthme, etc.

2. — INFECTIONS INTESTINALES (pH modifié) :

Colibacillose. — Entérite. — Entérocologie, etc.

3. — DYSTONIES VAGO-SYMPATHIQUES :

Troubles respiratoires, circulatoires, digestifs, sécrétoires, etc.

4. — PERTURBATIONS NERVEUSES : Neurasthénie, etc.

5. — DÉSORDRES CARDIAQUES : Palpitations, etc.

AUCUNE CONTRE-INDICATION

— MODE D'EMPLOI ET DOSES —

L'Humoro-Stabiline se prend toujours 1 heure au moins avant les repas.

Les pilules s'avient avec un peu d'eau ou bien à sec.

On peut aussi les ingérer écrasées et mélangées à de la confiture.

Le granulé se croque ou se donne dissous dans un peu d'eau ou de lait.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

PILULES

ADULTES : 3 pilules à la fois
1 heure avant chacun des deux
principaux repas.

ADOLESCENTS : 2/3 des doses
ci-dessus.

ENFANTS : 1/3 de ces doses.

GRANULÉ

ENFANTS : 1 bonne cuillerée à
café 1 heure avant chacun des
deux principaux repas.

NOURRISSONS : 1/2 cuillerée
à café 1 heure avant l'une des
tétés, matin et soir.

Ces doses répétées tous les jours pendant 2 ou 3 mois consécutifs.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du Médecin.

PRIX AU PUBLIC

Le flacon de 60 pilules : 25 fr. 00 | La boîte de 100 gr. granulé : 23 fr. 00

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

P.-L. DUMONT, Pharmacien,

2, rue Claude Matrat — ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11 et 22-68.)

HUPNOSAL ADRIAN

Composition. — Diéthylbarbiturate acide de sodium.

Propriétés. — Hypnotique. Anti-nervin. Modificateur du système sympathique. Sédatif nervin.

Indications. — Insomnie. Troubles nerveux de toute nature.

Avantages. — Tolérance absolue. Sédatif sans opium ni morphine.

Présentation :

a. *Dragées* dosées à 25 cgr.

b. *Elixir* dosé à 25 cgr. par cuillerée à soupe.

c. *Cachets* dosés à 25 cgr.

d. *Ampoules* dosées à 20 cgr.

Posologie :

Dragées : 1 à 2 le soir.

Elixir : 1 à 2 cuillerées à soupe le soir.

Cachets ou *Ampoules* : 1 à 2 le soir.

Prix : *Dragées* : 15 fr. 95 la boîte ; *Elixir* : 19 fr. 15 le flacon ; *Cachets* : 15 fr. 95 la boîte ; *Ampoules* : 15 fr. 95 la boîte.

Société Française de Produits Pharmaceutiques
Anoⁱ ADRIAN et Cie.

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

HYDRALIN

Antiseptique gynécologique.

Composition. — Perborate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 12 fr. 50.

Traitement unité : 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-2.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 12-63.)

HYDRASTINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 mmgr. d'Hydrastine.

Alcaloïde principal de l'*Hydrastis canadensis*, exempt de Berbérine.

Propriétés. — Détermine la contraction du muscle utérin. Vaso-constrictrice et hypertensive. Accroît le tonus gastrique et intestinal. Sympathicolytique.

Indications :

a. *Essentielles* : Toutes les métrorragies ; ménorragies par congestion utérine primitive (Siredey). Kystes de l'ovaire, métrites hémorragiques. Hémorragies de la ménopause.

Aucune contre-indication.

b. *Secondaires* : Epistaxis. Hémorragies hémorroïdaires. Hémoptysies. Dyspepsies atoniques.

Présentation. — Granules à 2 mmgr.

Posologie et mode d'emploi. — 6 à 15 granules par jour en 2 ou 3 fois avant les repas, pendant 8 à 10 jours avant la date présumée des règles, ou dès le début de l'hémorragie. Ces doses peuvent être largement dépassées.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

HYDRASTIS GMET

Composition. — Extrait total liquide et sans alcool de l'*Hydrastis canadensis*.

Propriétés. — Décongestif, hémostatique, laxatif (par son action sur le foie).

Indications. — Hémorragies, Fibromes, Métrorragies, Congestions pelviennes, Hémorroïdes, Constipation.

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

La moins onéreuse des préparations d'hydrastis.

Le flacon de 135 cc.

Laboratoire GMET

27, rue du Faubourg-Montmartre
PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

HYDRATE DE MAGNÉSIE ADRIAN

Composition :

Hydrate de magnésie pur, légèrement sucré et menthé.

Propriétés :

Alcalin, saturant de l'acidité gastrique, anti-fermentescible, eupeptique, laxatif.

Indications :

Hyperchlorhydrie, gastralgies, fermentations acides, dyspepsie, constipation.

Présentation. — Comprimés dosés à 25 cg.

Posologie :

2 à 4 comprimés une heure avant le repas, renouveler après le repas si nécessaire.

Prix : 12 fr. 80 le flacon.

**Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 97-80, 81-82.)

HYDRORRHÉOL

Nouvelle formule. Même posologie.

Composition :

Doses minima d'amorçage, non toxiques, de teinture de belladone (1 goutte par cachet); carbamate d'éthyle et phénylsemicarbazide.

Propriétés :

Antispasmodique et antisécrétoire.
Modérateur de l'excitation vago-tonique.
Désensibilisateur.

Indications :

Hydrorrhée nasale, Rhinite spasmodique, Éternuement paroxystique, Rhume des foins, Hay-fever, Grippe au début.

Posologie :

En cas de crise : 1 cachet d'heure en heure ;
4 cachets en moyenne.

En saison et en période de crises : 2 cachets
par jour pendant 8 jours.

Présentation et prix :

Boîte de 20 cachets : 13 fr. 55.

Laboratoire Laryngologique.

R. CORDIER,

Docteur en Pharmacie,

45, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

Tél. : Dorian 57-79.

HYDROXYDASE

Antitoxine naturelle vivante, eau minérale naturelle du Breuil et du Broc (Puy-de-Dôme).

Composition. — *Eau minérale naturelle* chlorurée, bicarbonatée sodique, magnésienne et ferrugineuse ; jusqu'ici *unique en hydro-minéralogie*, donne des réactions oxydasiques.

Mode d'action. — Grâce à ses nombreux colloïdes naturels, elle fixe l'oxygène intérieur et le rétrocède aux toxines et déchets de l'organisme, les brûle, les détruit et les élimine. Augmente le pouvoir d'oxydation du système endocrinien, et supplée aux sécrétions des glandes déficientes.

Indications. — Intoxications endogènes (rhumatismes, goutte, diabète, eczéma, obésité, etc.).

Intoxications exogènes (convalescences difficiles, arthritismes, uricémie, indicanurie, urobilinurie).

Mode d'emploi. — Cure normale : un verre le matin à jeun et un verre une heure avant chaque repas pendant 20 jours (souvent renforcée par des injections sous-cutanées ou intramusculaires).

L'Hydroxydase, embouteillée au griffon sans contact avec l'air, doit être consommée, aussitôt débouchée.

Caissettes de 20 petites bouteilles — de 10 petites bouteilles

Boîtes de 10 ampoules de 10 cc. :

Source Marie-Christine du Breuil-sur-Couze déclarée d'intérêt public par décret du 2 septembre 1934.

Compagnie de l'HYDROXYDASE

Siège social, 10, rue Blanche — PARIS. (Tél. : Pigalle 83-15 et 83-16.)

HYGIOCHOLINE

Formule établie d'après les Enseignements de M. le D^r Henri Leclerc, ex-président de la Société de Thérapeutique.

Composition. — Extraits aqueux. Sans alcool et sans sucre.

Une cuillerée à café contient :

0 gr. 15 de Taraxacum.

0 gr. 20 de Polypode.

0 gr. 15 de Bourdaine.

Propriétés. — Cholagogue puissant, Stimulant antiseptique du foie et de la vésicule biliaire.

Indications. — Tous les troubles hépatiques, Congestion du foie et de la vésicule, Insuffisance hépatique, Lithiase biliaire, Cirrhoses, Cholécystite, Maladies des pays chauds, Constipation.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les repas de midi et du soir.

Prix, le flacon de 150 cc. : 23 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires de Phytothérapie Expérimentale
61, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e)

L. LOISEAU, Pharmacien.

(Tél. : Laborde 16-15.)

HYGIODINE

Composition. — Par cuillerée à soupe :

Iode métallique	0,030
Iodure de potassium.....	0,007
Bi-iodure de Hg.....	0,006
Méthylarsinate de soude ..	0,024

Indications. — Traitement discret et complémentaire antisyphilitique.

Aucune mention mercurielle ni spécifique sur le conditionnement.

Forme. — Elixir à base de vin iodotannique.

Posologie. — Une cuillerée à soupe dans un verre à liqueur avant chaque repas.

Voir composition.

Prix : 16 francs le flacon (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Deux formes. — **Élixir Hymel** (Hydrargyre et Miel), comportant un excipient spécial à base de miel, qui lui procure un goût très agréable et une tolérance parfaite pour l'estomac.

Suppositoires Hymel, préparés entièrement à froid, au mercure vif : 2 dosages :

Adultes.

Enfants et Nourrissons. (Calibre très réduit.)

Voir : **Élixir Hymel**,

Suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

HYOL

Médication inhalante, d'odeur agréable, d'efficacité certaine.

Composition. — Menthol cristallisé 1,7453. Gaïacol liquide 0,4363. Essence de thym 2,6178. Essence de lavande 1,3961. Essence de pin de Norvège 1,7452. Teinture de benjoin 13,0890. Teinture d'eucalyptus 13,0890. Teinture d'aconit (racine) 13,0890. Eau de laurier-cerise 4,3630. Teinture d'érysimum 4,3630. Essence de romarin 0,4363. Alcool à 80° 43,63. Pour 100 grammes. Les plantes aromatiques sont traitées par distillation.

Présentation. — En solution.

Indications. — Angine. Asthme. Bronchite. Coqueluche. Coryza. Emphysème pulmonaire. Enrouement. Grippe. Laryngite. Otite. Sinusite. Toux spasmodique.

Propriétés. — Aseptise les muqueuses jusqu'aux alvéoles pulmonaires, régularise rapidement les sécrétions, tarit l'expectoration.

Posologie et mode d'emploi. — *En inhalations* : Une cuillerée à café dans un verre d'eau très chaude. Respirer l'émanation pendant 8 à 10 minutes, 4 fois par jour. (Laryngite, bronchite, coryza, catarrhe du nez, coqueluche, otite suppurée.)

En évaporation à froid : Une cuillerée à café dans une soucoupe matin et soir. Laisser évaporer dans la chambre du malade. (Rougeole, coqueluche, scarlatine, bronchite, grippe.)

En pulvérisations : Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau bouillie. Pulvériser dans le fond de la gorge 4 ou 5 fois par jour (Angine, pharyngite, abcès, etc.)

En gargarismes : XV gouttes dans un demi-verre d'eau bouillie tiède, 4 fois par jour. (Toutes les affections de la gorge.)

Prix : 16 fr. 65.

R. CUNIASSE, Pharmacien.

6, Place des Ternes — PARIS (XVII^e) (Tél. : Wag. 39-93.)

HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 mmgr. et à 1/4 de mmgr.

Hyoscyamine Houdé. — Alcaloïde pur cristallisé extrait de l'*Hyoscyamus niger*.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique et anticonvulsivante, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique, où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante dans le parkinsonisme et la vagotonie. Arrête les tremblements séniles, le hoquet épidémique. Traitement de la chorée infantile, de l'épilepsie, des troubles de la démarche, etc...

Produit *absolument inoffensif* si l'on respecte la posologie, détaillée dans le conditionnement des flacons.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 granules *pro die*, les prendre avant les repas. Pas d'accumulation.

S'arrêter en cas de *vision brouillée*.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

HYOSTINAL

Composition. — Extrait végétal en gouttes pour le traitement des séquelles de l'encéphalite et du parkinsonisme.

Propriétés. — Constitue à la fois un traitement général anti-infectieux et symptomatique. Tonifie les muscles, ceux des membres surtout, influence la respiration en la régularisant et atténue la salivation. A la suite du traitement, la rigidité musculaire diminue, l'insomnie et la sialorrhée disparaissent progressivement.

Posologie. — *Matin* : de XII à XV gouttes du flacon n° 1.

Après-midi : de XII à XV gouttes du flacon n° 2.

Ensuite augmenter d'une goutte par jour de chaque flacon sans jamais dépasser 50 gouttes de chaque flacon.

Dans les cas très graves où la rigidité musculaire, le tremblement et la salivation persistent, on devra employer l'*Hyostinal* type fort.

Présentation : en boîtes de 2 flacons, type normal ou type fort.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE
25, rue Dagorno — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 56-71.)
Fournisseur des Hôpitaux et des Grands Réseaux de
Chemins de fer.

HYPALÈNE

Comprimés et Suppositoires.

Composition. — Combinaison de l'acide Cyclopentenyl-allylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

Action. — Analgésique, Sédatif, Hypnogène, Antispasmodique.

Indications. — Traitement de toutes les insomnies nerveuses, algies diverses, angoisse pré-opératoire, douleurs post-opératoires, spasmes douloureux du pylore.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Suppositoires de grosseur moyenne permettant leur usage aux adolescents et aux adultes et enveloppés dans une enveloppe de matière plastique hermétique.

Posologie des Comprimés (dosés à 0,15 ctgr.).

Insomnies : 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, une heure ou deux après le repas.

Algies diverses : 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

Angoisse, Nervosisme : 1 à 2 comprimés par 24 heures ou quelques minutes avant les interventions chirurgicales les examens médicaux douloureux, les soins dentaires.

Dose maximum par 24 heures : 6 comprimés.

Posologie des Suppositoires (dosés à 0,20 ctgr.).

Insomnies : 1 à 2 suppositoires en se couchant.

Algies diverses : 1 à 2 suppositoires dans les 24 heures au moment des douleurs.

Angoisse pré-opératoire : 1 ou 2 suppositoires la veille de l'intervention, 1 suppositoire une heure avant l'intervention.

Etats anxieux : 1 suppositoire par 24 heures.

Dose maximum par 24 heures : 4 suppositoires.

Adolescents : administrer la moitié des doses pour adultes (Comprimés et Suppositoires).

Prix :

<i>Comprimés.</i> Le flacon	14 fr. 60
— La boîte de 50 plaquettes.	106 fr. 60
— — de 10 plaquettes.	21 fr. 35
<i>Suppositoires.</i> La boîte de 6.....	14 fr. 60
— — de 18.....	32 fr. 25

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, bd Saint-Michel — PARIS (V^e).

(Tél. Odéon 22-01.)

HYPALÈNE - MAL DE MER

(Traitement préventif et curatif du Mal de mer.)

Composition. — Combinaison de l'acide cyclopentényl-allylbarbiturique avec le phényl-diméthyl-diméthylaminopyrazolone.

Forme pharmaceutique. — L'*Hypalène-Mal de mer* est présenté dans la même boîte sous forme de Comprimés et de Suppositoires.

Action. — Grâce à son action élective sur l'ensemble du système nerveux et spécialement sur le système nerveux vago-sympathique, *évite* l'ensemble des troubles causés par le Mal de mer, d'avion, de chemin de fer ou d'auto, qui peuvent aller des simples nausées aux vomissements incoercibles s'il est absorbé préventivement, ou les guérit si on a laissé ces troubles s'installer.

Posologie et mode d'emploi. — *A titre préventif* : un Comprimé (ou un Suppositoire) la veille du départ en bateau, ou dès la montée en avion, chemin de fer, auto. Huit à dix heures après, renouveler la même dose.

A titre curatif : Si on a laissé le mal de mer s'installer, mettre un suppositoire et au besoin le renouveler au bout de 2 à 4 heures. Si nécessaire, renouveler le traitement le lendemain. Lorsque les vomissements ont cessé, prendre à la moindre nausée un demi ou un comprimé.

Pour enfants de 8 à 14 ans : prendre la moitié des doses.

Nota. — Les suppositoires ont été créés pour les sujets qui se sont laissé surprendre par le mal de mer et qui ne garderaient pas les comprimés absorbés en raison des vomissements.

Prix. — La boîte de 10 comprimés et 4 suppositoires : 21 fr. 35.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, bd Saint-Michel — PARIS (V^e).

(Tél. Odéon 22-01.)

HYPALÈNE OBSTÉTRICAL

(Analgésie obstétricale.)

Comprimé et Suppositoire.

Composition. — Association de l'acide cyclopenténylallylbarbiturique avec son sel d'Ephédrine, la Belladone et un anesthésique local qui favorise la rétention du suppositoire.

Action. — Action analgésiante générale, légèrement hypnogène qui met la parturiente au calme tout en lui permettant d'aider activement le travail. Les contractions sont renforcées, régularisées et plus rapprochées. Il n'y a pas lieu de craindre un ralentissement du travail, au contraire. Les délivrances sont normales et se font sans incident.

Mode d'administration et doses. — Il faut éviter de donner des doses massives, non pas à cause de la toxicité du produit aux doses indiquées, mais uniquement parce qu'il est mieux de les espacer afin de provoquer et d'entretenir pendant toute la durée du travail une analgésie suffisante, en n'allant pas jusqu'à l'analgésie totale. *L'Hypalène obstétrical* n'a pas été créé pour la réaliser.

Ces remarques importantes étant faites : Attendre le commencement de la dilatation et, dès qu'elle a atteint le diamètre d'une pièce de 5 francs au moins, commencer par introduire un suppositoire dans le rectum. Si l'intestin a été débarrassé par un lavement évacuateur préalable, avant le début des douleurs, l'action est plus rapide, mais cette précaution n'est pas indispensable.

20 à 30 minutes après ce premier suppositoire, les effets commencent à se faire sentir : diminution de la douleur, régularisation et renforcement des contractions.

Si ce premier suppositoire était expulsé, il faudrait faire prendre un comprimé dans une petite tasse de tisane chaude sucrée.

Après cette première dose (suppositoire ou comprimé), il faut se baser sur la marche du travail et l'état d'analgésie et de conscience de la parturiente pour administrer d'autres doses (suppositoires ou comprimés), mais on peut sans danger donner un comprimé ou un autre suppositoire une heure après le premier.

L'absorption des médicaments étant plus rapide par voie stomacale que par voie rectale, on peut agir plus ou moins rapidement en utilisant un ou deux comprimés avant d'administrer le deuxième suppositoire si toutefois celui-ci est nécessaire.

Ne pas dépasser pour un accouchement et dans les 24 heures, chez une femme de poids moyen, 2 suppositoires et 5 comprimés pris en les espaçant. Donner la préférence aux suppositoires lorsqu'ils sont bien tolérés.

Un suppositoire de *Hypalène obstétrical* calme très rapidement les tranchées utérines, mais elles sont très rares en raison de l'action analgésiante de l'*Hypalène obstétrical* utilisé pendant l'accouchement.

Prix. — La boîte de 5 comprimés et 2 suppositoires : 15 fr. 60.

Laboratoires du Dr Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).
(Tél. Odéon 22-01.)

HYPERSAN

Médication hypotensive et diurétique.

Composition. — Association d'extraits fluides de Gui, Cratægus, Stigmates de maïs et Cascara.

Action. — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratægus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

Indication. — L'hypertension sous toutes ses formes.

Doses. — 30 à 50 gouttes, 3 fois par jour.
90 à 100 — le soir au coucher.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

HYPER-SÉRUM NAC

Sérum sulfaté chloruré sodique, légèrement hypertonique, avec adjonction de traces de glycoollate de cuivre.

Injections hypodermiques absolument indolores de 2 cc., 5 cc. ou 10 cc.

Indications. — 1° *Athrepsie, anémie des nourrissons* et tous les états qui y conduisent : vomissements, mauvais régime, diarrhée, dénutrition dans les maladies infectieuses, etc...

2° *Asthénie des adultes* : asthénie des hépatiques, asthénie [des surmenés, asthénie à la suite des maladies infectieuses, asthénie des cancéreux, etc...

Posologie. — *Nourrissons* : 2 ampoules de 2 cc. ; 2 ampoules de 5 cc. par jour comme traitement d'attaque dans l'athrepsie, les vomissements répétés, la gastro-entérite aiguë.

1 ampoule de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour pendant 15 jours dans les anémies et les gastro-entérites chroniques du nourrisson.

Adultes : 1 injection quotidienne de 10 cc. pendant 12 à 15 jours ; arrêter 6 jours et reprendre.

Présentation :

Boîte de 10 ampoules de 2 cc	14 fr.
— 10 — 5 cc	18 fr. 20
— 10 — 10 cc	21 fr. 30

Laboratoires du D^r RENAUD

E. RENAUD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine

2, place de la Duchesse-Anne — NANTES

HYPIODE

Composition. — Hyposulfite de Magnésium, 5 p. 100 ; Iodure de Sodium, 5 p. 100. En ampoules de 10 cc. et 20 cc.

Indications. — Dans les troubles liés à l'instabilité humorale. Algies de toutes sortes (Sciaticques, lumbagos, radiculalgies, etc.). Migraines, rhume spasmodique, urticaire, eczémas, etc. Séquelles d'encéphalites, états anxieux.

Formes. — Boîtes de 5 ampoules de 10 cc., prix : 23 francs. Boîtes de 5 ampoules de 20 cc., prix : 28 fr. 75.

Posologie. — Injecter par voie intraveineuse 10 à 40 cc. par jour, pendant 10 jours consécutifs.

Laboratoire Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault, COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 18-33.)

HYPNO-NERVINE

Régulateur et stabilisateur du système neuro-végétatif.

Présentation. — Forme dragées.

Indications. — États sympathicotoniques et vagotoniques, Syndromes solaires, Éréthisme cardiaque, Psychasthénie, Angoisse, Insomnies, Anxiété, Émotivité, Irritabilité, Mal de mer, Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies nerveuses, Cure de désintoxication. (Maximum d'activité. Aucune contre-indication.)

Composition :

Extrait de Valériane stabilisé.	0 gr. 10
Extrait de Cratægus stabilisé.	0 gr. 05
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 015
Gardénal	0 gr. 02
Pour 1 dragée.	

Posologie. — 2 à 3 dragées par jour. Cure pouvant être prolongée sans inconvénient.

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roq. 14-12.)

HYPOCHOLATE

des professeurs **G. CARRIÈRE** et **E. GÉRARD**.

Traitement de l'Hypertension artérielle.

Composition. — En ampoules de 2 cc., contenant 0 gr. 02 de CHOLALATÉ de SOUDE, chimiquement pur pour 1 cc. En suppositoires à 0 gr. 10. Il est employé avec succès égal en petits lavements dans la capsule rectale de 5 ou 10 cc. à la poire ou à la main, en utilisant le contenu d'une ampoule de 5 cc.

Indications. — Hypertension intermittente, Hypertension par pléthore, Hypertension intermédiaire entre pléthore et sclérose.

Posologie. — Injecter le contenu d'une ampoule **profondément sous la peau**, tous les jours au début. Puis, lorsqu'un abaissement suffisant a été obtenu, injecter seulement deux fois par semaine et même une seule fois le contenu d'une ampoule, ce qui parfois suffit pour maintenir l'abaissement de tension obtenu. Puis, au bout d'un temps variable, cesser le traitement, pour le reprendre plus tard s'il y a lieu.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

HYPOGUISTYL

Synthèse des Médications hypotensives.

Propriétés thérapeutiques :

Vertiges, hypertension, artério-sclérose.

Formule :

Benzoate de lithine, Poudre de foie, Silicate de soude, Théobromine, Extrait de gui du poirier, Nitrite de soude, Scammonée pulvérisée, poudre de scille, pancréas pulv.

Posologie :

2 comprimés avant les trois repas.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-13.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS

(Tél. : Diderot 04-71.)

HYPOPHÉDRINE

Éphédrine végétale française corrigée.

Composition :

Ephédrine végétale	0 gr. 03
Hypophyse totale	0 gr. 03
Ext. de Lobélie	0 gr. 01

Par dragée.

Indications. — Rhume des foins, Asthme, Bronchites emphysémateuses. Tous états dyspnéiques.

Avantages. — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaires, ni insomnie.

Posologie. — 3 à 4 dragées par 24 heures.

L'étui de 25 dragées : 22 francs.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e)
(Tél. : Littré 54-07.)

HYPOSTRONTIUM TORAUDE

Hyposulfite de strontium pur en solution à 20 p. 100 répartie en ampoules de 3 cc.

Intramusculaires.

(Et éventuellement buvables ou intraveineuses.)

Indications. — Dermatoses récidivantes, Intolérances, Intoxications, Anaphylaxies, Lithiases, Ictères, Etats spasmodiques, Inflammations des muqueuses, Manifestations arthritiques.

Avantages. — “*Hyposulfène intramusculaire*” bien supporté. Très actif (16,2 p. 100 de S neutre, 44 p. 100 de strontium). Forme commode pour nourrissons et enfants. (Buvable.) Action antispasmodique supérieure à celle de l'hyposulfite de soude. Aucune toxicité.

Dose. — Le contenu d'une ampoule 2 à 4 fois par semaine en injection intramusculaire (Intraveineuse : 2 à 3 par semaine. Buvable : une par jour au déjeuner).

Prix : La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

HYPOSULFÈNE

"Soufre soluble." — "Aliment soufré."

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'Hyposulfite de Na chimiquement pur, sec, stabilisé.

Doses. — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas.

Indications. — Dermatoses récidivantes : Eczéma, Strophulus, Prurits, Urticaires, etc. Intolérances alimentaires, Ictère, Acné, Séborrhée, etc. Indications du soufre. Insuffisance hépatique. Bronchites.

Action. — Très grande activité réductrice et sulfurante due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 65 pilules glutinisées : 16 fr. 50.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

La boîte de 10 ampoules : 27 francs.

Pour les intramusculaires, voir **HYPOSTRONTIUM**.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°). (Odéon 73-92.)

HYPOTAN COMPRIMÉS

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive (Bromure de méthylacétylcholine, bromure de bromocholine) associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

Propriétés. — Synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. L'**Hypotan** améliore la circulation périphérique et réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre la musculature lisse.

Indications. — Hypertension, spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'**Acécoline**; hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue, tolérance parfaite.

Boîte de 44 compr. Prix : 20 fr. Assur. Soc. Classe B.

AMPOULES INJECTABLES

Une ampoule de 1 cc. correspond à 2 cgr. de bromure de méthylacétylcholine (synonyme bromure d'acétyl - β - méthylcholine).

Propriétés. — 1° Hypotenseur 200 fois plus puissant à doses égales que l'**Acécoline**.

2° Artério-dilatateur d'effet très prolongé.

3° Excito-sécréteur et excito-moteur de l'appareil digestif.

Effets accessoires. — 1° Chez certains sujets : chute tensionnelle et bouffée vaso-motrice importantes. Abondance des sueurs et des sécrétions digestives.

2° Chez les asthmatiques, effet broncho-constricteur.

L'atropine (1/4 ou 1/2 milligramme) inhibe l'action de l'**Hypotan**.

Indications. — Hypertensions rebelles et paroxystiques. Médicament d'urgence dans les coliques de plomb, l'état de mal épileptique, l'éclampsie, les troubles de la ponction lombaire, l'iléus paralytique, les tachycardies paroxystiques.

Contre-indications. — Asthme et ses équivalents.

Posologie. — Dose normale : 2 cgr. par voie sous-cutanée. Tâter la susceptibilité du sujet avec une 1/2 ampoule.

Boîte de 6 amp. Prix : 22 fr. Assur. Soc. Classe B.

L'HYPOTAN ne doit pas être prescrit en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de ses effets vasculaires.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 44-32. Télégr. Chevrematte-90 — Paris).

HYPOTAN-PAPAVÉRINE

Composition. — Dérivés de la choline (bromure de méthylacétylcholine, bromure de bromocholine) associés à une faible dose de chloral et au phénylglycolate de papavérine.

Propriétés. — Les dérivés de la choline dilatent les artères par voie nerveuse. La papavérine atteint le même but par action directe sur le muscle artériel.

La somme de ces deux actions est un effet antispasmodique vasculaire complet.

Indications. — Hypertension, Nervosisme des hypertendus, Spasmes vasculaires.

Cure complémentaire de l'Acécoline-Papavérine.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas, 15 jours par mois.

L'Hypotan-Papavérine ne doit pas être prescrit en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de ses effets vasculaires.

Boîte de 44 comprimés : 21 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

HYPOTENSEUR VALE

Composition. — Silicate de magnésie, cratægus oxyacantha, borotartrate de potasse.

Présentation. — Granulé chocolaté.

Indications. — Artériosclérose, hypertension, vertiges, carence siliceuse et magnésienne.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillère à café matin et soir (au lever et au coucher).

Prix. — 16 francs la boîte de 120 grammes pour un traitement de 15 jours.

Laboratoire F. GUILBERT

Place d'Armes — HESDIN (Pas-de-Calais).

(Tél. : Hesdin 182).

HYPOTENSOL

Spécifique de l'Hypertension essentielle.

L'HYPOTENSOL condense, sous la forme la plus réduite et la plus active, les meilleurs agents hypotenseurs qui, administrés isolément, n'ont qu'une action restreinte et de peu de durée.

Composition. — *Benzoate de Benzyle*, antispasmodique par son action sur les muscles lisses, *Guj*, agissant sur les muscles striés des artères et sur le système vasomoteur, *Ail* antiseptique et vaso-dilatateur, *Scille* diurétique et tonocardiaque éprouvé.

Indications. — L'HYPOTENSOL spécifique de l'Hypertension essentielle ou solitaire, qu'on observe si souvent chez les sujets atteignant ou dépassant la quarantaine, est conseillé également avec succès constants dans les hypertensions diathésiques, affections artérielles ou veineuses sans crainte d'incompatibilité avec les agents médicamenteux nécessités par la diathèse, comme les médications mercurielles ou iodurées.

Posologie. — Dose initiale : X gouttes deux fois par jour dans un peu d'eau matin et soir, augmenter jusqu'à XL gouttes par jour sans dépasser cette dose, concurremment avec tous médicaments et régimes que comporte la diathèse.

Durée du flacon, à XX gouttes par jour : environ 20 jours.

Prix : 10 francs.

Laboratoire des LICES

38, rue des Lices — ANGERS (M.-et-L.). (Tél. : 32-30.)

HYPO-THIORINE

Hyposulfite de soude pur.

Deux formes :

1° *Comprimés* glutinisés et dragéifiés, dosés à 0 gr. 50 d'hyposulfite Na desséché.

2° *Ampoules* de 10 cc. à 20 % (injection intraveineuse).

Indications :

Médication anti-choc. — Phénomènes anaphylactiques de toutes natures. Intolérance arsenicale, bismuthique ou aurique. Erythrodermies toxiques et médicamenteuses.

Médication antirhumatismale. — Rhumatismes chroniques, déformants et ankylosants.

Arthropathies gonococciques, Erythème noueux.

Médication dermatologique. — Dermatoses séborrhéiques, Séborrhées, Acné, Furoncles, Anthrax, Eczémas, Psoriasis, Prurits divers.

Médication hépato-intestinale. — Insuffisance hépatique, Ictère. Constipation.

Médication respiratoire. — Dans tous les cas où le soufre est indiqué l'hypo-thiorine réalisera sans dangers et sans fatigue pour l'organisme l'apport de soufre nécessaire.

Dose et mode d'emploi :

1° *Comprimés* : avaler sans croquer 2 à 6 comprimés par jour aux repas.

2° *Ampoules* : cas graves — 1 injection intraveineuse chaque jour ou à jour passé, dans l'intervalle 2 à 6 comprimés par jour.

50 Comp. : 14 fr. 45 — 10 Amp. : 29 fr. 35 — 1 Amp. : 4 fr. 30.

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Ph¹o, 39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

I. A. M.

Iodo-méthyl-Arsinate de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Composé organique, réalisant sous une forme optima l'action synergique de :

L'ion iode histotrope, leucopoïétique, lymphagogue.

L'ion arsenic stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

L'ion manganèse vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux 1928*).

Indications. — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, Etats anémiques, Asthénies, Etats de dépression, Asthme, Convalescences.

Posologie. — *Gouttes* « I. A. M. » (*adultes*), XV à XX gouttes matin et soir.

Gouttes « I. A. M. » (*enfants*), 1 goutte par année d'âge matin et soir.

Sirop « I. A. M. » (*enfants*), 1 cuillerée matin et soir.

Littérature et échantillons
Docteur LAVOUÉ — RENNES.

IDONIL

Complexe organique (bioton) extrait du poisson frais, ne renfermant ni huile, ni graisse, ni protéines.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue (lécithines, alcools supérieurs).

Toutes celles des nucléines pures de la totalité du poisson, Soit : anémies (syphilitique, paludéenne, post-opératoire), neurasthénie, déficiences organiques, fatigue et surmenage physique et intellectuel, lymphatisme, enfants débiles, arriérés, retardés, rachitiques, etc...

Action. — Intégralement assimilable, si l'intestin n'est pas colmaté. Aucune contre-indication.

Doses moyennes :

Comprimés : 3 à 4 aux repas, au début, puis 4 par jour.

Granulé (*enfants*) : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Présentation :

Comprimés, en boîte aluminium (40), une semaine : 22 francs.

Granulé, en boîte carton, une semaine : 11 francs.

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

IFRANOL

Composition. — Quinine, arsenic, strychnine, manganèse et toni-cardiaque.

Propriétés. — *Spécifique des pyrexies* par la quinine ; *reconstituant, stimulant et tonique* par la strychnine, l'arsenic et le manganèse ; *anti-infectieux, cardio-tonique*.

Indications. — Maladies infectieuses (**grippe** et angines grippales en particulier), convalescence et prophylaxie de la grippe.

Formes. — *Dragées* : 0 gr. 10 de quinine par dragée.

Suppositoires (Suppo-Ifranor) : 0 gr. 20 de quinine par suppositoire

Posologie et mode d'emploi :

Grippe aiguë. — *Adultes* : six dragées ou trois suppositoires par jour.
Enfants : de 1/3 à 2 suppositoires 1/2, ou de 1 à 5 dragées, suivant l'âge.

Convalescence. — *Adultes* : 2 ou 3 dragées, ou 1 suppositoire par jour, pendant une dizaine de jours au moins.

Enfants : de 1/4 à 1 suppositoire, ou 1 à 2 dragées, suivant l'âge.

Prophylaxie. — Une dragée par jour.

Flacon de 30 dragées. — Boîte de 10 suppositoires.

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

IMIDO « ROCHE »

Composition. — Solution injectable de bichlorhydrate d'Histamine dosée à 1 milligramme par cc.

Propriétés. — Détermine une sécrétion abondante du suc gastrique permettant la réalisation pratique de l'épreuve de l'Histamine ; détermine également réactions locales et générales, ainsi qu'une action rapide sur les douleurs.

Indications. — Particulièrement utile pour poser le diagnostic des ulcères et des cancers gastriques.

Utilisé également dans toutes les applications thérapeutiques de l'Histamine : arthrites rhumatismales, dyspnées asthmatiformes, rhume des foins, etc.

Posologie. — Une seule ampoule en injection sous-cutanée (épreuve de l'Histamine). 1/4 à 1/2 ampoule en inj. intradermique ou scarifications.

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-15.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél. : Archives 91-10.)

IMINASTHME

Médication abortive de la crise d'asthme.

Un seul comprimé d'IMINASTHME pris dès l'apparition des signes avant-coureurs de la crise d'asthme, la fait avorter presque à coup sûr sans danger pour le malade.

Composition :

Agaricine	0,005
Théophylline	0,10
Papavérine	0,02
Caféine	0,10

Thérapeutique. — Grâce à la double association Agaricine-Théophylline et Caféine-Papavérine, l'IMINASTHME a une toxicité beaucoup moindre que celle de ses composants, ce qui permet de le laisser aux mains du malade. Il agit rationnellement sur l'équilibre vago-sympathique.

En aucun cas, l'IMINASTHME ne peut être nuisible, ou contrecarrer un traitement général, car :

- 1° Il ne produit aucun effet secondaire ;
- 2° Il ménage la circulation (pas de vaso-constricteurs directs) ;
- 3° Il ne provoque pas d'accoutumance (absence de barbituriques et d'analgésiques).

Posologie. — Dès les premiers symptômes faisant craindre à l'asthmatique une crise (toux, expectoration rare et gluante, etc.), prendre un comprimé d'IMINASTHME avec un peu d'eau.

Si le malade prévoit une crise nocturne, il doit prendre un comprimé, le soir en se couchant, et deux comprimés si les crises se déclarent habituellement à la fin de la nuit.

La boîte de 10 comprimés : 14 fr. 50

Littérature et échantillons :

Laboratoires SERVIER

ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

IMMUNICORPS MARY LAURENT**Immuno-thérapie
physico-chimique**

(Complexe Carbono-Iodo-Magnésien.)

Traitement des maladies infectieuses, aiguës ou chroniques, par voie buccale.

Indications :

Grippes, Angines, Pneumonies, Otites, Rhumatismes, Septicémies, etc., assurent la fixation et la collection du pus : Furunculose, Anthrax.

Dose d'attaque :

50 gouttes 2 fois par jour.

Dose d'entretien :

30 gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau. Dépourvus de toute toxicité, pas de contre-indication.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ
6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

IMMUNIDERM GRÉMY

Pommade Vaccin.

Pommade vaccinante réalisant l'association du bouillon vaccin concentré et du Bactériophage.

Bouillon vaccin concentré 9,09

Bactériophage staphylo 2,70

Lanoline, vaseline aa 9,09

Sulf. double d'oxyquinoléine de potasse 0,015

Pour un tube de 30 grammes.

Indications :

Furonculose, Anthrax, Sycosis, Prurit, Ulcères variqueux, Plaies et brûlures infectées et toutes dermatoses.

Posologie :

Appliquer sur la partie infectée une couche de pommade, qu'il sera utile de protéger par une feuille imperméable fixée au moyen de leucoplaste.

Prix : 14 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

IMMUNIZOLS

Vaccins

I. Ampoules

Boîtes de 5 ampoules

— de 2 —
— de 1 —

10. Furunculose, Ostéomyélite.
11. Entérite, Appendicite.
13. Asthme, Asthme des foins.
15. Eczéma.
16. Bronchites chroniques.
17. Rhumatismes.
18. Urétrites.
19. Acné.
22. Typhoïde.

II. Bouillons-Vaccins pour panséments. (3 amp. de 10 cc.)

10. Furunculose et toutes staphylococcies.
24. Streptococcies.
25. Pneumococcies.
26. Colibacilloses.
31. Abscess chauds.
35. Ulcères variqueux.
36. Brûlures infectées.
41. Métrites.
50. Otites, Rhino-Pharyngites, Sinusites.

Le n° 50 existe également en boîtes de 5 ampoules de 5 cc. Prescrire (" B. V. 50 Vapo ").

Prix : 22 francs.

III. Hibévé.

Bouillon-Vaccin concentré, polyvalent, à diluer pour obtenir un demi-litre de bouillon-vaccin normal.

Prix : 50 francs.

IV. Comprimés.

Avec pilules adjuvantes de bile.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 10. Furunculose - Ostéomyélite. | 22. Typhoïde. |
| 11. Entérite-Appendicite. | 31. Abscess, plaies infectées. |
| 13. Asthme, Asthme des foins. | 40. Cystites, Pyélonéphrites. |
| 15. Eczéma. | 41. Métrites. |
| 18. Urétrites. | 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire. |

Prix : 22 francs.

14, rue de Clichy

GRÉMY

Microbiens

Injectables.

de 2 cc. : 27 fr. 50.

de 1 — : 9 —

de 2 — : 6 fr. 50.

23. Grippe.

24. Streptococcies, infections puerpérales.

31. Abscess chauds, plaies suppurées.

34. Gangrène.

40. Cystites, Pyélonéphrites.

41. Métrites, Salpingites.

50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.

70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

Immuniphages (bactériophages). (10 amp. de 2 cc.).

N° 10. Toutes staphylococcies.

N° 11. Infections intestinales.

N° 26. Colibacilloses.

N° 31. Infections pyogènes.

Prix : 28 francs.

Ovules à l'Immunizol n° 41 pour pansements gynécologiques.

Prix : 22 francs.

V. Collyre.

(à l'Immunizol Bouillon-vaccin).

En pipettes compte-gouttes. Prix : 25 francs.

VI. Immuniperos.

(Vaccins liquides pour vaccination buccale.)

Boîte de 10 ampoules de 5 cc.

10. Furunculose.

11. Infections intestinales.

15. Dermatoses.

22. Fièvre typhoïde.

Prix : 22 francs.

VII. Immuniderm.

Pommade à l'Antivirus et au Bactériophage

Prix : 14 francs.

— PARIS (IX^e).

R. C. Seine 229.088 B.

IMMUNOVACCIN ANTIRHUMATISMAL

Composition. — Bacille d'Achalme + entérocoques.

Forme injectable. — 5 séries (I, II, III, IV, V) à doses croissantes. Débuter par la série II pour le Rhumatisme articulaire aigu et la Chorée. Débuter par la série I pour le Rhumatisme viscéral, subaigu ou chronique.

Indications. — Toutes les formes cliniques de l'infection rhumatismale : Rhumatisme articulaire aigu, subaigu, myoarticulaire, chronique, Endocardite, Myocardite, Péricardite, Pleurésie rhumatismale, Sciatique, Névrites, Névralgies rhumatismales, Chorée, Thyroïdites, Arthritisme, Dermatoses streptococciques.

Forme à ingérer. — Ampoules de 5 cc. Une ampoule par jour.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique ne pouvant pas être traité par la forme injectable. Manifestations douloureuses gastro-intestinales, hépatiques, rénales des arthritiques ; Hypertension, Insuffisance cardiaque, syndromes angineux liés à l'Arthritisme.

Prix. — La boîte : 30 francs.

Laboratoire des IMMUNOVACCINS
8, avenue des Sources — NICE.

IMPÉTIGOL

Présentation. — Pommade en tube. Poids brut : 60 gr. environ.

Composition. — I complexe minéral : Iode-Cuivre associé à I complexe phytothérapique : Calendula — Hypericum — Thymus.

Composition en grammes p. 100 :

Protoiodure de cuivre.....	5 gr.
Huile de millepertuis.....	12 gr.
Tincture mère de souci.....	4 gr.
Huile essentielle de thym.....	4 gr.
Lanoline.....	40 gr.
Vaseline.....	35 gr.

Indications :

Dermatologie :

Streptococcies cutanées. Impétigo, Intertrigos, Dermatoses croûteuses et squameuses, Dermatoses à forme circonscrite, à forme nummulaire, Eczéma rétro-auriculaire. Sporotrichoses, Tricophytoses, Folliculites staphylococciques, Acné pustuleuse, Echthyma, Suppurations récentes ou anciennes, Ulcères variqueux non eczématisés, Plaies infectées rebelles.

Gynécologie. — Ulcérations du col de la métrite cervicale.

Mode d'emploi. — En applications ou en frictions suivies d'applications.

Prix au public. Le tube : 10 fr. 40.

Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 1501-2.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires JAUFFRET : NÉOBIOL-IMPÉTIGOL
Vanves, près PARIS

L. JAUFFRET, pharmacien, ex-Interne des Hôpitaux
Correspondance et Bureaux : 181, av. Victor-Hugo, CLAMART (Seine).
(Tél. : Michelet 04-71.)

INAVA

Pâte dentaire immunisante.

(Voir à Vaccins.)

Pâte gingivale bleue au Pyodarsénol.

(*Fuso-strepto-vaccin gingival Inava B
associé au Sulfarsénol.*)

Antipyorrhéique. — Antispirillaire.

Pour prévenir et traiter :

*La suppuration des gencives, la carie dentaire
et le déchaussement des dents.*

Et toutes Gingivites, Stomatites et Pyorrhée.

Tube ord. : 7 fr. 25 — Tube g. mod. : 9 fr. 10.

Laboratoire INAVA

E. Guignier, pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Association d'extraits opothérapiques et végétaux.

Composition :

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune
simple associés aux sucs glandulaires de : Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications :

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi :

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 17 fr. 70

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 47-00.)

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

Composition. — Principes actifs d'Hamamélis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale, Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonivascular et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 14 fr. 55.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél.: Dorian 47-00.)

INFANGYL CARLIER

Composition :

Thiocol, antipyrine, tolu.....	ââ	0 gr. 02
Benz. de Na, Eau de laurier-cerise	ââ	0 gr. 04
Teinture de Drosera		0 gr. 08
Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café.		

Indications. — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et striduleuses.

Propriétés. — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

Posologie. — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourrissons : demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Prix : 13 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1226-2.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil, JOINVILLE-LE-PONT (Seine).
(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

INFRA-ROUGES

- 1° Plaies et ulcérations atones, infections cutanées et sous-cutanées.
- 2° Troubles circulatoires (œdèmes, cellulite, stase veineuse, troubles de la circulation artérielle, engorgements ganglionnaires).
- 3° Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies.
- 4° Douleurs abdominales : entéro-colite, périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux.
- 5° Névralgies et névrites.

Vente et location de tous appareils et accessoires à :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 90-13.)

INHALANTYL

Définition. — Inhalantyl se présente sous forme de comprimés prompts à se désagréger, à base d'essences balsamiques extraites de zestes de fruits. Il ne contient ni alcool, ni menthol.

Originalité. — Sa nouveauté et sa raison d'être sont de deux ordres :

- 1° Nous avons fait appel à un groupe d'essences puissamment antiseptiques, utilisées pour la première fois d'une façon systématique pour la désinfection des voies aériennes supérieures, nous voulons dire les essences de zestes d'agrumes, dont les travaux poursuivis dans divers laboratoires de la Faculté de pharmacie de Lyon et des thèses soutenues depuis lors ont montré l'action remarquable contre les microbes habituels des voies aériennes supérieures : méningocoque, streptocoque, staphylocoque, Lœffler, etc. Des stations expérimentales italiennes, installées pour la plupart en Calabre, ont apporté mêmes résultats probants (notre laboratoire avait déjà mis ces essences sur le plan supérieur qu'elles méritent en les utilisant pour l'huile balsamique qu'il a dénommée *Balsamorhinol* et qui a fait ses preuves).
- 2° Pour garder les essences pures dans les comprimés, nous utilisons un excipient-support *inerte* dont les mailles ou trabécules maintiennent les essences *prisonnières à l'état de fines gouttelettes*. Le comprimé jeté dans l'eau chaude se dissocie immédiatement : les essences subtiles sont libérées et happées par les voies respiratoires avec la vapeur d'eau ; le support devenu inutile se dépose au fond du bol. Ainsi sont maintenues en captivité, sans altération, des particules aussi subtiles et évanescences que celles des essences pour être libérées au moment opportun.

Action. — Les essences balsamiques utilisées agissent de manière élective contre les agents microbiens des fosses nasales, du rhinopharynx, du larynx, de la trachée et des bronches. Elles se dégagent d'emblée (et continûment durant cinq à six minutes), gagnent avec la vapeur d'eau chaude l'ensemble des cavités aériennes et de leurs annexes (sinus, trompe d'Eustache) jusqu'aux alvéoles pulmonaires, décongestionnant et aseptisant toutes les muqueuses de l'arbre respiratoire.

Indications. — Toutes les affections inflammatoires, banales ou grippales, parties du nez et du rhino-pharynx et tombant sur la gorge ou les bronches ; toutes celles aussi qui touchent d'emblée le larynx et les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire : *coryzas, sinusites, rhinopharyngites, pharyngites, angines, — laryngites, enrrouement, aphonie, toux, — trachéites, bronchites, affections grippales avec ou sans complications.*

Mode d'emploi. — Trois inhalations par jour en moyenne (matin, midi et soir), de cinq minutes chacune, préparées en faisant dissoudre dans un bol d'eau bouillante, ou dans un inhalateur, 1 à 2 comprimés. Respirer les vapeurs alternativement par le nez et par la bouche.

Nota. — Le dépôt qui, après inhalation, reste au fond du bol est sans valeur. Il est constitué par l'excipient qui servait de support aux essences balsamiques.

Prix : boîte de deux tubes de comprimés, 15 fr. 85.

Laboratoire FIDES, R. VOUZELLAUD, docteur en pharmacie.
14, rue de la Comète — PARIS (VII^e). — Tél. : Invalides 64-13.

INHALATION-GARGARISME

« VOCALDOP »

Composition. — Perborate et salicylate de soude, eucalyptol, menthol.

La poudre VOCALDOP réunit en une seule prescription médicale synthétisant la thérapeutique externe naso-pharyngienne :

une **inhalation** et un **gargarisme**.

1 cuillerée à		Inhalation
café de	+ H ² O	Respiration nasale
Poudre	chaude =	et gargarisme.
<i>Vocaldop</i> .		Bain buccal.

L'Inhalation-Gargarisme *Vocaldop* remplace avantageusement les solutions alcooliques et les teintures (benjoin, eucalyptus, tolu). En effet, les vapeurs éthyliques sont nocives pour la Voix, l'alcool « fixe » les tissus des organes phonateurs. (*Thèse de Doctorat 1924.*)

Prix : 9 fr. 55.

Laboratoire Laryngologique.

R. CORDIER,

Docteur en Pharmacie,

45, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 57-79.)

INHALATION LANCOSME

Composition. — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

Présentation. — Liquide.

Propriétés. — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

Indications. — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

Contre-Indications. — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

Emploi. — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante ; deux à trois inhalations par jour.

Prix : 13 fr. 50.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

INHALO BOL

Cornet pour inhalations
(en papier parcheminé).

Simple,

pratique,

bon marché.

Indications thérapeutiques :

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 6 fr. 25.

Laboratoire de l'INHALO-BOL

32, rue de l'Ouest — PARIS

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

INHALO-SEL

Composition. — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles (pin, niaouli, eucalyptus).

Avantages thérapeutiques. — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 7 francs.

Laboratoire de l'Inhalo-Bol

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, docteur en pharmacie.

INHALO-THIORINE

Hydrogène sulfuré naissant.

Forme. — Comprimés pour inhalations (hydrogène sulfuré à l'état naissant, essence de Niaouli et Terpinol).

Propriétés. — L'INHALO-THIORINE permet de réaliser à domicile la cure sulfureuse externe par inhalation d'Hydrogène sulfuré à l'état naissant.

Dans les affections des voies respiratoires, c'est le complément de la cure interne de Sulfo-Thiorine.

Indications. — Rhinites, Sinusites, Pharyngites, Trachéites, Enrouements, Laryngites chroniques, Catarrhes, Bronchites.

Mode d'emploi. — Un comprimé dans un bol d'eau bouillante pour inhalation de 4 à 5 minutes.
2 à 3 inhalations par jour.

30 comprimés. Prix : 14 fr. 70.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 820-04.)

INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

Composition. — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

Mode d'emploi. — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques,

Indications. — Coryza, laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en **huile** pour instillations et pulvérisations.

Prix : 11 fr. 45 et 13 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e). Aut. 71-98.

INHESS

Inhalations sèches, sans vapeur d'eau.

Composition. — Essences balsamiques débarrassées des éléments toxiques ou irritants et composants d'essences qui les diluent et en renforcent l'action.

Indications. — Coryza, Rhinites, Adénoïdites, Trachéo-Bronchites descendantes.

Préventif des complications pulmonaires : Grippe, Rougeole, Coqueluche, Emphyseme et Sclérose pulmonaire.

Soins pré et post-opératoires.

Laryngites aiguës, Toux et Douleurs laryngées des tuberculeux, Toux spasmodiques.

Posologie. — 3 à 6 inhalations par jour.

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

INOCRININES

Extraits non glycerinés de glandes fraîches en ampoules buvables non injectables.

Toute la gamme endocrinienne.

Formules simples :

0 Epiphysine.....	0 gr. 02	4 Hypophysine ant...	0 gr. 10
1 Thyroïdine	0 gr. 025	5 Hypophysine tot..	0 gr. 10
2 Ovarine	0 gr. 10	6 Surrénine	0 gr. 10
3 Orchitine.....	0 gr. 10	7 Thymusine	0 gr. 50

Formules associées :

8 Thyroïdine	0 gr. 025	13 Thyroïdine.....	0 gr. 025
Hypophysine ant..	0 gr. 10	Hypophysine ant....	0 gr. 10
9 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine	0 gr. 10	14 Thyroïdine	0 gr. 025
10 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Hypophysine ant.	0 gr. 10
Orchitine.....	0 gr. 10	Ovarine	0 gr. 10
11 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Surrénine	0 gr. 10
Surrénine	0 gr. 10	15 Thyroïdine.....	0 gr. 025
12 Thyroïdine	0 gr. 025	Hypophysine ant ..	0 gr. 10
Hypophysine ant...	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine	0 gr. 10	Surrénine	0 gr. 10

Formuler : ampoules buvables d'Inocrinines, formule n° 00, 1 boîte.

Doses et mode d'emploi. — Selon l'avis du médecin.

La boîte de 10 ampoules : 28 fr. 75.

Laboratoires des INOCRININES

4, route du Médoc — BORDEAUX-BOUSCAT (Gironde).

INOLAXINE

Granulé mucilagineux végétal, naturel, pur, sans adjonction d'aucun produit laxatif chimique.

Propriétés. — L'*Inolaxine* absorbe 40 fois son volume d'eau. Elle augmente le bol intestinal et lui donne une consistance moelleuse. Elle favorise les mouvements péristaltiques et facilite l'acheminement des matières fécales. Elle agit mécaniquement et ne détermine pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, atonie intestinale.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

Mettre à sec sur la langue, sans mâcher, avaler avec un peu de liquide.

Présentation. — En boîte petit modèle à 14 fr. 55.

Boîte grand modèle (contenance quadruple), 46 fr. 80.

Échantillons

Laboratoires du Dr DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS.

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées):

INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar désodorisé.

Propriétés. — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

Indications. — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès. Soins de la gorge et du nez. Gynécologie. Ulcérations du col. Pansements des plaies.

Mode d'emploi.

Lavages : 2 à 3 cuillerées à café par litre d'eau.

Gargarismes : *Bains de bouche* : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

Badigeonnages : pur ou au demi.

Inhalations.

Dentifrice : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

Prix : le flacon, 17 fr. 65.

SPÉCIALITÉS INOLÈNE

Inolène simple : Soins des muqueuses et des plaies. (Voir ci-dessus.)

Inolène vaseline (Nasolène) : Antisepsie des fosses nasales.

Inolène thymolé : Antisepsie générale. (Injections, pansements 2 à 3 cuill. à café par litre d'eau.)

Inolène ovules : Gynécologie.

Inolène pommade et Inolène poudre : Dermatologie. Prurits. Plaies.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, Pharmacien.

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 25-51.)

INORÉNOL

Extrait désalbuminé et délipéïdé de rein.

Indications. — Albuminurie, Urémie, Uricémie, Arthritisme, Néphrites aiguës ou chroniques, Rhumatismes.

Résultats. — Augmentation de la diurèse et de l'élimination des chlorures, de l'acide urique et de l'urée ; abaissement de la concentration de l'albumine urinaire.

Posologie. — 1 à 2 ampoules buvables et injectables par jour, ou 2 à 6 dragées à jeun ou loin des repas, pendant des cures de 12 jours, alternées avec des périodes de repos de 10 jours.

Présentation :

La boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc. : 33 fr. 30.

La boîte de 10 ampoules injectables de 2 cc. : 29 fr. 10.

L'étui de 40 dragées : 18 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

INOSEPTA

Pommade à base de bouillon-vaccin de streptocoques, staphylocoques, b. pyocyaniques.

Traitement des pyodermites, furoncles, acné, impétigo, toutes lésions cutanées infectées.

Le tube : 16 fr. 65.

Le 1/2 tube : 9 fr. 35.

FILTRAT INOSEPTA

Présentation en ampoules du même bouillon filtré, pour pansements locaux.

La boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 24 fr. 95

INOSEPTA AURICULAIRE

Filtrat des mêmes cultures, obtenu en partant de souches prélevées exclusivement sur des infections auriculaires.

Furonculose du conduit auditif, otite, mastoïdite, etc.

La boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 20 fr. 80.

INOSEPTA OPHTALMIQUE

Pommade à base de filtrat de cultures de streptocoques, staphylocoques, b. pyocyaniques, bacilles de Morax, pneumocoques de Fraenkel.

Traitement des blépharites, conjonctivites, orgelets, dacryocystites, toutes les infections oculaires.

Le tube avec embout : 11 fr. 45.

INOSEPTA PUERPÉRAL

Filtrat de cultures de streptocoque puerpéral pour traitement préventif et curatif des fièvres puerpérales. En tamponnement ou injections vaginales.

La boîte de 6 ampoules de 20 cc. : 37 fr. 45.

INSÉVA

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Échantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e)

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

INOTYOL

Pommade adoucissante, réductrice et cicatrisante. Traitement de toutes les affections cutanées ou irritations de la peau : eczémas, ulcères, prurits, érythèmes, rougeurs des nouveau-nés.

POUDRE INOTYOL

Toilette des bébés, préventions des rougeurs.

Présentation :

Pommade INOTYOL :	le 1/2 tube :	7 francs.
—	—	Le tube : 12 francs.
—	—	Le quadruple tube : 29 francs.

Poudre INOTYOL. La boîte poudreuse :
7 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).
Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

INSTITUT PASTEUR

SÉRUMS		Prix de vente au Public
Antidiphthérique		
3 000 unités. 10 cc. liquide	7. »	10. »
5 000 unités. 10 cc. —	10.50	15. »
10 000 unités. 10 cc. —	24.50	35. »
Antidiphthérique purifié		
(Dose préventive), 1 000 unités.....	7. »	10. »
(Pour traitement), 5 000 unités.....	14. »	20. »
Antitétanique :		
3 000 unités In ^{ies} 10 cc. liquide....	7. »	10. »
20 000 unités In ^{ies} 10 cc. (p ^r trait)..	35. »	50. »
Antitétanique purifié		
(Dose préventive) 3 000 unités Int.	10.50	15. »
(Pour traitement), 10 000 unités Int.	28. »	40. »
Antistreptococcique , 10 cc. liquide .	7. »	10. »
Antiméningococcique , 10 cc. liq ...	7. »	10. »
Antidysentérique , 10 cc. liquide ...	7. »	10. »
Anticolibacillaire , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antivenimeux , 10 cc. liquide	14. »	20. »
Antivenimeux en flacon auto-injec- teur	21. »	30. »
Anticharbonneux , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antipesteux , 20 cc. liquide	14. »	20. »
Antipneumococcique , 20 cc. liquide	14. »	20. »
Anti-gangréneux :		
Antiperfringens , 20 cc. liquide	14. »	20. »
Antisporogenes , 20 cc. liquide.....	14. »	20. »
Antioédématis , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antivibrion-septique , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antihistolitique , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antigangréneux Polyvalent , 20 cc. liquide.....	14. »	20. »
Antipoliomyélitique , 10 cc. liquide .	17.50	25. »
Les sérums desséchés en flacon de 1 gr. correspondant à 10 cc. liquide.....	10.50	15. »

VACCINS

Prix
de vente
au Public

Antidiphtérique

(Anatoxine), boîte 3 ampoules.....	10.50	15. »
(Anatoxine), flacon 10 cc	10.50	15. »

Antitétanique

(Anatoxine), boîte 3 ampoules.....	10.50	15. »
(Anatoxine), flacon 10 cc.....	10.50	15. »

Antistaphylococcique

(Anatoxine), boîte 4 ampoules.....	17.50	25. »
------------------------------------	-------	-------

Antidiphtérique-Antityphoïdique,

3 ampoules	14. »	20. »
flacon 10 cc	14. »	20. »

Antidiphtérique-Antitétanique,

3 ampoules.....	14. »	20. »
Flacon 10 cc	14. »	20. »

Anti-Diphtérique-Tétanique-Typhoïdique

Boîte 3 ampoules	17.50	25. »
Flacon 10 cc.....	17.50	25. »

Antistaphylococcique

(Furonculose), 6 ampoules.....	17.50	25. »
(Ostéomyélite), boîte 6 ampoules....	17.50	25. »

Antigonococcique , boîte 6 ampoules	17.50	25. »
--	-------	-------

Tétra-vaccin Antipyogène, boîte 6 ampoules	17.50	25. »
--	-------	-------

Antipneumococcique , boîte 6 amp .	17.50	25. »
---	-------	-------

Anticholérique , boîte 2 ampoules...	5.60	8. »
---	------	------

Antityphoïdique , boîte 3 ampoules ..	10.50	15. »
--	-------	-------

Antipesteux , flacon 10 cc	10.50	15. »
---	-------	-------

Extrait d'antigène tuberculeux

Dilué, 10 ampoules	21. »	30. »
--------------------------	-------	-------

Pur, 10 ampoules	24.50	35. »
------------------------	-------	-------

Tuberculine brute , 1 cc	7. »	10. »
---------------------------------------	------	-------

Tuberculine au 1/100, 1 cc	2. »	3. »
---	------	------

Institut PASTEUR

36, rue du Docteur-Roux — PARIS.

(Adr. télég. : Serpasteur Paris. Tél. : Ségur 07-95.)

INSULANOL

Composition. — Pommade à l'Insuline.

Propriétés. — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

Indications. — Ulcères variqueux, Prurits de toute nature, Hémorroïdes, Plaies fistuleuses, Brûlures, Plaies atones.

Forme. — Tube de 35 gr. environ.

Posologie. — En onctions épaisses sur les parties malades. Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Prix : 18 fr. 20.

Remboursement aux Assurés Sociaux :
Catégorie B.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Voir **POUDRE ET POMMADE
D'INSULINE PHYLOZE**

**Laboratoire
de l'Endopancrine**

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 26-87.)

INSULINE BUCCALE FORNET

Principe actif :

Extrait des flots de Langerhans du Pancréas.

Présentation :

Concentration III (Pilules rouges : 4 unités par pilule).

Concentration I (Pilules vertes : 1 unité par pilule).

Posologie. — 3 pilules 3 fois par jour, strictement une 1/2 heure avant les repas.

Indications. — Tous les cas justiciables de l'Insuline (cas graves exceptés). (Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoercibles, acétoniques, cardiopathies, etc.).

Observations :

Avoir toujours recours à la concentration forte au début du traitement.

Prix : 49 francs et 25 francs.

Vente et Échantillonnage :

Laboratoires THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

INSULINE CHOAY

Nature. — Hormone hypoglycémiant extraite des flots endocriniens du pancréas.

Indications:

Diabète grave. Complications du diabète même léger.

Acidose diabétique ou non diabétique.

Cures d'engraissement.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires, sous-cutanées, parfois intraveineuses (coma).

Posologie. — Très variable suivant l'indication.

Cas d'un diabète moyen : 20 à 40 unités par jour, en deux fois, avant les repas.

Formes pharmaceutiques :

Solution faible : amp. de 1 cc = 10 unités intern.

Solution normale : amp. de 1 cc = 20 unités intern.

— flac. de 5 cc = 100 unités intern.

— flac. de 10 cc = 200 unités intern.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

INSULINE « LÉO »

Décret n° 65 du 8 juillet 1931.

Indications. — Diabète, cures d'engraissement et toutes autres applications de l'Insuline.

Forme. — Ampoules de 5 cc. contenant 100 u. i. (1 cc. — 20 u. i.)

Ampoules de 5 cc. contenant 200 u. i.
(1 cc. — 40 u. i.)

Ampoules de 5 cc. contenant 400 u. i.
(1 cc. — 80 u. i.)

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, suivant l'indication du médecin.

L'Insuline « Léo » ne contient aucun antiseptique, sa stérilité est absolue, les injections en sont indolores, son activité est constante grâce à sa teneur régulière en u. i., et elle conserve toute son efficacité pendant deux ans.

INSULINE RETARD « LÉO »

INSULINE PROTAMINÉE

Décret n° 94 eu 19 juin 1937.

Boîtes de : 5 ampoules 200 u. i. en 5 cc.
(1 cc. — 40 u. i.)

et 1 ampoule de solution complémentaire.

LA SERINGUE SPÉCIALE « LÉO »

grâce à ses deux graduations permet de mesurer la dose exacte d'insuline directement en unités.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX
(Tél. : 80-989).

Dépositaire et Pharmacien Garant pour la France et Colonies.

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

INSULINE « NOVO »

Décret d'autorisation n° 75 du 4 août 1933.

Indications. — Diabète, Cures d'engraissement.

Forme. — *Ampoules* de 5 cc. contenant 100 U. I. (soit 20 U. I. pour 1 cc.). Prix : 15 fr. 60.

Ampoules de 5 cc. contenant 200 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.). Prix : 29 fr. 20.

Ampoules de 5 cc. contenant 400 U. I. (soit 80 U. I. pour 1 cc.). Prix : 57 fr. 20.

Emballages pour cliniques et hôpitaux, soit :
10 flacons, chacun de 100 U. I. Prix : 73 fr.
10 flacons, chacun de 200 U. I. Prix : 140 fr.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses.

L'Insuline NOVO est recommandée pour sa grande pureté et son action constante. Elle ne provoque ni irritations, ni intoxications ; elle est de plus d'une conservation parfaite, sans adjonction d'aucun antiseptique.

ZINC-PROTAMINE-INSULINE

Complexe insoluble dont la dissociation lente dans l'organisme, retarde l'action hypoglycémiante de l'insuline libérée.

Forme. — Flacons de 5 cc. contenant 200 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.).

Flacons de 10 cc. contenant 400 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.).

Emballages pour cliniques et hôpitaux, soit :
5 flacons de 10 cc., chacun 400 U. I.

Laboratoires du Docteur H. MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS

(Tél. : Archives 39-44.)

INSULYL

Composition. — Solution d'insuline pure.

Propriétés. — Abaisse la glycémie. Permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications. — a. *Diabète et ses complications.*

b. *Traitement Insuline-sucre* : Cure d'engraissement ; Insuffisance hépatique ; Cirrhoses ; Insuffisance cardiaque : Arythmie, Asystolie ; Métrorragies, Ménorragies, Dysménorrhée.

c. *Médicament de choc* : Asthme, Urticaire, Schizophrénie.

Formes :

1° Boîte de 10 ampoules de 1 cc. à 20 unités par ampoule.

2° Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 40 unités par ampoule.

3° Tube de 5 cc. à 20 unités par cc.

4° Tube de 5 cc. à 40 unités par cc.

Posologie. — En moyenne 20 unités en injection intramusculaire avant chaque repas. Associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

Prix : Ampoules : 30 fr. Tube à 20 U. I. : 16 fr, Tube à 40 U. I. : 30 fr.

Remboursement aux Assurés Sociaux { Ampoules. Catégorie A.
Tubes. Catégorie A.

Laboratoire du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

INTESTARSOL

Réalise le complexe à la fois cicatrisant et parasiticide de la muqueuse intestinale.

Composition :

Acide Oxyacétylamino-phényl arsinique 0,50

Charbon animal spécial 10

Charbon de peuplier 10

Magnésie anglaise 5

Excipient aromatisé... Q. S. P. 100 grammes.

Indications. — Diarrhées, colites et entéro-colites, gastro-entérites, entérites tuberculeuses, fermentations, flatulences, toutes intoxications et colibacilloses paravitoses (oxyures, ascarides).

Posologie. — 2 à 4 cuillères à dessert par jour suivant le cas, délayées dans un peu d'eau et de préférence assez loin des repas.

Présentation et Prix. — 17 francs la boîte de 120 grammes de granulé fondant.

Laboratoires H. CALAS

162, rue de l'Hay — GENTILLY (Seine).

(Tél. : Alésia 19-02.)

INTESTO

(Granulés)

Présentation. — En tube métal.

Principes actifs. — Charbon végétal pulvérisé, Kaolin, Sous-nitrate de bismuth, Bicarbonate de soude.

Indications. — Entérites, Colites, Stases intestinales et tous états toxi-infectieux d'origine intestinale, Diarrhées des adultes et des nourrissons, Fermentations intestinales, Météorisme ou ballonnement et gaz.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à potage une demi-heure avant les repas ou le matin à jeun.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.

Peut être croqué ou délayé dans l'eau.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

INTRAIT DE DIGITALE DAUSSE

Préparation de Digitale conservant intacts tous les principes actifs de la feuille fraîche. (Stabilisation par le procédé Perrot et Goris.)

Toni-cardiaque à zone maniable très étendue.

Formes. — Solution d'Intrait de Digitale à prendre par gouttes; correspondant comme posologie à la solution officinale de digitaline à 1 p. 1 000.

Ampoules d'Intrait pour injections hypodermiques ou intraveineuses.

Chaque ampoule contient 2 cc. de solution et chaque centimètre cube correspond à 25 milligrammes d'Intrait de Digitale.

Granules d'Intrait de Digitale à 0 gr. 01, colorés en rose.

Posologie. — *Dose d'entretien cardio-tonique*: Granules à 1 centg. : 1 ou 2 par jour. — Solution d'Intrait : V à VII gouttes par jour en moyenne. Pendant une quinzaine.

Doses sédatives: Granules à 1 centg. : 3 à 5 par jour. — Solution d'Intrait : XV à XX gouttes par jour, pendant 3 à 4 jours avec intervalle de 10 à 12 jours.

Ampoules: 1/2 ou 1 ampoule.

Dose antiasystolique:

Solution d'Intrait : L à LV gouttes, en 3 prises, pendant une journée seulement.

Ampoules: 2 ampoules en une seule fois par voie hypodermique.

Une ampoule par voie intraveineuse.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. (Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux spécifique des *Hémorroïdes*, *Varices*, *Phlébites*.

Forme. — *Solution d'Intrait de marron d'Inde* : X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

Mode d'emploi. — *Usage interne* : *Solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*. V gouttes matin et soir.

INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*.) Toni-cardiaque puissant.

Formes. — *Solution d'Intrait de Strophanthus* : X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

Ampoules d'Intrait de Strophanthus dosées à un milligr. d'Intrait par cc.

Indications. — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiorénaux et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

Posologie. — **SOLUTION D'INTRAIT** : *Dose d'entretien cardiotonique* : V gouttes par jour pendant 15 jours.

Dose antiasthénique. — XX à XXX gouttes en une fois.

AMPOULES D'INTRAIT. — Exclusivement par *voie intramusculaire* : 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

**Antispasmodique
sédatif du système nerveux.**

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

Forme. — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

Indications. — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

Nervosisme, *irritabilité nerveuse*, *affections spasmodiques*, *dermatoses prurigineuses*, *chorée*, *tics*, *convulsions infantiles*.

Posologie. — *Solution d'Intrait de Valériane* : 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE PASSIFLORE COMPOSÉ

Préparation d'intrait de Passiflore associé à l'intrait de Valériane, à l'Aubépine et au Gelsemium Dausse titré physiologiquement.

Propriétés. — Calmant de l'excitation cérébrale. Antispasmodique, Modérateur de l'éréthisme cardiaque, Sédatif nervin.

Indications. — Affections spasmodiques ; palpitations cardiaques réflexes ; états anxieux ; insomnie d'origine nerveuse.

Posologie et mode d'emploi. — Régulateur du système nerveux ; 1 à 2 cuillerées à café avant chacun des 2 principaux repas.

Calmant des insomnies nerveuses :

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRA-REIPAR

Composition. — Solution d'acide salicylique injectable par voie intraveineuse.

Indications. — Toutes les indications de la médication salicylée : Rhumatisme articulaire aigu, particulièrement les formes graves ou à localisations viscérales, Névralgies et leurs séquelles, Sclérose en plaques, Parkinsonisme.

Avantages. — Action rapide et sûre. Aucune réaction soit locale, soit générale. Aucun des inconvénients du salicylate de soude par voie buccale (troubles gastriques, acidose) ou par voie intraveineuse (sclérose, etc...).

Aucune contre-indication.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 22 francs.

Prix spéciaux pour pharmaciens, cabinets médicaux, Hôpitaux et Cliniques.

Échantillons sur demande.

LES LABORATOIRES DRAPIER

RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

IOCASINE

Comprimés d'iodo-caséine pure.

*Régularise le métabolisme de l'iode,
Renforce les défenses anti-infectieuses de l'organisme.*

Propriétés particulières :

Iocasine doit à la caséine, molécule protidique bien tamponnée, d'être : la moins labile des combinaisons iodées, à l'abri des variations de pH du milieu, elle ne provoque pas de libération d'iode massive, cause d'accidents d'hyperiodémie brusque.

Sans action irritante sur le tube digestif, pas d'intolérances gastriques. Elle est la plus assimilable des combinaisons iodées, évitant les accidents dus à la rétention tardive ou à l'accumulation.

Iocasine doit enfin à la caséine, molécule de composition définie, un substratum invariable sur lequel l'iode se fixe en proportions constantes, facteur de stabilité qui manque aux peptones.

Indications. — Toutes celles de la médication iodée.

Posologie. — *Adultes* : 3 comprimés par jour, au milieu des repas. *Enfants* : 1 comprimé par jour.

Remboursé par les Assurances Sociales à 80 %.

UNION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

5 et 7, rue Claude-Decaen, PARIS (XII^e). (Did. 37-93.)

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant 5 cgr. d'iode par cc.
Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications internes, sans iodisme.

Arthritisme. — **Goutte.** — **Rhumatisme.**
— **Artério-sclérose.** — **Maladies du cœur et des vaisseaux.** — **Affections glandulaires.**
— **Rachitisme.** — **Goitre.** — **Fibrome.** — **Syphilis.** — **Obésité.**

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 17 fr. 95.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer — St-MANDÉ (Seine).
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

IODAMÉLIS LOGEAIS

Formule. — Préparation basée sur la combinaison d'iodo-iodure de potassium et d'hamamélidine donnant naissance à un iodotanin complexe, dont le dédoublement lent et progressif permet l'utilisation totale de l'iode ingéré.

Propriétés :

Stimulant de la circulation artérielle et veineuse.

Sclérolysant efficace, vasodilatateur et hypotenseur, eupnéique.

Stimulant des glandes endocrines, du tissu lymphoïde et du métabolisme basal.

Indications :

Maladies de la circulation artério-veineuse : artériosclérose, hypertension, pléthore des hypervisqueux cyanose, jambes en poteau, varices, hémorroïdes, etc.

Maladies de la nutrition : lymphatisme, scrofule, adénopathies, obésité, maladie de Basedow, rhumatisme chronique, goutte chronique, asthme, emphysème bronchite chronique, etc...

Maladies gynécologiques : troubles de la puberté et de la ménopause, métrites chroniques, etc...

Posologie. — L gouttes d'*Iodamélis* contiennent : 0,03 d'iode, 0,20 d'iodure de potassium et 0,20 d'hamamélidine.

Doses : De XX à L gouttes par jour aux deux principaux repas, dans un peu d'eau (Vichy de préférence).

Tolérance parfaite. Pas d'iodisme.

Prix : Un flacon (1 mois de traitement) : 20 fr. 55.

IODAMÉLIS COMPRIMÉS

Comprimés glutinisés et enrobés contenant chacun 0 gr. 10 d'iodotanin de l'*Iodamélis*, sous forme d'un *extrait sec, neutre et sans iode libre*, reproduisant exactement la composition de l'*Iodamélis* « gouttes ».

Six comprimés équivalent à L gouttes d'*Iodamélis*.

Prix : l'étui de 50 comprimés : 20 fr. 55.

Doses. — De 2 à 6 comprimés par jour.

(Voir *Opo-Iodamélis*).

Laboratoires Jacques LOGEAIS

ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

IODAMOL MICHEL

Composition :

Combinaison d'iode et de glucose titrée de telle façon que V gouttes représentent 1 cgr. d'iode métallique chimiquement pur entièrement combiné au glucose. XX gouttes correspondent à 1 gr. d'alcalin.

Indications :

Tuberculose infantile, lymphatisme, végétations adénoïdes, poussées ganglionnaires, adénopathies trachéo-bronchiques, sclérose artérielle ou veineuse, maladies du cœur et des vaisseaux, arythmies, néphrites chroniques, varices, syphilis acquise ou héréditaire, mycoses cutanées.

Présentation et prix :

Le flacon : 15 francs.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : X à XL gouttes par jour.

Enfants : V à XV gouttes par jour.

Laboratoire Central de la Bastille

F. BAYLOT

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 38-31.)

IODARGOL

Formes. — Flacons de 45 cc., ampoules, suppositoires.

Composition. — Suspension huileuse d'Iode colloïdal électrochimique, différant de l'Iodéol par sa concentration en iode (12 gr. 50 p. 100) et par la grosseur de ses micelles.

Propriétés. — Antiseptique sans toxicité ni causticité, il n'exerce aucune action traumatisante sur les tissus. Grâce à son extrême diffusibilité, il pénètre rapidement dans les cryptes des muqueuses et les anfractuosités des plaies. Il ne coagule pas les albumines. Ne tache pas la peau.

Indications. — *Flacons* de 45 cc. : Dans les pansements des plaies de toute nature, les brûlures, etc., en pansements vaginaux, en badigeonnages dans les orchio-épididymites, en instillations dans les otites, otorrhées, rhinites, antiseptie des voies génitales, au moment de l'accouchement.

Ampoules : Ne doivent pas être utilisées en injections sous-cutanées ou intramusculaires.

Y recourir dans :

Urétrites : traitement abortif et curatif, par injections intra-urétrales à l'aide de notre seringue spécialement construite, dite « Seringue DELTA », y associer l'IODÉOPIRINE : 6 comprimés par jour.

Cystites, folliculites.

Métrites : en instillations intra-utérines.

Pyélites : en lavages du bassin.

Suppositoires : Chaque suppositoire contient 0,15 d'Iodargol.

Dans les blennorragies compliquées de prostatites, dans la prostatite idiopathique : 1 suppositoire le soir pendant une dizaine de jours. Donner en outre comme antiseptique urinaire :

6 comprimés par jour d'IODÉOPIRINE.

Présentation :

Flacon de 45 cc. Prix : 18 francs.

Boîtes de 10 ampoules. Prix : 15 francs.

Boîtes de 10 suppositoires. Prix : 15 francs.

Seringue Delta. Prix : 10 francs.

Échantillons et littérature sur demande :

Laboratoire E. VIEL, 37, avenue de l'Opéra.

Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.

Usine à RENNES, 11 et 12, boulevard de Chézy.

(Tél. : 20-61.)

IODARPHOS

Composition. — Combinaison de Glycérophosphate de soude, méthylarsinate de soude. Iodure d'arsenic, chlorure de manganèse en solution.

Forme. — A prendre en gouttes.

Mode d'emploi :

Enfants : II à X gouttes avant les 2 repas.

Adolescents : X à XV gouttes avant les 2 repas.

Adultes : XV à XX gouttes avant les 2 repas.

Propriétés. — Traitement des affections ganglionnaires, Rachitisme, Anémie, Scrofulose, Lymphatisme, Bronchite chronique, Asthme.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 403-46.

Pharmacie LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XI^e).

IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES du Docteur Guiraud

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme, Rachitisme, Scrofulose, Emphyseme, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans II à X gouttes par jour.
— 2 ans à 8 ans IV à XX —
— 8 ans à 15 ans IV à XXX —
Adultes X à XL —

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 35 gr.

Prix : 17 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Marcadet 37-98.)

IODARSINE JICEM

Toutes les indications de l'Iode et des Iodures sans leurs inconvénients.
Puissant stimulant glandulaire et cellulaire.

Régénérateur des organes de défense et du système lymphatique.

Saveur agréable, Tolérance parfaite, Assimilation complète, Effets constants.

Une seule forme : élixir.

Composition. — Combinaison stable d'Iode organique assimilable + extrait spécial dont l'action synergique en augmente les effets.

Une cuillerée à café contient 0,04 d'Iode pur et 0,50 d'extrait spécial phosphaté.

Indications. — Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Rachitisme, Adénite, Goitre, Rhumatisme, Goutte, Obésité, Grippe et maladies infectieuses, Troubles de la formation et de la ménopause, Artériosclérose, Sénilité, etc...

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à café matin et soir.

Enfants : 1 cuillerée à café le matin, pure, dans de l'eau ou du lait.

Ces doses moyennes peuvent être augmentées par le médecin, suivant les cas et les résultats à obtenir.

Laboratoires JICEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 14-89.)

IODASCLÉRINE

Combinaison organique d'Iode directement assimilable par voie digestive sans dommage pour l'estomac.

Formule. — Iode 3 — INa , IK , BrNa , chimiquement purs, à 1 gr. substratum peptoné 94 gr., soit 0,05 par 1 cc.

Champ d'action. — 1° Affections cardio-vasculaires, artérites, douleurs angineuses, hypertension chronique, artériosclérose, phlébosclérose, hémorroïdes.

2° Goitre exophtalmique, arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, obésité, maladies de la ménopause, etc.

3° Lymphatisme, adénopathies, scrofule, etc.

4° Bronchites chroniques, asthme, emphysème, etc.

5° Maladies spécifiques, héréditaires et acquises, infections, mycoses, etc.

Dans l'intervalle des médications toni-cardiaques, l'Iodasclérine est le traitement de fond des scléroses vasculaires et viscérales (une seule contre-indication commune à toutes les préparations iodées : l'œdème du poulmon).

Par son action sur les glandes endocrines et la nutrition, l'Iodasclérine est le spécifique de la goutte, de l'obésité, du rhumatisme chronique. Dans le lymphatisme, les affections chroniques des voies respiratoires, dans les vieilles affections syphilitiques et mycosiques, l'Iodasclérine est antiscérosante, antiseptique et résolutive.

Dose. — Adultes de X à L gouttes dans un peu d'eau au milieu des repas. Enfants de IV à X gouttes suivant l'âge.

Prix : 21 fr. le flacon.

Produits SANOVA

Lab. TACHOT, 103, rue St-Lazare — PARIS (IX°). (Tél. : Tri. 04-49.)

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — (Iodobenzométhylformine) contenant 42 p. 100 d'iode : soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Propriétés thérapeutiques. — Dérivées de la nature de ses composants ; iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzolés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie). Adénopathies, Paludisme, Spirillose, Puissant tonique du cœur.

Prép. pharm. Posologie. — *Ampoules* : A. 2 cc., B. 5 cc., C., 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire *indolore*.

Rhumatismes chroniques (do ses fortes) : 5 à 20 et même 25 cc. *pro die*.
Tuberculose (doses faibles) : 2 à 5 cc.

Gouttes : XXX à C par jour (*enfants* : XX à L).

Prix : *Ampoules* A. 2 cc. 21 francs — *Ampoules* B. 5 cc. 28 fr. 50.

— C. 10 cc. 42 francs — *Gouttes*, le flacon, 19 francs.

Iodaseptine salicylée.

Dans les rhumatismes, aigus ou subaigus en injections intraveineuses ou intramusculaires, joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Tolérance parfaite. Supplée le traitement salicylé à haute dose qui ne peut être continué longtemps.

Ampoules de 5 cc. et de 10 cc. — *Solution* gouttes.

Doses. — Une ampoule matin et soir en injection intraveineuse, ou intramusculaire.

En ingestion : 50 à 100 gouttes par 24 heures en deux fois.

Prix : *Ampoules* 5 cc. 30 francs.

— *Ampoules* 10 cc. Boîte de 4 et 10 ampoules. 19 et 44 francs.

— *Solution*, le flacon. 21 francs.

Laboratoires CORTIAL. — 7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Téléph. : Suffren 53-70 et 53-71.)

IODASSIUM

Solution iodo-iodurée (Lugol stabilisé).

1 p. 100 d'Iode — 2 p. 100 d'Iodure de Potassium.

Préparé avec iode et iodure de K chimiquement purs ; stabilisé en solution spéciale, l'iodassium réduit au minimum les possibilités d'iodisme.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant du tissu lymphoïde. Régulateur thyroïdien. Antimycosique. Toutes affections ganglionnaires, adénopathies, lymphatisme, scrofule, etc. Goitre, insuffisance thyroïdienne troubles circulatoires, obésité, artério-sclérose, maladies mycosiques, lichen.

L'iodassium peut être associé au staprolysat pour la thérapeutique vaccino-iodée des affections neurotropes.

Posologie :

Adultes : 1 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : X à L gouttes 2 fois par jour, 1 cuillerée à café = LXX gouttes = 0,05 iode ; 0,10 KI.

(Mélanger à l'eau, au vin, au lait et absorber au début des repas.)

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

IODAUBÉPINE

Établi sur des bases scientifiques contrôlées par une longue expérimentation chimique, l'**Iodaubépine** constitue à l'heure présente le remède qui donne les résultats les plus heureux dans les maladies dues à l'altération des cellules et des humeurs de l'organisme.

Par sa composition (association du Crataegus et de l'iode combiné avec la peptone), à laquelle sont dues ses propriétés toniques, sédatives et vaso-dilatatrices, l'**Iodaubépine** en même temps qu'il active les échanges de notre économie, en facilite l'élimination des toxines. Son emploi est particulièrement indiqué dans les Maladies du Cœur et des Vaisseaux, l'Artério-Sclérose, l'Angine de Poitrine, l'Asthme et l'Emphysème, la Néphrite interstitielle et l'Obésité, le Goitre et les diverses affections glandulaires.

Doses (*sauf avis spécial du Médecin*).

Adultes : XX à XXV gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée ou non.

Enfants : V à X gouttes 3 fois par jour.

(Durée du traitement de l'unité : 15 à 18 jours.)

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, r. des Francs-Bourgeois — PARIS — Tél. : Arch. 63-27.

Détail dans toutes les pharmacies.

IODE COLLOÏDAL ROZE

Composition et présentation. — Dragées dosées à 3 cgr. d'iode colloïdal Rozé.

Avantages. — Equivaut thérapeutiquement à 30 cgr. d'iodure alcalin, sans en avoir les inconvénients.

Indications. — Scrofule, adénites, adénopathies générales, rachitisme, goitre, goutte, rhumatisme chronique, artériosclérose, arthritisme, obésité, hypertension, asthme, emphysème pulmonaire, bronchites, sclérose du tympan, maladies du fond de l'œil, début de cataracte entérites, fièvre typhoïde, amygdalites, angines, diphtérie, grippe, etc., etc.

Posologie. — 6 à 10 dragées par 24 heures.

Prix : 14 fr. 60.

Trois autres formes :

1° Pommade à l'Iode Colloïdal Rozé à 10 % : 13 fr. 50;

2° Ovules à l'Iode Colloïdal Rozé ou Colloviodes, renfermant 2 gr. d'iode Colloïdal par ovule : 18 fr. 75.

3° Ophtalmiodes, pommade au 1/10^e : 13 fr. 50. (Collyre gras).

Laboratoire de Biologie Appliquée

GASTON ROZE

Docteur en Pharmacie

2, allées de Chelles — LE RAINCY (Seine-et-Oise)..

IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine).

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes pharmaceutiques :

Sirop. — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe. 18 fr. 50.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist. 18 fr. 50.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 15 francs.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour 18 fr. 50

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

IODÉOL

Ampoules, Capsules, Iodéol externe, Ovules.

Composition. — Iode colloïdal électro-chimique (Brevets E. Viel), en suspension huileuse à 10 p. 100 stabilisée par un camphène.

Propriétés. — Toutes les indications de la médication iodée, absolument sans iodisme (s'élimine non sous forme d'iodure, mais sous la forme d'un complexe organique iodé). Non congestif. Agit même comme décongestif dans les affections de l'appareil respiratoire.

Rapidement diffusible, l'IODEOL est leucopoiétique, bactériocide, antitoxique.

Indications. — Ampoules. Injections intramusculaires dans toutes les infections : les tuberculoses, les mycoses, les rhumatismes aigus et chroniques, la fièvre puerpérale.

Doses. — De 1 à 2 ampoules par 24 heures. (Demander la notice spéciale.)

Capsules. — Bronchite catarrhale, emphysème, asthme essentiel, hypertension des artérioscléreux, arthrite rhumatismale.

Doses. — De 4 à 6 capsules par 24 heures ; par 2 avant les repas.

IODÉOL EXTERNE. — Adénopathies, bronchites, érysipèle, furoncle au début, en badigeonnage 2 fois par jour.

Ovules. — Métrites, vaginites, ulcérations génitales. (Voir à *Ovules à l'Iodéol.*)

Présentation.

Ampoules : Boîtes de 8 ampoules de 1 cc... Prix 25 francs.
(avec seringue hypodermique)

Capsules : Etui de 60 capsules..... Prix 15 francs.

Iodéol externe flacon de 15 grs..... Prix 8 francs.

Echantillons et Littérature sur demande.

E. VIEL, 37, av. de l'Opéra, PARIS. — Tél. Opéra 66-55 et 67-18
Usine à Rennes, 11 et 12, boulevard de Chézy. — Tél. 20-61

IODÉOPIRINE

Formes. — Comprimés, Pommade.

Composition. — L'*Iodéopirine* est l'acide Acétyl-Iodo-Salicylique obtenu par la combinaison de l'Iode atoxique électrochimique, avec l'acide salicylique acétylé (Brevets E. Viel). Chaque comprimé est dosé à 0,05 de produit actif.

Propriétés. — L'*Iodéopirine* possède, avec l'activité bien connue de l'ion salicylique, les propriétés bactéricides et antitoxiques de l'Iode colloïdal électrochimique (*Iodéol*). La combinaison exalte d'une manière intense les propriétés de chacun des constituants. Antirhumatismal, antithermique, analgésique et anti-infectieux général, l'*Iodéopirine* agit en provoquant la formation de cryptotoxines immunigènes. Grâce à sa grande diffusibilité, son action est extrêmement rapide, sa toxicité est nulle, et cette rapidité d'action rend inutile l'usage des injections hypodermiques ou intraveineuses.

L'*Iodéopirine* s'élimine par les urines, sous la forme d'acide iodosalicylique; de ce fait, elle agit électivement sur les germes des voies urinaires, colibacille et gonocoque en particulier.

Indications, Posologie.

- 1° Dans la *Colibacillose* aiguë, septicémie colibacillaire, la colibacillurie, pyélonéphrites, cystites, 6 à 12 comprimés par 24 heures ;
- 2° Dans les *infections aiguës*: Grippe, Rhumatismes articulaire aigu et infectieux, Chorée, Pneumonie, Typhoïde. Dans la septicémie puerpérale, combiner au traitement par les ovules à l'*Iodéol*, 6 à 12 comprimés par 24 heures ;
- 3° Dans les *rhumatismes chroniques*, sciatique, goutte, 4 à 10 comprimés par jour ; l'*Iodéopirine* n'est pas seulement un médicament *symptomatique* de la douleur rhumatismale ; grâce à l'iode, qui est un puissant modificateur du terrain, elle réalise le traitement de fond le plus actif du rhumatisme, qu'elle guérit ou stabilise : 21 cas traités, 17 guéris, 4 stabilisés (cf. Thèse Robin, mars 1938, travail d'un des principaux services hospitaliers de Paris).
- 4° Dans l'*Hypertension artérielle*, les polyscléroses, 2 à 3 comprimés par jour, pendant 10 jours consécutifs, repos pendant les 10 jours suivants et reprendre ;
- 5° Dans l'*angine de poitrine*, action sédative rapide sur la douleur et l'angoisse, 1 à 2 comprimés d'heure en heure, au moment ou en prévision des accès ;
- 6° Dans la blennorragie et ses complications, associé au traitement local par l'*Iodargol* (voir *Iodargol*), 6 comprimés par 24 heures.

Pommade au 1/25^e absolument inodore, effets rapides sur la douleur et le gonflement articulaire. En applications locales.

Présentation. Comprimés, tube de 20 : 15 fr. Pommade : 15 fr.

Echantillons et littérature sur demande.

E. VIEL

37, avenue de l'Opéra — PARIS. (Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.)

Usine à Rennes, 11 e 112, boulevard de Chézy. (Tél. : 20-61.)

IODEX

Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

Iodex simple.

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Principales indications: adénopathies, oreillons, goîtres, impétigos, trichophyties, furoncles, traumatismes.

Iodex au Salicylate de Méthyle

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes, lumbagos, pleurites, points de côté, névrites, entorses.

Iodex liquide.

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures).

Échantillons et Littérature :

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

IODHÉMA

Iodo - alcoylate - méthyle - benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solution aqueuse (43 p. 100 d'iode assimilable).

Indications :

Toutes les formes du rhumatisme chronique.

Formes :

- 1° *Ampoules* de 5 cc. (18 fr. 70) et de 10 cc. (35 fr. 35)
1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2° *Flacons* (35 fr. 35) (voie enterale ou digestive), 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée entre les repas.

Mêmes présentations pour :

- 1° *Iodhéma M* (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique 16 fr. 65 et (32 fr. 25) ;
- 2° *Iodhéma B* (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques (23 fr. 90) et (39 fr. 50).

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e).

IODIFORMINE

Composition. — Solution titrée d'iodométhylate d'hexaméthylène-tétramine (42 p. 100 d'iode).

Indications. — Antiseptique général des infections chroniques et parasitaires. Toutes les indications de l'iode. Rhumatismes. Sciatiques. Adénopathies. Troubles circulatoires.

Préparations pharmaceutiques :

Ampoules de 5 cc. (Boîte de 10 amp.).
Ampoules de 10 cc. (Boîte de 10 amp.).
Gouttes.

Posologie :

Ampoules : Par voie intramusculaire ou intra-veineuse, 1 injection tous les jours ou tous les 2 jours.

Gouttes : De L à C gouttes par jour en 2 fois.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires HENRI FRILLEY

94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

IODINJECTOL JAMMES

Médication iodée intensive indolore.

Composition. — Iodure de formine benzo-sodique : 20 cgs. par ampoule de 3 cc.

Indications. — Celles de l'iode et des iodures.
IODINJECTOL salicylé (Iodinjectol + 20 cgs. de salicylate de soude).

Action rapide et énergique sur les crises aiguës de tous rhumatismes, Sciatiques.

Posologie des trois formes :

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

IODINJECTOL gouttes : LX à C gouttes par jour.

Prix au public :

Ampoules : 26 francs. *Gouttes* : 18 fr. 70

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

ODOCAÏNE

Traitement des douleurs de toutes natures par les injections anesthésiantes locales.

Composition. — Chlorhydrate d'éthocaïne (novocaïne), 0,05 cgr., Caféine, 0,05, Iodure de sodium, 0,10, Sérum physiologique, 10cc.

Indications. — Rhumatisme chronique, névralgies, sciatique, lumbago, douleurs musculaires, cellulite, etc.

Technique. — Injecter tous les deux jours une ou deux ampoules au point maximum de la douleur repéré par la palpation.

Présentation et Prix. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 22 francs.

VINCENT, Pharmacien

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

IODOCALCIUM

La forme moderne du Sirop Iodotannique.

2 formes : Sirop, Gouttes.

Composition. — Une cuill. à café d'Iodocalcium Sirop ou XX gouttes Iodocalcium Gouttes renferment :

Gluconate de calcium..... 0 gr. 10

Chlorure de calcium..... 0 gr. 10

Iode en combinaison organique 0 gr. 01

Indications. — Toutes celles de l'iode et du calcium.

Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, pré tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc...

Posologie :

Enfants au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café de sirop ou X à XX gouttes de la forme gouttes, 2 fois par jour

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert de sirop ou XX à XL gouttes 2 fois par jour, au début des deux principaux repas.

Mode d'emploi. — Les gouttes doivent être prises dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France

19, avenue d'Orléans — Paris (XIV^e).

IODOCARDINE

Affections des systèmes circulatoires et pulmonaires, Artériosclérose, troubles endocriniens, etc.

Posologie. — XX à LX gouttes par jour.

Formule. — Peptone iodée, Hamamelis virginica, Glycérine, Eau distillée.

Laboratoires AUCLAIRE

36, rue de la Tour d'Auvergne

PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 66-15.)

Todes en combate: 2000 soldados y 3000 civiles

[illegible]

IODOCITRANE

Nouveau corps original
IODE. — ALBUMINE

Associé au CITRATE DE SOUDE.

Tolérance parfaite du tube digestif.

Aucun accident d'iodisme.

Protection contre toute oxydation du produit depuis la préparation jusqu'à sa désintégration dans l'intestin.

Indications thérapeutiques. — *Hypertension artérielle, Artériosclérose, Hyperviscosité sanguine, Troubles artériels et veineux, Varices, Hémorroïdes, Congestions de la Ménopause, Rhumatismes, Obésité. Maladies de l'appareil respiratoire : Sclérose pulmonaire, Emphysème, Etats congestifs.*

Formes. — Pilules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin. Chaque pilule correspond à VIII gouttes de teinture d'iode et contient 0 gr. 10 de citrate de soude.

Posologie. — Dose moyenne : 2 pilules à avaler au début des repas 2 à 3 fois par jour.

Prix. — La boîte de 80 pilules : 16 fr. (traitement de 20 jours). La triple boîte de 240 pilules : 42 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des PRODUITS SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien
21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).
(Tél. Trinité 29-29.)

iodo-CITROL

Médicament unique par sa composition et son dosage, d'efficacité certaine dans toutes les maladies de la circulation.

COMPOSITION. — Triple association d'iode organique, de citrate monosodique (obtenu en partant du jus de citron frais) et d'extraît d'hamamélis (de la plante fraîche stabilisée).

INDICATIONS. — Tous les troubles circulatoires, hyperviscosité sanguine, hypertension, vertiges, scléroses. Rhumatisme chronique, obésité, pléthore et intoxications. **L'iodo-Citrol maintient jeune.** Aucune contre-indication.

PRÉSENTATION. — Forme liquide et forme comprimés.

Liquide. — Une cuillerée à café par jour, au repas de midi seulement, dans un demi-verre d'eau sucrée. (0 gr. 20 d'iode ; 1 gr. Citr. de Na ; 0 gr. 10 Extrait hamamélis par cuillerée à café).

Comprimés. — 4 à 6 par jour, en deux fois, aux repas de midi et du soir. (0 gr. 02 d'iode ; 0 gr. 10 Citr. de Na ; 0 gr. 025 Extrait hamamélis par comprimé).

Prix de vente, liquide ou comprimés : 19 fr. 25.

Le liquide ou les comprimés permettent un traitement de 20 jours.

Laboratoire CODY

BRIVE-LA-GAILLARDE (Corrèze).

(Tél. 31.)

iodogénol PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Remplace Iode et Iodures sans Iodisme.

Propriétés. — Très grande proportion d'iode substitué (25 %) :

Absence d'acide iodhydrique libre.

Grande stabilité des iodures organiques.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Indications. — Artériosclérose. Hypertension. Arthritisme, etc...

Posologie. — XL à LX gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau, au début des deux principaux repas.

Laboratoires PÉPIN ET LEBOUCC

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

IODOLIPINE

Traitement de fond de l'hypertension artérielle.

Forme. — Capsules d'huile iodée composée.

Composition :

Iode pur combiné à l'huile	0,09
Diméthylxanthine	0,10
Extrait de gui	0,05
Extrait de bardane	0,05

Pour une capsule.

Propriétés. — Vaso-dilatateur, vaso-trophique et antisccléreux. Diurétique. Hypotenseur.

Indications. — Présclérose, Aortites, Artérites, Artériosclérose, Traitement préventif des scléroses viscérales : Myocardite chronique, Angine de poitrine, Sclérose rénale, Sclérose cérébrale.

Posologie. — 1 capsule 2 à 3 fois par jour au moment des repas, pendant 10 jours par mois.

Le flacon : 19 fr. 20.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

iodo-magnésium

du Dr J.-P. CLARY

Composition. — MgI^2 chimiquement pur, complètement et définitivement stabilisé par un procédé nouveau, avec de l'extrait de feuilles fraîches de cassis.

Action. — Réunit les avantages de l'iode et du magnésium.

De l'Iode, l'agent le plus favorable de la circulation, antiscléreux, antirhumatismal, utile dans les cures d'amaigrissement et dans les dysthyroïdies de beaucoup de goîtres.

Du Magnésium, dont l'importance thérapeutique égale celle du phosphore et du calcium. Il est le composant essentiel de la chlorophylle et de toutes les vitamines. Il joue un rôle de premier plan dans les troubles trophiques de l'enfance, dans l'équilibre nerveux de l'organisme, dans la sécrétion des sels biliaires, dans les congestions prostatiques et utérines, dans la disparition des papillomes, etc.

Son action inhibitrice de la sécrétion surrénale, opposée à celle du potassium, explique l'action hypotensive extraordinaire du MgI^2 .

L'iodo-magnésium enfin ne produit qu'un minimum d'iodisme.

Posologie. — *Adultes* 10 à 30 gouttes, suivant avis du médecin, dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas, dix jours consécutifs tous les mois.
Enfants : 1 goutte par année d'âge.

20 gouttes renferment 0^{gr},30 de MgI^2 .

Le flacon contient 450 gouttes.

Le flacon : 18 francs.

Laboratoire J.-P. CLARY

72, avenue Kléber — PARIS (XVI^e).

IODOMA SINE

Globules.

Combinaison directe de l'*Iode* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphyseme, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes et endocriniennes.

Posologie. — Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois avant les repas.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-3.

IODOMAÏSINE

Pommade.

Iodomaisine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

Propriétés particulières. — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

Indications. — Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

Mode d'emploi. — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'*Iodomaisine pommade* est présentée en *tube*. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e). (Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National N° 218-4.

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone trypsique.

Gouttes : XX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. d'iodure de potassium.

Comprimés : 1 correspond à X gouttes d'Iodure.

Doses et mode d'emploi. — X à C gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson. Comprimés : 2 à 10 par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition, artério sclérose, obésité, polysarcie, dégénérescence graisseuse, intoxications chroniques, asthme, emphyseme, rhumatisme, arthritisme, goutte, tertiarisme, pré tuberculose.

Prix : Gouttes 18 fr. 75. Comprimés : 17 fr. 70.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

IODONESYL

(Gouttes)

Complexe organo-iodo-magnésien.

Formule. — 10 p. 100 Iode métalloïdique dynamisé par la présence de réducteurs hydrocarbonés et du magnésium.

Action. — L'iode sous cette forme élective, administrée à dose élevée sans iodisme, stimule l'activité du tissu lymphoïde, réalise l'atténuation directe *in vivo* des toxines microbiennes.

Son action est alors analogue à celle d'un vaccin d'une valence strictement adéquate. Résultats cliniques surprenants.

Indications. — Toutes les indications de l'iode, en particulier *infections aiguës*, Grippe, Angines, Pneumonie, Phlegmon de la gorge, Rhumatismes, Dermatoses.

Posologie. — Doses d'attaque pour infections aiguës : deux cuillerées à café à 2 heures l'une de l'autre, puis XXX gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau sucrée.

Prix : 20 francs.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 13-38.)

IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodobenzoate de soude).

Forme. — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Emphysème, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

Doses. — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 14 fr. 95.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine)
(Tél. : Grésillons 05-21.)

IODOPAN (GOUTTES)

(Procédé Slivo)

Admis dans les Hôpitaux de Paris

Composition. — Nouvelle combinaison de l'iode avec une peptone spéciale.

L'iode n'est libéré que dans l'intestin, d'où impossibilité absolue de troubles gastriques et d'iodisme.

Indications. — Toutes les indications de l'iode et des iodures.

Doses. — XX gouttes agissent comme 1 gr. d'iodure alcalin.

Enfants : V à XV gouttes par 24 heures après les repas.

Adultes : XX à LX gouttes et plus après les repas.

Prix : 17 fr. 70 pour 1 mois de traitement.

Dépôt chez tous les Grossistes.

E. ROCHE, Pharmacien.

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

IODOSCLÉROL

**Spécifique des hypertendus
et des artérioscléreux.**

Formule. — Chaque comprimé renferme :

Iodométhylate d'hexaméthylènetétra-	
mine	0 gr. 02
Chlorure d'acéthylcholine.....	0 gr. 01
Sulfate spartéine.....	0 gr. 01
Silicate de soude.....	0 gr. 05
Iode peptonisé.....	0 gr. 0125
Citrate de soude.....	0 gr. 10

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour, suivant prescription médicale.

Présentation et prix. — Le flacon de 42 comprimés, taxe comprise : 18 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 15-052.

Laboratoire de l'IODOSCLÉROL

J. MARX, Pharmacien

LONGUYON (Meurthe-et-Moselle).

IODO-SODYL CLARS

Bains oculaires contre la *cataracte*, les Taies cornéennes et les troubles circulatoires des yeux.

Composition. — Solution concentrée et stabilisée par un procédé spécial d'iodure de sodium, de chlorures de calcium et de magnésium, en présence d'eau distillée d'hamamélis.

Indications. — *Cataractes au début* et *Cataractes inopérables*, Taies cornéennes, Chorio-rétinites, Hémorragies du vitré, *troubles circulatoires des yeux*.

Posologie. — Verser X gouttes d'*Iodo-Sodyl Clars* dans une ceillère de 10 cc. remplie d'eau bouillie tiède.

Prendre deux bains oculaires par jour, à horaire fixe, et pendant 10 minutes exactement chaque fois.

Laboratoire CLARS

18, rue Saint-Sulpice — PARIS.

(Tél. : Danton 01-29.)

IODOSULFÈNE

Iodosulfothérapie à haute dose.

Composition :

21,4 p. 100 d'Iode.

22,4 p. 100 de Soufre.

38,6 p. 100 de *Strontium*.

Indications. — *Rhumatismes* : Scléroses viscérales, articulaires, artérielles. Tous états douloureux d'origine musculaire ou nerveuse. Hypertension.

Présentation. — *Dragées* glutinisées et ampoules de 3 cc. en injections *intramusculaires*, indolores, bien tolérées.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour.
2 à 3 ampoules par semaine.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne, 22 — PARIS (V^e).

IDO-THYROÏDINE CATILLON

Forme. — Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications. — Obésité, Goitre, Myxœdème, Dermatoses.

Doses. — 1 à 2 contre Myxœdème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Le flacon de 45 comprimés.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III^e).

IODOVEINE LEDUC

(Gouttes).

Composition. — L'*Iodoveine Leduc* est une combinaison stable et concentrée. Un centimètre cube représente : 0,015 milligrammes d'Iode ; 0,020 milligrammes d'Extrait Fluide d'Hydrastis ; 0,30 centigrammes d'Extrait Fluide d'Hamamelis ; 0,12 centigrammes d'Extrait Fluide de Marron d'Inde ; 0,12 centigrammes d'Extrait Fluide de Viburnum.

Combinaison stable de l'iode métalloïdique aux vasoconstricteurs classiques : hamamelis, marron d'inde, viburnum, hydrastis

Formule classique mais cependant remarquablement complète. L'extrait fluide d'hydrastis, le plus actif de ces extraits végétaux, et qui fait cependant défaut dans beaucoup de préparations similaires, s'y trouve stabilisé par un procédé spécial minutieusement mis au point.

Indications. — Les gouttes d'*Iodoveine Leduc* luttent avec efficacité contre toutes les affections des veines : Varices, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Phlébites.

L'*Iodoveine* est aussi un véritable trésor thérapeutique contre les troubles de la circulation et notamment au moment de la ménopause.

Posologie. — Débuter par V gouttes à midi et V le soir au début du repas. Augmenter de II gouttes par repas pour arriver à L gouttes par jour.

Diminuer ensuite pour arriver insensiblement à V gouttes par repas.

Formule du professeur SICARD

L. CASTERAN, Pharmacien,
152, Côte-Pavée — TOULOUSE.

IODULANE

(Anc^t Iode Tulasne).

Iode organique en pilules

Nouvelle préparation stable et inaltérable contenant une forte proportion d'iode actif libéré seulement dans l'intestin et permettant un traitement iodé actif et prolongé sans le moindre symptôme d'intolérance ni la moindre fatigue.

Formule. — Chaque pilule contient 2 cgr. 1/2 d'iode métalloïdique entièrement assimilable. Une pilule = 20 gouttes de teinture d'iode.

Avantages. — Les pilules d'*Iodulane* glutinisées ne sont dissoutes que dans l'intestin, d'où protection de l'estomac et efficacité supérieure. Elles n'ont ni goût ni arrière-goût. Elles sont facilement transportables. Le traitement iodé qui demande en général à être assez prolongé est donc grandement facilité. Jamais d'iodisme. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes celles de l'iode et des iodures : ARTERIO-SCLEROSE, HYPERTENSION, EMPHYSEME, LYMPHATISME, GOUTTE, RHUMATISME, OBESITE, BASEDOW, SYPHILIS, TUBERCULOSE, etc.,

N. B. — L'*Iodulane* s'est montré particulièrement actif dans les *Troubles de la Cinquantaine* et l'*Obésité*. Traitement facilité par la forme pilulaire.

Doses moyennes. — De 2 à 6 pilules par jour, au début des repas. Pour les enfants 1/2 doses.

Prix. Le tube : 14 fr. 60.

Laboratoires BOUILLET

48 boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Mercadet 82-01.)

IODURASE

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Iodure de potassium pur..... 0 gr. 50

Levurine extractive 0 gr. 10

Par flacons de 36 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Prix : 34 fr. 30 pour 6 à 30 jours de traitement. A. S. C.

Laboratoires Oh. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

Antiseptique énergique dépourvu de toute action irritante et de toute toxicité.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humérales, de l'iode à l'état naissant.

Infections gastro-intestinales (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie). Traitement iodé.

Formule. — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

Dose. — *Adultes* : 6 à 12 pilules par jour.

Usages externes. — *Pansements et chirurgie* : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

Pansement Lumière : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte et poudre) et *Tulle gras Lumière* constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antiseptie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

Formuler. — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'Amidon Lumière.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

IODURES CROS

Chimiquement purs.

En pilules solubles dans l'intestin.

Trois formes :

Iodure de potassium (pilules à 0 gr. 25 de KI pur).

Iodure de sodium (pilules à 0 gr. 25 de NaI pur).

Bi-iodure (pilules à 0 gr. 20 de KI pur associé à 0 gr. 005 de HgI.²).

Indications. — *Toutes celles de l'iode et des iodures* : Artériosclérose, Accidents spécifiques primaires, secondaires et tertiaires, Emphyseme, Goutte, Hypertension, Lymphatisme, Maladie de Basedow, Obésité, Rhumatismes, Troubles circulatoires.

Avantages. — Grâce à l'enrobage spécial CROS, l'iodure conserve jusqu'à l'intestin son intégrité moléculaire. Traitement facilité par la forme pilulaire. Pas de gastrite médicamenteuse, pas d'iodisme.

Posologie. — 2 à 8 pilules et plus, par jour, pour l'iodure de potassium et de sodium. Moitié de ces doses pour le bi-iodure. (A prendre au milieu des repas.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 199-1, 2, 3.

Laboratoire des IODURES CROS

G. BROCHON, Pharmacien,

202 bis, rue de Paris — CLAMART (Seine).

(Tél. : Mic. 00-62.)

IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes dosés d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

Présentation :

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

Prix : à 0,25 : 13 francs. — à 0,50 : 18 fr. 20
à 1 gr. et 2 gr. : 26 francs.

à 3 gr. : 39 francs.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

(Tél. : Laborde 16-72.)

IOGLOTT

Comprimés violets et blancs dégageant 3 mgr. d'Iode Naissant, par couple de comprimés.

Indications. — Angines, Asepsie pré et post-opératoire, Prophylaxie des maladies épidémiques.

Mode d'emploi. — Mettre dans la bouche, 4 à 5 fois par jour et le soir au coucher, un comprimé violet et un comprimé blanc et laisser fondre lentement.

La boîte pour 15 jours de traitement : 10 fr. 15.

Adresse télégr. : Gaipharmcy, Alger.

Échantillons et littérature.

CHARLES ROCHE, * ✱ ✱, Pharmacien

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon,

Ex-pharmacien major de l'armée,

Ex-chef de travaux de chimie.

2, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 8-91.

Dépôt général : Office Commercial
Pharmaceutique, Paris.

IOGUINE DELBA

Médication hypotensive.

Composition. — Combinaison de iode avec la peptone et l'extrait de Gui stabilisé d'Aubépine.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de l'Hypertension et de l'Artériosclérose chez tous les sujets et à tous les stades de la maladie.

Tolérance parfaite et sans mauvais goût.
Pas d'Iodisme.

Posologie. — XX gouttes avant les repas, avec de l'eau.

Prix : 17 fr. 50 le flacon pour un traitement d'un mois.

Laboratoire DELBARY

SAINT-ASTIER (Dordogne).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1181.1.

IONYL

Médication bio-énergétique complète.

Composition. — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

Action thérapeutique et indications :

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles, Usure sénile).
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

Action immédiate. — Innocuité absolue.

Posologie. — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

Prix : 18 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

IO-SALYL

Dragées glutinisées, contenant 0 gr. 45 de salicylate de soude et 0 gr. 05 d'iode de potassium purs.

Dissociées et assimilées seulement dans le milieu intestinal. Aucune action sur la muqueuse gastrique. L'association de l'iode, en petite quantité, et du salicylate donne à cette formule le maximum d'activité.

Indications. — *Toutes les diathèses rhumatismales.*

Posologie. — Celle du salicylate, en tenant compte que chaque dragée, contient 0 gr. 50 de produits actifs.

Mode d'emploi. — Avaler les dragées sans les briser, par une ou par deux, avec un 1/2 verre d'eau ou mieux de tisane diurétique.

Prix : 18 fr. 50 la boîte de 44 dragées.

Laboratoires du NÉVRALGOL

E. CORNAUD, Pharmacien — LA ROCHELLE.

Anc. Pharmacien-Chimiste en chef de la Marine.

IPALCAL

Propriétés. — Médication alcaline polyvalente. S'emploie avec succès dans les différentes manifestations de l'insuffisance hépatique de l'enfant et de l'adulte.

Indications. — Nausées, constipation, migraines, vertiges, céphalées, urticaires, troubles digestifs, perte d'appétit et, en résumé, tous les troubles consécutifs à une déficience hépatique plus ou moins accusée.

Présentation. — En boîte de 30 paquets.

Composition :

Ipéca pulvérisé	0,01
Benzoate de soude	0,10
Bicarbonate de soude	0,10
Citrate de soude	0,10
Sulfate de soude anhydre	0,20
Phosphate de soude anhydre	0,30

Mode d'emploi. — Suivant les indications du médecin. En général : *Enfants* : 1 paquet le matin à jeun dans un verre à bordeaux d'eau tiède un quart d'heure avant le premier déjeuner.

Adultes : 1 à 2 paquets.

Prix : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

· Laboratoire de l'IPALCAL

6, avenue des Docteurs-Foix — SALIES-DE-BÉARN (Basses-Pyrénées)
(Tél. : 87.)

IRÉNINE GONNON

Composition. — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir : 0 gr. 53 d'Irénine proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine), 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

Indications. — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

Posologie. — 1, 2 ou 3 cachets par jour. Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.

(Pour 8 jours de traitement environ.)

Prix public : 10 fr. 50.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

IRRASTÉRINE

Vitamine D. cristallisée.

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Chocolatés.

Composition. — Vitamine D. cristallisée, en solution dans l'huile d'olive, sans aucune addition de cholestérine.

Propriétés thérapeutiques. — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'*Irrastérine* peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Indications. — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmodiques. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Pré-tuberculose et tous états de déminéralisation.

Dose et mode d'emploi. — *Solution huileuse* (0 milligr. 5 de vitamine D cristallisée par cc.) Jusqu'à un an : X gouttes ; de 1 à 10 ans : XX gouttes ; *adolescents, adultes* : XXX gouttes.

Chocolatés (1 chocolaté = 0 milligr. 1 de vitamine D cristallisée) : 1 à 3 par jour.

Prix :

Solution : 18 fr. 75. — *Chocolatés* : 20 fr. 80.

Les Établissements Byla

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

ISOGEV

Antiseptique des muqueuses de la bouche et du pharynx.

Forme. — Poudre soluble en sachets.

Composition. — Stovarsol, Cuivre colloïdal, Borate de soude.

Indications. — Gingivites, Stomatites, Pyorrhées, Maux de gorge, Pharyngites, et Angines.

Mode d'emploi. — 1 sachet par verre d'eau bouillie chaude en bains de bouche ou gargarismes : 4 à 5 fois par jour.

Prix :

Grand modèle..... 18 fr.

Petit modèle..... 10 fr.

Laboratoires GEV

26, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 32-88.)

ISONAL

N-Méthyl-Ethyl-Phényl-Malonylurée.

La plus récente formule de barbiturique sans aucune toxicité. Convient à tous les nerveux, n'entrave en rien la capacité de travail.

Indications. — Dépression nerveuse. Etats anxieux. Angoisse et palpitations. Insomnie. Surmenage. Nervosisme. Névroses et troubles convulsifs.

Présentations :

Tube de 20 comprimés titrés à	0,10
Tube de 30 comprimés titrés à	0,05
Tube de 60 comprimés titrés à	0,01

Prix au public : 9 fr. 10.

Boîte de 6 ampoules titrées à 0 gr. 10 (voie intramusculaire).

Prix au public : 20 fr. 80.

Posologie. — Dans les cas d'éréthisme nerveux : administrer 10 à 20 cgr. par jour, en 8 ou 10 prises.

Chez les enfants : 2 cgr. par année d'âge, en doses réfractées.

Chez les nourrissons, la dose quotidienne correspond à 0 gr. 01 par semestre d'âge.

Dans les troubles convulsifs des adultes et l'épilepsie, le traitement d'attaque nécessite des doses importantes variant de 0 gr. 30 à 0 gr. 80 par jour. Pour le traitement d'entretien, on pourra les réduire en les répartissant en plusieurs prises.

Remboursement aux Assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e). (Tél. : Littré 58-43.)

ISO-SELS

Comprimés solubles et granulés effervescents.

Médication *alcalino-sodique* du type Bourget, renforcée par les *chlorures de magnésium* et d'*ammonium*.

Propriétés. — Stimulent les sécrétions du foie. Corrigent les dyspepsies hypo- et hypersthéniques. Combattent les fermentations entérocoliques. Assurent l'équilibre acido-basique des humeurs.

Indications. — Insuffisance hépato-biliaire. Gastrite chronique. Fermentation intestinale. Colibacillose. Migraines. Asthénie. Dermatoses d'origine digestive.

Posologie. — *Adultes :* 1 à 3 comprimés ou 1 à 3 cuillerées à café, 1 à 3 fois par jour, à jeun, au coucher ou au cours de la journée dans un peu d'eau de préférence minérale (Vichy, Châtel-Guyon, Evian, Vittel, suivant les cas).

Enfants et Nourrissons : 1/4 ou 1/2 dose dans un peu d'eau sucrée ou dans le biberon.

Durée de la cure : 15 à 20 jours consécutifs.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale et admise aux assurances sociales.

Laboratoires R. BOUTIN

Pharmacien ex-interne des hôpitaux de Paris,

8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 09-63.)

ISOTANIN

Composition. — L'*Isotanin* est une solution aqueuse de Tanin spécialement purifié et stabilisé, additionnée de Chlorure de Sodium et présentée en ampoules stérilisées.

Indications. — Traitement des brûlures par tannage.

Cette méthode a pour avantages de diminuer la gravité de la brûlure par neutralisation des poisons formés à sa surface, de réaliser une protection complète de la plaie, de supprimer la douleur et de provoquer une cicatrisation très rapide.

L'*Isotanin* est également présenté sous la dénomination *Isotanin* « G », en association avec un antiseptique, le Violet de Gentiane, pour brûlures profondes et très souillées.

Mode d'emploi. — L'*Isotanin* et l'*Isotanin* « G » s'emploient en pansements ou pulvérisations après dilution dans l'eau bouillie. Les solutions initiales ayant une concentration de 25 % pourront être amenées ainsi à 15, 5, 2 % suivant les nécessités.

Présentation. — *Isotanin* ou *Isotanin* « G » : Boîte 1 ampoule de 10 cc. Boîte 5 ampoules de 10 cc.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 44-59.)

ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

Action.

L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38 nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'*Isotonyl* Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyperacide, assure l'évacuation gastrique.

Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre. Discoïdes, 2 pour 1 verre.

Adultes : 1 à 3 verres par jour.

Enfants : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : Paquets : 14 fr. 60.

Discoïdes : 15 fr. 60.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue La Fayette — PARIS (IX^e).

ISPAGHUL TROUETTE-PERRET

Phytothérapie gastro-intestinale.

Mucilage (semences ou granulé) du *Plantago decumbens*.

Traitement idéal de la constipation.

Avantages. — L'Ispaghul « Trouette-Perret » est un produit naturel d'une innocuité absolue et d'une tolérance parfaite. Son mode d'action est exclusivement mécanique.

L'Ispaghul « Trouette-Perret » rééduque l'intestin et facilite son travail biologique normal. C'est un lubrifiant.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes, Digestions lentes et difficiles, Gastro-Entérites, Insuffisance biliaire.

Mode d'emploi. — L'Ispaghul se prend sous la forme de fines semences ou de granulé dont l'absorption est très facilement acceptée. On le prend dans de l'eau ou dans un breuvage quelconque.

Doses :

Adultes : Une cuillerée à soupe à chacun des principaux repas, midi et soir.

Enfants : Une cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge à chacun des deux principaux repas.

Littérature et échantillon sur demande aux :

Laboratoires CONDOU et LEFORT

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

IXIUM

Composition. — Solution isotonique de Thorium X (exempte de radio-thorium et de corps radioactifs à vie longue).

Propriétés. — Antirhumatismal et action sur les organes hémopoïétiques : — stimulante à doses faibles, — destructrice à très fortes doses.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. en verre spécial.

Indications et mode d'emploi. — *Spondylose, rhumatismes chroniques, névrites, iritis, psoriasis* (particulièrement psoriasis arthropathique) : 8 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives, de 50 à 150 ou 180 microgrammes.

Anémie : 8 à 10 injections hebdomadaires, dosées à 25, 50, puis 75 microgr.

Leucémies, maladie de Hodgkin, polyglobulies : 5 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives, de 100 à 350 microgr. en principe.

Observations. — N'employer l'Ixium qu'en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses.

Les séries peuvent être renouvelées après un repos de 2 mois ; surveiller la formule sanguine en cas de séries répétées ou de doses fortes.

N.-B. — L'Ixium, préparé toutes les semaines, est expédié le mardi ; les dosages sont prévus normalement pour utilisation, en France, le mercredi.

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (7^e).

Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

JABOSULFÈNE

JABOrandi + hypoSULFite

« Le désensibilisant de choix ». Modifie le « terrain » et régularise le vague.

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'hyposulfite de Na chimiquement pur et 0 gr. 02 de poudre de feuilles de Jaborandi stabilisée.

Doses. — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas.

Indications. — Toutes manifestations anaphylactiques : Urticaire, Œdème de Quincke, Prurits, Dermatoses récidivantes, Asthme, Migraine, Rhume des foins. Toutes insuffisances hépatiques.

Action. — Très grande activité due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 65 pilules glutinisées : 17 fr. 50.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

La boîte de 10 ampoules : 29 francs.

pour les intramusculaires, voir *HYPOSTRONTIUM*.

Laboratoires TORAUDE

22, r. de la Sorbonne — PARIS (V^e). (Tél. : Odéon 73-92.)

J. B. S. BELLAS

Traitement des maladies tumorales.

Etats cancéreux et précancéreux

Organothérapie Bellas.

Présentation :

Comprimés (boîtes de 50 comprimés).....	80 fr.
Suppositoires (boîtes de 12 suppositoires)..	40 —
Pommade (tube de 100 gr.).....	40 —

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique et Extrait de rate.

Indications. — *Cancers et affections susceptibles de devenir cancéreuses.*

1° *Traitement préventif.* — Toutes affections aiguës ou chroniques (ulcères internes, fibromes, métrites, prostatites, ulcérations persistantes de la peau, etc.), susceptibles de devenir cancéreuses.

2° *Tumeurs malignes.* — Traitement adjuvant de la Chirurgie, Curiothérapie et Radiothérapie : Traitement préparatoire des cas qui, en raison de l'état général ou local, ne sont pas indiqués pour une intervention chirurgicale immédiate ; traitement post-opératoire pour éviter les risques de récidives et métastases ; traitement des cas réfractaires, ou devenus réfractaires aux rayons ; augmentation de la tolérance des malades aux rayons.

3° *Traitement des cas inopérables.* — Traitement freinant la croissance de la masse tumorale et des ganglions ; relève l'état général et moral, supprime les douleurs et assure souvent une survie appréciable.

Posologie :

Comprimés : dose moyenne : 3 à 6 comprimés par jour à prendre en 3 fois, 1/2 heure avant les repas. Dose d'attaque : 9 à 12 comprimés par jour pendant 8 à 10 jours.

Suppositoires : 3 suppositoires par jour.

Les comprimés constituent la base du traitement, qui est cependant plus actif si l'on fait en même temps le traitement avec suppositoires.

Si, pour une raison quelconque, le malade ne peut pas prendre les comprimés, ce traitement peut être remplacé par le traitement aux suppositoires (6 par jour).

Pommade : Application en couche épaisse sur de la gaze comme pansement pour les ulcères de la peau et en tampon pour les tumeurs rectales.

Durée du traitement : 3 à 7 mois.

Pour permettre de garder le secret du diagnostic, aucune littérature ou indication n'accompagne les produits.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd., n° 167-16.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser :

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, pharmacien,

3, place Intérieure-Saint-Michel — TOULOUSE
(Tél. : 213-06.)

JÉCOBIASE

Composition et formes. — Deux formes.

Formule.	Adulte.	Infantile.
Sulfate de soude cristallisé	1 gr.	0,50
Citrate trisodique.....	0,25	0,125
Bicarbonate de soude bicristallisé .	0,05	0,025
Chlorure de magnésium anhydre...	0,50	0,25
Excipient spécial	qsp. 8 cc.	qs p. 8 cc.

Indications. — Toutes les manifestations de l'insuffisance hépatique (migraines, nausées, vertiges, etc.). Les infections biliaires (ictères, lithiasse biliaire, cholécystites).

Les congestions du foie.

Les asthénies dont la cause est liée à des toxi-infections d'ordre digestif.

La constipation sous toutes ses formes.

Posologie. — Une ampoule le matin à jeun dans un verre d'eau. Après une semaine de repos, reprendre une nouvelle série de 10 ou 20 ampoules suivant le cas.

La boîte de 10 ampoules de 8 cc. : 21 francs.

Laboratoires de la JÉCOBIASE
D^r R. PIONNEAU, Pharmacien
VAYRES (Gironde).

JÉCOBOLDINE

(Gouttes de saveur agréable.)

Stimulant des fonctions hépatiques et apaisement des phénomènes douloureux résultant de l'irritation des voies biliaires et de la glande hépatique.

Formule :

Teinture de Belladone	20
— de Boldo.....	30
— d'Ipéca.....	30
— d'Artichaut	20
Pour 100 cc.	

Posologie. — V à XXX gouttes par 24 heures dans un peu d'eau au début des repas, en 2 ou 3 fois.

Laboratoire du Docteur L. COUTURE
2, rue du Pensionnat — LYON.

JÉCOL

L'auxillaire physiologique du foie.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les nos 223-2 et 223-10.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, Colibacillose, etc.

A. Formule.

Combretum (Extrait spécialisé de Kinkélibah)	3 centigr.
Boldo (Extrait aqueux)	2 1/2 centigr.
Evonymine (Codex).....	1 centigr.

Pour 1 cachet ou XX gouttes.

B. Forme.

1° **Cachets** minuscules, faciles à avaler, forme la plus simple pour administration aux adultes.

2° **Gouttes.** Posologie encore plus souple que le cachet, plus agréable aux enfants et aux adultes qui n'aiment pas avaler de cachet.

C. Posologie.

1 ou 2 cachets ou XX à LX gouttes à la fin de chaque principal repas.

Enfants : prescrire 1 goutte par année d'âge, dose à répéter 2 à 4 fois par jour.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

D. Boîte de 30 cachets	19 fr.
Flacon compte-gouttes.....	19 —

Laboratoire JÉCOL
COURBEVOIE (Seine).

JECOLAXINE

Cachets.

Traitement de la constipation en particulier d'origine hépatique.

Formule :

Poudre de Belladone.....	0,01
— Bourdaine	0,10
— Cascara	0,10
— Agar-Agar	0,10
Bile desséchée et purifiée....	0,01
Pour 1 cachet.	

Posologie. — 1 à 2 cachets au repas du soir provoqueront une selle le lendemain matin. Interrompre un jour sur deux.

Laboratoire du Docteur L. COUTURE
2, rue du Pensionnat — LYON.

JÉCOPEPTOL

Indications. — Toutes affections gastro-hépatiques. Calme immédiatement. Effet durable par usage régulier.

Composition. — Association de 2 formules : l'une *gastrique* : poudre magnésio-bismuthée, avec adjonction de silice absorbante. L'autre *hépatique* : cholagogue et désinfectante des voies biliaires.

Forme. — Poudre d'une extrême finesse, sans toxique, d'un goût excellent, d'un prix modique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe de poudre dans un verre d'eau après les principaux repas.

Prix de la boîte
pour un traitement d'une semaine : 16 fr. 50.

Laboratoires S. I. C. A.

R. MIOHY, Pharmacien
13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 75-75.)

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 1248-1.

JECOSEDYL

(Gouttes de saveur agréable.)

Sédatif de tous phénomènes douloureux du foie et des voies biliaires.

Formule :

Teinture de Belladone	10
— de Boldo	40
— de Jusquiame	10
— de Combretum	40
Pour 100 cc.	

Posologie. — *Type* : V à X gouttes dans un peu d'eau par 24 heures, prises en 2 ou 3 fois au début des repas.

Cas aigus : jusqu'à XXX gouttes par 24 heures.

Laboratoire du Docteur L. COUTURE

2, rue du Pensionnat — LYON.

JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue et d'extrait de malt, sous forme de paillettes.

Composition. — Huile de foie de morue, 30 p. 100 ; Extrait de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ; Essences aromatiques, Q. S.

Indications. — Le Jemalt réalise la médication à l'huile de foie de morue enrichie des éléments nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de malt. Anémie en général. Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à 2 ans, 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué dans du lait tiède ou dans une infusion.

Durée moyenne de consommation : 15 jours:

P. BASTIEN, pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

JUGLAND GMET

Extrait total, sans alcool ni sucre, des feuilles de noyer. Sous forme liquide, plus actif que les pilules.

Propriétés :

Toni-dépuratif, anti - diabétique, reminéralisant (Fixateur des phosphates de chaux).

Indications :

Anémie, lymphatisme, adénopathies, rachitisme, ostéomalacie, acné juvénile.

Diabète et ses complications. Tuberculose.

Posologie :

1 à 3 cuillerées à café par jour. Enfants : demi-dose.
Dans le diabète : dose doublée.

Le flacon de 135 cc.

Laboratoire GMET

Dr. A. LOROT, Pharmacien

27, rue du Faubourg-Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète et ses complications : acidose, acétonémie, en particulier les diabètes gras, arthritiques, hépatiques. Aucune contre-indication, tolérance parfaite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pilules avant chacun des trois repas. Cette dose peut être doublée sans inconvénient. Continuer progressivement le traitement jusqu'à complète disparition du sucre dans les urines.

Prix : 16 francs la boîte de 150 pilules. Conservation indéfinie en lieu sec.

L. N. C. n° 257-1.

Produits Euthérapiques

Camille CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon

12, rue des Écoles — CHAMBÉRY (Savoie).

(Tél. : 0-23.)

JUGLANREGINE ANDRÉ

Iodotannique phosphaté à base de feuilles de noyer, fraîches et sèches.

Indications. — Lymphatisme, tuberculose, reminéralisation, anorexie, états asthéniques, convalescence, hypothyroïdie, diabète.

Présentation. — Élixir très agréable au goût.

Dose. — 2 à 3 cuillerées (à bouche ou café, suivant âge) par jour.

Prix en France : le grand flacon : 18 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments : 556-1.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

JURANOL

Huile sulfurée naturelle du Jura.

Huile d'origine animale fossile, très riche en soufre organique, extraite d'une roche du massif montagneux du Jura. Réalise un Ichtyol suractivé et incolore.

Réparateur puissant des tissus, décongestif, calmant, antiseptique léger, antiprurigineux, ni irritant ni toxique. Ne tachant pas.

POMMADE à 10 p. 100.

Indications. — Plaies, Brûlures, Ulcères, Dermatoses (acné, eczéma, impétigo, etc...), Engelures, Crevasses, Coups de soleil, Périphlébites, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — Pansements, onctions, massages.

Présentation. — Tube de 30 gr. : 9 francs.

LIQUIDE à 10 p. 100.

Indications. — Chirurgie (plaies infectées, fractures ouvertes, ostéomyélites, abcès, phlegmons, lymphangites), Urologie (cystites, urétrites), Gynécologie, Dermatologie, Séborrhée, Rhinites.

Mode d'emploi. — Compresses, injections dans les drains ou trajets fistuleux, instillations, tampons vaginaux, pulvérisations.

Présentation. — Flacon de 60 gr. : 14 francs.

OVULES à 3 p. 100.

Indications. — Leucorrhées, vaginites, métrites, congestions pelviennes.

Mode d'emploi. — 1 ovule le soir au coucher.

Présentation. — Boîtes de 6 ovules : 17 fr. 50.

Laboratoires du Docteur COIRRE
5, boulevard du Montparnasse — PARIS (VI°).
(Tél. : Ségur 02-79.)

JUS DE RAISIN QUOTIDIEN

Composition :

Pur jus de raisin frais, sans alcool, ayant conservé la *saveur délicate* et le *fruité* du raisin frais. Préparé avec les meilleurs raisins de l'Anjou, pasteurisé à température modérée, renferme intégralement toutes les vitamines, albumines, corps azotés. Maintenu dans le vide dans sa bouteille, ce qui évite toute oxydation. Ni antiseptique, ni acide sulfureux.

Indications :

Auto-intoxications, Diverses manifestations de l'arthritisme, Insuffisance hépato-rénale, Pyrexies, Maladies de carence, Régulateur de l'équilibre acido-basique des humeurs, Hygiène alimentaire.

Mode d'emploi :

Pur ou mélangé d'eau à table, ou un verre à bordeaux avant chaque repas.

Prix : 10 francs la bouteille.

Henri CHARTIER — SAUMUR. — (Tél. : 416.)

JUS INTÉGRAL DE POMMES FRAICHES

« DALLERY »

Composition. — Sucre naturel, matières minérales, tanin, pectine, potasse, acide phosphorique, lévulose, vitamines.

Préparé par diffusion de fruits frais, coagulation des matières pectiques, à basse température.

Action thérapeutique. — Stimule le système digestif et hépato-rénal anti-diarrhéique, alcalinisant du sang.

Remplace la cure de pommes crues.

Posologie et mode d'emploi. — 3 à 4 verres à bordeaux par jour, matin et soir ou pendant le repas, additionné d'eau.

Prix : 8 fr. 50 la bouteille.

Laboratoire de l'Industrie de la Pomme

DALLERY *

Spécialiste,

75, av. Victor-Hugo — FRENAY-s-SARTHE (Sarthe).
(Tél. : n° 7.)

KALMANGOR

Application nouvelle de la Yohimbine.

Composition. — Dragées à noyau mou contenant chacune :

Chlorh. de Yohimbine.....	0,002
Trinitrine à 1 p. 100.....	2 gouttes.
Phényl-éthyl-malonylurée	0,015
Extrait de Cratægus	0,05

Indications. — Activité immédiate dans les crises d'angine de poitrine grâce aux vasodilatateurs Yohimbine, Trinitrine et aux sédatifs.

Médication vagotonique générale.

Posologie. — 4 à 6 dragées par 24 heures à croquer au moment des crises.

Prix : Le flacon de 50 dragées : 22 francs.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

KALM-ASTHMINÉ

Composition. — Comprimés d'éphédrine associée à l'acide benzoïque, antipyrine, phénacétine et caféine, contenant en plus, à doses homéopathiques, des teintures de lobélie, digitale, strophanthus et de l'iode.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe chronique, Rhume des foins et toutes les Dyspnées.

Effets. — Jugule les crises, fluidifie les sécrétions bronchiques, tonifie le cœur.

Mode d'emploi. — *Crises aiguës* : 1 à 3 comprimés au moment de la crise (maximum 10 par 24 heures).

Médication d'entretien : 1 à 2 comprimés par jour, 10 à 20 jours par mois.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose selon l'âge.

Bébés : 1/8 de comprimé.

Pas de toxicité, effet durable et sans accoutumance.

Présentation. — Boîte de 10 comprimés : 12 fr. 75.
— 20 — : 21 fr. 20.

Echantillons sur demande.

Laboratoire JOUVEINAL

137, Faubourg Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Did. 40-53.)

KANEURON

Nouvelle forme créée en 1933.

États anxieux vago-sympathiques.

Présentation. — Gouttes.

Composition. — Paullinia, Cratægus, Passiflore, Phényléthylmalonylurée.

Indications. — Spasmes, Vertiges, Anxiétés, Angoisses, Insomnies, États Parkinsoniens, Émotivité, Syndrome solaire.

Désordres graves d'origine nerveuse.

Propriétés thérapeutiques. — Sous forme liquide la phényléthylmalonylurée, étant absorbée de suite, agit à doses moindres. Les extraits de Cratægus et de Passiflore renforcent son action. L'extrait de Paullinia combat l'action dépressive que peut occasionner la phényléthylmalonylurée.

Prescription. — Kaneuron : 1 flacon. Durée moyenne : 20 jours.

Posologie. — X à XXX gouttes 3 fois par jour.

X gouttes = 0,01 de phényléthylmalonylurée.

Maniable. — Sa présentation sous forme « gouttes » donnant toute latitude désirable sous le rapport de la dose, particulièrement appréciable chez le nourrisson, l'enfant, les anxieux.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA

P. CORDONNIER, Pharmacien,

52, rue de Cambrai — LILLE.

Enregistré au Laboratoire national. — Admis aux Assurances sociales

KAOBROL

DEUX FORMES : Poudre. Tablettes.

DEUX FORMULES : Simple. Belladonné.

KAOBROL simple : Kaolin colloïdal. -- Bromure de Sodium (20 à 25 cgr. par cuillerée à café). Carbonate de Chaux et de Magnésie.

KAOBROL belladonné : Kaobrol simple + Poudre de Belladone titrée (IV gouttes de teinture par cuillerée à café).

Poudre homogène, adhésive et absorbante, très agréable au goût, sucrée et aromatisée à la menthe.

Indications. — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

Posologie. — Une cuillerée à café ou 2 tablettes après les repas et au moment des crises douloureuses.

Prix : 15 francs.

Littératures et échantillons

à Messieurs les Docteurs.

Laboratoire J. LAROZE, pharmacien.

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

(Tél. : Entrepôt 01-41.)

KAO CARBO

Présentation. — Tubes aluminium de 30 comprimés.

Principes actifs. — Carbonate de chaux, kaolin, sous-nitrate de bismuth, magnésie calcinée, bi-carbonate de soude, extrait de belladone, ess. d'anis.

Indications. — Affections gastro-intestinales, Gastrites aiguës ou chroniques, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Pyrosis (brûlures et aigreurs de l'estomac), Aérophagie, Météorisme, Flatulence (gaz), Entéocolite, Entérite, Diarrhée.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour dans le courant des repas.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

KAOLINASE

Pansements gastriques parfaits,
les moins coûteux.

Composition. — Silicate d'alumine naturel, stérilisé, finement porphyrisé, en poudre fine très adhésive : 10 grammes par paquet.

Indications. — Hyperchlorhydrie, Gastrites, Gastralgies, Ulcères de l'estomac et du duodénum, Colites, Fermentations.

Posologie. — 1 à 2 paquets délayés dans un verre d'eau le matin à jeun.

Renouveler 1/2 ou 1 paquet dans la journée si nécessaire, au moment des douleurs.

Présentation et prix. — Boîte de 20 paquets de 10 grammes : 14 francs.

KAOLINASE BELLADONÉE

Composition. — Kaolinase simple, 10 gr. Teinture de belladone 10 gouttes, par paquet.

Indications. — Hyperchlorhydrie grave, Gastropathies rebelles, Ulcères graves ou aggravés de spasmes, Spasmes gastro-intestinaux, Vomissements, Toux émétisante des tuberculeux.

Posologie. — Un paquet délayé dans un verre d'eau le matin à jeun. Renouveler dans la journée si nécessaire.

Présentation et prix. — Boîte de 20 paquets de 10 grammes : 16 francs.

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

KAVIASE

Pilules, Suppositoires, Ovules.

PILULES (2 formules).

1° *Pilules Kaviase.*

Ext. Kawa	0,10	} par pilule.
Uroformine	0,02	

6 à 8 par jour, 16 francs le flacon de 50 pilules.

2° *Pilules Kaviase au bleu de méthylène.*

Ext. Kava.....	0,10
Bleu de méthylène.....	0,01

6 à 8 par jour, 16 francs le flacon de 50 pilules.

Indications. — *Le symptôme douleur dans la sphère génito-urinaire.* Cystites, Urétrites, Prostatites, Orchites, Métrites, Salpingites, Colibacilloses.

SUPPOSITOIRES et POMMADE

Toutes les algies ano-rectales et pelviennes.

Indications. — Congestion prostatique et utéro-ovarienne, Hémorroïdes, Règles douloureuses, Prurit anal, Rectites, etc.

Composition :

Ext. Kawa	0,30
Ext. jusquiame.....	0,03
Stovaïne	0,005

16 francs la boîte de 10 suppositoires.

OVULES

Toutes les affections gynécologiques douloureuses : décongestif et sédatif.

Laboratoires de la KAVIASE

22, rue Lalande — PARIS (XIV^e).

(Tél.: Suffren 71-02.)

KÉFIROGÈNE CARRION-LAGNEL

Pour la préparation *domestique* du Kéfir.

Composition. — Ferments sélectionnés, fournis par des *cultures pures* des agents de la fermentation kéfirique. Préparation liquide glycinée.

Indications. — Le Kéfirogène permet la fabrication du Kéfir, lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

Mode d'emploi. — Chaque dose (une ampoule) est ajoutée à 250 cc. environ de lait bouilli, puis refroidi. Après un séjour de 24 heures, à 25 degrés, on a le Kéfir n° 1 et, au bout de 48 heures, le Kéfir n° 2 (le plus souvent utilisé). Une étuve simple facilite cet emploi du ferment (renseignements sur demande).

Présentation et prix. — La boîte de 12 ampoules : 10 fr. 65.

Laboratoires CARRION et LAGNEL

3, 5 et 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 40-30.)

KÉLÉDOL ET SUPPO-KÉLÉDOL

Composition :

Chlorhydrate de Morphine..... 1 centigramme.
Bromhydrate de Scopolamine ... 1/4 de milligramme.
Par ampoule de 1 cc., par suppositoire ou 2 comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Tous les emplois de la morphine sans les inconvénients : action hypnotique et sédative plus forte, pas d'effets toxiques sur la circulation et la respiration, beaucoup moins d'accoutumance.

Indications. — Douleur, Cancer, Sciatique, Anxiété, Agitation, Anesthésie pré-chirurgicale, Accouchement.

Posologie. — Ampoules, suppositoires ou comprimés : 1 à 4 par 24 heures.

Présentation pharmaceutique et prix :

12 ampoules : 16 fr. — 6 ampoules : 8 fr.
10 suppos. Kélédol : 21 fr. — 5 suppos. Kélédol : 12 fr.
14 comprimés : 10 francs.

D. RAQUET, Pharmacien Supérieur,

Licencié ès Sciences.

114, rue Solférino — LILLE.

KÉNOL

Compensateur Intestinal.

Extrait duodénal total	0 gr. 045
— biliaire total purifié.....	0 gr. 045
— Gladiolus ceruleus	0 gr. 019
— Evony. atropur.....	0 gr. 019
Mag. de soufre purifié.....	0 gr. 035

Pour un comprimé-dragée.

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre des sécrétions intestinales. Agit sur le péristaltisme. Action antiseptique puissante.

Indications. — Constipation, Affections hépatiques, Cholécystites, Dermatoses, Auto-intoxication.

Doses. — 1 à 3 dragées au repas du soir ou 1 à 2 à chaque repas. Avaler sans croquer Action évacuante douce, activité constante. Pas d'accoutumance.

Prix au public : 10 francs.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

(Provence 20-20 et 58-43.)

KÉPHÉDRYL

A base d'Éphédrine naturelle.

Formule :

Éphédrine <i>naturelle</i>	1	p. 100
Eucalyptol	0,50	—
Camphre	0,30	—
Excipient.....	98,20	—
	<hr/> 100	p. 100

Indications :

Le Képhédryl est indiqué dans toutes les affections du nez :

Coryzas inflammatoires ou spasmodiques,
Catarrhe nasopharyngien, Rhume des
foins, Sinusites, Otites, Asthme.

**C'est un merveilleux traitement abortif
du rhume de cerveau.**

Posologie :

Quelques gouttes dans chaque narine 3 ou
4 fois par jour.

Présentation :

La capsule compte-gouttes forme bouchon
permettant ainsi l'emploi du Képhédryl
dans les meilleures conditions d'asepsie.

Prix : 13 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

C'est un remède efficace et économique.

Laboratoires du KÉPHÉDRYL

Guy ÉLIE-MANTOUT, Pharmacien,
1, rue Auber — PARIS (IX^e).

KERALAX

Mucilage d'origine végétale infermentescible
et inassimilable.

Formules :

1° Keralax.

Mucilage.....	80 p.	100
Ext. Rhamnus Frangula	3 p.	100
Exc..... Q. S. pour.	100 gr.	

2° Keralax simple.

Mucilage.....	80 p.	100
Exc..... Q. S. pour.	100 gr.	

Le Kéralax renferme le % de mucilage pur le plus élevé (80 p. 100), ce qui lui assure l'action mécanique la plus efficace.

Indications. — Traitement physiologique de la Constipation, Rééducation de l'intestin, Auto-Intoxications, Stimulant des mouvements péristaltiques.

Posologie. — Une ou deux cuillerées à café midi et soir ou le soir seulement, selon les besoins du traitement.

Pas de contre-indication.

Présentation et mode d'emploi.

Granulés de goût agréable et d'absorption facile. Placer le contenu de la cuiller sur la langue et l'avaler *sans mâcher* avec quelques gorgées de liquide.

Prix : 16 fr. 50 la grande boîte.

Ce prix correspond à un coût journalier très modique et le moins élevé de tous les mucilages.

Laboratoires du KERALAX

Guy ÉLIE-MANTOUT, Pharmacien,
1, rue Auber — PARIS (IX^e).

KERASALICYL

Pilules *kératinisées* suivant le procédé du Dr Henri Philippe, ne se dissolvant que dans l'intestin et permettant l'absorption des fortes doses de salicylate sans intolérance ni fatigue d'estomac.

Salicylate de soude chimiquement pur dosé à 0 gr. 50 ou 0 gr. 25.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme infectieux, rhumatisme chronique, goutte, sciatique, névralgies, coliques hépatiques, fièvres infectieuses, infections urinaires, état infectieux.

Posologie. — 8 à 20 pilules à 0 gr. 50 par jour, soit 4 à 10 grammes, à déterminer par le prescripteur. Dose double p^r les pilules à 0 gr. 25. Étui de 60 pilules à 0 gr. 50 ou de 80 pilules à 0 gr. 25 : 17 francs.

Produits du Dr HENRI-PHILIPPE.

36, quai Fulchiron — LYON.

KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

Indications.

- 1° Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
- 2° Adénoïdite aiguë de l'enfance : décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage *utile* de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
- 3° Accès de faux croup.
- 4° Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

Mode d'emploi.

Chez les nourrissons, instiller à la fois II à III gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.

Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller IV à V gouttes.

Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Flacon de 20 cc.

Prix : 17 francs.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV°)
(Litré : 98-89.)

KIDOPHÉDRINE

Association Éphédrine-Adrénaline en solution huileuse.

Indications. — Rhinites et adénoïdites aiguës, Rhinites congestives, Sinusites aiguës fronto-maxillaires, Otites, Mastoïdites, Rhinites spasmodiques, Rhume des foins, Trachéites, Coqueluche.

Mode d'emploi :

Oto-rhino-laryngologie : en instillations nasales, IV à V gouttes dans chaque narine, 5 à 6 fois par jour.

Rhume des foins, rhinites spasmodiques. — Instillations nasales 5 à 6 fois par jour et au moment où la crise s'annonce par un chatouillement du nez ou de la gorge.

Coqueluche. — Instillations fréquentes et répétées, à raison de II gouttes dans chaque narine toutes les 2 heures.

Flacon de 20 cc. : 17 francs.

Flacon de 10 cc. : 11 francs.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard du Montparnasse — PARIS (XV^e).

(Tél. : Litté 98-89.)

KINALDYNE

Élixir fortifiant

Indications. — Surmenage, Anémie, Paludisme, Convalescence, Inappétence, Neurasthénie, Prophylaxie de la grippe et ses suites.

Forme. — Élixir faiblement alcoolisé de goût très agréable.

Composition. — Tous les principes actifs des quinquinas.

Mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur 1/4 d'heure avant les repas. (Le flacon pour 10 jours de traitement.)

Prix : 20 francs.

Laboratoires GAMEL

2, place de la Salamandre — NIMES.

KINÉCHOL

Composition. — Granulé soluble de goût agréable à base de sulfate de magnésie desséché, peptone de fibrine, extrait de boldo, hyposulfite de magnésie.

Indications. — Affections du foie et de la vésicule biliaire (calculs et coliques hépatiques).

Troubles digestifs d'origine hépatique : Vomissements, Pesanteurs, Constipation, Diarrhée d'origine hépatique. Manifestations hépatiques : Migraines, Urticaires, Nausées, Prurit.

Contre-Indications. — Cholécystites aiguës et dysenterie.

Posologie. — Une, deux ou trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun. Se coucher ensuite 20 minutes sur le côté droit.

Prix : 19 fr. 50

Laboratoire du KINÉCHOL

GENEVET, Docteur en Pharmacie

29, rue des Marchands — AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : 2-75.)

KINECTINE

(Combinaison d'Hectine et d'Éphédrine.)

Spécifique de la Fièvre des Foins, de la grippe et du Coryza.

Indications. — Fièvre des foins, Coryza aigu, grippe asthme, emphysème.

Forme. — Comprimés.

Posologie :

Adultes : 3 à 5 comprimés par jour.

Enfants : Moitié dose.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine

Docteur ès sciences, pharmacien de 1^{re} classe

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

Forme. — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

Posologie. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants.

Moins d'un an 2 à 4 cuill. à café par jour.

1 à 5 ans 4 à 8 — —

5 à 10 ans 5 à 10 — —

Au-dessus de 10 ans 8 à 10 — —

Nota.

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

Prix : 19 fr. 75.

LABORATOIRE REMEAUD

38, avenue J.-Baptiste-Clément — Boulogne-sur-Seine.
(Téléphone : Molitor 04-59.)

Dépôt général O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS

KODOS

Composition. — Mélange effervescent de sels de potasse, de lithine, de magnésie, de soude avec de l'eurotropine.

Propriétés thérapeutiques. — Elimine les déchets de la combustion vitale, Assouplit les artères, Combat la sclérose des tissus, Décongestionne le foie et les reins, Désinfecte les urines.

Indications. — Cure d'amaigrissement, Congestion du foie, Lithiase rénale, Affections de la peau, Prurit, Pyélonéphrite, Cystite, Prostatisme, Arthritisme, Rhumatisme, Troubles urinaires, Asthme et Emphysème, et surtout Cholémie.

Mode d'emploi. — Une pellette de poudre chaque matin à jeun au lever dans une eau très peu calcaire (de préférence l'eau minérale des Abatilles) ou une pellette un quart d'heure avant chaque repas.

Prix : 11 fr. 75 et 22 fr. 40.

Laboratoire des **ABATILLES**

Route du Moulleau — ARCACHON.

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, kolacatéchine, rouge de Kola.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et des maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 13 francs.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

KOLA MONAVON

Présentation et composition :	Prix public.
<i>Élixir</i> (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).....	20 fr. 75
<i>Vin</i> (18°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).....	20 fr. 75
<i>Granulée</i> : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.	15 fr. »
<i>Pastilles</i> : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.	10 fr. »

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : Excitant tonique général.

Indications. — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalalgie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

Posologie :

Élixir : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

Vin : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

Granulée : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

Pastilles : 10 à 15 par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente :

Élixir : 12 jours. — *Vin* : 8 jours. — *Granulée* : 8 jours. —

Pastilles : 4 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

KOLA-STHÉNYL

Élixir aux vins généreux de France et principes actifs en association très stable : *Noix fraîches de Kola*, coca, quinquina, noix vomique, Phosphate de Manganèse, arrhénal, associés à l'Acide orthophosphorique (1 partie); Phosphate acide de soude (2 parties selon les proportions de la formule de Joulie).

Propriétés-indications. — *Tonique musculaire, Tonique cardiaque, Tonique antigrippal, Reconstituant des Forces physiques et cérébrales*, remarquable par la *sûreté* et la *rapidité* de son action, dans : *Toutes les déficiences organiques, toutes les Convalescences : médicales, chirurgicales, obstétricales.*

Toutes les dépressions : Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

Présentation. — Flacon de 155 cc.

Posologie. — D'un goût liquoreux très agréable, le Kola-Sthényl se prend pur ou dilué dans eau ou vin, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café, avant, pendant ou après les principaux repas.

Enfants : 1/2 dose.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1244-11.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine.

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 01-35)

KOLATINÉS

Tonique sédatif.

Kola nature, *non caféinée* grâce au traitement sur place (A. O. F.) de l'amande vivante, avant l'oxydation diastasique destructrice de la *Kolatine* et productrice de caféine. La poudre soluble ainsi obtenue n'a, de ce fait, aucun rapport avec les kolas caféiques provenant des noix du commerce simplement séchées à l'air. Stimule beaucoup mieux que le café et *n'énerve pas*.

Indications particulières. — Asthénies du matin, des *hépatiques*, des surmenés, des insomniaques ; des enfants lymphatiques, anorexiques, adénoïdiens.

Dépression mentale, sous toutes ses formes, à toutes ses intensités, quelle qu'en soit l'origine.

Déficience sexuelle masculine, avec anxiété, dépression morale, impuissance psychique.

Stimulant inoffensif chez les neuro-végétatifs privés de café, thé, le matin, à midi, au goûter ou même le soir.

Élimine l'impression de fatigue éprouvée lors de certains régimes restrictifs : obèses, hépatiques, *diabétiques* (sucrer à la saccharine).

Intérêt de mordantage dans les thérapeutiques stimulatrices thyroïdienne, surrénale, orchitique, cérébrale.

Innocuité complète vis-à-vis du sommeil. Aucune contre-indication. Ni accumulation, ni accoutumance.

Utilisation de choix. — Dans l'eau sucrée très chaude, le lait ou les déjeuners, *après dissolution complète*. 1/2 à 4 sachets par jour, moyenne 1 à 2.

En vue de l'effort physique ou intellectuel chez les sujets bien portants (épreuves sportives ou scéniques, examens, concours, discours) : 1/2 heure avant l'action.

Boîte P. M., 10 sachets (14 fr. 45). Boîte G. M., 30 sachets (40 fr. 35).

Sté des Produits et Procédés CHALAS

75, rue Jacques-Dulud,
NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).

KOUMYL

Concentrat de bacilles lactiques vivants en gouttes.

Le Koumyl est une suspension concentrée de ferments lactiques, stabilisée par un milieu qui suspend la vie du bacille sans la détruire.

Avantages :

1° Maniement pratique.

Quelques gouttes versées au moyen du compte-gouttes dans un peu de lait ou d'eau.

2° Ne contient ni caséine, ni matières grasses, ni peptones, ni sucre. N'est pas un milieu de culture favorable auxensemencements accidentels.

3° Ne renferme pas d'acide lactique.

4° Pas de saveur désagréable.

5° Conservation pratiquement illimitée.

6° Traitement peu onéreux.

Indications :

Toutes les affections intestinales, aussi bien chez l'adulte que chez le nouveau-né (gastro-entérites, auto-intoxication, etc.), ainsi que les dermatoses et migraines dérivées.

Le Koumyl étant d'une innocuité absolue peut être administré dès la naissance.

Posologie :

Nourrissons : I à V gouttes trois fois par jour.

Enfants : X gouttes trois fois par jour.

Adultes : XV à XX gouttes trois fois par jour. Entre les repas dans un liquide froid ou à peine tiède. Agiter fortement avant l'usage.

Prix : 18 fr. 20

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait bouilli revenu à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 15 fr. 50.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

LAB-LACTO-FERMENT- MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons.

Dans tous les cas de mauvaise digestion du lait.

Troubles gastro-intestinaux du régime lacté.

Toutes les fois que le malade a besoin d'absorber une forte quantité de lait.

Doses. — *Pour adultes et enfants* : une cuiller-mesure par verre de lait.

Nourrissons : une demi-cuiller-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans 2 cuillerées d'eau. Quand l'effervescence est terminée, ajouter le lait, froid ou tiède.

Le liquide trop chaud détruirait le ferment.

Conservation : cinq années.

Flacon de 130 grammes. Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

LACCODERMES

verniss souples, solubles à l'eau.

TRAITEMENT

des maladies de la peau.

« **À chaque dermatose son médicament** ».

Les Laccodermes, vernis souples, ne tachent pas, ne graissent pas, n'ont aucun des inconvénients des pommades et ne nécessitent aucun pansement.

ECZÉMAS : Laccoderme au goudron de houille.

DERMATOSES LÉGÈRES : Laccoderme à l'oxyde de zinc.

DERMATOSES INFECTÉES : Laccoderme à l'ichtyol.

DERMATOSES PRURIGINEUSES : Laccoderme au Chl. d'amyléine.

DERMATOSES SÈCHES : Laccoderme au soufre. — Laccoderme sulfocadique.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et C^{ie}, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
Tél. : Montmartre 75-01.

LACPININE

Forme. — Liquide blanc.

Composition. — Émulsion d'essence de pin naturelle.

Indications. — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

Mode d'emploi. — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la LACPININE s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

Prix.	{	Flacon de	60 gr. :	6 fr. 90
		—	150 gr. :	15 fr. 95
		—	750 gr. :	53 fr. 30
		—	1 000 gr. :	63 fr. 95

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière
(Tél. : Trudaine 92-52.)

LAC-SER

Composition. — Lactosérum desséché.

Propriétés. — Provoque dans l'intestin des fermentations acides qui s'opposent aux putréfactions albuminoïdes toxiques. A, en outre, une action diurétique et cholagogue.

Indications. — Auto-intoxications intestinales, entérites des nourrissons, affections hépatiques, Pansements (bactériothérapie).

Formes et posologie. — Paquets : 5 gr. de lactosérum desséché par paquet correspondant à 100 grammes de lactosérum liquide.

Dose : 3 à 4 paquets par jour dans un liquide (300 à 400 grammes).

Prix : 18 fr. 50 (boîte de 30 paquets).

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS (XIII^e).

(Tél. : Gobelins 23-90.)

LACTACYD

PÂTE ANASEPTIQUE, VITAMINÉE, ACIDE

Soluble, sans corps gras, Iso-acide de l'épiderme pH : 5,2.

Remplace les pommades grasses, les pâtes neutres.

Calme la démangeaison. Régénère l'épiderme.

Composition. — Lacto-sérum acide, bacilles lactiques, huile de fétan, en émulsion d'hydrobase et d'éthers définis d'acides gras supérieurs.

Excipient nouveau, *ionisé* et actif, d'extrême douceur, *inoxydable*, ne séchant pas à l'air, *entièrement* soluble à l'eau. Très *hydrophyle* : contient 45 % de lacto-sérum, absorbe les exsudats, *Emulsif* : dissout la séborrhée, permet le nettoyage comme un savon. Déterge les plaies.

Action. — *Désinfection* par bactériothérapie lactique. *Reconstitution cellulaire* (lacto-sérum isotoni ue), *Activité biologique* (huile de fétan).

Indications. — *Dermatoses de cause externe* (physique, mécanique, chimique). Plaie, Brûlures, Froidure, (soleil et rayon X), Intertrigo des plis des pieds, Erythème infantile, Gerçures, Eczéma aigu. *Dermatoses séborrhéique*, Acné, Kérose, Cuir chevelu. *Prurit*, Prurigo et toute démangeaison. *Dermatose microbienne et parasitaire*, Poydermite, furoncles, érysipèle, Mycose et lèvrure. Dermatose coloniale.

Emploi : 1° *Nettoyage* : Etaler, frotter avec ouate. Laver à l'eau.

2° *Pansement* : Appliquer Lactacyd directement ou sur compresse.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE

Bureaux : 26, boulevard des Batignolles — PARIS (XVII°).

LACTAGOL

Poudre.

Nature. — Protéine galactogénique extraite par procédé spécial de la graine de cotonnier, Phosphoprotéides, Phosphates organiques assimilables.

Mode d'emploi. — Poudre agréable à prendre : 3 à 6 cuillerées à café par jour avant ou après les repas, délayée dans un liquide froid ou tiède. Ne pas chauffer.

Propriétés thérapeutiques. — Accroissement de la sécrétion lactée, enrichissement du lait en principes actifs : beurre, caséine, sels, etc.

Indications. — Agalactie, Hypogalactie, Allaitement maternel insuffisant au point de vue qualités du lait, Fatigues de l'allaitement.

Prix : La boîte entière : 17 fr. 65.

Pour un traitement de 10 à 20 jours.

(La demi-boîte : 10 fr. 40).

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV°).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-6.

LACTARIS

DÉSINFECTION INTENSIVE DE L'INTESTIN

Bactériothérapie polyvalente nouvelle

par précipité massif de cultures anaérobies facultatives.

ACIDOPHILES ET LACTIQUES STABILISÉES

Effet. — Hyperactif et toujours identique.

Présentation. — Ampoules de 6 cc. à sucer, pur, avec chalumeaux stérilisés inclus dans la boîte.

Richesse microbienne. — Env. 5 milliards de bactéries acidophiles et lactiques en symbiose, par ampoule.

Indications. — Toutes diarrhées, entérites, hyperintoxication intestinale. *Colibacillose*.

Dose moyenne. — *Adultes, enfants* : 2 ampoules par jour, 1/4 d'heure avant petit-déjeuner et repas du soir.

Nourrissons : 1 ampoule, mélangée au biberon.

Prix : 25 francs la boîte de 18 ampoules (cure de 9 jours).

Laboratoire CENTRAL

MASSON, Pharmacien,

2, Place de la Porte des Ternes — PARIS.

LACTAVINAIGRE

Lacticithérapie.

Fabrication Bourgeois et ^{Cl}, à Ballaigues, maison fondée en 1790.

Composition. — Produit biologique de fermentation acétique et lactique, 100 p. 100 lactéique, sans aucune adjonction de substances chimiques, stabilisé suivant un procédé spécial, conservation illimitée. A base :

1° De babeurre, petit-lait et sérum de lait décaféinés, condensés et concentrés.

2° D'un ensemble de sels minér. (phosphates, chlorures, sulfates), etc...

3° De vitamines.

Saveur agréable et aromatique ne rappelant en rien l'origine.

Propriétés. — Anti-toxique par son *acide lactique naturel libre et actif* (0 gr. 23 par cuillerée).

Non-agressivité et tamponnage de l'acide acétique par les sels minéraux du lait (5/6 gr. par lit.) prouvés par l'indice incontestable du pH ionique 3,40 (pH du jus de citron 2,30, des vinaigres 2,40/2,70).

Indications. — *Lactavinaigre remplace les vinaigres et jus de citron, dont il ne présente aucun des inconvénients.*

Lactavinaigre est aussi un adjuvant très rationnel comblant une lacune dans la thérapeutique des affections suivantes :

Désintoxication générale : toutes affections gastro-intestinales.

Hyperacidité, hyperchlorhydrie, dyspepsie, colibacillose.

Désensibilisation : dermatose, urticaire, eczéma.

Hypertension, diabète.

Mode d'emploi. — Au goût de chacun (à saveur égale acidité moindre) env. une 1/2 cuill. à soupe par personne avec les aliments (salade, crudités, mets divers assaisonnés), en remplace le vinaigre ou jus de citron.

Présentation — La bouteille de 75 cl. : 16. fr. 75.

Laboratoire du LACTAVINAIGRE

34, rue de Trévise — PARIS (IX^e). (Téléph. : Prov. 72-49.)

LACTIFÈRE CARRION

Composition :

Émulsion de *bacilles lactiques* sélectionnés, à 60 millions par cc., soit 300 millions par ampoule.

Forme :

Ampoules de 5 cc.

Indications :

Auto-intoxications intestinales, Entérites, Constipation.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 ampoules par jour, *per os*, dans un peu d'eau sucrée, avant les repas.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 21 fr. 30.

Durée de conservation (date indiquée sur les boîtes) : 150 jours.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTIPHAGE

Bacille lactique et bactériophage.

Boîte de 12 ampoules buvables de 10 cc.

Toutes affections intestinales.

Le *Lactiphage* est une émulsion saturée de bacille de Huppe en milieu approprié, toujours à l'état vivant, et dont la vitalité et l'activité sont de durée illimitée. À l'action des ferments lactiques, il joint celle des bactériophages polyvalents. Cette formule, entièrement nouvelle, affirme sa supériorité dans tous les cas d'infection intestinale (Shiga, Flexner, Eberth, para A et B, Gærtner, etc.). Le *Lactiphage* signale son efficacité par une sensation d'euphorie immédiate et tout à fait impressionnante.

Indications thérapeutiques. — Entérites, Entéro-Colites, Colibacilloses, Dysenteries (Shiga, Hiss, Russel, Flexner), Typhoïdes, Para A et B, Tuberculose intestinale, Diarrhées de types variés (séniles, infantiles, etc.), Appendicites chroniques, Constipation, Flatulence, Fermentations putrides et dans tous les cas où la fonction intestinale est troublée.

Posologie. — S'emploie par voie buccale, de une à trois ampoules par jour, pures ou diluées dans un peu d'eau tiède.

Aucune contre-indication, même chez les enfants.

Boîte de 12 ampoules : 25 francs.

PRODUITS BIOCHIMIQUES ROSSO

THURET, Pharmacien,

63, rue de Charonne — PARIS.

LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques
sélectionnés.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

Propriétés thérapeutiques. — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

Indications. — Auto-intoxication intestinale, Entérites, Diarrhées, Dermatoses.
Prix : 12 francs (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

LACTOBYL

Composition :

Sels biliaires	0,05
Poudre de glandes intestinales.....	0,02
Charbon poreux.....	0,02
Ferments lactiques	0,05
Poudre de laminaria flexicaulis.....	0,05

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Rééducateur intestinal.

Indications. — Toutes les modalités de la constipation.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés par jour avant les repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, deux lignes groupées.)

LACTOCALCINE

Comprimés.

Composition :

Ferments lactiques spéciaux..... 0,25
(Procédés Deperdussin)

Excipient..... Q. S. pour 1 comprimé.

Propriétés. — Thérapeutique lactique intensive sans déminéralisation : entérites aiguës ou chroniques, intoxications intestinales.

Particularités. — Conservation presque infinie. Désintégration et développement des ferments lactiques seulement dans l'intestin.

Doses :

Nourrissons : 1 à 2 comprimés par jour.

Enfants : 4 à 6 comprimés par jour.

Adultes : 8 à 10 comprimés par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

(Tél. : Louvre 53-16.)

LACTOCHOL

Composition. — Ferments lactiques. Sels biliaires.

Forme. — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

Propriétés thérapeutiques. — Infections intestinales, entérites (Adultes et nourrissons), Insuffisance biliaire.

Dose et mode d'emploi (*Comprimés et Granulés*) :

Adultes : 4 à 12 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avaler sans mâcher).

Enfants : 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour dans miel, confiture, avant les repas.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

Laboratoires LOBIOA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, deux lignes groupées.)

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif et cholagogue. Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin et du foie sans la moindre irritation.

Doses. — 1 à 2 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau.

Enfants : 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 14 fr. 55.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°).
(Tél. : Ségur 55-12.)

LACTOMA LAIT DE MAGNÉSIE BEYTOUT

Composition. — Hydroxyde de Magnésie porté à une division extrême comparable à l'état colloïdal. Stabilité parfaite.

Indications et Posologie. — Toutes constipations, Constipation des enfants, constipation des vieillards, constipation des femmes enceintes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Comme anti-acide : Aphtes, Stomatites, Gingivites, Pyrosis, Hyperchlorhydrie, 1 à 2 cuillerées à café diluées dans l'eau, après chaque repas.

Enfants : demi-doses.

Avantages. — Aucune contre-indication. Ne provoque pas de coliques. Ne congestionne pas le petit bassin. Goût agréable. (Jus de citron facultatif.)

Présentation et Prix :

Petit flacon 120 cc.....	9 fr. 35.
Grand flacon 360 cc	18 fr. 75.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).
(Tél. : Nord 76-85.)

LACTOPROTÉIDE CARRION

Composition. — Lait homogénéisé pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Forme. — Ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Indications et Posologie. — Les indications sont, dans l'ensemble, celles de la Protéinothérapie :

Infections de nature diverse : générale (grippes, fièvre puerpérale, etc.) ou localisées (suppuration, pyodermites, etc.).

Une injection intramusculaire (jusqu'à 10 cc.) le plus tôt possible, la répéter après 2 à 5 jours.

Anémies : 5 à 10 cc. tous les 5 jours.

Affections oculaires : 5 cc. tous les 2 jours.

Intolérance des enfants au lait de vache : 5 à 10 cc. puis réinjecter par doses progressives : 1/2 cc. puis 2 cc. une heure après, enfin 5 à 10 cc. une heure plus tard.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de	2 cc. :	11 fr. 45
— de 6 — de	5 cc. :	17 fr. 15
— de 6 — de	10 cc. :	19 fr. 75

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTOSÉRUM CARRION-LAGNEL

Action thérapeutique. — Epuration organique dans les affections du rein, de l'appareil digestif et du système circulatoire. Restauration tissulaire au niveau des plaies.

Indications. — Néphrite, Urémie, Hypertension, Ictères et congestions hépatiques, Dyspepsies gastro-intestinales, Entérites, Colites, Cardiopathies, Artériosclérose, Pansement des plaies et brûlures.

Mode d'emploi. — En général, 200 cc. (soit le contenu d'un flacon) à jeun en deux ou trois fois. Des prises espacées peuvent être également prescrites. Il est loisible de sucrer ou d'aromatiser le Lactosérum.

Pour les pansements, imbiber les compresses ou les mèches, ou pratiquer des instillations.

Présentation et prix. — Le flacon 5 fr. 35. — La boîte de 4 flacons : 21 fr. 30.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTO-SÉRUM LAVRIL

Désintoxication et diurèse. La Diète.

Substance-Tampon du sang.

Compensateur des Déséquilibres humoraux,

Déséquilibres acido-basiques (pH),

Déséquilibres du système : Foie, Intestin et Rein.

CURE DE DÉSINTOXICATION.

Diète partielle (4 ou 8 jours).

Un flacon de 200 cc. pris à jeun, en trois fois.
à 20 minutes d'intervalle.

Supprimer le petit déjeuner. Régime sans laitage.
Sucrer ou aromatiser à volonté (café, citron, rhum).
En cas d'aigreur, ajouter 2 gr. de carbonate de magnésie.

Indications. — Toutes les intoxications. Les prescriptions de Diurèse. Petits hépatiques, ictères, cirrhose. Cardio-rénaux, azotémie, hypertension, entérite, colibacillose. Déséquilibres : alcalose, acidose, eczéma. Convalescence.

DIÈTE

Lacto-Sérum Lavril est la base de toute diététique.

Grande cure (flacon de 960 cc.) : **120 cc. toutes les 2 heures.**

Sucrer et aromatiser, augmenter les doses à volonté.

Remplace diète hydrique et tisanes.

Diète des fiévreux. Typhiques. Grands malades.

Préparation opératoire. Diète des opérés. Urémie.

Reminéralisation. Réhydratation. Pas de perte de poids.

ENFANTS

Troubles d'assimilation : Mélanger 30 p. 100 par biberon.

Troubles digestifs : *Lacto-Sérum Lavril* pur, le matin.

Gastro-entérite. Diète : *Lacto-Sérum* pur, toutes les 2 heures.

Remplacer le lait ou l'eau en volume.

Cette diète peut être prolongée 8 jours sans perte de poids.

Lacto-Sérum Lavril arrête Gastro-entérite la plus grave.

Lacto-Sérum Lavril, solution isotonique du milieu humoral, stérile, de conservation indéfinie, ne doit pas être confondu avec un ferment lactique.

Les 4 flacons de 200 cc. 27 fr. 50

Le grand flacon de 900 cc. 18 fr. »

Laboratoires LAVRIL

PACY-SUR-EURE — (Tél. : 10.)

Bureaux : 26, boul. des Batignolles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marc. 21-14.)

LACTOSMOSE

Pansement isotonique du milieu cellulaire.

Composition. — Une poudre désinfectante (bacilles lactiques).
Un liquide cicatrisant (lacto-sérum isotonique).

Action. — Désinfection par changement de milieu.
Autolyse par désintégration des albumines.
Cicatrisation par osmose.

Présentations :

Type courant : 8 pansements (ampoules de 15 cc. et poudre)..... 24 fr. 50
Grand modèle : 8 pansements (flacons de 60 cc. et poudre)..... 30 fr. »
Poudre Lactosmose : 1 flacon de 40 cc. de poudre. 13 fr. 80

Emploi. — *Poudre et sérum* sont mis sur la plaie de la façon la plus simple, Processus facultatif. Ni dosage. Ni précaution, Ni contre-indication. (sauf greffon).

Pansement des plaies externes. — Saupoudrer légèrement, puis appliquer une compresse de sérum; pansement une fois par jour, puis espacer.

Pansement vaginal, mèche. — Imbibber la mèche avec du sérum, puis saupoudrer celle-ci. (Ce processus peut être employé sur plaie externe.)

Pansement épais obstétrical (bouillie lactique). — Pour pansements épais, prendre une boîte Lactosmose et un flacon de poudre. Mélanger dans un verre 1 vol. poudrè et 2 à 3 vol. lacto-sérum. Avec cette bouillie, enduire le champ opératoire ou le col après accouchement, ou projeter cette bouillie avec une seringue de Bonneau. La bouillie lactique s'utilise en pansement rectal (méthode Beïsaude).

Drainage et instillation vésicale. — Cystite (méthode Papin). Mélanger lacto-sérum avec 10 à 20 % de poudre. Instillations quotidiennes de 15 à 30 cc. Si la vessie est douloureuse, commencer par 5 cc. de lacto-sérum pur ou dilué.

Poudre et liquide peuvent être employés séparément.

Poudre : plaies légères, pansements d'urgence, pansements secs.

Liquide : plaies saines, traumatismes sans plaie.

Indications :

Toutes indications des antiseptiques et du Dakin mais :

Désinfection plus puissante et sans oxydation des tissus,

Nettoyage extraordinaire par autolyse,

Cicatrisation régulière en couches profondes,

Activité biologique des plaies atones.

Lactosmose est spécialement indiqué sur Brûlure, Plaie profonde, anfractueuse, Exérèse, Abscès, Hématomes, Ulcère, Escarre, Néo, Gangrène, Plaie périnéale, Seins, Rectum, Pansement vaginal, Épisiotomie. Lactosmose s'emploie dans l'abdomen (Appendicite suppurante), il est particulièrement efficace contre anaérobies et coli.

Sur plaies très douloureuses, commencer par pansements de lacto-sérum pur ou dilué à 50 % d'eau. La poudre est ensuite bien tolérée.

Laboratoires LAVRIL

PACY-SUR-EURE — (Tél. : 10.)

Bureaux : 26, boulevard des Batignolles — PARIS (XVII^e).

(Tél. Marc. 21-14.)

LACTOSODINE

Composition et Propriétés thérapeutiques. — La *Lactosodine* renferme :

- 1° Des bacilles lactiques sélectionnés : *Bacillus Lacticus* de Pasteur ; *Bacille Bulgare*.
- 2° Des sels de chaux assimilables qui *neutralisent l'action déminéralisante* de l'acide lactique.
- 3° Du citrate de soude dont l'action eupeptique et le pouvoir antiémétisant ne sont plus à discuter.

Indications. — Toutes affections gastro-intestinales de l'adulte comme du nouveau-né. Dermatoses d'origine digestive.

Présentation. — *Comprimés* : La seule forme qui soit pratique — les bouillons, en effet, ne se conservent pas, — ont d'autre part une odeur et une saveur désagréables qui en rendent l'absorption souvent difficile aux adultes et impossible aux enfants.

Vitalité et conservation des B. L. : Pratiquement la même pendant 9 mois.

Ensemencer — à la température de 37° — avec 2 gr. 50 de Lactosodine, 20 cc. de bouillon de Touraillons, peptonisé et lactosé : Vous trouverez, à l'analyse, au 4^e jour :

- 1° Avec des comprimés de fabrication récente 5 gr. 65 d'acide lactique.
- 2° Avec des comprimés datant de 6 mois 5 gr. 60 d'acide lactique.

Posologie :

Nourrissons : 1 à 3 comprimés par jour, délayés dans un peu de lait bouilli et tiède.

Enfants : de 2 à 6 comprimés.

Adultes : de 6 à 10 comprimés délayés dans un peu d'eau sucrée.

La Lactosodine assure l'*antisepsie du tube digestif*, sans déminéralisation.

Prix : 18 francs.

Laboratoires de l'UROIODINE

17 bis, rue Juge (XV^e).

(Tél. : Suffren 41-22 et 08-02.)

LAITANCYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.
Deux formules :

1° *Laitancyl simple*, comprimés dragéifiés de laitances de harengs, très riches en phosphore, desséchées dans le vide et à froid, sans goût ni odeur.

Leur action est renforcée par de l'huile de germe de blé (vitamine E), de l'Huile de flétan (Vitamine D), de la Cérébrine et de l'inositophosphate de chaux et de magnésie.

2° *Laitancyl méthylarsiné*, même formule additionnée d'arrhénal (0,008) et de fenugrec désodorisé et dés-huillé.

Propriétés. — Le *Laitancyl* est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent aliment phosphoré.

Indications. — Anorexie, amaigrissement, surmenage physique et intellectuel, asthénie post-grippale, rachitisme, toutes adynamies et débilités.

Posologie :

Adultes : 4 à 5 comprimés par jour.

Enfants (à partir de 7 ans), 3 comprimés.

Prix : 20 francs le flacon de 80 comprimés.

Laboratoire du Laitancyl: R. PANIER
MALO-LES-BAINS (Nord).

LAIT CALCIQUE ZIZINE

Lait sec, partiellement écrémé et décaséiné.

Forme. — Poudre.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment de transition pour la reprise du régime lacté. Alimentation des nourrissons dyspeptiques et eczémateux.

Indications. — Chez les vomisseurs, les diarrhéiques, les dyspeptiques, les eczémateux, les nouveau-nés privés du sein et dans tous les cas d'intolérance lactée.

Mode d'emploi. — Pour préparer un biberon, ajouter à 100 cc. d'eau bouillie à peine tiède et sucrée à 5 p. 100, 2 mesures de lait calcique sec. Agiter pour dissoudre.

Pour une quantité supérieure, verser une mesure par 50 cc. d'eau supplémentaire.

Pour la préparation des décoctions farineuses, l'eau bouillie peut être remplacée par une quantité égale de décoction de riz ou d'orge, sucrée ou non, suivant les indications du médecin.

Les bouillies au LAIT CALCIQUE sont préparées avec 50 cc. de bouillie tiède pour une mesure de LAIT CALCIQUE ZIZINE.

Valeur calorique du lait ainsi reconstitué :
685 calories environ.

Prix : 8 fr. 55.

Laboratoires du Dr. ZIZINE

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

LAIT DARDELET (MODIFIÉ)

pour Nourrissons.

Lait humanisé n° 1 (Système Backauss modernisé).

Semblable par sa composition et sa structure au lait de femme. Ne contient ni eau surajoutée, ni antiseptique. Allaitement de tous les nourrissons et spécialement des intolérants au lait, des prématurés, etc...

Lait humanisé n° 2. Même préparation que le précédent, mais composition intermédiaire entre le n° 1 et le lait de vache. Tous mes produits sont homogénéisés et donnent un coagulum semblable à celui du lait de femme. Conservation sous le vide.

Babeurre Dardelet (Voir rubrique *Babeurre*).

Mode d'emploi. — Pour tous mes produits, faire tiédir au bain-marie et donner pur ; mêmes doses que le lait maternel.

Prix. — En bouteilles (départ usine) 1/4 de litre : 3 francs.

Caisses de 25 ou 50 bouteilles.

Notre situation au centre de la France et sur une grande ligne nous permet des envois immédiats en Province.

Fournitures gratuites aux Hôpitaux.

J. DARDELET, Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne) — (Tél. : 4).

La Maison est à la disposition des Docteurs désirant entreprendre la *Maternisation* à leurs gouttes de lait.

LAIT DÉCHLORURÉ GUIGOZ

(Concentré à 2 1/2 pour 1, stérilisé non sucré.)

L'extraction du chlorure de sodium est obtenue par dialyse. Ce lait, qui conserve la saveur agréable d'un bon lait naturel, est un précieux agent thérapeutique *diurétique* et *déchlorurant*.

Après reconstitution, sa teneur, exprimée en Cl Na, est réduite à 0 gr. 023 par 100 cc., soit au huitième du lait complet.

Indications. — Toutes rétentions chlorurées : Néphrites, Ascites, Hypertension avec insuffisance rénale, Hyperchlorhydrie, Albuminuries, Néphropathies gravidiques, Accélération de l'accouchement.

Mode d'emploi. — La dilution normale, mais non obligatoire — notamment pour les hypertendus, — est de une fois et demie son poids, soit pour une boîte de 500 gr. dans 750 gr. d'eau bouillie.

Les aromates permis par le régime peuvent lui être ajoutés. Ne jamais tolérer l'ingestion d'aucun aliment, quel qu'il soit, pendant la digestion du produit.

Voir :

Lait en poudre *Guigoz* ; Lait Dextrosé Malté *Guigoz* ; Babeurre *Guigoz* ; *Ravix* (Lait *Guigoz* irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

LAIT DE MAGNÉSIE BEYTOUT LACTOMA

Composition. — Hydroxyde de Magnésie porté à une division extrême comparable à l'état colloïdal. Stabilité parfaite.

Indications et Posologie. — Toutes constipations, Constipation des enfants, constipation des vieillards, constipation des femmes enceintes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Comme anti-acide : Aphtes, Stomatites, Gingivites, Pyrosis, Hyperchlorhydrie, 1 à 2 cuillerées à café diluées dans l'eau, après chaque repas.

Enfants : demi-doses.

Avantages. — Aucune contre-indication. Ne provoque pas de coliques. Ne congestionne pas le petit bassin. Goût agréable. (Jus de citron facultatif.)

Présentation et Prix :

Petit flacon 120 cc.....	9 fr. 35.
Grand flacon 360 cc.....	18 fr. 75.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).
(Tél. : Nord 76-85.)

LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

Combinaison chimique définie de magnésie et d'eau (hydroxyde de magnésium) ne contenant aucun excipient destiné à maintenir la magnésie en suspension.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-acide, Sédatif gastrique, Laxatif.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies acides et nerveuses, Eructations, États bilieux, Constipation, Coliques, Diarrhées d'origine dyspeptique.

Posologie. — *Anti-acide.* Adultes. — D'une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, 2 heures après les repas. Enfants : 1/2 à une cuillerée à café. Nourrissons : X à XX gouttes suivant l'âge.

Laxatif. Adultes. — D'une à quatre cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de limonade, une heure et demie avant le petit déjeuner du matin. Enfants : de une à deux cuillerées à café. Bébés : une demie à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Anti-acide buccal. — Après s'être brossé les dents, bien se rincer la bouche avec une cuillerée à soupe de Lait de Magnésie Phillips. Il se forme sur les dents et les gencives une pellicule alcaline qui dure plusieurs heures et les protège contre les attaques de l'acide.

Présentation : flacon de 120 cc., triple-flacon de 360 cc. environ.

Échantillons et Littérature sur demande à

O. C. P.

108, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse), est livré sous 3 formes : Lait complet, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, **conserve indiscutablement toutes ses vitamines** et dispense de l'adjonction du jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons* : Diététique idéale des bébés privés, partiellement ou totalement, du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes : Intolérances lactées. Affections du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Dose. — Une partie (en poids) de lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Voir : { **Babeurre GUIGOZ.**
Lait dextrosé-malté GUIGOZ.
Lait déchloruré GUIGOZ.
Ravix (lait irradié).

Littérature et Échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, r. Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). — (Tél. : Wag. 66-76 et 77.)

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

(Dextrosé-malté.)

Identique au Lait en poudre Guigoz, $\frac{1}{2}$ écrémé, mais sans adjonction de saccharose, ce dernier étant remplacé par « Dextrose et Maltose ».

Indications. — *Pour nourrissons* : Intolérance au saccharose, Constipation, Fermentation intestinale, Eczéma.

Doses. — Une partie (en poids) de Lait Guigoz (dextrosé-malté) pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de Lait Guigoz (dextrosé-malté) pour 45 à 50 gr. d'eau.

Voir : { **Lait en poudre GUIGOZ.**
Babeurre GUIGOZ.
Lait déchloruré GUIGOZ.
Ravix (lait irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).
 (Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

LAITS CARRION

Préparés, aussitôt après la traite, à la laiterie Carrion d'Avesnes-en-Bray (Normandie).

1° *Pour l'alimentation des nourrissons normaux :*

Lait alimentaire : homogénéisé et stérilisé.

Lait demi-dégraissé : homogénéisé et stérilisé.

Diluer ces deux laits avec de l'eau bouillie, jusqu'au huitième mois.

2° *Pour l'alimentation des prématurés et des sujets débiles :*

Lait humanisé, homogénéisé et stérilisé, de composition ramenée à celle du lait de femme.

A consommer sans addition d'eau.

3° *Pour l'alimentation des sujets atteints de troubles digestifs :*

Lait écrémé, centrifugé et stérilisé.

4° *Pour réaliser une suralimentation :*

Lait suralimentaire, enrichi de la quantité de crème prescrite par le médecin.

5° **Laits fermentés Carrion-Lagnel**. — *Kéfir* et *Yohourth* (livraison dans Paris).

Pour leur fabrication domestique, voir « Kéfirogène » et « Yohourthogène ».

Présentation et prix ;

Lait alimentaire, demi-dégraissé ou humanisé : la bouteille de 200 grammes 1 fr. 75 ; la bouteille de 400 grammes 3 francs.

Lait écrémé : la bouteille de 400 grammes 2 fr. 50.

Kéfir : le flacon de 200 cc. 2 fr. 50.

Yohourth : le pot de 175 grammes 2 fr. 50 ; le pot de 140 grammes 1 fr. 50.

Laboratoires CARRION-LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV°

(Tél : Ségur 40-30.)

LAMBARÈNE

Composition. — Extrait sec de racines de Tabernanthe Manii, dosé à 0 gr. 20 d'extrait par comprimé.

Action thérapeutique. — Stimulant neuro-musculaire, excite les combustions cellulaires et *efface la fatigue*.

Durée de l'action. — Action rapide, prolongée, non suivie de dépression.

Indications. — Dépressions et Asthénies physiques et intellectuelles, Convalescences de maladies et d'opérations, Maladies infectieuses, Sédentarité et Cellulites, Effort physique ou intellectuel anormal à fournir par un sujet sain.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, suivant les indications du médecin, à *laisser fondre dans la bouche*. A prendre pendant 10 jours, 1/2 heure avant les repas.

Pas d'action nocive ni sur le cœur, ni sur le foie, ni sur le rein. Peut être administré aux hypertendus.

Assurances Sociales : Catégorie B.

Laboratoire du LAMBARÈNE

A. BLANCHOT, Pharmacien,

5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élysées 41-85.)

LANCERYL

Composition. — Formule de Lancereaux :

Digitale Standard	} à 0,05
Scille	
Scammonée	

Avantages. — Composants stabilisés et titrés **physiologiquement**.
Complexe préparé à l'abri de toute humidité conservant une valeur thérapeutique constante.

Action. — Ton-cardiaque, diurétique albuminurique et azoturique, stimulant hépatique.

Indications. — Cardiopathies subaiguës et chroniques, œdèmes périphériques, rétention chlorurée et azotémique. cirrhoses, congestions du foie et toutes affections hépatiques.

Posologie. — 3 à 5 pilules par jour pendant 10 jours. Arrêter 5 jours et recommencer. Dose pouvant être modifiée au gré du médecin traitant, car LANCERYL est de prescription uniquement médicale.

LANCERYL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1009-1.

Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires E. MOREAU, Pharmacien

13, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS.

(Tél. Turbigo 87-05.)

LANSOYL

Huile de paraffine chimiquement pure exempte de substances cancérogènes, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Forme gelée. — 90 p. 100 de Lansoyl liquide et 10 p. 100 de sucres de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect d'une véritable gelée de fruits. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, inflammation, Entéro-colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes* : 2 cuillerées à café matin et soir. *Enfants* : une cuillerée à café matin et soir. Augmenter ou diminuer légèrement suivant l'âge de l'enfant.

Prix :

Liquide G. M. (20 jours de traitement).....	23 fr. 40
— P. M. (10 — —).....	14 fr. »
Gelée (12 — —).....	15 fr. »

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Galvani 84-41.)

LANTOL

Anti-infectieux omnivalent.

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium (Procédé Couturieux) ; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules.

Action thérapeutique. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une *hyperleucocytose intense et durable*, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, gripes, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux hyperthermiques.

Enfants : Une à deux ampoules par jour en *injection* ou en *lavement* à conserver.

Prix : 34 fr. 30 pour 1 à 8 jours de traitement. A. S. B.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

Tél. : Carnot 18-75.

LARISTINE « ROCHE »

Composition. — Solution isotonique neutre et stérilisée à 4 % de chlorhydrate d'histidine.

Propriétés. — Traitement biochimique nouveau de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale d'après les travaux des professeurs A.-G. Weiss et E. Aron, qui ont mis en évidence l'action anti-ulcéreuse remarquable de l'histidine. Régression rapide sans régime strict de tous les symptômes, douleurs, hémorragies, vomissements, susceptibilité gastrique. Reprise immédiate de l'état général.

Indications. — Ulcère gastro-duodéal sous toutes ses formes, Préparation à l'intervention, Consolidation des résultats opératoires et aussi Angor, Asthme, Epigastralgies, Rhume des foins, etc.

Posologie et modes d'emploi. — 1 ampoule de 1 cc. = 0,04 monochlorhydrate d'histidine ; 1 ampoule 5 cc. = 0,20 monochlorhydrate d'histidine. Une injection quotidienne intramusculaire ou sous-cutanée d'une ampoule de 5 cc. ou intradermique d'une ampoule de 1 cc. pendant trois semaines environ.

Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. et 1 cc. : boîtes de 6.

Enregistré au Laboratoire National
de Contrôle des Médicaments
sous le N° 504-65.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE
et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

LAROSAN « ROCHE »

Composition. — Caséine-Calcium. Spécifique de la diarrhée infantile.

Propriétés. — Alcalinisation du milieu intestinal, suppression du petit lait, apport minimum de sucre, taux élevé de caséine.

Indications. — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (diarrhée simple, lenterique verte, infectieuse, cholériforme, diarrhées de dentition, de sevrage, athrepsie, etc.). Diarrhées toxiques des enfants et des adultes, Etats dyspeptiques des adultes, Ulcère de l'estomac, etc.

Posologie et modes d'emploi. — On prépare des mélanges : eau bouillie, lait, Larosan, contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas. Poudre : boîte de 100 gr.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-20.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

LAROSCORBINE « ROCHE »

Soutien indispensable de l'organisme carencé.

Composition. — Acide *l*-ascorbique. Vitamine C synthétique cristallisée.

Propriétés. — Favorise tous les phénomènes d'oxydo-réduction au cours des divers processus biologiques. Action anti-infectieuse et antitoxique très nette. Joue un rôle évident de désensibilisateur (allergies).

Indications. — Décalcification des os et des dents, Altération des vaisseaux, Troubles de la nutrition au cours de la grossesse, Anémie et troubles de la croissance des nourrissons, Diathèses hémorragiques, Maladie des capsules surrénales et pigments cutanés, Hémorragies du vitré, Rétinite pigmentaire, Scorbut infantile, Anaphylaxie, etc.

La fréquence de l'hypovitaminose C a pu être constatée par un simple test et par une méthode simplifiée de titration qui repose sur la réduction, par la vitamine C, du *dichlorophénol-indophénol* qui est transformé en leuco-dérivé incolore.

Posologie et modes d'emploi. — Ampoules et comprimés. 1 ampoule de 2 cc. = 0 gr. 10 d'acide *l*-ascorbique = 2 000 u. i. — 1 comprimé = 0 gr. 05 d'acide *l*-ascorbique = 1 000 u. i. 1 à 2 ampoules par jour (voie sous-cutanée ou endoveineuse) ou 1 à 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

Ampoules : boîte de 6. — Comprimés : flacon de 20.

Pour la titration de la Vitamine C : Dichlorophénol-Indophénol « Roche » : tube de 20 comprimés.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 504-71 (comprimés), 504-72 (ampoules).

Produits F. HOFFMANN-ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

LASAL

Spécifique des maladies des voies respiratoires et de leurs convalescences.

Propriétés. — Antiseptique pulmonaire et en même temps reconstituant par l'association d'un tonique (Glefina) (voir ce mot). Bonne saveur, ne provoque pas d'intolérance.

Composition. — Ortosulfogalacolate de potassium, sirop de sève de pin, de goudron, de baume de tolu, associés à une partie de Glefina reconstituant (voir ce mot).

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires et particulièrement leurs convalescences, bronchite chronique, rougeole, coqueluche, tuberculose, grippe, etc...

Posologie:

Enfants : 3 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.
 — 6 à 10 ans : 2 à 3 — à dessert par jour.
 — 11 à 15 ans : 2 — à soupe par jour.
Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

LASAL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 689-12.

Prix du flacon : 21 fr. 20.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Laboratoire du GLEFINA,
 348, rue Saint-Honoré — PARIS.

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène, médecine générale.

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

Doses. — Suivant les indications.

Le litre : 10 fr. 40. — Le demi-litre : 6 fr. 50.

Formes actives. — SAVON LAURÉNOL (antisepsie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL N° 2, désinfectant, sans odeur, ni mercure.

Savon Laurénol 4 fr. 20. — Savon dentifrice : 6 fr. 25.

Laurénol n° 2 :

Le litre : 6 fr. 25. — Le demi-litre : 4 fr. 20.

Laboratoires BELIERES
 19, rue Drouot — PARIS (IX^e),

LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.
Poudre cristalline d'un goût très agréable.

Posologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

Enfants : 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

Adultes : 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s-SEINE.

(Tél. : Maillot 17-75.)

LAXASEPTOL

Trois présentations :

GRANULÉ SIMPLE

GRANULÉ BILIÉ pour enfants.

Constipation. Antiseptique intestinal léger. Insuffisance hépatique. Intoxications alimentaires. Affection à point de départ intestinal.

Posologie. — 1 à 2 ans : 1/2 cuillerée à café le soir ;
2 à 5 ans : 1 cuill. à café; 5 à 12 ans : 2 cuill. à café.

DRAGÉES pour les adultes.

Laxatif non irritant. Constipation chronique ou passagère. Rééducation de l'intestin. Laxatif de choix pendant la grossesse.

Posologie. — De 1 à 3 dragées le soir au coucher.

Formule. — Diacétylisatine avec ou sans bile.

Ne contient pas de Phénolphtaléine.

Laboratoires ROBIA

M. ROBILLIART, Pharmacien — LILLE.

LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

PASTILLES MIRATON CHATEL-GUYON. —

Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du péristaltisme intestinal, non irritant.

Dose. — 1 à 2 pastilles, le soir au coucher.

Prix : la boîte 8 francs.

Pour un traitement de 20 à 30 jours.

GRAINS MIRATON CHATEL-GUYON. —

Sels de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques. Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

Dose. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Prix : le flacon 9 fr. 10

Pour un traitement de 30 à 50 jours.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-7 (grains)
n° 218-8 (pastilles).

Littérature et échantillons :

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV°).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

LAXIOR

Rééducateur de l'intestin.

Indications. — Traitement complet de la constipation sous toutes ses formes : Atonie intestinale, Entéro-colite, Spasme intestinal, Insuffisance biliaire.

Composition. — Agar-agar pulv., Cascara sans amertume, Ferments lactiques sélectionnés sur culture, Hépatine pure, Entérokinase, Magnésie calcinée.

Propriétés. — A pour but de rééduquer l'intestin ; ce n'est donc pas un purgatif ni un simple laxatif d'action mécanique ou drastique. Son emploi est indiqué dans tous les cas de constipation chronique et son action est douce, sans accoutumance ni douleurs.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cachets par jour, le matin au lever et le soir au coucher.

Prix. — La boîte de 40 cachets : 18 francs.

Littérature et échantillon sur demande aux

Laboratoires PILLIER

10, place Saint-Jacques — COMPIÈGNE (Oise).

LAXIRIS

Composition. — Comprimés glutinifiés à base d'oléate de soude, de bile dépigmentée, décholestérinée.

Indications. — Insuffisance hépatique. Ictères. Congestion du foie. Lithiase biliaire. Cirrhoses. Colites. Constipation.

Posologie. — 4 comprimés par jour.

Prix : 16 fr. 65.

Établissements André HATIER,
Pharmacien

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

LAXOPEPTINE GIRARD

Ferments de céréales contenant leurs Vitamines.
Citrates de soude, Eupéptiques, poudre agréable à prendre.

Mode d'emploi. — *Nourrissons :* 1 à 3 cuillerées à café par jour dans lait ou eau bouillie.

Enfants : doubler ou tripler les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur des fonctions digestives, antiseptique intestinal, laxatif idéal des nourrissons et jeunes enfants.

Indications. — Ballonnements, Gastro-entérites, Maladies infectieuses ou fébriles d'origine digestive, Vomissements du nourrisson et de l'adulte, Constipation infantile.

Prix : le flacon 12 fr. 80.

Pour un traitement de un mois environ.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-4.

LAXO-PSYLLIUM LANDON

Composition. — Semences sélectionnées de psyllium noir, associées à l'extrait fluide de cascara, sagrada désamérisé à la dose de 0 gr. 05 d'extrait de cascara pour une cuillerée à café de Psyllium.

Propriétés. — Régulateur intestinal d'action doucement laxative.

Indications. — Constipation. Formes non irritables de la stase intestinale chronique.

Posologie. — Une, deux ou trois cuillerées à café à chaque repas. Peut être associé utilement à l'huile de paraffine.

Mode d'emploi. — A prendre de préférence au début du repas, avec un quart ou un 1/2 verre d'eau.

Prix au public : 22 francs la boîte.

Laboratoire Central de **CHATEL-GUYON**

M. LANDON, Pharmacien

CHATEL-GUYON (Puy-de-Dôme).

LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine par cuillerée à café.

Propriétés thérapeutiques. — Elle accélère les échanges nutritifs, accroît les forces, augmente très rapidement le poids du corps et le nombre des globules rouges du sang, tonifie la cellule nerveuse.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, affections du cerveau et de la moelle; Chlorose, diabète, rachitisme; Convalescences longues et pénibles.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 17 francs.

Produits GONNON

J. et O. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

LEMONAÏ

(Ex-CITRONAÏ)

Composition. — Chaque cuillerée à café contient :
 Citrates trisodique et monosodique .. 0 gr. 50
 Iodure de Sodium 0 gr. 05
 Granulé sucre friable spécial stable. Q. S.

Propriétés. — Antivisqueux, Fluidifiant de la circulation sanguine, Antipléthorique, Anticongestif, Cholagogue.

Indications. — Troubles de la circulation artérielle et veineuse, tous états congestifs, hyperviscosité, *hypertension*, arthritisme et ses séquelles.

Présentation et prix. — Le flacon de granulé : 17 francs.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau avant les deux principaux repas.

Durée du traitement : 3 semaines.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires biochimiques de l'Est
J. FRECHIN

Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur,
 LURE (Haute-Saône).

LENADRYL

(Huile rhinologique)

Composition. — Antiseptiques végétaux, camphre, eucalyptol, terpinéol, en solution huileuse spéciale adrénalino-éphédrinée (f. rmes lévogyres).

Propriétés. — Synergie lénifiante, vaso-constrictive, décongestive et antispasmodique. Bactéricide, analgésique, cicatrisant. Ni caustique, ni toxique. Ne dessèche pas la muqueuse.

Indications. — Coryzas aigus et chroniques, rhumes des foins, sinusites, ozène, trachéites, laryngites ; inflammations et infections du rhino-pharynx, asthme.

Mode d'emploi. — Formes :

Flacon compte-gouttes spécial : X à XII gouttes matin et soir dans chaque narine, la tête penchée en arrière et du côté de la narine traitée.

Capsules nasales :

Adultes et auto-injections : 1 capsule dans chaque narine.

Enfants : une demi-capsule dans chaque narine, 3 à 5 fois par jour.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS
 OULLINS (Rhône).

LENIENTOL

Composition. — Seule préparation présentant sous la *forme liquide* l'association médicamenteuse : phényléthylmalonylurée et tartrate borico-potassique. — Sans bromure.

Indications. — Mal Comitial, Epilepsie, Crises nerveuses, Insomnies, Angoisse, Spasmes divers, Chorée, Troubles névropathiques en général, etc.

Deux formes :

Lenientol adultes. — Prix : 23 francs.

Une cuillerée à soupe contient :

Phényléthylmalonylurée ...	0,05 cgr.	{ 1 flac. dure env. 20 jours.
Tartrate borico-potassique.	0,50 cgr.	

Lenientol infantile. Prix : 15 francs.

Une cuillerée à café contient :

Phényléthylmalonylurée...	0,01 cgr.	{ 1 flac. dure 20 jours.
Tartrate borico-potassique.	0,10 cgr.	

Laboratoire DEMOULIN

27, rue Brézin — PARIS (XIV^e). — (Tél. : Ségur 76-90.)
et Grossistes.

LÉNIFÉDRINE

Composition. — Huile antiseptique à l'Oléate d'Ephédrine. Solution *faible* à 0 gr. 50 % et solution *forte* à 1 gr. %.

Indications. — Affections des voies respiratoires supérieures : Coryzas spasmodiques, Rhinites arthritiques, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Présentation. — Se vend :

- 1° En flacons compte-gouttes brevetés.
- 2° En flacons ordinaires pour pulvérisations.
- 3° En rhino-capsules pour auto-injections nasales.
- 4° En vaseline.

Prix flacon compte-gouttes	16 fr.
— ordinaire	15 —
Rhino-capsules	12 85
Vaseline.....	12 85

L. GAILLARD, Pharmacien,
26, rue Pétreille — Paris (IX^e).

LÉNIFORME

Composition. — Huile à 2, à 5 et 10 % d'Essences végétales antiseptiques.

Indications. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Forme et mode d'emploi. — Se vend en *Flacons compte-gouttes*.

en *Flacons simples* pour pulvérisations.

en *Rhino-Capsules* de gélatine pour auto-injections nasales.

en *Vaseline*.

Prix :

Le flacon compte-gouttes	12 fr. 85
Le flacon simple	14 fr. 65
Rhino-Capsules	11 fr. 50
Vaseline.....	10 fr. 65

L. E. V. A. — L. GAILLARD, Pharmacien
26, rue Pétreille — PARIS (IX^e).

LÉNIOR BONNET

LÉNIOR A L'OXYDE DE ZINC.

Composition. — Oxyde de zinc, Amidon, Lanoline, Vaseline. Ce produit est une pâte poreuse et non une pommade occlusive.

Indications. — Toutes démangeaisons, Rougeurs, Eczémas sous toutes ses formes. Crevasses et ulcère du sein. Herpes, Erythème fessier.

Emploi. — Étaler en couche mince, recouvrir d'une toile.

LÉNIOR AU COALTAR.

Composition. — Coaltar lavé, oxyde de zinc, Lanoline, Vaseline. Propriétés décongestionnantes desséchantes et antiprurigineuses très puissantes.

Indications. — Eczémas vésiculeux, amorphes, papulo-vésiculeux séborrhéiques. Eczéma des nourrissons.

Emploi. — Étendre en couche mince matin et soir.

LÉNIOR AU SULFATE DE CUIVRE.

Composition. — Vaseline, Sulfate de cuivre, Sulfate de zinc, Soufre précipité, Oxyde de zinc, Lanoline.

Indications. — Impétigo chronique et rebelle; Streptococcies cutanées; Pyodermites.

Emploi. — Étendre en couche mince matin et soir, après avoir fait tomber les croûtes.

Prix : Tube géant : 7 fr. 50.

Laboratoires du STÉAROL

5, rue Émile-Combes — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

LENISERUM DU D^r MOITY

Sirop, Comprimés.

Sirop pectoral au Thiocol bromoformé et à la Dionine.
Désinfection des poumons par voie sanguine. Spécifique de la Bronchite chronique. Sédatif de la Toux. Antibacillaire.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillères à soupe ou 3 à 5 comprimés par jour, pris purs ou avec une infusion pectorale.

Enfants à partir de 5 ans : 3 à 5 cuillères à café ou 1 à 2 comprimés par jour, de préférence entre les repas.

Diffusion strictement médicale. Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Prix : 16 fr. 50 le flacon de 250 cc.

Laboratoires du Docteur J. MOITY

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie, ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau — NEUILLY — PARIS.

LÉOTAMINE

Pommade à base d'Insuline « Leo » et de Vitamines A et D.

Indications. — Accélère la cicatrisation des plaies de guérison difficile chez les personnes anémiques, asthéniques, hémophiles et principalement chez les diabétiques. Brûlures.

Forme. — Tube de 15 et 30 grammes.

Mode d'emploi. — Application directe sur la plaie ; couvrir la plaie d'un pansement aseptique.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX.
(Tél. : 80-989).

Dépositaire pour la France et colonies :

Jean DEDIEU, pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

LEPTAB

Évacuant intestinal, spécifique du péristaltisme.

Comprimé à base de : résine pure de jalap, résine de scammonée, scille, badiane, sans action drastique.

Action. — Synergie médicamenteuse, évacue rapidement le contenu septique de l'intestin, assure la disparition du *Colmatage du grêle*.

Indications. — Toutes affections de l'appareil digestif, avec retard du transit, et leurs conséquences : constipation, ballonnement, aérophagie, migraines, névralgies, affections cutanées, acné, eczéma, urticaire, etc.

Présentation. — Deux modèles sous boîte aluminium : 11 francs (8 jours) ; 30 francs : (1 mois).

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

LEPTOL

Les 1^{ers} comprimés laxatifs français
à base de **Leptandrine** (extrait du Rhizome
de *Leptandra Virginica*, Amérique Nord).

Rééducateur de la fonction Hépto-Intestinale.

Ne contient pas de Phénolphtaléine.

Laxatif doux mais actif. . { pas de coliques.
pas d'irritation.
aucune toxicité.

Peut être donné en période de grossesse
et d'allaitement.

1/2 à 2 comprimés le soir au dîner.

Augmenter ou diminuer la dose suivant effet.

Laboratoires du LEPTOL

333, rue Vaugirard, PARIS-XV^e-Vau. 44-73.

LÉTHALGOL

Suppositoire analgésique et spasmolytique.

Composition. — Ether trichlorbutyl-salicylique (sédatif), Diméthyl-amino-phénazone (analgésique); Acéto-tartrate d'aluminium (antiphlogistique).

Avantages particuliers. — Plage posologique étendue; tolérance parfaite; restreint l'utilisation des narcotiques; s'emploie en pédiatrie.

Indications. — Toutes dystonies douloureuses segmentaires ou diffuses. Algies de tractus génital, péri-génital et gastro-intestinal. Accouchements laborieux. Algo-spasmes de la ménopause. Douleurs cataméniales. Coliques hépatiques et néphrétiques. Spasmes vésiculaires. Ulcus. Algies cancéreuses. Otalgies. Névralgies diverses, etc...

Posologie :

Adultes : 1 et jusqu'à 3 suppositoires consécutifs, à répéter une ou plusieurs fois si nécessaire.

Enfants : 1 à 3 par jour, suivant l'âge (au-dessus de deux ans seulement).

Boîtes de 6	10 fr. 65
— de 12	19 fr. 20

Littérature et échantillons.

Laboratoire GEWA

32, rue Assalit — NICE (A.-M.). Tél. : 814-61.

LEUCAGINE

TOPIQUE UTÉRIN.

1° CRAYONS SOLUBLES
pour la cavité utérine.

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 3, 5 et 10 micros à introduire dans le corps utérin à l'aide de pinces ou de notre porte-pansement.

Indications. — Métrites, Affections du col et du corps : 2 applications par semaine (Consulter la Notice).

N. B. — Utiliser pour l'application l'appareil « Porte-pansement » spécial.

2° — OVULES

Indications. — Tous les cas d'infection des voies génitales. Un ovule tous les jours.

Le crayon à 1 micro : 12 fr. ; à 3 micros : 18 fr.

à 5 micros : 25 fr. ; à 10 micros : 35 fr.

La boîte de 5 ovules : 30 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

LEVULINYL

Composition — Levulinate de calcium ($C^5H^7O^2$)² Ca.

Indications. — *Toutes les indications du Gluconate de Calcium avec action renforcée.*

Récalcifiant intensif, Hémostatique. Œdèmes. Diarrhées aiguës et chroniques. Diarrhées des tuberculeux. Diabète. Affections graves du foie. Antichoc comme solvant des principaux sels métalliques (sels d'or, arsenicaux, etc...), dont il empêche les accidents d'intoxication.

Présentation :

Cachets à 0,50 : boîte de 24 cachets.

Ampoules 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

Ampoules 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

(Solutions à 10 p. 100 et à 15 p. 100.)

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson bien sucrée).

Posologie. — 1 à 2 cachets par jour pendant les repas. — 2 à 4 injections par semaine.

Le Levulinate de calcium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du LEVULINYL

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — *Comprimés* de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme vaccin polyvalent vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Prix : 28 fr. 60 pour 5 à 12 jours de traitement. A. S. C.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

LICHÉNOSE DUCLOY

Acide fumaro-proto-cétrarique pur.

Médicament de la nausée et des vomissements nauséux.

Forme. — Tabloïdes de 1 cgr. dragéifiées.

Doses. — 3 à 6 par jour en moyenne. On peut doubler cette dose en cas de besoin.

Mode d'emploi. — A avaler avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

Indications. — *Toutes les nausées, mal d'auto, de chemin de fer, de bateau, d'avion, de théâtre, etc. Nausées d'origine psychique (émotions, dégoûts), d'origine auriculaire (vertiges), d'origine digestive, pharyngée, gastrique, duodénale, vésiculaire, colique, affections utérines, grossesse.*

Contre-indications. — Aucune. Médicament atoxique.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DUCLOY et Cie.
ARQUES (Pas-de-Calais).

LIMOL CHURCHILL

Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose.

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation de *chaux* et de *phosphore* au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable, Recalcifiant idéal.

Indications. — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

Mode d'emploi — *Adultes :*

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Enfants :

Sirop — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 20.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire des Produits du D^r CHURCHILL
P. DESCHAMPS, pharmacien

92, avenue Saint-Mandé — PARIS (XII^e). (Tél. : Diderot 74-02.)

LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée
au *Citrate basique de Magnésie*.

Avantages. — Seule limonade liquide au citrate basique de Magnésie susceptible de conservation.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées ni coliques.

Formes. — Flacon pour *adultes* de 100 cc. ; flacon pour *enfants* de 50 cc.

Mode d'emploi. — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prescrite pure, mais étendue d'une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi-verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Prix au public : flacon pour adultes : 6 fr. 75 ; flacon pour enfants : 4 fr. 75.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 704-1 et 704-2.

Laboratoires P. GODFRIN

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE (Seine).
(Tél. : Tremblay 04-48.)

LIPAULOL

Solution huileuse de Campho-Dithio-Carbonate double d'Or et de Sodium.

Indications. — Tuberculose pulmonaire ; Tuberculose ganglionnaire suppurée ou non ; Tuberculose pleurale ; Tuberculoses cutanées diverses ; Rhumatismes poly-articulaires chroniques.

Mode d'emploi. — Faire chaque semaine 2 injections intramusculaires de 1 ampoule de 1 ou 2 cc.

Durée du traitement. — 3, 4, 5 mois, selon les cas.

Présentation. — En boîtes de 3, de 6 ou de 12 ampoules de 1 ou 2 cc. (1 cc. correspond à 3 cg. or métal).

Prix de vente au public :

La boîte de 3 ampoules de 1 cc....	24 fr. 50
La boîte de 3 ampoules de 2 cc....	38 fr. 50
La boîte de 6 ampoules de 1 cc....	44 fr.
La boîte de 6 ampoules de 2 cc....	74 fr.
La boîte de 12 ampoules de 1 cc...	81 fr. 50
La boîte de 12 ampoules de 2 cc...	130 fr.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND
14, rue A.-Briand — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin, PARIS.

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale.

Ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 20 d'extrait.

Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

Propriétés thérapeutiques. — Agit par ses phosphatides, lipoides et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsivant, Tonique.

Indications. — *États dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

Doses. — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

La boîte de 12 amp. Prix : 24 francs.

La boîte de 60 dragées. Prix : 17 fr. 50.

Assurances Sociales { Ampoules : Classe A.
Dragées : Classe B.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél.: Trinité 44-32. Télégr.: Chevrematte-90 Paris.)

LIPOCRINYL

Hormonothérapie ambo-sexuelle par les lipoides orchitiques d'animaux jeunes.

Composition. — Lipoides orchitiques totaux : 0 gr. 10, (correspondant à 0 gr. 80 de glande fraîche) pour une pilule.

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre hormonal altéré par manque ou insuffisance de sécrétions endocriniennes. Activité s'exerçant indifféremment sur les deux sexes.

Indications. — *Chez l'homme : Hypertrophie de la prostate et ses troubles urinaires (travaux du professeur Champy), Présénescence, Impuissance, Déclin génital. Chez la femme : Troubles nerveux dépressifs liés à la ménopause et à la puberté. Chez les deux sexes : Neurasthénie d'origine sexuelle, et tous syndromes d'insuffisance endocrinienne.*

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour réparties en 3 prises dans l'intervalle des principaux repas.

Prix : le flacon de 100 pilules : 32 francs.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

LIPOIODINE

Dilodobrassidate d'éthyle

CIBA

IODE ORGANIQUEMENT COMBINÉ.

La Lipoiodine (41 p. cent d'iode) remplace avantageusement les iodures et iodiques à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indications. — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, Hypertension artérielle, Angine de poitrine, Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants* : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Tube de 20 comprimés.

Boîte de 6 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

LIPOSEPTINE

Antitoxine polyvalente du Professeur G. Lemoine.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. Possède les propriétés curatives, des vaccins les plus actifs.

Indications. — Toutes les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale. Innocuité absolue.

La Liposeptine se présente également sous la forme de petites pilules, pour ingestion par voie buccale. Complètent et renforcent l'action des injections.
Dose moyenne : 4 petites pilules par jour.

Boîte de 5 ampoules.

Tube de 50 pilules.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

LIPOSEPTOL

Composition. — Pâte anti-infectieuse, à base de Liposeptine du Professeur G. Lemoine, et de lipoides.

Indications. — Traitement très rapide des plaies atones, des brûlures et des ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Etendre la pâte sur un morceau de gaze de la dimension de la surface malade, recouvrir d'un morceau de gaze plus grand, maintenir le tout par une bande ou fixer simplement les bords par des languettes de Leucoplaste.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 44-59.)

LIPOSPLÉNINE DU D^r GROC

Opothérapie splénique spécifique (Soula).

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Références scientifiques propres à la Liposplénine du D^r Groc :

Communications : Académie de médecine :

18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Société de Biologie : 22 décembre 1928,

16 février 1929, 21 décembre 1929.

XX^e Congrès de médecine de Montpellier :

18 septembre 1929.

II^e Congrès du Paludisme : Alger, 19-21 mai 1930.

Société de Thérapeutique, Paris : 12 octobre 1930, 8 février 1933.

Société d'Hématologie, Paris : 3 février 1932.

Société de Pédiatrie, Paris : 18 juin 1935.

Société de médecine infantile de Bordeaux et du Sud-Ouest : 20 octobre 1935.

Thèses : D^r E. Cauquil, *Rate et Rachitisme* (1928) ; D^r Fau, *Action des Extraits Lipidiques d'organes* (1928) ; D^r Radji, *Contribution au traitement des Anémies avec splénomégalie* (1929).

Composition. — 1^o Lipides insaponifiables contenus dans la pulpe splénique, dont le cholestérol, extraits par un procédé spécialement établi par le Pr L.-C. Soula ; 2^o l'Insaponifiable X partiellement soluble.

Indications. — 1^o *Médication spécifique* des :

a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature, sauf les anémies de Biermer).

b. Amaigrissements graves et persistants.

c. Anémies et déminéralisations en cours de grossesse ou après un accouchement pénible.
Points névralgiques dorsaux.

d. Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques, lymphatisme, déminéralisations, troubles douloureux dentaires du nourrisson, eczéma du nourrisson.

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, Inappétence, tous états de débilité organique.

2° *Puissant modificateur du terrain dans* : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

Présentations. — 1° *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 22 fr.), séparées par un repos de trois jours.

2° *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs. Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon ce rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée.
(La boîte de huit ampoules : 25 francs.)

3° *Sirop*, dosé à 8 cgr. de principes actifs par cuillerée à café. *Enfants* : 2 cuillerées à café par jour ; *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour. *A prendre dans l'intervalle des repas.* (Prix : 22 francs pour 12 jours de traitement.)

4° *Gouttes*, titrées à 5 p. 100 de principes actifs. Jusqu'à un an : XXX gouttes par jour, en trois prises ; de un à deux ans : XL gouttes, toujours en trois prises dans la journée. Au-dessus de deux ans, recouris au sirop. (Prix : 22 francs pour 15 à 20 jours de traitement.)

Laboratoire des LIPIDES

Jean OLIVE, pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-94.)

LIPOVITA (Granulé)

Vitamines liposolubles.

Formule :

Carotène (Vitamine A) : 4 000 unités internationales.
Ergostérol irradié (Vitamine D) : 40 000 unités internationales pour 100 grammes. Goût très agréable.

Indications. — Troubles de croissance, Rachitisme, Déperdition de chaux et de phosphate, Carie des dents, Etats ganglionnaires.

Doses :

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour en deux fois.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Adolescents et adultes : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 19 fr. 20.

Laboratoire MAUCHANT

à GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél. : Grésillons 05-21.)

LIQUIDIX

Formule :

Sulfate de Cuivre	1 gr. 2174
Sulfate de Zinc.....	0 gr. 1492
Camphre.....	0 gr. 3141
Safran	0 gr. 1492
Alcool à 60°	19 gr. 1355
pour 100 gr.	

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 322-2.

Indications thérapeutiques. — Toutes dermatoses.

Mode d'emploi. — Simple application, pur ou étendu d'eau. Le mode d'emploi qui accompagne chaque flacon est très détaillé.

Livré en flacon de 250 cc.

Prix : 16 fr. 75.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SÈVRE (Vendée).

LITA

Cuniculi-sérum Iodobenzométhylé.

Composition. — Mélange de sérum de lapin ayant reçu des doses croissantes de tuberculine (1 partie) et d'Iodseptine (2 parties).

Présentation. — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou exceptionnellement intraveineuse.

Mode d'emploi. Doses. — Deux injections par semaine par série de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration : continuer jusqu'à guérison. Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. Chez l'enfant, on commencera par 1 cc. pour la première injection, 2 cc. pour la seconde, 3 cc. pour la troisième.

Indications. — *Chez l'adulte* : Toutes formes de Tuberculose pulmonaire à toutes les périodes. Tuberculose viscérale. Tuberculose des séreuses. *Pas de choc, pas d'intolérance*, pas d'accidents (hémoptysies ou autres). *Chez l'enfant* : Prétuberculose, formes ganglio-pulmonaires du premier âge.

Prix : Boîte de : 6 ampoules : 80 francs.

4 ampoules : 57 francs. — 2 ampoules : 28 fr. 50.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

LIVARTIL

Le stimulant d'élection des parenchymes hépatique et pancréatique.

Composition :

Extrait <i>total</i> de feuilles <i>fraîches</i> d' <i>artichaut</i> de Macau (333 gr. de feuilles fraîches d'artichaut).	
Combretum	0,02
Boldo.....	0,05
Adonis Vernalis	0,05
Jaborandi	0,02
Formiates de Calcium et de Magnésium	5,00
pour 100 grammes de Livartil,	

Propriétés :

L'Artichaut stimule les fonctions hépatique et pancréatique, augmente la diurèse, élimine la cholestérine et l'urée.

Boldo et Combretum : cholagogues et cholofluidifiants classiques.

Adonis : toni-cardiaque et diurétique direct et indirect.

Jaborandi stimule la musculature lisse du tube digestif par son action parasympathicotonique.

Formiates de Calcium et de Magnésium, diurétiques azoturiques, renforcent en outre le pouvoir diurétique propre de l'artichaut.

Avantages.

- 1° L'extrait **total** liquide de feuilles **fraîches** d'**artichaut de Macau** procure des succès thérapeutiques bien supérieurs à ceux qu'on obtient avec les « principes » partiels préparés à partir de la plante desséchée ou avec l'extrait sec.
- 2° Absolument atoxique.
- 3° Effet rapide, mais durable.

Indications. — A. Hépatiques.

- 1° Toutes **insuffisances hépatiques**, aiguës, sub-aiguës et chroniques, légères ou graves. Cholémie familiale. Ictères catarrhal et infectieux. Hépatites aiguës et chroniques. Congestion du foie. Gros foie douloureux des paludéens, des alcooliques, des gros mangeurs. Lithiase biliaire. Coliques hépatiques et vésiculaires. Cirrhoses. Surcharge et Dégénérescence graisseuse du foie (1). Cholécystites, Angiocholites, Angiocholécystites, Séquelles des cholécystectomies. Atteinte hépatique au cours des maladies infectieuses, Foie grippal.

(1) Voir H. PÉRICAUD et LAPORTE : *L'Envahissement graisseux du foie.*

2° Toutes les **conséquences de l'insuffisance hépatique et pancréatique** : dyspepsie hépatique avec douleurs tardives. Constipation. Hémorroïdes. État saburral des voies digestives. Anorexie des hépatiques. Nausées. Somnolence post-prandiale. Urticaire. Migraines. Manifestations anaphylactiques d'intolérance digestive. Auto-intoxication. Intolérance aux arsénobenzènes et aux sels d'or. Dermatoses d'origine hépatique. Prurits. Asthme hépatique.

B. Rénales :

Oliguries. Ascites. Insuffisance rénale. Rétention azotée. Azotémie d'alarme. **Brightisme**, Mouches volantes. Bourdonnements d'oreilles. Fourmillements des extrémités. Prurit. Crampes. Doigt mort. Céphalées des brightiques.

C. Sanguines et circulatoires :

Hypercholestérolémie. Athérome artériel. Hypertension et ses troubles subjectifs.

Posologie et mode d'emploi :

Traitement d'attaque. — LXXX gouttes 3 fois par jour, aux repas, dans le premier verre de boisson. (Penser à une exonération intestinale abondante possible due à l'augmentation de la cholérèse.)

Traitement d'entretien. — XXX à LXXX gouttes 2 à 3 fois par jour.

Enfants jusqu'à 5 ans : III à V gouttes par année d'âge 2 à 3 fois par jour.

Remarque. — Le **Livartil** étant dénué de toute toxicité, les doses ci-dessus peuvent être augmentées si besoin.

Prix :

20 fr. 80 pour un traitement moyen de 15 à 18 jours.

Laboratoires Roger FOSSE (Livartil-Lotusédine),

Docteur en Pharmacie,

86, rue du Pas-Saint-Georges,

BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 42-44, 80-958.)

Sur demande, les Laboratoires Roger FOSSE adresseront à MM. les Docteurs un échantillonnage aussi copieux que nécessaire pour leurs expérimentations.

LOBÉLIANE LALEUF

Composition. — Préparation exclusivement végétale à base de Lobélie, Valériane stabilisée, Aubépine, de goût et odeur agréables, dénuée de toxicité, exempte de toute addition de produits chimiques.

Propriétés et indications. — Antispasmodique puissant, agissant sur le système neuro-végétatif.

Médicament de choix des affections spasmodiques, névropathiques, névroses et insomnies.

Formes. — *Liquide et comprimés.*

(2 comprimés correspondant à 1 cuillerée à café de LOBÉLIANE liquide.)

Posologie et mode d'emploi :

Dose calmante : 2 à 3 cuillerées à café — 4 à 6 comprimés par jour.

Dose hypnotique : 1 ou 2 cuillerées à café — 2 à 4 comprimés, après le repas du soir.

La LOBÉLIANE se prend avec un peu d'eau ou, mieux, avec une infusion de tilleul ou de verveine.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon ou l'étui de 50 comprimés : 17 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

LOBÉLINE BRUNEAU

Médicament spécifique de toutes les paralysies des centres respiratoires.

Composition. — Solution rigoureusement titrée de chlorhydrate de Lobeline chimiquement pur. (Conservation indéfinie.)

Indications. — Tous les états asphyxiques : En chirurgie (syncopes anesthésiques). — En obstétrique (asphyxie des nouveau-nés). — En médecine générale (troubles respiratoires à la suite de pneumonie, broncho-pneumonie, etc., empoisonnements, électrocution, submersion).

Posologie et mode d'emploi.

Chez l'adulte : en injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0 gr. 010 par dose. On peut sans aucun danger répéter les injections toutes les 10 ou 15 minutes.

Doses maxima : 0 gr. 02 par dose. 0 gr. 10 par 24 heures.

En injection intraveineuse : 0 gr. 003 à 0 gr. 010 par dose. Cette injection doit être pratiquée très lentement. On peut faire immédiatement après une injection intramusculaire ou sous-cutanée de 0 gr. 010.

Chez l'enfant : en injection sous-cutanée ou intramusculaire exclusivement :

Chez le nouveau-né et pendant les 4 premiers mois 0 gr. 003 par dose.

A partir de 4 mois 0 gr. 005 —

A partir de 1 an 0 gr. 010 —

Présentation. — Boîtes de 2-6 ampoules titrées exclusivement à 0 gr. 003 et 0 gr. 010.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17, rue de Berri — Paris (VIII^e).

Al. Ellysées 61-46.) — Adresse télégr. : Labomédical-Paris.

LOBÉLINE « SANDOZ »

Composition. — Chlorhydrate de lobéline pur. Alcaloïde principal de la *lobelai inflata*, totalement exempt d'alcaloïdes secondaires et d'impuretés toxiques.

Avantages. — Pureté chimique. Actions physiologique et thérapeutique toujours identiques. Solution stable dosée rigoureusement. Titre constant.

Indications. — Asphyxie bleue des nouveau-nés, laryngite striduleuse, asthme, broncho-pneumonie, toutes asphyxies accidentelles et médico-chirurgicales.

Posologie et présentation. — Boîtes de 3 ampoules, dosées à 0 gr. 003 et à 0 gr. 01. 1 ampoule à la fois, à répéter si nécessaire.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

LOFODOL

Huile de Foie de Morue de Norvège.

Préparée, contrôlée et mise en flacons sur place, sous la garantie et le cachet du gouvernement Norvégien.

Dosage très élevé en vitamines A et D, nécessite des doses 3 fois moindres.

Indications. — Rachitisme, Troubles de croissance, Avitaminoses, Adrénopathies, Dénutrition, Débilité, Bronchites, Convalescences, Etats anémiques, Grossesse, Prétuberculose, Tuberculose.

Posologie :

Enfants de 1 à 3 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café par jour.

Enfants de 3 à 14 ans : 1 à 1 1/2 cuillerée à café par jour.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

CONDOU et LEFORT, Pharmaciens

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

LOGAPHOS

Composition. — Acide monoéthylphosphorique. Noix vomique totale.

Forme. — Gouttes.

Indications. — Toutes asthénies, Tonique stomacal, Rephosphorant de la cellule cérébrale.

Dose. — XX gouttes avant les 2 repas dans un peu d'eau.

Traitement : 15 jours.

Prix : 16 fr. 40.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

(Tél. : Parmentier 31-29.)

LORAGA

Traitement rationnel de la constipation.

Composition :

Émulsion parfaitement homogène et stable d'Huile de paraffine *spécialement traitée*, remarquablement pure et de haute viscosité, d'Agar-agar et de Phénolphthaléine *chimiquement pure*. Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalins.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications, constipation post-opératoire. Utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices. Absence totale d'inconvénients.

Action physiologique :

Pénètre et ramollit le bol fécal tout en facilitant son évacuation. Stimule doucement et sans irritation le péristaltisme du gros intestin.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion. Ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement par l'anus. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

De goût agréable, naturel, le Loraga est miscible à tous liquides : lait, eau sucrée ou non, infusions, potages.

Adultes : De 1 à 3 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

Pour les cas de constipation bénigne et pour les enfants, voir **Molagar**.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-2.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85; 16-86.)

LOTION BLANCHE R. P.

De La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés et sélénisés de La Roche-Posay associés aux oxydes de titane.

Propriétés et indications. — Calme, décongestionne, antiseptise et cicatrise ; lésions suintantes, en général ; eczémas, eczématides aigus ou infectés, intertrigo, prurits anogénitaux.

Mode d'emploi. — S'applique en couche mince par badigeon. Au renouvellement du pansement nettoyer à l'eau chaude additionnée de sels de bain R. P. de La Roche-Posay. (Deux à six sachets suivant la quantité.)

Dès l'assèchement panser avec le Cérat inaltérable R. P. et ensuite avec le Cold Cream naturel R. P. Poudrer ensuite largement avec la poudre dermique R. P.

Présentation et prix :

Lotion blanche R. P. de La Roche-Posay. Le flacon....	14 francs.
Sels de bain R. P. La boîte de 30 sachets.....	10 —
Cérat inaltérable R. P. Le tube	8 —
Cold Cream naturel R. P. Le tube	10 —
Poudre dermique R. P. La boîte	10 —

Laboratoires des PRODUITS DERMQUES R. P.
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

LOTION PY

Au Soufre dissous associé.

Composition. — Soufre, Houblon, Hamamelis.

Propriétés. — Dissout les graisses et apporte au derme le soufre indispensable et *actif*.

Avantages. — Rigoureusement *inflammable*, *non irritante*, *non toxique*; odeur agréable.

Indications. — Tous les *états séborrhéiques* ; Alopecies ; toutes les formes d'*Acnés* : Comédons, Pityriasis ; Erythrasma ; antiseptique et parasiticide puissant.

Mode d'emploi. — Faire une application au cou cher à l'aide d'un tampon de coton hydrophile.

Prescrire : LOTION PY : 1 flacon.

Prix : 22 fr. 50.

Laboratoire PY

58, boulevard Richard-Wallace - PUTEAUX (Seine).
(Tél. : Lon. 01-13.)

LOTUSÉDINE

Médication phytothérapique des déséquilibres neuro-végétatifs et des insomnies nerveuses.

Composition :

Alcoolature d'Anémone	22 gr. 60
Extrait stabilisé de Lotus	3 gr. 33
— de Gattilier	3 gr. 33
— de Cratægus.....	6 gr. 66
— fluide de Belladone.....	0 gr. 60
Eau de laitue	Q. S. pour 100 gr.

Indications :

- 1° États névropathiques; états anxieux; hyperémotivité, hyperexcitabilité, nervosisme, irritabilité, crises de dépression, modifications du caractère.
- 2° États spasmodiques gastro-intestinaux; aérophagie aérocolie; syndrome solaire; troubles dyspeptiques post-prandiaux d'origine nerveuse.
- 3° Éréthisme cardio-vasculaire, palpitations, tachycardie, fausse angine de poitrine et troubles circulatoires nerveux: vertiges, bourdonnements.
- 4° Troubles nerveux de la vie génitale: émotivité, nervosisme, règles douloureuses, bouffées de chaleur, vertiges, bourdonnements, etc...
- 5° **Toutes insomnies** provoquées par le surmenage physique, le surmenage intellectuel et moral, les soucis, les chagrins, la nervosité.

Posologie et mode d'emploi :

- 1° *Sédatif et équilibrant neuro-sympathique.* — Dose moyenne: L gouttes, 2 fois par jour, dans une tisane chaude, après les deux principaux repas.
 - 2° *Insomnies nerveuses.* — Dose moyenne: C gouttes le soir, dans une tisane chaude, en une seule fois.
- Enfants à partir de 5 ans:* V gouttes par année d'âge et par jour.

Remarque. — La Lotusédine, étant d'une atoxicité absolue, peut être donnée sans inconvénients aux enfants, aux vieillards, aux femmes enceintes. Les doses moyennes peuvent être notablement augmentées sans aucun danger.

Prix : 20 francs (3 semaines de traitement environ.)

Laboratoires Roger FOSSE (Livartil-Lotusédine)

Docteur en Pharmacie,

86, rue du Pas-Saint-Georges — BORDEAUX (Gironde).
(Tél. : 80-958, 42-44.)

Sur demande, les Laboratoires Roger FOSSE adresseront à MM. les Docteurs, un échantillonnage aussi copieux que nécessaire pour leurs expérimentations.

LUBROKAL

Composition. — 0,60 de brome (ionisé) ; 0,04 de phényl-éthyl-barbiturate de sodium.

Indications. — Epilepsie essentielle et symptomatique, insomnie nerveuse (sous forme de cure médicamenteuse), états d'angoisse, neurasthénie, hystérie, chorée, terreurs nocturnes, à titre préventif contre la migraine et la migraine ophtalmique.

Mode d'action. — L'action simultanée sur les centres corticaux (brome) et les centres mésencéphaliques (acide barbiturique) permet, avec un dosage très réduit, de calmer le système nerveux presque tout entier.

Dosage. — Prendre toujours les comprimés dissous dans l'eau. Epilepsie bénigne : 1 à 2 comprimés ; cas moyens : 3 fois par jour 1 comprimé ; cas graves : jusqu'à 3 fois par jour 2 comprimés. Posologie pour les enfants à fixer suivant leur poids.

Présentation :

Tube de 20 comprimés : 16 fr. 15.

Laboratoires RECRESAL

Pharmacie Normale L. BÉLIÈRES

Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

LUDIN

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

Formes. — *Granules, Gouttes, Sirop.*

Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop	} = 1 cgr. Hg. + 1 millgr. As.
ou 3 granules	
ou XX gouttes	

Sans IODURE, sans Alcool.

Doses moyennes :

Sirop :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.
Adolescents : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.
Enfants : par cuillerées à café.

Granules :

Adultes : 8 à 12 granules par jour.
Adolescents : 4 à 8 granules par jour.
Enfants : 2 à 3 granules par jour.

Gouttes :

<i>Adultes</i> : XX gouttes.	} 2 à 4 fois par jour.
<i>Adolescents</i> : X à XV gouttes.	
<i>Enfants</i> : V à X gouttes.	
<i>Nourrissons</i> : I à II gouttes.	

Nota. — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc...). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

Indications thérapeutiques. — Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc., etc...

Les gouttes ou le Sirop Ludin peuvent être prescrits sans inconvénient aux nourrissons en diluant soit dans de l'eau, soit dans du sirop de sucre ou même dans le lait des biberons.

Les granules sont sans sucre.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 302-1, 302-2, 302-5.

Laboratoires REY — DIJON — Tél. : 22-12.

LUGOCALCION

Sirop de Chlorure de Calcium suractivé. Délicieux au goût.

Composition :

Solution pseudo-colloïdale de Chlorure de Calcium, incorporé par procédé spécial.

1 cuillerée à soupe contient :

Chlorure de Calcium	1 gr. 50
Adrénaline physiologique sol. 1/1000.....	DIX gouttes.
Teinture belladone	DEUX gouttes.

Seule préparation de goût réellement délicieux.

Indications et posologie :

- a. **Récalcifiant** : Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement Convalescence, etc.
Adultes : 1 cuillerée à soupe. *Enfants* : 1 cuillerée à café par jour.
- b. **Hémostatique** : Hémoptysies, Gastrorragies, Epistaxis, Purpura, Menstruations abondantes, Préventif des Hémorragies post-opératoires, etc.
Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants* : 3 à 4 cuillerées à café par jour.
- c. **Antianaphylactique** : Urticaire, Eruptions d'origine digestive, Prurits, Rhume des Foins, Eruptions post-sérothérapiques, Asthme.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à café. *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.
- d. **Déchlorurant, résorbant** : Albuminurie, Néphrite, Pneumonie, Accidents sériques, Convulsions des nouveau-nés, Ascite, Diarrhée des Tuberculeux, Pleurésie, Œdème malléolaire, Cellulite.
Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants* : 3 à 4 cuillerées à café
Nouveau-nés : 1/2 cuillerée à café par jour.
- e. **Neuro-sédatif** : Etats spasmodiques, Ménopause, Basedowiens, Nervosisme, Surmenage.
Par petites doses de 1 cuillerée à café, à prendre 4 fois par jour.
- f. **Tenso-régulateur artériel** : Hyper et Hypotension, 2 à 4 cuillerées à café par jour.
- g. **Thérapeutique oculaire** : Glaucome, rétinites, Choroidites, spasmes oculaires, Décollements de la rétine, Cataracte, Hémorragies de la rétine, etc.
Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre pur ou additionné de 2 fois son volume d'eau, avant les repas.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

LUSOFORME

Solution de formol et de ricinoléates alcalins.

Antiseptique, bactéricide et désodorisant.

Indications. — Gynécologie, Obstétrique, Hyperhydroses, Pansements d'urgence.

Formes. — Liquide et comprimés.

Posologie. — Une cuillerée à café ou un comprimé donnent avec 1 litre d'eau une solution à 1/2 p. 100.

Emploi. — *Lusoforme médical.* — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100, 250 et 500 gr., à 4 fr. 70, 9 fr. 40 et 15 fr. La boîte de 50 compr., 10 fr. 50.

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 12 fr., 11 fr. 50 et 11 fr. 25 le kilo.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél.: Opéra 43-79.)

LUTÉOVAR

Indications. — Dysménorrhées. Règles douloureuses. Règles irrégulières. Insuffisances ovariennes. Ménopause et ses troubles.

Composition. — Contient 0 gr. 20 d'ovarine par dragée.

Posologie. — De 4 à 6 dragées par jour (au début des repas).

Propriétés. — Régularise l'activité ovarienne. Supprime la douleur. Normalise les règles.

Prix. — Le flacon de 60 dragées : 16 francs.
Échantillons gratuits :

Laboratoires FOULON

12, boul. Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

LYMPHIODE

Iode entièrement fixé sur un support extrait des ganglions lymphatiques.

Histotropisme électif. — Tolérance parfaite. Activité exaltée. Absence d'iodisme.

Le **LYMPHIODE** peut être pris dans n'importe quel liquide après le repas : eau bicarbonatée sucrée, vin rouge, lait, etc...

Doses :

Adultes : X à L gouttes par jour en deux fois après chaque repas.

Enfants : V à XX gouttes par jour suivant l'âge.

Ces doses peuvent d'ailleurs être largement dépassées.

Indications. — Toutes celles de la médication iodée : Affections du cœur et des vaisseaux, Hypertension, sclérose vasculaire, déficience circulatoire, etc... Affections oculaires relevant de la médication iodée : choroïdite, iritis, etc... Affections respiratoires : asthme, emphysème, bronchite chronique. Affections ganglionnaires : adénites, micro-polyadénopathie des enfants. Affections de la peau : eczéma, psoriasis, tuberculides. Mycoses.

États infectieux aigus.

Syphilis tertiaire.

Prix : 17 fr. 05 le flacon suffisant à un traitement de 1 à 2 mois selon les doses. — Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-31.

Laboratoires du D^r MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

LYSACRÈME L. M. L.

Composition. — Émulsion savonneuse stable d'antivirus lysats concentrés à 70 p. 100 (d'après les travaux des Docteurs Larget, Moreau et Lamière).

Propriétés et avantages :

- 1° Le *savon* de constitution spéciale permet une concentration considérable des antivirus et facilite la pénétration de l'émulsion d'antivirus ;
- 2° Souches microbiennes non repiquées et fraîchement prélevées ;
- 3° Lyse par le B. Pyocyanique facilitant la concentration des antivirus ;
- 4° Aucune réaction. Aucune contre-indication.

Indications. — Suppurations aiguës ou chroniques de la peau et des muqueuses ; Furoncles, Orgelets, Panaris, Anthrax, Ulcères variqueux, Pyodermites, Engelures, Brûlures, Coups de soleil, Eczéma, Conjonctivites, Blépharites. Plaies de toutes natures.

Posologie. — Deux à trois pansements par jour avec massage doux et prolongé si possible. Recouvrir avec un taffetas. Dans les cavités : une mèche imbibée de *Lysacrème L. M. L.*

Prix : 18 fr. 10 le grand tube ; 12 fr. 25 le petit tube.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

LYSAXINS L. M. L.

Composition. — Lysats pyocyaniques, Corps microbiens formolés, Peptones polyvalentes.

Avantages. — 1° Lysats très polyvalents (souches sélectionnées). Très actifs (souches non repiquées, PH spécialement étudié) ; 2° Vaccins microbiens très efficaces, grâce à l'atténuation par la formaline ; 3° Choc peptonique à volonté.

Indications. — *Antipyogène* : suppurations dues aux pyogènes communs : Furoncles, Anthrax, etc.

Abdominal : Suppurations digestives (préventivement : avant toutes interventions sur l'abdomen).

Antineisser : Uréthrites, Orchites, Métrites, etc.,

Forme. — Ampoules 2 cc.

Posologie. — *Curatif* : 1/2 cc. et augmenter ensuite jusqu'à 2 cc. Minimum 3 injections de 2 cc.

Préventif : 4 injections de 1 cc. Espacer les injections de 48 heures au minimum.

Prix : 24 fr. 50 la boîte de 4 ampoules.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

LYSOCOCCINE

(Sulfanilamide)

CHIMIOTHÉRAPIE DES ÉTATS INFECTIEUX.

Composition. — Comprimés à 0 gr. 30 de para-amino phényl sulfamide.

Indications. — Tous les états infectieux à Streptocoques, Méningocoques, Gonocoques, Staphylocoques, Pneumocoques, Colibacilles.

Septicémies, Infections puerpérales, Suppurations oto-rhino-laryngologiques et pulmonaires. — Anthrax, Furoncles. — Méningites. — Blennorragies aiguës, chroniques et toutes leurs complications. — Colibacillurie.

Posologie. — Doses habituelles dans un traitement d'attaque :

Les deux premiers jours : 2 comprimés toutes les 3 heures : 8 prises par 24 heures.

Les deux jours suivants : 2 comprimés toutes les 3 heures : 6 prises par 24 heures.

Puis les quatre à huit jours suivants :

Cure de consolidation (ou traitement des états infectieux bénins). 2 comprimés toutes les 3 heures : 4 fois par 24 heures.

Enfants.

AGE	DOSES MOYENNES habituellement suffisantes pour 24 heures de traitement.	DOSE MAXIMA pour 24 heures de traitement.
Nourrissons.	30 à 60 cgr. (1 à 2 comprimés).	45 à 90 cgr. (1-1/2 à 3 comprimés).
1 à 5 ans...	60 cgr. à 1 gr. 20 (2 à 4 comprimés).	90 cgr. à 1 gr. 50 (3 à 5 comprimés).
5 à 12 ans..	90 cgr. à 2 gr. 10 (3 à 7 comprimés).	1 gr. 50 à 3 gr. (5 à 10 comprimés.)

Traitement préventif adultes. — 2 comprimés 3 à 4 fois par jour, à 3 heures d'intervalle pendant 2 ou 3 jours.

Contre-indications, intolérances, échecs. —

La faible toxicité de *Lysococcine* permet de l'administrer à tous les patients.

Une certaine prudence est néanmoins nécessaire à conseiller dans sa posologie, lorsque les organes de désintoxication et d'élimination sont gravement lésés (foie et reins).

Il faut supprimer systématiquement tous les sulfates alcalins pendant la cure de *Lysococcine* afin d'éviter les phénomènes de Sulfhémoglobinémie possibles.

On maintiendra les prescriptions diététiques habituelles, sans augmenter ni diminuer la ration liquide journalière. L'eau alcaline est la boisson la plus recommandable, car l'administration de bicarbonate de soude évite des petits incidents thérapeutiques.

On peut constater, lors du traitement d'attaque, une sensation de lassitude, de vertiges, une légère hyperthermie. L'ingestion de bicarbonate de soude (1 à 2 grammes 3 fois par jour) et la diminution des doses de *Lysococcine* en amènent une disparition rapide.

Lorsqu'on a des raisons de craindre une idiosyncrasie, il est bon de tâter la tolérance du malade avec de faibles doses.

Prix : la boîte de 44 comprimés : 24 fr. 50.

Produit enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 1101-11.

Remboursé par les Assurances Sociales.

Échantillons et littératures :

Laboratoires M. BORNE

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 02-78.)

Fournisseurs du Ministère des Colonies
et de l'Assistance publique.

LYXANTHINE ASTIER

Composition. — Établie suivant une formule entièrement inédite, la Lyxanthine Astier contient 33 p. 100 de principes actifs : bitartrate de lysidine, iodopropanol-sulfonate de sodium, gluconate de calcium.

Aucun toxique ni analgésique.

Propriétés. — Puissant anti-arthritique, dissolvant de l'acide urique huit fois plus actif que les solvants habituels.

Indications. — Rhumatismes chroniques, goutte, convalescence de la maladie de Bouillaud, lithiases biliaires ou urinaires, névralgies et névrites d'origine rhumatismale, troubles hépatiques des arthritiques.

Posologie. — *Granulés* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Comprimés : 2 à 4 par jour. Cures de 10 à 20 jours.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

MAGBROMYL

Solution pour adultes.

Solution^{te} de Bromure de Sodium pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium et du CaCl^2 . Tonique et stabilisateur du Système nerveux. *MgCl^2 augmente l'activité thérapeutique des Bromures. Ca Cl^2 stabilise le système nerveux. Plus de torpeur, plus de dépression. Pas d'anphrodisie.*

Indications. — Toutes celles des Bromures.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café *pro die*, chaque cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau, de tisane, ou de lait sucrés.

Une cuillerée à café = 0 gr. 50 NaBr, 0 gr. 25 MgCl^2 , 0 gr. 10 CaCl^2 .

Sirop de Magbromyl (Médecine infantile) pour enfants jusqu'à 12 ans.

Doses. — 1 à 8 cuillerées à café *pro die*.

Une cuillerée à café = 0 gr. 25 NaBr, 0 gr. 10 MgCl^2 , 0 gr. 05 CaCl^2 .

Ces préparations, de goût vraiment agréable, masquent totalement la saveur désagréable des Bromures.

Traitement de 8 à 15 jours suivant les cas.

Prix : Adultes 18 fr. 70. Sirop pour enfants : 11 fr. 45.

Laboratoire du MAGSALYL

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE

(Tél. : Italie 16-91.)

MAGÉCARINE

Comprimés à base de magnésie, carbonate de chaux, bicarbonate de soude et divers extraits de plantes.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés au moment des troubles.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant.

Indications. — Aigreurs, Brûlures d'estomac ou hyperchlorhydrie.

Prix : 14 francs. (10 à 15 jours de traitement.)

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Galv. 86-17.)

MAGIODYL

Solution d'Iodure de Sodium chimiquement pur associé au Chlorure de Magnésium.

Seule préparation de goût vraiment agréable où la saveur insupportable des iodures est totalement masquée.

Avantages. — Le Chlorure de Magnésium augmente l'activité thérapeutique des iodures, supprime les accidents d'iodisme. Emploi facile en médecine infantile et chez les personnes délicates.

Indications. — *Hypertension*, artériosclérose, et toutes les indications des iodures.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café *pro die*, chaque cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède sucrés ou non.

Dose variable suivant avis du médecin traitant.

Une cuillerée à café = 0 gr. 25 NaI + 0 gr. 25 MgCl².

Traitement de 5 à 30 jours suivant les cas.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire du MAGSALYL

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE
(Tél. : Italie 16-91.)

MAGNACALCINE

Granulé aux 3 glycérophosphates et au nucléinate de manganèse et de magnésie, Agent de récalcification, de reminéralisation, de rénovation du tissu osseux, tonique de la cellule nerveuse.

Principales indications. — Toutes affections par carence calcique et magnésienne.

Neurasthénie, phosphaturie, *fractures*, Rachitisme, *lymphatisme*, grossesse, allaitement, *surmenage*, *débilité*, *troubles de croissance*, carie dentaire, tuberculose pulmonaire et osseuse.

Doses à croquer :

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café (par jour aux repas ou en dehors).

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café (par jour aux repas ou en dehors).

Prix : 14 francs.

Laboratoire des Produits SANOVA

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

MAGNELAX

Composition. — Émulsion de Magnésie et d'Huile de paraffine.

Indications. — **LAXATIF** ne contenant aucun drastique : CONSTIPATION, fermentations, acidités.

Posologie (Doses moyennes) : que l'on peut augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

Adultes : 1 cuillerée à soupe par jour, au repas du soir de préférence.

Enfants : 1 cuillerée à dessert par jour.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour dans le lait du biberon.

Prix : 18 francs.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

MAGNÉSIE DECHOSAL

Magnésie calcinée suractivée par un procédé nouveau de porphyrisation.

Avantages. — Conservation parfaite. Action plus que doublée. Aucun goût. Se délaye dans l'eau en formant une suspension homogène comme les solutions colloïdales.

Indications. — Toutes celles de la magnésie calcinée.

Doses. — 1/2 à 4 cuillerées à café suivant les cas.

Prix de la boîte : 12 fr. 50.

Laboratoires DECHOSAL

Pharmaciens Spécialistes,

39, rue Roger-Salengro — BONDY (Seine).
(Tél. : 65.)

MAGNÉSIE LANCOSME

Présentation. — Magnésie lourde de fabrication anglaise, ténue, inodore, insipide, se tenant en suspension parfaite dans l'eau et d'une absolue pureté. Saveur agréable. Parfaitement acceptée par tous les malades.

Indications. — Constipation, acidités gastriques, flatulences, lithiase biliaire, atonie vésiculaire ; anti-acide buccal, intoxications par acides corrosifs, arsenic, sels métalliques.

Posologie. — Prendre la magnésie dans un peu d'eau sucrée ou une infusion chaude.

Dose purgative : 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun.

Dose laxative : 1 cuillerée à café le soir au coucher.

Dose anti-acide : 1/4 de cuillerée à café à chacun des 2 repas.

Anti-acide buccal : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau pure et après brossage des dents se rincer la bouche avec ce mélange.

Contre les intoxications : après lavage de l'estomac 15 à 20 gr. dans 1/2 litre d'eau.

Prix : 13 fr. 50 (traitement de 20 jours).

LANCOSME,
71, avenue Victor-Emmanuel — PARIS.
Tél. : Élysées 17-46.

MAGNÉSIUM HARDY

Deux formes :

Granulé-Bouillon & Sirop.

Composition. — *Granulé-bouillon* (remplace l'ancienne forme *Tablette-Bouillon*) : 1 gr. 20 Chlorure de Magnésium par demi-cuillerée à café.

Sirop : 1 gr. 20 Chlorure de Magnésium par cuillerée à soupe.

Originalité. — Agrément et facilité d'absorption tant du *Sirop* aromatisé à la Groseille, que du *Granulé-Bouillon* donnant avec une tasse d'eau chaude un consommé très savoureux.

Posologie. — Une demi-cuillerée à café de *Granulé-Bouillon* par jour ou une cuillerée à soupe de *Sirop* au début d'un des repas.

Indications. — Asthénie nerveuse. Prostatisme. Vieillesse prématurée. Stimulant biologique général. Verrues et toutes proliférations. Reminéralisation. Prurits, tremblements.

Présentation :

Granulé-Bouillon : flacon pour 16 jours de traitement.

Sirop : flacon pour 14 jours de traitement.

Laboratoires Paul HARDY
Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V°).
(Tél. : Gobelins 36-96.)

MAGNÉSIUM ROSSO

Solution Hypertonique de Galacto-Gluconate de Magnésium à 8 p. 100.

Chimiothérapie sédative des syndromes neuro-végétatifs par hyperminéralisation magnésienne.

Par injections intramusculaires et intraveineuses.

Le Magnésium Rosso en thérapeutique est le traitement de choix de : Troubles de déséquilibre neuro-végétatif (Emotivité, Insomnies, Hyperexcitabilité, Irritabilité, Angoisse), Troubles névropathiques, Vaso-moteurs et cardiaques par sympathi-cotonie, Contractures et crampes, Asthme, Saturnisme et tremblements séniles, Séueqlles des maladies infectieuses et post-encéphalites avec lésions organiques (Chorées-Parkinson et sclérose en plaques). Carence sexuelle, Ménopause physiologique postopératoire : Bouffées de chaleur, Transpiration, Aménorrhée.

Troubles complexes de femmes privées de *maternité*, aide au déclenchement du flux menstruel, favorise l'apparition et le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

Eclampsie, Spasmophilie, Anaphylaxies, Dermatoses (prurigo, urticaire), Maladie de la prostate, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires, Lésions précancéreuses, Prophylaxie du cancer.

Posologie :

Traitement d'entretien : 10 cc. tous les jours par injections intramusculaires ou tous les 2 jours intraveineuses.

Traitement d'attaque : de 10 à 30 cc. tous les jours par injections intraveineuses ou intramusculaires.

De préférence, la dose par voie intraveineuse n'excédera pas, la première fois, 10 cc.

Présentation et prix :

Boîte de 12 amp. de 5 cc. : 35 francs.

Boîte de 6 amp. de 10 cc. : 31 fr. 80.

Boîte de 5 amp. de 20 cc. : 40 francs.

Boîtes de 6 amp. à 20 p. 100 de 10 cc. : 40 francs.

Médication intensive, Cytophylactique, Cytotrope, Indolore, Aucune réaction.

Enregistré au L. N. C. M.

Produits Biochimiques ROSSO

THURET, Pharmacien,

63, rue de Charonne — PARIS.

MAGNÉSO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium (plus de 50 p. 100) associé à des acides phosphoriques organiques : glycérophosphates, anhydro-oxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie, acide nucléinique.

Présentation. — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlorure de magnésium.

Emploi. — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

Posologie. — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

Indications. — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement défectueux des glandes endocrines. Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). Séquelles post-opératoires. Asthénie. Fatigue générale. Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... Affections de la peau : acné, psoriasis, eczéma. Lutte contre les tumeurs en général. Prophylaxie du cancer. Donne une sensation de grand bien-être.

Prix : 23 francs.

Laboratoires ROBINET

MORET-SUR-LOING (Seine-et-Marne).

(Tél. : 57.)

TERRAINS MAGNÉSIENS ET CANCER, L. Robinet. — Pour la France : communication à l'Académie de médecine par M. le professeur Delbet (avril 1930). — Pour l'Alsace-Lorraine : Académie de médecine (avril 1930). — Pour l'Angleterre : Académie de médecine (juillet 1931). — Pour le Grand-Duché de Bade : Académie de médecine (juillet 1932).

TERRAINS MAGNÉSIENS ET CANCER, MM. Pierre Delbet et L. Robinet (nouvelle étude). Communication Académie de médecine (mars 1934).

SUIOIDES, TUBEROULOSE SÉNILITÉ ET TERRAINS MAGNÉSIENS, communication à l'Académie de médecine (avril 1934).

MAGNÉSOVULES

Ovules au chlorure de magnésium
(0 gr. 25 par ovule) conservés suivant la

MÉTHODE SOLACTIVE

Méthode de *conception nouvelle* donnant des résultats remarquables, consistant à conserver les ovules dans un récipient de verre neutre contenant un liquide spécial.

Avantages. — Fusibilité parfaite. Activité décuplée. Asepsie. Conservation intégrale du pouvoir hygroscopique.

Indications. — Les inflammations aiguës ou chroniques de l'utérus et des annexes. Métrites, Salpingites, Ulcérations du col. Vaginites, Prurits vulvaires, etc...

Mode d'emploi. — Retirer du flacon un Magnésovule en le piquant avec la petite fourche, et l'introduire dans le canal vaginal, le soir au coucher. Se garnir ensuite au moyen d'un tampon de coton et d'une serviette périodique.

Les Magnésovules s'appliquent tous les soirs ou tous les deux soirs. Dans les cas aigus, ils peuvent être employés plusieurs fois dans la journée.

Présentés de même façon, il existe des ovules à l'Ichtyol véritable, dénommés Ovules au Sulfichtyol.

Prix : 19 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-16.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*. Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital. Remplace avantageusement le Fer.

Indications. — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

Trois formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 20.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire des Produits du D^r CHURCHILL

P. DESCHAMPS, Pharmacien

92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 74-02.)

MAGSALYL

Association Soufre-Salicylate de Soude.

Forme Solution : dosée par cuillerée à café à :

Salicylate de Soude pur 0,50

Hyposulfite de Magnésium 0,075

Plus Chlorure de Mg, Chlorure de Ca, Salicylate de K, pour établir une solution en équilibre physiologique avec les ions Na, Ca, K et Mg du plasma sanguin.

Propriétés. — Activité accrue surtout dans le traitement des affections cardiaques évolutives par l'action catalytique puissante du soufre vis-à-vis du salicylate, en milieu calcique.

Atoxique. Parfaite tolérance gastrique par l'hyposulfite de Mg, antichoc, antitoxique, cholagogue. PH = 7,4. Seule préparation de goût agréable et persistant grâce à un procédé spécial de fabrication.

Forme Comprimés glutinisés :

Composés des mêmes principes actifs, sans aucun excipient, ils se délitent et se dissolvent rapidement et complètement dans l'intestin.

A prescrire lorsqu'il y a impossibilité à employer la solution (intolérance absolue, malade en déplacement ou travaillant au dehors, etc...), la solution demeurant, à notre avis, la forme préférable.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu, rhumatismes chroniques, sciatique, lumbago, hépatisme, états infectieux.

Mode d'emploi. — 4 à 20 cuillerées à café ou comprimés par 24 heures, à diluer 2 cuillerées à café dans un verre de liquide (tisane, lait, etc.).

Traitement. — De 3 à 15 jours suivant les cas.
Prix : 20 fr. 30.

Laboratoire du MAGSALYL

8-10, rue Jeanne-Hachette

IVRY-SUR-SEINE.

(Tél. : Italie 16-91.)

MAISLERIASE

Biochimiothérapie par dilatation gazeuse du Dr H. MAISLER.

Composition. — *Oxydant* : Peroxyde d'H. benzoiné et catalysé.

Spécifique : Argent en combinaison protidique en milieu hydroglycériné et fermenté.

Propriétés. — Dilatateur parfait, Décongestif, Hémostatique, Anti-prurigineux, Indolore, Innocuité absolue, Application facile, Séances courtes.

Indications. — Toute forme de blennorragie aiguë ou chronique et ses complications, Abortives, Rectites gonococciques ou non, Hémorroïdes, Vaginites, Métrites, Vulvo-vaginites des petites filles, Leucorrhée, Prurit vulvo-vaginal et anal, Stérilité, Vaginite granuleuse.

Présentation et prix. — *Maisleriase* : une seringue Maisler et deux flacons (oxydant spécifique) : 60 francs.

Maisleriase F. : deux flacons (oxydant spécifique) : 40 francs.

Maisleriase P. M. : deux flacons (oxydant spécifique) : 25 francs.

Nota : Chaque boîte présente un traitement complet.

Mode d'emploi et posologie :

A. *Chez l'homme* : en injections urétrales, Blennorragies récentes (Abortives, aiguës), injection d'un cc. d'oxydant à canal ouvert, suivie d'une injection d'un cc. de spécifique que le malade garde 2 minutes environ. Traitement quotidien ou tous les deux jours.

Urétrites chroniques, toujours accompagnées d'infiltrations à 6 à 8 cm. du méat et à l'angle pénien, et de prostatite subaiguë dans les formes anciennes. Traiter à l'aide d'un instillateur n° 15, en gomme, à boule exploratrice. Traitement bi ou tri-hebdomadaire (4 à 12 séances).

B. *Chez la femme* : Leucorrhée ; Injection vaginale d'une cuill. à café d'oxydant dilué dans un demi-verre d'eau bouillie froide, suivie 3 minutes après d'une injection d'une cuill. à café de spécifique dilué dans un demi-verre d'eau, à garder 3 minutes environ. Tous les deux jours (3 séances).

Vulvo-Vaginites des petites filles : Injection vaginale de 3 cc. d'oxydant dilué au 1/3, suivie d'une injection de 3 cc. de spécifique dilué au 1/3. Arroser ensuite la vulve avec 1/2 cc. d'oxydant et de spécifique purs. Traitement tous les deux jours (3 séances).

Pelvi-métrites, vaginites, vaginisme, stérilité, métrites gonococciques suraiguës : Inj. vag. de 3 cc. d'oxydant dilué dans 6 cc. d'eau 3 minutes après inj. de 3 cc. de spécifique dilué dans 6 cc. d'eau. Arroser ensuite la vulve avec solutions pures.

Rectites : Inj. successive de 9 cc. dilué au tiers.

Prurit anal et vulvo-vaginal : Arroser avec 1 cc. d'oxydant pur et de spécifique pur.

Métrites gonococciques subaiguës : Spéculum. Seringue de Pravaz de 10 cc. Injection de 9 cc. d'oxydant dilué au tiers, suivie 3 minutes après de 9 cc. de spécifique dilué au tiers. Application tous les deux jours.

Laboratoires de la MAISLERIASE

143, rue d'Alésia — PARIS (XIV°).

(Tél. : Vaugirard 70-61.)

MAÏZENA

Présentation. — Poudre blanche, sans saveur, ni odeur, insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau chaude et formant une crème onctueuse et, si la concentration est suffisante, une gelée en refroidissant.

Analyse :

Carbohydrates	87,60 %
Matières grasses.....	0,04 —
Matières azotées	0,72 —
Matières minérales	0,14 —
Humidité.....	11,50 —
	<hr/> 100 %

Indications. — Aliment léger, facilement assimilable convenant particulièrement aux enfants et aux sujets présentant des troubles digestifs.

Mode d'emploi. — Sous forme de bouillies, potages, entremets sucrés et aromatisés : 1° Délayer le *Maïzena* dans un liquide froid (lait, bouillon) pour que le mélange soit bien lisse ; 2° Verser ce mélange dans le reste du liquide en ébullition ; 3° Laisser bouillir quelques instants seulement.

Doses. — Variables suivant les mets à préparer. Pour les enfants. 1 cuillerée à soupe rase (10 grammes) pour une bouillie de 160 grammes.

Prix : 4 fr. 75 la boîte de 500 grammes.

2 fr. 70 la boîte de 250 grammes.

Société des PRODUITS DU MAIS

29, rue de Berri — PARIS. (Tél. : Elysées 72-06.)

MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé, pour tous les âges.

Indications. — Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes). Saveur agréable. Très grande assimilation.

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

Mode d'emploi. — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon (usage 15 jours).

MOSER et Cie S. A.

8, chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

Tél. : Moncey 42-19.

MALT ETHEL

Malt d'orges touraillé et torréfié (succédané du café).

Le malt Ethel est composé uniquement d'orges germées (malt), touraillées et torréfiées.

Il contient tous les principes actifs et nutritifs de l'orge dans une forme facilement assimilable; il remplace le café, dont il n'a pas la nocivité.

Le Malt Ethel est très riche en vitamines et enzymes (diastases).

Il convient particulièrement :

1° A tous les débilités, anémiés et aux gastro-hépatiques, dont il stimule et régularise les fonctions digestives.

2° A tous ceux auxquels l'usage du café est interdit : cardiaques, rénaux, excités, nerveux etc., car il constitue également un sédatif puissant du système nerveux.

Mode d'emploi.

Avoir soin de moudre en gros grains, infuser à l'eau chaude, remplacer progressivement le café par du malt Ethel, tant dans le café noir que dans le café au lait.

Le malt Ethel peut être consommé indéfiniment sans le moindre inconvénient.

Pour tous renseignements et échantillonnage, prière de s'adresser aux

USINES ETHEL S. A.

Malteries et Torréfaction de malt à SCHILTIGHEIM, près Strasbourg (Bas-Rhin).

Ou à l'Agent Général

Pierre RONCIN

132, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS (10°).

(Téléphone : Nord 32-13)

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.

Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 4 fr. 15 verre compris.

Etablissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

MALTOGIL

(Malt pailleté Progil.)

Composition. — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique vitaminé. Renferme la totalité de la diastase du malt, du maltose, des phosphates naturels, de la lécithine, des peptones et des vitamines.

Propriétés. — Aliment très concentré de goût agréable, de digestibilité parfaite.

Indications. — Convalescents, Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-rénaux, Hépatiques.

Remplace avantageusement la bière pour nourrices.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

Bouillies maltées : Après cuisson, retirer la bouillie du feu et la laisser reposer deux ou trois minutes. Ajouter une cuillerée à café de **Maltogil** par cuillerée à soupe de farine employée et remuer. Attendre un quart d'heure, puis porter rapidement à l'ébullition. La bouillie devient fluide et parfaitement digestive.

PROGIL, Sté An. au cap. de 50 000 000 de fr.

10, quai de Serin — **LYON** (IV^e).

(Tél. : Burdeau 85-31.)

Laboratoires à **RIS-ORANGIS** (S.-et-O.)

MALTOSAN

Bouillie maltosée en poudre.

Composition. — Maltose, 30 p. 100. Dextrines, 25 p. 100. Céréales, 40 p. 100. Sels minéraux, 2 p. 100. H²O, 3 p. 100. Diastases.

Indications. — Dyspepsie du lait de vache ; combat les fermentations putrides. Désinfectant intestinal, exerce une action favorable dans le traitement de la constipation. Facilite le sevrage.

Doses. — 2 mesures par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 mesure nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.

Retirer du feu au premier bouillon.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

MALTOSINE DÉJARDIN

Extrait de Malt sec, atomisé, obtenu absolument pur, et contenant la totalité des ferments du grain à l'état naturel.

Indications. — Troubles de la nutrition des nourrissons et enfants, Putréfactions, Colites, Déphosphatisation des anémiés, surmenés, convalescents et vieillards.

Posologie :

Nourrissons : 3 cuillerées à café par tasse.

Bouillies maltosées : 2 à 4 cuillerées à café par litre.

Enfants : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 8 francs.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

MALT WANDER ou GLOMALT

(Extrait de malt sec.)

Composition. — Matières azotées 5,87 p. 100 ; Hydrates de Carbone (maltose et dextrine), 89,19 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Acide phosphorique des substances minérales, 9 p. 100. Eau, 3,40 p. 100 ; Diastases. Vitamines.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal nutritif et digestif dans les cas d'Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocologie chronique par insuffisance amylolytique. Source de diastases et de vitamines B. Permet la préparation des bouillies maltosées.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

MANACINE

(Produits à l'extrait de Manaca.)

Comprimés
(Us. interne).

Pommade
(Us. externe).

Composition :

KI.....	0,048	Extr. mou de Manaca	1gr.
KBr	0,008	Huile de Chaulmoogra...	1,50
Extr. mou de Manaca	0,05	Ichtyol.....	1gr.
— de Quinquina .	0,024	Camphre	0,40
— de Gentiane ...	0,008	Menthol	0,10
— de Marrube ...	0,004	Deutoxyde de Plomb....	0,10
— d'Agaric	0,02	Oxyde de Zinc.....	10,00
— de Passiflore....	0,004	Excipient.....	Q. S. P. 100gr.
— de Centaurée ...	0,004		
pour un comprimé.			

Indications. — Maladies de la Peau (Eczéma, Psoriasis, Acné, Urticaire, etc.), Ulcères variqueux, Troubles de la circulation (Varices, Phlébites, etc.), Artériosclérose, Arthritisme, Brûlures.

Posologie.

2 comprimés matin et soir avant le repas | Un pansement (ou une application) matin et soir suivant le cas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de la MANACINE

83, boulevard de la Villette — PARIS (X°).

MANDÉLIUM

Composition. — *Mandélium-ampoules* : ampoules buvables de 3 gr. 38 de mandélate d'ammonium. *Mandélium-poudre* : divisions de 3 gr. 38 de mandélate de calcium ou cachets de 1 gr. 12.

Propriétés. — *Bactéricide et acidifiant.*

Indications. — Toutes infections urinaires aiguës, subaiguës et chroniques ; *spécifique du colibacille*. Lithiase phosphatique et oxalique. Toutes alcaloses.

Posologie. — *a.* Des infections urinaires : 4 ampoules ou divisions par jour, une unité immédiatement après chaque repas ou 3 cachets au cours de chacun des quatre repas.

Enfants : de moins de 6 mois à 2 ans : $\frac{2}{3}$ de division à 1 ; de 2 à 5 ans : de 1 à 2 divisions ; de 5 à 12 ans : de 2 à 3 divisions ; *en quatre fois comme chez l'adulte.*

b. Des lithiases et alcaloses : la moitié ou le quart des doses précédentes.

Boîte de 12 ampoules ou divisions.

Boîte de 36 cachets.

N. B. — L'action du *Mandélium* est sûre, si l'*acidité urinaire est suffisante*.

Dès le début du traitement, il faut la mesurer plusieurs fois avec notre papier réactif ; si celui-ci reste jaune après avoir été trempé dans l'urine, l'acidité de cette dernière est suffisante (pH égal ou inférieur à 5,3) : s'il vire au gris ou au gris violacé, les urines sont insuffisamment acides.

Si le papier réactif vire au gris violacé après deux jours de traitement par le *Mandélium*, on ajoutera un acidifiant urinaire. Lorsque l'acidité nécessaire est atteinte, diminuer progressivement l'acidifiant et même les doses de *Mandélium*.

Société générale d'Applications Thérapeutiques
“ THERAPLIX ”

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

MANDOCARBINE

Indications. — Antisepsie des voies biliaires, intestinales et urinaires. Fermentations intestinales, Intoxications alimentaires, Aérophagie, Entérites, Congestion du foie, Prostatites, Cystites, Colibacilloses, Constipation.

Composition. — Charbon absorbant, magnésie, poudre de feuilles de belladone, para-amino-benzène sulfamide, mandélate de calcium.

Forme. — Granulé fondant.

Prix : 18 fr. 75 la boîte pour 10 jours de traitement.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café après chaque repas principal, à placer sur la langue et à absorber avec une gorgée d'eau.

Enfants : 1/2 cuillerée à café.

Laboratoires SICA

R. MICHY, Pharmacien, 13, rue Beudant — PARIS.
(Tél. Wagram 75-75.)

MANGAÏNE

Polyoxyde de Manganèse
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indications thérapeutiques :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose. — 4 à 6 tablettes par jour.

Prix : 13 fr. 75.

Pharmacie SCHMIT

71, rue Sainte-Anne — PARIS.
(Tél. : Richelieu 19-26.)

MANGANESIA

Solution permanganique arsenicale.

Traitement du Diabète.

Propriétés thérapeutiques. — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

Dose et mode d'emploi. — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

Prix : 18 fr. 75.

**Laboratoires des Produits DANNEC'H
BRUN et MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e). (Tél.: Arch. 87-44.)
R. C. Seine 218.670.

MANGANO-PHOSPHAL

Gouttes sans aucun toxique.

Composition. — XX gouttes contiennent :

Ac. phosphorique offic. pur.....	0 gr. 35
Magnésium et polyglycéroph.....	0 gr. 60
Sels de manganèse.....	0 gr. 10
Gluconate de cuivre.....	1/4 milligr.
Phosphate de zinc.....	1/10 milligr.

En solution sans alcool et sans sucre.

Indications. — Puissant reconstituant, sans aucun toxique, agissant très rapidement et donnant des résultats durables. Enfants, adultes, femmes enceintes ou qui nourrissent, diabétiques, vieillards même hypertendus.

Posologie :

Enfants : II gouttes par jour par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes : XX gouttes à chacun des repas de midi et du soir, dans 1/2 verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Prix : 17 francs. — Flacon gratuit sur demande :

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie.

105, rue de Rennes — PARIS (VI^e). — Tél.: Littré 80-76.

MARINOL

Reconstituant marin physiologique.

Inaltérable. De goût agréable.

Composition. — Eau de mer captée au large. Iodalgol (Iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

Particularités. — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

Indications. — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe.
Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.

Prix : 18 francs.

Littérature et Échantillons :

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

MARRUBÈNE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzoate de soude.

Propriétés. — Possède la triple action : *Fluidifiante*, *Expectorante*, *Aseptisante*, sur les produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

Indications. — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

Mode d'emploi. — Le Marrubène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granules et d'elixir. Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café de granules, ou 2 à 3 cuillerées à soupe d'elixir.

Boîte de 36 cachets.

Tube de 45 dragées.

Élixir — Granules.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

Formes. — Dragées et sirop.

Propriétés. — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Indications et Posologie. — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

Intoxications, dysenteries (selles nombreuses) : 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures.

Entérite chronique : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n° 103-3 et 4.

Prix : 16 fr. 65 durée 2 à 4 jours.

COMTE, Pharmacien,

60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

MARRUCOL

Composition. — Sulfogaiacolate de potasse, Marrube blanc, Glycérophosphate de chaux, Méthylarsinate de soude, Noix vomique pulvérisée.

Indications. — Agit particulièrement comme Traitement d'entretien dans les Bronchites aiguës ou chroniques, Pleurésies, Pneumonies, Congestions pulmonaires, Maladie de Poitrine. Est également indiqué dans Toux, Rhume, Catarrhe, Asthme, Grippe, Crachats persistants, Anémie, Rachitisme.

Propriétés. — Antiseptique pulmonaire et modificateur de la muqueuse respiratoire. Fluidifie les sécrétions et facilite l'évacuation des mucosités filandreuses et transparentes. Calme la toux, Recalcifiant, Reminéralisant, Tonique, Excite l'appétit.

Mode d'emploi. — Un cachet matin, midi et soir, avant les repas.

La boîte de 30 cachets : 12 fr. 50.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 86-76.)

MARUBOR

Sirop à base d'extrait hydroalcoolique stabilisé de Marrube Blanc.

Propriétés. — Modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant, toni-cardiaque.

Indications. — Congestion pulmonaire, Bronchites rebelles ou chroniques, Catarrhe, Asthme, Tuberculose.

Aucune contre-indication.

Posologie. — Agréable malgré sa haute teneur en Marrube (10 gr. d'extrait stabilisé par litre), ce sirop se prescrit à la dose moyenne de 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 16 fr. 15:

Littérature et Échantillons au
Laboratoires du MARUBOR

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).
(Tél. : 1-59.)

MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay.

Indications. — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression. ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

Composition. — Vin : Muscat de Samos et Maté.
Prix : 20 francs.

Élixir : Crème de Cacao et Maté. Prix : 18 francs.
Granulé : Maté glycérophosphaté composé.
Prix : 13 fr. 50.

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice,
sur demande adressée au Dépôt général :

**PHARMACIE ANGLAISE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 22-52.)

MÉNATOL

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 363-2.

Forme. — Pilules.

Composition. — Poudre d'ovaire, Marron d'Inde, Genêt, Viburnum, Hydrastis, Hamamelis.

Propriétés pharmacodynamiques. — Vasoconstricteur utérin. Tonique et décongestif du réseau veineux. Opothérapie ovarienne.

Indications. — Troubles de la ménopause. — Règles douloureuses. — Régulateur des fonctions utéro-ovariennes.

Mode d'emploi. — Deux à six pilules par jour, au début des repas.

L'étui de 40 pilules : 17 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. Lab. 62-30.

MENOSSEDINE

Composition. — Gossypium, Hamamelis, Poudre ovarienne, Pyramidon, Bromure de sodium.

Indications. — Sédatif utérin, Calme les phénomènes douloureux et malaises qui précèdent ou accompagnent les règles.

Formes. — Liquide et comprimés.

Posologie. — Au début des malaises, une cuillerée à soupe : une seconde cuillerée une demi-heure après si la première n'a pas suffi.

Trois comprimés dans un peu d'eau ; trois autres une demi-heure après si besoin.

Prix : Liquide et comprimés : 12 fr. 80 (3 ou 4 mois de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

MENSIVAL

Médicament spécifique de la douleur menstruelle.

Forme. — Cachets de 0 gr. 50 constitués uniquement par le Diméthylpropanoateorthoxybenzoïque (Ether valérianique de la fonction oxydrile salicylique).

Propriétés thérapeutiques :

A. **Sédatif utérin** analgésique, antipyrétique et antispasmodique agissant en 20 minutes.

B. **Régulateur du flux menstruel.**

Inocuité absolue. Pas de contre-indication.

Indications. — Règles douloureuses, Dysménorrhées, Spasmes utérins, Coliques *post partum*, Névralgies utéro-ovariennes, Troubles douloureux de la ménopause, Nervosisme de l'époque menstruelle.

Posologie. — **Mode d'emploi :** 2 jours avant la date présumée des règles : 2 cachets par jour. Pendant les règles, 3 à 4 cachets par jour, avec une infusion chaude, à 3 ou 4 heures d'intervalle.

Prix : 17 fr. 50 la boîte de 24 cachets.

Laboratoires SUJAL

J. LAFARGE, Pharmacien

62, rue de la Brauderie — CHATEAUROUX (Indre).

MENSUOSÉDYL

**Sédatif spécifique Inoffensif des
Douleurs Menstruelles.**

Composition :

Un analgésique.....	Pyramidon.
Un diurétique.....	Théobromine pure.
Un antispasmodique...	Ext. de Valériane.
Un sédatif	Ext. d'Anémone.
Un tonique.....	Guaranine.

(Procédé spécial de conservation.)

Indications. — Traitement symptomatique des Dysménorrhées, Menstrualgies, Douleurs du *post-partum*, Troubles nerveux de la vie génitale. (*Aucune contre-indication.*)

Processus de l'action. — Sédation très rapide de tous les phénomènes douloureux et diffus et action tonicardiaque désirable.

La *Théobromine* non seulement pallie à l'inconvénient que pourrait présenter seul le pyramidon vis-à-vis de certains reins, mais présente une heureuse action décongestive sur l'hyperémie habituelle du rein pendant cette période.

Sans opothérapie, aucune influence directe sur le rythme de l'ovulation.

Posologie. — 1 *cachet* dès l'apparition des douleurs, et 3 cachets par 24 heures.

La boîte de 12 cachets : 14 francs.

La demi-boîte, 6 cachets : 7 fr. 50.

Paul AUGIER, Pharmacien

Ex-interne des hôpitaux de Paris,
2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 09-04.)

MENTHE MITCHAM VÉDÉ

Feuilles de menthe pour infusions digestives d'une qualité exceptionnelle et d'un arôme sans égal. Cultures médicinales modèles au château de Brailly-Cornehotte (Somme). Plants Mitcham sélectionnés à teneur élevée en huiles essentielles.

Plantation, récolte, mondage, dessiccation dans locaux spécialement aménagés. Plants entourés de tous les soins nécessaires pour favoriser l'acclimatation et éviter la dégénérescence.

Boîte pour 50 tasses : 5 fr. 30.

Boîte pour 100 tasses : 10 fr. 10.

Échantillons gratuits au Corps médical.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 97-46 et 94-47.

MERCURO-PAST

Dermatologie - Chirurgie.

Composition. — Pâte à l'eau spéciale au mercuro-fluoren.

Propriétés. — Par l'association stable des deux meilleurs agents dermatothérapeutiques. La pâte à l'eau traditionnelle. L'antiseptique moderne de choix : le dibromooxymercurifluorescéine (marque déposée : mercuro-fluoren).

Indications. — Le *Mercurio-Past* est indiqué dans toutes les dermatoses.

Dermatologie : Eczémas, Dermatoses inflammatoires, Dermatoses parasitaires.

Chirurgie : Cicatrisant et désinfectant des plaies superficielles et anciennes. Cicatrisant des plaies superficielles infectées. Plaies chirurgicales trainantes : fistules, escharres, etc. Retard de cicatrisation.

Mode d'emploi. — Selon l'indication du médecin.

Présentation. — Tube de 80 gr. Prix public : 15 fr. 50.

Remboursable aux Assurances Sociales.

Laboratoire PRIGNIAU

52, rue des Cinq-Diamants — PARIS (XIII^e).

(Tél. : Gob. 90-79.)

MÉSOTHINE RHEMDA

Comprimés radioactifs à base de Bromure de Mésothorium, associé à la médication dialytique du Professeur HAYEM (lithine-citrate de soude-hexaméthylène tétramine).

Action. — 1° La MÉSOTHINE augmente la solubilité de l'Acide urique et de la Cholestérine.

2° Elle en ralentit la production en les détruisant en partie au moment de leur formation par activation des ferments uricolytiques (travaux de Sarvonat et Rebattu sur l'émanation du Radium).

Diathèse arthritique.

Indications. — Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Hypertension, Maladies de la cinquantaine. Affections vésico-rénales et biliaires.

Posologie. — 1 à 4 comprimés, le matin à jeun, de préférence suivant l'indication du médecin.

Dans les cas de manifestations aiguës : 4 tubes de 20 comprimés. Cure préventive ou d'entretien : 1 tube tous les 3 mois.

Prix au public : tube de 20 comprimés : 15 francs.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERC.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. : Seine 255.068 B.

MÉSOTHORIUM RHEMDA

Solution isotonique de Bromure de Mésothorium en ampoules.

Primesol. — 1/5 de micro par centimètre cube. Boîtes de 6 ampoules de 1 cc. Traitement prolongé des états morbides peu graves : arthritisme, convalescence des maladies infectieuses, lymphatisme. Traitement d'une douzaine de jours : 1 à 3 cc. par jour.

Prix au public : 12 fr. 50.

Bimesol. — 1 micro par centimètre cube. Boîtes de 3 ampoules de 1 cc. Angine de poitrine, artériosclérose, hypertension, manifestations goutteuses, rhumatisme.

1 à 3 cc. par jour pendant une douzaine de jours.

Prix au public : 21 fr. 30.

Trimesol. — 2 micros par centimètre cube, 2 ampoules de 5 cc. par boîte. Utilisé pour effet rapide, infections de haute gravité. (Prompte amélioration de la formule sanguine.) Traitement palliatif et analgésique du cancer.

5 à 20 micros par jour pendant 8 jours.

Prix au public : 73 fr. 80.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERC.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000.

S. MOGAN, Pharmacien

51, Rue d'Alsace, COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068 B.

MÉTACARBINE

Formine (recristallisée dans l'alcool)...	3 gr.
Charbon hyper-activé.....	15 gr.
Sucre aromatisé.....	O. S. p. 100 gr.

Propriétés. — Anti-infectieux interne, absorbant et puissant adsorbant.

Indications. — Infections biliaires, urinaires ou gastro-intestinales d'origine épidémique, parasitaire avec ou sans fermentation (entérites, entéro-colites muco-membraneuses, colites spasmodiques, colibacillooses, etc...).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin et après les 2 principaux repas. A croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Nota. — Le pouvoir adsorbant de ce charbon a été considérablement augmenté par une préparation spéciale. Il ne ressemble en rien aux autres charbons dont la force attractive envers les toxines et les poisons ne peut être comparée à celle du charbon hyperactivé.

Prix : 14 fr. 50 la boîte de 135 gr.

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e). — Tél. : Gobelins 56-71.

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France

O. C. P., Paris, et tous Grossistes.

Afrique du Nord : **PELISSARD ALGER-CASABLANCA.**

MÉTACITRINE

Citrate trisodique	6 gr. 50
Phosphate de soude.....	7 gr. 50
Sulfate de soude.....	8 gr. 50
Lactose et sucre effervescent	100 gr.

Poudre granulée très effervescente.

Propriétés. — Favorise la digestion, active la sécrétion biliaire, fluidifie le sang, prévient la lithiase intestinale.

Son action (leïtonique) sur le muscle lui-même et (cholagogue) sur la sécrétion biliaire, détermine une réaction directe et indirecte sur les glandes annexes.

Indications. — Dyspepsies, gastropathies, crise hémoclasique, diathèse arthritique, stase veineuse.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun ou 1 cuillerée à café matin, midi et soir avant les repas. Dans un grand verre d'eau tiède.

Nota. — Si le Phosphate Acide de Soude dissout les calculs phospho-carbonatés, le Sel de Magnésie agit moins en dissolvant les concrétions oxalo-phosphatées qu'en empêchant leur formation.

Prix : 18 francs le flacon de 150 gr.

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoire du D^r E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e). — Gobelins 56-71.

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France.

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : **PELISSARD**
ALGER-CASABLANCA.

MÉTACUPROL

(A base de sulfate de cuivre.)

Propriétés. — Efficacité certaine dans toutes les Staphylococcies et Streptococcies. Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

Indications :

Gynécologie : Leucorrhées, Métrites, Démangeaisons, Hygiène intime.

Dermatologie : Furunculose, Anthrax, Impétigo, Eczémas, Brûlures, Affections suintantes, Boutons.

Formes :

Comprimés effervescents de 1 gr.

Ampoules de 5 cc. pour injections intra-veineuses au 1/200^e (utiliser des aiguilles fines).

Pommade en tube. Non grasse. Soluble dans l'eau.

Posologie :

Gynécologie : 1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau (hygiène).

1 à 2 comprimés pour 1 litre d'eau (cas aigus).
Position couchée.

Dermatologie : 1 comprimé par litre d'eau.

Pommade : Application matin et soir.

Ampoules :

Enfants : 1/2 ampoule de 5 cc. par jour.

Adultes : 1 ampoule de 5 cc. par jour, ou 2 ampoules de 5 cc. par jour (cas graves).

Tolérance parfaite. Aucune toxicité.

Prix : Ampoules, 25 francs. Pommade, 12 fr. 50.
Comprimés, 12 fr. 50.

Laboratoire du MÉTAGUPROL

5 bis, rue Pajou — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Jasmin 54-52.)

MÉTAFORMINE

(GRANULÉ SOLUBLE)

Composition :

Rein (extrait total).....	3 gr.
Formine (anhydro-citrate).....	2 gr.
Pipérazine (tartrate).....	2 gr.
Lithine (citrate).....	2 gr.
Lactose et sucre. Q. S. pour.....	100 gr.

Propriétés. — Stimulant diastasique rénal, diurétique atoxique. Diallytique, anti-urique.

Indications. — Arthritisme, uricémie, goutte, gravelle, rhumatisme, migraine.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un grand verre d'eau. Le matin à jeun ou avant les repas, et le soir au coucher.

Etats aigus : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Prix : Grande boîte étanche : 135 gr. : 17 fr. 50.

10 jours de traitement.

Conditions spéciales au corps médical.

Nota. — La première synergie des diastases rénales associées aux diurétiques chimiques.

Il existe aussi une forme *Métaformine comprimé*, renfermant uniquement 0 gr. 50 de formine purifiée par comprimé soluble dans l'eau. —

Toutes indications des antiseptiques diffusibles.

LABORATOIRES du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (Ve). — Gobelins 56-71.

Approvisionnement pharmaceutique et Dépôts France :

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PÉLISSARD

ALGER-CASABLANCA.

MÉTALLOPHÉDRINE

Traitement des états congestifs, inflammatoires et infectieux de la muqueuse rhino-pharyngée et des cavités annexes.

Composition. — Association stable d'argent, de cuivre, de zinc et de chlorhydrate d'éphédrine naturelle permettant, en même temps qu'une action constrictive prolongée, une destruction complète de tous les agents microbiens du Rhinopharynx (streptocoque, staphylocoque, pneumocoque, etc.), grâce au cuivre et au zinc existant non pas sous leur forme colloïdale, mais à l'état de sulfates.

Mode d'emploi. — *Gouttes :* 1 à 3 par narine de trois à six fois par jour en instillations.

Peut être utilisé également en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur nasal en verre sans pièces métalliques. Donner deux séries de 5 à 6 coups de poire par narine, à 2 minutes d'intervalle 3 à 6 fois par jour.

Indications — Toutes rhinites, céphalées d'origine nasale, sinusites, éthmoïdites, adénoïdites, et comme préventif de la paralysie infantile (zinc).

Le flacon avec compte-gouttes : 18 fr.

Laboratoire COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e). (Tél. : Trudaine 45-01.)

MÉTASULFAMIDE

**Chimiothérapie antibactérienne
polyvalente.**

Enregistré au Lab. Nat. Contr. des Méd.
sous le n° 1017-3.

Formule (par comprimé). — Sulfanilamide 0,15, Oxyquinoléine 0,03, acide 4-oxy-3-acétylaminophénylarsinique 0,02, Bile 0,05, Hexainositophosphate de Ca et de Mg.

ACTION ANTIBACTÉRIENNE POLYVALENTE DE LA MÉTASULFAMIDE

ULFANILAMIDE	OXYQUINOLÉINE	ACIDE 4-OXY-3-ACÉTYLAMINO PHÉNYLARSINIQUE	BILE
Streptocoques Staphylocoques Méningocoques Gonocoques Colibacilles	Gonocoques Colibacilles Protozoaires	Protozoaires Pneumocoques Spirochètes	Colibacilles Pneumocoques

Posologie. — 1 comprimé par 10 kilogrammes de poids et par jour.

Le flacon renferme 40 comprimés.

Pas de toxicité.

Échantillons sur demande.

Laboratoire

de Chimiothérapie Antibactérienne

16, route d'Abbeville — AMIENS (Somme).

MÉTATITANE

Pommade et Poudre introduisant le titane en thérapeutique.

Indications. — *Prurits, Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo, Brûlures, Coups de soleil, Engelures, Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.

Propriétés et Avantages. — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Tourneux, Juster, etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

Remarque. — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus rigoureusement purs par un procédé tout particulier.

Présentation : Grand tube. — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER
TOURS. (Tél. : 10-78 et 13-62.)

METATONE

Tonique général.

Forme. — Liquide.

Composition. — 100 grammes contiennent :

Extrait d'embryon de froment.	1 gr. 95
Acide nucléinique.....	0 gr. 385
Glycérophosphate de Calcium...	0 gr. 775
Glycérophosphate de Potassium.	0 gr. 775
Glycérophosphate de Sodium...	0 gr. 385
Glycérophosphate de Manganèse	0 gr. 095
Glycérophosphate de Strychnine	0 gr. 0076

Propriétés. — Stimule, reconstitue et renforce le tonus nerveux, excite l'appétit et augmente la résistance aux infections.

Indications. — Débilité générale, Convalescence des maladies graves, Neurasthénie, Anémie, pendant la grossesse et la lactation, etc.

Posologie. — Une ou deux cuillerées à café trois fois par jour, après les repas.

Comme tonique stomachique, administrer avant les repas.

Prix : 25 francs.

Produit enregistré au Laboratoire
de Contrôle des Médicaments.

Parke, Davis et Co, Londres.

Concessionnaires pour la France

SCOTT et Fils, Pharmaciens,

348, rue Saint-Honoré — PARIS.



MÉTAUX COLLOÏDAUX ET DÉRIVÉS CINNAMIQUES

Procédés ANDRÉ LANCIEN

*Académie des Sciences (1907-11-15-24-34)
Société Médicale des Hôpitaux de Paris (1911-1912)
Journées médicales de Bruxelles (Médaille d'or 1926)*

DÉSIGNATION DES PRODUITS	COMPOSITION ET DOSE	MALADIES TRAITÉES
BANIKOL A L (B. 5a 3 cc.)	Iodure de tétra-méthyl-ammonium 3 inj. par semaine	Algies-Rhumatisme Asthme-Hypertension Intoxic. nicotin.
BANIKOL A L (B. 40 comp.)	Iodure de tétra-méthyl-ammonium en association nucléo-argentique 6 à 10 comp. par jour	Algies -- Rhumatisme Asthme-Hypertension Intoxic. nicotin.
Bismuth A L (B. 4a 3 cc.)	Bismuth amiconique 3 inj. par sem. 10 inj. repos 10 jours	Syphilis
ÉTAIN A L (B. 4a 3 cc.)	Étain amiconique 3a par sem. 10 inj. repos 10 jours	Furonculose-Acné
ÉTAIN A L (B. 40 comp.)	Étain colloïdal 4 à 6 comprimés par jour jusqu'à guérison	Furonculose-Acné
GLANDACTINE A L (B. 40 comp.)	Total glandulaire activité U V et catalysé par Cu et Be. 6 à 8 comp. par jour	Déficiences organiques
Magnésium A L (B. 4a 3 cc.)	Magnésium amiconique	Néoplasme, Hépatites
Osmium A L (B. 4a 3 cc.)	Osmium amiconique Une inj. t. l. j. 10 inj. repos 20 jours	Sciaticques, Tabes, Sclérose en plaques
Or A L (B. 4a 3 cc.)	Or amiconique 3 inj. par sem. 15 inj. repos 10 jours	Angine de Ludwig Bacillose, Streptococcies
PLUROLAN AL (B. 4a 3 cc.)	Complexe colloïdal amiconique, Arsenic, Fer, Manganèse, Vanadium, 1 inj. tous jours 15 inj. Repos 30 jours	Anémies
RHODIUM A L (B. 4a 3 cc.)	Rhodium amiconique par 3 cc. ou 6 cc 2 fois par jour pendant l'infection	Typhoïdes, Grippe- Pneumonies, Pleurésies, Septicémie streptococciques
Sélénium A L (B. 4a 3 cc.)	Sélénium amiconique 1 inj. t. les jours 20 inj. repos 1 mois	Néoplasmes
Sélénium Vanadium A L (B. 4a 3 cc.)	Complexe amiconique Sélénium - Vanadium	Néoplasmes

DÉSIGNATION DES PRODUITS	COMPOSITION ET DOSE	MALADIES TRAITÉES
TUNOL A L (B. 40 comp.)	Etain colloïdal, Soufre colloïdal, Levure de Bière, Lait irradié 4 à 6 comp. p. j. jusqu'à guérison	Acné, Furonculose, Folliculite.
SOUFRE A L (B. 4a 3 cc.)	Soufre électrique amicronique 3a par sem. pend. 15 j. repos 10 jours	Rhumatismes et Insuffisance sulfurée
SOUFRE A L (B. 40 comp.)	Soufre colloïdal 4 à 5 comp. p. j. jusqu'à guérison	Rhumatismes et Insuffisance sulfurée
Soufre A L pommade	Onction quotidienne	Dermatose, Eczéma, Acné, Urticaire, Pityriasis
ZARYL (B. 14 cigarettes.)	Fibre médicamenteuse aux Huiles essentielles sans Eucalyptus ni toxiques 6 à 8 ctg par jour	Congestion des voies respiratoires et Asthme
ZIMBYL A L (B. 5a 3 cc.) (B. 20a 3 cc.)	Cin. Éthyl. Formine en sol. aq. 3a par semaine 10 inj. Repos 10 jours	Bacillose, Convalescences, Grippe Aff. gytn. et Urinaires
ZIMBYL A L (B. 40 comp.)	6 à 8 comp. par jour	Bacillose, Convalescences, Anémies
ZIMBYL-BISMUTH A L (B. 5a 3 cc.)	Cin. Ethyl. Formine-Bismuth 3a par semaine 10 inj. Repos 10 jours	Syphilis
ZIMBYL - CUIVRE A L (B. 5a 3 cc.)	Cin. Éthyl. Formine-Cuivre 3a par semaine 15 inj. repos 10 jours	Tuberculose cutanée Anémies graves, Lèpre
ZIMBYL-OR. A L (B. 4a 3 cc.)	Cin. thyl. Formine-Or 3a par semaine, 15 inj. Repos 10 jours	Bacillose, Convalescences, Anémies
Zimbyl-Sélénium A L (B. 5a 3 cc.)	Cin. Ethyl. Formine-Sélénium-la ts. 1. j. 20 inj. repos 1 mois	Néoplasmes et Bouton d'Orient

N. B. — Des prix exceptionnels de bon marché sont faits à tous les hôpitaux, cliniques, œuvres de bienfaisance, pour les ampoules livrées en vrac et par quantité importante.

Tous les produits en ampoules sont à 20 francs } la boîte (public).
 — — — en comprimés sont à 20 francs }

LABORATOIRE DES PROCÉDÉS ANDRÉ LANCIEU

PARIS/FRANCE

Georges WEBER, 8, Rue des Capucines, PARIS

Maison Fondée en 1835

PAS DE SUCCURSALE — TÉLÉPHONE : OPÉRA 32 15

MÉTAVACCIN

Vaccin-pommade aux antiviruses. Rigoureusement stérile.

Indications. — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abscesses, Panaris, Pyodermites, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites. Tous pansements après accouchement.

Avantages. — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

Emploi :

1. *Immunisation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze, et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunisation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles.

Présentation ; Grand tube — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER

TOURS (Tél. : 10-78 et 13-62.)

MÉTAVITALYSE

Forme. — Ampoules de 5 cc. et 10 cc, pour injections intraveineuses, intramusculaires ou voie buccale.

Composition. — Gluconate de calcium à 10 p. 100. Rigoureusement stable.

Indications. — Tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, Rachitisme, Grossesse, Allaitement, Fractures. Hémoptysies, Œdème, Ascite, Diarrhée des Tuberculeux.

Posologie. — Dose moyenne : une ampoule par jour ou tous les deux jours.

Prix :

Boîte de 10 ampoules de 5 cc	38 fr.
Boîte de 5 ampoules de 10 cc	28 —

Laboratoire G. GENESLAY

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris, Licencié ès-Sciences
Lauréat (Prix Desportes) de la Faculté de Pharmacie de Paris
Lauréat Médaille d'Or de la Société de Pharmacie de Paris.

Dépôt : 5 bis, rue Pajou, PARIS (XVI^e).
(Tél. : Jas. 54-52.)

MÉTRITOLS

Thérapeutique gynécologique

COMPRIMÉS GYNÉCOLOGIQUES EFFERVESCENTS « MÉTRITOLS »

Composition. — Acide picrique, oxyquinoléine, thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, alcalins, astringents, les MÉTRITOLS donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

Mode d'emploi. — Injections vaginales. Un comprimé dans 1 litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Position couchée, bock très bas.

Prix : 16 francs.

CRAYONS INTRA-UTÉRINS « MÉTRITOLS »

Composition. — Oxyquinoléine, Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorescéine, Argent colloïdal, Chlorothymol, Parachlorométacrésol, Chloroxylénol.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, Polyvalents, Cicatrisants, Décongestionnants.

Métrites chroniques endocervicales de toute origine.

Mode d'emploi. — Placer un crayon intra-utérin tous les 2 ou 3 jours.

Prix : 20 francs.

OVULES « MÉTRITOLS »

Composition. — Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorescéine — Parachlorométacrésol — Chloroxylénol — Sous-gallate de Bismuth, Oxyde de titane, Essences de cèdre et de Labiées.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, Calmants, Cicatrisants, Désodorisants.

Mode d'emploi. — Un ovule tous les 2 ou 3 jours.

Prix : 18 francs.

Laboratoires LEES

Docteur Pierre ROLLAND, Directeur.

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 22-01.)

MEXYL

Pâte dentifrice antispirillaire à l'arsénobenzol.

Propriétés. — Le Phénylaminarsan, arsénobenzol pentavalent, est un agent antispirillaire puissant: il présente l'avantage d'une grande stabilité et d'une très forte diffusibilité, propriétés qui en font l'agent thérapeutique de choix des spirochétoses buccales.

Indications. — Pyorrhée alvéolaire, gingivites, stomatites, noma, gangrène buccale, hygiène buccale préventive.

Mode d'emploi. — Brosser gencives et dents, faces externe et interne. Si les gencives ne supportent pas la brosse, masser avec doigt enduit de pâte.

Prix: le tube, 7 fr. 50.

L. N. C. M. n° 574-1.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 08-29 et 58-55.)

MICELLIODE

Iode colloïdal micellaire électro-positif.
Préparé à partir de foies frais.

Composition :

Iode métalloïdique libre 0 gr. 15

Glycogène extrait du foie frais .. 2 gr. 50

Pour 100 gr. de pseudo-solution aqueuse.

Soit 0 gr. 0015 (1 mgr. 1/2) d'iode libre par gr. ou cc.

Avantages. — Résultats cliniques surprenants à doses infinitésimales d'iode libre grâce à la forme colloïdale.

Jamais d'iodisme

Indications thérapeutiques. — Toutes les indications de l'Iode. Préparation de choix pour l'administration de l'iode aux Basedowiens.

Présentation :

1° *Gouttes* pour la voie buccale (flacon avec compte-gouttes).

2° *Ampoules* injectables (boîte de 10 ampoules de 2 cc.).

Posologie :

Gouttes : Doses par 24 heures à fractionner en 2 fois dans la journée.

Adultes : LX à C gouttes.

Adolescents : L à LXXX gouttes.

Enfants : XXX à L gouttes.

Nourrissons : XV à XX gouttes.

Ampoules :

Adultes : une ampoule de 2 cc.

Adolescents : 1 cc. 1/2.

Enfants : 1 cc.

Nourrissons : 1/2 cc.

Tous les 2 jours jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives représentant une série à renouveler selon besoin.

Prix :

Gouttes : Le flacon 19 fr. 20

Ampoules de 2 cc. : La boîte de 10 19 fr. 20

Échantillons sur demande :

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

MICRANYL GRÉMY

Formule :

Peptones spéciales.....	0,15
Extrait de corps thyroïde	0,005
Extrait hépatique.....	0,15

Pour 1 comprimé.

Indications. — Migraines : arthritique, thyroïdienne, menstruelle, de la ménopause, hépatique, de la constipation.

Contre-indications. — Céphalées : des méningites, des tumeurs cérébrales, des syphilitiques.

Mode d'emploi. — Une demi-heure ou une heure avant les repas, trois comprimés de **Micranyl Grémy**.

Surveiller la constipation ; faire prendre une alimentation légère, finement coupée : purées, légumes verts. Éviter tabac, alcool et tous excitants. Les sources thermales, agissant sur le foie, l'estomac ou l'intestin, sont indiquées, ainsi que l'exercice au grand air.

Prix : 20 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

MICRODERME-CRÈME

CRÈME D'ALIBOUR CICATRISANTE

Non irritant. Microbicide par le Zn et Cu ionisés. Isotonique par : $MgCl_2$. Cicatrisant par les vitamines A et D.

Formule. — SO_4Cu , 0,20 ; SO_4Zn , 0,20 ; Sérum magnésien, 40 ; ZnO , 8g ; Huile de Flétan, 2 ; Excipient enlevable à l'eau, Q. S. p. 100.

Indications. — Toutes *Pyococcies cutanées* et plaies atones. Impétigo (après lavage avec le *Microderme-Solution* dilué au 1/20), Orgelets, Anthrax, Dartres volantes, Eczéma et Dysidrose infectés, Ulcère de la jambe, Brûlures, Dermites fessières des nourrissons, Prurit, etc.

Aucune contre-indication, peut être associé à une médication iodée. Est supporté par tous épidermes et muqueuses même irrités par une médication préalable.

Le tube de 60 gr. 14 fr.

MICRODERME-SOLUTION

Le flacon de 200 cc. à diluer au 1/20... 14 fr.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

(Tél. Laborde 08-51.)

MICROGEL

Composition. — Gelée translucide, soluble dans l'eau, de Séro-Vaccin de Leclainché et Vallée dans du sérum normal de cheval.

Propriétés — Vaccinothérapie antipyogène des infections cutanées.

Indications. — Plaies infectées, Pyodermites, Brûlures, Furoncles, Impetigo, Acné, Intertrigo.

Forme. — Tube de 30 gr. environ.

Mode d'emploi. — Après avoir lavé la plaie à l'eau bouillie, appliquer une couche de Microgél qui, en séchant, forme un vernis souple protecteur.

Prix : 18 fr. 75.

Remboursement aux Assurés Sociaux :
Catégorie B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél.: Littré 68-22, 23 et 24.)

MICROLYSE

Thérapeutique de l'Infection par Imprégnation.

Traitement des affections à

Staphylocoques, Streptocoques et surtout action
élective sur le Colibacille et le Gonocoque.

Travaux du professeur Louis GAUCHER.

Communication à l'Académie de médecine
du 24 janvier 1933.

Action et Composition :

Combat l'infection généralisée et les phénomènes consécutifs sur l'arbre urinaire par la coordination de deux éléments bactéricides.

SEL A. Chlorhydrate de méthyl-oxyquinoléine.
Imprègne l'organisme et lui rend ses moyens de défense.

SEL B. Chlorhydrate d'Ortho-oxyquinoléine. Se porte sur l'arbre urinaire qu'il calme et assainit.

Indications.

La plupart des états infectieux. Septicémies, Furunculose (action rapide).

Colibacilloles : Infections des voies intestinales et biliaires, Entérocrites, Cholécystites, Lithiases.

Infections urinaires. En général : Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites.

Parasites intestinaux : Vers, Amibes et autres protozoaires, souvent générateurs de colibacillose.

Gonococcies : Urétrites, Métrites, Salpingites.

Cinq formes :

Comprimés : 3 par jour, un pendant ou après chaque repas. Avaler sans croquer. Prix : 21 fr. 30.

Suppositoires pour enfants. Prix : 20 fr. 50.

Tablettes pour lavages vésicaux et vaginaux. Prix : 22 francs.

Ovules pour gynécologie. Prix : 20 francs.

Laboratoires de Physiologie et de Thérapeutique.

10, rue de Strasbourg — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 46-14.)

MICROVAX DU D^r ROUSSEL

Les Microvax du D^r Roussel comprennent 4 variétés

1. VACCINS INJECTABLES.

En boîte de 6 ampoules de 2 cc.

Microvax n° 1 : Antistaphylococcique.

Microvax n° 2 : Antipyogène.

Microvax n° 3 : Infections génito-urinaires.

Microvax n° 4 : Antigrippal, Antipneumococcique.

Microvax n° 5 : Infections oto-rhino-laryngo.

Mode d'emploi. — Une série de 12 injections espacées de 2 ou 3 jours. Commencer par 1/2 cc. et augmenter régulièrement de 1/2 cc. chez l'adulte jusqu'à 2 cc. ; 1/4 cc. chez l'enfant jusqu'à 2 cc. Repos de 15 jours entre deux séries.

Remboursement aux Assurés Sociaux : Catégorie A.



2. BOUILLONS-VACCINS.

En boîte de 5 ampoules de 10 cc.

Microvax n° 10 : Antistaphylococcique.

Microvax n° 11 : Antipyogène.

Microvax n° 12 : Infections oto-rhino-laryngo.

Mode d'emploi. — Applications locales en pansements, badigeonnages, instillations.

Remboursement aux Assurés Sociaux : Catégorie B.

3. VACCINS INGÉRABLES.

Microvax n° 20 : Antistaphylococcique.

Microvax n° 21 : Anticolibacillaire.

Microvax n° 22 : Antipyogène.

Mode d'emploi. — Chez l'adulte : 2 ampoules par jour loin des repas.

Chez l'enfant : 1 ampoule par jour le matin à jeun.

Une série de 10 ampoules. Repos de 5 jours entre 2 séries.

Remboursement aux Assurés Sociaux : Catégorie B.

4. BACTÉRIOPHAGES INGÉRABLES.

En boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Microvax n° 30 : Anticolibacillaire.

Microvax n° 31 : Antipyogène.

Microvax n° 32 : Antistaphylococcique.

Mode d'emploi. — Une ampoule à jeun dans 1/2 verre d'eau pendant 10 jours. Ils peuvent être utilisés également par voie hypodermique et en applications locales sur les plaies et dans les foyers infectieux.

Remboursement aux Assurés Sociaux : Catégorie B.

Pour la prescription médicale, il suffit d'indiquer

Microvax ou vaccins du D^r Roussel, en précisant la spécificité microbienne et la forme désirée.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL,

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Lit. 68-22, 23, 24.)

MICTASOL

Décongestif pelvien.

Composition.

Comprimés. — *Noix de Malva purpurea* 0,25, Bromure de Camphre 0,02, Hexaméthylène tétramine 0,05.

Suppositoires : *Malva purpurea* 0,50, Stovaine 0,01, Ext. de Jusquiame 0,05, Ichtyol 0,25.

Ovules : *Malva purpurea* 1,50, Ichtyol 0,50, Ext. de Jusquiame 0,05, Glycérine solidifiée Q. S.

Propriétés thérapeutiques.

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indications thérapeutiques.

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence. Cystites. Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites. Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes.

Mode d'emploi.

Comprimés : 6 à 9 comprimés par jour, à prendre aux repas, avec un peu d'eau.

Suppositoires : 1 ou 2 par jour.

Ovules : 1 le soir au coucher.

Laboratoires du MICTASOL

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

MICTASOL BLEU

Décongestif pelvien.

Composition :

<i>Malva purpurea</i>	0 gr. 25
Bleu de Méthylène....	0 gr. 02
Bromure de Camphre..	0 gr. 02
(Pour 1 comprimé.)	

Indications. — Toutes les indications du *Mictasol* et en particulier les infections, congestions et inflammations du petit bassin s'accompagnant de douleurs.

Forme. — Comprimés.

Posologie. — Même posologie que le *Mictasol*, soit 6 à 9 comprimés par jour.

Laboratoires du MICTASOL

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

MICTASOVULES

Décongestif pelvien.

Composition :

<i>Malva purpurea</i>	1 gr. 50
Ichtyol	0 gr. 50
Extrait de Jusquiame..	0 gr. 05
(Pour 1 ovule.)	

Indications. — Les *Mictasovules* complètent très utilement la cure buccale par le *Mictasol* ou le *Mictasol Bleu* dans les Métrites, Salpingites, Vaginites, Congestions utéro-ovariennes, etc.

Posologie. — 1 ovule le soir au coucher.

Laboratoires du MICTASOL

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

MICTAZINE

Anti-infectieux et décongestif pelvien.

Composition par comprimé :

Para-amino-phényl-sulfamide	0 gr. 30
Malva purpurea	0 gr. 15
Bromure de camphre	0 gr. 025

Propriétés thérapeutiques. — *Anti-infectieux* par la para-amino-phényl-sulfamide, spécifique contre le streptocoque, le gonocoque, le colibacille, le staphylocoque souvent associés dans les affections génito-urinaires.

Décongestif pelvien par la Malva purpurea.

Anti-spasmodique et sédatif génital par le bromure de camphre.

Action rapide, durable, sans toxicité.

Indications thérapeutiques. — Infections urinaires aiguës, Urétrites, Cystites, Prostatites, Pyélites, Pyélonéphrites, Métrites, Salpingites, Prophylaxie du post-partum, Fièvre puerpérale, Prophylaxie des accidents infectieux post-opératoires en chirurgie abdominale et urinaire, Infections gonococciques, streptococciques, colibacillaires, etc.

Posologie. — *Infections urinaires à gonocoques* : Commencer le traitement par 12 comprimés par 24 heures pendant la première semaine (doses fractionnées de 1 ou 2 comprimés d'heure en heure), puis dégressivement 10 et 8 comprimés jusqu'à guérison intégrale. Sous surveillance médicale.

Infections urinaires à streptocoques, colibacilles, staphylocoques :

Traitement curatif des infections déclarées : Pyélonéphrites, Cystites, Infections du petit bassin, Salpingites, Métrites, Prostatites, Infections puerpérales : 12 comprimés par 24 heures (par 2 comprimés d'heure en heure). Sous surveillance médicale.

Baisser progressivement avec la chute de la température, l'éclaircissement des urines, la sédation des phénomènes douloureux.

Laboratoire du MICTASOL

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

MICTOPHILE RICHER

Antiseptique. — Diurétique. — Analgésique.

Comprimés glutinisés au bleu de Méthylène.

Composition :

Bleu de méthylène	0,02
Lactose	0,29
Extrait de belladone	0,003
— de mauve	0,05

Pour 1 comprimé glutinisé.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical. Cystites aiguës ou chroniques, Pyélites, Pyélonéphrites, Blennorrhagies, Prostatites, Colibacillurie.

Mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour (de préférence avant les repas). Avaler sans croquer avec un peu d'eau.

Le flacon de 40 comprimés. Prix : 16 francs.

Laboratoire RICHER

Docteur en Pharmacie,

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien,
PARIS. (Tél. : Provence 34-87.)

MICTOSEDÁ

Comprimés.

Sédatif-décongestif génito-urinaire.

Deux formes : Bleu et Simple.

Petits comprimés lenticulaires.

Composition. — Mictoséda *bleu* : Bromure de Camphre 0,02, Benzoate de Lithine 0,10, Hexaméthylène Trétramine 0,05, Bleu de Méthylène, 0,02, Extrait de Buchu 0,01, Extrait de Jusquiame 0,01, Bimalva qualité supérieure 0,30. Mictoséda *simple* : même formule, sauf remplacement du Bleu de Méthylène par extrait d'Hamamélis 0,05.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical. Prostatisme, Urétrites, Cystites, Néphrites, Bactiuries, Dysménorrhées, Métrites, Vaginites, Salpingites. Rétention, Troubles nerveux urinaires, Congestion du petit bassin chez l'homme et la femme.

Mode d'emploi. — 6 à 8 comprimés par 24 heures, aux repas, avec une gorgée d'eau.

Prix : 17 fr. 20 l'étui de 50 comprimés.

(6 à 9 jours.)

Laboratoires FAURE et LAGENTE

MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59.)

MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide.)

Composition. — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

Indications. — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorrhagie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ;
Enfants : par demi-cuillerée à café.

Prix : 17 fr. 20.

Laboratoires B. C. L.

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique,
71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

MICTUALINE

Antiseptique, Sédatif, Décongestif.

1^o PILULES

Collargol à 80 p. 100 argent pur	0,02
Urotropine recristallisée	0,10
Bleu de méthylène pur	0,01
Bromure de camphre.....	0,02
Extraits d'Uva ursi et seneçon.....	Q. S. p. 1 pilule

Indications :

1^o *Maladies des voies urinaires* (métrites, cystites, pyélonéphrites, prostatites, hypertrophie de la prostate, etc.).

2^o *Maladies des voies génitales* des deux sexes.

3^o *Maladies intestinales* dans leurs rapports avec le tractus génito-urinaire (syndrome entéro-rénal, colibacillose, etc...).

Posologie. — 6 à 9 pilules par jour.

Prix : 19 fr. 20

2^o SUPPOSITOIRES

Extrait Belladone	0,01
— Jusquiame	0,05
— Hamamélis	0,10
Bromure de camphre.....	0,10
Analgsine	0,40

Toutes algies : 1 à 2 par jour. — Prix : 16 francs.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Émile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

MINERVOL

Pommade en tube. Poudre.

Composition. — Acide benzoïque du toluol, 0 gr. 20 ; acide borique, 3 gr. ; Silicate de magnésie, 10 gr. ; Baume du Pérou, 1 gr. 50 ; Stéarate de zinc, 10 gr. ; acide orthoxybenzoïque, 0 gr. 30 ; Métadioxyphe-nol, 0 gr. 70 ; Lanoline et essence de verveine Q. S. pour 100 grammes.

Indications. — Erythème fessier, rougeurs, déman-geaisons, crevasses du sein et des mains, engelures, gerçures, brûlures, coups de soleil, prurits, impétigo, intertrigo, et toutes dermatoses.

Propriétés. — Donne d'excellents résultats pour les cas indiqués, ne renferme aucun produit toxique, ne tache pas et s'enlève facilement.

(Publicité exclusivement médicale.)

Présentation :

Tube moyen : 7 fr. 20. Grand tube : 11 fr. 25.

Poudre : 7 fr. 20.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médi-caments sous le n° 888-2 et 888-13.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX°).

MINUREX

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Pour 1 comprimé :

Extrait de Cécropia	} aa	0,015
Extrait de Cynara feuilles fraîches.....		
Extrait de Teskra		
Diméthylxanthine.....		0,125
Phosphate de Soude Anhydre		0,10

Propriétés. — Diurétique direct, il diminue l'azotémie, régularise et stimule la systole ventriculaire.

Indications. — Syndrome cardio-rénal, azotémie légère chez certains porteurs d'ulcères jambiers, déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux, Dyspnée d'effort.

Mode d'emploi. — Prendre 3 fois 2 comprimés par jour. Demander les brochures des Docteurs P. et R. Bourg-graff : *Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.*

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle.)

MIROXYL LAHAYE

Sirop.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la Toux. Expectorant d'action antiphlogistique certaine. Puissant modificateur de toutes les pneumopathies.

Propriétés actives. — A base de Cinnaméine du Baume du Pérou (*Miroxylon Peretrea*) associée au Sulfogaïacolate de potasse et au Camphosulfonate de Soude.

Une cuillerée à bouche contient :

Extrait hydroalcoolique spécial de Baume du Pérou.	0,075
Sulfogaïacolate de potasse	0,45
Camphosulfonate de soude	0,023
Iodhydrate de codéine.....	0,015
Sirop de Thym	3 gr. 65

Préparation agréable au goût. Pas de constipation grâce à l'adjonction d'un extrait de Rhamnus sans amertume.

Posologie. — *Affections aiguës* : 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, éloignées des repas.

Affections chroniques : 1 cuillerée à soupe matin et soir.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections des voies respiratoires et en particulier la grippe, pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite fétide, toux des tuberculeux.

Prix : 17 fr. 65 (taxe comprise).

Laboratoires de CINNAMATHÉRAPIE

C. ROUX, Docteur en Pharmacie

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine). (Tél. : Alésia 12-55.)

MISTOL

Composition. — Solution huileuse d'essences aromatiques, Camphre, Eucalyptol, Menthol, Chlorobutanol.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites, et, en général, tous états inflammatoires des voies respiratoires supérieures.

Présentation. — En flacons compte-gouttes, pour instillations nasales.

Prix : Flacon P. M. : 8 francs ;
G. M. : 15 francs.

Dépôt général :

Laboratoires NOVA

61, avenue de Saxe — PARIS (VII^e).

MITOSYL

PANSEMENT BIOLOGIQUE

Pâte aux vitamines A et D,
Huile de foie de morue et de flétan.

**Cicatrisation rapide des plaies simples ou infectées
des brûlures de tous degrés et des ulcères.**

Propriétés :

Mitosyl active les mitoses cellulaires.

Mitosyl constitue le pansement biologique idéal, antalgique, cytophylactique, anti-infectieux.

Grâce à la vitamine A, il est un anti-infectieux de premier ordre, régénérateur des tissus cutanéo-muqueux et osseux.

Grâce à la vitamine D, il réduit l'inflammation, diminue la douleur et permet la suppression des drains et mèches.

Grâce à l'huile de foie de morue, Mitosyl possède un pouvoir de pénétration très grand, et rend indolore le changement des pansements.

Indications :

En chirurgie : plaies avec ou sans délabrement tissulaire, abcès incisés, anthrax, panaris, brûlures du premier au troisième degré, ulcérations des moignons d'amputations, cavités osseuses d'ostéomyélites.

En médecine : ulcérations cutanées atones, engelures, ulcères variqueux, suppurations cutanées, staphylococcies épidermiques, escarres de décubitus.

En pédiatrie : eczéma du nourrisson, érythrodermies.

En dermatologie : eczémas aigus, dermatoses prurigineuses et croûteuses.

En gynécologie : métrites, ulcérations du col, vaginites.

En proctologie : fissures et ulcérations anales et péri-anales.

En oto-rhino-laryngologie : cavités de mastoïdectomie, rhinites atrophiques, ozène.

En stomatologie : stomatites, pyorrhées alvéolaires.

Mode d'emploi :

Désinfecter, réséquer, traumatiser le moins possible. Appliquer *larga manu* le *Mitosyl* — faire pénétrer dans les anfractuosités et les fistules — couvrir de compresses stériles simples.

Eviter le plus possible drains et mèches.

Ne jamais associer d'antiseptiques chimiques aux pansements faits avec *Mitosyl*.

Remboursé par les Assurances Sociales à 80 p. 100.

UNION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

5 et 7, rue Claude-Decaen, PARIS (XII^e). (Did. 37-93.)

MIXIOD

Médication spécifique de l'Amibiase.

Acide 7 iodo-8 oxyquinoléine-5 sulfonique additionné de bicarbonate de Sodium qui facilite la dissolution de cet acide dans l'eau.

Présentations :

Mixiod poudre pour préparations extemporanées (Cachets-Solutions pour lavements).

Flacons de 15 g. Prix : 35 fr. ; de 30 g. Prix : 64 fr.

Mixiod pilules, dosées à 0 g. 25.

Flacons de 20 pilules. Prix : 17 fr. 50.

Indications. — Amibiase aiguë et amibiase subaiguë.

— Destruction des Amibes et des kystes amibiens.

Mode d'emploi et posologie. — Traitements par voie buccale, par voie rectale (en lavements) et traitements mixtes.

Voie buccale : 1 g. 50 à 3 g. *pro die* pendant une semaine.

Voie rectale : Lavements à doses croissantes de 0 g. 25 à 1 g.

Société parisienne d'Expansion chimique

SPECIA

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

MOLAGAR

Emulsion parfaitement stable d'huile de paraffine et d'agar-agar (sans aucun médicament laxatif).

Le Molagar est une émulsion homogène, très fluide et très agréable au goût, contenant 50 p. 100 d'huile de paraffine *spécialement traitée* et de haute viscosité.

Propriétés : Le Molagar stimule doucement le fonctionnement de l'intestin en lubrifiant les parois et en humidifiant le contenu. Ne contient aucune substance aromatique ou laxative surajoutée. Ne provoque jamais ni nausées ni coliques ; n'occasionne pas de suintement huileux par l'anus, comme c'est le cas pour l'huile de paraffine ordinaire ; aucune accoutumance.

Indications. — Convient surtout aux constipés dont l'intestin est délicat. Recommandé en cas de constipation spasmodique, en cas de colites, surtout chez les coloniaux à foie déficient. Le Molagar est particulièrement utile chez les femmes enceintes, les opérés, les hémorroïdaires, les diabétiques et les enfants, car il agit doucement.

Mode d'emploi. — *Doses pour adultes :* une à deux cuillerées à soupe de Molagar le soir en se couchant ; à répéter dans la matinée si nécessaire, une ou deux heures après le repas. *Doses pour enfants :* de 2 à 4 cuillerées à café prises telles quelles ou mélangées avec du lait, de l'eau ou des aliments.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-7.

Littérature et Échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUEROUlt, Docteur en pharmacie :

13, rue Pagès. — SURESNES

(Tél. Longchamp 16-85-16-86.)

MOLÈNE

Indications. — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse) ; adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative ; tuberculose pleurale ; tubercules cutanées diverses.

Contre-indication. — Néphrite avec albuminurie abondante.

Mode d'emploi. — Voie intraveineuse ou voie intramusculaire. La dose moyenne est d'une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours ; chez les grands fébricitants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours ; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

Présentation. — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhydride Molybdique pur).

Prix de vente au public ; 30 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin. — PARIS.

MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Éthyle : solution huileuse à 25 p. 100
(Ampoules de 2 cc.)

Traitement de la tuberculose pulmonaire.

Indications. — Le Moréthyl est actif contre toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique, en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et produit, dans certains cas, la rétrocession des lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées. — Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

Posologie. — Une injection chaque jour, pendant 20 jours consécutifs, par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arseniée (entièrement assimilable).

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos. — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique, d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique ; méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoiétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

Indicat. — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

Posologie. — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour ; de 5 à 10 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments. sous le n° 586-10.

Prix : 18 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e). (Tél. : Roquette 14-12.)

MORRHUÉTINE JUNGKEN et MORRHUÉTINE JUNGKEN VITAMINÉE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (NaO, Cao, Manganèse), en tout 15 cgr. par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

La **Morrhuéline Jungken Vitaminée** est le même produit avec, en plus, toutes les Vitamines d'huile de foie de morue.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences, des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi — *Enfant* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau ou au début des principaux repas.

BRACQUEMOND et Cie

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 05-54.)

MORRHUOL CHAPOTEAUT

Composition. — Extrait concentré d'Huile de Foie de Morue, enrichi en Vitamines A, de croissance (11 000 U. I. par gr.) et en Vitamines D, antirachitiques (1 500 U. I. par gr.), par de l'huile de Flétan sélectionnée.

Pour compléter l'action propre du Morrrhuol, 1 centigr. d'Hypophosphite de Chaux est incorporé à l'enveloppe gélatineuse de chaque capsule.

Indications. — Avitaminose, rachitisme, lymphatisme athrepsie, troubles de croissance, rhumes, bronchites chroniques, pré tuberculose.

Présentation. — Capsules minces de gélatine très pure dosées à 0 gr. 10, se dissociant dans l'estomac.

Posologie :

Adultes : 4 à 8 capsules par jour au début des repas.

Enfants : 2 à 4 capsules par jour au début des repas.

Prix : 17 fr. 05 le tube de 80 capsules.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et C^{ie}

Laboratoire de Pharmacologie Générale

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gutenberg 27-0 3.)

MORRHUXINE

Composition. — Iode organique. — Brome. — Extrait opothérapique de foie de morue. — Glycérophosphates alcalins et arrhénal à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glyceriné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

Propriété. — Apéritif tonique, reconstituant anti-lymphatique.

Indications. — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

Doses. — *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 14 fr. 50.

E. VERGELOT, Pharmacien,

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Nord 48-22.)

Enregistré au Laboratoire national des médicaments sous le n° 997-25.

MORUAN**Granulé.****Composition :**

Extrait lipoïdique de foie de morue frais,
Extrait lipoïdique de foie de porc. Phosphate tricalcique, Iode, Tannin, Extrait liposoluble de *Laminoria flexicaulis*.

Indications :

Lymphatisme, Infections microbiennes, engorgements ganglionnaires, Dépuratif.

Posologie :

Une cuillerée à café du granulé sur la langue, puis avaler un peu d'eau, 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS.

MORUCALCOSE**(Granulé)**

Forme. — Granulé reconstituant, de goût très agréable.
(Huile de foie de morue d'hiver et d'été sans odeur.)

Composition. — Extraits lipoïdiques de foie de veau et de foie de morue, thyrotoxine, surrénine, phosphate tricalcique et combinaison iodotannique.

Indications. — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue dans toutes ses indications : Anémie, Croissance, Scrofule, Lymphatisme, Rachitisme, Bacillose, etc...

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments
sous le n° 484.

MORUPINE

Médicament de choix.

Pour les croissances difficiles. Facteur puissant du développement de l'organisme carencé.

Composition. — Extrait de Foie de Morue obtenu par procédé spécial, très riche en vitamines, chaux, iode en combinaison tannique et antiscorbutique.

Pas de colorant artificiel, Jus de Cassis, Jus de Framboises (Fruits sélectionnés, Acide ascorbique).

Indications. — Troubles de la Nutrition, Lymphatisme, Pré-tuberculose, Anémie et Faiblesse générale, Bronchite chronique, Troubles du Métabolisme, Furunculose et éruption cutanée.

Présentation. — Forme sirop, flacon 300 cc.

Prix : 18 fr. 70.

Posologie :

Adultes : 3 cuillerées à soupe avant ou après les repas.

Enfants de 2 à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessous de 2 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1111-7.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

MOTHERSILL'S SEASICK REMEDY

Médication contre le mal de mer, des airs, du chemin de fer et de l'automobile. Préviend et arrête tous les maux de voyages.

Composition	Poudrés	Rose	Brune
	Sucre de lait.....	33,0 %	0,0 %
	Cannelle	0,0 —	29,4 —
	Caféine	8,2 —	8,4 —
	Acidestéarique	18,0 —	17,4 —
	Trichlorbutyl-alcool tert	40,1 —	44,5 —

Posologie et mode d'emploi. — a. *Préventif* : prendre une capsule rose et une brune environ une heure avant de prendre le bateau, le train, l'auto ou l'avion. Ces doses doivent être prises 1 heure avant de manger ou 2 heures après. Les doses ultérieures seront prises à intervalles de 6 heures tant que la nausée continue.

Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne jamais prendre ce remède durant l'heure qui précède le repas ou durant les 2 heures qui suivent celui-ci.

b. Pour arrêter les vomissements, répéter la dose dès que le premier vomissement violent est terminé. Au cas où les vomissements sont continus, vider les capsules et en avaler le contenu comme une poudre en prenant quelques gorgées d'eau.

Présentation et prix : Boîte petit modèle, 3 doses : 18 francs.

Boîte grand modèle, 8 doses : 36 francs.

Laboratoire MOTHERSILL REMEDY COMPANY

A. GLANDIÈRES, Pharmacien, 5, rue de Provence — PARIS (IX^e).

(Tél. Provence 53-67.)

MUCICARBOS

Composition. — **Charbon animal chimiquement pur activé** (Carbos), associé à un *mucilage pur* pour éviter la constipation.

Forme. — Granulé rond : **Mucicarbos simple** ; **Mucicarbos benzo-naphtolé**.

Indications. — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocolites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 16 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Autorisé pour A. S.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
(Tél. : 30.)

MUCIGRAINS

Grains de Mucilage.

Composition :

Mucilage pur..... 98 %

Extraits de Rhamnus..... 2 %

Action purement mécanique, par gonflement et augmentation du bol alimentaire. Protège et lubrifie la muqueuse intestinale. Action douce et progressive sans accoutumance.

Indications. — *Constipation*, Atonie intestinale.

Posologie et mode d'emploi. — De 1 à 2 cuillerées à café au début ou à la fin des repas. Mettre à sec sur la langue et, sans mâcher, avaler avec un peu de liquide.

Prix : La boîte de 250 gr. : 22 francs.

Laboratoires Henri FRILLEY
94, bd Lefebvre — PARIS (XV^e).

MUCILAGE GOY

Composition :

Poudre de cæcum.....	2 grammes.
Polypode de chêne stabilisé.	3 —
Mucilage pur.....	60 —
Pour 100 grammes.	

Propriétés. — Régulateur de l'intestin.

Indication. — Constipation sous toutes ses formes.

Présentation. — *Granulé.* La boîte de 125 grammes pour 12 à 13 jours de traitement.

Posologie et mode d'emploi :

1 ou 2 cuillerées à café à la fin du repas, midi et soir. Placer le granulé dans la bouche, sans le mouiller, et avaler avec une gorgée d'eau.

Enfants : 1/2 dose.

Prix : 13 fr. 50.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Archives 34-68.)

MUCILAXINE

Composition. — Huile de Paraffine de haute viscosité et neutre, associée par procédé spécial à un mucilage pur sans cellulose sans aucune addition d'eau ni de produit laxatif. Action purement mécanique. *Suppression du suintement.*

Forme. — Crème facile et agréable à prendre.

Indications. — Rééducation et pansement de l'intestin. — Constipation, Colite, Entérocélite muco-membraneuse. Constipation des opérés, des accouchées, des enfants, des nourrissons, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à soupe, à dessert ou à café par jour (suivant l'âge) au début des repas.

Prix : 15 francs.

Le double flacon : 27 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Autorisé pour A. S.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
(Tél. : 30.)

MUCINUM

(Comprimés de)

Composition :

Entérokinase	0 gr. 005
Érepsine	0 gr. 005
Pancréase	0 gr. 005
Bile	0 gr. 010
Atropa Belladonna	0 gr. 005
Cassia acutifolia	0 gr. 075
Phénolphtaléine	0 gr. 075

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux, n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés, très friables, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 36 comprimés.

Laboratoire CHANTEREAU
(Produits Innothéra)

26 bis, rue Dombasle — PARIS.

MUCOBISMUTHINE

Pansement du tube digestif (Carbonate de bismuth pur en suspension dans un mucilage végétal à l'exclusion de tout autre produit de remplacement).

Une cuillerée à soupe contient 2 gr. 50 de carbonate de bismuth.

Indications. — Syndromes douloureux, gastriques et duodénaux. Ulcérations, Colites, Entérites aiguës saisonnières, Fermentations intestinales, Oxyurase.

Doses et modes d'emploi. — Suivant les cas, 2, 3 ou 4 cuillerées à bouche : la présence d'un mucilage permettant de diminuer les doses habituellement données de carbonate de bismuth.

Prix au public : le flacon : 23 fr. 50

Le 1/2 flacon : 13 fr. 85

Docteur J. GALIMARD O. * * *

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES.

MUCOFOIE

Composition. — Complexe d'extrait hépatique et de muqueuse pylorique.

Indications. — Anémies pernicieuses quelle que soit leur origine : anémies Biermeriennes, anémies au cours des leucémies, au cours des ictères hémolytiques, au cours des néphrites.

Forme. — Comprimés renfermant chacun : 0 gr. 140 d'extrait sec de foie, 0 gr. 070 de poudre de muqueuse pylorique.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 8 comprimés par jour. *Enfants* : 4 à 6 comprimés selon l'âge.

Prix de la boîte : 47 francs.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS.

MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigations.

Prix : 10 fr. 40.

Traitement unité : 10 à 12 jours

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-1.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).
(Tél. : Suffren 12-63.)

MUCYLLIUM

Traitement rationnel et moderne de la constipation par le plus parfait des Mucilages.

Semences sélectionnées, cultivées spécialement et purifiées scientifiquement de **Psyllium noir**. Désinfectées rationnellement sans détruire ni Vitamines ni Hormones indispensables. Elimination sûre de tous corps étrangers métalliques et organiques.

Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucune toxicité. Pas d'action irritante. Aucune contre-indication.

Indications du Mucyllium. — Le Mucyllium doit être employé dans toutes les constipations, qu'elles soient d'origine atonique ou spasmodique, par stase ou par dolichocôlon, et ce, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

On peut le prescrire par conséquent dans tous les états pathologiques où la constipation est en cause, tels que troubles toxiques, état saburral des voies digestives, gastrites, colites segmentaires ou totales, fermentations intestinales, états dysentériques, colites ulcéreuses et hémorragiques, hémorroïdes, fissures anales, appendicite chronique, cholécystites, troubles cutanés, acné, furonculose, manifestations anaphylactiques, eczéma, urticaires, migraine, bouffées de chaleur. Syndrome entéro-rénal, coli-bacillurie.

Doses. — *Enfants* : suivant l'âge, 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe ou plus, au moment des repas, dans un peu d'eau, laisser se former le mucilage pendant quelques minutes.

Prix : boîte de 250 grammes : 12 francs.

Prix : boîte de 500 grammes : 23 francs.

Prix : boîte de 1 kilogr..... : 45 francs.

Prix : boîte de 5 kilogr..... : 175 francs.

Prix : boîte de 10 kilos..... : 320 francs.

Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 914-1.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

Littérature et Échantillons médicaux sur demande :

Laboratoires BERNARD-GARCIN

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : n° 6.)

Eugène GRAS, pharmacien de 1^{re} classe,

Ex-interne des hôpitaux.

Chimiste expert des tribunaux.

MULTIPLAST

Pansement adhésif cicatrisant.

Composition. — Le *Multiplast* est composé d'une compresse de coton et gaze imprégnée à la Pyoktanine, puissant antiseptique.

Cette compresse est montée sur un support adhésif permettant la fixation instantanée.

Indications. — Au foyer, à l'usine, en voyage, une boîte *Multiplast*, type « Sport » sera très utile pour les soins rapides et la protection des petites blessures, des enfants et des adultes.

Pour le cabinet de consultations, le Poste de Secours, l'Infirmier, un coffret contenant des bandes de largeurs 4, 6, 8 centimètres, permettent des centaines de pansements.

Prix au public : *Multiplast*, boîte sport, la boîte : 6 francs.

Multiplast, coffret 1255, le coffret 60 francs.

Fabriqué à Paris par les laboratoires Herbel.

Dépôt général.

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

MUOLÉOL

Agent de drainage intestinal, d'une grande efficacité pour le traitement de la constipation, même chronique, avec ou sans complication d'entérite.

Rééducateur de l'intestin, pas d'accoutumance, ne contient pas de phénolphtaléine.

Forme. — Poudre aromatisée à l'anis, facile à prendre.

Composition. — Ferments digestifs (papaïne, diastase, pancréatine, duodénine) ; Magnésium hydroxydé et hydrocarbonaté ; citrate trisodique, glycéro-phosphate de soude ; lactose.

Indication. — La constipation sous toutes ses formes.

Posologie. — Une à deux fois par jour, prendre après les repas une cuillerée à café de MUOLÉOL, délayé dans 1/4 ou un demi-verre d'eau ou d'infusion, que l'on peut sucrer à volonté ; boire aussitôt après un peu d'eau ou d'infusion. Si l'effet est insuffisant, on peut augmenter les doses sans inconvénient.

Peut se donner aux enfants au-dessus de 5 ans, en diminuant les doses.

Prix : 15 francs.

Durée moyenne de chaque boîte : 15 à 20 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques A. BLANC

BARCELONNE-DU-GER (Gers). (Téléphone : 4.)

MURONES DU D^r ROBERT JACQUES

1^o **MURONE aérogène.** — Redressement fonctionnel du poulmon par activation des échanges respiratoires et oxydation.

Indications. — S'adresse aux anémiés, aux troubles de la croissance, et à tous les *menacés* de tuberculose.

Composition. — Essences oxydées et essence phénol en proportion juste : ampoule n^o 1, et essence diffusible : ampoule n^o 2, contenues dans la même boîte.

Mode d'emploi. — Injecter quotidiennement en alternant ampoule 1 et ampoule 2 pendant 24 jours, repos 6 jours. Traitement : trois mois.

2^o **MURONES A. B. C.** — Oxygénation et oxydations intratissulaires par oxydoréduction.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, osseuse, laryngée, suppurations pulmonaires, bronchites fétides.

Composition. — Murone A : essences oxydantes à doses plus actives ; Murone B : balsamique très diffusible ; Murone C : doué de grande activité infertilisante, ne doit être employé qu'après amélioration des signes généraux et fonctionnels.

Mode d'emploi. — Alternier les injections chaque jour, au début dans l'ordre A. B. B. A. B. B., puis A. B. A. B. A. B., puis A. B. C., B. A. B. C.

Voir notices et formules dans chaque boîte. — Prix en France : 16 fr.

Fabrique par les laboratoires AUG. LUMIÈRE

Dépôt et vente :

Établissements SILBERT et RIPERT

30, rue Bénédit — MARSEILLE.

MUSCULOGÉNOL

Reconstituant, recalcifiant.

Forme. — Elixir et cachets.

Composition. — L'éllixir : *reconstituant* à base de méthylarsinate disodique, nucléinate de soude, glycérophosphate de soude, fluorure de sodium, muscat vanillé.

Les cachets : *recalcifiants* à base de nucléinate de manganèse, fluorure de calcium, de glycéro de chaux et de sel calco-magnésien de l'acide anhydroxyméthylène diphosphorique.

Indications. — Convalescence, Surmenage, Débilité, Lymphatisme, Scrofule, Anémie, Neurasthénie.

Tous états asthéniques et atoniques ou troubles du métabolisme calcique.

Posologie :

Élixir. { *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour avant les repas.
 Enfants : 2 à 3 cuillerées à café de 4 à 10 ans.
 Au-dessus, par cuillerées à dessert.

Cachets. *Adultes* : 2 à 3 cachets par jour aux repas.

Enfants : 1 par jour.

Prix : *Elixir* : 20 fr. — *Cachets* : 20 fr.

Laboratoire du MUSCULOGÉNOL

117, rue Victor-Hugo — HOUPLINES (Nord) (Tél. 11.)

Médicament enreg. au L. N. C. M. sous le n^o 1480-1.

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes. Pian, Angine de Vincent, Lupus érythémateux.

Dose normale : Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 30 fr. 75.

Double dose : Ampoule de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 41 francs.

Dose infantile : Ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 cgr. 6 de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 25 fr. 65.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 3 jours ou 2 ampoules tous les 5 jours.

Traitement de sécurité : Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

MUTHIODE

Solution d'Iodure double de Bismuth et de Sodium.

Indications. — Syphilis à tout âge et à toutes ses périodes. Le MUTHIODE peut être utilisé comme traitement d'attaque.

Hérédo-Syphilis.

Scléroses parenchymateuses et vasculaires.

Mode d'emploi. — 2 injections intramusculaires par semaine.

Présentation :

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. (Adultes).

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (Enfants).

Prix de vente au public :

La boîte de 12 ampoules 2 cc. 24 fr. 50.

La boîte de 12 ampoules 1 cc. 19 fr. 25.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt :

Pharmacie générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

MUXAGOL

Régulateur du tube digestif. Seul mucilage garanti stérilisé au cours de sa préparation.

Composition. — Graines de *Plantago decumbens* (Psyllium blond des Indes) produit le mucilage le plus abondant et dont la teinte claire permet, par triage à la main, d'éliminer totalement les impuretés qui sont généralement de couleur foncée.

Indications. — Rééducation et pansement de l'intestin, Constipations, Colibacilloles, Entérocolites mucomembraneuses, Colite et dans toutes les affections d'origine intestinale.

Recommandé aux « entéro-névropathes », dyspeptiques, malades atteints d'hémorroïdes, de fissures, de ténisme ano-rectal, etc.

Action sédative dans les coliques néphrétiques, les cystites et dans toutes les inflammations des voies urinaires.

Posologie. — 1 ou 2 fois par jour, au cours des repas.

Adultes : 1 cuillerée à soupe.

Enfants : 1 ou 2 cuillerées à café.

Un traitement régulier de 3 mois est généralement nécessaire, mais un emploi pendant des années de même qu'une augmentation des doses ci-dessus indiquées ne présentent aucun inconvénient, le MUXAGOL n'étant pas un laxatif, mais un *régulateur* de transit intestinal.

Prix : 18 fr. Permettant un traitement de 15 à 30 jours.

Laboratoire du MUXAGOL

43, rue de Chartres — NEUILLY-SUR-SEINE.

MYCIDOL BADEL

Combinaison allylique et sulfurée de méthanal, essences aromatiques et sels de radium.

Externe. — Antiseptique général, chirurgie, gynécologie, obstétrique.

Dose. — 2 cuillerées à café par litre d'eau.

Prix : 9 francs.

Interne. — Infections gastro-intestinales, non spécifiques, dysentériques, typhiques et grippales. Helminthiase.

Dose. — 50 à 100 gouttes par jour.

Prix : 11 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments
556-2, 556-3.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

Prix :

Buvable-Extrait : 23 fr. 50 le flacon de 250 gr.

Ampoule : 6 francs.

Laboratoires **LEBEAULT**

BESINS et Cie, Pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

MYGDAL

Traitement organothérapique des troubles amygdaliens] et pharyngiens.

Composition. — Extractif de tissus amygdaliens en solution hydroalcoolique, pour administration par voie buccale, selon la méthode des D^{rs} Cuvier et Carrère.

Indications. — Dans l'hypertrophie simple des amygdales. Dans les troubles persistant après leur ablation. Dans les amygdalites dues à des états diathésiques (rhumatismales, etc...). Dans certains troubles pharyngiens et laryngiens (enrouements, etc...).

Posologie :

Chez l'enfant : 1 goutte 2 à 3 fois par jour.

Chez l'adulte : 1 goutte 3 à 4 fois par jour.

Loin des repas.

Forme. — Gouttes pour administration par voie buccale ou en gargarismes.

Prix au public : 30 francs,

Préparé par **H. BOISSEL, Pharmacien.**

Préparation, Littérature, Echantillons :

Laboratoires **H. BOISSEL**

295 bis, rue de la Benaugue — BORDEAUX.

Dépôt général : France : O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Afrique du Nord :

Coopération Pharmaceutique Française,

37, rue de Lyon — ALGER.

MYOCHRYSINE

Aurothiomalate de Sodium, sel titrant 50 %, d'or métal sous forme de solution aqueuse et de suspension huileuse pour injections intra-musculaires ou sous-cutanées. À utiliser dans les cas où les injections intraveineuses de CRISALBINE sont impossibles. Bien toléré localement.

Indications. — Tuberculose pulmonaire de l'adulte et T. P. infantile. T. ganglionnaires et cutanées. Tuberculides. Rhumatismes chroniques et infectieux.

Présentations. — Solution aqueuse (étiquettes bleues) et suspension huileuse (étiquettes jaunes). Dosages : 0,01, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50. Boîtes de 1 et 10 ampoules. (Prix suivant dosage et conditionnement.)

Tuberculose pulmonaire. — Débuter à 0,05 et ensuite 0,10, puis 0,20 et 0,30 par semaine.

Rhumatisme. — Débuter à 0,01 et ensuite 0,05 et 0,10 ou 0,20 par semaine (consulter la notice).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usine du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94).

MYODEN

Élixir Antirhumatismal et Antigoutteux
au Phosphohexaparadiazinammonium.

Composition. — Phosphohexaparadiazinammonium, Sel de Gregory, Extrait stabilisé de belladone, Extrait fluide de bulbes de colchique stabilisés, Teinture de digitale pourprée, Ethanol pur, Eau bi-distillée.

Indications. — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

Enfants au-dessus de dix ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.

Durée du traitement : pour un flacon 8 jours. Traitement complet : 3 flacons.

Nota. — Le MYODEN peut être prescrit par le Corps médical pour les Assurances Sociales.

Médic^t enregistré au Lab. N^o de Contrôle des Médic^{ts} n^o 726-1.

Prix : 23 francs.

Laboratoires E. DAUPEZ

37, rue des Lois — TOULOUSE (Hte-Gar.). (Tél. : 224-55.)

MYORAL

Le MYORAL est un sel d'or insoluble en suspension huileuse. Il correspond à la formule de l'aurothioglycolate de calcium, soit 64,16 d'or métal et 6,54 de calcium.

C'est le sel le plus riche en or métal employé jusqu'ici, ce qui lui assure une *remarquable efficacité*.

Son insolubilité, d'une part, sa présentation en suspension dans l'huile, d'autre part, en font le *mieux toléré* de tous les sels d'or.

Il doit être utilisé en injection intramusculaire qui est *absolument indolore*.

Le MYORAL est présenté en ampoules de 5 cg. (demi-dose), 1 cc., 2 cc., 3 cc., on peut sans inconvénient en injecter 2 doses de 3 cc. par semaine jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc.

Mode d'emploi :

2 injections intramusculaires par semaine.

En commençant par des doses faibles, arriver le plus vite possible à injecter dans la même semaine 2 ampoules de 3 cc. Jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc., soit environ 3 à 4 gr. d'or métal pour une série. Attendre deux mois avant d'entreprendre une deuxième série.

Prix de vente :	{	12 fr. 75	l'ampoule de 5 cg. (demi-dose).	
		18 fr. 65	—	1 cc. (6 cg. 41 d'or métal).
		24 fr. 55	—	2 cc. (12 cg. 83 d'or métal.)
		32 fr. »	—	3 cc. (19 cg. 24 —

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. Opéra 54-58.)

MYOSTHÈNE

Tonique et reconstituant général. Synergie médicamenteuse de principes actifs classiquement éprouvés, stimulant de la nutrition, tonique musculaire et cardiaque, renfermant un extrait de kola stabilisée préparé selon un procédé spécial qui assure à la préparation toutes les vertus de la plante fraîche. Préparation de goût agréable, de tolérance parfaite, agissant vite chaque fois qu'il s'agit de relever un état général déprimé.

Indications. — Asthénies, convalescences, anémies, surmenage, grippe, anorexies, amaigrissement, toutes les carences organiques.

Formes :

- 1° **Myosthène méthylarsiné, forme d'éllixir :** arsenic en combinaison organique (pas d'intolérance), kola fraîche stabilisée Dausse, phosphates alcalins, catalyseurs biologiques, en un véhicule de goût agréable ;
- 2° **Myosthène au fenugrec, forme granulée :** même formule que l'éllixir, mais sans arsenic et avec addition d'extrait de fenugrec désodorisé ;
- 3° **Myosthène à l'hémoglobine, forme granulée :** même formule que l'éllixir, mais sans arsenic et comportant de l'hémoglobine totale, des extraits d'organes hémapoïétiques et du suc musculaire sec.

Nota. — Ces deux dernières formes sont destinées aux malades qui tolèrent mal l'arsenic, même organique.

- 4° **Élixir Myosthène pour diabétiques :** préparation sans sucre.

Doses moyennes :

Deux ou trois cuillers à soupe par jour pour les adultes.

Deux ou trois cuillers à dessert pour les enfants au-dessus de 10 ans.

Chaque présentation permet un traitement de 15 jours.

Myosthène étant inscrit au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, peut être remboursé aux Assurés Sociaux.

Laboratoires BARTIER

E. BARTIER, Docteur en Pharmacie

ARMENTIÈRES (Nord).

(Tél. : 254.)

MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

Indications. — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticolis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

Mode d'emploi. — Etendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 14 francs.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Échantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 00-15.)

MYOVARSYL

Sulfarsénobenzol, voie intramusc. ou sous-cutanée.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Hypotrophie des sujets en bas âge. Médication de choix des sujets à veines difficiles : femmes, enfants, nourrissons.

Présentation. — En boîtes unitaires : ampoule de 0,015 à 0,50. A chaque dose est adjoint un *solvant pour arsenicaux*. Ce solvant rend indolore l'injection des arsénobenzènes. Aucun analgésique. Ampoules de 2 et de 5 cc.

L'ampoule de 2 cc. suffit pour dissoudre les doses s'échelonnant de 15 mgr. à 18 cgr. de sel. Au-dessus de cette dernière dose, utiliser 3 à 5 cc.

Prix au public : suivant dose, de 2 fr. 70 à 15 fr. 30.
Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dép. : **Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**
5, rue A.-Thomas — PARIS (IX^e). T. : Prov. 20-20.

NADOR-ASEBORHAL

Remède Anticalvitie. Séborrhée. Pelade.

Indications. — Permet d'enrayer dès la première application la chute des cheveux.

Assure la croissance de nouveaux cheveux sains. Réussit dans tous les cas où tout autre moyen a échoué.

Assure l'élimination du flux séborrhéique.

Forme. — Liquide, odeur agréable.

Doses. — *Légère séborrhée* : Enfants, Cas de jeunes gens, Age de puberté : chaque semaine, une application.

Séborrhée, pellicules, calvitie : chaque semaine au moins deux applications.

En outre, pour une calvitie de longue date, appliquer NADOR-ASEBORHAL tous les soirs directement sur les racines.

Pelade, dartres farineuses : pendant deux mois, chaque semaine, trois applications.

Très jeunes enfants et bébés : 15-20 grammes dilués d'un tiers d'eau : une à deux applications par semaine. A employer pur en cas de croûtes ou autres affections.

Composition du Nador. — Extraits fluides de Sapindus Saponaria : 21,00. Areca Catechu : 20,00. Symphytum Officinale : 17,00. Quillaja Saponaria : 26,00. Betula Alba : 16,00. Acidum Salicylicum : 0,10.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 1668-1.

Composition de l'Aséborhal. — Extrait de plantes stimulantes sans matière grasse, rigoureusement exempt d'alcaloïdes et de matières minérales toxiques, certifié par le Laboratoire Municipal de Paris.

Effets et durée du traitement. — Les cheveux vont se renouvelant sans cesse de la profondeur vers la surface du cuir chevelu.

Chez les sujets séborrhéiques, l'insuffisance de ces fonctions amène la calvitie.

Le NADOR-ASEBORHAL a les rôles de dépurateur, de générateur de cellules, de stimulateur des artérioles nourricières.

En conséquence, il y a lieu de commencer et d'en faire l'emploi dès les premiers symptômes de séborrhée et d'en continuer l'emploi dans la thérapeutique de la séborrhée et de la calvitie.

Son emploi constant permet au follicule pileux un fonctionnement sain et normal.

Une chute de cheveux n'est plus à craindre.

Présentation. — Le flacon 28 fr., le demi-litre 44 fr. et le litre 68 fr.

Préparateur : M. BOUTARIC, Docteur en Pharmacie.

Les Laboratoires NADOR

25, rue de Tocqueville — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagr. 39-74.)

NAÏODINE LOGEAIS

Formule : 1° *Normale*, ou **A**, solution aqueuse à 1 % d'iodure de sodium stabilisé pour intramusculaires.

2° *Concentrée*, solution **B** aqueuse à 5 %. *Spéciale pour intraveineuses.*

3° *Sulfoiodée* (voir *Thionatodine*).

Formes :

A	{ 6 amp. de 10 cc. : 26 fr. 95.
	{ 6 amp. de 20 cc. : 35 fr. 10.
B	{ 6 amp. de 10 cc. : 31 fr. 60.
	{ 6 amp. de 20 cc. : 41 fr.

Boîtes vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps Médical. Prix courant réduit sur demande.

Propriétés :

Solution A. — Sédatif type de l'élément douleur dans les algies rebelles, grâce à l'action neurotrope intense de NaI stabilisé (imprégnation nerveuse par l'*ion I* de la NAIODINE).

Véritable traitement spécifique de la sciatique, c'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, toxicomanies, néoplasmes, douleurs du tabès, etc.).

Solution B. — Action antiseptique et anti-infectieuse puissante par voie intraveineuse dans le traitement des névraxites et leurs séquelles. Cure intraveineuse des algies rebelles.

La NAIODINE A ou B est atoxique, stabilisée, indolore à l'injection immédiatement assimilable, sans réactions secondaires.

Indications :

Solution A. — Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciatique, Lumbagos, Zonas, Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme déformant, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Asthme, Emphysème, Toxicomanies, etc.

Solution B. — Maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Epilepsie essentielle. Algies rebelles. Mycoses.

Posologie :

Solution A. — Traitement d'attaque à doses massives : 20 à 40 cc. par jour, en une seule séance, jusqu'à sédation. Injections intramusculaires indolores lentes (*loco dolenti* si possible). Ni réactions, ni incompatibilité, ni contre-indications. Pas d'iodisme ni d'accumulation.

Solution B. — Injections strictement intraveineuses très lentes : 20 à 40 cc. par jour pendant 10 jours, 20 jours de repos entre chaque série d'injections. Non sclérosante.

Laboratoires Jacques LOGEAIS
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

NASOBORE

Forme. — Comprimés effervescents instantanément solubles, pour Gargarismes et Inhalations.

Composition. — Associe la *Chloramine T* au baume du Pérou véritable et à des essences balsamiques naturelles, décongestionnantes, sédatives et bactéricides.

Indications. — Prophylaxie et traitement des affections du nez, de la gorge, de la trachée, du larynx et des bronches.

Mode d'emploi :

- 1° Gargarismes (3 à 4 par jour) : 1 comprimé effervescent dans 1/2 verre d'eau bouillie chaude ;
- 2° Inhalations (3 à 4 par jour) : 2 à 3 comprimés effervescents dans un bol ou un inhalateur d'eau bouillante. Respirer les vapeurs pendant 5 à 10 minutes.

Durée de traitement : 5 à 10 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

NASOPHÉDRINE BÉRAL

Pommade nasale (Huile gélifiée) à 3 p. 100 d'Éphédrine Béral.

Rigoureusement neutre. Exempte d'analgésique et d'oléate.

Effet intégral de l'éphédrine sans irritation et avec conservation de la perception de la respiration nasale.

Agit mieux que les instillations huileuses, dont elle évite les inconvénients.

Indications. — Coryza, Rhinite spasmodique, Asthme nasal, Obstructions nasales, Sinusite, etc.

Mode d'emploi. — Gros comme un grain de chènevis dans chaque narine.

Prescrire : Nasophédrine Béral, un tube.

Prix : 12 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

NATIBAÏNE NATIVELLE

Seule association renfermant 1/3 de **Digitaline Nativelle** et 2/3 d'**Ouabaïne Arnaud**.

Forme. — Solution au 1/1000.

Indications. — Myocardites avec troubles du rythme et dilatation des cavités ventriculaires — Arythmie complète avec troubles du tonus — Hypertension artérielle avec tendance à la Tachycardie.

Doses. — Suivant le degré de l'insuffisance, entre XV et L gouttes de *Natibaïne Nativelle* par jour, les cinq premiers jours de chaque dizaine ou de chaque quinzaine.

Prix : 19 fr. 50

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

NATROSYL

Forme pharmaceutique. — Soluté.

Composition. — Soluté alcalin à base de Baume du Pérou et d'Essences antiseptiques aromatiques.

Action. — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

Indications. — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie chaude en injections vaginales.

Prix : 14 francs.

Laboratoires

du Dr Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, bd St-Michel — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 22-01.)

NAVIDRINE

pour Mal de Mer et d'Avion.

Tablettes à sucer contenant chacune :

Adrénaline	1/4 mgr.
Br. d'Hyosciamine.....	15 centièm. de mgr.
Chl. d'Ephédrine Béral.	1 centigramme.

Mode d'emploi :

Deux tablettes à sucer avant le départ.
 Ensuite une tablette toutes les 2-4 heures.
 Prescrire : NAVIDRINE, une boîte.

Prix : 22 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL
 194, rue de Rivoli — PARIS

NAZOÏL

Antiseptique rhinopharyngien.

Aromatique, cicatrisant, hémostatique, décongestif et inhalant. Rétablit l'aisance respiratoire.

Composition. — Eugénol, cinéol, menthol, gaïacol, camphre, chloréto-
 ne, essence de citron, éphédrine, huile de vaseline, ion picrique.

Indications. — Prévention épidémique, Coryza, Sinusite, Pharyngite,
 Amygdalite, Trachéite, Otite, Suites opératoires.

Mode d'emploi. — *Adultes, enfants, bébés :* Quelques gouttes 2 à 4 fois
 par jour dans les narines, la tête inclinée en arrière, jusqu'à la percep-
 tion du liquide dans la gorge.

Une instillation nasale a un effet beaucoup plus complet qu'une inhala-
 tion. Nazoïl peut aussi s'utiliser en pulvérisations nasales ou laryn-
 giennes.

Particularités. — Doses équilibrées. Présence faible mais suffisante
 d'éphédrine. Injection indolore. Goût agréable. Véhicule neutre et
 aseptique. Léger effet kératinisant sur la pituitaire pour la rendre
 moins vulnérable aux actions microbiennes, principalement en cas
 d'épidémies, Rougeole, Poliomyélite, etc.

Présentation. — Flacon compte-gouttes nasal, 15 cc.

Prix : 12 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
 sous le N° 1641-2.

Laboratoire NOGRYP-NAZOÏL

F. LACOSTE, Pharmacien licencié de chimie,
 94, rue de l'Ecole-Normale — CAUDÉРАН (Gironde).

NEADOL

Nouveau complexe antirhumatismal.

Forme. — *Cachets* contenant :

Diméthylaminoantipyrine. 0,18	Phénylacétamide	0,10
Acétyl Paraphénétidine... 0,12	Acide Quinique	0,01
Triméthyl xanthine..... 0,03	Semence de Colchique pul-	
Nitrate de Potassium... 0,05	vérisée	0,02
Carbonate de Lithium... 0,05	Silicate de Magnésium... 0,07	
	Carbonate de Calcium... 0,04	

Effets thérapeutiques. — Analgésique. Antithermique. Anti-rhumatismal. Diurétique puissant. Eliminateur et réducteur de la production d'acide urique, s'opposant à son accumulation dans les tissus. Modificateur du terrain arthritique.

Indications. — Toutes les manifestations douloureuses de la diathèse urique ; rhumatisme aigu et chronique ; douleurs articulaires et musculaires ; goutte ; gravelle urique ; lumbago ; torticolis ; névralgies (sciatique, intercostale).

Posologie et mode d'emploi. — Un cachet avant chacun des deux principaux repas dans un demi-verre d'eau bicarbonatée ou d'eau de Vichy. Dans les cas aigus, 4 cachets par jour.

Prix : 16 fr. 50 la boîte de 24 cachets.

Laboratoires SUJAL

J. LAFARGE, Pharmacien

62, rue de la Brauderie — CHATEAUROUX (Indre).

NÉALGYL BOTTU

Composition et présentation. — Comprimés constitués d'une association de deux groupements médicamenteux : un noyau antalgique à base d'une nouveauté : la chloralopyrine de Bottu et un groupement correctif des effets nocifs secondaires sur le cœur et le rein (caféine-hexaméthylène amine).

Les comprimés dragéifiés sont insolubles mais faciles à déglutir. Chacun représente 0,27 de chloralopyrine, 0,10 d'oxyéthylacétanilide, 0,01 de caféine et 0,07 d'hexaméthylène.

Indications et posologie. — Toutes les algies depuis les bénignes (courbatures, céphalées, odontalgies) jusqu'aux douleurs tenaces et rebelles (goutte, sciatique, menstrualgies).

Pour un effet immédiat et massif : 2 comprimés d'emblée suivis à 20 minutes de distance d'un troisième et, si besoin, d'un quatrième. Pour une action prolongée et soutenue : 6 à 8 comprimés par jour toutes les 2 heures, avant ou pendant les repas, mais à éviter pendant le travail de la digestion.

Pour les algies vespérales et insomnies douloureuses, 2 comprimés d'emblée le soir dans un liquide très chaud.

Deux modèles : La boîte P. M. de 12 comprimés.

La boîte G. M. de 30 comprimés.

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e). (Tél. : Danton 13-20.)

NÉFITOL

Présentation. — En tube, dans une boîte à tiroir.

Composition. — Adrénaline, Benjoin, Co-caïne, etc..., dissous ou en suspension dans la vaseline neutre, fluide.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique par excellence des maladies des voies aériennes supérieures, en décongestionnant rapidement les muqueuses sans jamais les irriter.

Indications. — Coryza aigu ou chronique, rhume des foins, rhinites, pharyngites, etc...

Mode d'emploi. — En introduire gros comme un pois dans chaque narine, 3 ou 4 fois par jour (renifler doucement).

Laboratoires J. TIFFENEAU

Docteur en Pharmacie

24, rue de Monttessuy — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 35-30.)

NÉOARSITE

(Liquueur de Fowler spéciale.)

Propriétés. — Les composés arsenicaux, tels que cacodylates, méthyl-arsinates, etc., ont été adoptés thérapeutiquement pour remplacer les sels arsenicaux anciens, arséniates, arsénites, mais leur efficacité n'est réelle qu'à des doses importantes, c'est-à-dire à des doses voisines de leur toxicité spécifique.

De tous les arsenicaux, seule la liqueur de Fowler a une valeur thérapeutique bien définie. Aussi le prof^r Roger a-t-il étudié, pour ce médicament de toute efficacité, les conditions optima de son absorption sous des formes nouvelles.

Formes :

1^o *L'Ampoule isovisqueuse de Néoarsite*, grâce à sa viscosité qui est égale à la viscosité moyenne du Myoplasma sanguin, est résorbée presque instantanément et sans réaction.

2^o *Les Perlules de Néoarsite*, solubles seulement dans l'intestin, suppriment les inconvénients de l'absorption gastrique. Chaque perle correspond à IV gouttes de Liqueur de Fowler et à 1 milligramme de quassine.

Posologie :

Ampoules : 1 par jour.

Perlules : 1 au repas du midi. 1 au repas du soir.

Dépôt : **Laboratoire NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

NÉOBIOL

Composition. — Soufre colloïdal et complexe hydro-carburé spécial, dégraissant et d'odeur agréable.

Formule enregistrée au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1501-1.

Indications. — Séborrhée et ses manifestations : chute des cheveux, pellicules, peaux grasses, points noirs, acné.

Mode d'emploi :

Au visage : En applications externes quotidiennes. En frictions douces avec un tampon de coton hydrophile.

Au cuir chevelu : Ecarter les cheveux par quelques raies faites au peigne, et procéder de même qu'au visage.

Prix au public : Flacon : 20 fr. 80 (250 cc. environ).

Demi-flacon : 13 francs (125 cc. environ).

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires JAUFFRET

NÉOBIOL-IMPÉTIGOL — VANVES, près PARIS.

L. JAUFFRET, pharmacien, ex-interne des hôpitaux.
Correspondance et bureaux : 181, avenue Victor-Hugo,
CLAMART (Seine). (Tél. : Michelet 04-71).

NÉOBOLDINE

Pilules titrées à un milligramme de Boldine et à 0,05 d'Extrait de Boldo, représentant le *Totum Actif du Pneumus Boldus*.

Indications Thérapeutiques :

Toutes les *Insuffisances Hépatiques, Maladies du Foie* (Cirrhoses hypertrophiques, Cholestécystites chroniques, Congestion du Foie, Ictère), *Constipation chronique*.

Posologie et mode d'emploi :

De 2 à 6 pilules par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Prix : 14 fr. 60

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

17, rue Chomel — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 53-05.)

NÉO-CALCILINE

Total endocrinien intégral.

Reconstituant biologique, para-hépto-pancréato-splénique. Anti-rachitique.

Composition :

Os frais pulvérisé.....	0,15
Parathyroïde.....	0,001
Thymus	0,05
Surrénale	0,05
Diastase pancréatique.....	0,05
Poudre de muq. intest.....	0,05
Extrait lipoidique de foie	0,05
Extrait lipoidique de rate.....	0,05
Par comprimé ou mesure de granulé,	

Doses. — 2 comprimés, 2 mesures (granulé) avant chaque repas, 20 jours par mois.

Enfants : 1/2 doses.

Prix : 19 fr. 20.

Laboratoires Gastro-Entérologiques ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV°).

(Tél. : Ségur 69-13.)

NÉOCARDYL

Butyl-thio-laurate de Bismuth oléosoluble.

Indications. — Bismuthothérapie de la syphilis acquise ou héréditaire, par voie intramusculaire.

Présentations et posologie. — Néocardyl (pour adultes), solution huileuse dosée à 0 g. 05 de Bimétal par cm³. Ampoules de 1 cm³ 5 contenant 0 g. 075 de Bimétal (boîtes de 12 ampoules).

Série de 12 injections bihebdomadaires ; intervalle de 5 semaines environ entre deux séries consécutives.

Néocardyl infantile : Solution huileuse dosée à 0 g. 015 de Bimétal par centimètre cube. Ampoules de 1 cm³. (boîtes de 10 ampoules). Dose par injection, suivant le poids de l'enfant (consulter la Notice détaillée).

Prix de vente :

Néoc. *Adultes*. La boîte de 12 ampoules.. 24 fr. 50

Néoc. *Infantile*. La boîte de 10 ampoules.. 14 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉOCÉDINE

Spécifiques des infections cancéreuses. Epithéliomas.

Composition :

Sulfate de cuivre.....	1,0792
— magnésium.....	0,9100
— manganèse.....	0,0017

pour 1 cc., quantité en milligrammes.

Association de métaux catalyseurs ionisés sous forme d'oléate métallique parfaitement osmosable. — Innocuité complète.

Formes : voie buccale : Capsules (étui de 20) et Elixir.

Voie intramusculaire : Ampoules de 2 et 5 cc. boîtes de 6 et 12.

Voie intrarectale : huile — lavements de 10 cc. à conserver 5 à 6 heures et pour instillation dans les ulcères profonds.

Pansements : Pommade pour les plaies suppurantes.

Indications : Cancer — Sarcome — Epithélioma — Pansements avec la Pommade pour les plaies suppurantes : Anthrax — Furoncles — Panaris — Mal blanc.

Posologie : Au début des deux repas, pendant 10 jours, une capsule ou une cuillerée à soupe d'Elixir. Après 10 jours, arrêt de 5 jours.

Tous les 3 jours ou tous les 2 jours (suivant le cas), une *injection intrarectale* de 10 cc. ou une *piqûre intramusculaire* de 2 ou 5 cc. (faite très lentement). Aiguille de 9/10° et les deux alternativement dans les traitements intensifs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le N° 1024-4.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires des HORMOMÉTALIONS

50, Avenue Jacqueminot, MEUDON

(Tél. : Obs. 13-33.)

NÉO-COCCYL

1162 F-Para-amino-phényl-sulfamide.

Chimiothérapie antimicrobienne polyvalente préventive et curative.

Indications. — Spécifique des infections à streptocoque, méningocoque, pneumocoque, staphylocoque, gonocoque, colibacille et tous états infectieux.

Posologie. — Traitement préventif : 2 à 6 comprimés par jour. Traitement curatif :

Cas bénins. Cas graves. Cas désespérés.

<i>Adultes</i>	4 à 6	8 à 10	14 à 18
<i>Enfants</i> de			
5 à 12 ans.	2 à 4	5 à 7	7 à 11
De 1 à 5 ans.	1 à 2	2 à 5	3 à 7
6 mois	0,5	1	2

Lors de l'emploi de fortes doses, il est prudent de suivre avec attention l'état du foie et des reins et de diminuer progressivement ces doses dès qu'un mieux est observé.

Gonococcies : Le premier jour : 5 à 6 comprimés ; les 2^e, 3^e et 4^e jours : 3 à 5 comprimés ; les jours suivants : 2 à 3 comprimés.

Les lavages journaliers au permanganate doivent être pratiqués sous contrôle médical pendant le traitement. (Sans lavages : 1 gr. de plus par jour).

Mode d'emploi. — Toujours commencer par la dose maxima décidée.

Fractionner les doses journalières en 4 à 8 prises.

Poursuivre le traitement 1 semaine après disparition des phénomènes morbides.

Proscrire les sulfates (soude, magnésie, chaux) et les traitements arsenicaux. Éviter la constipation par l'huile de paraffine ou les mucilages. Conseiller le bicarbonate de soude à raison de 2 à 5 gr. par jour.

Prix : 14 fr. le tube de 20 comprimés, dosés à 0 gr. 50 de 1162 F.

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

NÉO-CODION

Puissant sédatif de la toux.

A base de deux nouveaux dérivés :
le **Camphosulfonate de Codéine**
et le **Camphosulfonate de Dionine**.

Plus actifs — Moins toxiques
que la *Codéine* et la *Dionine*.

Composition. — *Camphosulfonates de Codéine* et de
Dionine dissous, dans la proportion de 1 p. 100,
dans un mélange de teintures de Droséra, Grin-
délia, Marrube blanc stabilisé.

Présentation. — Deux formes : *Gouttes* et *Dra-
gées*.

Indications. — 1° *Toux spasmodiques et réflexes* :
Laryngites, Trachéites, Coqueluche.

2° *Bronchites aiguës* : Grippe, Asthme.

3° *Toux rebelles* : Bronchites chroniques, Bacilliose.

Doses. — *Enfants* : 2 gtes par année d'âge 2 à 3 fois
par jour. *Adultes* : 30 gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 16 fr. 65 pour un traitement de quinze jours.

Laboratoires E. BOUCHARA

47, rue de Bretagne — PARIS (3°). Archives 94-65

NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (80 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergiques dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïné pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïné pour frictions dans les maladies infectieuses.
Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-19.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.
Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-17.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.
Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-21.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la coli-bacillose et l'appendicite chronique.
Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-18.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Prix :

Pommade cocaïnée : 16 fr. 40. — *Pommade non cocaïnée* : 15 fr. 40. *Ovules* : 15 francs.
Suppositoires : 15 francs. — *Pilules* : 15 francs.
Compte-Gouttes : 13 fr. 90.

Laboratoires du Dr MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

NÉOCRINOL

NÉOCRINOL M

Composition. — Extrait de glande orchitique associé à extrait de surrénale, thyroïde, prostate, hypophyse, cerveau et moelle épinière.

Le NÉOCRINOL M existe également *sans* thyroïde.

Indications. — Chez l'homme : troubles adipo-génitiaux de l'adolescence, asthénie neuro-psychique et neuro-musculaire, impuissance et vieillissement de l'organisme, hypertrophie de la prostate.

Posologie. — 1 ampoule par jour dans eau sucrée avant repas.

Première cure de 12 jours, complétée par cures de 12 ou 24 jours pendant 2 ou 3 mois.

NÉOCRINOL F

Composition. — Extrait d'ovaire associé à extrait de surrénale, thyroïde, hypophyse, cerveau et moelle épinière.

Le NÉOCRINOL F existe également *sans* thyroïde.

Indications. — Chez la femme : troubles de la puberté, de la menstruation, de la ménopause. Frigidité, obésité, règles doul. ou anormales.

Posologie. — 1 ampoule par jour dans eau sucrée avant repas.

Première cure de 6 jours, complétée par cures de 6 à 12 jours pendant 2 ou 3 mois.

Prix : M ou F : La boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 26 francs.

12 — — 10 cc. : 48 francs.

Aux enfants arriérés, prescrire NÉOCRINOL M ou F *Sans* thyroïde.

Laboratoire du NÉOCRINOL

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

NÉO-DMÈGON

Vaccin curatif des complications de la gonococcie.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonocoques* et de *synocoques* traitées par le fluorure de sodium.

Indications. — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmègon agit notablement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cm³. (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules imprimées rouge et bleu. Voie hypodermique, intramusculaire ou intraveineuse.

Prix de vente : la boîte de 6 amp. : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉO-DMÉTYS

Vaccin curatif et préventif de la coqueluche.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traités par le fluorure de sodium.

Indications. — Vaccinothérapie et vaccination préventive de la coqueluche.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cm³. (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (souches différentes). Une injection intramusculaire (de préférence) ou sous-cutanée, tous les 2 jours ; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule dès la deuxième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Séries de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules imprimées rouge et bleu.

Le *Néo-Dmétys* peut être utilisé pour l'intradermo-réaction (diagnostic).

Prix de vente : La boîte de 6 amp. : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉOGLOBULINE

Médication tonique, antianémique, antirachitique.

Forme et Composition. — Comprimés dragéifiés à base d'histidine, de vitamines A et D, d'extraits opothérapiques, d'extrait d'avoine et de fenu-grec déshuilé.

Action thérapeutique. — Stimule l'appétit, favorise l'anabolisme, augmente le poids et la valeur globulaire, relève l'état général.

Indications. — Croissance, rachitisme, lymphatisme, anémie, asthénie, débilité, convalescence.

Posologie :

Enfants (à partir de 15 mois) et selon l'âge : 1 à 6 comprimés par jour.

Adultes : 6 à 10 comprimés.

Le flacon de 40 comprimés : 17 francs.

Laboratoire SYNOPS

84, rue du Faubourg-du-Temple — PARIS (XI^e).

NÉO-GYNERGÈNE

Association stable de tartrate d'ergotamine et de tartrate d'ergobasine.

Propriétés. — Le Néo-Gynergène, stimulant du tonus utérin, combine les effets rapides de l'ergobasine à l'action prolongée, mais plus tardive de l'ergotamine. Le Néo-Gynergène n'a pas d'action sur la tension artérielle, contrairement aux extraits hypophysaires.

Indications. — Hémorragies de la délivrance par atonie utérine, Opération césarienne, Subinvolution utérine, Hémorragies gynécologiques.

Posologie. — *Gouttes* : XV à XXX, 1 à 3 fois par jour. *Ampoules* : Injection de 1/2 cc. à 1 cc. (voies sous-cutanée et intramusculaire).

PRODUITS SANDOZ,

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

Laxatif.

Composition. — Suc d'orange et manne.

Forme. — Sirop.

Indications. — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

Ne renferme ni produits chimiques, ni phtaléine du phénol, ni drastiques, ni stupéfiants.

Peut être donné aux enfants, même nouveau-nés.

Posologie.

Enfants du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.

Enfants de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.

Enfants de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.

Adultes : une à deux cuillerées à soupe.

S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet pour revenir ensuite à des doses moindres, mais suffisantes.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoires CHAPOTOT

56, boulevard Ornano

PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Montmartre 28-90 et 30-65.)

R. C. 231917 B.

NÉOLYSE

Composé silico-magnésien.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur et antinéoplasique. Le meilleur traitement médical des affections cancéreuses.

Indications. — Prophylaxie et traitement des néoplasmes. Traitement préventif des récides et des métastases. Traitement des verrues et des lésions du type pré-cancéreux. Traitement des troubles asthéniques (fatigue, dépression, surmenage). Adénome prostatique.

Posologie. — Un cachet avant les 3 principaux repas, pendant 20 jours. Interrompre le traitement pendant 10 jours.

Boîte de 60 cachets : 25 fr. 65.

Une ampoule par jour, voie hypodermique, intramusculaire ou interstitielle; séries de 16 injections, repos de 15 jours.

Boîte de 4 ampoules ordinaires : 10 fr. 25.

Boîte de 4 ampoules radioactives : 20 fr. 50.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

NÉO-NEUROSINE PRUNIER

Saccharure granulé à base de :

Phospho-glycérate de calcium pur	0,05 centigr.
Glycéro-phosphate de sodium pur	0,10 —
Chlorure de magnésium pur ..	0,15 —
par cuillerée à café, soit 5 grammes.	

Propriétés thérapeutiques. — Médication tonique, phosphorée, calcique et magnésienne.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre en nature ou dans de l'eau.

Prix en France : 15 fr. 45 le flacon.

Dépôt général :

CHASSAING, LE COQ ET Cie

(Anc. Mon Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NÉOPANCARPINE

Solution d'Extrait total de Jaborandi.

Formes. — Gouttes, Granules, Ampoules injectables.

Indications thérapeutiques:

Traitement de fond des troubles vago-sympathiques, en particulier des *altérations de la sensibilité organique* (nerf pneumogastrique et annexes).

ASTHME - GRIPPE

RHUME DES FOINS

CORYZAS SPASMODIQUES

TOUX QUINTEUSES

COQUELUCHE

Accidents respiratoires et digestifs post-anesthésiques au cours des opérations.

Manifestations anaphylactiques.

URTICAIRE - ECZÉMA

Mode d'emploi:

Commencer toujours par des doses faibles. S'en tenir ensuite aux doses moyennes. Augmenter les doses en cas d'insuffisance d'action.

Doses moyennes:

Gouttes : *Enfants* : III à X gouttes.

— *Adultes* : VIII à XV gouttes.

3 à 4 fois par jour, immédiatement après les repas.

Granules : *Adultes* : 1 granule 3 à 4 fois par jour.

Ampoules : *Adultes* : Commencer toujours par 3/4 d'ampoule, puis l'ampoule entière. Continuer à la dose la mieux tolérée. **1 ou 2 ampoules par jour.**

Le traitement par ampoules peut être continué sans toxicité pendant toute la période du rhume des foin, combiné avec le traitement interne et les instillations nasales et oculaires de **RHINO-FLUINE.**

Dans l'asthme, il peut être poursuivi par périodes de plusieurs semaines, 3 à 4 fois dans l'année comme traitement de fond jusqu'à disparition des crises.

Prix : Gouttes, Granules : 18 fr. 75.

Ampoules : 22 fr. 90.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris.

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e)

(Tél. : Auteuil 35-25.)

NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires : Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas. Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injections intramusculaires tous les 2 jours du contenu total d'une ampoule n° 1 et de 1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 104 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

BANDES **NÉOPLASTEX** EN FILÉS LASTEX

Extensibles. Lavables.

Faisant office de

Bandages de CONTENTION par enroulement.

TROIS QUALITÉS (*Bien préciser la qualité prescrite.*)

1° EXTRA-MINCE (ou 3259) pour tous soutiens :

- a. Des membres, en largeurs 4, 6, 8, 10 cm. sur 2 m. 50 de long ;
- b. De l'abdomen, en largeurs 15, 20, 25, 30 cm. sur 2 m., 2 m. 50, 3 m. de long.

Indications.

- a. *Varices, Phlébites, Hydarthroses, etc. ;*
 - b. *Ptoses, Suites d'Opérations et d'Accouchements, etc.*
- Petites bandes pour pansement ombilical, chevilles, poignets.*

2° RENFORCÉE (ou 3400) en largeurs 8 et 10 cm. sur 2 m. 50 de long, pour plus fortes contentions des membres.

3° EXTRA-FORTE (ou 3464) en largeurs 8 et 10 cm. sur 3 m. de long, pour très fortes contentions : traitement ambulatoire des **Ulcères variqueux**, Hémostases, Fractures de côtes, etc.

Remboursables par les Caisses d'Assurances Sociales.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Ces bandes assurent toute la gamme des contentions désirables en thérapeutique :

● **Contentions continues.**

● **Contentions homogènes.**

● **Contentions dosables.**

● **Contentions inaltérables.**

Avec minimum d'épaisseur, maximum de plasticité.

Bandages { toujours propres et hygiéniques
(lessivables) ;
Économiques par leurs prix, leur durée, leur résistance.

Toutes les bandes Néoplastex sont munies pour leur fixation d'attaches élastiques, inoxydables Néoplastex.

NÉOPLASTEX

71, fg Saint-Martin — PARIS (X^e). Tél.: Bot. 18-72.
Dépôts : tous grossistes de Paris et de province.
Détail : toutes pharmacies.

NÉOPULMINE

Affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

Composition :

Sulfogaiacolate de potasse	1,00
Benzoate de sodium.....	1,50
Extrait thébaïque.....	0,02
Dionine	0,02
Teinture de belladone.....	0,65
— de drosera.....	0,65
— de grindelia	0,65
Sirop de baume de tolu.....	15,00
Excipient aromatique... Q. s. p. 100 cc.	

Indications. — Trachéite, laryngite, bronchite aiguë et chronique, asthme, grippe, catarrhe, etc.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes et 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 6 ans.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoires RICHER

Docteur en pharmacie.

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien, PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

NÉORAL

Médication biologique adjuvante et palliative des Néoplasies.

Composition. — Extractif inactivé de tissus néoformés pour administration par *voie buccale*, selon la méthode des D^{rs} Carrère et Cuvier.

Indications. — Comme adjuvant à la suite des interventions chirurgicales ou physiothérapiques. Médication d'appoint influant sur le terrain par rétablissement des métabolismes perturbés.

Comme palliatif dans les cas jugés incurables par les traitements classiques pour chercher à obtenir la diminution des saignements, de la douleur, le relèvement de l'état général et du moral, et, dans certains cas, la régression ou la stabilisation des masses tumorales.

Posologie et formes. — 1^o Voie buccale :

Gouttes : 1 goutte 3 fois par jour en dehors des repas. Prix : 60 francs.
Cachets : 1 cachet par jour à partir de la 1^{re} semaine, comme 4^e prise quotidienne. Prix : 60 francs.

2^o Pommade en application locale. Prix : 30 francs.

Préparé sous le contrôle des auteurs par H. BOISSEL, pharmacien.

Littérature, échantillons :

Laboratoires H. BOISSEL

295 bis, rue de la Benaugue — BORDEAUX.

Dépôt général pour la France : O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS
pour l'Afrique du Nord :

Coopération Pharmaceutique Française,

37, rue de Lyon — ALGER.

NÉO-RHÉNium

du Docteur Louis FOURNIER

Principe actif. — Sel rhénio-sodique de préparation spéciale.

Indications thérapeutiques. — Traitement des néoplasmes, carcinomes, fibromes, cancers et de toutes tumeurs bénignes ou malignes.

Forme. — Ampoules de 10 cc.

Chaque ampoule contient 0 gr. 10 de perrhénate de soude chimiquement pur et indolore.

Boîte de 6 ampoules : 175 francs.

Posologie. — Injection quotidienne (intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée) de 10 cc. au minimum. Traitement à continuer pendant 16 à 24 jours.

Envoi de toute documentation sur demande.

Laboratoires du Néo-Rhénium

82, 84, rue de Belleville — PARIS (XX^e).

(Tél. : Men. 69-04.)

NÉO-RIODINE

$C^3 H^6 O^4 I S Na$

Composition. — Dérivé sodique à 40 p. 100 d'iode organique en solution aqueuse.

Formes. — Boîtes de 10 ampoules de 2, 3, 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — *Action immédiate et intensive.* Aucune intolérance.

Indications. — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée à résultats rapides est indiquée.

Doses et mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 ampoule par jour le matin à jeun dans un peu d'eau. En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Autcuil 24-52 — 53 et 54.)

NÉOSALIODE

Huile Iodo-Salolée injectable Indolore.

Composition. — Chaque ampoule de 5 cc. contient :

Iode	0,10
Salol.....	1,00
Camphre.....	0,02

Huile d'olive purifiée à l'éther : Q. S.

Indications. — Toutes les affections rhumatismales chroniques.

Posologie. — Une ampoule tous les deux jours en injection intramusculaire profonde. Séries de 10 injections séparées par un repos d'un mois.

Prix :

La boîte de 5 ampoules : 27 fr. 50.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

NÉO-SALYL

du Dr Martinet (Ex-Sodisalyne).

Composition. — Salicylate de soude purifié.

Indications. — Spécifique du R. A. A. Antisep-tique général puissant, Cholagogue de choix, Antinévralgique fidèle.

Formes. — Dragées enrobées, : 2 dragées = 1 gr. de Salicylate de Na.

Gouttes concentrées : L gouttes : 1 gr. de Salicylate de Na.

Ampoules : Intra-musculaires de 10 cc. à 20 p. 100.
Veineuses de 10 cc. à 10 p. 100.

Posologie. — 2 à 10 gr. par jour de salicylate de Na :
Dragées, 1 heure avant les repas de préférence ;
Gouttes, pendant les repas ; Ampoules, 1 à 2 pi-
qûres par jour.

Prix. — Le flacon de 60 dragées ou 60 cc. : 19 fr. 20.
Ampoules : 21 fr. 30 la boîte de 6.

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

NÉOSÉDYL

(Vincent)

Composition. — A base d'acétylsalicylate de calcium, salicylate neutre de calcium, Bromhydrate de Codéine, Diallylmalonylurée, Phénacétine.

Indications. — Toutes les algies, états infectieux (grippe, rhume, etc...) rhumatismes, sciatique, douleur d'origine génitale chez la femme.

Posologie. — Jusqu'à 4 ou 5 cachets par jour pour les adultes.

Avantages. — Formule complexe, dépourvue, du fait de l'absence de tout noyau benzénique, de toute toxicité pour les organes généralement sensibles aux analgésiques : cœur, foie, reins.

Présentation. — Tubes de 14 et 6 cachets.

Dépôts : Établissements BOYER, 12, r. Pavée, Paris, et toutes Drogueries.

Échantillons :

Pharmacie H. BOUISSET

18, boulevard de Strasbourg — ALBI (Tarn).

NÉO-SETI

Solution buvable de Soufre et d'Iode.

Propriétés thérapeutiques. — L'association de Soufre et d'Iode permet le traitement *per os* de toutes les maladies relevant de la Sulfoïodothérapie (A. Léri et Dedet).

Indications. — Rhumatismes Chroniques, Arthrites, Névralgies rebelles, Hypertension artérielle, Asthme et périphlébites.

Mode d'emploi. — Prendre XXX gouttes, 2 fois par jour, aux repas, dans un verre d'eau pure ou sucrée.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

NÉOSOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth.

Indications. — Le Néosolmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

Mode d'emploi. — 2 injections intramusculaires de une ampoule de 1 cc. par semaine.

Présentation :

En boîtes de 12 ampoules de 1 ou de 2 cc. (la solution contient 4 cg. de Bismuth métal par cc.).

Prix de vente au public :

29 fr. 50 la boîte de 12 ampoules 1 cc.

36 fr. 50 la boîte de 12 ampoules 2 cc.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand. — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt :

Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

NÉOSPLÉNINE

Ampoules buvables.

La première synergie d'extraits désalbuminés de rate, foie, muqueuse gastrique.

Indications. — Toutes anémies, Dyspepsies, Déficiences organiques, Hémorragies, Anorexies.

Présentation. — Une ampoule buvable de 5 cc. correspond exactement à 62 gr. 50 d'*organes frais sélectionnés*.

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule buvable le matin à jeun ou avant le repas du midi et du soir dans un demi-verre de liquide. (Gazeux de préférence.)

Avantages. — Cet extrait concentré, préparé avec des organes frais non congelés ni d'importation, privé de ses albumines et lipoides, peut être donné même aux malades à qui ces organes sont interdits : Goutteux, Brightiques, Azotémiques, Entéritiques.

10 ampoules buvables = 22 fr. 50.

8 à 10 jours de traitement.

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoires Français de Gastro-Entérologie

3, place Jussieu — PARIS (V^e).

Tél. : Gobelins 56-71.

Dépôt général O. C. P. France et tous grossistes.

Afrique du Nord : PÉLISSARD

ALGER et CASABLANCA.

NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Énergiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes à base de Néodyme et de Thorium stable d'activité pratiquement illimitée.

Ovules Néothorium Millot.

Métrites : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 10 francs.

Crayons Néothorium Millot.

Endométrites : 2 à 3 par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 16 francs.

Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : 1 ou 2 dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 9 francs.

Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le *bismuth métalloïdique pur*.

Médication spirillicide intramusculaire, dosée à environ 96 p. 100 de Bi élément en milieu aqueux isotonique. (Ampoules de 2 cc., contenant 0,08 centigr. de bismuth par centicube.)

Séries de 10 à 20 injections (1 à 2 par semaine).

Adopté par le Ministère de l'Hygiène.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 fr.

— 12 — : 36 —

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).
(Tél. : Odéon 73-92.)

NÉOTROPE AGUETTANT

Plomb colloïdal électrique stable et non toxique, en ampoules injectables.

Le Plomb colloïdal dans le traitement des Cancers.

Nos recherches entreprises en 1934, avec le Professeur Duroux, nous ont fourni une documentation qui s'enrichit encore chaque jour (action du Néotrope seul ou associé au traitement par les rayons X).

Nous sommes à la disposition des médecins pour leur exposer l'état de la question et leur faciliter des expérimentations personnelles.

L'électro-colloïde de Plomb, que nous sommes seuls à savoir obtenir stable, **n'est pas toxique** et ne donne pas de choc.

Les injections sont suivies d'une hémopoièse importante; jamais nous n'avons observé d'anémie saturnine.

Dose. — 5 cc. par jour ou 10 cc. tous les deux jours, en injection intramusculaire ou mieux intraveineuse. Après 12 injections, cesser 6 à 7 jours et reprendre la cure.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-63.)

NÉPHRACTIVE

Théobromine française, très pure, dosée physiologiquement d'une activité certaine.

Formes. — Cachets dosés à 0,50 de théobromine, pure ou associée : Néphractive pure, caféinée, digitalique, lithinée, magnésienne, phosphatée, Scillitique.

Poly-Néphractive ou Néphractive polycomposée : Chaque cachet contient : Néphractive pure 0,15 ; Scille stabilisée, 0,08 ; Phosphate de soude, 0,10 ; Sulfate de spartéine 0,01.

Indications. — Diurétique employé avec succès dans : *Artériosclérose, Hypertension, Albuminurie, Œdèmes, Rhumatismes, Infections, Affections cardio-rénales, Hydropisie* et chaque fois qu'il faut déclencher la diurèse.

Doses. — 2 à 4 cachets à 0,50 ou 4 à 8 à 0,25 par jour.
Prix : 20 à 22 francs la boîte.

Pour échantillons copieux, écrire : Fabrique Vendéenne de Produits Pharmaceutiques, 10, rue du Pont-aux-Chèvres, à Fontenay-le-Comte (Vendée).

Dépôt : Etablissements Darrasse Frères, 13, rue Pavée, à Paris, et leurs succursales : Rouen, Caen, Rennes, Tours, Moulins, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montauban, Narbonne.

NÉPHRALBINE

Cachets.

Adjuvant du régime lacté et lacto-végétaro-fruitarien.

Composition. — Lactate de Strontium, Gluconate de Calcium, Salsepareille Tampico, poudre de Reins, Diurétiques lénitifs végétaux.

Indications. — L'insuffisance rénale : Albuminuries, Néphrites, etc., Maladies infectieuses, Manifestations anaphylactiques, Arthritisme. Déminéralisation. Diabète rénal.

Posologie. — 3 à 6 cachets par jour pour les adultes. 1 à 3 pour les enfants, de préférence avec une tasse de lait.

La boîte de 30 cachets : 20 fr. 75.

Laboratoire de la Nephralbine.

R. FAURE, Docteur en Pharmacie,
2, rue Carnot — MELUN (S.-et-M.) Tél. : 179.

NÉPHRYLAN

du Dr Lobry (Comprimés)
ALBUMINURIE, OLIGURIE
COLIBACILLURIE

et toutes affections des voies urinaires.

Composition. — Lactate de strontium, Chlorophylle pure, Poudre de rein, Cantharis (à dose homéopathique), Extraits de Lawsonia, de Chymaphyla, d'Aphloïa, d'Uva ursi.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour. Suivre l'avis du médecin.

Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires du Docteur LOBRY
 6, rue Parrot — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 49-31).

NEPTAL

Hydroxy-mercuri-propanolamide de l'acide ortho-carboxy-phénoxy-acétique.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide.

Indications:

Oligurie des affections cardio-rénales,
Cédèmes, Anasarque, Ascites, Hydrothorax, Arthrites, Syphilis
cardio-aortique.

Présentation: Boîte de 3 ampoules de 1 cm³. 5 (sol. à 9,2 p. 100). Boîte de 10 ampoules de 1 cm³. 5 (sol. à 3 p. 100).

Posologie et mode d'emploi. — Injection intramusculaire du contenu d'une ampoule à renouveler éventuellement après 6 à 10 jours. En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques, les fébricitants et les azotémiques à partir de 1 gr. Traitement des syphilis vasculaires par la solution à 3 p. 100.

Le Neptal peut être injecté par voie intraveineuse (Neptal à 3 %) en cas de nécessité, ainsi que dans la cavité péritonéale (Neptal à 9 %) en cas d'ascite.

Prix de vente :

La boîte de 3 ampoules : 11 fr. 70.

N. à 3 p. 100. La boîte de 10 ampoules : 14 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NERGINE

Composition. — La Nergine est une farine de germe de blé dégraissé. Le germe de blé constitué par un sel de calcium et magnésium associé à un acide phospho-organique : l'acide phytinique, et par des sels de fer, calcium, manganèse, réalise un produit reconstituant et reminéralisant d'une activité considérable, rapide et constante.

Indications. — Décalcification, croissance et dentition chez les enfants, convalescence, surmenage, tuberculose, anémie, neurasthénie, allaitement.

Mode d'emploi. — Pour les *adultes* : 4 à 6 fortes cuillerées à café à prendre par jour en plusieurs fois dans un peu d'eau sucrée ; pour les *enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu de lait.

Prix : 9 fr. 60.

Laboratoires Diéto-Pharmaceutiques

Charles HEUDEBERT Fils, Pharmacien
4, rue Lamartine — NANTERRE (Seine).

NERVANTYL MILUC

Composition :

Extrait de Lotus alc.....	0,10
Teinture Aubépine 1/5.....	0,50
Extrait de Nénuphar aq.....	0,05
Extrait de Valériane Stab. alc.....	0,10
Ion Calcium.....	0,05

Excipient sans sucre : Q. S. pour une cuillerée à café ou un comprimé.

Propriétés. — Sédatif des palpitations et des troubles fonctionnels nerveux. — Sédatif du système nerveux à électricité génitale.

Indications. — Toutes dystonies du sympathique, déséquilibre nerveux, émotivité, anxiété, neurasthénie, psychasthénie, mélancolie, palpitations, tachycardie et troubles fonctionnels cardio-vasculaires, éréthisme génital, insomnies.

Présentation et prix :

Solution sans sucre : 18 fr. 70. — Comprimés : 12 fr. (Ass. Soc. : Cat. B.)

Posologie. — Régulateur du système nerveux : 1 ou 2 cuillerées à café ou 1 ou 2 comprimés 1/4 d'heure avant chacun des 2 principaux repas. Contre l'insomnie nerveuse : 2 à 3 cuillerées à café ou 2 à 3 comprimés le soir au coucher.

Chaque cuillerée dans un 1/4 de verre d'eau, ou mieux dans une tisane (feuilles d'oranger). Demi-dose pour enfants.

Assurances Sociales : Catégorie B.

Laboratoires MILUC

L. RAGOUCY, Pharmacien.

2, rue Joseph-Bara — PARIS (VI^e). (Tél. : Odéon 02-53)

NERVOCITHINE (HÉPATISÉE)

du Docteur TISSOT

HÉPATOCITHINE

Ampoules buvables, Dragées, Sirop.

(Hémoglobine et extrait de foie.)

Méthode de Whipple complétée et activée par sels organiques.

Composition et formes. — Sirop, dragées, ampoules buvables par boîtes de 6 ou boîtes de 12.

Hémoglobine et Extrait de Foie frais activés par sels organiques.

Puissance effective supérieure à celle de ces produits pris séparément.

Tout mauvais goût supprimé.

Nervocithine non hépatisée, ampoules injectables.

Indications thérapeutiques. — Toutes les fatigues, anémies, faiblesses, diminution de résistance, anorexie, pertes de forces, convalescences, épuisements, etc. (Paludisme, maladie du foie, etc.).

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour ; 1 à 2 dragées à chaque repas ou 1 à 2 cuillerées de sirop (très agréable).

Enfants : Au-dessus de 7 ans, moitié dose.

Prix : Taxe d'état comprise :

Sirop : 19 fr. 20. — *Dragées* : 14 fr. 40. — *Ampoules injectables* : 14 fr.

Ampoules buvables : boîtes de 6 : 12 francs.

— — — de 12 : 24 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. Mont. 01-91.)

NERVYL ROUSSEAU

Comprimés dragéifiés.

Médication à prédilection vago-sympathique.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Extrait mou de Cratægus	0 gr. 05
— de Gelsemium	0 gr. 005
Bromhydrate de quinine	0 gr. 02
Extrait mou de Passiflore	0 gr. 05
— de Cimicifuga	0 gr. 01
Phényléthylmalonylurée.....	0 gr. 01

Indications. — Tous déséquilibres vago-sympathiques, Insomnies, Asthme nerveux, Émotivité, Anxiété, Irritabilité, Spasme, Angor, Erethisme cardiaque, Troubles cardiaques, Séquelles d'Hystérectomie.

Doses. — 2 à 9 comprimés par jour (doses fractionnées).

Admis par les Assurances sociales.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1732-1.

Laboratoires ROUSSEAU

SENS (Yonne).

NESAL

Régulateur du Système nerveux.

Composition. — 1 mesure contient :

Tartrate Borico-Potassique	
Bromuré	0,80
Phényléthylmalonylurée.....	0,03
Extrait Hydroalcoolique Sta- bil. de Belladone.....	0,01

Propriétés. — Calmant, Sédatif, Hypnotique, Anti-épileptique.

Indications. — 1° Insomnie.

2° Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Troubles nerveux au moment des règles, du retour d'âge, de la puberté, Migraines, Céphalées, Chorée, Tremblements nerveux, Gastrites nerveuses, Hyperexcitabilité, États hypocondriaques, Névroses cardiaques, Pollakiurie, Incontinence nocturne d'urine, etc.

3° Épilepsie.

Avantages. — Produit synergique. Sédatif puissant, mais sans danger, d'une tolérance parfaite, sans accoutumance lors des cures de longue durée.

Forme. — Présentation nouvelle : Granulés à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau, additionnée d'un ou deux morceaux de sucre ou dans une infusion.

Posologie. — 1° Insomnie : 1 mesure avant le coucher. (Dans les cas rebelles, ajouter une mesure vers 18 heures.)

2° Névroses, 2 à 3 mesures par jour.

3° Épilepsie, 3 à 5 mesures par jour.

Flacon petit modèle : 50 doses environ.

Flacon grand modèle, spécial pour cures, 100 doses environ.

Produits POLYPHARMA

Concessionnaire **L. BRUN**, Pharmacien
92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

NESEPTOL BENGUÉ

Composition. — Synergie médicamenteuse à base d'Essence de Pin maritime, Huile de parafine, Éphédrine et Menthol.

Propriétés et indications. — Astringent, Décongestionnant, Antiseptique. Rhumes de cerveau, Rhume des foins, Rhinite chronique, Pharyngite, Angine, Amygdalite, Prophylaxie des affections rhino-pharyngées.

Forme. — Flacon verre breveté, comportant un bouchon à cupule dit Neillère, à la fois verseur et obturateur. Il supprime l'emploi du compte-gouttes et de la cuiller.

Posologie. — Verser deux fois par jour, matin et soir, le contenu de la cupule dans chaque narine, en inclinant la tête.

Prix : 13 fr. 50.

**Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,
Pharmaciens**

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trin. 85-60.)

NESTOGÈNE

Lait en poudre Nestlé.

Lait en poudre demi-gras et sucré (saccharose et maltose-dextrine) obtenu par le procédé du « brouillard ».

Composition :

Matière grasse	12	p. 100.
Matières protéiques	20	—
Lactose.....	30	—
Maltose-dextrine	15	—
Saccharose	15	—
Cendres.....	4,7	—
Eau	3,3	—

432 calories par 100 gr.

Riche en vitamines y compris vit. C., de conservation parfaite, de haute valeur alimentaire et de grande digestibilité.

Indications. — Allaitement normal dès les premiers jours des nourrissons sains, des intolérants au lait, des prématurés et des dystrophiques.

Prix : La boîte de 250 gr. : 11 fr. 50. 500 gr. : 21 francs.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Association de paraaminobenzoates d'éthyle et de butyle sans aucune toxicité. Antiseptique, non irritant.

Propriétés. — Puissante anesthésie de surface par simple contact, pourvu que l'intégrité de la peau soit modifiée, soit accidentellement (ablation, érosion ou même distension), soit naturellement (muqueuse). Suppression rapide et inoffensive de toute douleur ou démangeaison, qui provient ou est accompagnée de plaie, érosion, excoriation, inflammation, irritation, éruption, œdème ou qui a son siège sur une muqueuse.

Formes de présentation. — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

Solution huileuse au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Suppositoires au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Ovules au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Pommade : Prix : 13 fr. 40.

Ovules, Suppositoires. Prix : 17 fr. 70.

Solution huileuse. 16 francs.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod. PARIS.

NESTROVIT

Composition. — Association des 4 vitamines indispensables A, B¹, C, D en proportions minutieusement étudiées et parfaitement équilibrées, permettant un dosage exact, un contrôle sûr, une administration agréable et ne présentant aucun danger même à hautes doses.

Indications thérapeutiques. — Hypo- et Avitaminoses, états de dénutrition, d'inappétence, d'anorexie, déminéralisation provenant d'un régime trop uniforme ou insuffisant, rachitisme et lymphatisme, troubles de la digestion et de l'assimilation, diarrhée et constipation chroniques, grossesse, allaitement, convalescences, troubles de la croissance, cicatrisation insuffisante des plaies, retard de la formation du cal après les fractures.

Avantages. — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue, se dose facilement et est très bien accepté par tous les estomacs, même les plus délicats. Son goût est délicieux, ce qui représente un grand avantage chez les enfants.

Posologie et mode d'emploi. — Pour nourrissons : 1 cuillerée à café par jour ; pour enfants : 2 ; pour adultes : 3, à mélanger au lait du biberon ou à la bouillie ou à prendre au moment des repas.

Enfants de plus de 4 ans et *adultes* : 2 tablettes par jour à croquer telles quelles ou à laisser fondre lentement dans la bouche.

NESTROVIT

Tablettes. Boîtes de 20 et 100.

Liquide. Flacon de 125 cc.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-77 (*liquide*) et 504-78 (*tablettes*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

NEURALGIC CARON

Comp. — Liqueur végétale, agréable à prendre, provenant de la distillation de plantes aromatiques et vulnérables, contenant en solution une combinaison de camphre et de Diméthyléthylpyrazolone.

Un verre à liqueur contient .. 0 gr. 30

Une cuillerée à soupe contient. 0 gr. 22

de Camphorate de Pyramidon spécialement préparé au Laboratoire du Neuralgic Caron.

Propriétés. — Spécifique de la douleur, antithermique, action rapide et persistante, parfaitement toléré sans occasionner jamais d'urticaire ni de bourdonnements d'oreilles, plus actif que tous les médicaments généralement employés.

Indications. — Migraines rebelles, Névralgies, Douleurs périodiques, Grippe, Fièvre, toutes les algies.

Présentation et prix. — Le flacon de 150 cc. : 12 fr. 50
Inscrit au Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 1214-1. — Remboursé par les Assur. Soc.

Posologie. — Une à 4 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires ERLA-LATOUR, Pharmacien,
Avenue de la Gare — TERRASSON (Dordogne).

NEURÈNE

Solution et Comprimés.

Bornéol soluble, principe actif inodore de la valériane associé au principe actif antispasmodique du serpolet.

Doses et mode d'emploi.

Le Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1° La solution, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2° Les comprimés : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Prix : 19 fr. 20.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

NEURÉOL

Présentation et composition. — Association soluble de Véronal, Antipyrine, Valériane, Crataegus, Teinture de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

Avantages. — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

Posologie et mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant de dîner ou de se coucher.

Prix : 16 fr. 10.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien.

3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche stabilisée inodore, renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée (0 gr. 15 par comprimé ou cuillerée à café de solution).

A. Dose et mode d'emploi. — 1° Sédatif : 1 cuillerée à café, ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée ; 2° Hypnotique : de 1 à 4 cuillerées à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher.

Les Enfants supportent bien la NEURINASE.

Solution. — Doses maxima : Enfants de 6 mois : 2 demi-cuillerées à café par 24 heures en plusieurs fois.

B. Indications. — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladie de Basedow, Tics, Alcoolisme aigu et autres délires toxiques, Erethisme cardiaque, Palpitations, Tachycardie, Excitation générale, Dermatose d'origine nerveuse, Prurit, Surmenage.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 16 fr. 65 — Comprimés : 11 fr. 45

Laboratoire A. GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.
(Tél. : Mail. 17-77.)

NEUROCALCIUM

Sirop antispasmodique de l'enfance.

Composition. — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du bromure de calcium les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du chlorure et du **gluconate** de calcium.

Indications. — Tous les syndromes nerveux, spasmodophilie, troubles de la dentition, convulsions, insomnies, cris, terreurs nocturnes, etc.

<i>Gluconate de calcium...</i>	<i>0 gr. 10</i>	} <i>par cuill.</i> <i>à café.</i>
<i>Chlorure de calcium...</i>	<i>0 gr. 10</i>	
<i>Bromure de calcium...</i>	<i>0 gr. 05</i>	

Posologie :

Nourrissons : 2 cuillerées à café par jour et jusqu'à 6 cuillerées à café en cas d'accidents aigus.

Après un an : 2 à 5 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France
19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

NEUROFERYL

Traitement de base des déséquilibres vago-sympathiques et des dépressions.

Composition. — Atropine, Esérine, Fer, Phényléthylmanolylurée, Manganèse, Boldo.

Propriétés thérapeutiques. — Action synergique sur les deux systèmes par l'administration simultanée de paralysants du vague et du sympathique. Action spécifique du fer sur les troubles de la nutrition et du système nerveux, liés ou non à des symptômes anémiques.

Principales indications. — Anxiété, Obsession, Mélancolie, Neurasthénie, Spasmes et angoisses, Neuro-anémie, Psycho-anémie, Troubles endocriniens, Symptômes nerveux post-opératoires, Syndromes solaires, Troubles digestifs d'origine nerveuse, Dépressions physiques et psychiques.

Posologie. — 2 à 6 comprimés dragéifiés par jour.

Le médicament le plus complet des états nerveux, à la fois sédatif, tonique et fortifiant.

Laboratoire Henri LUZUY

Docteur en Pharmacie.

29, rue Carnot — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

NEUROFLORINE

**Sédatif Nervin,
Antispasmodique, Cardiotonique.**

Présentation. — Solution et Comprimés.

Composition. — Synergie phytothérapique non toxique de : Passiflore, Valériane stabilisée, Saule, Cypripedium, Cratægus.

Avantages. — Sédatif puissant inoffensif et sans accoutumance ; véritable régulateur du système nerveux. *Il redonne la stabilité.*

Inodore.

Tolérance parfaite des voies digestives, du foie et des reins. Sans dépression secondaire. Aucune contre-indication.

Indications. — Nervosisme, Etats spasmodiques et anxieux, Insomnies.

Posologie. — *Dose sédatif* : 1 à 2 cuillerées à café ou 2 à 4 comprimés à chaque repas dans un peu d'eau.

Dose hypnogène : 2 à 3 cuillerées à café ou 4 à 6 comprimés en une seule fois dans une infusion chaude, une heure avant le coucher.

Prix : 14 fr. 95. — Durée moyenne : 8 à 10 jours.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

NEUROGALÈNE

*Formule établie d'après les Enseignements de M. le Dr Henri Leclerc,
ex-président de la Société de Thérapeutique.*

Composition. — Extraits aqueux sans alcool et sans sucre.

Une cuillerée à café contient :

0 gr. 02 de Chélideine magus.

0 gr. 10 de cratægus oxyacantha.

0 gr. 05 de Lycium Europæum.

Propriétés. — Sédatif de l'excitation psychique, des états de dépression et d'anxiété. Equilibrant des fonctions neuro-végétatives. Spécifique des spasmes vasculaires et des flexalgies cardiaques.

Indications. — Tachycardie, Cardialgies, Vertiges, tous états névropathiques : Angoisse, Anxiété, Neurasthénie, etc. Enfants agités, instables, troubles nerveux de la vie génitale, etc.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les repas de midi et du soir.

Contre l'insomnie. — Une ou deux cuillerées à café, avant le coucher, dans un peu d'eau ou infusion.

Prix, le flacon 150 cc. : 23 francs.

(Admis aux Assurances Sociales.)

Laboratoires de Phytothérapie Expérimentale

61, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII).

J. LOISEAU, Pharmacien.

(Tél. : Laborde 16-15.)

NEUROGASTRINE

Sédatif nerveux, régulateur des fonctions gastro-hépatiques, antiseptique intestinal et urinaire.

Composition. — Granulé fondant contenant par cuillerée à café :

Charb. act.. 0,50	Phényléthylmalonylurée. 0,015
Urotropine . 0,15	Bromure de Potassium . 0,10
Cit. de soude. 0,10	Extrait de Valériane... 0,025
Ext. de boldo 0,05	Extrait de Jusquiame.. 0,01

Indications. — Pesanteurs gastriques, Aérophagie, Vertiges, Migraines, Insomnies, Angor réflexe, Spasme du pylore, Dyskynésies vésiculaires, Cholécystites, Ulcères gastro-duodénaux, Fermentations, Entérites, Pyélonéphrites, Dermatoses, Prurits.

Mode d'emploi :

Adultes : Une cuillerée à café avant les principaux repas.

Enfants : Demi-dose à partir de 10 ans.

Prix : 17 fr. 65.

Laboratoires E. et G. GLOMAUD

12, bd Saint-Michel - PARIS (VI^e). (Tél. : Dan. 92-66.)

NEURONAL Brothier

Indications. — Angoisse, Emotivité, Vertiges, Anxiété, Spasmes divers, Mal comitial sous ses diverses formes (crises paroxystiques, équivalent). Insomnies de natures variées. Perturbations du système neuro-sympathique.

Composition :

Ethyl-phényl-malonylurée.....	0,10
Belladone totale.....	0,01
Tartrate borico-sodique.....	0,40

Pour un comprimé pouvant se diviser en quatre.

Bien toléré. Accoutumance nulle. La facilité de division des comprimés (division cruciale) permet de traiter les grands et les petits nerveux, de fractionner les doses et de soigner les enfants.

Posologie. — Un quart de comprimé à 4 comprimés par jour. Pour les enfants 1/4 de comprimés à un comprimé pris par quart.

Prix : 19 fr. 20 la boîte de 30 comprimés (120 doses par quart).

Laboratoires Pierre BROTHIER

Docteur en pharmacie.

20, rue Henri-Martin — VANVES-PARIS
(Tél. : Michelet 10-30.)

NEUROPHORYL

**Régulateur du Système Neuro-Végétatif
Sédatif Nervin.**

Composition. — Passiflore, Salix Alba, Adonis, Cratægus, Ballote, Intrait de valériane, Jusquiame et Phényléthylmalonylurée solubilisée par procédé spécial.

Indications. — Tous états de nervosismes, dystonies neuro-végétatives telles que : anxiété, angoisse, émotivité, insomnies, éréthisme cardiaque, aérophagie. Tous états spasmodiques.

Présentation. — Elixir de goût agréable. Flacon de 90 cc. (durée 10 jours environ). Prix : 18 fr. 75.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour dans une infusion chaude.

Laboratoire du NEUROPHORYL

187, rue de Créteil — MAISONS-ALFORT (Seine).
(Tél. : Entrepôt 12-97.)

NEUROPHOS

Forme. — Gouttes

Composition :

Acide phosphorique	33 gr.
Glycérophosphates alcalins.....	10 —
Extrait désalbuminé de glandes orchitiques	20 —
Extrait désalbuminé de glandes interstitielles	20 —
Catalyseur d'oxydation (sel de manganèse spécial).....	2 —
Excipient glycériné et aromatisé.Q. S. p.	100 —

Indications. — Asthénie, Dépression nerveuse, Dépression physique, Fatigue, Surmenage, Dyspepsie hyposthénique, Diabète.

Doses. — XXV à LXXX gouttes (1 à 3 compte-gouttes plein) dans un grand verre de boisson au cours de chacun des deux repas.

Prix : 20 francs le flacon pour une durée d'un mois environ.

**Laboratoires DAGONNOT
CANNES**

NEUROPLEXYL

**Spécifique du nervosisme
et des Troubles vago-sympathiques.**

Présentation : En tube de 50 dragées assimilables.

Composition :

Extrait mou de Jusquiame.....	0,01
— de Passiflore	0,05
— de Cratægus	0,05
Phényléthylmalonylurée	0,01

INDICATIONS :

Ce produit a trois groupes d'indications majeures :

1° L'instabilité neuro-végétative au cours de la *maladie de Basedow* et des *syndromes parabasedowiens*, instabilité à l'origine :

- a. Des troubles du caractère, irritabilité, instabilité, angoisse;
- b. Des troubles vaso-moteurs ;
- c. Des troubles digestifs.

2° L'instabilité du système vago-sympathique dont le déséquilibre subit provoqué par le trouble humoral est l'agent responsable de certains *syndromes anaphylactiques* :

Rhume des foins, Asthme.

Le *Neuroplexyl* trouve là son application principale dans le *traitement de base* longtemps suivi, visant à *modifier le terrain neuro-végétatif* de ces malades.

3° Au cours de certains syndromes cardio-vasculaires, le *Neuroplexyl* est une aide précieuse :

- a. En tant que stabilisateur du système nerveux. Il s'oppose aux *troubles spasmodiques des hypertendus* et permet d'éviter dans une certaine mesure les à-coups paroxystiques ;
- b. Par ailleurs, il trouve une application de choix, de par la dose minime de phényléthylmalonylurée qu'il renferme, dans le traitement :

Des algies des moignons ;

Des troubles vaso-moteurs des phlébites.

POSOLOGIE :

1° Maladies de Basedow et états parabasedowiens : 4 à 6 comprimés par jour.

2° Etats anaphylactiques : 2 à 4 comprimés par jour.

3° Maladies hypertensives et éréthisme cardio-vasculaire : 3 à 6 comprimés par jour.

4° Algies des moignons, troubles vaso-moteurs et douloureux des phlébites : 12 comprimés par jour, 1 comprimé toutes les deux heures.

Aucune contre-indication.

Prix : 18 francs le tube.

LABORATOIRE DU METACUPROL

Barré, pharmacien 1^{re} classe,

5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e). — (Tél. : Jasmin 54-52.)

NEUROPOL

Composition. — Glycérophosphates de Calcium, Fer et Magnésie associés au Nucléinate de Manganèse et à des extraits opothérapiques *nécessaires pour assurer la fixation des éléments minéraux et rétablir le jeu normal des fonctions endocriniennes.*

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, protecteur de la cellule nerveuse. Mor dance du tissu nerveux, lors des traitements hydrargyriques, bismuthiques et arsenicaux.

Présentation. — Comprimés solubles.

Deux formes :

Sexe masculin (testicule) — Sexe féminin (ovaire).

Indications. — Toutes les dépressions, déminéralisation, maladies nerveuses, impuissance, aménorrhée, rachitisme, prétuberculose, frigidity, tétanie.

Doses. — 3 à 9 comprimés par jour.

Laboratoire R. FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS.

Publicité : **Société d'Expansion Thérapeutique**

Société anonyme au capital de 20 000 francs

Siège Social : 129, rue de Turenne, PARIS (III^e).

R. C. 248.921.

NEUROSINE PRUNIER

(*Phospho-Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier.*)

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant du Système nerveux et tonique général.

Mode de présentation. — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, Prétuberculose, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuillerée à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Le flacon ou la boîte :

Prix en France 15 fr. 45.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NEUROSOLÈNE

(Comprimés enrobés)

Composition :

Pilules de Méglin.	Extrait de Jus-	
	quiame	0 gr. 017
	Extrait de Valé-	
	riane	0 gr. 017
	Oxyde de Zinc.	0 gr. 017
Phényl-éthyl-malonylurée ..		0 gr. 017

Indications. — Sédatif du système vago-sympathique.

Posologie :

Avaler sans croquer.

États nerveux : 2 à 4 comprimés par jour.

Insomnie : 2 à 4 comprimés le soir au coucher.

Prix : 15 fr. 60.

LABORATOIRES D'ANALYSES BRÉANT

11, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 23-84.)

NEUROSTHÉNOL

Reconstituant général, neurotonique. Résultats immédiats. Action durable.

Forme. — Gouttes.

Composition. — Extrait total de substance cérébrale, strychnine, acide orthophosphorique, glycérophosphates titrés de sodium, magnésium, calcium et manganèse.

Propriétés. — Tonique rationnel du système neuromusculaire. Modificateur actif des troubles de la nutrition et de l'élimination.

Indications. — Toutes les dépressions (physiques, nerveuses, mentales), surmenage, usure, sénilité, convalescences de maladies infectieuses.

Manifestations alcalosiques (phosphaturie, arthritisme). Auto-intoxication, scléroses.

Posologie. — *Adultes* : XV à XXX gouttes dans un grand verre de liquide, midi et soir, en mangeant.

Prix : 16 francs.

Durée de traitement d'un flacon 12 à 15 jours.

Laboratoire Marcel RICHARD
AUBENAS (Ardèche). — Tél. : 2-79.

NEUROTENSYL

Troubles fonctionnels d'origine sympathico-endocrinienne.

Présentation. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Chlorhydrate de papavérine, Extrait de gui, Sulfate de spartéine, Extrait de Cratægus, Anémone pulvérisée.

Indications. — Troubles sympathiques à la grossesse, à la ménopause, à la puberté, Angoisse, Bouffées congestives, Troubles cardio-vasculaires, Arythmie, Anxiété, Emotivité, Hyperexcitabilité, Tics et spasmes, vertiges.

Mode d'emploi. — Prendre, sans croquer, 2 à 3 comprimés avant les principaux repas.

Laboratoires J.-P. PETIT

72, boulevard Davout. — PARIS (XX^e).
(Tél. : Diderot 55-01.)

NEUROVAROL

Traitement de l'Insuffisance ovarienne et de ses troubles secondaires (excitabilité nerveuse, états congestifs, etc.).

Chaque cachet contient :

1 comprimé de ..	{	Thyroïde	0 gr. 0025
		Ovaire	0 gr. 10
		Ext. valériane stabilisée Dausse...	0 gr. 10
Poudres végétales à propriétés vaso-constrictives..	{	Hydrastis	0 gr. 10
		Gossypium	0 gr. 10
		Viburnum	0 gr. 10
		Hamamelis	0 gr. 30

Posologie. — 1^o Troubles par hypofonction ovarienne, 1 à 2 cachets par jour.

2^o Ménopause physiologique ou opératoire, 1 à 2 cachets par jour pendant 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n^o 233-1.

Prix : 17 francs.

Laboratoires DOUETTEAU frères

20, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

NEUSEDA

Calmant du cœur — Calmant du sympathique.

Chlorhydrate de papavérine...	0 gr. 006
Phényl-éthyl-malonylurée	0 gr. 004
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 033
Anémone pulsatile pulvérisée.	0 gr. 040
Extrait d'aubépine	0 gr. 006
Excipient	Q. S.

Pour 1 comprimé kératinisé.

Dose moyenne. — 3 à 4 comprimés par 24 heures.

Indications. — *Algies et troubles cardiaques* : 4 à 9 comprimés en 2 ou 3 fois dans un peu d'eau.

Déséquilibre vago-sympathique, anxiétés et troubles nerveux, troubles d'hypertension (vertiges), etc. : 1 comprimé toutes les 2 heures.

Spasmes, douleurs, coliques (intestinale, rénale, hépatique, ovarienne) : 1 comprimé toutes les demi-heures.

Excitations nocturnes de la blennorrhagie : 3 à 4 comprimés au repas du soir.

Prix : 22 francs.

Durée du flacon en moyenne : 10 à 12 jours.

A. LYONS, Pharmacien
30, rue Monge — PARIS (V^e).
(Tél. : Odé. 73-42.)

NEUTRACÉTYL NEUTRACÉTYL CHOCOLATÉ

Composition :

1 comprimé ou 1 tablette chocolatée = 0 gr. 60 d'acétylsalicylate basique d'aluminium.

Action :

Antirhumatismal spécifique, antipyrétique et antigrippal. Absolument insipide, ne provoque aucun trouble gastrique. Effet d'une durée supérieure à celui de l'acide acétylsalicylique.

Indications :

Maladies par refroidissement (catarrhes, grippe), états fébriles, rhumatismes, céphalées, névralgies dentaires, névrites, asthme. Particulièrement indiqué chez les malades à estomac sensible ou porteurs d'ulcus gastrique, chez les hyperpeptiques et chez les *enfants*. C'est surtout chez eux que le produit, sous sa forme chocolatée, est utile, car il est accepté avec la plus grande facilité. Chocolat de la meilleure qualité, aucun goût médicamenteux.

Posologie :

Adultes. A la fois : 1 à 3 comprimés ou tablettes chocolatées.

Par jour : 3 à 10 comprimés ou tablettes chocolatées.

<i>Enfants :</i>	1 an :	1/4 de tablette chocolatée	}	1 à 4 fois
	5 ans :	1/2 — —	}	par jour.
	12 ans :	3/4 — —		
	au-dessus :	1 à 1 1/2 — —		

Présentation :

Neutracétyl : Étui de 12 comprimés : 8 francs.

Boîte de 40 comprimés : 17 francs.

Neutracétyl Chocolaté : Boîte de 12 tablettes : 12 fr.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien,

25, bd La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 60-77.)

NEUTROSES-VICHY

Composition. — Chaque comprimé contient :

Sels extraits des eaux du Bassin de Vichy (Deuto-carbonates naturels) ..	0,008
Carbonate de calcium	0,27
Carbonate de bismuth	0,06
Carbonate de magnésium	0,114
Saccharose pure	0,55
Essence de menthe Mitcham	0,0001

Forme. — Comprimés de 1 gramme.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la fonction digestive par excellence.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Hypersthénie, Fermentations acides de l'hyper et de l'hypo-Chlorhydrie.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 5 comprimés, croqués de préférence, 2 heures après chacun des repas, ou bien au moment où l'on sent un malaise.
Enfants : 2 à 3 comprimés.

Laboratoire Médico-Pharmacologique de Vichy
1 et 3, rue Lafloque — VICHY (Allier).

NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets).

Analgésiques. — Antithermiques — Fébrifuges.

Indications. — Grippe — Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques — Rhumatismes — Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : la boîte de 12 cachets, 11 fr. 50.

La boîte de 6 cachets, 6 francs.

Laboratoire CORNAUD et BROSSARD
1, rue du Cordouan — LA ROCHELLE
(Tél. : 21-30.)

Échantillons sur demande des Docteurs.

NÉVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*

Composition. — Teinture de *Cratægus*, *Passiflore*, Alcoolature de *ballote*.

Action. — L'action bien connue du *Cratægus* et de la *Passiflore* est renforcée par la *Ballote* (antispasmodique à action principale sur l'irritabilité neuro-végétative).

Indications. — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, Incontinence d'urine, etc.

Doses. — Action sédatif : 80 à 100 gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : 30 à 50 gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

NÉVROSOL

Remède-type de l'élément douleur.

Formule :

Diméthylamino-		Carb. de chaux.	0,12
antipyriné ...	0,30	Caféine	0,03
Phénacétine	0,20	Chlorure d'amy-	
chl. quinine	0,10	leine	0,003

« Aucun hypnotique. »

Spécificité. — Ne provoquant jamais d'hyperchlorhydrie, de nausées, ni de crampes.

Névrosol, particulièrement indiqué chez les malades porteurs d'ulcus gastriques ou dont l'estomac est sensible.

Indications. — Algies, céphalées, migraines, névralgies, grippe, rhumatisme, goutte, lumbago, sciatique. Douleurs menstruelles.

Posologie. — 1 à 3 cachets par jour.

Prescription strictement médicale.

Boîte de 10 cachets : 9 francs.

Laboratoires ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

Forme. — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux, alcool, arsenic ni strychnine ; XX gouttes = 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie, éléments de constitution et d'entretien des tissus nerveux.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson, sans interruption nécessaire jusqu'à effet obtenu.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux. Aucune contre-indication.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

Prix : 14 fr. 90.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

NEVROVITAMINE 4

Nouvelle dénomination de BEDENAL.

Spécifique des troubles nerveux de l'enfance de l'adolescence.

Composition. — Association des éléments modificateurs du « terrain » (vitamines B. D. E., hypophyse), des éléments sédatifs nervins végétaux (salix, alba, passiflora incarnata), de la phényléthyl-malonylurée, à petite dose.

Indications :

Avant 3 ans : Agitation habituelle nocturne et diurne, spasmodie.

Après 3 ans : Onychophagie, tics, terreurs nocturnes, incontinence d'urine, onanisme, troubles de la puberté, etc...

Forme. — Granulé délicieusement parfumé.

Posologie :

Avant 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Après 3 ans : 3 cuillerées à café par jour (une cuillerée une demi-heure avant chacun des trois repas).

Prix : 18 fr. 70.

**Laboratoire d'ACTINO-BIOLOGIE
LAURENÇON et Cie, pharmaciens
11, rue François-Giraud
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).**

NIGÉRINE VINCENT

Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.

Fixateur par excellence des toxines
et alcaloïdes.

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

Prix : 15 francs.

VINCENT, pharmacien,

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

NITIUM

Bromure de radium suractivé enrichi en rayonnement alpha.

Crayons. — Traitement des métrites chroniques et hémorragiques (Curetage médical).

Ovules. — Vaginites, Ulcérations du col.

Pommade :

Dermatoses rebelles, plaies atones. Ulcérations torpides étendues et infectées. Ulcères variqueux rebelles.

Toutes les présentations contiennent 6 microgrammes de bromure de radium.

Soc^{té} Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

NITRARGOL

**Amino-nitrate d'argent indolore
pour usage externe.**

Indications. — Urologie (lavages et instillations), Gynécologie, Affections oculaires, etc., et toutes indications du Nitrate d'Argent. — S'emploie aux mêmes concentrations.

Indolore. — Ne provoque pas de ténésme. — Puissant bactéricide. — Non irritant.

Formes. — 1° Solution aqueuse à 1 p. 100 en ampoules de 6 cc.

2° En solution aqueuse à 1 p. 2 000, en flacon de 1 litre.

Posologie. — Usages externes : en instillations et lavages uréthro-vésicaux, en badigeonnages, en dermatologie, etc.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. Nord 03-34 et 66-53.)

NOGRYP

Antigrippe total.

Composition. — Chlorhydrate d'éphédrine, phosphate de codéine, benzonaphthol, kola, thiocol, cryogénine, magnésie.

Synergie médicamenteuse permettant de combattre énergiquement les symptômes simultanés de la grippe : fièvre, courbature, embarras respiratoire et intestinal.

Forme. — Boîte de 6 cachets.

Prix : 7,50 N° 1641-1 au L. N. C. M.

Emploi. — 2 à 4 par jour, pris un à un, entre les repas.

Indications. — Grippe, États fébriles, Phtisie, Pneumonie, Intoxication intestinale.

Laboratoire NOGRYP-NAZOÏL

F. LACOSTE, pharmacien, licencié de Chimie,
94, rue de l'École-Normale — CAUDÉRAN
(Gironde).

NORGANGINE

Solution hydro-alcoolique des Glucosides totaux de Rheum officinale, des Glucosides de Matricaria camomilla avec adjonction d'acide salicylique.

Indications. — Toutes les inflammations de la bouche et du pharynx.

Action. — Utilise les propriétés antiphlogistiques remarquables des Glucosides anthraquinoniques.

Son pouvoir de pénétration lui permet d'agir non seulement en surface, mais dans la profondeur de la muqueuse. Rapidement les phénomènes inflammatoires et leur corollaire, la difficulté de la déglutition, s'atténuent pour disparaître.

Emploi. — Une demi-cuillerée à café dans un demi-verre d'eau pour bain de bouche ou gargarisme, badigeonnages ou vaporisations. De préférence toutes les demi-heures.

Prix : 20 fr.

Laboratoires NORGAN

P. ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

NORMACOL

Mucilage Évacuant

puissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

Action. — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

Forme. — Granulé dragéifié très menu.

Dose (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Différentes préparations :

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

Normacol et Charbon : Voir CARBOMUCIL.

Prix : 13 fr. 85.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.
41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Laborde 08-00.

NORMALAX

produit français

Mucilage Type.

Régulateur intestinal.

Non irritant, non toxique, non fermentescible.

Propriétés. — Déclenche le péristaltisme par action mécanique, augmente le bol intestinal.

Pas d'accoutumance. Tolérance parfaite pour les intestins les plus délicats.

Indications. — Tous les troubles de la fonction intestinale.

Constipation, Atonie intestinale.

Doses moyennes. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas. Avaler, sans mâcher, avec un peu de liquide.

Enfants : demi-doses.

Deux préparations. — Normalax simple : mucilage pur. — Normalax au Cascara : Mucilage pur + Cascara 2 p. 100.

Présentation. — Boîte de 200 gr. : 20 francs.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

17, rue Chomel — PARIS (VII^e)

(Tél. : Littré 53-05.)

NORMATENSOL BOURET

Composition :

Tartrate borico-potassique	1 gramme.
Lactose.....	3 grammes.
Mélange sucro-édulcorant	Q. S.

Pour un paquet.

Effets physiologiques. — Par le *Bore* agit sur la thyroïde (Loeper) et libère la sécrétion interne de cette glande hypotensive (De Cyon), est diurétique et débarrasse l'organisme des produits de déchet. Par le *Potassium* il a des effets modérateurs sur le myocarde et les fibres lisses des vaisseaux (Claude Bernard).

Indications. — Hypertension artérielle, Néphrites chroniques, Céphalées persistantes, Dermatoses dues à une insuffisance de l'épuration urinaire.

Avantages. — Pas de toxicité, pas de contre-indication, parfaitement toléré par le tube digestif.

Mode d'emploi. — 1 paquet le matin à jeun et 1 le soir en se couchant, dans 1/2 verre d'eau froide ou tiède, 12 jours par mois ou 2 périodes de 6 jours.

Prix au public : 12 fr. 50.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

NORMOGASTRYL

Tous dyspeptiques, aérophages, petits hépatiques

un comprimé effervescent de 2 gr.	{	Bicarbonate de soude.....	0 gr. 60
		Sulfate de soude sec.....	0 gr. 285
		Phosphate de soude sec.....	0 gr. 195
		Bromure de sodium desséché.....	0 gr. 25
		Chlorure de magnésium.....	0 gr. 03

Excip. citrique. Q. s. pour 1 comprimé effervescent de 2 gr.
5 tubes de 10 comprimés de 2 gr. Prix : 18 francs.

Particularités. — Présence de bromure de Sodium sédatif de l'aérophagie et de l'état général.

En une solution agréable au goût, le dyspeptique trouve l'activation de ses digestions et la disparition de son aérophagie, s'il la prend avant le repas (apparition de citrate de soude) ; une sédation de ses brûlures et malaises s'il la prend après, dans 1/2 verre d'eau.

Emploi. — 1 comprimé avant les repas (hyposthéniques, aérophages) ou après ceux-ci (hypersthéniques) dans 1/2 verre d'eau, matin, midi et soir.

En tous lieux, avec agrément et commodité un comprimé de Normogastryl est une dose qui réalise une solution de Bourget bromurée citratée magnésienne.

J. OLIVE 14, rue des Minimes — PARIS
O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

NORMUCYL

(Granulé)

Mucilage gommeux pur enrobé ni sucré ni parfumé. Créé et expérimenté à Plombières-les-Bains.

Mode d'action. — Laxatif doux agissant progressivement grâce à son très grand pouvoir de gonflement (il absorbe 40 fois son volume d'eau).

☞ Lubrifie la muqueuse. Pas d'accoutumance. Pas de contre-indications.

Particularités. — Ne contient ni phénolphtaléine, ni extraits d'écorces drastiques, ni agar-agar. Ni digestible, ni fermentescible, ni putrescible. Plus même, il s'oppose à l'alcalinisation trop forte du contenu colique et par suite aux putréfactions.

Indications. — *Constipation. Fausses diarrhées.*

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour au cours des repas. Avaler sans mâcher en s'aidant d'un peu d'eau.

Prix. — La boîte renfermant 150 gr. de granulé : 16 fr. 65.

La boîte renfermant 400 gr. de granulé : 39 fr. 55.

Cette dernière permet un traitement de 30 à 40 jours.

Voir également *Boldomucyl* (granulé de Normucyl, charbon végétal activé, artichaut et boldo).

Laboratoires CHATRON

PLOMBIÈRES-LES-BAINS (Vosges)
et 45, rue Cambronne — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 26-79).

NOVACÉTINE PRUNIER

(Saccharure granulé à base de Sulfosalicylate de Pipérazine, Lithine et Soude).

**Antiarthritique énergique
agréable à prendre.**

Indiqué contre les manifestations rhumatismales et gouteuses de l'arthritisme.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café par jour (suivant les cas et l'avis du médecin), à prendre au moment des repas, dissoutes dans un peu d'eau.

Chaque cuillerée à café contient 0 gr. 30 de sulfosalicylate composé.

Prix en France : 16 fr. 45 le flacon.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Ancienne maison Chassaing-Prunier)
1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NOVALIBUT

(ex « HALIBUT »)

Association et concentrations naturelles des vitamines A et D.
Puissant antirachitique biologiquement contrôlé.

Deux formes. — Gouttes et pilules (vanillées et chocolatées).

Composition. — Huile naturelle, non irradiée, de foie du poisson *Hippoglossus Hippoglossus* L., présentant des teneurs considérables de vitamines A et D.

Concentrations. — 1 gramme d'huile contient :

50 000 U. I. vitamine A. ; 6 250 U. I. vitamine D.

Propriétés. — Puissant antirachitique par la vitamine D ; puissant antiinfectieux par la vitamine A.

Indications. — Rachitisme (traitement spécifique et prophylaxie), tous troubles de l'ossification (ostéomalacie, caries dentaires, etc.), tuberculose, pré-tuberculose, maladies infectieuses (traitement curatif et préventif), déminéralisation dans la grossesse, etc...

Posologie. — **Gouttes :** nourrissons : II à III gouttes par jour.

Enfants : IV à VI gouttes par jour (selon l'âge).

Adultes : VIII à X gouttes par jour.

Pilules. — **Enfants** (5 à 10 ans) : 2 à 3 pilules par jour.

Enfants (10-15 ans) : 3 à 4 pilules par jour.

Adultes : 5 à 6 pilules par jour.

Prix. — Gouttes et pilules : 21 fr. 20. Durée minima : 15 jours.

Enregistrés au Lab. Nat. de Contrôle sous les N^{os} 689-30 et 689-31.

Laboratoire DU GLEFINA

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

NOVALIBUT LOCAL LOCALIBUT

Antiseptique, analgésique, biologique, à base de vitamines A et D naturelles pour traitements externes et locaux.

Composition. — A base d'huile pure d'Hippoglossus Hippoglossus L. à très hautes concentrations de vitamines A et D *naturellement associées*.

Propriétés. — Anti-infectieux, analgésique, stimule la réparation des tissus (cutané-muqueux, osseux).

Indications. — Traitements externes (Plaies, Brûlures, Ulcères, Affections et Suppurations cutanées, etc.).

Traitements locaux : Otorhinolaryngologie (Rhinites, Sinusites, suites d'Otites et Mastoïdites), Ophtalmologie (Kératites, Blépharites, etc.).

Modes d'emploi. — En pansements, badigeonnages, pulvérisations, instillations.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 689-37.

Prix du flacon : 21 fr. 20.

Laboratoire du GLEFINA
348, rue Saint-Honoré — PARIS.
(Tél. : Opéra 90-85.)

NOVAMIDE

109 M.

**Traitement des Gonococcies, Streptococcies,
Méningococcies, Colibacilloles.**

Composition. — A base de 109 M, nouveau dérivé soluble de la paraaminophénylsulfamide, très actif, sans action nocive sur le sang.

Indications. — Gonococcie et ses complications, Erysipèle, Fièvre puerpérale, Méningococcies, Colibacilloles, Affections pulmonaires.

Formes. — *Comprimés* de 0 gr. 50.
Ampoules pour injections intraveineuses.

Solution pour usage externe.

Posologie. — *Adultes* : 5 à 10 comprimés par jour.
Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT
Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,
12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE près Saint-Denis (Seine).
(Tél. Nord 03-34 et 66-53.)

NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin

à l'oxyeyanure d'hydrargyre indolores.

Composition. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxyeyanure d'hydrargyre : 1 cgr. ; Novocaïne : 1 cgr. ; Eau distillée : 1 cc.

Propriétés. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indications. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Prix : 18 fr. 20.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

NOVARSÉNOBENZOL BILLON

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfoxyolate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions neutres injectables exclusivement par voie veineuse.

Indications :

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Angines, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Présentations: Ampoules unitaires de 0 g. 15, 0 g. 30, 0 g. 45, 0 g. 60, 0 g. 75, 0 g. 90. Prix suivant dosage.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections intra-veineuses graduées : 0 g. 15 à 0 g. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Le Novarsénobenzol Billon est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations et conforme au Codex 1938.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NOVHEPAR

Indications. — Anémies, convalescences, Traitement auxiliaire de la tuberculose, Insuffisance hépatique.

Composition. — Extrait *total* de foie.

Forme.—*Ampoules buvables*, 3 présentations :

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. 18 fr. 75.

Boîte de 18 amp. de 10 cc. 52 fr.

Anémies, convalescences : adultes.

Boîte de 10 ampoules de 3 cc. 16 fr. 60

Anémies, convalescences : enfants.

Insuffisance hépatique : adultes et enfants.

Posologie.

Une ampoule de 10 cc. par jour, dans de l'eau sucrée, avant le repas.

Une ou deux ampoules de 3 cc. par jour.

Laboratoires du NOVHEPAR
89, rue Martre — CLICHY (Seine).

NOVIGOL

Traitement mercuriel et ioduré.

Sous les trois formes :

Élixir (Prix : 20 fr. 80) :

	A bouche.	A entremets.	A café.
Par cuillerée.....			
Bi-iodure de Mercure.	0,006	0,004	0,002
Iodure de Potassium ..	0,15	0,10	0,05

Dans un véhicule liquide et aromatique-spécial.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à bouche par jour aux repas.

Enfants, jusqu'à 10 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

De 10 à 18 ans : 2 à 3 cuillerées à entremets par jour.

Suppositoires (Prix : 18 fr. 75) :

Adultes : Hg. vif. 0,04 par suppositoire.

Enfants : Hg. vif. 0,015 par suppositoire.

Posologie. — 1 suppositoire le soir au coucher pendant 15 jours.

Globules (Prix : 18 fr. 75) : Sulfophénate Hg. : trente milligrammes pour un globule.

Posologie : { *Adultes* : 4 à 6 globules par jour.

{ *Enfants* (Au-dessus de 10 ans) : 2 à 4 globules par jour.

Indications. — Cure d'imprégnation mercurielle entre les séries de piqûres. Traitement de consolidation et d'entretien :

Hérédo-Syphilis, Dermatoses, Artério-Sclérose.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1660-1.

Laboratoire du NOVIGOL

24, rue de Lesson — ROCHEFORT-SUR-MER (Ch.-Inf.) (Tél. : 1-00.)

NOVISMUTH

Composition. — Sous-nitrate de bismuth pur, très léger, très couvrant, peu chargé en acide nitrique combiné.

Propriétés. — Adsorbant, sédatif, protecteur des muqueuses gastriques et intestinales.

Indications et posologie. — C'est au médecin traitant seul qu'il appartient de fixer la posologie du Novismuth.

Le Novismuth est en général constipant à faible dose et laxatif à haute dose.

Les indications que nous donnons ci-dessous sont d'ordre général :
Ulcères gastriques ou duodénaux : 3 à 10 gr., 1/2 h. avant chaque repas.
Dyspepsies, Crampes, Aérophagie : 3 à 5 gr. 3 à 4 fois par jour.

Colites, Constipation : 20 gr. par jour, pendant 20 jours le matin à jeun.
Fermentations et Infections intestinales, Entérites, Helminthiase, Colibacillose : 3 à 5 gr. au réveil à chacun des principaux repas et le soir au coucher.

Chez les enfants, réduire les doses de moitié ou des 2/3 suivant l'âge. En cas de selles blanches ou grisâtres, suspendre momentanément la médication.

Prix : *Novismuth pur*, 200 gr. : 70 fr. (Prix public.)
 — — 100 gr. : 36 fr. —
Novismuth kaoliné, 200 gr. : 54 fr. —
 — — 100 gr. : 28 fr. —

Laboratoires POINTET et GIRARD,
 30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (III^e).
 (Tél. : Archives 03-29 ou 42-40.)

NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes,
 avec addition de lupulin et de phosphates.
 (Bromure non spécifié.)

Préparation et marque absolument françaises.

Le Novo-Brol est le *seul produit utilisant* les remarquables *vertus* calmantes du *lupulin* (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications. — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose. — Ecraser les tablettes de Novo-Brol dans une tasse d'eau bouillante, pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. Na Br chim. pur desséché 1 gr par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour — Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour. — *Enfants nerveux* : 1/2 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppement spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain paraffiné — dépôt de garantie.)

Contenance : 30 tablettes. — Prix : 21 fr. 30.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET
 62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
 (Tél. : Auteuil 11-86.)

NOVOCORTEX ISCOVESCO

Extrait de la partie corticale de la glande surrénale
en gouttes

Hormones antitoxiques et antiasthéniques.

Indications :

Toutes les maladies infectieuses.

Toutes les convalescences.

Toutes les asthénies.

Hypotension. Troubles végétatifs du système nerveux. Vomissements de la grossesse.

Aucune contre-indication.

Posologie générale. — XXX à XL gouttes par jour au minimum en deux prises dans un peu d'eau quelques minutes avant les repas. Ces doses doivent être augmentées dans les cas graves afin de permettre l'administration de plus grandes quantités d'hormones corticales.

Posologie infantile. — De 2 à 6 ans, X à XX gouttes par jour : — au-dessus de 6 ans : dose normale.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS. (Wag. 07-90.)

NOVOLACTOL DAGUIN

Forme nouvelle. — Afin d'assurer un dosage rigoureux, le granulé est remplacé par des comprimés se délayant facilement dans l'eau sucrée.

Composition. — Papaine extractive ; Citrate de soude ; Benzonaphtol ; Ferments lactiques.

Dose :

Nourrissons : 2 à 3 comprimés par jour.

Enfants 15 mois à 2 ans : 3 à 4 comprimés.

Et au-dessus, 5 par jour.

Indications. — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons ; éruptions cutanées. Intoxication alimentaire.

Prix : 12 fr. 75 la boîte.

Laboratoire DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

NOVOLUG

Composition :

Arrhénal	0,002
Hydrargyrophénoldisulfonate de soude. (Soit 1,5 centigramme Hg métal.)	0,042
Sirop aromatisé à la groseille framboisée. Q. S. pour 1 cuillerée à soupe.	

Indications :

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

Posologie :

<i>Adultes</i>	2	cuillerées à soupe	par jour.
3 à 6 ans	2	— à café	—
6 à 14 ans	3	— à café	—
14 à 20 ans	2	— à dessert	—

(A prendre aux principaux repas.)

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

Observation importante :

Goût très agréable. Étiquette discrète.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

NOVOPLASMINE

1° Dragées à noyau glutinisé
(En boîte de 3 tubes.)

Composition. — *Eléments hémapoïétiques et catalyseurs* (extraits de foie, extrait d'antré pylorique, carotène, vitamine D). — *Eléments reconstitutifs des hématies* (globinates de fer, de manganèse, de cuivre). L'action des globinates dans le traitement de l'anémie secondaire n'est plus à démontrer, depuis les travaux de G. Fontès et de L. Thivolle. Ils permettent de faire ingérer, en même temps que le fer, le manganèse et le cuivre, le groupement prosthétique de l'hémoglobine « la globine », et par suite de refaire très rapidement les hématies et l'hémoglobine que réclame tout anémique. — *Aliments nerveux* (phosphate de magnésie associé à la noix vomique et au fluorure de calcium).

Indications. — Anémies graves (Biermer et autres); anémies secondaires (grippe, tuberculose, cancer, paludisme, etc.); anémies post-hémorragique, par hémolyse; anémies de la puberté et de la grossesse; anémies provoquées par certains traitements (curiethérapie, röntgenthérapie, bismuthothérapie, chrysothérapie, etc.); convalescences, asthénie, surmenage, etc.

Posologie. — 1° *Adultes*: 2 à 3 le matin ou le midi, et 2 à 3 le soir aux repas. 2° *Enfants*: 2 à 3 par jour en 2 ou 3 fois.

2° Solution injectable
(en ampoules de 1 cc.)

Présentation. — **Novoplasmine A** (solution faible pour commencer le traitement des adultes et pour les enfants). **Novoplasmine B** (exclusivement pour les adultes en cours de traitement).

Composition. — Complexe nucléino-strychniné en milieu spécial, pour le traitement spécifique de la tuberculose, sous toutes ses formes (pulmonaire, ganglionnaire, osseuse, abcès froids, organes génitaux, lupus, etc.). Une seule contre-indication: la tuberculose pulmonaire en poussée évolutive.

Action. — Bactéricide, antitoxique, leucocyto-gène. L'action est quelquefois si rapide que l'on est étonné du changement radical qui survient presque brutalement: retour de l'appétit, disparition des troubles gastro-intestinaux, de la toux, de l'insomnie, des sueurs nocturnes, de l'affaiblissement nerveux, augmentation régulière du poids (parfois de 1 kilogramme par semaine).

Doses. — *Adultes*: de 1/2 cc. de **Novoplasmine A** à 1 cc. de **Novoplasmine B**. *Enfants*: ne se servir que de **Novoplasmine A**. Pour la technique des injections, consulter la notice placée à l'intérieur de chaque boîte. Brochure sur demande.

Laboratoires LINDEUX

7, avenue des Marronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

NOVOSPASMYL

Antispasmodique. Sédatif nerveux.

Composition :

Extrait de belladone titré.....	0,002
Extrait de jusquiame titré.....	0,01
Phényléthylmalonylurée.....	0,01
Extrait de cratægus stabilisé...	0,04
Bromhydrate de quinine	0,04
pour 1 comprimé dragéifié.	

Indications. — Tous les troubles fonctionnels reconnaissant une origine spasmodique ou nerveuse.

Posologie. — De 2 à 6 comprimés par jour, à prendre au début des repas, en 2 à 3 fois, avec un peu d'eau.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 20 francs.

Laboratoires HENRI FRILLEY

94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

NOVURIT

Diurétique mercuri-purique.

Suppositoires. — Ampoules de 1 et 2 cc.

Composition :

Sel de sodium de l'allylamidométhoxytriméthylcyclopentane-dicarboxonate hydroxy-mercurique à raison de : 0 gr. 10 pour 1 cc. + 0 gr. 05 de théophylline ; 0 gr. 50 pour un suppositoire.

Action :

Diurétique très énergique sans effet toxique aux doses indiquées.

Indications :

Sous ses deux formes :

Œdèmes d'origine cardio-rénale, ascites de toute origine, cirrhoses hépatiques, hydrothorax, péricardites séreuses, pleurésies, hydarthroses, œdème pulmonaire, œdèmes rénaux, etc.

Les suppositoires :

Sont particulièrement indiqués : au cas où les injections intraveineuses ou intramusculaires sont impossibles (oblitération veineuse et nodules fessiers).

Dans les cas récents de troubles cardiaques, où une cure d'injections n'est pas encore indiquée.

Pour le maintien du régime hydrique au lieu de l'administration *per os* de théobromine ou de théophylline.

Pour l'amaigrissement dans les cas d'obésité hydrophile.

Et en général : dès que l'état du malade demande une thérapeutique active et cependant prudente.

Contre-indications :

Glomérulo-néphrites chroniques et aiguës, affections intestinales diarrhéiques, états fébriles, cachexie. S'il existe des lésions de la muqueuse rectale, ne pas employer les suppositoires.

Posologie :

Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par semaine, deux heures environ après évacuation intestinale spontanée ou par purgation douce. Les introduire profondément. Par ailleurs, mêmes remarques que pour le traitement par injections.

Ampoules : 1 à 2, au maximum 3 injections de 1 à 2 cc., intraveineuse ou intramusculaire, par semaine.

En cas de décompensation cardiaque, traitement digitalique préparatoire. On augmente la diurèse en donnant les deux jours seulement qui précèdent chaque administration du Novurit, 9 à 12 dragées de Chlorammoniac *pro die*.

Présentation :

5 ampoules de 1 cc. — 5 ampoules de 2 cc. — 5 suppositoires.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE, M. Lefebvre, Pharmacien

25, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Tél. : Ségur 60-77.)

NUCIPHOS

Agent incomparable de la suractivité cellulaire avec phagocytose exaltée entraînant une réparation des tissus, modifiant le terrain d'évolution de toutes affections microbiennes.

Injection indolore pendant et après la piqûre.

Indications. — Asthénie, Cachexies de toutes origines, Neurasthénie, Surmenage, Amaigrissement, Prétuberculose, Gripes et Convalescences, Anémie, Suite d'interventions chirurgicales, Anémie sénile.

Doses. — Le traitement est de trois séries de 10 piqûres à raison d'une ampoule tous les deux jours avec repos de dix jours entre chaque série.

Prix : 27 francs.

Durée d'une série : 20 jours.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

NUCLÉARSAN

(Élixir)

Tonique analeptique et puissant reconstituant, favorise le métabolisme organique.

Formule. — Arrhéнал, Acide nucléinique, Formiate de soude, Acide Phosphorique, Glycéro de Soude et de Magnésie, Teintures de Kola et de Damiana dans excipient aromatisé.

Indications. — Prétuberculose, Asthénie, Cachexie, Dépression nerveuse, Chlorose, Convalescence, etc...

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée (Voir *Nucléatol*) avec le méthylarsinate de soude.

Granulé. Comprimés. Ampoules injectables

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesures, 5 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

Prix : *Granulé* : 17 fr. 20

Comprimés : 17 fr. 70. — *Ampoules* : 19 fr. 75.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon et 08-55 38-75.)

NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates et de nucléinate de soude.

Granulé : glycérophosphate de chaux et de soude et nucléinate de soude. — *Injectable* : glycérophosphate de soude pur et nucléinate de soude.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesure de granulé aux repas ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

Prix : *Granulé* : 17 fr. 20. — *Ampoules* : 19 fr. 5.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

NUCLÉOCARDYL

Traitement des troubles cardio-vasculaires
par l'ADENOSINE

extraite de muscles d'animaux jeunes.

(Communication à l'Académie de médecine, séance du
18 janvier 1938.)

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique physiologique à action directe sur l'innervation vasomotrice.

Trois formes : Ampoules injectables, gouttes, comprimés dragéifiés.

Indications. — Angor, Coronarite, Asthme cardiaque, Tachycardie, Tachyarythmie, Névroses cardiaques, Refroidissement et Asphyxie des extrémités, Claudication intermittente, Hypertension.

Posologie :

Traitement d'attaque : Ampoules : 1 ou 2 ampoules par jour en injection sous-cutanée.

Gouttes : 2, 4 ou 6 prises par jour (chaque prise est de LX gouttes).

Traitement d'entretien : 2, 4 ou 6 comprimés par jour.

Laboratoire A. DEFFARGE

Docteur en Pharmacie

188, cours de la Somme — BORDEAUX.

(Tél. 91-609.)

NUCLERGOL

Granulé à base de Manganèse, Phytines, Lipides spléniques, Carotènes (Vitamines A), Oxalate de fer.

Reconstituant général des forces physiques et du système nerveux, Chlorose, Asthénie, Convalescence, Dénutrition, Troubles de la croissance.

Posologie. — *Adultes :* 1 cuillerée à dessert au début de chaque repas.

Enfants : à partir de huit ans, une cuillerée à café.

Prix : 18 fr. 70.

Laboratoire BIOSÉDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23.)

NUJOL

Huile de paraffine.

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

CRÈME DE NUJOL

Émulsion.

Description. — La Crème de Nujol est une émulsion d'un blanc très pur et d'un goût agréable, à base de Nujol, dont elle possède les propriétés thérapeutiques. Ne contient pas de sucre ; convient aux diabétiques. Est recommandé pour les enfants et toute personne acceptant difficilement l'huile de paraffine pure.

Indications. — Traitement de la constipation.

Dépôt Général :

Société Générale

d'Applications Thérapeutiques.

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

NUTROMALT

Sucre nutritif pour le biberon
d'après la formule de Soxhlet.

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H₂O 2 %.
Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Maternise le lait de vache, s'emploie contre les selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

Mode d'emploi. — Une demi-cuillerée à café par biberon (soit 5 grammes environ) pendant les 3 premières semaines, puis une cuillerée à café par biberon (soit 10 grammes environ). Durée de consommation : 10 jours.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

NUXEOL

Élixir physiologique complet.

Tonique, reconstituant, reminéralisant, digestif.

Composition :

Juglan Regia, ext. mou...	0,15	Chl. manganèse.....	0,10
Noix de kola, ext. mou...	0,10	Ac. phosphorique off....	0,05
Ec. oranges am., ext. mou.	0,10	Phosphate disodique.....	0,05
Noix vomique, ext. sec ...	0,007	Excip. généreux aromatisé	100 cc.

Indications. — Anémie, Débilité, Convalescence, Prétuberculose, Tuberculose, Neurasthénie, Inappétence, Dépression nerveuse, Surmenage physique et intellectuel, Tous États asthéniques et atoniques, Maladies de la nutrition.

Ne contient pas d'arsenic.

Très bien toléré par les hépatiques et les malades du poulmon.

Forme. — Elixir très agréable au goût. 450 cc. environ : 19 fr.

Posologie. — 2 à 3 fois par jour, prendre avant les repas.

Adultes : une cuillerée à soupe.

Enfants : au-dessus de 10 ans, 1 cuillerée à entremets ;
de 6 à 10 ans, 1 cuillerée à café.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle.

Dépôt général :

Laboratoires BORDELAIS,
47, rue Maleret — BORDEAUX.

OBSOR

(Dragées.)

Présentation. — En étui de 50 dragées.

Principes actifs. — Iodure d'amidon, Glandes thyroïdes desséchées, Extrait de fucus, Extrait de Bourdaine.

Indications. — Obésité, disparition de la graisse, augmentation des forces sans modification de régime.

Mode d'emploi. — Prendre 2 dragées au milieu des deux principaux repas.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

OCRÉINE GRÉMY

Traitement des insuffisances ovariennes de la puberté à la ménopause.

Formule:

Chaque pilule correspond à 0 gr. 20 de corps jaune frais. Existe sous 3 formes pharmaceutiques.

Pilules : 4 à 6 par jour.

Gouttes : XXX à L par jour dans un peu d'eau.

Ampoules : 1 injection intramusculaire tous les 2 jours pendant la période du traitement.

Indications:

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, bouffées de chaleur, migraine, obésité, rhumatisme de la ménopause, acrocyanose et toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne.

Permet de réaliser, en association avec la **Follestrine Grémy** (voir à ce nom), le cycle physiologique ovarien.

Prix : *Pilules-Gouttes* : 22 francs. — *Ampoules* : 27 fr. 50.
14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

OCTENSANOL

Solution à 1 p. 10.000 d'alcool octylique primaire.

Indications. — Hypertension artérielle et ses conséquences.

Formes thérapeutiques. — Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

Boîte de 12 ampoules : 32 francs au public.

Perles glutinisées, Boîte de 42 : 19 fr. 20 au public.

Posologie. — 1 ampoule tous les deux jours (série de 12). 3 à 6 perles par jour.

Bibliographie. — Clerc, R. Paris, J. Stern, *P. M.*, 25 nov. 33; F. Pezzangora, *C. R. Soc. Biol.* 1935, 119, 1931; M. Loeper, Mougeot et Aubertot; *Presse méd.*, 1934, n° 42, 857.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

OCULASE

Forme. — Solution.

Composition. — Acide borique, antipyrine, sulfate de zinc en solution tamponnée, rigoureusement isotonique et neutre aux larmes.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Soins prophylactiques et curatifs de toutes les infections oculaires primitives ou secondaires : conjunctivites, orgelets, blépharites.

Mode d'emploi. — S'utilise en tamponnements ou en bain d'œil tièdes, renouvelés.

Prix :

Le flacon de 125 cc	7 fr. 30
— 250 cc	12 fr. 50

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

ODARSOL

Opiat dentifrice antispérochétosique, contenant 0 gr. 50 p. 100 de Sulfo-Tréparséan, parfumé aux essences de menthe et de badiane.

Indications. — Préventif et curatif des infections buccales : Pyorrhée alvéolaire, polyarthrite alvéolo-dentaire, ulcérations buccales, amygdalites, angine de Vincent.

Peut être utilisé journellement pour l'hygiène dentaire.

Forme. — Tube de 31 grammes.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ŒNOPHOS

*Acides hydroéthylène-phosphorique.
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Formes. — Elixir, granulé, gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Neurotonique, reconstituant énergétique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (*Voir fiche DOLOMA*). Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose*.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'Elixir ou 2 cuill. à café de Granulé ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante, voir « DOLOMA ».

Prix : La boîte granulé Œnophos.	18 fr. 70
Le flacon gouttes	15 fr. 60
— élixir	20 fr. 80

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.
29, place Bossuet — DIJON.
Tél. : 16-42.)

OÉRÉLIODE

Iode de l'Otorhinolaryngologiste.

La plus active et la mieux tolérée des préparations iodées.

Solution huileuse d'Iode d'absolue pureté, *non combiné*, entièrement diffusible à froid. Huile *violette*, neutre, indolore, non irritante.

Indications. — Rhinites, Affections catarrhales et inflammatoires du nez, Infections et congestions des muqueuses naso-pharyngées, du larynx, des amygdales, otites, otites mycosiques.

Echantillons gratuits sur demande.

Le flacon de 50 cc. Prix : 14 francs.

— 30 — — 10 fr. 75.

Laboratoire BOUVOT

AUVERS-SUR-OISE (S.-et-O.).

(Tél. : Auvers 49.)

ŒSTROBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré
associé à une solution de Folliculine
titrée physiologiquement.

Boîte de 15 tablettes.

1 tablette { Na Br..... 1 gramme.
contient : { Folliculine 100 unités internationales.

Mode d'emploi et doses. — 1 à 2 tablettes 2 fois par jour : matin et soir.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait dissoudre 1 ou 2 tablettes : on prépare ainsi un bouillon savoureux qu'il convient d'absorber le plus chaud possible.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles nerveux accompagnant une dysfonction ovarienne : Aménorrhée, Dysménorrhée et surtout Ménopause.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-62.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

ŒSTROGLANDOL « ROCHE »

Hormone œstrogène titrée biologiquement

Une ampoule ou 1 comprimé ou 1 gramme d'onguent
= 1.000 unités internationales.

Indications. — Tous les troubles dus à une insuffisance ovarienne. Troubles de la Puberté et de la Ménopause, Acné, Prurit vulvaire, Céphalée, Vertiges, Dysménorrhée, Aménorrhée, Hypoplasie génitale, Retard des règles, Ménopause précoce.

Doses et modes d'emploi :

Comprimés (flacon de 20) : 1 à 2 par jour.

Ampoules (boîte de 6) : 1 à 2 par jour, deux à trois fois par semaine.

Onguent (tube de 20 gr.) : en applications suivies d'un léger massage matin et soir.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous les n° 504-73 (*ampoules*), 504-74 (*comprimés*), 504-75 (*onguent*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

OKAMINE Simple

Formule N° 2 du Dr Dani Hervouet :

Glycocolle.....	2 gr. 50
Méthylglycocolle	1 gr. 50
Monométhyl N Leucine gauche.....	1 gr.
Solvant isotonique.....	Q. S. p. 100 cc.
Boîte de 10 ampoules de 2 cc.	

Mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée tous les deux jours.

Indications. — Toutes tuberculoses courantes.
Toute déficience organique. Supprime les vomissements gravidiques.

OKAMINE Dragées

Glycocolle, 4 gr. ; Sarcosine, 0 gr. 40 ; Leucine, 0 gr. 40 pour un flacon de 40 dragées.

Mode d'emploi. — 2 à 4 avant le petit déjeuner.

Indications. — Prolongent et renforcent les ampoules. Toute affection broncho-pulmonaire.

Enfants adénopathiques.

OKAMINE Cystéinée

Formule N° 3 du Dr Dani Hervouet.

Boîte de 20 ampoules pour 10 injections.

10 ampoules N° 1 de 2 cc.

Okamine et solvant spécial.

10 ampoules N° 2 de 1 cc.

Cystéine et solvant spécial.

Le mélange des deux ampoules dans la seringue est isotonique.

Mode d'emploi. — 1 ampoule tous les deux jours en injection sous-cutanée.

Indications. — Tuberculoses graves ou rebelles pour traitement tenace.

Remboursables par les Assurances sociales.

Laboratoire Contrôle 8847 $\begin{matrix} \swarrow 1 \\ 2 \\ \searrow 3 \end{matrix}$

P. BLOUIN, pharmacien,

50, rue de Turenne — PARIS. (Tél. : Arc. 93-14.)

Dépôt général : DARRASSE Frères,

13, rue Pavée — PARIS (IV°). (Tél. : Tur. 84-40.)

OLBIA

Solution huileuse de Bismuth.

(Dicamphocarbonate de Bismuth.)

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes, Spirilloses, Spirochétoses.

Formes :

- 1° Ampoules de 2 cc. pour injections intramusculaires indolores ;
- 2° Ampoules de 1 cc. pour injections intramusculaires indolores.

Posologie :

Adultes : Injecter dans la région fessière une ampoule de 2 cc. tous les 4 jours.

Enfants : Injecter dans la région fessière une ampoule de 1 cc. tous les 4 jours.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. Nord 03-34 et 66-53.)

OLCALAN

Composition :

Borate de soude, Huile d'Olive stérilisée,
Eau de chaux, Lanoline.

Trois présentations : OLCALAN SIMPLE,
OLCALAN SALICYLIQUE, OLCALAN
RÉSORCINE.

Tubes de pommade.

A employer dans toutes les irritations de
l'épiderme : Eczémas, Brûlures, Rougeurs
des Nouveau-Nés, Prurit, etc...

Le tube : 6 fr. 25.

Enreg. au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX (Gironde).

Tél. : 840-78.

OLEGEL

Association d'huiles essentielles rigoureusement pures, présentées en gelée transparente, grâce à un procédé spécial, sans adjonction d'aucun mucilage.

Formule :

Pélargonium odorantissimum.....	5
Rosmarinus officinalis	5
Cupressus sempervirens.....	2,5
Thymus vulgaris.....	2,50
Lavandula officinalis	10
Excipient neutre	75

Pour 100 de gelée.

Indications cutanées. — Brûlures, plaies septiques, plaies atones, ulcères variqueux, furoncles et toutes pyodermes.

Indications gynécologiques. — Métrites, salpingites, pertes et toutes affections gynécologiques.

A employer, soit pure, soit en dilution aqueuse, l'OLEGEL formant instantanément au contact de l'eau une solution opalescente stable.

Tube de 50 grammes.

a) Gelée. — b) Ovules. — Boîte de 6 ovules.

L. CHAUVIN, Pharmacien,
3, rue de Vouillé — PARIS (XV°).

OLÉOCHRYSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie et Calcithérapie par injections de suspension huileuse.

L'Oléochrysine Lumière est une suspension dans l'huile d'auro-thiopropanol sulfonate de calcium, teneur en or 35 p. 100, taux calcique 4.52 p. 100.

L'Oléochrysine Lumière présente le considérable avantage de n'exercer aucune agression brutale à l'égard du rein et autres émonctoires ou organe, le calcium accroît encore la tolérance.

Une injection intra-musculaire tous les 4 ou 5 jours réalise une imprégnation continue. Absorption lente, régulière, acquise totalement en un temps variant entre 96 et 120 heures.

L'absorption à doses filées se trouve ainsi réalisée, d'où une fixation organique de l'or plus élevée que lorsque le sel est brutalement absorbé.

Tuberculose sous ses diverses formes et, au premier chef, Tuberculose pulmonaire, sans nulle restriction imposée par les caractères évolutifs de l'affection.

Dans les Tuberculoses dites externes : cutanées, osseuses, laryngées, ganglionnaires, articulaires, des résultats satisfaisants sont atteints par l'usage de l'**Oléochrysine Lumière**. Les localisations rénales sont elles-mêmes favorablement influencées par l'**Oléochrysine Lumière** qui doit alors être administrée avec précaution sous le contrôle d'une surveillance minutieuse.

Rhumatismes et, plus particulièrement, la grande polyarthrite chronique infectieuse. Non seulement un rhumatisme chronique infectieux traité par l'**Oléochrysine Lumière** cesse d'évoluer, mais encore des malades immobilisés depuis des années par des nouures articulaires extrêmement douloureuses ont récupéré intégralement ou presque leur faculté de mouvement.

Maladies infectieuses diverses : Lèpre, Syphilis.

Dermatoses : Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis, sont traités avec l'**Oléochrysine Lumière** avec des résultats inégalés dans de telles affections par tout autre traitement chimique.

Affections du système nerveux : Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse (l'or franchit la barrière méningée), de plus l'**Oléochrysine Lumière** semble donner quelques résultats dans la sclérose multiloculaire considérée comme échappant aux ressources de la thérapeutique.

L'Oléochrysine Lumière est livrée en ampoules de 0 gr. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 30.

Mode d'emploi :

Tuberculose. — Début 0 gr. 10, puis 0 gr. 20 et 0 gr. 30. 1 injection tous les 5 jours. Traitement de 10 à 40 injections.

Rhumatisme. — Mêmes directives, mais progression lente des doses. Récidiver 2, 3 ou 4 fois les dosages 0 gr. 10 et 0 gr. 20, ensuite 0 gr. 30.

Laboratoires LUMIÈRE
45, rue Villon — LYON.

OLÉOCHRYSOS LUMIÈRE

(CH₂ S Au CHO₂ SO₃ Sr)

Suspension dans l'huile

d'Aurothiopropanol-sulfonate de strontium

Teneur or 47,9 % — Taux du strontium 10,6 %

L'Oléochrysos Lumière est un sel hydrosoluble, à hydrosolubilité restreinte (0,9%) de sel d'or et de strontium en combinaison sulfo-organique; cette combinaison est de celles qui permettent d'atteindre au plus haut index thérapeutique, par rapport au poids d'Or administré.

L'Oléochrysos Lumière est totalement absorbé, lentement et avec régularité; l'élimination sous de faibles concentrations n'est pas irritante pour les émonctoires, car jamais elle ne leur impose une quantité massive de déchets.

Tuberculose — sous ses diverses formes — succès particulièrement tangible à l'égard des poussées évolutives, mais les Tuberculoses chroniques avec lésions anciennes n'échappent pas à l'indication de l'Oléochrysos Lumière.

Rhumatismes. — et tout particulièrement la grande polyarthrite chronique infectieuse que l'Oléochrysos Lumière arrête dans son évolution et permet aux malades de récupérer intégralement ou presque leur faculté de mouvement.

Affections des yeux qui s'apparentent au Rhumatisme, telle l'iridocyclite.

Maladies infectieuses diverses : Lèpre, Syphilis.

Dermatoses : Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis, sont traités avec l'Oléochrysos Lumière.

La maladie de Nicolas-Favre est justiciable de l'Oléochrysos Lumière.

Affections du système nerveux : Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse. L'or franchit la barrière méningée.

L'Oléochrysos Lumière est livré en ampoules dont le dosage est indiqué en Or élément.

Les dosages sont 25 milligrammes, 50 milligrammes et 100 milligrammes d'Or-métal. Le but essentiel étant d'administrer de l'or, il est logique de fixer les doses en Or-métal.

Le rythme moyen des injections est bi-hebdomadaire ou hebdomadaire.

Mode d'emploi :

*Pour tâter les susceptibilités individuelles
et chez les sujets jeunes : débiter par 25 milligrammes d'Or.
Cette dose permet l'Or aux hypersensibles.*

	Début	Doses ultérieures	Rythme	Nombre d'injections
Tuberculose	50	100	Chaque	De dix
Lèpre	milligr.	milligr.	7 ou 10	à
Spirillose	d'Or	d'Or	jours	quarante

Après une série, cessation de 1 à 2 mois, puis reprise du traitement

Rhumatisme...... } Mêmes directives générales, mais progression lente des doses; récidiver 2 ou 3 ou 4
Sclérose multiloculaire..... }
Psoriasis...... } et même 5 fois les dosages.
Lupus érythémateux..... }
Syphilis...... }

Alterner la thérapeutique par l'arsenic, le mercure, le bismuth, l'antimoine, avec des séries d'Oléochrysos Lumière, dont l'intérêt essentiel est dans la prévention des accidents nerveux et, le cas échéant, la cure de ceux-ci.

L'index toxique de l'Oléochrysos Lumière est inférieur à celui de l'Oléochrysin et à celui de l'Allochrysin, d'où possibilité d'user de doses plus élevées qu'avec l'un et l'autre de ces produits.

Pas de contre-indications formelles. Cependant il est préférable de s'abstenir chez les sujets présentant un trouble profond, des constantes hématiques, une albuminurie importante, une diarrhée persistante.

Laboratoires LUMIERE
45, rue Villon — LYON

OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint l'Acide Oléique Paul Thibault réalise, avec effet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire. Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine par désagrégation.

Posologie. — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 2 à 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.).

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Nota. — Pour éviter toutes confusions, prescrire toujours : capsules d'Oléocidase Paul Thibault.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-9.

Voir également : OLÉOSODINE.

OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre	0,20
Hexaméthylène tétramine.....	0,25

Indications. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

Mode d'emploi. — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

Présentation. — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Traitement pour 10 jours. Prix : 14 francs.

Laboratoire pharmaceutique
CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Carnot 78-11.)

OLÉO-MEL

« LE LAXATIF DE RÉGIME »

Formule. — Huile de Paraffine extra-neutre à viscosité maxima et spéc. raffinée p. l'usage interne. } P. E.
Miel surfin sélectionné..... }

Indications. — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, pour le traitement de la **Constipation et des Affections gastro-intestinales**, de toutes les indications et de la posologie même de l'huile de paraffine. **Action mécanique. Innocuité absolue.**

Préparation. — L'Oléo-Mel, préparé par un procédé spécial, se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable ; il conserve tout l'arôme et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des Enfants et des personnes délicates.

Prix : 14 fr. et 24 fr. (taxe comprise).

Durée moyenne : 8 et 15 jours de traitement.

Laboratoire DELFOUR, Docteur en Pharmacie.

à **POUILLON (Landes)** — (Tél. : 9.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 246-1.

OLÉOPHÉDRINE BÉRAL

Huile d'Éphédra à 1 et 2 p. 100 d'éphédrine naturelle, à alcalinité atténuée sans analgésique, sans oléate.

La plus active et la moins irritante des huiles éphédrinées. Pour **pulvérisations** nasales contre rhinites, sinusites, rhume des foins, coryzas, surdités catarrhales, céphalées sinusiennes, etc... Utiliser de préférence l'éphédriseur BÉRAL, pulvérisateur de poche, étui métal : 26 francs.

Prescrire : **OLÉOPHÉDRINE BÉRAL.**

Un flacon : 12 et 15 francs.

Laboratoires de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

OLÉO-SANOCRYSINE

de Mollgaard

Thiosulfate d'or et de sodium.

En suspension huileuse.

Indications et posologie de la « Sanocrysine aqueuse »
(Voir celle-ci).

Forme :

Suspension.	1 %	5 %	10 %	Sanocrysine.
Amp. à 2 cc.	2 ctg.	10 ctg.	20 ctg.	„
— 3 cc.	3 —	15 —	30 —	„
— 5 cc.	5 —	25 —	50 —	„

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires.
Avant l'emploi, agiter l'ampoule jusqu'à ce que la suspension soit homogène.

Valentin Aage MOLLER,

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX.

Tél. : 80-989.

Dépositaire pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

OLÉOSODINE

Oléate de soude **Paul Thibault.**

Composition. — Capsules dosées à 0 gr. 30 d'oléate de soude anhydre, chimiquement pur.

Propriétés. — Produit parfaitement toléré par les estomacs digérant mal les corps gras, exaltation de la sécrétion biliaire, désagrégation et expulsion des calculs de cholestérine, sédation des phénomènes douloureux.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholestérinémie, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 2 à 3 capsules le soir, dans un peu d'eau minérale tiède (Vichy, Vals, Châtel-Guyon).

Prix : 16 fr. pour 6 à 8 jours de traitement environ.

Établissements SOUDAN

48, rue l'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

(Voir également **OLÉOIODASE.**)

OLÉOVULES

Ovules gynécologiques de formule entièrement originale.

Acide picrosalique : Nouveau succénadé de l'Acide Picrique dépourvu de ses inconvénients (ne colore pas les téguments, ne détermine, même à haute dose longtemps continuée, aucun accident toxique) (M. Marchand, *Thèse Paris*, 1935).

Rubacrine ou Rouge d'Acridine : puissant antiseptique, non irritant (S. Lurié, *Thèse Paris*, 1934).

Sulfostérol : Composé organique soufré remplaçant l'Ichtyol (inodore et ne tachant pas).

Avantages. — Efficacité. Propreté. *Fusion parfaite.*

Indications. — Infections de toute nature des voies génitales inférieures (Blennorrhagie après la phase aiguë, Infections streptococciques post-puerpérales, etc.), et principalement : Métrites, Cervicites, Ulcérations et érosions du col, Vaginites.

Posologie. — 2 à 3 ovules par semaine.

Littérature. — Thèses de G. Donet et de M. Marchand ; Communication à la Société de Gynécologie ; travaux de MM. Chéron, Vigneron, Thierry, Fuchs, Fayot, de Manet, etc.

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 13-31.)

OLÉTHYLE-BENZYLE

L'Oléthyle-Benzyle, qui sert à faire en France les premières études cliniques sur le Benzoate de Benzyle et permet son introduction dans la thérapeutique, est une présentation de Benzoate de Benzyle pur.

Propriétés physiologiques. — Antispasmodique et Hypotenseur dépourvu de tout pouvoir narcotique ne produisant aucun effet nocif sur le cœur, les reins, l'appareil respiratoire et le système nerveux.

Indications :

I. — Hypertension, Angine de Poitrine, Angio-Spasmes.

II. — Tous les états spasmodiques de la musculature lisse ;

Spasmes bronchiques, asthme, coqueluche, hoquet persistant d'origine périphérique, péristaltisme exagéré de l'intestin (dysenterie, diarrhées, pylorospasme), coliques hépatiques, néphrétiques, intestinales, constipation spasmodique, spasmes de la vessie, dysménorrhées spasmodiques.

Présentation. — Gouttes et gélules.

L'Oléthyle-Benzyle Gouttes est une solution de Benzoate de Benzyle synthétique pur titré à 20 p. 100.

L'Oléthyle-Benzyle Gélules est la présentation de choix de ce produit permettant au malade d'avoir toujours sur lui en toutes circonstances son médicament dosé de façon précise (chaque gélule renferme 0,10 de Benzoate de Benzyle).

Posologie. — Oléthyle-Benzyle Gouttes, XX à XXX gouttes trois ou quatre fois par jour, dans un peu de lait ou d'eau sucrée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Oléthyle-Benzyle Gélules 3 à 5 gélules par jour, espacées dans le courant de la journée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Prix :

Oléthyle-Benzyle gouttes : 14 fr. 90.

Oléthyle-Benzyle gélules : 16 francs.

Laboratoire Central de Paris.

122, faubourg Saint-Honoré — PARIS.

OLIPHÉDROL

Antisepsie des voies respiratoires, sans Menthol, sans Cocaïne.

Formule : Ess. Vég. Ant. 4 + Camphre 1 + Ephédrine nat. 0,5 + Stovalne 0,1 + Huile *végétale* neutre purifiée.

Indications. — Coryza, Rhume des Foins, Rhinites, Sinusites, Pré-servation des maladies contagieuses : Grippe, Rougeole.

Propriétés. Avantages. — Vaso-constricteur, Sédatif, Antisepique, Sans menthol. Ne contenant que des essences naturelles.

Ne rancit pas. Non irritant, odeur agréable.

Présentation :

Solution	Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes	16 fr. »
	Flacon de 30 cc. avec pulvérisateur.....	27 fr. 50
Capsules, boîte de 24.....		16 fr. »

Mode d'emploi. — Pulvérisations, Instillations (VI à VIII gouttes ou une capsule) dans chaque narine et plusieurs fois par jour.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments 1170-1.

Pour les personnes à muqueuses *très* sensibles et chez le nourrisson, employez l'**Oliphédrol B. B.** — Ephédrine 0,3 — adénaline 0,05 — chlorétone 0,5 — essences 2 — huile quantité suffisante p. 100.

Laboratoire de l'OLIPHÉDROL

18, rue Daval — PARIS (XI^e).

OLIRICYL

EX-OLIRICIN

Composition. — Chaque comprimé dragéifié contient :

Huile de Ricin saponifiée	0,025
Huile d'Olive saponifiée	0,025
Bile dépigmentée	0,03
Soufre pur	0,02
Belladone pulv.	0,015

Originalité. — Utilisation des sels de l'huile de ricin et de l'huile d'olive, actifs sous un faible volume, sans aucun des désagréments des huiles (*nausées, renvois, indigestions, etc....*).

Posologie. — 1 à 5 comprimés par jour avant ou après le repas, ou le soir au moment du coucher.

Commencer par 2 comprimés le soir.

Augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

Avaler sans mâcher.

Indications. — Toutes les formes de constipation. Stimulant hépatobiliaire sans réactions. Lithiase biliaire. Cholagogue.

Présentation. — Tube de 40 comprimés assurant 15 à 20 jours de traitement.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e).

(Tél. : Gobelins 36-96.)

OLIVÉOL

Acide oléique β

Olivéol pilules, 6 par jour.

Olivéol globules, 1 à 2 par jour.

Olivéol gouttes (pour enfants), X à XL
gouttes suivant l'âge.

SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE

augmente la sécrétion biliaire,
se retrouve dans la bile hypersécrétée,
dissout le calcul de cholestérine.

Prix : Globules-Gouttes : 14 fr. 50.

Prix : Pilules : 15 fr. 50.

Lab. OLIVÉOL et HÉPATICOL ÉTIÉVANT

Ed. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des Hôpitaux de Lyon

TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône).

(Téléphone : 140-38.)

ONCTION ANGELINI

Curacare

Guérison de la Gale même infectée.

Sans bains.

Sans frotte — En une seule application.

Adoptée par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.

L'Onction Angelini, à base de soufre et
huile de cade, est en usage dans les hôpi-
taux maritimes de Brest, Cherbourg,
Lorient, Rochefort, Toulon, Bizerte.

Prix au public : 11 francs.

Angelini, Pharmacien,

61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous

les commissionnaires et droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

ONGUENT FREVAL

Composition. — 45 p. 100 de mercure ; 2 p. 100 d'extrait frais de Belladone et 10 p. 100 d'extrait frais de ciguë.

Propriétés thérapeutiques. — Antiphlogistique, Résolutif, Antiseptique, Calme immédiatement la douleur et localise l'infection.


Indications. — Tout état inflammatoire : Piqure infectée, Furoncle, Phlegmon, Panaris, Anthrax, Hémorroïdes, Phlébite, Orchite, Arthrite aiguë, Adénite.

Tumeurs blanches et autres tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires.

Tout traitement mercuriel par friction (très recommandé pour les enfants ou comme traitement discret chez les adultes).

Mode d'emploi. — Étendre l'onguent, le recouvrir d'un linge propre ou d'une gaze et faire tenir.

Dose journalière. — Chez l'adulte : gros comme une noisette en une ou deux fois.

 **Prix :** le tube de 50 grammes environ, 19 fr. 70.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-18.)

ONOGO

(Pilules.)

Présentation. — En étui de 50 pilules.

Principes actifs. — Extrait de Piper methysticum, Extrait de Bucchu, Bi-Carbonate de soude, Salol.

Indications. — Affections des voies urinaires, Blennorrhagie, Métrites aiguës et chroniques.

Mode d'emploi. — 8 à 10 pilules par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

OPHTAL

Composition :

Novocaïne	0,05
Sulfate d'Alumine	0,20
Sulfate de Zinc.....	0,15
Azotate de Potassium.....	0,05
Chlorure d'Ammonium	0,05
Sulfate de Cuivre.....	0,05
Laudanum.....	0,30
Alcoolat vulnéraire.....	5,00
Eau distillée de rose	10,00
Eau distillée de sureau.....	10,00
Eau distillée. Q. S. pour.....	100,00

Indications. — Conjunctivites infectieuses ou traumatiques, blépharites, orgelets, chalazions. Prophylaxie des affections oculaires.

Mode d'emploi. — En bains tièdes de 2 ou 3 minutes au moyen d'une œillère, matin et soir, dans les cas bénins.

Trois fois et plus par jour dans les cas aigus.

Prix : 10 francs le flacon de 125 cc.

Laboratoire de l'Ophtal

F. LAGARCE, Docteur en Pharmacie

13, place de la Nation — PARIS (XI^e).

(Tél. : Diderot 61-05.)

OPOBROL

Opothérapie ovarienne, bromée et valériano-barbiturique.

Composition :

Iso-bromovaléryl-urée	0,05
Ovarine totale.....	0,10
Pour un comprimé dragéifié.	

Action :

1° Opothérapie ovarienne totale. — Ranime le métabolisme cellulaire du tissu ovarien déficient. *Contient toutes les hormones de l'ovaire* (folliculine, lutéine, hormone circulatoire, hormone des échanges de Wagner).

2° Opothérapie bromée. — Libération par l'isobromovaléryl-urée de 40 p. 100 de son poids de Brome, à l'état ionique, transformé dans le sang en Brome organique et dans l'hypophyse en hormone bromée.

La reminéralisation bromée est indispensable dans les déficiences ovariennes, par suite de l'appauvrissement de l'organisme en brome hypophysaire.

3° Opothérapie valériano-barbiturique. — L'acide valérianique est régénéré par la combinaison avec le Brome et l'Urée et l'iso-bromo-valéryl-urée, voisin du véronal, gardénal, se comporte aux doses usuelles plus comme *toni-sédatif et antispasmodique* que comme hypnotique.

Indications :

Toutes les Hypo-ovaries. Troubles de la Ménopause. Troubles vasculaires ou nerveux dépendant de dysovaries.

Mode d'emploi :

Ne donne de résultats qu'employé comme traitement de fond : 15 jours par mois — 2° et 3° semaines après les règles ou leur date anniversaire — et 3 ou 4 mois de suite, à la dose de 4 à 6 comprimés par jour (dose supplémentaire nécessaire au moment des malaises nerveux), soit doses continues pendant 3 mois si les malaises sont continus.

Présentation et prix : 20 francs la boîte de 40 comprimés, 10 ou 20 jours de traitement.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales

Laboratoire LE FOLLET

NOZEROY (Jura).

(Tél. : Nozeroy 5.)

OPOBYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 363-3.

Forme. — Pilules.

Composition. — Extrait hépatique, Sels biliaires,
Boldo et Combretum.

Propriétés pharmacodynamiques. — Chola-
gogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépa-
tiques. Excitant physiologique du péristaltisme
intestinal.

Indications. — Hépatites. — Ictères — Cholécys-
tites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Cons-
tipation chronique. — Dyspepsie gastro-intes-
tinale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 pilules au début ou à la
fin des repas, 2 ou 3 fois par jour.

L'étui de 50 pilules : 15 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 62-30.)

OPOCALCIUM DU D^r GUERSANT

Reminéralisation. Polypothérapie.

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde (titrant 200 unités Collip au gr.), surrénale, thymus, hypophyse, (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets (en tubes d'aluminium), comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et, d'une façon générale, la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Dosés et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 3 à 5 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre. Durée du traitement : minimum 10 jours.

Opocalcium arsénié (avec 1 cc. de méthylarsinate disodique). — Une seule forme : cachets.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium gaïacolé (avec sulfo-gaïacolate de potasse). — Antisepsie pulmonaire et reminéralisation associées.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium irradié. — (Voir plus loin.)

Opoferrine (avec fer organique et extraits organiques). (Voir notice plus loin.)

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 comprimés par jour.

Prix. — *Cachets* : 17 fr. 10. — *Comprimés* : 17 fr. 10.

Granulé : 18 fr. 70. — *Poudre* : 18 fr. 70.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX^e).

(Tél. : Ménilmontant 62-81 et 62-82.)

OPOCALCIUM IRRADIÉ DU D^r GUERSANT

Composition. — Vitamine D pure cristallisée titrant 40 millions d'unités internationales au gramme, associée au complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium. (L'extrait parathyroïdien titre 200 unités Colip au gramme).

Formes. — Cachets (présentés en tubes d'aluminium). Comprimés, Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — L'Opocalcium irradié assure une reminéralisation intégrale. Il fixe le calcium et le phosphore dans les tissus.

Indications. — Rachitisme, Croissance, Carence minérale, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières et mode d'emploi :

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 1 cuillerée à café.

Durée du traitement : minimum 10 jours.

Prix : Cachets : 24 fr. 05 ; Comprimés : 24 fr. 05 ;

Granulé : 25 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX^e).

(Tél. : Ménilmontant 62-81 et 62-82.)

OPOCÉRÈS

Hormones sexuelles associées au complexe mangano-ferrique et au phosphore embryonnaire.

Reconstituant biologique général.

Poudre d'orchitine	0 gr. 05
— Lobe antérieur de l'hypophyse.....	0 gr. 02
— Surrénale.....	0 gr. 01
— Oxalate de fer	0 gr. 04
— Chlorure de Manganèse.....	0 gr. 02
— Inosito-hexaphosphate de calcium et magnésium. Q. S.	0 gr. 20
Excipient.... pour un comprimé de	0 gr. 20

Indications. — Développement tardif ; Surmenage ; Convalescence ; Dépression ; Neurasthénie ; Dénutrition ; Asthénie ; Anorexie ; Rachitisme ; Déminéralisation ; Déglobulisation.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 demi-comprimé au milieu des deux repas, écrasé dans la confiture).

Adolescents : 1 comprimé.

Adultes : 2 comprimés.

A avaler avec une gorgée d'eau ou à prendre délayé dans un peu d'eau sucrée ou boisson habituelle, suivant avis du médecin traitant.

Boîte de 40 comprimés : prix : 20 fr. 80.

Laboratoire de l'AÉROCID — SCHMIT, pharmacien.

71, rue Sainte-Anne — PARIS (II^e). R. C. Seine n° 34-029.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 89-4.

OPOCHOL

Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait total hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah (Combretum).

Forme pharmaceutique :

Comprimés lenticulaires dragéifiés et glutinisés.

Indications thérapeutiques :

Régulateur des fonctions hépato-biliaires, convenant aussi bien aux hépatiques diarrhéiques (ne contient pas de drastique) qu'aux hépatiques constipés (présence d'oléate de soude).

Affections hépato-biliaires. — Hépatites, Cirrhoses, Ictères, Cholémie simple et familiale, Angiocholites, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Insuffisance hépatique et biliaire, etc.

Affections gastro-intestinales. — Dyspepsies réflexes, Constipation par insuffisance de chasse biliaire, Entéro-colite muco-membraneuse.

Maladies de la nutrition. — Diabète par hypohépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, Etats hypercholestérinémiques.

Affections de l'appareil circulatoire avec participation du foie. — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, Hémophilie, certaines anémies.

Infections, Intoxications.

Neuro-psychiatrie. — Psychasthénie avec signes hépatiques, mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 comprimés par 24 heures, 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

B. *Régulateur. Entretien.* — 2 comprimés par 24 heures, un comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

Prescrire :

Opochol : comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 17 fr. 80.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe, BEAUVAIS (Oise).
(Tél. : 0-50.)

Échantillons et littérature à la disposition
de MM. les Docteurs.

OPODERMYL

Onguent cutané opothérapique.

Composition. — Extraits embryonnaires, albumoses et tous principes actifs de la régénération cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Agent spécifique de l'épidermisation.

Indications. — Plaies atones. Pertes de substances chirurgicales ou diathésiques, Engelures, Brûlures, Erythèmes, Crevasses du sein, Prurits, Dermatoses.

Mode d'emploi. — Application permanente en couche épaisse, renouvelée aussi souvent que possible.

Prix au public : 13 francs.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

OPO-DINITRA

Sans ovaire. Sans thyroïde.

Dinitrophényl-lysidine, Lobe antérieur d'hypophyse, Extrait hépatique.

Le *Lobe antérieur d'hypophyse*, par ses hormones adipolytique, gonadotrope et thyrotrope, est une médication synergique de la nitro-phénazine.

L'*Extrait hépatique* réduit les intolérances idiosyncrasiques et facilite le travail du foie si souvent déficient chez les obèses dysendocriniens.

Opo-Dinitra est le médicament des obésités d'origine **endogène** (insuffisance glandulaire, hypométabolisme, ménopause, syndrome adiposogénital), *Dinitra* étant réservé aux obésités d'origine **exogène** (sédentarité, polyphagie). Voir *Dinitra*.

OBÉSITÉ DE LA MÉNOPAUSE } 1 comprimé par 10 kgs
OBÉSITÉS ENDOCRINIENNES } de poids corporel.

LASSITUDE MENSTRUELLE : 2 à 4 comprimés par jour, 3 jours avant et pendant les règles.

FRIGIDITÉ GÉNITALE masculine ou féminine, 4 à 6 comprimés par jour.

Boîtes de 60 comprimés et de 300 comprimés.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales à 80 p. 100.

Société d'Applications Pharmacodynamiques.

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII°). (Invalides 43-60)

OPOFERRINE VITAMINÉE

Thérapeutique anti-anémique.

Composition. — Association des Peptonates de fer et de manganèse à l'extrait hépatique (méthode de Whipple) et à l'extrait splénique, en présence des Vitamines A (Carotène) et C (Chlorophylle), qui commandent le métabolisme du fer.

Action. — Agent de régénération sanguine : stimulant l'hématopoïèse.

Indications. — Anémies de toute nature (post-hémorragiques, infectieuses, parasitaires, toxiques, cancéreuses, de l'enfance, etc...), chlorose, altérations et affections sanguines, déficiences spléno-hépatiques, états post-opératoires, convalescence, surmenage, intoxications (saturnisme, oxyde de carbone, alimentaire, etc...), amaigrissement.

Forme. — Granulé.

Doses journalières. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café. Aucune action toxique.

Prix : 19 fr. 20.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS.

(Tél. : Ménilmontant : 62-81, 62-82.)

OPOGERMINE

**Reconstituant intégral, Recalcifiant,
Anti-anémique, Tonique.**

Composition. — Association de la Germinine du Blé à l'extrait hépato-splénique désalbuminé, en présence d'ergostérol irradié. Granulé fondant, d'un goût exquis, sans odeur ni saveur médicamenteuse.

Indications. — Rachitisme, Croissance difficile, Carie dentaire, Fracture, Allaitement, Grossesse, Phosphaturie, Anémie, Convalescence, Surmenage, Usure, Bacillose.

Mode d'emploi :

Doses quotidiennes :

Nourrissons : 1 cuillerée à café ;

Enfants : 2 cuillerées à café,

Adultes : 3 cuillerées à café.

Laboratoire national de contrôle n° 1219-2.

Prix : 20 francs.

Éts Pharmaceutiques M. et P. LEDENT
MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais).

(Tél. : 1-60).

OPO-IODAMÉLIS LOGEAIS

Composition. — Iodotantin de l'*Iodamélis* neutre, stable et sans iode libre sous forme d'un extrait sec associé à l'organothérapie masculine ou féminine et présenté sous forme de comprimés glutinisés et enrobés.

Propriétés. — Associe les effets stimulants de l'*Iodamélis* sur le métabolisme général, à l'action compensatrice et régulatrice des extraits endocriniens stabilisés et des hormones, action synergique, douce et progressive par stimulation de l'ensemble du tractus génital.

DEUX FORMULES

Formule masculine :

Iodotantin de l' <i>Iodamélis</i>	0 gr. 10
Orchitine.....	0 gr. 10
Ante-hypophyse.....	0 gr. 005

Indications. — Obésité, troubles circulatoires, hypertension solitaire de la cinquantaine, insuffisance testiculaire transitoire, impuissance, neurasthénie, retard du développement sexuel chez l'homme, syndrome adiposo-génital, adénome prostatique, sénilité, stérilité, troubles vagotoniques ou amphotoniques du système nerveux chez l'homme et chez la femme.

Doses. — De 2 à 6 dragées par jour.

Prix. — L'étui de 40 comprimés..... 22 fr. 90

Formule féminine.

Iodotantin de l' <i>Iodamélis</i>	0 gr. 10
Ovaire	0 gr. 05
Ante-hypophyse.....	0 gr. 005
Benzoate de dihydro-folliculine ..	40 U. I.

Indications. — Retard de puberté, infantilisme utérin, dysendocrinies de la jeune fille et de la femme, dysménorrhées, règles trop espacées, règles traînantes, douleurs menstruelles, stérilité, vaginites, leucorrhées, pertes blanches, menstruations fétides, ménopause, hypertension solitaire de la cinquantaine, troubles vaso-moteurs et bourdonnements d'oreilles, bouffées de chaleur, migraines, obésité, troubles psychiques.

Doses. — De 2 à 6 dragées par jour.

Prix. — L'étui de 40 comprimés..... 26 fr.

Laboratoires Jacques LOGEAIS
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

OPOMYGDAL

Granulé.

OPOMYGDAL est généralement prescrit comme cure d'entretien, dont l'effet s'ajoute à celui du MYGDAL, lorsque l'administration de ce dernier n'est plus nécessaire et que le malade a besoin d'un stimulant biologique particulier.

OPOMYGDAL s'adresse tout spécialement aux *enfants lymphatiques*, porteurs de *petites adénopathies* et dont le *développement retardé* s'accompagne de troubles généraux d'ordres divers.

OPOMYGDAL se révèle ici comme un *régulateur de la croissance*.

OPOMYGDAL augmente, en outre, la *résistance aux multiples infections de la gorge*, en exaltant les réactions naturelles de défense, devenues insuffisantes du fait d'une *dystrophie amygdalienne*.

Posologie. — 1/2 à 1 cuillerée à café deux fois par jour, loin des repas.

Prix : 20 fr. (taxes comprises).

Préparé par H. BOISSEL

295 bis, rue de la Benaugue — BORDEAUX.

R. C. Bordeaux 16531 A.

Vente O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Dépôt pour l'Algérie : **Coopération Pharmaceutique Française**
37-39, rue de Lyon, ALGER.

OPONUCLYL TROUETTE-PERRET

Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium.
(Vitamine D.)

Médication synergique organo-minérale.

Composition. — Lipoides médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Croissance, Surmenage, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose.

Doses. — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.

Enfants : 1 sphérule à chaque repas.

Littérature et Échantillons :

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

OPOPHOS

Composition. — Glycérophosphate de chaux, Inosito-Phosphate de chaux et magnésie ; Gluconate de calcium ; Phosphates de magnésie, de manganèse ; Protoxalate de fer, Splénine, Thy-musine, Parathyroïdine.

Indications. — Anémies, Chlorose, Asthénie, Surmenage, Rachitisme, Lymphatisme, Carences, Troubles de Croissance et de Nutrition, Déminéralisation, Caries dentaires.

Forme. — 1° Granulé sucré, aromatisé. Ne contenant aucun produit toxique, l'OPOPHOS constitue la forme la plus facile et la plus agréable pour faire prendre fer et phosphates aux enfants et aux bébés. — 2° Cachets (pour adultes).

Doses. — 1° *Bébés* : 1/4 de cuill. à café 2 fois par jour. — 2 à 5 ans : 1/2 cuill. à café 2 fois par jour. — 5 à 15 ans : 2 cuill. à café par jour. — 2° *Adultes* : 2 cachets par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire DENISOT

19, rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

OPO-PLASMA

Composition. — Extraits de Foie, Rate, Muqueuse gastrique, Pancréas, Rein, Surrénale, Glande mâle, Extrait de Malt et Peptone de muscle (Acides aminés totaux) en-Plasma marin synthétique, hypertonique par les facteurs Ca, Mn, Mg, Cu.

Indications. — *Maladies chroniques*, déglobulisantes, déminéralisantes et consomptives : Anémies, Lymphatisme, Rachitisme, Avitaminose, Athrepsie des Nourrissons ; *Tuberculose* dans toutes ses manifestations, rhumatismes chroniques, Paludisme, Cachexies, Néoplasies, etc.

Maladies aiguës toxi-infectieuses ou septicémiques. Fièvres éruptives, broncho-pneumonies, diphtérie, états typhoïdes et puerpéraux, pyosepticémies chirurgicales, etc... Toutes convalescences.

Présentation. — Ampoules buvables (non injectables) de 20 cc.

Prix : 46 fr. 80 la boîte de 10 ampoules.

— 26 francs — 5 —

(Par voie buccale.)

Adultes : 1 à 4 ampoules par jour dans un peu d'eau ordinaire ou gazeuse avant ou loin des repas. *Enfants* : 1 à 2 ampoules suivant l'âge.

(Par voie rectale.)

Mêmes doses étendues d'un volume égal d'eau bouillie tiède ou mieux incorporées dans un « goutte à goutte » de sérum physiologique ou glucosé.

L. BÉLIÈRES,

19, rue Drouot — PARIS.

OPOSCLÉRINE VERGELOT

Traitement de l'arthritisme et de l'artério-sclérose par les extraits opothérapiques.

Composition. — Extrait ovarique, Extrait orchitique, Peptone iodée, Extrait thyroïdien.

Propriétés. — Synergie opothérapique par association d'extraits de glandes génitales au corps thyroïde et à l'iode, agissant sur tous les éléments concourant à la production de l'artério-sclérose. Abaisse le taux du cholestérol sanguin. Abaisse la tension artérielle. Action antiscérosante sur les tissus et les vaisseaux. Augmente la force musculaire.

Indications. — Arthritisme, Artério-sclérose, Goutte, Asthme, Hypertension, Rhumatismes chroniques et de la ménopause.

Présentation et mode d'emploi. — Dragées : 2 à 4 par jour, avant chaque repas, 20 jours par mois, suspendre et recommencer.

Prix : 17 fr. 70 le tube de 40 dragées.

Laboratoires Ch. VERGELOT

Docteur en Pharmacie,

6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-18).

Enregistré au Lab. de contrôle sous le n° 1236-1.

OPOSSÉINE

Granulé endocrino-minéral vitaminé.

Reminéralisant

Hémopoiétique

Composition :

Glandes endocrines (extraits totaux) : **Thymus**, rate, Parathyroïde, moelle osseuse, foie, hypophyse.

Vitamine D, Solution huileuse. — Cristallisée et chimiquement pure. Inaltérable, d'action K (isolée de l'ergostérine irradiée au contact de laquelle elle s'altère).

Ions P, Ca, Mg, Mn, Na : **Hypophosphite** de Mg, **nucléinate** de Mn et de Na, phosphates et glycérophosphates.

Action :

Réalise intensément reminéralisation et hémopoïèse.

Favorise la nutrition de la cellule nerveuse et osseuse.

Remédie aux spoliations phosphorées et aux carences calciques.

Régularise le métabolisme des ions et des stérols.

Assure l'équilibre minéral et acido-basique.

Supplée à toutes les déficiences organiques ou endocriniennes.

Forme et posologie :

Boîte cylindrique de 37/150, en métal imprimé rouge et noir sur fond gris clair.

Prix : 23 francs. (Pour 15 jours de traitement).

Renfermant 140 grammes = 40 cuillerées à café de granulé fondant, agréable au goût, à croquer.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Adolescents : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Deuxième enfance : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Première enfance : 1 cuillerée à café par jour.

Indications :

Prétuberculose et tuberculose. — Troubles de la croissance.

Convalescence, Surmenage, Rachitisme, Déminéralisation.

Fractures. — Grossesse. — Dentition. — Allaitement.

Toutes anémies de l'adulte et de l'enfant.

Dépresseions nerveuses, Neurasthénie, Phosphaturies.

Littérature et échantillons à la disposition de MM. les Docteurs.

Laboratoires OPOS

60, rue Nationale, 1 et 3, rue Soumet,
CASTELNAUDARY (Aude). (Tél. : 3-10.)

OPOSTYL

Auxothérapie Opoorinienne des Asthénies.

Composition. — Cortico-Surrénale + Arsenic organique, Moelle osseuse + Hypophosphites, Thymus + Magnésium et Rate + Fer.

Indications. — Réunit ainsi 4 associations en synergie du sel minéral et de la glande qui le fixe dans l'organisme.

1° Stimule puissamment le pouvoir anti-infectieux et l'hématopoïèse ; 2° rend possible la création de réserves consommables, même sur le terrain peu favorable d'un organisme déprimé ; 3° restaure le tonus nerveux.

Épuisement des réserves, convalescences, épuisement nerveux.

Formes. — Dragées, Liqueur.

Posologie et mode d'emploi :

Liqueur : 2 à 4 cuillerées à café par jour avant le repas, de préférence dans un peu d'eau sucrée.

Dragées : 2 à 4 par jour à avaler avant les repas.

Prix : Liqueur : 18 fr. 60.

Dragées : 16 fr. 65.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

OPOTHÉRAPIE BAZIN

SUCS ORGANIQUES BAZIN

Extraits totaux glycéринés d'organes frais
(méthode de Brown-Séquard.)

Simple macération glycéринée suivie d'expression de l'organe frais, ces préparations constituent l'idéal opothérapique. Journallement et uniquement préparés avec des glandes fraîches, il n'entre dans leur fabrication aucun organe frigorifié d'origine américaine.

Opothérapie simple. — Suc ovarien, orchitique, thyroïdien, hépatique, pulmonaire, rénal, surrénal, hypophysaire, thymique, para-thyroïdien, pancréatique, cortico-surrénal, gastrique, intestinal, amygdalien, mammaire, placentaire, prostatique, splénique, médullaire, cerébrine, cardine, oculine, sérum de porc anticolibacillaire, etc.

Opothérapie associée. — Suc thyro-ovarien, thyro-orchitique, surrénal-ovarien, surrénal-orchitique, hypophyso-ovarien et orchitique, triglandulaire M. et F., pluriglandulaire M. F. et toutes formules que MM. les médecins voudront bien nous indiquer.

Mode d'emploi. — Deux à quatre cuillerées à café dans un peu d'eau pure ou d'eau minérale et suivant avis du médecin.

1 cuillerée à café correspond à 1 gr. d'organe frais.

Présentation. — 1° En flacons de 90 cc. au prix de 12 francs les uniglandulaires et 13 francs les pluriglandulaires ;

2° En ampoules (boîte de 10 ampoules de 10 cc.) au prix de 18 francs.

Laboratoire Spécial BAZIN

Autorisé par l'État après avis favorable de l'Académie de Médecine pour préparation des Extraits organiques.

H. GARRAUD, Pharmacien,

Ancien assistant de la Faculté, Lauréat, Médaille d'or.

9, cours Victor-Hugo — BORDEAUX (Gironde).

Tél. : 927-61.

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés sous un vide profond à basse température et présentés en dragées (préparées à froid et permettant une conservation indéfinie) ou en ampoules de 1 et 3 cc.

Thyroidine: (0 gr. 10 de corps thyroïde), Obésité, Myxœdème.

Oviginine: (0 gr. 12 d'ovaires), Ménopause naturelle ou artificielle.

Gastrozymase: Comprimés effervescents de suc gastrique de porc, Dyspepsies, embarras gastrique.

Liqueur à la Thyroidine: 1 cuillerée à café = 0 gr. 02 de thyroïde desséchée, Myxœdème infantile.

Globépal: Poudre de foie frais.

Opostyl: Voir 1/2 page spéciale.

Triglandine:

Thyroïde.....	0 gr. 08	{	Asthénies endocriniennes féminines.
Hypophyse	0 gr. 05		
Ovaire	0 gr. 10		

Triglandol:

Thyroïde.....	0 gr. 08	{	Asthénies endocriniennes masculines.
Hypophyse	0 gr. 05		
Testicule.....	0 gr. 10		

Biliol, Séquardine, Hépatine, Surrénaline, Néphrine.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

OPOTHÉRAPIE BYLA

Présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyme, deux **comprimés** concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipide correspondant (procédé breveté).

Posologie. — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° **Les « EXO » BYLA**, sucs totaux **Inaltérables**, préparés par exolyse des organes frais (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

Posologie. — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° **Les GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur.
Conservation indéfinie.

Prescrire : GLANDULES DE SURRÉNINE BYLA.

Posologie. — (4 à 8 par jour).

4° **Les AMPOULES BYLA** : préparées à partir des ORGANES FRAIS ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HÉPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES « ISO » BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPOULES ISO REIN BYLA, etc.

Posologie. — 1 ampoule tous les 2 jours.

*Opothérapie simple, pluriglandulaire
et panglandulaire.*

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 08-11.)

OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO — Exolysés — Glandes — Ampoules.

Formule

MÉDICATION ASSOCIÉE

1	Hypophysine. 0.10 Orchitine 0.60	Infantilisme masculin. Dystrophie des adolescents.
2	Hypophysine. 0.10 Ovarine..... 0.20	Infantilisme féminin, troubles de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux
3	Orchitine 0.60 Thyroidine... 0.025	Myxœdème. Infantilisme masculin.
3 bis	Ovarine..... 0.20 Surrénine... 0.10	Hypotension et asthénie de la ménopause.
4	Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Hypertension et Troubles de la méno- pause naturelle ou opératoire. Obésité.
4 bis	Ovarine..... 0.15 Orchitine... 0.30	Carence sexuelle féminine.
5	Surrénine.... 0.10 Hypophysine. 0.10	Myasthénies. Insuffisance surrénales. Hypotension.
6	Surrénine.... 0.10 Thyroidine... 0.025	Retards de croissance. Etats thyroïdien avec hypotension. Fatigabilité.
7	Hypophysine. 0.10 Thyroidine... 0.025	Infantilisme. Obésité. Sénilité précoce.
7 bis	Placentine... 0.25 Mamelline .. 0.25	Galactogue.
8	Surrénine.... 0.15 Hypophysine. 0.05 Thyroidine.... 0.025	Asthme essentiel. Myasthénies. Syndrome adiposo-génital. Infantilisme.
8 bis	Ovarine..... 0.15 Surrénine.... 0.05 Hypophysine. 0.05	Troubles de la puberté et de la méno- pause. Syndromes adiposo-génitaux.
9	Hypophysine. 0.05 Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Retards de la puberté. Troubles de la ménopause et de la puberté. Syndromes adiposo-génitaux.
9 bis	Ovarine..... 0.20 Surrénine.... 0.05 Thyroidine.... 0.025	Troubles de la puberté et de la ménopause. Etats dépressifs avec hypotension.
10	Hypophysine. 0.05 Orchitine 0.60 Thyroidine.... 0.025	Développement tardif. Infantilisme. Syndromes adiposo-génitaux.
11	Hypophysine. 0.05 Thyroidine... 0.025 Surrénine.... 0.05 Orchitine 0.10	Infantilisme masculin. Syndromes adiposo-génitaux. Sénilité précoce.
12	Hypophysine. 0.05 Thyroidine.... 0.025 Surrénine.... 0.05 Ovarine..... 0.10	Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la méno- pause. Obésité.

14	Splénine....	0.15	Reconstituant général dans toutes les anémies.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine...	0.15	
	S. H. P.		
15	Duodénase..	0.15	Excito-régulateur des diverses sécrétions commandant la digestion duodéno-hépatopancréatique — Troubles du carrefour sous-hépatique. Syndromes digestifs mal définis.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine...	0.15	
	D. F. P.		
16	Hépatine....	0.15	Puissant reconstituant général dans toutes les formes de l'anémie.
	Gastérase...	0.15	
	Splénine....	0.15	
	Surrénine... 0.05		
	F. E. R. S.		

Les dosages indiqués sont ceux des CACHETS OPO.

Traitement de l'obésité: Cachets Amaigrissants Byla, n° 21 (sans thyroïde.

Traitement de l'oxyurose: Glandules n° 20 (gastérase-entéropancréatine-hépatine-bile).

Posologie :

Cachets Opo Byla. 2 à 4 par jour | Exos Byla (sucs). 2 à 4 cuil. par jour.
Glandules (dragées). 4 à 8 par jour | Ampoules Byla. 1 tous les 2 jours.

MÉDICATION PANGLANDULAIRE

contenant toutes les glandes en proportion normale.

PANGLANDULAIRES BYLA : Masculins, Féminins, Infantiles.

Les Etablissements BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris-14°.

(Tél. : Danton 08-11.)

OPOTHÉRAPIE CARRION

1° Comprimés dragéifiés et Cachets uniglandulaires. — Poudres d'organes renfermant, inaltérées chimiquement, les substances spécifiques contenues dans les organes frais. La forme « comprimés » de conservation plus aisée, est recommandée particulièrement.

Comprimés à 0 gr. 10 de corps jaune, Fiel, Hypophyse totale, Hypophyse lobe antérieur Ovaire, Surrénale.

Comprimés à 0 gr. 20 de Myocarde, Gastrique, Moelle osseuse, Orchitique, Ovaire, Pancréas Placenta, Prostate, Rate, Rein, Substance grise, Surrénale totale Surrénale cortex.

Comprimés à 0 gr. 50 de Foie, Glande Mammaire, Thymus.

Comprimés de Thyroïde à 0 gr. 01, 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20.

Comprimés de Parathyroïde à 0 gr. 01.

Boîtes de 24 comprimés. Prix variant suivant les cas.

Cachets à tous dosages et suivant toutes formules, sur ordonnance.

Posologie. — En général, 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

2° Comprimés dragéifiés et Cachets pluriglandulaires.

T. O. S. H.	{	Thyroïde .	0,02	T. O. S.	{	Thyroïde	0,02
		Ovaire.....	0,10			Ovaire	0,10
		Surrénale .	0,10			Surrénale	0,10
		Hypophyse	0,03				
T. A. S. H.	{	Thyroïde .	0,02	T. S. H.	{	Thyroïde	0,02
		Orch. (A) .	0,10			Surrénale	0,20
		Surrénale..	0,10			Hypophyse....	0,05
		Hypophyse	0,03				
T. O. H.	{	Thyroïde .	0,02	O. S. H.	{	Ovaire.....	0,15
		Ovaire.....	0,10			Surrénale	0,05
		Hypophyse	0,03			Hypophyse	0,05
S. H.	{	Surrénale .	0,20	T. O.	{	Thyroïde	0,03
		Hypophyse	0,05			Ovaire.....	0,20
T. A.	{	Thyroïde .	0,03	O. M.	{	Ovaire.....	0,20
		Orch. (A)..	0,20			Mammaire (glande).....	0,30

Posologie. — 2 à 3 comprimés ou cachets par jour ; la boîte de 24 22 fr. 90 (T. A. : 17 fr. 15).

3° Extraits injectables uniglandulaires. — En ampoules de 2 cc. correspondant à 0,10 d'extrait d'organe (sauf Parathyroïde). Une injection par jour ou tous les 2 jours. La boîte de 6 ampoules : 17 fr. 15.

Pluriglandulaires : en ampoules de 2 cc. répondant aux formules des comprimés. La boîte de 6 ampoules : 22 fr. 90.

4° Per-extraits injectables. — Voir plus loin « Per-Extraits » « Per-Hépatique », « Per-Ovarien », « Per-Surrénalien », « Per-Thymique »

5° Extrait injectable de lobe postérieur d'hypophyse. — Voir plus loin : « Rétro-pituine ».

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

OPOTHÉRAPIE CHOAY

I. EXTRAITS TOTAUX CHOAY, poudres d'organes (Codex) préparées à froid (0°) et dans le vide profond, de propriétés pharmacodynamiques égales à celles des pulpes fraîches correspondantes

Formes pharmaceutiques. — *Cachets* et *Comprimés* présentés en tubes hermétiques.

Posologie moyenne. — 4 à 6 par jour.

Nomenclature et dosage des produits les plus couramment utilisés-

Cachets et comprimés : Hépatiques	25 et 50 cg.
Hypophysaires	5 et 10 —
Mammaires	25 et 50 —
Orchitiques (ou Androïques)....	25 et 50 —
Ovariens	20 à 50 —
Pancréatiques	25 et 50 —
Spléniques	25 et 50 —
Surrénaux	10 et 20 —
Thymiques	25 et 50 —
Thyroïdiens ...	1 et 5 mgr., 1, 2, 5 et 10 —

Boîtes de 24 à 40 cachets ou comprimés suivant dosage.

II. EXTRAITS INJECTABLES CHOAY : Solutions aqueuses, désalbuminées, stérilisées et sensiblement isotoniques.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules de 1 à 10 cc.

Nomenclature et posologie des solutions les plus utilisées :

Ampoules hépatiques	1, 2 et 5 cc.,	1 tous les jours.
Ampoules hypophysaires (lobe <i>antérieur</i>)	1 et 2 cc	1 tous les 2 jours.
Ampoules hypophysaires (lobe <i>postérieur</i>)	Voir « Post-Hypophyse Choay »	
Ampoules mammaires.....	1 et 2 cc ...	1 tous les 2 jours.
— orchitiques	1 et 2 cc ...	—
— ovariennes	1 et 2 cc ...	—
— spléniques	1, 2 et 5 cc ...	—
— surrénales	1/2 et 1 cc ...	—
— thymiques	1 et 2 cc ...	—
— thyroïdiennes	1/2 et 1 cc ...	—

Boîtes de 6 et de 12 ampoules.

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE : *Syncrines Choay* (Voir ce mot)

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

OPOTHÉRAPIE du D^r FRAYSSE

(Associations)

THYRODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

Indications. — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc. — Trait^t : 3 sem.

NEURODOSE. — Comprimés de 1 gr. contenant : orchitine 0,20, substance grise 0,10.

Doses. — *Adultes* : 4 par jour.

Indications. — Épuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle, surmenage. — Infantilisme, etc. — Traitement : 15 jours.

PLACENTODOSE. — Granulés de Placenta et de mammaire.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Flaccidité utérine. — Métrorragies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc. — Traitement : 15 jours.

SPLÉNODOSE. — Comprimés de 0 gr. 60 composés de : Rate. — Foie. — Surrénale. — Hémoglobine. — Osséine.

Méthode de Whipple renforcée.

Doses. — 4 à 6 par jour.

Indications. — Déminéralisation. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Paludisme, etc. — Traitement : 15 jours.

Laboratoires du D^r FRAYSSE

21, r. de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 12-88.

Notices et échantillons sur demande.

(Voir aussi *Folli-Lobine*.)

OPOTHÉRAPIE E. VERGELOT

AMPOLASES

Composition. — Extraits totaux ovariens, orchitiques, rate, foie, parathyroïde, préparés à froid sans modification du pH et maintenus en suspension isotonique avec toutes leurs propriétés physiologiques. Ampolases O, Ampolases G, Ampolases R, Ampolases F, Ampolases Para N, Ampolases de thymus.

Indications. — Troubles des fonctions génitales, Dépression, Déminéralisation, Anémie, Débilité, etc.

Présentation. — Ampoules buvables.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ou 2 ampoules par jour contenant 33 p. 100 de produit actif.

Durée du traitement. — 12 jours au moins par mois.
Prix : La boîte de 6 ampoules : 21 fr. 30.

OPOLASES

Composition. — Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques prélevés aseptiquement dès l'abat et desséchés par le froid et l'air sec.

Avantages. — Ces produits sont dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

Les poudres de glandes sont préparées par les Laboratoires de Organotechnie situés à proximité des abattoirs de la Villette où sont recueillies les glandes ; elles sont soumises à un simple courant d'air pour les dessécher, ce qui permet de conserver inaltérés leurs principes actifs et leur confère ainsi une activité remarquable.

Principaux produits. — *Opolases* : Ovaires « O », Ovaire et Thyroïdine « O. T. », Thyroïde « T », Surrénale totale « S », Ovaires-Surrénales-Hypophyse-Thyroïdine « P », Testicules-Surrénales-Hypophyse-Cérébrine « P. M. », Mammaire « M », Hypophyse « H », G. Testiculaires.

Parathyroïde à 1/10 de mgr. Thyroïde à 1/10 de mgr (Ttt).

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 dragées par jour.
Prix : 17 et 21 fr. 30 la boîte de 24 dragées.

Enregistré au laboratoire national des médicaments sous les n^{os} 997-1 à 997-15.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Nord 48-22.)

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

LES ENDOCRISINES

Extraits totaux d'organes frais. — Hormones

TOUTES LES GLANDES

Prescrire : ENDOCRISINES FOIE, etc...

Cachets dosés en extrait sec. Ampoules dosées en glande fraîche, soit environ cinq fois le poids d'extrait sec.

Exécution rapide de toutes les Prescriptions Médicales

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
1^o GLANDES PRINCIPALES			
BILE ou BILEYL Sels biliaires dépigmentés et décholesté- rinés	Affections biliaires et hépatiques. Cholécystites. — Ictères. Entérocolites. Constipation.	60 globules	16.65
FOIE Glande totale	Insuffisances hépatiques. Cirrhoses — Dermatoses. Hémophilie.	24 cach. à 0,50 30 comp. à 0,30 6 amp. de 2 cc. à 1 gr.	17.70
*Foie Buvable	Toutes les anémies : Méthode de Whipple pour thérapeu- tique infantile.	7 amp. b. de 10 cc. (150 gr. de foie frais) 12 amp. b. de 2 cc. (30 gr. de foie frais)	54.10 35.35
HYPOPHYSE Glande totale	Hypotension, myocardites toxi-infections. Syndrome adipo-génital. Neurasthénie-Otosclérose.	24 cach. à 0,05 0,10 et 0,20 30 compr. à 0,05 et 0,10 6 amp. de 2 cc. à 0,25	17.70 à 39.50 17.70 24.95 17.70
Lobe antérieur (Extrait total)	Retards de la croissance — Obésité Insuffisances ovariennes et génitales. — Ectopie testiculaire. — Enurésie.	24 cach. à 0 gr. 05, et 0,10 30 comprimés à 0,10 6 amp. de 2 cc. à 0,25	17,70 29,10 27,05 23,90
Lobe postérieur (Extrait total)	Ménorragies et Hémorragies viscérales. — Céphalées. Diabète insipide.	24 cachets à 0,10 5 tubes de poudre à priser à 0,15	31.20 23.90
Hormone post-hypo- physaire ocytocique ou PHYSOCRI- SINE	Inertie utérine. Hémorragies de la délivrance. — Ménorragies et Hémorragies viscérales. Diabète insipide. Atonie gastro-intestinale. Hémoptysies des tuberculeux.	3 amp. 1 cc. à 5 U. I. 6 amp. 1 cc. à 5 U. I. (inj. sous-cutanée) 3 amp. 10 cc. à 5 U. I. (inj. intravein.)	16.65 27.05 27.05
OVAIRE et dérivés Glande totale	Troubles de la ménopause, de la grossesse et de la puberté. Troubles psychiques. Rhumatismes chroniques. Obésité.	30 cach. à 0,05 à 24 cach. à 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50. 30 comp. à 0,10 et 0,20. 6 amp. 2 cc. à 0,50	15.60 à 39.50 16.65 20.80 17.70
Corps jaune (sans folliculine)	Troubles des fonctions menstruelles. — Ménorragies. Stérilité. — Vomissements de la grossesse.	24 cach. à 0,05 0,10 et 0,20 6 amp. de 2 cc. à 0,50	17.70 à 29.10 17.70

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
Corps Jaune Vit. E ou VIT - E - LUTEINE	Stérilité. Avortements à répétition. Troubles de la grossesse.	40 pilules à 0,12 de c. j. et 1 gr. d'huile de germe de blé	21.85
Lipides de l'ovaire ou MINOVA-RIUM	Hyperovarie. Hémorragies menstruelles. Puberté précoce.	40 pilules à 0,15	18.70
Hormone ovarienne FOLLI-CULINE (Benzoate de dihydro en sol. huileuse) et *FOLLIDI-MYL	Hypo-ovarie. Aménorrhées. Oligoménorrhées. Dysménorrhées par hypoplasie ovarienne. Troubles de la ménopause et de la castration. Artérites oblitérantes. Enfants prématurés et athrepsiques.	6 amp. de 1 cc. à 200 U. I. 23.90 6 amp. de 1 cc. à 500 U. I. 23.90 6 amp. de 1 cc. à 1000 U. I. 23.90 6 amp. de 1 cc. à 2000 U. I. 26. » *4 amp. de 1 cc. à 5000 U. I. 29.10 *2 amp. de 1 cc. à 10.000 U. I. (Follidimyl) 29.10 *1 amp. de 1 cc. à 50.000 U. I. 46.80	
PARATHY-ROIDE	Tétanie - Spasmophilie - Ulcus gastrique. Décalcification - Otosclérose Maladie de Parkinson.	48 cachets à 0,001 et 0,002 16.65 30 cac. à 0,01 et 0,02 50 comprimés à 0,001 et 0,005 27.05 amp. inj. s. dem.	
RATE Glande totale	Paludisme. Anémie. Tuberculose.	24 cach. à 0,50 6 amp. de 2 cc. à 1 gr.	17.70
Extraits désalbuminés de Rate à haute concentration SPLENO-CRISINES 15-30-60	Eczémas. Dermatoses rebelles et prurigineuses. Asthme vrai. Tuberculose.	5 amp. de 3 cc. à 15 gr. 22.90 » - - 30 gr. 35.35 » - - 60 gr. 52. » (inj. intramusc.)	
REIN	Néphrites. - Urémie. Albuminurie.	30 cachets à 0,25	15.60
SURRENALE	Maladie d'Addison. Choc opératoire. Adynamie des syndromes infectieux malins. Collapsus. - Asthénies. Décalcifications.	30 et 24 cach. à 0,10 et 0,25 15.60 30 comp. à 0 gr. 10 15.60 6 amp. de 2 cc. à 0,50 17.70	
Glande totale			
Cortico Surrenale (exemple d'adrénaline)	Intoxications. - Adynamies. Hypotension. - Troubles psychiques et Neurasthénie. Alopécies. Vomissements gravidiques.	30 et 24 cach. à 0,10, et 0,25 16.65 6 amp. de 2 cc. à 0,50 21.85	
Hormone surrenale ADRÉNALINE (Organique)	Asthénie - Hypotensions - Collapsus - Mort apparente. Asthme. Shock anaphylactique.	Flacon de 15 gr. sol. à 1 p. 1000. 6 amp. de 1 cc. à 1 p. 1000. 17.70	10.40

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
TESTICULE	Infantilisme génital. Obésité.	30 cach. à 0,20	15.60
Glande totale	Troubles sexuels masculins. Neurasthénie sexuelle. Hypertrophie de la prostate. Stérilité.	30 comp. à 0,30 6 amp. de 2 cc. à 0,50	17.70 17.70
Extrait orchitique dissimulé, ou ANTAGONYL	Médication complémentaire chez la femme — Troubles physiques et psychiques fém. par carence sexuelle. Ozène.	40 comp. à 0,33 6 amp. de 2 cc. à 1,50	20.80
THYMUS	Troubles de la croissance et du dévelop. intellectuel de l'enfant. Ectopie testiculaire. Enurésie.	24 cach. à 0,50 30 comp. à 0,30 amp. inject. sur demande.	17.70
THYROÏDE	Myxoedème — Obésité — Rhumatismes chroniques. Infantilisme et retards de la puberté. — Athrepsie infantile. — Migraines. Ichtyose. — Sénilité précoce. Dysménorrhées.	48 cach. à 1, 2, 5, 20, 25 milligr. 30 cach. à 0,05, 0,10 et 0,20. 24 cach. à 0,25, 0,50. 50 compr. à 1 et 5 milligr. 30 comp. à 0,025 et 0,10, 6 amp. de 2 cc. à 0,025	13 60 à 23.90 15.60 17.70
UTÉRUS ou HORMUTER	Troubles liés à la ménopause chirurgicale et à l'hypogénésie utérine. Dysménorrhées essentielles. Douleurs menstruelles. Frigidité féminine. Fibromes utérins.	40 comp. à 0, 6 amp. de 2 cc. à 2 gr.	22. »

Amygdale Bulbe Cerveau Cervelet Cœur Corps ciliaire Epiphyse	2^e AUTRES GLANDES Ganglion grand sympathique Ganglion lymphatique Mamelle Moelle épinière Moelle osseuse Muqueuse gastrique Muqueuse intestinale	Os Pancréas Placenta Poumon Prostate Rein Rétine
---	---	---

Prix : de 15.60 à 21.85 la boîte de cachets.

Ampoules injectables sur demande.

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
CRINO-STHENYL	3^e ASSOCIATIONS ENDOCRINIENNES		
d^e glandes l'énergie	Asthénies. Convalescences. Déficiences physiques et psychiques.	40 comprimés. 6 amp. inject. Sirop	20.80 20.80 20.80

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
CRINO-MENSTRYL Régulateur ovarien	Aménorrhées. Dysménorrhées. Troubles de la puberté et de la ménopause. Obésité.	40 comp. Forme injectable (Lobe antérieur d'hypophyse et folliculine) 4 amp.	22.90 29.10
S. H. A. (sol. inj. : surrénale, hypophyse et adrénaline)	Crises d'Asthme.	6 amp.	18.70
PLURI-GLANDULAIRES F. et M.	Troubles de la puberté. Déficiences endocriniennes des deux sexes.	30 cach. 60 comp. 6 amp.	18.70 18.70 18.70
Bivalents Trivalents Quadri-valents	<u>O.T. - O.H. - O.S.</u> <u>A.F. - A.H. - A.S.</u> <u>T.H.S. - T.H.O. - T.P.F.</u> <u>T.O.S. - H.O.S. - T.H.A.</u> <u>T.A.S. - H.A.S.</u> <u>E.I.P.F. - H.T.S.O.</u> <u>H.T.S.A.</u>	24 cachets 30 comp. (assoc. soulignées)	21.85 à 2

N.-B. - Les produits marqués d'un astérisque ne peuvent être échantillonnés. **LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES**
7, rue Biscornet - PARIS (XII^e). Tél. : Did. 86-45 (5 lignes groupées).

OPOTHÉRAPIE ISCOVESCO

(Lipoïdes H. I.).

Définition. — Opothérapie totale contenant toutes les hormones spécifiques et les principes actifs de la glande renforcés par les lipoïdes et débarrassée des principes nocifs et inactifs.

Nomenclature :

Extrait ovarien	Gynocrinol.
Extrait orchitique.....	Androcrinol.
Extrait de la glande surrénale débarrassé d'adrénaline	Adrénol Total.
Extrait de la partie corticale de la glande surrénale	Adrénol Cortex.
Extrait du corps jaune	Gynolutéol.
Extrait du cerveau	Cérébrocrinol.
Extrait du placenta	Placentocrinol.
Extrait du foie	Hépatocrinol.
Extrait de l'hypophyse	Hypophysol.
Extrait de la rate	Splénocrinol.
Extrait du cœur	Cardiocrinol.
Etc...	

Présentation. — Pilules dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique (tube de 60). Ampoules injectables en solution huileuse, neutre, indolore, dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique par ampoule (boute de 12).

Mode d'emploi :

Per os : Minimum 9 pilules par jour, en trois prises avant chacun des principaux repas.

Voie injectable : une injection hypodermique quotidienne ou trihebdomadaire.

Opothérapie associée.

Ovaire-Hypophyse.....	Gynohypophysol.
Ovaire, Hypophyse, Surrénale, Thyroïde.....	Gynopolycrinol.
Glande orchitique, Hypophyse, Surrénale, Thyroïde.....	Andropolycrinol.
Ces deux derniers produits n'existent que sous la forme pilule.	

AUTRES PRÉPARATIONS

Yo-Androl. } Voir à Yo-Androl.
Yo-Gynine. }

OPOPÉDOL (granulé thyroïdien) à l'usage infantile.

ANDRO-GOUTTES fractions hydro et lipo-soluble de la glande orchitique. (Voir à *Andro-Gouttes*.)

GYNÔ-GOUTTES, solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant la totalité des principes actifs de l'ovaire. (Voir à *Gyno-Gouttes*.)

NOVOCORTEX, extrait de la partie corticale de la glande surrénale en gouttes. (Voir à *Novocortex*.)

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e). (Wag. 07-90.)

OPOTHÉRAPIE LAURIAT ISORGANE

Fabrication LAURIAT (Procédé breveté).

Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.

FOIE DE VEAU

Cachets de 0 gr. 50

Dose d'entretien : 1, 2, 3 cachets par jour.

Dose maxima : de 8 à 10 cachets par jour.

Indications. — Anémies graves et pernicieuses.
Déchéances organiques. Convalescences. Troubles
hépatiques.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

COMPLEXE F

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— d'ovaires.....	0,10
— d'hypophyses	0,05
— de thymus.....	0,05

Dose normale : 1 cachet matin et soir.

Indications. — Arriération féminine. Retard des
signes de la puberté. Syndromes adiposo-géni-
taux. Faiblesses générales. Surdité, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

COMPLEXE H

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— d'orchitine.	0,10
— d'hypophyses	0,05
— de thymus.....	0,05

Dose normale : 1 cachet matin et soir.

Indications. — Infantilisme masculin. Développe-
ment retardé. Syndromes adiposo-génitaux. Sur-
dité. Boîte de 20 cachets : Public : 25 fr. 55.

OVARINE COMPOSÉE

Cachets de 0,10

Poudre d'ovaires	0,075
— d'orchitine	0,025

Dose normale : 1 cachet matin et soir, 5 jours
avant la date présumée des règles.

Indications. — Insuffisance ovarienne. Ménopau-
se. Troubles menstruels. Règles insuffisantes.
Aménorrhée. Dysménorrhées, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

Exécution de toutes formules
sous notre propre

OPOTHÉRAPIE LAURIAT ISORGANE

Fabrication LAURIAT (Procédé breveté)
Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.

RATE

Cachets de 0,35 (Poudre de rate de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 1 cachet matin, midi et soir.

Indications. — Paludisme. Cachexie palustre. Hypertrophie de la rate. Toutes les anémies. Hémorragies utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

REINS

Cachets de 0,25 (Poudre de reins de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Accidents urémiques. Insuffisance de l'activité rénale. Néphrites aiguës, infectieuses et toxiques. Brightisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

ORCHITINE COMPOSÉE

Cachets de 0,20

Poudre d'orchitine 0,175

Poudre d'ovaires..... 0,025

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir ; 15 jours par mois.

Indications. — Insuffisance organique. Impuissance fonctionnelle. Débilité sénile. Asthénie musculaire et nerveuse. Infantilisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

MAMMAIRE

Cachets de 0,40 (mamelles de vaches).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Stimulante de la sécrétion lactée chez les nourrices insuffisantes. Régulatrice d'un fonctionnement utéro-ovarien excessif. Congestions utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

THYMUS

Cachets de 0,50 (Poudre de thymus de veau).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Maladies de Basedow. Goitre simple. Enfance débile. Troubles de la croissance et de la nutrition.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

Laboratoires LAURIAT

La Garenne-Colombes — SEINE.

(Tél.: Charlebourg 23-78.)

magistrales (Produits opothérapiques)
marque "Isorgane".

OPOTHÉRAPIE MONCOUR

En **Sphérulines**, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous les extraits totaux préparés avec des glandes fraîches, par dessiccation à froid dans le vide profond.

1° Sphérulines monergiques.

Dosages (suivant les extraits) : 0 gr. 10 et 0 gr. 20.

Sphérulines thyroïdiennes : 0 gr. 001, 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 05, 0 gr. 10.

Sphérulines parathyroïdiennes : 0 gr. 001.

Posologie. — 1 à 6 par jour, sauf hépatiques et rénales : 1 à 16.

Prix : de 16 à 20 francs l'étui de 30 à 80 sphérulines, suivant extraits et dosages.

2° Sphérulines synergiques.

(Associations opothérapiques.)

Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques, Thyro-surrénales, Hypophyso-ovariennes, Surréno-ovariennes, Surréno-orchitiques, Surréno-hypophysaires, Entéro-pancréatiques, Thyro-surréno-ovariennes, Hypophyso-surréno-Thyroïdiennes, Hypophyso-surréno-ovariennes, Hypophyso-ovaro-thyroïdiennes, Hypophyso-thyro-surréno-ovariennes, Hypophyso-thyro-surréno-orchitiques.

Posologie. — 1 à 6 par jour.

Prix : de 20 à 22 francs l'étui de 20 à 36 Sphérulines (suivant associations).

NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Opothérapie fraîche, préparée de suite, au reçu de la prescription médicale, avec des glandes fraîches pour être ingérées fraîches.

Préparations datées. Tous dosages, organes et associations.

Prix : variables suivant les dosages, organes, associations et nombre de prises formulés.

Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.
(Tél. : Molitor 08-47.)

OPOTHÉRAPIQUES "GRINEX-UVÉ"

Nos extraits totaux CRINEX, OREX, FRÉNOVEX et CRINEX-OREX (AMBO) permettent de traiter efficacement la majorité des troubles génitaux ou périphériques liés à un dysfonctionnement ovarien.

Comme des causes pathologiques différentes produisent des syndromes identiques, un même trouble devra, selon les causes, être traité par des produits différents. Pour chaque syndrome, les produits à essayer successivement sont classés selon l'ordre de fréquence de chaque étiologie.

Les produits sont désignés par des initiales :

A. : CRINEX-OREX (AMBO)

C. : CRINEX

O. : OREX.

F. : FRÉNOVEX.

Acné juvénile.....	O.	Hyperfolliculinie (Trou-	
Acrocyanose	O.	bles par)...	O. ou F.
Aménorrhées primitives		Hypergénéralisme.....	
A. ou C. ou O. ou	F.		O. ou F.
Aménorrhées secon-		Hyperhidrose	O.
daires. C. ou O. ou	A.	Mastopathies doulou-	
Asthénies psychiques et		reuses	O. ou F.
somatiques	O.	Menaces d'avortement..	F.
Asthme. C. ou O. ou	F.	Méno-métrorragies ...	F.
Avortements à ré pé-		Ménopause.....	A.
tition	F.	Obésité	O. ou C.
Castration.....	A.	Oligoménorrhées pri-	
Dépressions nerveuses..	O.	maires.....	A.
Dysménorrhées	C.	Oligoménorrhées secon-	
Dysménorrhées rebelles.		daires. C. ou F. ou	O.
O. ou	A.	Polyménorrhées	F.
Eczéma	O.	Prurit vulvaire	O.
Engelures	O.	Puberté (Voir : Amé-	
Erythrocyanose	O.	norrrhées, oligomé-	
Fibromes, Polypes (Hé-		norrrhées primaires).	
morragies des)	F.	Rhinite cataméniale...	O.
Frigidité féminine.....		Rhumatismes ovariens.	A.
C. ou	F.	Sterilité. C. ou O. ou	F.
Furonculose	O.	Troubles psycho-géni-	
Hémorragies de la pu-		taux et neuro-psy-	
berté et de la méno-		chiques	O.
pause	F.	Troubles vaso-moteurs.	O.
Hémorragies utérines..	F.	Vomissements de la	
		grossesse	C.

Pour la posologie et le mode d'emploi, se reporter à :
CRINEX-OREX (AMBO).

CRINEX.

FRÉNOVEX.

OREX.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

Beaune et Cie, Pharmaciens

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV^e).

Tél. : Alésia 28-51.

OPO-VACUOLINE et VACUOLINE-ÉMULSION

Traitement de la Constipation.

L'association de ces deux préparations constitue une médication rationnelle de la constipation et s'adresse à tous les cas.

1° L'une est active : **Opo-Vacuoline** (suc intestinal associé à une émulsion d'huile de paraffine et d'agar-agar-phthaléinée).

Indications. — Constipation chronique ou aiguë, Insuffisance duodénale.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas.

Prix du flacon : 18 francs.

2° L'autre, émolliente : **Vacuoline-Émulsion** (huile de paraffine émulsionnée à des algues marines, sans laxatif, sans drastique).

Action purement mécanique.

Rééducation intestinale rapide sans irriter.

Indications. — Constipation, Entérite, etc. Préparation excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à soupe au milieu des repas.

Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoires DECHOSAL

39, rue Roger-Salengro — BONDY (Seine). (Tél. : 65.)

OPOZONES LUMIÈRE

Préparation à base de glande fraîche.

Organothérapie moderne.

Médication des Troubles endocriniens.

Constitution. — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

Propriétés. — Les dragées d'OPOZONES LUMIÈRE sont obtenues :

1° Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-dessiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait, les OPOZONES LUMIÈRE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale.

Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.

2° Avec rapidité (inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.

3° La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIÈRE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs.

Les OPOZONES LUMIÈRE, même préparées depuis fort longtemps, demeurent inodores. *Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.*

Doses courantes. — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

Formuler. — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIÈRE, en spécifiant l'extrait désiré.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

OPTALIDON

Forme et composition. — *Comprimés dragéifiés* renfermant : Isobutylallyl-malonylurée, 0 gr. 050 ; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125 ; Caféine, 0 gr. 025.

Suppositoires : teneur en principes actifs 3 fois plus élevée que pour les dragées.

Propriétés. — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

Posologie. — De 2 à 6 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 4 dragées 1/2 heure avant le coucher.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

Enfants : 1 à 3 dragées ou 1/2 à 1 suppositoire par jour, à partir de 5 ans.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

OPTICURA BENGUÉ

Composition :

Alcool à 90°.....	3 gr. 75
Sulfate de zinc.....	0 gr. 45
Novocaïne.....	0 gr. 30

Pour 100 grammes.

Indications. — Collyre en flacon compte-gouttes, de conception spéciale. Le liquide ne peut être ni altéré, ni souillé : pas de contact de compte-gouttes, ni atmosphérique. Conjonctivite, Blépharite, Larmoiement, Fatigue oculaire produite par le travail à la lumière, par le soleil, par les poussières, par le vent.

Forme. — Flacon compte-gouttes. Les gouttes sont obtenues par la dilatation de l'air dans le flacon, sous l'influence de la chaleur de la main.

Posologie. — Une goutte dans chaque œil deux ou trois fois par jour.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,
Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trin. 85-60.)

OPTIPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté au ZnO.

Forme. — Occlusive ou perforée, en rouleaux de :
1 m. de long de 1 à 5 cm. de large ;
5 m. de long de 1 à 20 cm. et plus de large.

Avantages. — Adhésivité parfaite, aucune irritation de la peau, grande facilité à l'enlèvement, longue conservation dépassant largement celle habituellement admise pour les produits similaires, aucune odeur.

Indications. — Contention des pansements ; pansements de tractions, d'extensions, etc...

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)
Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS :
104, faubourg Poissonnière (X^e).
(Tél. : Trudaine 92-52.)

OPTO SCOTT

Produits Ophtalmiques Scott :

Opto-Gouttes. — Opto-Tubes. — Opto-Bain. — Opto-Borine.

Notre but : 1° Constance absolue de nos préparations.

2° Asepsie rigoureuse.

3° Groupement de l'arsenal ophtalmologique en un seul mot: *Opto-Gouttes, Opto-Tubes, Opto-Bain, Opto-Borine.*

4° Présentation toute nouvelle correspondant à la perfection pour chacun de nos produits :

<i>Opto-Gouttes</i> : le flacon spécial	12 fr. 80
<i>Opto-Tubes</i> : le tube spécial à canule	7 fr. 40
<i>Opto-Bain</i> : l'ocillère spéciale	18 —
<i>Opto-Borine</i> : le sachet antiseptique.....	10 —

Opto-Gouttes :

N° 1 Sulfate neutre d'Atropine	1	p. 100
N° 2 Nitrate de Pilocarpine.....	2	p. 100
N° 3 Argyrol	3	p. 100
N° 4 Sulfate de zinc	0,5	p. 100
N° 5 Sulfate de zinc	1	p. 100
Novocaïne	1	p. 100

Opto-Tubes :

N° 1 Oxyde jaune de Mercure	1	p. 100
N° 2 Ichtyol	2,5	p. 100
Oxyde de zinc	5	p. 100
N° 3 Iodure de Sodium.....	3	p. 100
Chlorure de Calcium.....	2	p. 100
N° 4 Cuprol	1	p. 100

Opto-Bain :

Tannin à l'éther.....	0 gr. 05
Sulfate de cuivre	0 gr. 05
Sulfate de zinc	0 gr. 10
Acide salicylique	0 gr. 25
Acide borique	1 gr.
Borate de soude	5 gr.
Eau distillée d'hamamélis	150 cc.
Eau distillée..... Q. S. P.	500 cc.

Opto-Borine :

Acide Borique	1 gr.
Borate de soude	1 gr.
Fluorescéine; Q. S.	
Essence de lavande : Q. S. par sachet.	

Produits enregistrés au L. N. C. M.

SCOTT et Fils, pharmaciens.

348, rue Saint-Honoré — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 90-85.)

OPTRAEX (Bain oculaire).

Composition. — Extraits végétaux : Hamamélis, borates, etc...

Propriétés. — Décongestif, antiseptique, vaso-constricteur, régulateur circulatoire. Sans aucun toxique.

Indications. — Inflammation de la conjonctive et des paupières. Surmenage oculaire. Préventif pendant les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — De 1 à 3 bains par jour, selon les cas, en utilisant l'œillère fournie avec le flacon. Durée de chaque bain : une minute environ.

Prix. — Le flacon ordinaire : 13 fr. 25 ; double : 20 francs ; hôpital : 36 francs. Impôt compris.

Laboratoires P. FAMEL

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e).

ORARGOL AMICROS

Complexe colloïdal électrique

Or et Argent.

Anti-Infectieux Général.

I. ORARGOL INJECTABLE (0,05 %). AMPOULES

Boîte de 6 amp. 5 cc. : 22 fr.

Tube de 1 amp. 10 cc. : 7 fr.

— 2 amp. 5 cc. : 7 fr.

Septicémies, Grippe, Fièvres, Traitement pré et post-opératoire.

Posologie. — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection, seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

II. ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %).

Gouttes. — Flacon de 60 gr. : 22 francs.

Grippes, Fièvres, Thérapeutique infantile.

Posologie. — XX à C gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire sans inconvénient.

Rhino-Orargol. — Fl. 20 gr. : 17 francs.
(Compte-gouttes et instillateur nasal.)

IV à V gouttes en instillations nasales.

X à XV gouttes en gargarismes.

III. ORARGOL-COLLYRE

Orargol-Collyre (solution isotonique 0,2 %).

Boîte de 4 ampoules 1 cc. 5 : 15 francs.

Toutes les indications de l'Argent colloïdal comme collyre.

Laboratoire des Produits AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

ORCALCINE

(Granulé)

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Régénérateur complet du sang et recalcifiant intégral. Véritable régénérateur organique. Résultats cliniques remarquablement constants et durables.

Composition. — Extraits hépatiques et spléniques concentrés 33 fois.

- + Fer, Phosphore, Calcium.
- + Chlorophylle et Carotène.
- + Sels d'or à dose homéopathique.

Posologie :

Enfants : 2 cuillerées à café par 24 heures.

Adultes : 2 cuillerées à dessert par 24 heures.

Prix : 19 fr. 75 (pour 15 jours de traitement).

Dépôt chez tous les Grossistes.

Laboratoires de l'Orcalcine

9, rue de La Platière — LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

OREX

**Médication orchitique à formule dissimulée
pour prescription chez la femme.**

Composition. — Extrait orchitique total standardisé (procédé *Crinex*), contient toutes les hormones du testicule.

Gouttes : Solution hydro-alcoolique, 1 cc. (XL gouttes) correspond à 2 gr. de glande fraîche.

Dragées à croquer : 1 dragée = V gouttes.

Ampoules injectables : Solution aqueuse isotonique, indolore. 1 cc. correspond à 2 gr. de glande fraîche.

Mode d'action. — Rétablit l'équilibre entre les sécrétions femelles et mâles de l'ovaire ; freine l'hypersécrétion folliculaire ; exerce un effet tonique sur le psychisme, stimule les métabolismes.

Indications. — Certaines dysovaries rebelles à l'opothérapie homologue (ovarienne).

Troubles généraux par déséquilibre entre les hormones mâles et femelles de l'ovaire : hyperfolliculinie, mastites chroniques.

Troubles cutanés et trophiques d'origine génitale : Prurit vulvaire, Eczéma, Acné juvénile, Acné rosacée, Séborrhée, Engelures, Acrocyanose, Erythrocyanose, Hyperhidrose, Livedo, etc.

Troubles psychiques d'origine génitale : Irritabilité, Insomnies, Pertes de mémoire, Sénilité précoce, Psychasthénie, Nymphomanie.

Posologie. — **Gouttes :** Doses moyennes, XX à XXX gouttes par jour, en 2 ou 3 prises, 1/2 heure avant les repas, dans un demi-verre d'eau ou sur un morceau de sucre que la malade laissera fondre lentement dans la bouche (absorption *per linguam*).

Dragées : 4 à 6 par jour, croquer et non avaler.

Ampoules injectables : Tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours, suivant les cas, injecter par voie sous-cutanée une ampoule, seule ou en autohémocrinothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Prix :

Gouttes ou dragées.....	18 fr. 20
Boîte de 6 ampoules.....	31 fr. 20

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV^e).
(Tél. Alésia 28-51.)

OREXYL

Spécifique des maladies de la nutrition et le plus actif des reconstituants, ranime l'appétit.

Composition. — Persulfates alcalins, métavanadate de soude, fluorure de sodium, tannate d'orexine, glycérophosphate de chaux.

Formes. — Granulé et comprimés.

Indications. — L'Orexyl est indiqué dans tous les cas où il s'agit d'augmenter la nutrition et de relever l'état général de l'organisme : Inappétence, Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Grossesse, Convalescence, Bacillose pulmonaire, Surmenages, physique ou intellectuel, Fractures, Convalescences.

Posologie. — *Enfants* : Une cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, quelques instants avant les deux principaux repas, ou un comprimé. *Adultes* : Une cuillerée à soupe de granulé, ou deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chaque repas.

Prix : Le flac., granulé : 19 fr., 25 j. de trait. p. enfants.
comprimés : 22 fr., 95 j. de trait. p. adultes.

Paul PHILIPPE

Docteur en Médecine — Pharmacien de 1^{re} classe.
5, rue Mazard — LYON (Rhône). — (Tél.: Franklin 76-20.)

ORGANESIUM

Médication stimulante — Tonique — Réparatrice — Association Opo-minérale.

Forme : Granulé de goût agréable.

Formule :

Lobe antérieur hypophyse.....	0, 15
Extrait de glandes orchitiques.....	1, 20
Extrait de glande interstitielle.....	0, 40
Inosito-hexaphosphate de magnésium et de calcium.....	3, 00
Nucléinate de magnésium.....	0, 125

Excipient. Q. s. pour 100 gr.

Prix : 20 fr. 80 la boîte.

Action et indications thérapeutiques.

- 1^o *Action stimulante sur l'état général.* — Anémies, convalescences, états dépressifs, surmenage physique.
- 2^o *Action tonique sur le système nerveux et neuro-musculaire.* — Troubles nerveux, asthénie, fatigue cérébrale et certains phénomènes séniles, tremblements, crampes, contractures.
- 3^o *Action reminéralisante et fixatrice du calcium.* — Croissance, rachitisme, convalescence des maladies infectieuses.

Doses :

Enfants. — 1 cuillerée à café.

Adultes. — 1 cuillerée à soupe avant les deux principaux repas.

Mode d'emploi. — Mettre directement la cuillerée de granulé dans la bouche en une ou plusieurs reprises, avaler ensuite une gorgée d'eau.

Echantillon sur demande. — Grossistes dépositaires O. C. P. et C. N. P. F.

Laboratoires DOUETTEAU Frères

20, faubourg Saint-Honoré — PARIS

ORGANI-CALCION ENDOCRINIEN POLYVITAMINÉ

Opothérapie stimulante.

Granulé de Calcium soluble et Phosphore organiques associés à une synergie glandulaire et aux vitamines A, B et D. Assimilable par voie gastrique. Association médicamenteuse très active, répondant aux plus récentes données de l'endocrinologie et de la biologie.

Indications. — Déficiences glandulaires, neurasthénie, pré-carences (troubles entéritiques, asthénie, anémie). Rachitisme, fractures, carie dentaire, troubles de la croissance. Toutes déminéralisations, convalescence, surmenage, débilité, Grossesse, allaitement, Tuberculose, Rhumatisme chronique, Aérophagie.

Posologie. — *Nourrissons* : 1/2 cuillerée à café par jour ; *enfants* de 1 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café ; de 5 à 10 ans : 3 cuillerées à café ; *adultes* : 3 cuillerées à dessert. A croquer (goût agréable) ou à délayer.

Aucune contre-indication : ni arsenic, ni strychnine, ni surrénales, ni thyroïde.

Prix : 20 francs. (Durée minimum 10 jours.)

Laboratoire National de Contrôle, 196-3.

Laboratoires du VIOPHAN

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX. (Tél. : 340-29)

ORGANI-CALCION SIMPLE

30 Cachets de gluconate de Ca français dosés à 0 gr. 50.
2 à 10 par jour.

Ne possède pas les inconvénients du chlorure de calcium (saveur désagréable, phénomènes d'acidose).

Utilise au maximum, grâce à sa combinaison organique, les propriétés thérapeutiques du Ca ionisé.

Son emploi est curatif et préventif : Hémostatique, coagulant. Hémorragies : opératoire, gastrique, intestinale, pulmonaire, menstruelle. Déchlorurant-diurétique (œdème, ascite, albuminurie, néphrite). Antitoxique (intoxication gastro-intestinale avec dermatoses). Anticlasique : réactions sériques, urticaire, rhume des foies, asthme. Recalcifiant : Grossesse, allaitement, tuberculose.

Troubles vago-sympathiques : hypervagotonie, spasmodie, tétanie, etc.

A noter que l'Organi-Calcion augmente considérablement l'effet thérapeutique de la médication thyroïdienne.

Organi-Calcion injectable : 5 amp. de 5 cc. solution
10 p. 100 stable et 5 amp. de 10 cc.

Prix : 15 francs.

Durée moyenne : 10 jours.

Laboratoire National de Contrôle 196-4 et 5.

Laboratoires du VIOPHAN

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX. (Tél. : 340-29.)

ORGANO-STHÉNINE

DU DOCTEUR L. DELALBRE

EX-STHÉNOLÉINE

PRÉPARATION

OPOTHÉRAPIQUE ET CHIMIOTHÉRAPIQUE
non toxique

RÉPARATRICE DES ORGANISMES AFFAIBLIS
pour

MÉDICATION HUMORALE IMMUNISANTE

curative et préventive

DANS TOUTES LES INFECTIONS MICROBIENNES
(générales, pulmonaires et autres localisations)

PRÉSENTÉE sous forme d'AMPOULES INJECTABLES

- COMPOSITION -

Cholestérine pure.....	0 gr. 02	Camphre.....	0 gr. 02
Lipoïde de Bile.....	0 gr. 001	Essence de Niaouli.....	0 gr. 02
Lipoïde de Rate.....	0 gr. 02	Gaïacol.....	0 gr. 01
Cinnamate de benzyle pur.....	0 gr. 01		
pour 1 c.c.			

Excipient: Huile d'olive surfine, chimiquement épurée et lavée à l'alcool.
délivrée en **AMPOULES de 5 cc. à 2 pointes.**

Chaque ampoule de 5 cc. contient 5 fois les doses ci-dessus.

- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES -

L' "Organo-Sthénine" a pour but la défense de l'organisme
contre les invasions microbiennes

en permettant à celui-ci d'acquérir artificiellement une véritable tolérance ou immunité vis-à-vis de tous les germes infectieux, par renforcement du pouvoir antitoxique du sang (action de la Cholestérine, extraite des cervelles de mouton) et par modification des milieux humoraux (action du Cinnamate de benzyle, retiré du baume du Pérou).

Cette dernière action entraîne une forte hyperleucocytose et, dans les poumons, la création de tissu conjonctif réparateur et protecteur.

DEUX INDICATIONS GÉNÉRALES

États défectifs: Convalescences, Lymphatisme. Prétuberculose, etc.

Grandes infections: Grippe, Typhoïde, Pneumonie, Tuberculose, etc.

----- TRÈS RARES CONTRE-INDICATIONS -----

- MODE D'EMPLOI ET DOSES -

L'injection, toujours indolore, se fait dans les muscles (fesse ou cuisse).
Jamais la moindre réaction; toutefois mieux vaut l'injection lente.

DOSES MOYENNES POUR 48 HEURES

ADULTES :

Une injection d'une ampoule de 5 cc. tous les 2 jours (pratiquement trois injections de 5 cc. par semaine) jusqu'à concurrence de 24 injections de 5 cc. au minimum en 2 mois.

Pour la durée du traitement (2, 4 ou 6 mois consécutifs) et pour doses supérieures (5 ou 10 centic. par jour), se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS

4 cc.

ENFANTS

1 à 2 cc.

NOURRISSONS

1/2 à 1 cc.

PRIX AU PUBLIC : 29 fr. 00 LA BOITE de 8 AMPOULES

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

P.-L. DUMONT, Pharmacien

2, rue Claude Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11 et 22-68.)

ORGANOTIOL S-S

Soufre naturel organique non oxydé.

Formule :

Méthyl-Propyl-Thiophène-Sulfonate de soude.....	13 gr. 33
Excipient aromatisé.....	0 gr. 35
Alcool à 95°.....	8 cc. 3
Eau distillée	Q. S. pour 100 gr.

Composition. — Le Méthyl-Propyl-Thiophène est un soufre vital fossilisé, extrait de dépôts organiques riches en Planctons.

Ce soufre se présente sous la forme Thiophénique naturelle, c'est-à-dire la plus apte à l'absorption par l'organisme.

L'*Organotiol* est atoxique, sans choc et parfaitement assimilable.

Aucune contre-indication.

Doses :

Adultes : XXV à L gouttes par jour (1/2 à chacun des deux repas).

Enfants : demi-dose.

Indications générales. — *Toutes les carences soufrées* dont on commence seulement à soupçonner l'importance et qui se traduisent par un déséquilibre du métabolisme soufré.

A titre d'indications particulières, nous signalons :
La cure de tous les états arthritiques ;

L'action élective tissulaire (soufre sulfinique) sur les infections pulmonaires chroniques ou laryngées ;

L'action de désintoxication très puissante sur les accumulations métalliques ;

L'action spécifique de désensibilisation et d'antiseptie hépato-entéritique ;

Les dermatoses de toutes origines.

Prix. — Le flacon de 30 cc. : 22 francs.

Laboratoires de Spécialités scientifiques
LOGEAI

J. GOBERT, Pharmacien.

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

ORTEDRINE

Sulfate de phényl 1-amino 2-propane.

Composé organique stimulant l'activité du système orthosympathique et du système nerveux central.

Indications. — Maladies de Parkinson post-encéphalitique, Narcolepsies, Hypersomnies, Dépressions physiques et psychiques.

Présentation et posologie. — Tubes de 20 comprimés dosés à 0 gr. 005 (divisibles en deux), Posologie variable suivant les sujets. Chercher la dose optimum en commençant par 1 comprimé, la dose totale étant comprise entre 2 et 4 comprimés.

Prix de vente : Le tube de 20 comprimés, 12 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e),

(Tél. : Balzac 22-94.)

ORTHOCHOL

Granulé.

Médications de tous les États Hépatobiliaires.

Cholécystites avec ou sans Lithiase, gros foie, Congestion hépatique, nausées, troubles gastriques et d'origine hépatique.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour dans un verre d'eau chaude.

Formule. — Sulfate de magnésium, sel de seignette, Benzoate de lithine, masse effervescente.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mon. 33-86.)

ORTHOCYNOL

Dragées.

Médication de *stimulation hépato-spléno-rénale* à base de *Cynara*, d'*Orthosiphon*, d'*acide ascorbique* (Vitamine C) et de *Quinquina*.

Propriétés. — Sollicite les sécrétions hépato-biliaires, Mobilise et élimine la cholestérine en surcharge. Active les sécrétions rénales (aqueuse, azotée, chlorurée). Combat la sclérose viscérale et l'arthritisme. Corrige les dyscrasies sanguines.

Indications. — Insuffisance hépatique (ictère, troubles digestifs, manifestations cutanées, troubles liés à l'imperméabilité rénale).

Foie colonial. Brightisme. Oligurie. Hépato-néphrites aiguës. Scléroses viscérales et vasculaires. Diathèse arthritique. Diathèse hémorragique. Trouve ses applications tant en médecine d'adulte qu'en chirurgie et en pédiatrie.

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, au cours des repas avec une tasse d'infusion chaude 1/2 dose pour les enfants.

Cure : 10 à 20 jours par mois.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale et admise aux Assurances Sociales.

Laboratoires R. BOUTIN

Pharmacien, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII^e). (Tél. : Étoile 09-63.)

ORTHO-GASTRINE

Formule :

Sulfate de Soude anhydre	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude	0 gr. 10

Pour 1 paquet ; n° 30.

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alimentaire, etc.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 paquets par jour.

Enfants (sucrer légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 9 francs.

Laboratoire A. LEBLOND

Pharm. de 1^{re} classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.
15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36).



ORTHOGÉNOL

Traitement de Base des Maladies
de l'Age mûr.

Formule de redressement biologique (1)
du Docteur A. VERNIER

Composition. — Phosphore, Magnésium, Manganèse, Silice, Soufre, Lithine, Diurétine, Scille, Ac. Thyminique (solv. urique physiol.)

+ Opothérapie homostimulante, substitutive et régulatrice : Foie, Hypophyse antér., Thyro-Parathyroïdes, Glande interstitielle mâle, Sur-rénale (privée d'adrénaline).

— Régénérations cellulaires. Réactivation physiologique. Dépuration.

Indications. — Déficiences organiques et fonctionnelles qui constituent l'usure physiologique. Troubles biologiques intriqués de l'Involution sénile normale ou pathologique. Age critique des deux sexes. Arthritisme, Artériosclérose, Rhumatismes (2), Diabète, Obésité, Azotémie, Anuries médicales.

Présentation. — Deux formes : *Cachets* et *Élixir*.

Posologie. — L'ORTHOGÉNOL, traitement de Base, se prescrit à la dose minima, longtemps soutenue, de 3 cachets ou cuillerées à soupe d'élixir par jour. Dans les grandes *Anuries* (avec Anasarque, Hydropisie, Asystolie), cette posologie doit être doublée pour obtenir fidèlement les Débâcles libératrices sous l'action conjuguée des *Dépurateurs tissulaires*, des *Diurétiques rénaux* et des facteurs *Endocriniens* de la Diurèse (2).

(1) Sénescence et morbidité sénile, M. Mazauric (*Thèse de Montpellier*, 1931).

(2) Dermo-révuulsion par effleurage « en raies de feu ». *Le Polycautére du Dr Vernier*, R. Grégoire (*Thèse de Montpellier*, 1933).

Prix : 33 fr. 30.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ORTHOLAXINE

Présentation. — Dragées à noyau central glutinisé sous un revêtement se dissociant dans l'estomac.

Composition.

Revêtement externe soluble dans l'estomac.	Extrait de Cascara Sagrada privé d'amertume.....	0gr.035
	Extrait de bourdaine.....	0gr.050
	Poudre d'aloès.....	0gr.025
	Evonymne brune.....	0gr.015
	Extrait de belladone.....	0gr.005
Noyau central ne se dissociant que dans l'intestin.	Poudre de belladone.....	0gr.005
	Poudre de muqueuse d'intestin grêle.....	0gr.05
	Extrait inaltérable de fiel de bœuf.....	0gr.05
	Extrait pancréatique.....	0gr.03
	Ferments lactiques.....	0gr.05
	Essence d'anis.....	0gr.025

Action physiologique. — Laxatif doux ne provoquant aucun spasme ni colique, aucune irritation ni accoutumance.

Indications. — La *Constipation* chronique ou passagère, sous toutes ses formes, avec toutes ses conséquences habituelles : affections gastro-hépatiques, entérites, maladies de la nutrition, arthritisme, migraines, affections cutanées, hémorroïdes, syndrome entéro-rénal, etc...

Posologie. — Comme laxatif habituel, une ou deux dragées avant le dîner (une ou deux dragées supplémentaires dont les cas de constipation rebelle):

Prix : 16 fr. 65.

SPECIALITÉS PHARGÈNE — VIAL & C^{ie}

Laboratoires de Pharmacologie Générale.
8, rue Vivienne — Paris (II^e). (Tél. : Gut. 27 (3).)

ORTHONEUROL

Stimulant physiologique général.

Formule :

Acide phosphorique.....	20 gr.
Glycérophosphate de soude	18 —
Glycérophosphate de magnésie ..	3 —
Glycérophosphate de manganèse ..	2 —
Sérum physiologique... Q. S. P.	100 —

Indications. — *Tonique nervin. Stimulant général* qui trouve son application dans tous les cas de *Faiblesse générale et nerveuse, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Phosphaturie, Alcalose, etc.*

Forme. — Gouttes.

Posologie. — XX gouttes à chaque repas dans la boisson.
Enfants : demi-dose.

Durée du flacon : 15 jours environ.

Prix au public : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. M.

Laboratoires SOURIGUÈRE

ANGOULÈME (Charente).

(Tél. : 2-42.)

ORTHOPHORINE

Composition. — Granulé soluble, d'un goût agréable sans acidité brutale, pouvant se croquer pur.

Acide orthophosphorique 7 gr.

Phosphate disodique crist 14 gr.

Sucre 20 gr.

Lactose Q. S. P. 100 gr.

Une cuillerée à café = VI gouttes PO⁴ H³ libre.

Indications. — Troubles de la nutrition, Lithiase phosphatique, Etats alcalosiques, Dermatoses, Dyspepsie, Céphalées, Prétuberculose, Phosphaturie, Déminéralisation, Oxalémie, Arthritisme, Anémie.

Tonique du système nerveux, Asthénie, Mélancolie, Surmenage physique et intellectuel.

Mode d'emploi. — Se prend au milieu des repas, pure ou dans un peu d'eau.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : jusqu'à 12 ans, 1/2 dose.

Prix : Traitement pour 7 jours, 15 francs.

Laboratoires A. LEBLOND

15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36.)

ORTHOSEDAN

Comprimés.

Régulateur du Système Vago-Sympathique.

Doses. — 2 à 4 comprimés par jour.

Indications. — Céphalées, Migraines, Anxiété, Angor, états dépressifs.

Composition. — Dionine, Théobromine, Extrait de Cratægus, Phénylméthyl malonylurée.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Moncey 33-86.)

ORTHOSIPHÈNE

Composition. — Solution concentrée et titrée des principes actifs extraits des feuilles de l'*orthosipon stamineus*, sans toxicité.

Propriétés. — *Médicament hépato-rénal, stimulant de la dépuratation urinaire, abaisse le taux de l'urée sanguine, Antiurique, Désintoxicant.*

Forme. — Extrait aqueux en ampoules buvables de 10 cc. (Boîte de 8 amp.). contenant tous les principes actifs de 6 gr. de feuilles sélectionnées de plante.

Indications. — A prescrire au cours des Insuffisances hépato-rénales, Azotémie, Uricémie, Arthritisme, Hypertension, Maladies infectieuses, Affections cardio-vasculaires.

Posologie. — Diluer le contenu d'une ampoule dans un demi-litre d'eau, sucrer à la convenance la tisane ainsi préparée, l'absorber en 4 ou 5 prises au cours de la journée, et dans l'intervalle des repas.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie
20, rue des Fossés-St-Jacques — PARIS.

OSMOLÉINE

Pommade stérilisée antiseptique pour pansement de la muqueuse des fosses nasales.

Composition. — Camphre, Benzoate de soude, Soufre précipité, Acide borique, Menthol, Essence de géranium rosat.

Propriétés. — Désinfection de l'auvent nasal, de la filière nasale jusqu'à sa partie postérieure.

Indications. — Toutes les affections subaiguës ou chroniques des fosses nasales : l'ozène avec sécrétion et croûtes fétides, les séquelles de sinusite maxillaire et frontale.

Mode d'emploi. — Après avoir mouché pour vider les fosses nasales, aspirer doucement par l'une et par l'autre narine alternativement le volume d'un pois de la pommade, 3 fois par jour.

Présentation. — Tube d'étain avec olive nasale.

Prix : 8 fr. 55.

L. N. C. 314-35.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS. (Tél. : Marcadet 14-14.)

OSMO-PEPTINE SANOVA

Comprimés destinés à donner une solution osmotique qui dialysera la muqueuse stomacale, la cellule hépatique et la vésicule biliaire.

Formule par comprimé :

Sulfate de Soude.....	0,14
Sulfate de Magnésie.....	0,14
Sesquiphosphate de Soude.....	0,04
Bromure de Sodium.....	0,05
Peptone.....	0,02
Bicarbonate de Soude.....	0,10

Champ d'action : Tous les troubles de l'estomac, du foie et de la vésicule.

Principales indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsies, fermentations, ballonnement, digestions pénibles, migraine, urticaire, surmenage alimentaire, neurasthénie dyspeptique, ulcères, gastropathies hépatiques et biliaires, constipation.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés à jeun dans un verre d'eau chaude. Petit déjeuner 1 heure après. Pendant 12 à 15 jours consécutifs chaque mois ou tous les 2 matins en alternant avec un comprimé d'Hépatisme le soir en dinant.

En cas de brûlures, de lourdeurs ou de malaises de l'estomac, on peut, dans la journée, croquer 3 ou 4 comprimés si on n'a pas d'eau chaude.

Prix : 14 fr. 25 le flacon.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT, 103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

OSMO-VACCINS BRÉANT COLIBACILLES

Vaccins par voie buccale, par pansements ou par instillations vésicales.

Composition. — 200 milliards de germes :

Colibacilles.....	150 milliards.
Entérocoques.....	30 —
Bacillus proteus.....	10 —
Staphylocoques.....	10 —
Endo et exotoxines en milieu osmotique.	10 cc.

Indications. — Infections intestinales (colites, entérocolites, etc.), Syndrome entéro-rénal, colibacillurie, soins pré et post-opératoire, etc...).

Posologie. — Une ampoule, le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau.

Boîte de 8 ampoules de 10 cc..... 37 fr. 50

Boîte cure de 18 ampoules de 10 cc..... 52 fr.

N. B. — Existents :

Les **Osmo-Vaccins Bréant Gynécologiques** (ampoules et ovules).

Les **Osmo-Vaccins Bréant Rhino** (ampoules).

Les **Osmo-Vaccins Bréant Staphylo** (ampoules).

LABORATOIRES D'ANALYSES BRÉANT

11, rue de Clichy. — PARIS. (Tél. : Trinité 23-84.)

OSSYL

Reminéralisateur et reconstituant vivant directement assimilable.

Composition et propriétés. — *Poudre d'os frais, non calcinés (os fœtaux).* — Produit vivant à maximum d'activité, contient les vitamines naturelles.

Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie. Phosphore organique naturel, extrait de l'embryon de blé. Contient les Vitamines A et B.

Nucléinate de manganèse. — Provoque une réaction de défense hyperleucocytaire.

Silicate de magnésium — Agent de reminéralisation et d'ossification.

Fluorure de calcium. — Reminéralisateur. Stabilise la cellule nerveuse. Règle le fonctionnement des glandes endocrines.

Poudres de surrénale et de thymus. — Anti-toxique et anti-rachitique.

Indications : Troubles de croissance, rachitisme, fractures, états pré-tuberculeux, tuberculose, grossesse, lactation, anémie, convalescence.

Forme et posologie : Cachets et granulé fondant à prendre au début des repas.

Adultes : 3 cachets par jour ou 3 cuillerées à dessert.

Adolescents : 2 cachets par jour ou 3 cuillerées à café.

Enfants : 2 cuillerées à café de granulé par jour.

Prix : Cachets : 17 francs. — Granulé : 18 francs.

Remboursement applicable aux Assurances Sociales : Catégorie B.

Laboratoire de l'OSSYL

D^r F. VASSEUR, Ph^a, Ancien chef de Laboratoire — GLAGEON (Nord).

OSTÉOPEPTINE

Composition. — Poudre de moelle osseuse rouge. Pepsine extractive. Phosphate tricalcique.

En dragées chocolatées, facilement acceptées par les enfants.

Indications. — Dyspepsie et anorexie infantiles. Insuffisance de poids et de taille. Convalescence des maladies infantiles aiguës.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour avant les repas.

Prix : 18 francs la boîte de 30 comprimés.

LES LABORATOIRES DRAPIER

RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

OSTRÉIODE

Eau de mer, biologiquement suriodée ; procédé Salles-D^r Loubatie.

Composition. — Eau de mer naturelle iodoactivée par un procédé respectant les lois de la nature et le cycle de l'iode dans les océans.

Présence de quantités d'iode importantes par rapport à la teneur en iode du milieu marin et sous ses diverses formes dont la forme thyroxinienne.

Teneur : 80 milligrammes par litre, d'iode assimilable.

Indications. — Lymphatisme sous toutes ses formes. Croissances difficiles. Asthénie des convalescents. Inappétences. Dépressions. Anémies. Grossesse. Rachitisme. Dysthyroïdies.

Toutes les cures marines à domicile.

Posologie. — *Adultes* : 4 cuillerées à bouche par jour.

Enfants au-dessus de 5 ans : demi-dose.

Enfants au-dessous de 5 ans : 2 cuillerées à dessert.

Au début des repas, pure ou dans un liquide tiède ou froid. (Eau, lait, bouillon).

Prix : 20 fr. 80 le flacon d'un demi-litre.

OSTRÉIODE Injectable

Composition. — Eau de mer iodoactivée biologiquement par le procédé Salles-D^r Loubatie. Procédé permettant le maintien de la vie marine en milieu directement isotonique, au sérum sanguin.

Teneur en iode : 50 milligr. par litre.

Indications. — Toutes les indications du traitement marin enrichi en iode vital. Effets extrêmement rapides dans les carences minérales.

Prétuberculose, rachitisme, croissance, lymphatisme, suites opératoires, surmenage, anémies secondaires, infections, convalescences, paludisme, séquelles coloniales.

Mode d'emploi. — Série de 8 injections — une tous les deux jours. Voie sous-cutanée. Interrompre 10 jours et reprendre.

Présentation. — Boîte de 8 ampoules de 10 cc.

Prix : 31 fr. 20.

Laboratoires de l'OSTRÉIODE

J. SOUTERBICQ, Pharmacien

344, boulevard de la Plage — ARCACHON

(Tél. : 0.64.)

Agent général de vente : S. I. T. S. A.

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

OTALGOLEX

Tube instillateur de soluté neutre glycériné rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

Composition. — Sol. d'adrénaline, stovaïne, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon, glycérine chimiquement pure.

Propriétés. — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

Mode d'emploi. — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube : 12 francs
pour 15 jours de traitement.

Dépôt général pour la France.

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

OTOLÉINE

Composition. — Sulfate de paraaminobenzoyldi-butylaminopropanol, adrénaline, acide phénique cristallisé, glycérine neutre.

Propriétés. — Analgésique, vaso-constrictive, décongestive et antiseptique.

Indications. — Otites externes, otites moyennes, sèches ou suppurées, et toutes affections congestives, subaiguës ou chroniques de l'appareil auditif.

Présentation et prix. — Un flacon : 14 francs.

Posologie et mode d'emploi. — 2 fois par jour, instiller après avoir fait tiédir au bain-marie quelques gouttes d'OTOLÉINE dans chaque oreille, et recouvrir d'un tampon d'ouate stérile.

Laboratoires de Thérapeutique

Oto-rhino-laryngologique.

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 02-41)

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif cristallisé du Strophantus gratus isolé par le procédé particulier du Professeur Arnaud. — Étalon International.

Propriétés. — Cardio-tonique énergique. Diurétique puissant.

Indications. — Insuffisances cardiaques à rythme régulier ou accompagnées de bradycardie. Insuffisance aiguë ou progressive du ventricule gauche. Myocardites.

Formes. — Solution à 2/100 (Actibaïne), dont L gouttes = 20 mg.

Ampoules 1/4 mg. (1 cc.) pour inject. intravein.

Ampoules 1/2 mg. (2 cc.) pour inject. intramusculaires.

Doses. — L'*Ouabaïne Arnaud* ne s'accumulant pas, le traitement peut être poursuivi aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Per os. *Doses d'attaque* : XL à LX gouttes par jour de solution à 2/100 en 2, 3 prises.

Doses d'entretien : XXV à XL gouttes par jour en 2 prises.

Voies intraveineuse et intramusculaire. Injecter par jour : soit 1/4 mg. (1 cc.) d'une ampoule intraveineuse, soit 1/2 mg. (2 cc.) d'une ampoule intramusculaires.

Prix :

Solution à 2/100 (Actibaïne)....	20 fr. 50
Ampoules	19 fr. 50

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

OUABAÏNE-MIALHE

Soluté au centième d'Ouabaïne cristallisée. Cent gouttes = vingt milligrammes.

Ralentit, renforce, régularise le cœur, provoque la Diurèse. Réduit les œdèmes. Insuffisance cardiaque, Dilatations aiguës des cavités droites, Cardiopathies valvulaires, Asthénie du Myocarde, Arythmie, Tachycardie, Médication spécifique du cœur droit.

Ouabaïne-Mialhe ne s'accumule pas ; le traitement peut donc être prolongé tout le temps nécessaire à l'amélioration du malade,

X à L gouttes par 24 heures.

Conservation indéfinie.

Flacon 6 cc. Prix : 20 fr. 80.

Ampoules au 1/10 et au 1/4 de milligramme.

Intraveineuse ou intramusculaire.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (II^e).

(Tél. : Rich. 35-10.)

OUATAPLASME

du Dr Ed. LANGLBERT.

Pansement humide, complet.

Instantané, aseptique émollient.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Absès, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquor de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se sinapiser en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

Se trouve dans toutes les Pharmacies en enveloppe entière, demi et quart d'enveloppe.

Établissements SABATIER

10, rue René-Bazin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 06-40.)

OVA-CRINE

Dragées.

Composition :

Hormone ovarienne lipoïdique acéto-soluble	0,01
Ovarine	0,05
Hypophysine	0,01
Hépatine	0,05
Phényléthylmalonylurée	0,01

Pour 1 comprimé dragéifié.

Mode d'action. — Supprime l'hypo-activité ovarienne. Médication endocrinienne d'appoint.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne et des troubles qui l'accompagnent. Troubles de la puberté. Troubles de la menstruation. Aménorrhée. Dysménorrhée. Règles douloureuses. Ménopause naturelle ou artificielle. Stérilité. Obésité.

Posologie. — De 2 à 4 dragées par jour en 2 fois, loin des repas, pendant 10 à 20 jours par mois.

Prix : 22 francs.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

17, rue Chomel — PARIS (VII^e).

OVOBIOL

Bouillon Bromuré Léoithiné.

Puissant sédatif du Système Nerveux.

Reconstituant cellulaire.

L'Ovobiol apaise le système nerveux en état d'excitation morale ou physique et favorise le sommeil. Il fortifie par les phosphates assimilables et la lécithine

qu'il renferme.

Effets rapides et prolongés sans inconvénient.

Les tablettes d'Ovobiol se dissolvent rapidement dans l'eau bouillante.

Absorber tel quel ou mélangé à l'alimentation habituelle (potage, légumes, etc...).

Dose normale, toujours utile : 1 à 3 tablettes par jour.

Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour (selon l'avis du médecin).

Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes suivant l'âge.

Laboratoire A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 11-86.)

OVOMALTINE

Aliment naturel équilibré.

Source abondante de vitamines et de diastases.

Composition. — Extrait préparé sous vide à basse température, à partir du malt, du lait et du jaune d'œuf frais, aromatisé par une trace de cacao.

Forme. — Paillettes solubles.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne, complet, tonique riche en diastases, sels minéraux et vitamines. Auxiliaire de la digestion. Galactagogue.

Indications. — Diète liquide. Etats fébriles, états post-opératoires anémies, convalescences, grossesse, suralimentation. Affections de l'appareil digestif : abcès dentaires, phlegmons de la gorge, angines, ulcères, troubles gastro-intestinaux, carences frustes.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe à faire dissoudre dans une tasse de lait, eau, café, thé, ou toute autre boisson chaude. Ne pas faire cuire.

Société Anonyme des Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.

OVUCRIDINE

Ovules au « Ricinonol ».

Composition. — Acridine, Cristal violet, Chlorure de platine.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, Antigonococcique, Décongestif, Sédatif du système nerveux génital.

Indications. — Blennorragie et ses complications. Dans le traitement conjugal de la blennorragie à utiliser dans tous les cas.

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Mode d'emploi. — Un ovule tous les deux soirs.

Remarque : Les taches pouvant résulter de leur emploi disparaissent après simple savonnage.

Prix : 18 fr. 20.

(N° du L. N. C. M. 795-7).

Laboratoires TERRASSE

2, Rond-Point du Centre — LA GARENNE-COLOMBES
(Seine).

(Tél. : Charlebourg 22-84.)

OVULE AU LACTOSMOSE

Iso-acide du vagin pH : 4,5

L'Ovule au Lactosmose est une **Bouillie Lactique**. Lacto-sérum hyperacide, 4 cc. ; bacilles lactiques, 60 millions ; lactose, 2 cc.

Emploi comme d'usage. L'Ovule au Lactosmose remplace les ovules médicamenteux. *L'Ovule au Lactosmose, iso-acide, n'irrite jamais la muqueuse, ne tache pas et associe la propreté à l'hygiène.*

Indications. — Leucorrhée, vulvo-vaginites, vaginites séniles, métrites, infections gynécologiques, ulcérations, suites de couches, néos.

La boîte de 6 ovules..... 18 fr. 50.

OVULACYD

Pour Vaginite à Trichomonas

L'Ovulacyd ovule sec se désagrègeant dans le vagin. Stovarsol (acide acétylamino-phényl-arsinique), 0,25 ; hydrates de carbone, 2 cc.

Mettre un Ovulacyd matin et soir dans le vagin. Au bout de 10 jours, alterner Ovulacyd, Gyno-Lactosmose. Le traitement peut demander 4 à 5 semaines.

Le flacon (cure de 15 jours)... 18 fr. 50.

Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE
Bureaux, 26, boulevard des Batignolles. PARIS (XVII^e).

OVULES A L'IODÉOL

Composition. — Chaque ovule contient 0 60 d'Iode colloïdal électrochimique (*Iodéol*) ; enfermés dans une enveloppe métallique sertie à la presse, ces ovules gardent un point de fusion absolument fixe, 36°, 5, et peuvent se conserver indéfiniment.

Propriétés. — Les ovules à l'*Iodéol*, grâce à la diffusibilité de l'Iode colloïdal, calment presque instantanément la douleur, décongestionnent la muqueuse, modifient et tarissent les sécrétions et produisent une cicatrisation et une guérison rapide (voir à *Iodéol Viel*).

Les ovules à l'*Iodéol*, ni toxiques, ni caustiques, réalisent le pansement gynécologique idéal. L'*Iodéol* détruit tous les germes, ne coagule pas les albumines, respecte les tissus, et de ce fait pénètre par osmose dans la profondeur des tissus en conservant ses propriétés antiseptiques.

Indications, Posologie. — Les ovules à l'*Iodéol* trouvent leur indication dans les affections gynécologiques, particulièrement chez la femme enceinte :

1° Vaginites de toutes natures, ulcérations du col, métrites, annexites.
Un ovule matin et soir ;

2° *Avant l'accouchement* : Un ovule chaque soir pendant six jours consécutifs, au cours des 3 dernières semaines de la grossesse.

L'*Iodéol* stérilise les voies génitales et en outre, grâce à son pouvoir antisccléreux, il assouplit les tissus fibreux et cicatriciels du col et du vagin, et les prépare à une dilatation et à une ampliacion régulières ;

3° *Après l'accouchement* : Prévention des complications infectieuses du post-partum, un ovule chaque soir ; donner en outre : *Iodéopirine* : 6 comprimés par 24 heures.

L'*Iodéopirine*, acide acétyl iodosalicylique, antiseptique général, agit comme un auto-vaccin, en transformant les toxines microbiennes en cryptotoxines immunigènes ;

4° *Traitement curatif des infections puerpérales* : Un ovule à l'*Iodéol*, matin et soir ; 8 à 12 comprimés d'*Iodéopirine* par 24 heures.

Dans les cas graves, utiliser, en outre, la diffusibilité extrême et la rapidité d'action de l'*Iodéol*, en injections intramusculaires.

Une ampoule de 1 cc. deux fois par jour.

Après Cabantous, Durœux et Quesnel, Foucault, Le Gac, Goldsmid, Santner obtiennent avec l'*Iode Colloïdal* les meilleurs résultats, dans le traitement des états infectieux du post-partum : 86 p. 100.

Présentation. — Boîte de 6 ovules : Prix : 20 francs

E. VIEL

37, Avenue de l'Opéra. — PARIS (Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.)

Usine à Rennes : 11 et 12, boulevard de Chézy. (Tél. : 20-61.)

OVULES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur dans : Vaginites, Vaginisme, Abscès du vagin, Fistules, Plaies, Tumeurs, Métrites, Règles douloureuses, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, et tous examens et petites interventions gynécologiques (Speculum, curetage, cautérisations, dilatations, etc.).

Posologie. — Délai nécessaire pour la fusion complète : 3 heures environ. Compte tenu de ce renseignement, introduire 1 ou 2 ovules en temps utile. Renouveler cette introduction chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*.

Dans les pays tropicaux où l'ovule est inutilisable, y substituer un tampon vaginal imbibé de *Solution huileuse au Nestosyl*.

Prix : 17 fr. 70 la boîte de 6 ovules.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod-PARIS.

OVULES CHAUMEL

à la Glycérine solidifiée.

Indications :

Aménorrhée. — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

Antisepsie. — Ovules Chaumel acide borique.

Congestions. — Ovules Chaumel simples et ichtyol.
Ovules Chaumel (borate de soude).

Douleurs. — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

Inflammations. — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

Leucorrhée. — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

Métrites. — Ovules Chaumel ichtyol.

Prix : 19 fr. 20.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 applications.

Crayons CHAUMEL

Très appréciés pour leur fusion et la facilité avec laquelle le médecin les pose.

Prix : 18 fr. 15.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

OVULES HYSTAN

du Docteur L. Lafay

Traitement précis, rapide, de tous les exsudats vaginaux, microbiens ou non, *même gonococciques*. Aucune autre thérapeutique ne peut leur être comparée.

Douze ovules suffisent généralement pour une cure.

Composition :

Catalyseur molybdène.....	0,001
Catalyseur plomb.....	0,005
Acétate de plomb.....	0,15
Sulfate de zinc.....	0,08
Excipient	16

Mode d'emploi. — Chaque soir, après toilette, en se couchant, mettre un ovule.

Présentation. — Boîte de 6 ovules : 20 francs.

Laboratoire du Docteur L. LAFAY.

LECOQ ET FERRAND, Pharmaciens.
54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence — PARIS.
(Tél. : Trinité 21-06.)

OVULES OAPE

Présentation. — En boîte de 6 ovules sous cupules.

Principes actifs. — Ichtyol, Extrait d'Hamamélis, Baume de San Salvador.

Indications. — Affections gynécologiques, Vaginites, Métrites, Salpingites, etc...

Mode d'emploi. — Applications locales. Laisser l'ovule fondre dans la cavité vaginale.

Laboratoire **PROBIOS**

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

OVULES RHEMDA RADIOACTIFS

(Radiovules.)

Composition. — A base de terres radioactives et de Terpinéol : d'une radioactivité égale à une unité uranique.

Action. — Par émission de radiations amenant une action bactéricide et leucocytogène.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Métrites, Leucorrhée, etc.

Boîte de 6 ovules.

Prix au public : 23 fr. 90.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERC.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068-B.

OVULES SAPOREX

Fondants-Glycérinés, Saponiques.

Formule :

Essences Saporex :

—	Lavande	0,45
—	Thym.....	0,13
—	Citronnelle.....	0,08
—	Verveine	0,07
—	Santal.....	0,07

Thymol 0,10

Pâte de savon neutre 5,00

Glycérine solidifiée, Q. S. pour faire une
masse de 100 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestifs, cicatrisants, résolutifs, désodorisants, diminuant les exsudats vaginaux.

Indications. — Métrites, leucorrhées, vaginites, ulcérations, tumeurs, abcès, prurit vaginal, etc...

Mode d'emploi. — Un ovule le soir ; le lendemain matin une injection au Saporex (voir rubrique Saporex).

Boîte de 6 ovules : 20 francs.

Laboratoires SAPOREX

184, route de Genas — LYON (III^e).

(Tél. : Villeurbanne 93-88.)

OVULES SÉDO-HÉMOSTATIQUES

du Dr JOUVE

Les ovules Sédo-Hémostatiques à excipient gélatino-glycériné véhiculent comme principes actifs l'antipyrine et le chlorure de calcium, médicaments hémostatiques et sédatifs qui ont fait leurs preuves. Ils sont fusibles à la température du corps, ne tachent pas et n'irritent pas les muqueuses. Nullement toxiques, ils peuvent être renouvelés à volonté.

Composition. — Les doses pour un ovule sont les suivantes :

Gélatine officinale lavée et séchée.....	1 gr.
Glycérine officinale.....	10 gr.
Antipyrine.....	1 gr. 50
Chlorure de calcium.....	0 gr. 50
Eau distillée.....	2 gr.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments sous le n° 1050-1.

Une triple action :

- a) **Analgésique.** — (Métrites, Vaginites, Règles douloureuses, etc.)
- b) **Hémostatique.** — (Métorrhagies, Ulcérations, Règles prolongées, etc.)
- c) **Décongestive.** — (Ils s'associent heureusement à la Diathermie gynécologique.)

Les Ovules sédo-hémostatiques remplacent avantageusement les « tamponnements locaux » utilisant des préparations magistrales d'exécution plus ou moins délicate et d'action variable.

Une indication précieuse. — Pour éviter les douleurs menstruelles, utiliser les Ovules Sédo-Hémostatiques 3 ou 4 jours avant l'apparition des règles.

Mode d'emploi. — Introduire l'Ovule aussi profondément que possible se garnir et rester étendue.

Prix de vente : 19 francs.

Laboratoire du Dr JOUVE,

16 bis, rue Dufrénoy — PARIS (XVI^e) Tél. : Trocadéro 69-87.

OVULES STÉRIGYNE

Ovules secs spumescents à base d'Octylhydrocupréicine (0 gr. 01 par ovule).

Traitement nouveau, pratique et propre des leucorrhées, pouvant être prolongé sans inconvénients même à titre d'hygiène habituelle.

Les ovules secs Stérigyne décongestionnent et désodorisent. Ne coulent pas. Ne tachent pas. Inutile de se garnir.

Posologie. — Introduire le soir au coucher un ovule aussi profondément que possible.

Un ovule Stérigyne coûte environ trois fois moins qu'un ovule classique.

La boîte de 8 ovules : 11 francs.

La boîte de 16 ovules : 19 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires SERVIER

ORLÉANS. (Tél. : 31-10.)

OVULES-VACCINS « INAVA »

Pansement Gynécologique.

(*Vaccin Inava M*,

excipient au soufre organique assimilable.)

Antipolymicrobien (aérobies et anaérobies),

Efficace, Propre, Commode.

Aseptise les Voies génitales féminines.

Indications.

Métrites, Salpingites, Leucorrhées, Vaginites,

Préventif des Infections Puerpérales.

Mode d'emploi. — Introduire l'ovule profondément et se garnir. Ne procéder à la toilette ordinaire que 12 heures après.

Prix : 18 fr. 70 la boîte de 6 ovules.

Laboratoire INAVA

E. Guignier, pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

OXY-BUCCOL

Enregistré au L. N. M. sous le n° 363-37.

Forme. — Bain de bouche liquide.

Composition. — Sulfate neutre d'orthoxyquinoléine ; chloral.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique, cicatrisant, calmant.

Indications. — Soins post-opératoires dentaires et de toutes interventions dans la cavité buccale. Aphtes, stomatites, gingivites, angines ; hygiène buccale quotidienne.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède.

Le flacon de 100 cc. : 8 fr. 50.

— 500 cc. : 22 fr. 90.

— d'un litre : 41 fr. 60.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — Paris (VIII^e). (Lab. 62-30.)

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Composition. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goitre et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

Forme. — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 fr. 80 le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 55-12.)

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Posologie. — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

Indications. — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 fr. 80 le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 55-12.)

OXYFUGE

Cachets.

Composition :

Chenanthol	0 gr. 09
Thymol	0 gr. 45
Calomel chimiquement pur	0 gr. 45
Semen contra pulv.	2 gr. 70
Pyréthrum flor. pulv.	2 gr. 70

Pour 9 cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des parasites intestinaux : ascarides, ankylostomes, tricocephales et tout particulièrement des *oxyures*.

Mode d'emploi. — (Adultes seulement.) Pendant 3 jours consécutifs, faire prendre le matin à jeun avec une infusion 3 cachets, chacun de 1/2 heure en 1/2 heure. N'absorber aucun aliment jusqu'au repas de midi, qui sera normal.

Présentation. — Tube aluminium renfermant 9 cachets.

Prix : 15 francs.

Laboratoire CASTEL

1, place Bouquerie — NIMES.

A. CASTEL, Pharmacien.

Ingénieur-chimiste, Licencié ès Sciences.

OXY-INJECTEUR DU D^r FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

Indications. — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphysème, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Broncho-pneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

Avantages de l'appareil. — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 150 francs.

Pharmacie du D^r FIALIP

23, av. de la Motte-Picquet — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 00-91.)

OXYMENTHOL

(Tablettes et pâtes.)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaine, benzoate de soude, etc.

Tablettes et pâtes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes*, 6 à 10 par jour à sucer ; *Enfants*, 3 à 6 par jour à sucer.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge. Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Autorisé par les *Assurances sociales*.

Prix au public : Tablettes 6 fr. ; Pâtes, 5 fr. 50. pour 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr PERRAUDIN, pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

OXYPLASTINE

Thérapeutique Chirurgicale post-opératoire.

Protection intégrale de la peau avoisinant toute plaie suppurante aiguë ou chronique.

Résistance absolue à l'attaque des sécrétions (pus et liquides organiques).

Forme. — Crème onctueuse aseptique, adhésive. *ne séchant pas, ne s'écaillant pas* (s'enlève par simple essuyage à la compresse).

Indications. — Opérations abdominales avec drainages, *Anus artificiels*, Fistules biliaires, duodénales, pancréatiques, Fistules du grêle, *Pleurésies purulentes*, *Cystostomies*, Adénites et abcès froids fistulisés, Arthrotomies, *Ostéomyélites*, Mastoïdites, Brûlures, Ulcères variqueux, *Escarres*.

Indications spéciales. — Améliore la cicatrice opératoire, *Esthétique des cicatrices*.

Présentation. — Tube G. M. : dit tube chirurgical : 170 gr. : 23 francs, tube médical : 85 gr. : 16 francs.

Laboratoires de l'OXYPLASTINE

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII^e),

(Tél. : Marcadet 61-96.)

OXYTHYOL

du Docteur P. Bourgraff.

Composition. — Ichtyol titré d'origine strictement naturelle gisements autrichiens. — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

Propriétés. — Grâce à la teneur rendue constante de tous ses éléments composants, la pâte *Oxythyol* permet d'obtenir des résultats toujours identiques. Ses propriétés kératoplastiques et antiphlogistiques font de cette pâte un élément précieux de l'arsenal thérapeutique du dermatologiste et du praticien.

Indications. — Dermites variqueuses, eczémas secs et suintants.

Mode d'emploi. — Demander les brochures des docteurs P. et R. Bourgraff : « Ulcères variqueux » et « Eczémas pré et post-ulcéreux ».

Présentation. — Pâte grise en pot :

Grand modèle.....	27 fr. 70
Petit modèle.....	14 fr. 90

L'*Oxythyol* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.).

OZOL

Traitement rationnel de la blennorrhagie.

Composition :

Résorcine	0,40	} pour 100 grammes.
Sel marin	0,70	
Goudron végétal pur.....	1	

Indications. — Blennorrhagie chez l'homme et chez la femme.

Avantages. — Propriété osmotique du milieu. Pénétration dans les espaces sous-muqueux, contact assuré avec les cellules infectées. Pas d'action coagulante.

Posologie. — *Chez l'homme* : 4 à 5 injections de 10 cc. par jour, à conserver 5 à 10 minutes. En cas d'intolérance de l'urètre, dédoubler les premières injections avec de l'eau bouillie.

Chez la femme : Tamponnements à l'Ozol pur et injections de 2 litres d'eau bouillie contenant 4 à 5 cuillerées à soupe d'Ozol. Lorsque la maladie s'étend à l'urètre : petites injections d'Ozol pur dans l'urètre
Enregistré au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments, n° 572-2.

Forme. — Liquide.

Prix du flacon : 18 fr. 50.

Laboratoire de l'OZOL
6, place des Ternes — PARIS (XVII°).
(Tél. : Roquette 09-35.)

OZOLASE

Antiseptique gynécologique.
Hygiène intime. Usage externe.

Composition :

Trioxyméthylène	0,008	} pour 1 comprimé.
Peroxyde de magnésium	0,030	
Sulfophénate de zinc.....	0,075	
Sulfate de zinc	0,075	
Sel marin.....	0,145	
Alun	1,172	

Indications. — Métrite, leucorrhée, vulvite, prurit, toilette intime et par **action calmante sur le réseau nerveux utérin** : insomnie, excitabilité, irritabilité.

Avantages. — Solubilité immédiate, odeur discrète et non persistante, innocuité absolue, usage quotidien sans inconvénient.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 25, parfumés au thym.

Posologie. — Pour la toilette intime : 1 comprimé par litre d'eau
« Etats inflammatoires » : 2 comprimés par litre d'eau.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le N° 572-1.

Prix de la boîte (40 comprimés) : 12 fr. 90.

(L'emploi de l'Ozolase entraîne une dépense de 0 fr. 32 par jour.)

Laboratoire de l'OZOL

6, place des Ternes — PARIS (XVII°).

(Tél. : Roquette 09-35.)

OZOTHINE

Essence de térébenthine en solution aqueuse isotonique

(Procédé F. Sauvage).

Dégagement d'oxygène actif. Valeur thérapeutique augmentée. Dépourvue de tout élément irritant.

Totalement indolore. Pas de réaction locale ou générale.

Action. — Désinfectante, asséchante et désodorisante. Bactéricide, cicatrisante, sédative et stimulante. Oxydant de l'Hémoglobine.

Puissant modificateur du terrain.

Indications :

Médicales. — *Maladies des voies respiratoires et maladies infectieuses, Pneumopathies aiguës, subaiguës ou chroniques, Pleurésies purulentes, Bronchites aiguës ou chroniques, Dilatations bronchiques, Gripes et suites post-grippales, Asthme et Emphysème.*

Broncho-Pneumonies infantiles (suites de rougeole, coqueluche, etc.).
Modification du terrain. Stimulant cellulaire.

Chirurgicales. — *Préventif des complications pulmonaires post-opératoires.*

Aucune contre-indication.

Formes :

Par injections : Intramusculaires, Intraveineuses, Intratrachéales ou Intra-bronchiques : ampoules 2 cc, 5 cc, 10 cc.

Per os : Gouttes, Capsules. *Composé :* Inhalations, Fumigations.

POSOLOGIE :

Ampoules.

a. En médecine.

Adultes : 10 cc. par jour avec éventuellement association de gouttes.

Dose pouvant être augmentée dans les cas graves suivant avis du médecin.

Enfants et nourrissons.

Au-dessous de 3 ans : commencer par injection intramusculaire de 1 cc. en augmentant selon état jusqu'à 4 cc. ou plus.

Au-dessus de 3 ans : de 1 à 2 cc. le premier jour en augmentant rapidement à 5 cc. ou plus.

b. En chirurgie.

1 injection de 5 cc. avant l'opération.

1 injection de 5 cc. après l'opération.

Gouttes.

Adultes : le matin à jeun et le soir avant de se coucher de XX à LX gouttes dans un peu d'eau sucrée.

Enfants : 1/4 jusqu'à 1/2 dose suivant âge et état.

Composé.

Inhalations, Fumigations : de V à XXX gouttes.

Présentation :

Boîtes de 6 ampoules de 10 cc.

Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc.

Ozothine gouttes.

Ozothine capsules.

Ozothine composé.

Présentation spéciale pour le corps médical, les hôpitaux et cliniques privées :

Boîtes de 25 ampoules de 10 cc.

Boîtes de 25 ampoules de 5 cc.

Boîtes de 25 ampoules de 2 cc.

Laboratoire de L'OZOTHINE G. WARIN, Pharmacien.

4, chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e). (Tél. : Aut. 71-98.)

PADÉRYL

Composition. — Dragées de :

Bromhydrate de papavérine.....	0,03
Bromhydrate de codéine	0,02
Extrait de valériane stabilisée	0,10
— de jusquiame stabilisée	0,035

Propriétés et indications :

Calmant de la toux : toux pharyngolaryngée, toux rebelles et persistantes des affections pleuro-pulmonaires chroniques, toux coqueluchoïdes, toux réflexes au cours des insufflations du pneumothorax artificiel, toux incoercibles et émétisantes de certaines affections pulmonaires aiguës ou tuberculeuses.

Sédatif nerveux sans action hypnotique, troubles fonctionnels d'origine nerveuse et neurovégétative : *surmenage, troubles nerveux menstruels, insomnies* (qu'il jugule sans causer de troubles au réveil).

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour et plus selon prescription médicale.

Laboratoires CLIN, COMAR ET Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

PAINS DE RÉGIME HEUDEBERT

Les Pains de régime **Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain ordinaire est interdit.

Diabète.

Pain de gluten : 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime très sévère.

Pain d'aleurone : 15 à 20 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime sévère.

Special-Diabetic : 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime normal.

Pain de Vichy : 55 à 60 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime léger.

Biscottes au gluten, Flûtes au gluten : 60 à 65 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime de repos.

Albuminurie-Arthritisme.

Régime de désintoxication.

Pain désazoté ... 0,40 % d'azote. Régime très sévère.

Pain hypoazoté .. 1,30 — — — normal.

Pain de Vittel ... 1,26 — — — —

Biscottes, Gressins } sans sel, 2 % d'azote. Rég. léger.
Longuets.

Pains de Contrexéville, d'Evian, de Saint-Nectaire.

Cœur et vaisseaux.

Mêmes pains, appauvris en azote, que dans le régime de désintoxication.

Pain de Royat.

Pain de Bains-les-Bains (artères).

Constipation.

Pain de son (frais).

Pain complet (frais ou en baguettes).

Pain de Châtel-Guyon.

Pain de Plombières.

Dyspepsie-Entérite.

Biscottes de pain grillé, longuets, gressins.

Pain de Vichy.

Foie et voies biliaires.

Pain hypoazoté.

Biscottes, longuets, gressins.

Pains de Vichy, de Vittel.

Obésité.

Gressins,

Pain de Brides.

D'une haute valeur nutritive, tous ces pains ont une composition rigoureusement constante, placée sous le contrôle permanent du Laboratoire.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain, à NANTERRE (Seine).

2 et 4, Chemin Feuillat, à LYON (Rhône).

PALPITINE

Sédatif d'effet constant non déprimant.

Composition. — Association de *sédatifs à doses faibles* (Phosphate de codéine, 0,006 ; Phényléthylmalonylurée, 0,01) et d'un *tonique* (Méthylarsinate, 0,008 . Guaranine, 0,01).

Indications. — Nervosité habituelle ou occasionnelle; Emotivité, anxiété, éréthisme cardiaque, palpitations. algies précordiales qui les accompagnent souvent, Dépression due aux préoccupations de la vie courante. Troubles nerveux qui précèdent les règles ou la ménopause. Hyperexcitabilité sous toutes ses formes.

La *Palpitine* apporte le calme, régularise le travail et facilite le sommeil.

Mode d'emploi. — 1 à 2 dragées avant chacun des 3 repas, pendant trois semaines environ. *Doses faibles* : 4 dragées par jour. *Dose moyenne* : 6 dragées par jour. — La *Palpitine* peut être prise ou renouvelée sans danger d'accoutumance.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).
(Tél. Botzaris 38-78.)

PAMPRYL

Jus de raisin naturel

Blanc et rouge.

Composition. — Pur jus de raisin frais naturel, préparé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), sans pasteurisation par filtration stérilisante. Donc jus de raisin intégral, sans concentration ni modification.

Indications. — **Nutritif, Antitoxique, Alcalinisant, Diurétique.**

Toutes les indications de la cure de raisin : Auto-intoxications, Entérites, Insuffisance hépatique et rénale, Urologie, Néphrites, Arthritisme, etc.

Boisson de chevet des malades dans tous les états infectieux et fébriles.

Dose moyenne. — 3 verres à bordeaux par jour, on peut augmenter sans inconvénient.

Se trouve dans toutes les Pharmacies : bouteille (8 à 9 verres) : 13 francs.

Bien spécifier la marque « Pampryl ».

Société du PAMPRYL

NUITS SAINT-GEORGES (Côte-d'Or)

Bureau de PARIS : 149, rue du Port-de-Bercy (XII).
(Tél. : Diderot 37-88.)

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, agit simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glyciné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante; et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 6 pilules de Panbiline ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. *Enfants* : Demi-dose.

Prix au public :

14 fr. 50 la boîte de 50 pilules de Panbiline.

21 fr. 30 le flacon de Panbiline liquide.

Laboratoires du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

PANBIOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-36.

Forme. — Pilules.

Composition. — Acides aminés (Histidine, Tryptophane, Lysine), Extrait total de muqueuse et de muscle gastriques, Phosphore organique de l'embryon du blé, Manganèse organique, Fenugrec.

Propriétés pharmacodynamiques. — Anti-anémique, tonique, reconstituant. Fixateur des sels de chaux et de magnésium.

Indications. — Tous les états anémiques, toutes les asthénies, anorexies, déminéralisations. Grossesse, allaitement, croissance, rachitisme, cachexie; troubles de la nutrition et du métabolisme, convalescences.

Posologie. — 4 à 6 pilules par jour.

L'étui : 17 fr. 70.

LABORATOIRES A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 62-30.)

PANCALCION

Chlorure de Calcium d'action rapide.

Composition. — Solution titrée de *chlorure de calcium* cristallisé, stable et pur. XL gouttes = 1 gr. de CaCl^2 .

L'adjonction de traces d'halogènes et de P qui sont les satellites habituels du CaCl^2 dans l'organisme, lui assure une orientation biologique qui explique sa rapidité d'action (ces corps fixent le calcium à la manière des catalyseurs).

Indications. — *Recalcifiant* : croissance, rachitisme, fractures, lymphatisme, tuberculose, grossesse, allaitement. *Anti-hémorragique* : Préventif et curatif de toutes les hémorragies. *Diurétique-déchlorurant* : pleurésie, ascite, œdème, néphrites, albuminuries. *Anti-anaphylactique* et *redressant humoral* : accidents du sérum, urticaire, asthme, spasmophilie, tétanie.

Doses. — Se souvenir que XL gouttes = 1 gr. de CaCl^2 .

Dose quotidienne pour *adultes*, à prendre dans un peu d'eau sucrée avant les repas.

Récalcifiant : 1 gr. (2 fois XX gouttes).

Hémostatique : 2 à 4 gr. (4 fois XX gouttes ou 4 fois XL gouttes).

Diurétique déchlorurant ou anti-anaphylactique : 3 à 6 gr.

Enfants : V à X gouttes par année d'âge suivant les cas.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

PANCARBO

Deux formes : **Granulé fondant** — **Comprimé friable**.

Composition. — *Granulé* : à 25 p. 100 de charbon animal, végétal et charbon activé. P. E.

Une cuillerée à café contient :

Charbon polyvalent : 0 gr. 90 ; Formine : 0 gr. 10 ; Carbonate de chaux : 0 gr. 10 ; Bromure de Sodium : 0 gr. 10 ; Teinture de Belladone : II gouttes.

Comprimé : dosé à 0 gr. 45 de charbon animal, végétal, activé, mêmes autres composants, mais sans bromure.

Originalité. — Réalise la première association des trois charbons usités en thérapeutique : végétal, animal, végétal activé.

Par sa polyvalence, possède une activité supérieure dans tous les cas.

Posologie. — *Granulé* : 1 cuillerée à café ou 2 après chaque repas. Croquer à sec ou avec un peu d'eau.

Comprimé : 2 à 3 comprimés après les repas, croqués à sec.

Indications. — Affections gastro-intestinales. Intoxications, fermentations intestinales.

Gastropathies douloureuses, digestions difficiles. Dyspepsies.

Présentation. — *Granulé fondant* : Boîte contenant environ 18 cuillerées à café pour 8 à 10 jours de traitement.

Comprimé friable : Boîte de 45 comprimés pour 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). (Tél. : Gobelins 36-96.)

PANCHOL-SEL

Poudre.

Composition :

Sulfatè disodique chimiquement pur et anhydre...	8 gr.
Sulfate de magnésie pulvérisé	14 gr.
Phosphate de soude sec.....	20 gr.
Bicarbonate de soude pur.....	40 gr.
Citrate de soude pur	18 gr.
Pour 100 gr. de Panchol-sel.	

Indications. — Syndromes gastro-hépatiques, Dyspepsies, Toutes insuffisances hépatiques, Hépatisme et ses conséquences, Cures d'entretien et de complément, Cholécystites, Vésiculaires sensibles, Migraine, Urticaire, Hypertension, Hyperviscosité sanguine, Intoxications.

Posologie et mode d'emploi :

Doses moyennes. *Adultes* : une demi-cuillerée à trois cuillerées à café le matin à jeun dans un peu d'eau.

Enfants : un quart à une cuillerée à café le matin à jeun dans un peu d'eau.

Autre mode d'emploi. — Faire dissoudre 1 à 3 cuillerées à soupe dans 1 litre d'eau bouillie ou d'eau minérale. Prendre à jeun un verre à Bordeaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1593-2.

Laboratoires ROUSSEAU
SENS (Yonne).

PANCRÉAL KIRCHNER

Composition. — Le PANCREALUM KIRCHNER est le complexe d'extraits minutieusement dégraissés et purifiés de suc pancréato-kinatique suractivé par des ferments biologiques auxquels revient une action thérapeutique aussi constante que parfaite.

Caractéristique :

1° Comprimés de 25 centigrammes renfermant 100 p. 100 d'ingrédient actif (Hydrolases diastatiques et Zymases pancréato-kinatiques) sans addition de sucre, cacao, lactose ou amidon (véhicules) ;

2° Procédé de purification perfectionné au plus haut degré, permettant d'obtenir un comprimé inaltérable et sans mauvaise odeur à laquelle le malade prenait le dégoût ;

3° Dosage et titrage exacts et une solubilité absolue dans le suc digestif alcalin ;

4° Pas de contre-indication.

Propriétés thérapeutiques et indications :

Pancréal Kirchner représente le stimulant éminemment précieux de la sécrétion interne et de la régurgitation duodénale (**Affaiblissement général, Régime de suralimentation, Vieillesse**).

Pancréal Kirchner réalise la **Zymatothérapie totale et parfaite du Diabète**.

Pancréal Kirchner facilite et parachève la digestion (**Dyspepsie, Gastrite, Intolérance de matières grasses**), équilibre l'acidité du suc gastrique (**Hypo ou Hyperchlorhydrie**) et évite la **Prédisposition à l'Ulcère**.

Pancréal Kirchner est le vrai antiseptique physiologique des intestins dans les multiples infections gastro-intestinales (**Gastro-entérite, Fermentations, Auto-intoxication, Urticaire**).

Pancréal Kirchner stimule les contractions péristaltiques et représente le remède étiologique de la **Constipation**.

Pancréal Kirchner supprime les troubles de la grossesse (**Vomissements**) en garantissant l'afflux normal de la sécrétion interne et en compensant l'assimilation maternelle.

Pancréal Kirchner active la sécrétion cellulaire du foie et règle l'élaboration de l'acide urique.

Nourrissons :

Pancréal Kirchner permet le traitement de l'intolérance au lait de vache des nourrissons.

Pancréal Kirchner constitue le régularisateur du fonctionnement du tube gastro-intestinal du nourrisson en réalisant la désintoxication intestinale (**Gastro-entérite**) d'une façon plus parfaite que peuvent le faire les agents chimiques.

Doses :

Adultes : 3-4 fois par jour, 2-4 comprimés.

Enfants : 2-3 fois par jour, 2-3 comprimés.

Nourrissons : 2-3 fois par jour, 1-2 comprimés.

Prix : 22 fr. 50 le flacon de 60 comprimés.

11 fr. 50 le flacon de 30 comprimés.

Littérature et échantillons :

Laboratoires du Docteur KIRCHNER

SARREGUEMINES-STRASBOURG

Service commercial : 24, rue de Verdun. STRASBOURG (Bas-Rhin).

PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

Caractéristiques. — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

Indications. — Digestions difficiles et prolongées. Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

Chez le nourrisson. — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

Doses. — *Enfants* jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillers-mesures par jour. *Grands enfants* ou *adultes* : 6 à 12 cuillers-mesures par jour.

Littérature et Échantillons :

Laboratoires DEFRESNE

19, rue Jacob — PARIS.

PANCRÉATINE PHILIPPE

Pilules Kératinisées.

La pilule *Pancréatine Philippe*, grâce à sa gaine de Kératine, traverse la fraction du trajet digestif, dont le milieu est très notablement acide, sans subir de dommage qui détruirait ou entraverait son action. La pilule en arrivant ainsi intacte à l'intestin peut donner toute son action.

Indications. — Pancréatite chronique, insuffisance pancréatique, traitement d'entretien, du diabète, diarrhée et entérite rebelles, troubles de la motricité intestinale.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour, soit 2 à 4 pilules au moment des deux principaux repas.

Prix : 17 francs.

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, Quai Fulchiron — LYON.

PANCRÉATOKINASE CARRION

Composition. — Poudre de pancréas et de muqueuse duodénale desséchés dans le vide.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indication. — Dyspepsies intestinales. Constipation.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés à chaque repas.

Présentation et prix. — Le flacon de 50 comprimés : 17 fr. 15.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PANCRÉATOSE IDON

C17 H19 AzO ³ HCl.....	0,50	Pancréatine	25
Na Cl.....	30	Mg O.....	15
Carb. Ca.....	50	Na H CO ³	850
Lactose	30	Essence d'Anis	1

Poudre, cachets et granulé à base de pancréatine, lactose, magnésie, chlorure de sodium, essence d'anis et un calmant.

Indications. — Maladies d'estomac, du foie et des intestins. Hyperchlorydrie, Gastrite, gastralgie, urticaire, fermentations intestinales, dermatose, aérophagie, auto-intoxication, insuffisance hépatique.

Posologie

Poudre : 1 cuillerée à café avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Cachets : 1 cachet avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Granulé : 1 cuillerée à soupe avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Prix : Poudre et cachets : 10 fr. au public (10 jours de traitement).

Granulé : 14 fr. au public (8 jours de traitement).

Laboratoire de la PANCRÉATOSE IDON

Jean BREVIERE (succ.)

Docteur en Pharmacie,

Ancien préparateur à la Faculté,

89, rue Saint-Georges — NANCY (M.-et-M.). (Tél. : 73-89.)

PANCRÉBILE

Composition :	<i>Pancréas total (ext. spécial).....</i>	0 gr. 10
	<i>Bile dépigmentée, décholestérinée.</i>	0 gr. 20
	<i>Glandes del'intestin (ext. pulv.)...</i>	0 gr. 05
	<i>Oléate de soude.....</i>	0 gr. 05
	<i>Carbonate de chaux. Q. S. p...</i>	1 dragée glutinisée.

Propriétés. — Stimulant et régulateur hépato-pancréatique. Cholagogue. Anti-infectieux, Laxatif doux.

Indications. — Foie, Intestin, Constipations, Dermatoses.

Posologie. — 1 dragée avant ou après les repas. Avaler sans croquer.

Constipations : 3 dragées le soir au coucher.

Nota. — PANCRÉBILE n'est pas un laxatif irritant, mais un cholagogue doux. Son action est augmentée par la présence du carbonate de chaux qui neutralise l'Acidité et dont le Calcium agit comme Auxo-ferment ou Zymosthénique.

PANCRÉBILE s'administre 1 heure avant les repas si on désire un effet excito-secrétoire : 1 heure après, si on veut suppléer à la sécrétion pancréatique déficiente.

Commencer le traitement par une dragée à chaque repas. Augmenter suivant l'effet obtenu.

Prix : 17 francs. (15 jours de traitement.)

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

3 place Jussieu — PARIS (V^e). — Gobelins 56-71.

App. pharm. et Dépôts France : O. C. P. — PARIS et tous Grossistes.
Afrique du Nord : PÉLISSARD — ALGER-CASABLANCA

PANCRÉPAR

Médication eupeptique.

Association en proportions définies d'extraits pancréatique et hépatique, de bile de bœuf, de boldine.

Propriétés thérapeutiques. — Médication eupeptique régularisant les fonctions hépato-biliaires et pancréatiques.

Indications. — Manifestations digestives dues à un trouble d'assimilation. Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Constipation d'origine hépatique, Anaphylaxie digestive.

Forme. — Dragées glutinisées.

Doses et mode d'emploi. — Au début de chacun des trois repas : 2 à 3 dragées.

Enfants à partir de trois ans : moitié de ces doses. Au-dessous de trois ans, s'abstenir sauf avis contraire du médecin.

Prix au public : 18 fr. 25.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr. E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-20.)

PANCRÉPATINE LALEUF

Composition. — Extrait spécial de Pancréas activé par addition de Suc hépatique et analgésine.

Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

Propriétés et indications. — Opothérapie du Diabète par médication interne. Sous l'influence de la PANCRÉPATINE, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal;
- 4° Disparition des troubles secondaires, soif, polyurie, prurit, etc.
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

Forme. — Capsules glutinisées.

Posologie et mode d'emploi. — Les capsules de PANCRÉPATINE LALEUF doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures, suivant prescription médicale.

Durée moyenne des unités de vente. — 12 à 18 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 100 capsules : 27 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

PANCRINOL

Complexe d'extrait désalbuminé et délipoidé de foie, rate, rein et surrénale.

Indications. — Toutes les anémies, anémies banales ou secondaires, en particulier celles s'accompagnant d'état asthénique. — Toutes les convalescences des maladies aiguës ou infectieuses. — Toutes les dépressions physiques ou nerveuses, le surmenage, etc.

Action. — Reprise de l'appétit, réapparition des forces, augmentation du nombre des globules rouges et du taux de l'hémoglobine, élévation du poids.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 ampoules de 7 cc. par jour ou 1 à 2 cuillerées à soupe d'Elixir.

Enfants : 1 à 3 ampoules de 3 cc. ou cuillerées à café de sirop ou d'Elixir par jour.

Présentation :

Adultes : Boîte de 10 ampoules de 7 cc. : 23 fr. 90.

— 30 ampoules de 7 cc. : 61 fr. 35.

Elixir, le flacon : 17 fr. 15.

Enfants : Boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 16 fr. 65.

Le flacon de sirop : 23 fr. 90.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

PANDRÉNALINE JULIEN

Gouttes. — Suppositoires.

Composition. — Extrait *total* désalbuminé et stabilisé de *glandes surrénales* contenant, en solution *exactement titrée et stable* :

- Un pour mille d'adrénaline *naturelle* extraite de la zone médullaire.
- Tous les *principes extractifs* antitoxiques contenus dans la zone corticale (Hormone, etc.).

Indications. — *Insuffisances surrénales* au cours des maladies infectieuses et toxiques, *asthénies* et *états neurasthéniques*, *hypotension*, *collapsus* et *choc*, *affections digestives*, *vomissements graves*, *hémorragies*, *intoxications aiguës*.

Posologie. — XV gouttes 2 fois par jour sur un morceau de sucre à sucer lentement.

3 suppositoires par jour. Chaque suppositoire contient X gouttes de Pandrénaline.

Prix : 20 francs. — Echant. gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie,
05, rue de Rennes, PARIS (VI^e). Tél. : Littré 80-76.

PANFÉBRINE

Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres.

Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur.

Traitement du paludisme : Panfébrine AB.
Spécifique de toutes les pyrexies : Panfébrine B

1° Panfébrine B (toutes fièvres).

Composition. — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle. — Antithermique dans toutes les *pyrexies*.

Action. — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants ;

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiéntenterie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

Posologie. — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (peut être renouvelée 2 à 4 fois en 24 heures).

Prix : le tube de 10 *cachets*, 10 francs.

2° Panfébrine AB (paludisme).

Composition. — Panfébrine A : Acide méthylarsinique $As = O-CH^3 (OH)^2$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébrine B : Composition indiquée ci-dessus.

Son rôle. — Action spécifique dans le paludisme (n'occasionne jamais d'accidents quinquiques).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie. — Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — *Enfants* : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour; de 7 à 8 ans, 1 cachet comprimé B par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n°s 586-11 et 586-12

Prix : la boîte de 40 *cachets*, 25 francs.

Échantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°).

(Tél. : Roquette 14-12.)

PANFLUINE

Du Docteur Moity.

Combinaison organique dissimulée d'iode, avec les tanno-glucosides de vaso-constricteurs et plastifiants veineux.

Indications. — Régulateur circulatoire, Affections phlébotiques et artérielles, Hémorroïdes, Varices, Hypertension, Troubles congestifs, Formation de la jeune fille et troubles de la quarantaine chez les deux sexes, Rhumatismes diathésiques et infectieux, Arthritisme, Hyperviscosité sanguine, Dépuratif.

Formule. — Hydrastis Canadensis, 4; — Sol. Intrait Marron d'Inde stabilisé, 2; — Extrait fl. Viburnum Prunifolium, 2; — Extrait fl. Hamamelis virginica, 8; — Extrait fl. Rhamnus frangula, 2; — T. Cupressus Sempervirens 2; — Teinture d'iode combiné, 2 pour 100 cc.

Doses. — 3 à 5 comprimés par jour, 2 à 3 cuillerées à soupe, Selon les indications du médecin.

Prix : Flacon de 250 cc. : 16 fr. 50. Boîte 40 comprimés : 16 fr. 50.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux. Diffusion strictement médicale.

Laboratoire du Dr J.-O. MOITY

Docteur en Médecine, Docteur en pharmacie,
ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, Boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE.

PANGADUINE

Bloc total de Vitamines et Principes actifs des Foies de Morues.

Composition. — La *Pangaduine* contient tous les alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, vitamines et principes actifs des foies de morue.

Elle permet d'absorber, sous un petit volume et sous une forme de goût très agréable, la valeur d'une grande quantité d'huile de foie de morue.

Indications (Fatigue générale). — Les indications de la *Pangaduine* sont celles de l'huile de foie de morue que peu d'enfants et de grandes personnes tolèrent.

C'est le médicament par excellence des enfants et des jeunes gens déprimés par une croissance difficile ou trop rapide, des neurasthéniques, des convalescents et de toutes les personnes fatiguées par un travail excessif ou pour toute autre cause.

C'est le médicament à prescrire dans l'insuffisance hépatique.

Action. — La *Pangaduine* agit :

1° Comme stimulant de la nutrition et de la circulation ;

2° Comme diurétique.

Au bout de quelques jours de traitement, on remarque toujours le retour de l'appétit et la reprise des forces.

Deux formes agréables et actives :

Adultes : Pangaduine Élixir : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Prix : 19 fr. 20.

Enregistré au L. N. G. M. sous le N° 1059-25.

Enfants : Pangaduine granulée. 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas selon l'âge.

Prix : 10 fr. 65.

Enregistré au L. N. G. M. sous le N° 1059-24.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44.)

PANGASTROL

Pansement de l'Estomac.

Composition. — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

Forme. — 15 Sachets de 10 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

Indications. — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Prix : 14 francs.

Laboratoire STOULS

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.
(Tél. : Passy 68-14.)

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhée. Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés* ou *Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Granulés : 17 francs (25 cuillerées à café).

Cachets : 13 fr. 50 (24 cachets).

Laboratoires Georges TINARD

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e). Wag. 56-16.

PANGLANDINE

Description. — La *Panglandine* est une préparation opothérapique comprenant l'ensemble des glandes endocrines et dosée en raison de l'activité physiologique de chaque glande : hypophyse, thyroïde, surrénales, glandes génitales (ovaires, testicules et prostate), parathyroïdes, thymus, rate, moelle rouge, foie, pancréas, duodénum.

Action thérapeutique. — En raison des connexions fonctionnelles des endocrines et de leurs interdépendances, toute dysfonction glandulaire entraîne des perturbations générales du système sympathico-endocrinien, dont le traitement exige une médication « panglandinienne » à doses régulatrices ou légèrement stimulatrices. Cette posologie prudente et nuancée permet d'adapter le traitement adéquat à chaque cas sans fatiguer l'organisme, ni exciter les glandes dont le fonctionnement est normal.

Indications. — La *Panglandine* ne s'adresse pas aux lésions glandulaires graves (maladie d'*Addison*, maladie de *Basedow*), mais plutôt aux *petits états endocriniens*, petits insuffisants pluriglandulaires, dont le tableau clinique est souvent mal défini, parce que les signes en sont insuffisants ou imprécis.

Troubles de croissance physique, de développement du psychisme ; certains troubles de la nutrition, de la vie génitale ; dysfonctions ovariennes chez la femme (aménorrhée, dysménorrhée, frigidity, stérilité) ; impuissance chez l'homme, sénilité précoce ; convalescences après maladies infectieuses ; asthénie, surmenage scolaire et comme adjuvant chez les tuberculeux qui sont de grands déficients pluriglandulaires.

Formes pharmaceutiques. — La *Panglandine* est présentée sous deux formes distinctes :

1° **Capsules** (50 par flacon) qui se prescrivent à raison de 2 à 10 par jour la dose moyenne suffisante étant en général de 3 à 6 capsules.

2° **Solution** glycinée plus pratique pour les enfants (flacon de 45 centimètres cubes) se prescrivant de X à XL gouttes à 2 ans ; XX à LX gouttes à 5 ans ; L à C gouttes à partir de 10 ans (XX gouttes correspondent à une capsule).

Prescrire : *Panglandine capsules* ou *Panglandine liquide*.

Prix. — Capsules : 28 fr. 60. Solution : 31 fr. 20.

Durée du traitement : Capsules 5 à 25 jours. Solution 10 jours à 3 mois. A. S. C.

LABORATOIRES COUTURIEUX

18, avenue Hoche. — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

PANHÉMOL

Composition :

Sirop :

Extrait hématique total.....	20 cc.
Glycérophosphate de Sodium cristallisé..	0 gr. 10
Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères.....	Q. S. P. 15 cc.

Indications. — Anémie, Asthénie, Surmenage, Convalescences, Tuberculose, Rachitisme, Croissance, Déchéance organique, Hémorragie, Paludisme.

Présentation et prix. — 19 fr. 25 le flacon de 310 cc.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe de sirop avant chaque repas, midi et soir.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café de sirop suivant l'âge, avant les repas, midi et soir.

Laboratoires R. BOUYSSOU
à CHAMBOIS (Orne).

PANLUTÉINE VOGEin

Association de 0,05 extrait total ovarien et de 0,005 extrait thyroïdien.

Indications. — Dans tous les cas où il y aura carence de l'organisme en extrait total ovarien. Elle réussit merveilleusement dans tous les cas de castration chirurgicale ou spontanée, troubles de la ménopause, obésité de la ménopause.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour, 10 jours par mois. Le flacon : 15 francs. Traitement de 10 jours.

Laboratoires VOGEin

2, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).
(Tél. : Danton 83-24.)

PAN-NEUROL

Stabilisateur et Régulateur du Système Nerveux.

Traitement biologique de toutes les Neurotonies.

Forme. — *Comprimés Dragéifiés.*

Composition. — Phényléthylmalonylurée. Polybromures. Belladonne. Passiflore. Phosphoglycérates.

Indications. — Etats anxieux et émotifs. Palpitations. Insomnies rebelles. Dépression nerveuse. Neurotonies cardio-vasculaires et gastro-intestinales.

Posologie. — 4 à 6 comprimés en 24 heures, de préférence au moment des repas.

Prix : 16 francs l'étui de 40 comprimés.

Laboratoire STOULS

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

(Tél. : Passy 68-14).

PANOSAN

Tonique général.

Reconstituant énergétique. Préparation agréable et suractivée.

Composition. — Elixir complexe à base de vins généreux contenant entre autres des hypophosphites, de la créosote, du gaiacol, des extraits hépatiques, pancréatiques et spléniques, de l'huile de foie de morue prédigérée, de l'extrait de malt, de la gentiane et de la noix vomique.

Indications. — Toutes les convalescences et en particulier celles des maladies pulmonaires. Anémies, Déficiences organiques, Asthénie post-grippale.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe 4 à 6 fois par jour, avant ou après les repas. *Enfants* : De 3 à 5 ans, 1 cuillerée à café. Au-dessus de 5 ans, jusqu'à 2 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-8.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Docteur en Pharmacie

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.

PANOSTYL

Régénérateur total

à base de sang pur de pur sang boulonnais.

Renferme l'hémoglobine totale et les hormones en solution dans le plasma sanguin dilué-fluoré.

Anémie, Tuberculose, Dénutrition, Croissance Surmenage, Convalescences, Paludisme, Déchéances organiques.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules. Voie buccale, réalisant l'opothérapie sanguine intégrale.

Posologie. — 2 ampoules par jour aux repas.

Aucune contre-indication.

Prix de vente au public : 18 francs.

Littérature et échantillons :

PHARMACIE BIOLOGIQUE

57, rue Mathurin-Régnier — PARIS (XV^e).

Adr. télég. Ibacépède-Paris 102.

(Tél. : Ségur 11-40.)

Fournisseur des hôpitaux civils et militaires.

PANPHOSPHATES

Reconstituant et Reminéralisateur.

Composition :

Glycérophosphate de chaux.....	3.500
Phosphate tricalcique.....	2.282
Carbonate de chaux.....	761
Magnésie calcinée.....	379
Fluorure de calcium.....	61
Sulfate de cuivre.....	0,0504
— — manganèse.....	0,1278
— — magnésium.....	0,1638
— — fer.....	0,1296

Pour 100 gr. quantité en milligrammes.

Association de reconstituants minéraux, glycérophosphates, phosphates tricalciques et métaux ionisés.

Forme. — Granulés.

Indications. — Croissance, Surmenage physique et intellectuel, Convalescence, Grossesse, Anémie, Sénilité.

Posologie. — Une cuillerée à café croquée à la fin des trois repas.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1024-6

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires des Hormométalions

50, avenue Jacqueminot — MEUDON.

(Tél. : Obs. 13-33.)

PANSMACOL

du Docteur Moity

Pansement colloïdal gastro-intestinal

Formule. — Kaolin colloïdal, 80 gr. — Silicate de calcium activé, 10 gr.
— (5 gr. absorbent 268 cc. CO₂). Silicate de magnésium précipité, 10 gr.

Indications. — Toutes les gastrites — Toutes les colites — Toutes les inflammations de l'intestin — Ulcères — Hyperchlorhydrie — Désinfection gastro-intestinale — Aérophagie.

Aucune contre-indication.

Le Pansmacol est très agréablement aromatisé et édulcoré sans addition de sucre (pas d'amorce de digestion). Il peut être prescrit aux diabétiques.

En suspension dans un demi-verre d'eau, il présente la facilité d'absorption d'une crème vanillée.

Mode d'emploi. — *Traitement de base* : une grosse cuillerée à soupe bien délayée dans un demi-verre d'eau, le matin à jeun.

Se coucher 5 minutes sur chaque côté.

Une deuxième cuillerée à soupe le soir, avant le dîner.

Traitement symptomatique : une cuillerée à soupe au moment des douleurs et à n'importe quel moment.

Prix, la boîte de 200 grammes : 17 fr. 60.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoire du D^r J.-O. MOITY

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie,

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

199, boulevard Bineau — NEUILLY-sur-SEINE.

PANSOLANÉE

Composition. — Extrait de belladone spécialement titré.

Indications. — Excellent médicament susceptible d'apaiser l'état nerveux des malades anxieux, quelle que soit l'origine de cette anxiété, elle est la médication apaisante par excellence en ce sens qu'elle apaise l'excitation nerveuse de ces malades en même temps qu'elle calme les douleurs qu'ils ressentent et leur rend confiance.

Mode d'emploi :

Ampoules : 1 injection sous-cutanée par jour.

Comprimés : 2 à 3 par jour.

Suppositoires : 1 par jour le matin ou le soir de préférence après une selle.

Boîte de 15 ampoules.

— de 8 ampoules.

— de 30 comprimés.

— de 16 suppositoires.

— de 8 suppositoires.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

PANSTOMASE

1° Ampoules buvables ; 2° Dragées à noyau mou.
Méthodes de Castle et de Whipple associées.

Composition. — Extrait de foie de veau ; Extrait et suc frais de muqueuse d'estomac, d'autre pylorique et de jéjunum de porc. Renferme donc à la fois tous les principes antianémiques et tous les ferments digestifs à l'état naissant, notamment la Pepsine et la Sécrétine.

Indications. — Toutes les Anémies, Apepsies, Asthénies, Cirrhoses du foie, Cholécystites, Tuberculoses, Achylies, Dyspepsies, Gastrites chroniques, hypoacides, Entérocrites, Diarrhées.

Posologie. — Ampoules buvables : de 1 à 3. Dragées, de 2 à 6 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 34 fr. 30

Dragées : 19 fr. 85

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).
(Tél. : Mai. 17-77).

PANTAMINE

Composition et forme :

Granulé dosimétrique renfermant par mesure de 1 gramme :

1° Vitamine A (Huile d'Halibut).....	6.250 Unités Internat.
2° Vitamine D (Stérois marins).....	1.000 Unités Internat.
3° Vitamine C (Extrait de Cynorrhodon).....	20 Unités Internat.
4° Hydrolysat de levures (Vitamines B ₁ et B ₂ — Acides aminés et diastases) 0 gr. 15	

Indications :

- 1° *Nourrissons* : États de dénutrition, d'hypotrophie, d'anorexie.
- 2° *Enfants* : Toute la période de croissance. Rachitisme et Lymphatisme.
- 3° *Adultes* : Affections saisonnières. Insuffisance de régimes. Grossesse et lactation.

Avantages :

- 1° *Origine naturelle* et équilibre biologique des Vitamines.
Les Vitamines naturelles sont plus actives, mieux assimilées et moins toxiques que les Vitamines synthétiques. Une proportion judicieuse est indispensable pour éviter les antagonismes.
- 2° *Totalité* des Vitamines et des *Acides aminés*.
Les Avitaminoses simples sont rares ; par contre, les carences relatives sont extrêmement fréquentes. Les acides aminés, les diastases et les bases hexoniques sont les éléments catalytiques indispensables à une bonne assimilation.
- 3° *Concentration maxima et administration facile*.
Granulé à grains très fins, d'absorption très facile, même pour les nourrissons. Action très rapide.

Posologie.

Nourrissons : 1 mesure de 1 gramme par jour, en 2 ou 3 fois.

Enfants et Adultes : 2 mesures de 1 gramme par jour.

Prix : 25 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

PANTAVOINE

CORBIÈRE

Principes excito-toniques de l'avoine
employés pour la première fois en thérapeu-
tique.

Composition. — Complexe lipido-protéique, huile
essentielle aromatique, hormone, alcaloïdes de
l'avoine.

Propriétés thérapeutiques. — Action excito-
tonique sur le système neuro-musculaire.

Indications. — Asthénies de toute origine, Insom-
nie, Oligurie, Impuissance sexuelle, Diabète, Ané-
mie et asthénie des coloniaux, Surmenage des
intellectuels.

Posologie. — 6 comprimés par jour, 2 avant chaque
repas.

Présentation. — Comprimés. Boîte de 60.
Prix : 16 francs.

Produit naturel, puissant, dénué de toute toxicité.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

PANTOPON « ROCHE »

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

- 0 gr. 01 de **Pantopon « Roche »**,
- = 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,
- = 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,
- = 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et modes d'emploi.

Voie buccale :

PANTOPON « ROCHE » SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS

(Flacon de 20.)

(1 comprimé = 0,01 ctg. de Pantopon « Roche ».)

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.

Voie Hypodermique :

PANTOPON « ROCHE » AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche ».)

Boîtes de 6 et 12 Ampoules.

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.

Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-25 (*poudre*), 504-26 (*sirop*), 504-23 (*comprimés*), 504-22 (*ampoules*),

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

PANVEININE

Synergie phytothérapique toni-veineuse suractivée par la présence d'une petite dose d'Iodométhylate de Formène.

Formule :

Extr. <i>Æsculus Hippocastanum</i>	0.02	Extr. <i>Origanum Marjorana</i>	0.01
Extr. <i>Hamamelis virginica</i>	0.02	Extr. <i>Crataegus Oxyacantha</i>	0.02
Extr. <i>Cupressus sempervirens</i>	0.01	<i>Pulvis Hoang-Nan</i>	0.01
Extr. <i>Senecio Jacobææ</i>	0.01	Extr. <i>Pneumus Boldus</i>	0.02
Extr. <i>Casella Bursapastoris</i>	0.01	Extr. <i>Cascara sagrada</i>	0.02
Extr. <i>Hyoscyamus niger</i>	0.01	Méthyl-jodhydrate de Formène.....	0.02
Pour un comprimé			

Indications :

- 1° *Tous les états variqueux* et de leurs complications : Phlébites, Périphlébites, Ulcères, Eczémas.
- 2° *Des affections hémorroïdaires* et des troubles qu'elles entraînent.
- 3° *Des troubles circulatoires dus à l'âge ou au cycle menstruel* : Dysménorrhée, Métrorragies de la ménopause ou de la puberté, règles douloureuses ou irrégulières.
- 4° *De l'hypertension* accompagnant souvent la ménopause et se manifestant par des céphalées, des vertiges, des bouffées de chaleur.

Mode d'emploi et doses :

La *Panveinine*, dépourvue de toxicité et d'effets secondaires fâcheux, se prescrit à la dose moyenne de 2 à 3 dragées avant les deux principaux repas, par périodes de dix à quinze jours.

Prix : 18 francs l'étui de 50 dragées.

Laboratoire Scientifique AUCLAIRE

E. AUCLAIRE, Pharmacien de la Faculté de Paris,
36, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS (IX^e).

PANVITA

Vitaminothérapie Intégrale.

Composition. — Vitamines A, B¹, B², C, D, E, associées aux acides aminés nobles.

Propriétés thérapeutiques. — Agent d'équilibre et de résistance aux infections, favorise la croissance.

Indications. — Troubles de croissance, Prétuberculose, Convalescence, Toutes les carences vitaminiques, Diabète.

Deux formes : *Comprimés.*

Liquide (chaque boîte contient :

Flacon n° 1 : Vitamines hydrosolubles ;

Flacon n° 2 : Vitamines liposolubles.

Posologie. — *Nourrissons* : 2 comprimés ou XX gouttes de chaque solution par jour. *Enfants* : 4 comprimés ou XL gouttes. — *Adultes* : 6 comprimés ou LX gouttes.

Laboratoire A. DEFFARGE, Docteur en Ph¹⁰
188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. : 91-609.)

PANXYLON LOGEAI

INJECTABLE

Auto-défense de l'organisme par Immunisation indirecte contre les infections aiguës, subaiguës et chroniques.

Injectations sous-cutanées ou intramusculaires atoxiques indolores et alternées de :

1° Cinnaméine (amp. A) :

Cinnaméine totale du Miroxylon

Pereirae..... 9 gr. 07

Oleum olivæ neutrum déshyd ... 1 cc.

2° Campholine (amp. B) :

Camphorate de choline 0 gr. 01 p, 1 cc.

Pharmacodynamie :

La Cinnaméine totale LOGEAI est extraite directement du Baume du Pérou, dont elle contient tous les principes actifs et naturels.

Elle est donc plus active que le seul Cinnamate de Benzyle préparé synthétiquement.

La Cinnaméine a une action immunogène et eucocytaire intense (Brown Séquard).

La Campholine joint à son pouvoir cholestérinogène une intense action toni-cardiaque et sympathico-tonique ainsi qu'une augmentation considérable des globules rouges. L'association de ces deux produits en une synergie médicamenteuse réalise l'auto-défense de l'organisme.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences médicales et chirurgicales, Etats infectieux des voies respiratoires, Infections pulmonaires spécifiques ou non.

Mode d'emploi. — Une ampoule chaque jour, en alternant les ampoules A et B. Dans les cas aigus, injecter simultanément les 2 ampoules A et B en mélangeant le contenu dans la même seringue.

Avant injection, faire tiédir l'ampoule Cinnaméine.

PANXYLON L 12% : Injections modificatrices locales
Fistules, Adénites, Pneumothorax.

PANXYLON GRANULÉ : entre les séries de PANXYLON injectable.

Forme et prix au public :

8 amp. 1 cc. 5 (4 amp. A, 4 amp. B) ... 19 fr. 20

8 amp. 2 cc. 5 (4 amp. A, 4 amp. B) .. 23 fr. 45

12 amp. 2 cc. 5 (6 amp. A, 6 amp. B) . 31 fr.

PANXYLON GRANULÉ. La boîte 20 fr. 30

PANXYLON L (3 amp. 10 cc) 23 fr. 45

Laboratoires

des Spécialités Scientifiques LOGEAI

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 40-15 et 16.)

PAPAÏNE **de TROUETTE-PERRET**

Ferment digestif, énergétique, extrait du suc du *Carica Papaya*, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications. — Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Élixir « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*.

Un verre à liqueur après chaque repas.

Cachets « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*.

Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*.

Deux à huit comprimés à chaque repas.

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE **de TROUETTE-PERRET**

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication.

Bien formuler : *Elixir, Sirop, Cachets, Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste

PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

PAPAVÉRINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, avec effet électif sur les *muscles striés* de tout l'organisme. Dilatateur énergique des coronaires, hypotenseur. Stimulant respiratoire. Équilibrant du système végétatif.

Indications. — Angine de poitrine. Spasmes artériels en général. Migraine. Spasmes gastro-intestinaux (constipation, vomissements, hyperchlorhydrie). Spasmes œsophagiens. Asthme, coqueluche, toux quinteuses et émétisantes.

Présentation. — Granules titrés à 2 centigrammes de chlorhydrate de Papavérine rigoureusement pur (alcaloïde du *Papaver species*).

Posologie. — 5 à 12 granules par jour. Chez l'enfant (coqueluche) débiter par 1/4 de centigramme par année d'âge *pro die*, pour arriver progressivement à 1 centigramme et demi.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 40-58.

PAPAVÉRYL

Chlorhydrate de papavérine chimiquement pure.

Indications. — Oblitération artérielle aiguë. Tous les spasmes musculaires lisses. Résultats particulièrement remarquables dans : l'hypertension, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérococolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée.

Présentation : Existe sous trois formes :

1° Tube de 20 comprimés dosés à 4 cgr. par comprimé.
2° Boîte de 6 et 12 ampoules de 2 cc. dosées à 4 cgr. par ampoule.

3° Boîte de 6 suppositoires dosés à 4 cgr. par suppositoire.

Posologie :

2 à 6 comprimés par jour et plus. Chez l'enfant 1/4 de comprimé par année d'âge.

Laboratoire ORRILLARD.

J. LAVALLE

245, rue de Vaugirard — PARIS
(Tél. : Suffren 78-88.)

PAPIER IODOGÈNE EYMONNET à l'iode naissant.

Toute la révulsion.

Depuis la rubéfaction jusqu'à la vésication.

Remplace : Vésicatoires, Sinapismes, Ventouses, Coton iodé.

Aucune contre-indication. Non toxique pour le rein.

Mode d'emploi. — Tremper une feuille dans un peu d'eau. L'iode naissant apparaît. Appliquer à l'endroit voulu et recouvrir de la feuille imperméable incluse dans la pochette.

Durée d'application : 2 à 5 minutes ; Rubéfaction.

5 à 10 minutes : révulsion simple, égale aux ventouses et sinapismes.

10 à 20 minutes : révulsion moyenne.

30 à 40 minutes : révulsion forte, légère vésication.

Au delà : vésication avec soulèvement de l'épiderme.

Indications. — Toutes affections pulmonaires et pleurales. Tous rhumatismes. Toutes névralgies, lumbagos, sciatiques. Médication sans égale, très aimée de la clientèle.

Prix : La pochette deux feuilles : 6 francs.

Laboratoire du PAPIER EYMONNET

14, Grande-Rue — PONT-DE-VAUX (Ain).

PAQUETS ALCALS

Les Paquets Alcals s'adressent à l'appareil digestif (estomac, foie, intestin). Ils ont pour but de réaliser la médication alcalino-sodique sous une forme simple et pratique.

Il existe *trois spécialités* distinctes, différentes par leurs formules pour s'adapter aux *nourrissons*, aux *enfants*, aux *adultes*.

Ce sont les :

Paquets Alcals-Nourrissons.

Paquets Alcals-Enfants.

Paquets Alcals-Adultes.

PAQUETS ALCALS-NOURRISSONS

Formule :

Citrate de soude hydraté.....	0 gr. 40
Sulfate de soude hydraté	0 gr. 50

Pour un paquet de poudre *desséchée*.

Indications. — Agit aussi bien à titre préventif qu'à titre curatif dans les embarras gastriques, l'insuffisance hépatique, les affections cutanées (éruptions, eczéma, prurigo, strophulus), inappétence, accidents de la dentition.

Présentation. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative exposant les modes d'emploi suivant le cas.

(Prix : 12 francs.)

PAQUETS ALCALS-ENFANTS

Formule

Carbonate acide de sodium	0 gr. 50
Phosphate mono-acide de sodium hydraté	1 gr.
Citrate de sodium hydraté.....	0 gr. 80
Sulfate de sodium officinal hydraté.....	1 gr.

Pour un paquet de poudre *desséchée*.

Indications. — Dyspepsie, gastrite, insuffisance hépatique, entérite, intoxication alimentaire, constipation, hyperchlorhydrie et dermatoses telles que prurit, boutons, acné, urticaire, eczéma, prurigo.

Présentation. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative exposant les modes d'emploi suivant l'âge.

(Prix : 14 fr. 80.)

PAQUETS ALCALS-ADULTES

Formule. — Même composition que les « Paquets-Alcals-Enfants », mais les doses des composants sont différentes.

Indications. — Mêmes indications que les « Paquets Alcals-Enfants ».

Présentations. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative, exposant les modes d'emploi.

(Prix : 14 fr. 80.)

Notices et échantillons sur demande.

Laboratoires FLEURY — ARCACHON — Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences,

Docteur en Pharmacie, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

PAQUETS VÉDÉ

Antigastralglques du Docteur de Montmorot.

Hyperchlorhydrie et affections du tube digestif.

Réalisant une chimiothérapie saturante totale de l'acidité gastrique. Les résultats obtenus ne sont nullement comparables à ceux enregistrés avec une poudre de saturation quelconque, les produits entrant en composition étant d'une pureté chimique absolue.

Hydrate de magnésie extra-blanc et pur, Bicarbonate de soude sursaturé raffiné n° 1, Carbonate de chaux « précipité extra-léger », Lactose de Hollande, Essence d'anis de France.

2 à 4 paquets par 24 heures aux repas.

Admis aux Assurances sociales.

Boîte de 18 paquets : 11 fr. 80 pour 8 jours.

Boîte de 36 paquets : 19 fr. 80 pour 18 jours.

Boîte de 100 paquets : 47 francs pour 45 jours.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

(Tél. : Roquette 97-46 et 97-47.)

PARADOLINE

LIQUIDE

Indication. — *Cure d'entretien hépatique*, notamment pour la femme et pour l'enfant (goût très agréable).

Posologie. — *Enfants* : de 2 à 4 ans, XX à XXX gouttes par jour en 2 fois ; 4 à 6 ans, XL gouttes par jour en 2 fois ; 6 à 8 ans, LX gouttes par jour en 2 fois.

Cadets de 8 à 15 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

La PARADOLINE LIQUIDE se prend le matin à jeun et avant le repas du soir, diluée dans 6 fois son volume d'eau minérale.

Composition. — Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate, Salicylate de Sodium chimiquement purs ; Boldo, Chirette, Artichaut.

AMPOULES BUVABLES

Indication. — *Syndrome Douleur* (Douleurs d'accouchement, Nausées de la grossesse, Toutes Coliques, hépatiques et néphrétiques principalement. Crises rhumatismales).

Posologie. — Absorber le contenu d'une ampoule tous les quarts d'heure jusqu'à sédation complète de la douleur. Une heure maximum.

Composition. — Bicarbonate et Salicylate de Soude, Boldo, Chirette, Romarin, Artichaut, Arénaria, Buchu, Piscidia.

DRAGÉES

Indications. — Affections pelviennes, génitales, urinaires.

Posologie. — 6 dragées par jour.

Composition. — Salicylate et Bicarbonate de soude, Kawa-kawa, Uva-Ursi, Maïs Piscidia, Pichi, Romarin, Arénaria.

Paradoline liquide : contenance 20 cuillerées à café. Prix : 18 fr. 75.

Paradoline ampoules buvables : contenance 8 ampoules de 10 cc. Prix : 38 fr. 50.

Paradoline dragées : contenance 40 dragées. Prix : 18 fr. 75.

PARADOLEX

(Paradoline externe).

Liniment concentré en flacon stilligoutte.

S'emploie en **applications** concurremment avec la **Paradoline** ampoules buvables, dont il renforce considérablement l'action dans les douleurs **rhumatismales**, rénales, génito-urinaires.

Analgésique externe O. R. L.

Contenance : environ 20 applications. Prix : 20 francs.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

(Tél. 22.)

PARASCLÉROSE

Composition. — Le *Parasclérose* est une préparation d'Iodure de Strontium additionnée d'extrait d'artichaut présentée en pilules glutinisées dosées à 4 centigrammes d'Iodure de Strontium et à 20 centigrammes d'extrait d'artichaut.

Indications. — Le *Parasclérose* qui chasse le cholestérol par l'extrait d'artichaut et le calcium grâce à l'Iodure de Strontium s'oppose au durcissement des artères. C'est le médicament de la sclérose artérielle, cardiorénale, etc...

Mode d'emploi et doses. — Le *Parasclérose* se prescrit à la dose moyenne de 3 à 5 pilules par jour, prises avec un peu d'eau, au début des repas. Le traitement doit durer jusqu'au moment où les symptômes de sclérose ont disparu ou ont été fortement atténués. Il s'agit ensuite de faire de temps en temps des cures, avec la même quantité de pilules, de 3 à 4 semaines chacune, pour conserver le bénéfice acquis. Cette façon de procéder préserve des accidents graves de la sclérose artérielle.

Présentation. — Flacon de 50 pilules.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 44-59.)

PARATOXINE du Prof. LEMOINE

Contre la Tuberculose (Lipoides biliaires).

Deux formes : 1^o *Paratoxine A*, ampoules de 1 cc. et 2 cc. pour injections sous-cutanées ;

Pilules de 0 gr. 20 pour médication interne.

2^o *Paratoxine B*, ampoules de 5 cc. pour injections intralaryngées ; Capsules pour médication interne.

Action thérapeutique et usages. — Préconisée aux diverses périodes de la tuberculose en injections sous-cutanées ou intralaryngées, modifie le terrain et constitue le traitement de choix de la tuberculose.

Posologie et mode d'emploi. Paratoxine A : En injection sous-cutanée de 1 cc. ou 2 cc. par jour et plus. En pilules 2 à 6 par jour comme adjuvant de la médication sous-cutanée.

Paratoxine B : En injection intralaryngée tous les 2 jours pour laryngite bacillaire. En capsules dans les cas de diarrhée bacillaire.

La Paratoxine présente le grand avantage d'être inoffensive. Les hautes doses sont en général inutiles. Chez les enfants au-dessous de 12 ans, les doses doivent être diminuées de moitié.

Les injections doivent se faire assez profondément sous la peau à la limite de la couche graisseuse et du muscle.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré, Paris.

PARATYRONE

Composition. — La Paratyronne est l'hormone parathyroïdienne, physiologiquement titrée (1 cc. = 20 unités).

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances parathyroïdiennes, tétanies, états spasmophiles, ulcères digestifs, syndromes spasmodiques douloureux, rhumatisme chronique, certains troubles psychiques, épilepsie, chorée, tics, cataracte, oto-spongieuse, otite scléreuse, ulcères variqueux, etc.

Présentation et posologie. — La PARATYRONE est présentée en flacons de 5 cc. contenant 100 unités, soit 20 unités par cc. Les flacons, destinés en principe aux injections, s'utilisent aussi par voie orale (XXXV-VL gouttes = 1 cc.). Ampoules (boîte de 12) à 10 unités par ampoule de 1 cc. Une injection quotidienne de 1/2 à 1 cc., sous-cutanée. Suppositoires (boîte de 10), un par jour. Solution pour pulvérisations.

Dans certains cas, il sera utile d'ajouter aux injections de PARATYRONE une cure par l'IRRASTERINE BYLA, dont on sait la puissance comme fixateur du calcium.

Prix. Flacon : 46 fr. 80. Ampoules : 62 fr. 40. Suppositoires : 46 fr. 80. Solution pour pulvérisations : 50 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.
(Tél. : Danton 08-11.)

PARAVEININE

Gouttes.

Composition. — Iodopeptine, Extraits fluides de Marron d'Inde, Hamamelis, Cupressus, Alcoolés de Piscidia et d'Anémone Pulsatille.

Indications. — Etats variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Varicocèles, Artério-sclérose, Accidents de la Puberté et de la Ménopause.

Posologie. — XXV gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire RICHER, Docteur en Phar^{ie}
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

PARLAX

Huile de Paraffine pure de haute viscosité.

Description. — **Parlax** est la reine des huiles de Paraffine. Inodore et insipide, limpide comme le cristal de roche, sa pureté est absolue.

Indications. — Son onctuosité et sa viscosité remarquables lui permettent d'assurer le rythme de l'évacuation intestinale. **Parlax** doit être prescrit : dans tous les cas de constipation, entérites, appendicite, hémorroïdes, aux opérés, aux femmes enceintes, aux nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à potage deux fois par jour.

Enfants : 1 cuillerée à café deux fois par jour.

Parlax doit être pris de préférence pendant les repas, dans les purées de pommes de terre, de légumes secs, avec les épinards, endives et salades cuites, etc. Dans la salade assaisonnée au jus de citron. Dans les confitures, compotes de fruits.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delcupe — MONTREUIL-s-BOIS (Seine).
(Tél. : Avron 32-53.)

PAROLAGAR

(Marque déposée.)

Le Parolagar est une émulsion perfectionnée de 65 % d'huile de paraffine et d'agar-agar.

Formes thérapeutiques et indications :

N° 1. *Parolagar simple* (étiquette bleue).

Huile de paraffine.....	65 %
Agar-agar, eau distillée.....	35 %
	<hr/> 100 %

Traitement de choix de la constipation habituelle, doit être employé à la suite du Parolagar phtaléiné, lorsque l'habitude de l'évacuation à heure fixe aura été provoquée.

N° 2. *Parolagar composé* (étiquette rouge).

Huile de paraffine.....	65,00 %
Phénolphtaléine	0,32 %
Agar-agar, eau distillée.....	34,68 %
	<hr/> 100,00 %

Renferme la dose prudente de 5 centigrammes de phénolphtaléine par cuillerée à potage. Indiqué comme traitement d'attaque de la stase chronique et surtout pour les malades ayant abusé de purgatifs. On lui substituera la forme simple dès que l'habitude de l'évacuation régulière aura été obtenue.

Posologie.

Adultes : Une cuillerée à soupe le soir, pendant le repas, ou matin et soir, si nécessaire.

Peut être pris dans de l'eau ou du lait.

Enfants : Une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe. Peut être mélangé aux aliments ou au biberon.

Pas de suintement. Pas d'accoutumance.

LABORATOIRES DU PAROLAGAR

10-12, rue de Strasbourg — PARIS (10^e).

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Propriétés thérapeutiques. — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

Posologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

<i>Enfants</i> de moins de 1 an	X à XXX	gouttes.
— de 1 à 5 ans	XX à LX	—
— de 5 ans et au-dessus..	XX à C	—
<i>Adultes</i>	XXX à C	—

Prix : 12 francs.

THIRIET et Cie

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

(Tél. : 40-65.)

PARULCINE

Composition. — Pepsine injectable en solution neutre.

Présentation. — Ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. 10 de Pepsine.

Indications. — Ulcus gastro-duodéal.
Lithiase biliaire.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires, à raison de 3 par semaine (commencer par 1/4 de cc., en augmentant de cette quantité, jusqu'à 2 cc.) série de 15 injections.

Prix : 26 fr. 70.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

PARVULA

Semences Laxatives.

(*Plantago Ispaghula* Roxb.)

Propriétés. — Ces semences, produit végétal naturel, fournissent dans l'intestin un mucilage abondant qui provoque des contractions péristaltiques et réveille la tonicité de l'intestin par action réflexe. Dépourvues d'action offensive sur la muqueuse, elles la lubrifient simplement.

Indications. — Le rééducateur intestinal, traitement rationnel de la constipation, laxatif de choix de la grossesse, des entéritiques, des malades à hypersensibilité intestinale, etc...

Posologie et mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café le soir avec le potage, ou le matin avec le petit déjeuner. Peuvent être également prises pures ou incorporées à de la confiture, purée de légumes, etc.

Prix : 13 fr. 75.

Échantillon gratuit sur demande.

Laboratoire A. BRUNSCHWIK

Pharmacien de 1^{re} classe

3 bis, rue Vallier — LEVALLOIS-PERRET.

(Tél. : Pereire 40-46.)

PASSICARBONE

Charbon animal purifié. Charbon végétal.

Charbon végétal activé.

Extraits sédatifs végétaux (*Passiflorine*).

L'étude comparative des différents charbons utilisés en thérapeutique démontre que, suivant leur porosité, leur texture capillaire et leur origine, ils semblent avoir des propriétés variables d'absorption et d'adsorption. On a donc intérêt à associer des charbons d'origine variée. C'est à cette formule que répond le *Passicarbone*.

D'autre part, les affections gastro-intestinales s'accompagnent souvent de réactions spasmodiques, de troubles neuro-végétatifs ou de troubles psychiques. L'addition aux charbons des sédatifs végétaux qui ont fait le succès de la *Passiflorine Réaumur* font du *Passicarbone* un remède complet dans tous ces cas.

Composition. — Le *Passicarbone* est un granulé fondant dont 5 grammes (soit pratiquement une cuillerée à café) contiennent 2 grammes, soit 40 p. 100, de charbons sélectionnés et actifs et la valeur d'une cuillerée à café de *Passiflorine*.

Usages :

Aérophagie et formes diverses des dyspepsies flatulentes.

Dyspepsies nerveuses.

Gastrites diverses. — Gastrites infectieuses, gastrites post-anesthésiques, gastro-entérites, etc.

Ulcères.

Affections intestinales. — Colites ou typhlocolites, Colibacillose, diarrhées diverses, entérites, grippe à forme intestinale et états intestinaux toxico-infectieux, fermentations intestinales.

Affections hépatiques (Ictère, lithiase biliaire, etc.).

Intoxications.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café aux repas.

La boîte : 18 francs.

G. REAUMUR et Cie,

Docteur en Pharmacie

115, rue de Paris — BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états
névropathiques.

Composition. — Une cuill. à café contient
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*
nata ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;
XX gouttes alcoolé de *Crataegus oxya-*
cantha.

Action. — La *Passiflore* diminue la tension
artérielle, régularise l'influx nerveux dans
le domaine du grand sympathique et est un
sédatif et un antispasmodique de premier
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin
que les auteurs américains ont comparé
au bromure, et par le *Cratægus* dont l'ac-
tion tonicardiaque et équilibrante du sys-
tème nerveux est bien connue (Huchard,
Renon, H. Leclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques :
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-
somnie nerveuse, troubles fonctionnels du
cœur d'origine nerveuse (palpitations,
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la
vie génitale, etc.

Posologie. — Comme médicament équi-
brant du système nerveux : une cuillerée à
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : une à trois
cuillerées à café le soir.

Prix : 18 francs.

G. RÉAUBOURG et Cie,

Docteur en Pharmacie,

115, rue de Paris,

BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

PASTICAÏNE

Composition. — Comprimés antiseptiques et anesthésiques à base de jaune d'acridine et de chlorhydrate de larocaïne.

Avantages. — Le jaune d'acridine est à la fois plus actif et moins toxique que les autres colorants antiseptiques habituellement employés.

Le chlorhydrate de larocaïne, supérieur à la cocaïne comme anesthésique local, est moins toxique ; il n'irrite pas les tissus et n'a pas d'action secondaire. Le chlorhydrate de larocaïne ne figure pas au tableau B.

Indications. — Traitement préventif et curatif de toutes les affections du pharynx (angines, amygdalites, laryngites) et de la bouche (stomatites).

Posologie. — 8 à 10 pastilles par jour, sauf indications spéciales du médecin traitant.

Présentation. — Boîte de 30 pastilles, pour un traitement de 4 jours environ.

Prix : 10 fr, 40.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

Tél. : Archives 34-68.

PASTILLES HOUDÉ

au Chlorhydrate de cocaïne.

Pastilles dosées à 1 milligramme de Chlorhydrate de cocaïne.

Indications. — Stomatites, *angines*, *pharyngites aiguës*. Calmant des gastralgies, des vomissements. Excellent sédatif des *toux nerveuses* et des hoquets. Calmant des irritations laryngées. Véritable *gargarisme sec*.

Doses. — 6 à 12 pastilles par jour, suivant l'âge.

Formes diverses. — Cocaïne simple ; Cocaïne et chlorate de potasse ; Cocaïne et borate de soude ; Cocaïne et menthol ; Cocaïne, borate et chlorate ; Cocaïne, borate et menthol.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

PASTILLES M. B. C.

Chaque pastille renferme les principes actifs suivants :

Chlorhydrate de cocaïne	0,0002
Chl. d'amyléine (stovaïne)	0,0003
Menthol	0,005
Borate de soude.....	0,02
Chlorate de potasse.....	0,06

Boîte de 5 paquets de 12 (*enveloppage automatique*).

Mode d'action. — Antiseptique, Anesthésique, Cicatrisant.

Indications. — Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, stomatites, etc...). — Désinfection de la bouche (fumeurs, haleine fétide, etc...). — Hygiène de la voix (chanteurs, professeurs, conférenciers, etc...).

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

Durée : 7 à 8 jours.

Prix : 5 fr. 50.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis, PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 34-68.)

PÂTE À L'EAU ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.
Pâte à l'eau stable, poreuse, aseptique, porphyrisée. Ne renferme ni vaseline, ni corps gras, souvent mal tolérés, facile à enlever.

Deux formes :

Aloplastine simple.

Indications. — Eczémas suintants, dermatites irritables, érythèmes fessiers, etc.

Aloplastine Ichthyolée à 5 p. 100.

Indications. — Eczémas, Eczématides, Parakératoses, Dermo-épidermites microbiennes, Acné, Engelures, Brûlures.

**Laboratoires Biologiques de
l'ÎLE-DE-FRANCE**

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

PÂTE À L'EAU R. P.

de La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés et sélénisés naturels
de La Roche-Posay.

Indications. — Lésions suintantes peu étendues, eczémas irritables, eczémas infantiles. Pâte décongestionnante, agit comme pansement humide.

Mode d'emploi. — S'applique à la spatule, en couche légère sous enveloppement de préférence au renouvellement laver à l'eau chaude additionnée de quelques sachets de sels de bains R. P. (Deux à six suivant la quantité). Dès l'assèchement panser au cérat R. P. et ultérieurement au Cold Cream naturel R. P.

Poudrer toujours légèrement avec la « Poudre Dermique R. P. ».

Présentation et prix :

Pâte à l'eau R. P. de La Roche-Posay. Le grand pot.....	14 fr.
Sels de bains R. P. La boîte de 30 sachets	10 —
Cérat inaltérable R. P. Le tube	8 —
Cold Cream naturel R. P. Le tube	10 —
Poudre dermique R. P. La boîte	10 —

Laboratoires des PRODUITS DERMIQUES R. P.
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

PÂTE GINGIVALE À L'ACÉTYLARSAN

Préparation où se trouvent associés l'ACÉTYLARSAN, spirillicide bien connu et le ricinoléate de sodium, savon bactéricide, antitoxinique et générateur d'anti-virus.

Indications. — Traitement préventif des infections fuso-spirillaires, des gingivites et des stomatites aiguës ou chroniques. Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire. Prévention de la carie dentaire.

Mode d'emploi. — Dans les cas de lésions pyorrhéiques étendues ou importantes, appliquer la pâte sur les gencives pendant 15 minutes 1 fois par jour, après brossage préalable à l'aide d'une brosse dure.

Dans les cas légers ou à titre prophylactique, employer la pâte gingivale comme une pâte ordinaire, suivant les règles habituelles.

Présentation. — En tube d'étain.

Prix de vente, le tube : 8 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PATE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.
(Voir à *Sirop Mireille*.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : Chlorhydrate d'amyléine et chlorate de potasse). Même saveur plaisante.

Prix au public : 6 francs.

Laboratoires LEGENDRE et Cie.

Section D.-S. — Houilles (S.-et-O.).

Dépôts généraux pour la vente en gros,
France, Colonies et Protectorats :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,
à Bruxelles-Maritime.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n^o 1045-1.

PAVÉRINOL LALEUF

Composition. — Chaque capsule contient très exactement :

Papavérine Chlorhydrate.....	0,015
Camphre monobromé.....	0,15

Propriétés et indications. — Puissant stimulant respiratoire, cardiaque et circulatoire.

Le PAVÉRINOL dilate les vaisseaux coronaires, amplifie les contractions cardiaques, diminue l'excitation des fibres musculaires et en empêche la paralysie passagère.

Son emploi est recommandé dans les états infectieux et spasmodiques entraînant une insuffisance cardiaque.

Forme. — *Capsules glutinisées.*

Posologie et mode d'emploi. — De 4 à 6 capsules par jour, suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 à 12 capsules par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente : 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 capsules : 22 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium.)

Hypnotique, sédatif, analgésique.

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.

Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

Indications. — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

Formes et posologie. — *Ampoules de Pavéron* dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.

Dose : 1 ampoule à la fois ; 2 par jour.

Dragées de Pavéron dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. —

Dose : 1 à 2 dragées à la fois.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

PAVONOL

Alcaloïdes totaux de la Jusquiame associés à la Morphine et au Camphre.

Composition. — Morphine (Chlorhydrate) 0 gr. 01, Codéine (Phosphate) 0 gr. 01, Extrait hydro-alcoolique de Jusquiame 0 gr. 02, Sulfo-camphonate de sodium 0 gr. 10, Sérum physiologique camphré Q. S. pour une ampoule de 2 cc.

Propriétés. — Sédatif du système nerveux, Toni-cardiaque, Neutralisation des phénomènes douloureux en toutes circonstances.

Forme et posologie. — Une à deux ampoules de 2 cc. par 24 heures en injections hypodermiques.

Ce médicament s'emploie également par voie buccale ou en petit lavement à garder, par voie anale.

Boîte de 8 ampoules de 2 cc. Prix : 22 francs.

Laboratoire CASTEL

1, Place de la Bouquerie — NIMES.

A. CASTEL, Pharmacien,

Ingénieur-chimiste, licencié ès sciences.

PAXÈNE

Trois synergies phytothérapiques.

Sédatif Nervin: Valériane et Cypripedium.

Antispasmodique: Chaton de saule et Passiflore.

Cardiotonique: Cereus grand. et Aubépine.

Indications : Névropathies, Cardiopathies, Insomnies nerveuses.

Doses. — Insomnies nerveuses : 2 à 3 cuillerées à café le soir, pur ou dans un peu de tisane.

Nervosisme en général : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

Médication très active, agréable, non toxique et sans accoutumance.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

(Provence 20-20 et 58-43.)

PAXYL

Ampoules buvables de 5 cc.

Synergie Phytothérapique non toxique de haute valeur dans toutes les dystonies du Sympathique.

Formule :

1 ampoule, soit 5 cc., contient les principes extractifs de :

Marjolaine.....	0,50	Valériane stabilisée	0,10
Passiflore	0,50	Gelsemium	0,10
Saule blanc.....	0,25	Jusquiame.....	0,02
Ballote	0,20	Réglisse	1
Piscidia.....	0,20	Bromure de Magnésium... 1	

Propriétés. — Sédatif nervin et antispasmodique de premier ordre, abaissant la tension artérielle et régularisant le tonus sympathique.

Indications. — Tous états névropathiques, Tachycardie, palpitations, angoisse, Dyspnées, douleurs précordiales, Hypertension, mal de mer, gastrite nerveuse, etc.

Posologie. — Troubles Vagosympathiques : 1 ampoule dans un peu d'eau ou dans une infusion 1/4 d'heure avant les deux principaux repas.

Insomnies : Une troisième ampoule le soir en se couchant.

Prix : La boîte de 24 ampoules buvables de 5 cc : 36 francs.

Laboratoires AUCLAIRE

E. AUCLAIRE, Pharmacien de la Faculté de Paris.

36, rue de la Tour-d'Auvergne — (PARIS IX°).

Tél. Trudaine 38-63.

PECTINE OBERLIN

Une cuillerée à soupe contient :

Benzoate de soude.....	0 gr. 50
Eau de laurier-cerise.....	0 gr. 20
Sulfogaïacolate de potasse.....	0 gr. 50
Sirop de morphine.....	6 gr. 60
Sirop de punch..... Q. S. P.	20 gr.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires.

1 cuillerée à soupe 3 ou 4 fois par 24 heures.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

Tél. Trudaine 14-73.

PECTORAL COULLOUX

Pour les enfants.

Composition. — Teinture de belladone, Alcoolature d'aconit, Teinture de drosera, NaBr, Benzoate de soude, Ext. d'ipéca, Analgésine, Thiocolum, Sirop de Codéine, Sirop de Coquelicots, Sirop de Tolu.

Action et Indications. — Le Pectoral Coulloux calme les toux les plus rebelles, modère les sécrétions ; régularise les fonctions essentielles de l'économie et facilite la guérison de toutes les maladies des voies respiratoires.

Le Pectoral Coulloux est expectorant, sédatif et antispasmodique en même temps.

Doses et mode d'emploi. — Dans les 24 heures :

1^o De 1 à trois ans : 2 à 4 cuillerées à café ;

2^o De 3 à 5 ans : 4 à 6 cuillerées à café ;

3^o De 5 à 8 ans : 3 à 6 cuillerées à dessert ;

4^o De 8 à 10 ans : 3 à 4 cuillerées à soupe.

A donner loin des repas. Pour six jours ou deux jours de traitement suivant l'âge.

Laboratoires COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE. Tél. : 0-21.

PEDIOZEMA

(Granulés)

Composition. — Médication oposérothérapique à base de sérums activés de jeunes taureaux et d'organes frais de jeunes animaux.

Propriétés. — Désensibilisation. Libération des émonctoires. Brassage endocrinien.

Indications. — Eczéma infantile. Erythème fessier.

Présentation et posologie. — Boîte de granulés aromatisés à prendre à jeun, dissous dans un peu de lait, à raison de 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 fr.

Laboratoire biologique VALTRY
122, Champs-Élysées — PARIS.
(Tél. : Élysées 28-12.)

PÉLARGON DE NESTLÉ

(Lait de Marriott)

Lait entier acidifié en poudre, non sucré, pour l'alimentation infantile normale ou diététique. Antidyspeptique, anti-anémique.

Composition :

Matière grasse	26,0	p. 100
Matières protéiques	25,2	—
Lactose	36,2	—
Substances minérales (dont cendres 5,5 p. 100)	6,3	—
Acide lactique	3,3	—
Eau	3,0	—
Acidité totale exprimée en acide lactique	4,2	—

492 calories par 100 gr.

Haute valeur nutritive sous faible volume, extrême digestibilité, composition constante, excellente conservation.

Indications. — Alimentation des prématurés, dystrophiques, dyspeptiques, vomisseurs, de certains diarrhéiques, des eczémateux, des coquelucheux, pneumoniques, cysto-pyélitiques. Alimentation de certains nourrissons sains intolérants à tout lait normal.

Prix : La boîte, de 225 gr : 13 fr. ; de 500 gr : 22 fr.

Société NESTLÉ
6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

PELVINAL (Suppositoires)

Toutes algies pelviennes.

Composition :

Onguent napolitain.....	0,05
Extrait thébaïque	0,02
— de belladone	0,01
— de jusquiame.....	0,01

pour un suppositoire.

Triple action rapide, *loco dolenti*. Sédatrice, décongestive, antiseptique.

Indications :

Métrites, Salpingites, Congestion utéro-ovarienne, Cellulites diffuses, Règles douloureuses, Suites de couches, Prostatites, Cystites, Urétrites postérieures, ténésme, etc...

Prix : 13 fr. 30.

Laboratoire FOSSET
MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).
(Tél. : 11.)

PELVURYL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Chlorure de Magnésium, Méthylène-citrate d'Urotropine, Camphre monobromé, Acétate de Potasse, Benzoate de Soude, Buchu, Uva Ursi, Mauve.

Propriétés. — Antisepsie des voies hépato-biliaires, du rein et de la vessie. Décongestionnant du petit bassin.

Indications. — Syndrome entéro-rénal, Cholécystites, Lithiase biliaire, Congestion du Foie, Pyélonéphrites, Cystite, Urétrites, Prostatites, Hémorroïdes, Colibacillurie, Congestions Utéro-Ovariennes.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 6 à 10 comprimés par jour.

Prix : 19 fr. 50 (le flacon de 60 comprimés).

Enregistré au Lab. national de Cont. des Médicaments N° 950-2.

Laboratoire du « QUINA BLOT »

38, boulevard de Strasbourg — TOULOUSE.

(Tél. : 210-16.)

PENGHAWAR DES ILES

(Hémostatique Végétal.)

Composition. — Penghawar Djambi finement trié à la main.

Propriétés. — Hémostatique très sûr ; sans contre-indications, sans danger ; à effet très rapide.

Indications. — Hémorragies dentaires et nasales, Hémostase après applications de sangsues. Toutes coupures superficielles persistant à saigner.

Mode d'emploi. — Pratiquer une légère compression à l'aide de petits tampons sur les points hémorragiques.

Echantillons sur demande.

Prix { Boîte grand modèle : 6 francs.
au public { Sachet d'urgence : 2 fr. 50.

D. RINGEADÉ, pharmacien.
FOSSEBOUDEAU-BLAYE (Gironde).

PÉPIDON HENRY

Composition. — Combinaison de l'iode, avec les produits de la dégradation moléculaire des protéiques poussée jusqu'aux acides aminés, par la trypsine et l'érepsine.

Chaque cc. contient 50 mgr. d'iode pur, à l'état combiné.

Le Pépidon est la combinaison idéale de l'iode parce que :

1° C'est un produit dérivant d'une hydrolyse tryptique et érepsique poussant la dégradation des peptones jusqu'à sa phase ultime, *acides aminés*. De ce fait, le *Pépidon* est plus assimilable que les peptones iodées.

2° C'est un produit où l'iode a un dosage toujours constant de 50 mgr. par cc.

3° Le *Pépidon* n'est pas décomposé par le suc gastrique et n'irrite donc pas la muqueuse stomacale.

Doses. — *Adultes* : 40 à 60 gouttes par jour aux repas. Ces doses peuvent être augmentées ; certains médecins prescrivent 100 à 200 gouttes par jour sans la moindre intolérance.

Enfants : 5 à 10 gouttes et plus suivant âge.

Flacon de 45 gr. : 16 francs, pour 15 jours.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÈGE.

PÉPIONE

Gouttes.

Formule. — Iode pur, Peptone, Essence citron, Eau distillée.

Présentation. — En flacon compte-gouttes.

Indications thérapeutiques. — Contre le lymphatisme, scrofule, asthme, emphyseme, goitre, obésité, artériosclérose, affections du cœur et des vaisseaux, goutte, rhumatismes.

Mode d'emploi :

Adultes : XX gouttes 2 fois par jour.

Enfants : V à X gouttes 2 fois par jour, suivant âge.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo : 40-83.)

PEPSINACID

(Granulé)

La médication chlorhydro-pepsique, présentée sous une forme stable, d'un goût agréable, de conservation parfaite et d'activité contrôlée par digestion artificielle.

Composition. — 1 cuiller à café (3 gr. de granulé) renferme : V gouttes HCl dilué, 0,25 de pepsine.

Indications. — Troubles gastriques liés à l'Hypochlorhydrie, Pesanteurs, Anorexie, Troubles sympathiques post-prandiaux.

Troubles intestinaux : diarrhée par insuffisance gastrique, colites.

Traitement complémentaire dans les anémies graves. Dénutrition. Anachlorhydrie des néoplasiques.

Mode d'emploi. — 1 cuiller à café de granulé dissous dans la boisson habituelle, tout au début et pendant les repas.

Le flacon : 16 fr. 65.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie,
Successeur.

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 12-35.)

PEPSOBYL

Médication rationnelle de la constipation et de la dyshépatie.

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Pepsine	0,10	Extrait de Combretum...	0,015
Boldo	0,025	Extrait de Rhamnus Pur-	
Bile	0,05	shiana	0,015
Extrait d'artichaut.....	0,025	Poudre de Belladone	0,004

Avantages. — Association synergique de produits d'une valeur thérapeutique universellement reconnue avec le plus puissant des cholagogues : le Calomel.

Mode d'emploi :

Si prédominance des troubles hépatiques : 2 à 4 dragées le matin à jeun.

Si prédominance des troubles gastro-intestinaux : 1 à 2 dragées aux 2 principaux repas.

Enfants au-dessus de 13 ans : 1/2 dose.

Indications générales. — Toutes les insuffisances glandulaires digestives d'origine hépatique et leurs conséquences physiologiques (auto-intoxication, constipation, lithiase, hypertension, artério-sclérose, troubles nerveux et psychiques, angor biliaire, etc.).

Prix : 17 francs.

Échantillons sur simple demande.

Enregistré au lab. nation. de contr. des médicaments sous le n° 1790-I.

Vente autorisée pour les Assurances Sociales.

Laboratoire de **CHIMIO-OPOTHÉRAPIE**

22, rue de Turbigo — PARIS (II^e).

PEPSO-PANCRE-MALT WANDER

Composition. — Pepsine, pancréatine glutinisée; extr^t de malt (diastases, vitamines B).

Forme. — Paillettes.

Indications. — Insuffisances digestives ; digestions pénibles, dilatation et pesanteur de l'estomac ; accidents d'anaphylaxie alimentaire : eczéma, urticaire, prurit, etc. ; maladies de la dénutrition : amaigrissement, débilité ; convalescence.

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café.
Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe à la fin des principaux repas, dissous dans de l'eau ou une infusion, ou délayé dans un peu de compote, de purée ou de bouillie.

Durée moyenne de consommation : 15 jours.

P. BASTIEN, Pharmacien

CHAMPIGNY (Seine). (Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

PEPTALMINE

Peptones de Viande et de Poisson
Extraits d'Œuf et de Lait
Farine de blé dans l'enrobage.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas.*

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 18 francs ; granulés : 18 fr. 25.

Pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.
Extraits d'œuf et de lait.
Farine de blé dans l'enrobage.
Sulfate de Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholestites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 18 francs ; granulés : 18 fr. 25.

Pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

PEPTARGYL AGUETTANT

Sirop peptoné à teneur élevée
d'Argent colloïdal

Anti-infectieux, Antitoxique, Antithermique,
très actif,
à grande facilité d'emploi.

Aucun des inconvénients des sels d'Argent.

Indications. — Etats infectieux buccopharyngés et du tube digestif. Etats septicémiques. Gripes, amygdalite, sinusite, bronchite, congestion pulmonaire, colites, gastro-entérites, dysenteries, fièvre typhoïde, phlébites, dyscrasies sanguines. Staphylococcies : furonculose, anthrax, acné.

La pénétration parfaite de l'argent colloïdal étend son action à tout l'organisme.

Dose. — *Préventive* : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Curative : 4 à 8 cuillerées à café par jour.

Une demi-heure avant les repas, avec un peu d'eau.

Particulièrement indiqué pour les enfants, ils en sont friands ; on leur donne 1/2 dose.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

PEPTICOL

Formes. — Elixir de goût aromatique, très agréable, absorbé sans répugnance, même par les tout jeunes enfants.

Granulé aromatisé, permettant un usage plus commode aux personnes prenant leurs repas hors de leur domicile.

Composition. — Peptones de viande, de poisson, d'œuf, de lait, de farine de blé. Glycérine, Alcool.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-choc complète ; spécifique des intoxications d'origine alimentaire ; excite l'appétit et facilite la digestion en augmentant et régularisant les sécrétions des glandes salivaires, des muqueuses gastriques et intestinales ; favorise les sécrétions et le péristaltisme du gros intestin.

Indications. — *Urticaire, Manque d'appétit, Mauvaises digestions, Intolérances stomacales, Prurits, Somnolences après les repas, Flatulences, Asthme.*

Posologie :

Liquide ou granulé.

Enfants : une demi-cuillerée à café.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café, 15 minutes avant les repas.

Prix au public :

Elixir, le flacon : 15 francs.

Granulé, la boîte : 15 francs.

Laboratoire du PEPTICOL

13, avenue du Maréchal-Foch,
DAMMARIE-LES-LYS (S.-et-M.).

PEPTODIASE

Stimulant gastrique.

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1° Association de :

Chlorure de calcium.

— magnésium.

— sodium.

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2° **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

Propriétés thérapeutiques :

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérogastrie.

Anorexie.

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants : IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 17 fr. 10.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 28-96.)

PEPTO-FER JAILLET

Composition. — Combinaison organique chlorée de peptonate de fer.

Avantages. — Le fer dans le PEPTO-FER du D^r Jaillet est animalisé par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine est rapidement augmenté, sans aucune fatigue ni pour l'estomac, ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle anti-anaphylactique.

Le PEPTO-FER du D^r Jaillet n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et ne constipe pas.

Indications. — Anémies.

Forme pharmaceutique. — Elixir.

Doses. — *Grandes personnes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café après les repas dans un peu d'eau.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS.

PEPTOGIL

Peptones gastriques et pancréatiques.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antianaphylactique polyvalente, spécifique des anaphylaxies d'origine digestive.

Indications. — Urticaires, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin, et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

Conditions d'emploi. — 3 fois par jour, 1 heure avant les repas, croquer 1 à 2 dragées. *Adultes* : 2 dragées.

Enfants : jusqu'à 12 ans, 1 dragée.

Prix de la boîte de 56 dragées : 16 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 fr.

VILLEFRANCHE (Rhône).

P. PHILIPPE, Pharmacien de 1^{re} classe

PEPTO-KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable à base de Glycérophosphates et de Kola.

Dose et mode d'emploi. — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications. — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, Stimulant pour les sportifs, etc.

Prix : 21 fr. 85

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PEPTO-MAGNÉSIE VASSAL

Composition. — *Granulé de Peptones Polyvalentes* (de viande, d'œuf, de lait, de gélatine, de poissons, de céréales) et de *Sulfate de Magnésie pur sec*, goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant Hépatobiliaire, puissant Cholagogue qui agit efficacement sur le foie et les voies biliaires, puissant antianaphylactique polyvalent.

Indications et posologie. — Cholécystite, congestion du foie, ictère, entéro-colites mucomembraneuses, lithiase, constipation, asthme, urticaire, eczémas, vertiges et migraine.

1 à 3 cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau chaude, le matin à jeun.

Prix de la boîte : 16 fr. 65.

Échantillons sur demande :

Aux Laboratoires Léon DANJOU

28, rue Hôpital-Militaire — LILLE.

PEPTOMALTONE DÉJARDIN

Préparée dans le vide, à basse température, donc sans destruction des vitamines.

Trois préparations :

- A. *Etiquette verte* : sans œufs ni cacao.
- B. *Etiquette bleue* : sans œufs, mais aromatisée au cacao.
- C. *Etiquette violette* : sans œufs, mais avec arôme café.

Indications. — Pour combattre toutes les déficiences de la nutrition, remédier aux déphosphatations.

Posologie. — De 2 à 4 cuillerées à café par tasse, mais après refroidissement, à bonne température, du liquide choisi comme excipient, eau, lait, café ; préalablement bouilli.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 250 grammes environ.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 03-04.)

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE de viande intégrale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine, somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise hémoclasique atténuée).
Urticaire.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés.
— Granulé.

Dose. — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou une cuillerée à café de granulé.

Prix :

Comprimés : Le tube, 16 fr. 65.

Granulé : La boîte, 16 fr. 65.

Société industrielle de thérapeutique scientifique appliquée.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone et de fer.
Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur
d'Elixir ou de vin à chaque repas. *Enfants*
1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Reconsti-
tution des hématies.

Indications. — Tous les états anémiques
et chlorotiques

Prix : *Gouttes* : 16 fr. 15.

Elixir : 21 fr. 85. — *Vin* : 25 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PEPTONE VASSAL

Viande de bœuf digérée.

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf.
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières
données scientifiques, est un produit remar-
quable tant par ses qualités organoleptiques que
par sa richesse en matières directement assimi-
lables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être
d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.
Agréable au goût.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage
ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente
600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Échantillon gratuit sur demande.

Prix : 25 francs.

Laboratoires Léon DANJOU
LILLE.

PEPTOPANCREASI SERONO

Se recommande dans tous les cas de troubles digestifs.

Renfermant la totalité des ferments gastriques et pancréatiques, la **Peptopancreasi Serono** représente une thérapeutique très complète, basée sur les recherches scientifiques les plus modernes. On emploie la **Peptopancreasi Serono** dans toutes les dyspepsies gastro-intestinales, ainsi que pour corriger les insuffisances et l'atonie de l'estomac. Se prend à la dose d'une cuillerée à café dans un peu d'eau avant chaque repas.

Présentation : flacons de solution.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

Tél. : Dorian 56-71.

Fournisseur des hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

PEPTOSTHÉNINE CHOAY

Composition. — Association opothérapique digestive suivant formule :

Poudre gastrique	15 cgr.
— entéro-pancréatique ..	15 —
— hépatique	15 —
— biliaire	5 —

Pour 1 cachet ou 1 comprimé de 50 cgr.

Indications. — Troubles dyspeptiques par insuffisance des glandes digestives.

Mode d'emploi. — Un cachet ou comprimé à la fin de chacun des principaux repas.

Boîte de 24 cachets ou de 30 comprimés.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

PEPTOZYM

Composition :

Extrait de pancréas	0 gr. 10
Extrait de bile	0 gr. 05
Boldine	0 gr. 00075
Extrait de muqueuse gastrique..	0 gr. 15
Poudre de noix vomique	0 gr. 025

En deux enrobages concentriques, le premier contenant les deux derniers composants et soluble dans l'estomac, le deuxième soluble dans l'intestin et contenant les trois premiers composants.

Indications. — Toutes dyspepsies par insuffisances sécrétoires et par insuffisance de la motricité, stimulant de la sécrétion et de la motilité gastro-intestinale, dysfonctionnements gastriques à tendance hypo.

Présentation et prix. — 15 fr. 60 la boîte de 45 dragées.

Posologie. — 2 ou 3 dragées au début des deux principaux repas.

Laboratoire R. BOUYSSOU
CHAMBOIS (Orne).

PERANDRONE

Propionate de testostérone.

CIBA

HORMONE ORCHITIQUE DE SYNTHÈSE.

Propionate de testostérone préparé synthétiquement selon le procédé original de Ruzicka. Représente, à l'heure actuelle, la substance possédant l'activité hormonale la plus élevée, telle qu'elle est révélée par la méthode des tests : test-coq (croissance de la crête du chapon) ; test-rat (augmentation du poids de la vésicule séminale).

Indications :

Chez l'enfant et l'adolescent : Les troubles du développement sexuel, tels que puberté retardée, infantilisme, eunuchoidisme, cryptorchidie, adiposité, anomalies morphologiques (gynécomastie) et psychiques résultant de ces troubles.

Chez l'adulte : L'insuffisance testiculaire, avec ses répercussions physiologiques et psychiques, affaiblissement ou cessation prématurée de la fonction sexuelle eunuchoidisme, pusillanimité, adiposité, sénilité précoce.

Chez les prostatiques : Les troubles de la fonction urinaire disparaissent souvent complètement au premier stade ; dans les cas plus avancés on obtient encore des améliorations considérables. *L'état général* est toujours relevé ; même chez les sujets qui ne sont plus justiciables que de l'intervention, l'invigoration et la résistance accrue favorisent l'acte opératoire et son pronostic.

Dans les affections chroniques par déficience endocrine :

Tels certains états d'asthénie, de psychasthénie avec affaiblissement de la mémoire, l'obésité, lorsqu'elle traduit la carence testiculaire.

Chez la femme : Les mastopathies, les fibromes et certains troubles menstruels relevant d'un état d'hyperfolliculinémie habituelle sont très heureusement influencés.

Présentation. — La Perandrone est présentée en ampoules de 1 cc. sous trois solutions :

Solution I. Boîte de 4 ampoules à 5 milligrammes.

Solution II. — 5 — 10 —

Solution III. — 2 — 25 —

permettant des traitements Moyens, Intensifs, Très intensifs.

Traitement moyen : 1 Amp. Sol. I, 4 fois par semaine.

— *intensif* : 1 Amp. Sol. II, tous les 2 ou 3 jours.

— *très intensif* : 1 Amp. Sol. III, 2 fois par semaine.

PERANDRONE A — Acétate de testostérone.

Boîte de 5 ampoules de 10 milligrammes.

Boîte de 1 ampoule de 40 milligrammes.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PÉRASUROL

Éliminateur des déchets uriques.

Composition :

Salicylate de lithine.....	2 grammes.
Phénylcinchoninate de soude	2 —
Tartrate de diméthylpipérazine.....	3 —
Anhydrométhyl. citr. d'urotropine ..	3 —
Phosphate de soude.....	4 —
Excipient effervescent aromatisé pour 100 gr.	

Forme. — Granulé effervescent.

Indications. — Rhumatismes, goutte, lithiase rénale, arthritisme, coliques néphrétiques, gravelle.

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée du flacon : 8 à 10 jours.

Prix. — 20 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôles sous le n° 1081-2.

G. BAETZ, pharmacien
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 21).

PERCAÏNE

Ohlorhydrate de la diéthyléthylène-diamide
de l'acide α -butyloxycinchoninique

CIBA

ANESTHÉSIQUE LOCAL

Action très intense (10 fois celle de la cocaïne) et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface. Médicalement, son action analgésique est précieuse dans le traitement des états douloureux les plus divers.

Anesthésie par infiltration. — Solution de 1 à 2 p. 1.000, additionnée ou non d'adrénaline.

Anesthésie rachidienne. — Ampoules de 20 cc. à 1 p. 1.500 (JONES), et de 2 cc. à 5 p. 1.000 (QUARELLA).

Anesthésie des muqueuses, du nez, de la gorge, de l'urètre, de la vessie. — Solutions de 1/1.000 à 2 p. 100 (oto-rhino-laryngologie).

Présentation :

Comprimés de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tube de 20 comprimés.

Ampoules de divers titres et contenances pour infiltration et rachi (demander Notice).

PERCAÏNAL CIBA

ONGUENT ANALGÉSIQUE ET ANTIPRURIGINEUX,
A BASE DE PERCAÏNE.

Calme la douleur et la démangeaison dans toutes les lésions ou éruptions douloureuses de la peau et des muqueuses. Assure le repos et le sommeil. Favorise la guérison des lésions.

Indications principales. — Eczéma, prurigo, crevasses, gerçures, ulcères, zona, prurit anal et vulvaire, fissure anale, hémorroïdes, etc.

Prescrire : Un tube Percaïnal.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PERCALCINE

Composition. — Association d'arrhénal, de divers sels de chaux (en particulier du silicate), de fenugrec et de girofle (qui supprime les inconvénients du fenugrec.)

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant intensif
Augmente l'appétit, l'assimilation, le poids.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, anémie, déphosphatisation, carence calcique, dépressions nerveuses, Neurasthénie, Croissance difficile, faiblesse musculaire et osseuse, fractures.
Grossesse et allaitement.

Mode d'emploi :

A prendre 20 jours par mois.

Adultes : 3 cachets par jour au milieu des repas.

Enfants : au-dessus de 10 ans : 2 cachets ; de 4 à 10 ans : le contenu d'un cachet pris en 2 fois, aux repas de midi et du soir, mélangé aux potages, aliments ou confitures.

Prix : 17 fr. 10. La boîte de 30 cachets.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX°).
(Tél. : Trudaine 45-18.)

PERCALCIUM

Composition. — a. *Solution de Chlorure de Calcium*, stabilisée et dosée de façon à ce que 1 goutte = 0,02 ctg de sel.

b. *Solution de Chlorure de Manganèse*, jouant le rôle de catalyseur et rendant le *Percalcium* beaucoup plus actif que les préparations similaires.

c. *Excipient spécial* masquant la saveur particulièrement désagréable du Chlorure de Calcium.

Propriétés thérapeutiques. — a. *Anti-Hémorragique*: Action curative dans les maladies hémorragipares, les hémorragies viscérales : épistaxis-hémoptysies, métrorragies, etc., action préventive des hémorragies post-opératoires.

b. *Recalcifiant* : 1° la *Tuberculose* et les *Etats prétuberculeux*, dans toutes leurs formes, dans toutes leurs phases évolutives ; 2° les *Troubles du Métabolisme calcique* : Rachitisme, Grossesse, Tétanie, Décalcification osseuse, Caries dentaires.

c. *Régulateur du Métabolisme de l'eau*: Résorption des épanchements séreux d'origine rénale, hépatique, pleurale.

d. *Anti-choc*: Etats colloïdoclasiques : choc hémoclasique ; rhinorrhée ; asthme, rhume des foins ; urticaire, accidents sériques.

Posologie. — Chez l'enfant : V à XX gouttes par année d'âge jusqu'à 8 ans ; au-dessus de 8 ans et chez l'adulte, de XX à CC gouttes.

Prix : 17 francs.

Laboratoires du Percalcium : A. JOURDIN

6, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI°). (Tél. : Passy 92-54.)

PER-EXTRAITS CARRION

Extraits opothérapiques injectables préparés selon une technique spéciale.

Composition. — Solutions désalbuminées correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule de 2 cc. (Corps jaune, Cortex. Foie, Ganglions lymphatiques, Hypophyse antérieure, Hypophyse totale, Mammaire, Moelle épinière, Moelle osseuse, Myocarde, Orchitique, Ovaire, Pancréas, Placenta, Prostate, Rein, Rate, Substance grise, Surrénale, Thymus, Thyroïde, Utérus). Pour le Per-Parathyroïde, une ampoule de 1 cc. correspond à 0,05 d'organe.

Voir dans ce dictionnaire : *Per-Hépatique, Per-Ovarien, Per-Surrénalien, Per-Thymique.*

Forme. — Ampoules de 2 cc. (sauf Parathyroïde de 1 cc., Perhépatique et Perthymique de 2 et 5 cc.).

Indications. — Troubles endocriniens.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire, tous les jours, ou tous les deux jours.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules : 27 fr. 55.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PERGLANDÈNE HÉPATIQUE

Extrait de Foie injectable, délipoidé, désalbuminé.

Indications. — Anémies, cirrhoses, ictères, dyspepsie, insuffisances hépatiques au cours des maladies aiguës et chroniques, en particulier de l'intoxication éthylique. Toutes manifestations anaphylactiques, cutanées, respiratoires, nerveuses, etc. Dépression mélancolique et manifestations convulsives.

Formes et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais.

Conduite du traitement. — Une injection par jour ou tous les deux jours de 1 cc.

Prix de la boîte : 36 fr. 50.

Prix du tube : 34 francs.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE 

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

PERGLANDÈNE ORCHITIQUE

Extrait d'Organe injectable, délipoïdé, désalbuminé.

Indications. — *Chez la femme*: troubles de la ménopause et de la puberté, anxiété génitale, troubles liés à la continence, aménorrhée rebelle. *Chez l'homme*: infantilisme, impuissance, sénilité précoce. *Dans les deux sexes*: obésité, engelures, acrocyanose.

Formes et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Conduite du traitement. — Une injection tous les deux jours de 1 cc. ou suivant prescription médicale.

Prix de la boîte : 21 fr. 50.

Prix du tube : 19 fr. 50.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 26-87.)

PERGLANDÈNE OVARIEN

Extrait d'Ovaire injectable, délipoïdé, désalbuminé.

Indications. — Insuffisances ovariennes, troubles de la puberté, de la ménopause naturelle ou opératoire, aménorrhée ou dysménorrhée.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Conduite du traitement. — Une injection par jour, ou tous les deux jours, de 1 cc. Séries de 20 ou de 10 injections en dehors de la période menstruelle.

Prix de la boîte : 39 fr. 50.

Prix du tube : 37 fr. 50.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 26-87.)

PER-HÉPATIQUE CARRION

Composition. — Extrait spécial de foie désalbuminé, correspondant à 1 gramme ou 2,5 gr. d'organe frais par ampoule.

Forme. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

Indications. — Insuffisance hépatique au cours des maladies aiguës et chroniques (tuberculose notamment). Intolérance à certaines médications (chryso et arsénothérapie), Cirrhoses.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 27 fr. 55. La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 44 fr. 70.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PÉRICOLS DU D^r LEGROS

Présentation. — Conglomérés à base de glycérine pouvant contenir tous médicaments, de forme discoïde, d'élasticité parfaite.

Avantages. — Entre en contact parfait avec la muqueuse du col utérin, épousant la forme des culs-de-sac. Fonte parfaite.

Composition. — Péricols bellado-iodurés ; au thigénol ; à l'ichtyol ; au collargol.

Et toute formule spéciale désirée par le médecin.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques.

Prix : Boîte de 6 : 19 fr. 25.

Boîte de 20 : 42 francs.

Inscrit aux Ass. Sociales.

Laboratoires G. LESOURD

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

PÉRISTALTINE

CIBA

LAXATIF-ECCOPROTIQUE.

Glucoside pur du *Rhamnus purshiana* agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cc. 1/2).

Indications. — Constipation chronique, formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

Comprimés — Cachets — Ampoules.

Doses. — *Adultes* : 1 à 3 cachets ou comprimés, 1 à 3 ampoules. — *Enfants* : Quart ou demi-dose de l'adulte suivant l'âge. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

Boîte de 20 cachets.

Flacon de 20 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

Boîte de 20 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PERLES FERRO-VITALES ARSENIÉES PERLES FERRO-VITALES NON ARSENIÉES

Complexe ferrugineux sous enveloppe de gélatine soluble.

Indications. — Anémies simples, post-opératoires, palustres, etc. Insuffisance hépatique, Prétuberculose. Troubles dus à la chimiothérapie antigonococcique.

Forme arseniée. **Composition** (par perle) : Forme non arseniée.

0 gr. 05	Glycérophosphate de fer soluble.....	0 gr. 05
0 gr. 01	Glycérophosphate de manganèse soluble.	0 gr. 01
0 gr. 05	Essence de thym.....	0 gr. 05
4/10 de mgr.	Strychnine basique pure.....	4/10 de mgr.
0 gr. 01	Extrait de boldo.....	0 gr. 01
0 gr. 05	Extrait d'artichaut.....	0 gr. 05
0 gr. 01	Méthylarsinate disodique.....	néant

Avantages. — La capsule gélatineuse est toujours soluble. La forme pilule est souvent insoluble. Le manganèse agit comme catalyseur et permet d'utiliser des doses minimales de fer. Les médicaments intestino-hépatiques (Thym, Strychnine, Boldo, Artichaut) aseptisent l'intestin, en augmentent le péristaltisme et favorisent la fonction biliaire.

Mode d'emploi (Pour adultes et enfants de plus de dix ans). Une perle immédiatement avant les deux grands repas (pendant 15 jours de suite).

Prix : 18 francs.

Charles ROCHE *, **, *** Pharmacien de 1^{re} classe,
Ex-Interne lauréat des Hôp. de Lyon. Ex-Pharmacien Major de l'Armée,
2, rue Michelet — ALGER.

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Prix : 14 fr. 95.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PERMYASE

Composition. — Suc désalbuminé et stérilisé de larves de *Lucilia sericata*.

Formes :

PERMYASE LIQUIDE : Ampoules de 5 cc., et de 2 cc., de suc de larves dilué dans du sérum physiologique, résorciné à 1/1 000.

PERMYASE GÉLIFIÉE : Tube de 50 gr. de gelée à base de suc de larves, résorcinée à 1/500.

Indications. — Toutes les suppurations ouvertes, aiguës ou chroniques.

Chirurgie : Pansements post-opératoires dans la chirurgie septique.

Anthrax, furoncles, panaris, abcès divers.

Médecine : Ulcères variqueux, eczéma suintant, brûlures s'accompagnant de sphacèle.

Oto-rhino-laryngologie : Ozène, otites, pansements post-opératoires.

Mode d'emploi. — Applications locales en méchages ou pansements, à renouveler selon les cas deux fois par jour, tous les jours ou tous les deux ou trois jours jusqu'à nettoyage et bourgeonnement de la plaie.

Prix de la boîte de 5 ampoules de 5 cc. : 27 francs.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 21 fr. 50.

Prix du tube : 21 fr. 50.

Laboratoire de l'ENDOPANCINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

PER-OVARIEN CARRION

Composition :

Extrait spécial d'ovaire total, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule.

Forme : Ampoules de 2 cc.

Indications.

Insuffisances ovariennes, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhées.

Posologie et mode d'emploi :

1 ampoule en injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 ou 12 ampoules.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 27 fr. 55.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PERSODINE LUMIÈRE

Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.

Constitution. — Préparation stable à base de Persulfates alcalins purs, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

Propriétés. — Active le métabolisme général, elle crée le besoin de s'alimenter, elle réalise véritablement l'oxygénothérapie interne, par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs.

La **Persodine Lumière** est un apéritif par action secondaire, son mode d'action est profond, il stimule les besoins organiques et ne crée pas seulement l'envie de réplétion gastrique.

Les aliments ingérés avec faim sous l'influence de la **Persodine Lumière**, sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde. Particulièrement précieux chez les tuberculeux.

Indications : Anorexie, Hypo-nutrition.

(Tuberculose, Chloro-Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Neurasthénie, Convalescence, etc.).

Éviter l'usage de la **PERSODINE LUMIÈRE** chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.

Doses courantes. — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

Adultes : 3 comprimés.

Enfants de 8 à 14 ans : 2 comprimés.

Enfants de 2 à 7 ans : 1 comprimé.

Formuler. — Flacon de comprimés de **PERSODINE LUMIÈRE**.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

PER-SURRÉNALIEN CARRION

Composition. — Extrait spécial de surrénale totale, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule, et renfermant 1 mgr. d'Adrénaline (1/2 milligramme par cc.).

Forme. — Ampoules de 2 cc.

Indications. — Insuffisances surrénales aiguës des maladies infectieuses, syndrome secondaire de la diphtérie maligne. Insuffisances surrénales chroniques, maladie d'Addison, asthénie, hypotension artérielle.

Posologie et mode d'emploi. — 1/2 à 1 ampoule à la fois en injection sous-cutanée. Commencer éventuellement avec moins encore, pour tâter la susceptibilité du malade.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 27 fr. 55.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PER-THYMIQUE CARRION

Composition. — Extrait spécial de thymus, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule de 2 cc. et à 2 gr. 50 d'organe par ampoule de 5 cc.

Forme. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

Indications. — Ectopies testiculaires. Troubles de croissance et de nutrition du jeune enfant. (Insuffisance de la première dentition.) Syndrome adiposo-génital, Infantilisme, Certaines Dysménorrhées ou Aménorrhées.

Posologie et mode d'emploi. — 1 injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 à 12 injections.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 27 fr. 55.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 44 fr. 70.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PÉRUBORE (Comprimés)

Inhalations — Gargarismes.

Composition

Chaque comprimé contient :

Baume du Pérou.....	0 03	Borate de soude	0 60
Essences aromatiques	0 025	Bicarbonate de soude.....	0 30

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza, grippe.

Posologie et mode d'emploi. — 1° *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2° *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation : dissoudre 2 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Prix : 15 fr. 50 (8 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). — Tél. Passy 51-12

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

PÉRUSOL

Savon au Baume du Pérou et Benjoin.

Indications. — **Toilette** quotidienne, Soins hygiéniques de la Peau et des Muqueuses.

Dermatoses superficielles (Rougeurs, acné, boutons, gerçures, dartres).

Lavage des régions avant et après application de pommade, crèmes, corps gras.

Savon de choix pour la Toilette des Enfants.

Formes :

Savon de toilette :

Le pain 5 fr. 25.

Savon pour barbe :

Le bâton 5 fr. 25.

Savon liquide : Chirurgie, gynécologie.

Le flacon 17 fr. 50.

Le bidon 32 fr. »

Les Laboratoires du PÉRUSOL

31, rue Gambetta — LA ROCHELLE.

PERVOSINE

Composition. — Extr. stabilisés de marron d'Inde, de gui, de séneçon, Bourse à Pasteur, Bourdaine, Passiflore, Cratægus, Anémone, NaBr.

Sans alcool.

Forme. — Gouttes.

Indications. — Tous les troubles de la circulation du sang aussi bien chez l'homme que chez la femme.

Doses. — XV à XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, trois fois par jour avant chaque repas.

Prix du flacon, réglementé : 16 fr. 50.

Durée du flacon : 15 jours environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
sous le n° 1081-3.

G. BAETZ, Pharmacien,
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 21.)

PHAGOLYSINE

Endotine du professeur Gabrilovitch en élixir composé.

Médication tonique type de toutes les convalescences et de tous les états de déficience organique.

Composition. — Par cuillerée à café : 1/2 mgr. d'endotine ; 1/4 de mgr. d'arsenic ; 5 mgr. de fer assimilable.

Indication majeure. — *Prévention de la bacillose pulmonaire.*

Indications. — Préventif et Curatif des affections pulmonaires, pré tuberculose, anémies, adénopathies, convalescence des chroniques et des surmenés, affections ganglionnaires de l'enfance, croissance, rachitisme, lymphatisme.

Contre-indications. — Période menstruelle, température élevée, formes congestives, hémoptysies, formes trop avancées des affections pulmonaires. Pendant le traitement, éviter les Acidités et les Crudités.

Doses maxima prophylactiques et toniques :

Enfants de 5 à 10 ans : Par demi-cuillerée à café (dans un peu d'eau immédiatement avant les deux repas).

Enfants 10 ans : Par cuillerée à café (dans un peu d'eau immédiatement avant les deux repas).

Jeunes gens, 16 ans : Par cuillerée à dessert (dans un peu d'eau immédiatement avant les deux repas).

Adultes : Par cuillerée à soupe (dans un peu d'eau immédiatement avant les deux repas).

Vieillards, femmes enceintes ou suites de couches :
Par cuillerée à dessert (dans un peu d'eau, avant les deux repas).

Le médecin traitant débutera par de faibles doses ; ces quantités seront progressivement augmentées jusqu'au maxima des doses prophylactiques.

Prix : 24 fr. 50 le grand flacon.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 365-1.

Laboratoires de la PHAGOLYSINE

14, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-27.)

PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoiétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

Formule :

Cacodylate de soude pur	20 centigr.
— de magnésie pur	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique	5 cc.

Indications. — Tuberculose, Prétuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiariisme, Etats cancéreux, Cachexies.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours.

Se vend en boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 fr. 90.

Phagosthyl Infantile pour enfants de 8 à 15 ans.
12 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 55-12.)

PHAGOSTHYL MANGANÉ

(*Pour adultes.*)

(Exempt de strychnine.)

Formule :

Cacodylate de manganèse	2 centigr.
— de soude	10 —
— de magnésie	8 —
— de calcium	10 —
Eau distillée	5 cc.

Indications. — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 fr. 90.

Phagosthyl Mangané Infantile : 12 ampoules de 2 cc.
pour enfants de 8 à 15 ans.

Prix : 16 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, r. de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e). (Tél. : Ség. 55-12.)

PHAGURYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 363-5.

Forme. — Pilules.

Composition. — Santalol β , Essence de Cèdre, Térébenthine, Salicylate de Phényle, Lupulin, Formine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique des voies urinaires, Décongestif, Diurétique.

Indications. — Blennorragie, Rétrécissements, Urétrites, Cystites, Prostatites.

Mode d'emploi. — Six, huit à douze dragées par 24 heures.

L'étui de 80 pilules : 17 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Lab. 62-30.)

PHARYNGASEPTYL

Composition. — Résorcine, Méthylpyrocatechine, Acides borique, salicylique, tartrique, benzoïque, Terpinéol, Cinéol, Myrthol, Pinènes et Polyterpènes purifiés.

Forme. — Poudre.

Indications. — Laryngites, Trachéites, Sinusites, Chordites, Fatigue vocale, Enrouement, Catarrhe tubaire, Stomatites, Pharyngites, Amygdalites, Angines diverses.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, 2 à 4 fois par jour en gargarismes, bains de gorge, fumigations, inhalations, vaporisations, lavages et bain nasal.

Enfants : 1/2 cuillerée à café.

Prix : 17 fr. 20.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

PHARYNGOLÉINE

Composition. — Adrénaline, benzoate de soude, bromure de sodium, analgésine, alcool de menthe, glycérine neutre, eau de laurier cerise.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestive.

Indications. — Toutes affections inflammatoires et microbiennes de la bouche et du carrefour aéro-digestif, stomatites, gingivites, aphtes, muguet, pharyngites, laryngites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau en bains de bouche ou gargarismes, ou en pulvérisations avec un pulvérisateur type Lucas-Championnière.

Pure en badigeonnages.

Présentation et prix. — Un flacon : 17 francs.

**Laboratoires de Thérapeutique
Oto-rhino-laryngologique.**

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Alésia 02-41.)

PHARYNXOL

(Rhinopharynxoil)

Capsules nasales d'huile balsamique

Composition. — Huile végétale diffusible, neutralisée, d'arôme agréable, à base de santalol et de camphre.

Tolérance absolue : aucun élément caustique, irritant ou toxique.

Action. — Lubrifie, décongestionne et déterge, sans les irriter, les muqueuses du nez et de la gorge : grâce à son pouvoir de diffusion, cette huile se répand dans toutes les voies aériennes supérieures ; elle exerce une action particulièrement élective sur les cordes vocales.

Indications. — Coryza, aigu ou chronique. — Maladies du nez, de la gorge, du larynx, de la trachée. — Affections grippales des voies respiratoires supérieures. Protection contre les multiples maladies infectieuses à début rhino-pharyngé et en particulier contre celles du premier âge (Rougeole, scarlatine, etc...). Spécifique rationnel contre l'enrouement.

Mode d'emploi. — Couper préalablement le col de la capsule à sa partie supérieure ; par une légère pression, en verser le contenu dans chaque narine, en prenant soin de renverser la tête en arrière.

Prix : 12 fr. 80.

Formule. — Chaque capsule d'environ 0 gr. 50 contient :

Santalol.....	0 gr. 0036
Camphre.....	0 gr. 0030
Huile végétale aromatisée.....	0 gr. 4934

SPECIALITÉS PHARGÈNE. — VIAL & C^{ie}

Laboratoire de Pharmacologie Générale
8, rue Vivienne — PARIS (11^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

PHÉNA

(Phénaseptyl V. de Christmas.)

Composition. — Phénate de soude, Ac. salicylique, Ac. benzoïque, Menthol, Formol, Ess. aromatiques, dans véhicule spécial glycéro-sodique.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1591-1.

Propriétés. — Puissant Antiseptique, Bactéricide, Analgésique Cicatrisant, Décongestif, Phagocytaire.

Indications. — Dans tous les cas exigeant un puissant antiseptique en Oto-rhino-laryngologie, Stomatologie, Chirurgie, Dermatologie, Gynécologie, Hygiène, etc.

Préventif des maladies d'origine microbienne.

Présentation et mode d'emploi. — PHENA (liquide) : Hygiène, bains de bouche, lotions : X à XX gouttes dans un verre d'eau tiède. Gargarismes, panséments, lavages après extractions dentaires, etc. : 1 cuill. à soupe par litre d'eau bouillie. Injections vaginales : 1 à 2 cuill. à soupe par litre d'eau.

PHENA (ovules) : En pansement gynécologique.

Prix. — PHENA : flacon P. M., 12 fr. 50 ; flacon G. M., 18 fr. 50

PHENA : boîte de 10 ovules, 21 fr.

Littérature et échantillons aux

Laboratoires « PHENA »

Boîte postale N° 5 — LIMOGES (Haute-Vienne).

PHÉNIODINE BOUCHEREAU

Chimiquement : Ethyllodophénate d'Hexaméthylène-amine. Nouveau dérivé aminé iodo-phénolé cristallisé, hydrosoluble, *antiseptique atoxique essentiellement neurotrope.*

Indications. — Utilisation très efficace dans toutes les *affections neuro-vasculaires* de diverses origines, intéressant le système nerveux central et le système neuro-végétatif : Névralgies, grandes Hypertensions, Hémiplegies, Synovites, Accidents secundo-tertiaires, etc.

Forme. — Ampoules dosées à 0 gr. 50 de produit actif par 10 cc., une ampoule tous les jours ou tous les 2 jours, en intramusculaires profondes ou éventuellement en intraveineuses.

Boîte de 6 ampoules 10 cc., public : 45 francs.

Laboratoire de Contrôle N° 1621-5. Dépôt O. C. P.

Laboratoire de Chimie Thérapeutique

P. BOUCHEREAU

Docteur en Pharmacie, Lauréat de la Faculté de Paris.

57, Boulevard A.-Briand — CHAMPIGNY (Seine).
(Tél.: Pompadour 197.)

PHILENTÉROL

Vaccin polyvalent buvable.

Composition. — Association d'une émulsion de colibacilles avec des filtrats : colibacillaire, entérococcique, staphylococcique.

Emploi préventif.

Vaccination pré-opératoire. — Prévient et évite les complications et accidents consécutifs aux interventions chirurgicales, en particulier les phlébites post-opératoires. Grossesses et accouchements.

Huit jours avant l'intervention, prescrire une ampoule par jour pendant les six premiers, et deux par jour pendant les deux derniers.

Après l'opération : 1 ampoule par jour.

Emploi curatif.

Rétablissement de l'équilibre humoral intestinal et des fonctions hépato-rénales et gastriques, antisepsie des voies génito-urinaires.

Indications. — Gastro-entérites, colites, diarrhées, grippe intestinale, syndrome entéro-rénal, appendicites, fièvres typhoïdes. 1 ampoule par jour pendant dix jours. Reprendre la cure si nécessaire après un repos de huit à dix jours.

La boîte de 10 ampoules : 26 fr. 75.

Boîtes de 50 pour MM. les Chirurgiens, les cliniques et hôpitaux.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS. — (Tél. : Auteuil 24-52, 53 et 54.)

PHILODERME YLDRA

Pommade au précipité blanc et au Salol.
Décongestive, Réductrice et Cicatrisante.

Indications. — Streptococcies et Staphylococcies cutanées, Eczémas rebelles, Psoriasis, Dartres, Brûlures, Engelures, Érythèmes, Prurits et Plaies de toute nature.

Contre-indication. — Applications simultanées de produits iodés.

Avantages. — Ni caustique, ni irritant.

Mode d'emploi. — Étendre à l'aide d'une spatule sur une compresse de gaze hydrophile. — En application matin et soir.

Présentation. — En tube de 50 grammes.
Prix : 12 francs.

Laboratoire du Docteur E. ARDELY

20, rue Antoinette — PARIS (XVIII^e).

O. C. P. et C. N. P. F.

(Tél. : Montmartre 02-98.)

PHILOGASTRINE

(Comprimés.)

Traitement dialytique des dyspepsies. Réalise la concentration optima du contenu gastrique. Assure l'évacuation pylorique.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 50.

Composition p. 100 :

Lactobiose	90
Citrate de soude	2
Bicarbonate de soude	8

Emploi. — 2 comprimés dans 125 cc. d'eau tiède 2 heures après le repas, en une fois. Même dose, par gorgées, en cas de douleurs.

Indications. — Toutes dyspepsies.

Action rapide sur douleurs, aigreurs, brûlures, pesanteur, etc... Usage prolongé fait disparaître les troubles sécrétoires.

Prix : 10 francs.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 13-38.)

PHLÉBOCRATYL

Formule établie d'après les Enseignements de M. le Dr Henri Leclerc, ex-président de la Société de Thérapeutique.

Composition. — Extraits aqueux, sans alcool et sans sucre.

Une cuillerée à café contient :

0 gr. 15 d'Hamamélis Virginica.

0 gr. 20 de Polygonum-Hydropiper.

Propriétés. — Régulateur de la circulation veineuse, décongestionnant (très puissant du fait que cette préparation ne contient pas d'alcool) et antihémorragique.

Indications. — Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles de la puberté et de la ménopause, Varicocèle.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, de préférence au milieu des repas, dans un peu d'eau.

Prix, le flacon de 150 cc. : 23 francs.

(Admis aux Assurances Sociales.)

Laboratoires de Phytothérapie Expérimentale

61, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e).

J. LOISEAU, Pharmacien

(Tél. Laborde : 16-15.)

PHLEBOS

Forme. — Dragées et Gouttes.

Composition. — 2 dragées ou XV gouttes correspondent à : Intrait de marron d'Inde Dausse : 0,006. Extrait de Berberis : 0,20. Extrait de Ficaire : 0,20. Extrait de Seneçon : 0,20. Extrait d'anémone : 0,10. Extrait de noix vomique : 0,02.

Actions thérapeutiques. — Vasoconstricteur périphérique énergique, sédatif puissant, régulateur, emménagogue, décongestif, hémostatique et tonique vasculaire.

Indications. — Spécifique des hémorroïdes, varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorragies viscérales et utérines, hémoptysie, Dysménorrhée, Aménorrhée.

Posologie. — XV gouttes ou 2 dragées avant les deux principaux repas.

Prix : 16 francs (dragées et gouttes).

Voir *Suppoalgos*, spécifique des règles douloureuses.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.
(Tél. : Moncey 14-35).

PHLÉBOSINE CARRION

Association de produits opothérapiques et d'extraits végétaux.

Composition :

Phlébosine M. : Thyroïde, Orchitique, Surrénale, Hypophyse, Hamamélis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

Phlébosine F. : Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Hamamélis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Hypotonicité vasculaire.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour au repas. Bien spécifier M. ou F.

Présentation et prix. — Le flacon de 24 comprimés : 21 fr. 85.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PHLÉBOTONINE

Solution d'extraits fluides ou stabilisés agissant sur le cœur (gui, genêt, aubépine) et les vaisseaux (hamamélis, viburnum, cupressus, etc...).

Avantages. — Aucun trouble digestif et aucune toxicité.

Indications. — Troubles circulatoires, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, etc.

Forme. — Liquide, flacon de 125 cc. pour un traitement de 10 à 12 jours.

Dose. — 1 cuillerée à café avant chaque repas.

G. MARTINIE, Pharmacien

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

R. C. Seine 440-107.

(Tél. : Roquette 86-84.)

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1122-6.

PHLOXIODE

Composition et propriétés thérapeutiques. — Solution huileuse à base :

1° *D'iode spécial*, correspondant à quelques milligrammes par cc.

2° *Xylol* (0,02 par cc.) qui provoque une leucopénie légère, aboutit à un rajeunissement leucocytaire, au réveil des réactions d'activité, entretenus et exaltés par l'iode à dose homéopathique.

3° *Camphre* (0,10 par cc.) qui agit comme toni-cardiaque et avec :

4° *L'Eugénoï* (0,03 par cc.) comme anti-thermique et antiseptique.

Indications. — S'adresse à tous les états infectieux. Médication d'allure spécifique dans les infections grippales, typhiques, *pneumonococciques*, (broncho-pneumonies, pneumonies).

Condition du succès. — La mise en train immédiate du traitement : *frapper vite et fort*.

Posologie. — *Cas légers, moyens* : 1 ampoule par injection. *Cas grave, désespérés* : 2 ampoules par injection. Tous les jours, au besoin matin et soir jusqu'à la chute de la température. Dans les cas graves et rebelles, *quel que soit l'âge et quelle que soit l'infection*, ne pas hésiter à employer d'emblée la dose de 2 ampoules.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs pour un traitement de 5 à 10 jours.

Laboratoires G. GAIZARD

94, rue Michelet — ALGER — Tél. : 81-56.

PHONODIOSE

Composition. — Le phonodiose est un composé d'iode et d'un naphthène sélectionné, dosé à 1 gr. d'iode pour 1. 000. Le phonodiose est délivré en ampoules de 5 cc.

Propriétés. — Cette nouvelle combinaison permet d'utiliser les propriétés bactéricides de l'iode sans avoir à redouter la corrosivité qui jusqu'ici en rendait l'emploi malaisé. Aux effets thérapeutiques de l'iode s'ajoute l'action lénitive, adoucissante, protectrice du naphthène. Aussi, obtiendra-t-on des résultats remarquables dans toutes les affections des tissus superficiels, dans le cas d'inflammation ou d'infection de la peau ou des muqueuses, que ce soit en oto-rhino-laryngologie, en gynécologie, en urologie, en dermatologie, en petite chirurgie, etc.

Posologie. — Le phonodiose s'applique sur toutes les parties faciles à atteindre à l'aide d'un tampon de coton ou, de préférence, à l'aide de l'atomiseur L. G. de la Sté des Atomiseurs 42, rue Beaumarchais, MONTREUIL (Seine).

Lorsque le traitement doit être appliqué sur des points difficilement accessibles, il est indispensable de se servir des appareils spéciaux, créés pour cet usage, dénommés les atomiseurs médicaux.

Les applications se font, alors, par des pulvérisations très fines sur les tissus malades, répétées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Oto-Rhino-Laryngologie : Sinusites, otites, coryzas, laryngites, angines... — **Phthisiologie :** Trachéites, bronchites, asthme...

Gynécologie : Endométrites, métrites cervicales, bartholinites...

Urologie : Urétrites et prostatites blennorragiques.

Dermatologie : Psoriasis, acnés, impétigo et toutes affections du derme.

Petite Chirurgie : Phlegmons, anthrax, furonculoses, plaies variqueuses, etc... et toutes plaies infectées.

LABORATOIRES F. LATOUR

71, rue Douy-Deloque — MONTREUIL-s-BOIS(Seine), Tél. : Avron 32-53.

PHOSBIOSE (Codex)

Sel magnésien calcique de l'acide hexa-phosphorique naturel.

Produit naturel retiré des céréales, le plus riche en magnésium des phosphates organiques végétaux : 11 p. 100.

Se dissout dans le suc gastrique.

Contient 20 p. 100 environ de phosphore, associé intimement aux ions magnésium et calcium en une molécule organique complexe, dans des proportions sensiblement les mêmes que dans les céréales à l'état vivant.

Indications. — Troubles de la croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Anémies, Neurasthénie, Tuberculose, Néoplasmes, Convalescences longues et difficiles, Grossesse, Allaitement.

Présentation :

Granulé : la 1/2 boîte, 10 fr. 65; la grande boîte, 19 francs.

Cachet : dosés à 0 gr. 50, la boîte de 24 cachets : 15 francs.

Comprimés : dosés à 0 gr. 25, la boîte de 50 comprimés : 16 francs.

Poudre pure : le flacon de 30 gr. : 26 fr. 65.

Posologie. — **Poudre** (formules magistrales) : 0 gr. 50 à 2 gr. par jour ou 2 à 8 mesures de 0 gr. 25.

Comprimés { *Enfants* : 2 à 4 par jour.
 Adultes : 4 à 8 par jour.

Cachets : 2 à 4 par jour.

Granulés { *Bébés* : demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

Enfants : 2 Cuillerées à café par jour.

Adultes : 4 cuillerées à café par jour.

Se prend de préférence avant les repas.

Laboratoires BOYER et Cie

12, rue Pavée — PARIS.

PHOSCAMINE

**Granulé recalcifant hématogène,
Activateur de la nutrition.**

Principes actifs. — Glycérophosphates de chaux, magnésie, fer et manganèse. Méthylarsinate de soude, acides aminés provenant de l'hydrolyse des hématies.

Indications. — Anémie, Convalescence, Tuberculose, Néoplasmes, Dyspepsie, Retard de développement et de croissance.

Doses :

Adultes : 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 14 fr. 95.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine).
(Tél. : Grésillons 05-21.)

PHOSMA

Puissant reconstituant général

Composition :

Acide phosphorique off.....	1 gr.
Chlorure de magnésium pur.....	1,20
Teinture de noix vomique.....	0,05
Teinture de cannelle.....	0,50
Teinture d'écorce d'oranges amères.....	1 gr.
Carbonate de lithine.....	0,005

Pour 100 gr.

Indications thérapeutiques. — Anémie, Asthénie, Chlorose, Surmenage, Croissance, Convalescence, Inappétence, Stimulant du Système nerveux.

Avantages. — Bien toléré par les hépatiques et les tuberculeux. Saveur très agréable.

Présentation. — Forme Elixir, flacon de 310 cc., de 10 à 20 jours de traitement. Prix : 18 fr. 70.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe avant ou pendant les repas, pur ou coupé d'eau.
Enfants (à partir de 5 ans) : 1 à 2 cuillerées à café avant ou pendant les repas, coupé d'eau.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires PHOSMA

Marcel FREMONT, Docteur en médecine de la Faculté de Bordeaux. — Pharmacien de première classe,
143, Cours de la Somme. — BORDEAUX.

PHOSOL

(Forme Élixir et forme Granulé)

PHOSOL ÉLIXIR

Composition. — Acide phosphorique officinal, Glycérophosphate de soude, Teinture de noix vomique, Extrait de ratanhia, Phosphate bicalcique, Vin kola muscat, Excip.

Indications. — Suralimentation, convalescence, croissance et anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — Dans un grand verre d'eau ou de vin : 2 cuillerées à soupe par jour pour les adultes ; pour les enfants 2 cuillerées à café. A ne pas donner aux enfants au-dessous de 9 ans.

PHOSOL GRANULÉ

Composition. — Sulfate manganèse, Acide phosphorique, Hypophosphite de chaux, Extrait quinquina, Extrait kola, Alc. oranges douces, Cacao, sucre vanillé.

Indications. — Suralimentation, convalescence, anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à dessert à chaque repas.
Enfants : 1 cuillerée à café à chaque repas.

Prix : Élixir 16 francs.

Granulé 15 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Laboratoire QUINET

143, rue du Temple — PARIS. (Tél. : Archives 42-27.)

PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, pré tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour. S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Prix :

1 cc. : 18 fr. 15 — 2 cc. : 21 fr. 30 — 3 cc. : 23 fr. 45.

Supp. : 18.15.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI°).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PHOSPHAN CADUCIA

Acidifiant. Sthénique. Recalcifiant.

Première utilisation des acides organiques mono et diméthylphosphoriques.

En solution stable et contrôlée par une nouvelle technique de dosage. (*Bulletin de la Société Chimique*, t. XIX, 1898, page 383 ; *Journal de Pharmacie et de Chimie*, 8^e série, t. XX, 1934, pages 160 à 167.)

Formule :

Acide diméthylphosphorique.....	2,11 p. 100
Méthylphosphate acide de calcium.....	2,90 —
Phosphate diacide de calcium.....	0,49 —
	<hr/>
	5,50 p. 100

Forme. — Solution.

Avantages :

- Teneur la plus élevée en principe actif : concentration 5,50 p. 100, soit 0 gr. 75 d'acide organique libre par cuiller à soupe.
- Tolérance parfaite pour les muqueuses digestives.
- Utilisation de l'Ion calcium ne pouvant se fixer dans les tissus qu'en combinaison phosphorique.
- Action tonique immédiate.

Indications thérapeutiques :

- 1° *Toutes les asthénies* : musculaires, nerveuses et psychiques.
- 2° *Tous les états de déminéralisation* : phosphaturie, grossesse, pré tuberculose et tuberculose.
- 3° *Tous les états alcalosiques.*
- 4° *Rhumatisme, dyspepsies, asthme, diabète.*
- 5° *Coli-Bacillose et syndrome entéro-rénal.*

Posologie :

Une semaine de traitement alternée avec une semaine de repos.

Adultes : 2 cuillerées à dessert ou à soupe par jour. Chaque cuillerée consommée midi et soir, au cours du repas, dans un grand verre d'eau rougie ou sucrée.

Enfants : Demi-doses.

Prix : 22 fr. 90.

1 flacon pour 2 semaines de traitement.

Laboratoires CADUCIA

Y. Jund, pharmacien.

95, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 90-60.)

PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarséniée organique combinée à la strychnine. Correspondant à 2 mgr. cacodylate de strychnine et 15 cgr. glycérophosphate par tablette.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser la dose de 8 comprimés par jour.*

Prix en France : 15 fr. 60 la boîte.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU

Docteur en Pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

PHOSPHATE DE CHAUX DU DOCTEUR PINARD

Phosphate tricalcique extrait directement des os en particules infinitésimales en suspension dans un liquide isotonique.

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage.

Enfants et Nourrissons : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Prix : 15 francs le flacon pour 10 jours de traitement.

PHOSPHATE DE CHAUX RRADIÉ DU DOCTEUR PINARD

Phosphate de Chaux simple du Docteur Pinard et « Vitamine D » cristallisée.

(750 unités internationales par cuillerée à potage)

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées potage. *Adolescents :* 2 cuillerées à dessert. *Enfants :* 2 cuillerées à café.

Prix : 20 fr. 80 le flacon pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis — COURBEVOIE-PARIS (Seine).

(Tél. : Défense 02-69.)

PHOSPHIGEM

Réalise sous forme de granulés fondants d'un goût très agréable, en combinaison stable et inaltérable, la formule de Joulie :

Acide orthophosphorique	50 gr.
Phosphate acide de soude.....	100 —
Granulés fondants, Q. S.....	1 000 —

Propriétés et indications. — Tonique général et nerveux, reminéralisateur, correcteur des troubles de la nutrition, le Phosphigem est indiqué dans :

Neurasthénie, Impuissance, Anémie, Anorexie, Convalescence, Déminéralisation, Etats Alcalosiques et leurs manifestations : Dermatoses, Rhumatisme chronique, Dyspepsies, Phosphaturie, Lithiase phosphaturique, Congestion hépatique.

Présentation. — Granulés d'un goût exquis, en boîte métal. (150 gr. environ)

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe après les repas.

Enfants et vieillards : 1/2 dose.

Innocuité absolue, aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 1244-4.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}). (Tél. : Central 01-35.)

PHOSPHOBIASE LANDON

Composition. — Acide phosphorique, phosphate de soude, jus de raisin concentré et sucré. Combinaison particulièrement agréable au goût. Une cuillerée à soupe du médicament contient 1 gr. acide phosphorique et 2 gr. phosphate de soude.

Propriétés. — Tonique général. Correcteur des états d'alcalose.

Indications. — Asthénie, Surmenage, Déminéralisation, Troubles de la croissance, Alcalose, Colibacillose.

Posologie. — *Adultes* : une cuillerée à soupe ou deux à chaque repas.

Enfants : une à trois cuillerées à café à chaque repas.

Mode d'emploi. — Le médicament ne doit pas être absorbé pur, mais dilué dans un verre d'eau qui sera pris au cours du repas.

Prix au public :

Le flacon P. M. : 17 fr. 50.

Le flacon G. M. : 27 fr. 50.

La *Phosphobiase* se fait également en *granulé* au prix de 17 fr. 50 le flacon.

Laboratoire Central de CHATEL-GUYON

M. LANDON, Pharmacien

CHATEL-GUYON (Puy-de-Dôme).

PHOSPHOBIOL

Forme. — Solution aromatisée au sirop de curaçao et de citron.

Formule. — Une cuillerée à café contient :

Chlorh. quinine	0,05
Hypoph. de Manganèse	0,05
Hypoph. de chaux	0,05
Citrate de fer	0,025
Sulf. de strychnine	0,001

Propriétés thérapeutiques. — Puissant reconstituant général, Accélérateur de la nutrition. Favorise l'augmentation de poids et provoque l'appétit.

Indications. — Toutes dépressions organiques : Croissance, Anémies, Surmenage, Neurasthénie, Convalescences, etc...

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau deux fois par jour avant les repas.

Prix : 18 fr. 25. — Durée du traitement : 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. GUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

PHOSPHOBROM

Composition. — Bromure, Phosphate, Citrate alcalin.

Forme. — Granulé fondant soluble, de goût agréable.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Prix : 15 fr. 25.

Laboratoire SERINDAT

4, rue Lecomte-de-Nouy — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 53-48.)

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

Dose et mode d'emploi. — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 3 à 10 ans : 1/2 dose.

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; enfants 1/2 dose. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 fr. 80.

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

Pharmacie SEQUIN

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

PHOSPHOGAIACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques assimilables, avec addition de sulfogaiacolate de potasse et de nucléinate de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

Prix : 18 francs.

Laboratoire

du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

PHOSPHOLÉOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue. Reconstituant physiologique, de goût agréable.

Composition. — **Phospholéose A** : Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique).

Phospholéose B : même composition, mais sans arsenic.

Indications. — Lymphatisme, prétuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescences.

Présentation. — Une seule forme : liquide.

Posologie. — De 3 ans à 6 ans : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas. Au-dessus de cet âge : une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

Phospholéose C : Traitement arséno-mercuriel dissimulé associé à l'iode.

Composition. — Une cuillerée à soupe de **Phospholéose C** contient : 0,01 cgr de Hg + 0,01 cgr. de As + 0,50 cgr. d'iode + 0,10 cgr. de phosphate.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants* : par cuillerées à café.

Prix : **Phospholéose A et B** : 17 fr. 10. **Phospholéose C** : 19 fr. 20.

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

PHOSPHONEUROL

Un polyphosphate phosphorique
sans excipient ni alcaloïde.

Formule :

Acide phosphorique officinal	22,50
Phosphate de soude	45,00
Biphosphate de chaux	22,50
Glycérophosphate magnésie	10,00
	<hr/> 100 gr.

1° Par sa richesse en acide phosphorique et phosphate de sodium :

Phosphoneurol est donc indiqué :

a. Dans tous les cas de déperdition phosphatée.

Fatigue, surmenage, surtout avec insomnie.

Amaigrissement.

Convalescence de maladies infectieuses ou d'actes opératoires, **Etats de dépression nerveuse** (Neurasthénie, Psychasthénie, etc.)

b. Dans l'arthritisme, les rhumatismes subaigus ou chroniques.

c. Dans toutes les dyspepsies.

d. Dans la **colibacillose**, comme adjuvant de l'urotropine.

2° Par son phosphate de calcium :

a. Dans les **troubles de l'ossification** (croissance, rachitisme).

b. Dans la cure de la tuberculose en général.

3° Par son phosphate de magnésium :

Dans la cure et la prophylaxie des tumeurs malignes.

Présentation. — Une seule forme : **Gouttes.**

Posologie : { *Adultes* : XV à XXX gouttes.
 { *Adolescents* : X à XX gouttes.
 { *Enfants* : V à X gouttes.

A prendre à l'un des principaux repas (de préférence à celui de midi), dans un verre d'eau sucrée ou de boisson.

Prix : Le flacon (traitement pour un mois) 20 fr.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-07.)

PHOSPHONINE SOULIÉ

(Solution et Gouttes.)

Composition. — Acide Phosphorique. Biphosphate de Chaux mielleux. Phosphate de Soude.

Indications. — Tonique de la cellule nerveuse centrale et périphérique, régulateur du système sympathico-glandulaire.

Asthénies, Surmenages physique et intellectuel, Convalescences, Anorexies.

Posologie :

Adultes (Prescrire **Solution**) : 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des 2 grands repas.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose suivant l'âge.

Nourrissons (Prescrire **Gouttes**) : 1 goutte par mois d'âge, 2 fois par jour dans un peu d'eau ou dans le lait des biberons.

Laboratoire COLONIAL

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Ségur 77-70.)

PHOSPHOPINAL JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

Indications. — *Reminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Fixateur des sels de chaux. — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

Formes et doses moyennes.

Capsules : adultes : 4 à 6 par jour.	{	Contenance du flacon : 50 capsules.
enfants : 2 à 3 par jour.		

Élixir : adultes : 2 cuil. à café par j.	{	Contenance du flacon : 90 grammes.
enfants : 1 cuil. à café par j.		

Gouttes : adultes : 40 à 60 par jour.	{	Contenance du flacon : 40 grammes.
enfants : 20 à 30 par jour.		

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

LE PHOSPHOPINAL JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Prix : 17 francs.

Laboratoires JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Marcadet 37-98.)

PHOSPHOSODINE

*Médicament des troubles de la Digestion et de la Nutrition.
Tonique général et nerveux*

Composition :

Cephælis Ipécacuanha Tre. Rac.	4
Croton Eluthéria Teint. Ec.	10
Ac. ortho-phosphorique off.	15
Phosphate disodique pur.	30
Excipient hydro-glycériné.	Q. S. P. 100 cc.

Indications. — Dyspepsie hypochlorhydrique, Atonie gastrique, Fermentations anormales, Lithiases, Phosphaturie, Oxaluries, Colibacilloses, Rhumatismes chroniques, Etats alcalosiques, Dermatoses, Neurasthénie, Fatigue, Convalescences, Etc...

Forme. — Solution concentrée. Le flacon : 17 fr.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un verre de boisson, à boire en mangeant, midi et soir (sauf indication contraire du médecin).

Remarque : Chaque dose doit être prise au cours du repas, diluée dans un grand verre d'eau ou de boisson, sucrée au besoin.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

Dépôt général :

Laboratoire BORDELAIS

47, rue Maleret — BORDEAUX.

PHOSTHÉNINE LINDEUX

Forme. — Gouttes concentrées en flacon compte-gouttes.

Composition. — Acide-éther monoéthylorthophosphorique pur, surrénales, hypophyse.

XXX gouttes représentent 0 gr. 50 d'acide orthophosphorique sous la forme la plus assimilable et la plus douce à la muqueuse gastrique (ac. monoéthyl exempt de diéthyl), 0.05 de surrénales et 0.01 d'hypophyse.

Indications. — Toutes celles de l'ac. phosphorique associé aux extraits d'hypophyse et de surrénales. Anémie cérébrale, neurasthénie, surmenage, dépression nerveuse des diabétiques et des entéritiques, convalescences des maladies fébriles (grippe, etc...), phosphaturie, tuberculose, états dyspeptiques, azotémie, colibacillose, alcalose, sclérose, rhumatisme chronique.

Chez la femme, dans la lassitude anormale aux époques de la formation et de la ménopause, pendant la grossesse et après l'accouchement.

Chez l'enfant, dans l'Enurésie et pour remédier aux perturbations du développement et de la croissance, en même temps qu'aux états languissants et apathiques.

Posologie. — 1° *Adultes* (au-dessus de 16 ans) : XXX à XL gouttes dans un verre d'eau, aux repas, 2 à 3 fois par jour ;

2° *Enfants* (au-dessous de 16 ans) : II gouttes par année d'âge, 2 fois par jour.

Laboratoires LINDEUX

7, avenue des Marronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

PHOSTYL PY

Composition. — Acide Phosphorique pur ; Méthylarsinate de Strychnine ; Manganèse.

Propriétés. — Augmente le nombre et enrichit les globules rouges par fixation de Fer. Donne le coup de fouet nécessaire à la remise en route et fixe cet effet par son action tonique et reminéralisante. L'acide phosphorique est l'antidyspeptique de choix chez de nombreux hypo et hyperchlorhydriques (Joulie).

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies ; Dépression ; Surmenage intellectuel ; Convalescence (grippe) ; Anorexie ; Dénutrition des tuberculeux ; Hypoacidité urinaire.

Posologie :

Adultes	XXV	gouttes	midi	et	soir.
12 à 18 ans	XV	—	—	—	—
6 à 12 ans	VI	—	—	—	—

Dans le premier verre de boisson aux repas ; *goût agréable.*

Prescrire : PHOSTYL PY : 1 flacon.

Prix : 15 francs ; durée moyenne : 15 à 18 jours.


Laboratoire PY

58, bd Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Lon. 01-13.)

PHYLLA

Chlorophylle pure solubilisée.

Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé *et solubilisé*, est actif et assimilable, contrairement à la chlorophylle des légumes verts, crus ou  cuits.

Indications :

Anémies pernicieuses, anémies post-hémorragiques.

Anémies néoplasiques. — (La chlorophylle relève le taux de l'hémoglobine et active les effets de l'opothérapie hépatique.)

Anorexies des nourrissons. — *Anorexies des tuberculeux* — (La chlorophylle augmente l'appétit sans altérer la muqueuse gastrique.)

Asthénies — *Surmenage* — *Convalescences* (tonique dépourvu de toute toxicité).

Hypotensions artérielles (idiopathique, permanente, symptomatique).

Acrocyanoses (adynamie circulatoire).

Adynamie des Cancéreux et des Tuberculeux.

Hypotrophies — *Rachitisme* — *Carences solaires.* [La chlorophylle sensibilise l'organisme aux radiations (X et U. V.) et à l'action des médicaments irradiés].

Posologie :

XX à XXX gouttes avant les trois repas, 15 jours par mois.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales à 80 %.

Société d'Applications Pharmacodynamiques.

39, Bd. de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Invalides 43-60.)

PHYSIOSCYAMINE

Médication du vague et du sympathique.

Composition. — Combinaison définie d'atropine, d'hyoscyamine et d'ésérine activée par la présence de pepsine spécialement préparée, unie à un excipient approprié.

Indications. — Troubles nerveux ressortissants à la dyspepsie hyperchlorhydrique, à la dilatation et à la ptose gastrique, tel que : vertiges, congestions postprandiales, migraines gastriques, palpitations de cœur d'origine digestive, tremblements, somnolence, bâillements, constipation d'origine sympathique, etc...

Posologie. — Un cachet 10 à 15 minutes avant les trois repas.

Présentation. — Boîte de 30 cachets. Prix de la boîte : 16 francs.

Dépôt général :

Laboratoires BORDELAIS

47, rue Maleret — BORDEAUX. — (Tél. : 843-22.)

PHYTINE

Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie.

CIBA

TONIQUE, RECONSTITUANT, DYNAMOGÉNIQUE.

Phosphore organique végétal 22 p. 100.

Calcium 12 p. 100. Magnésium 1,50 p. 100.

Préparation phosphorée extraite des graines végétales. Le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés.

Indications. — Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Doses. — *Adultes* : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé, 4 à 8 comprimés. *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

Boîte de 20 cachets.

Flacon de 40 comprimés.

Flacon de granulé.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PHYTOCUPRINE

Composition. — Association de chlorophylle, sulfate de cuivre et hexainosito-phosphate de calcium et de magnésium.

Indications. — Thérapeutique anti-anémique. Maladies du sang et toutes les complications consécutives à l'hypoglobulie et à l'homoglobinémie. Maladies de la nutrition.

Présentation. — Dragées, ampoules buvables.

Posologie :

Dose moyenne : 6 dragées par 24 heures.

Cas graves : 9 dragées par jour, 3 avant chaque repas.

Prix : 20 francs le tube.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5 bis, rue Pajou — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jas. 54-52.)

PHYTOGÉNOL GRANULÉ

Spécifique des maladies de la Nutrition.

Formule (par 100 gr. de granulé entièrement soluble). — Méthylarsinate disodique : 0 gr. 20 ; Nucléinate de Manganèse : 0 gr. 25 ; Végé-phos (Hexa-inosito-phosphate de Calcium et de Magnésium) : 2 gr. 50 ; Hémoglobine crist. : 5 gr. ; Lipoides spléniques : 0 gr. 80 ; Extrait de glandes interstitielles : 1 gr. 25 ; Extrait mou de Kola : 2 gr. 50.

Indications thérapeutiques :

Toutes formes de fatigue : surmenage, asthénie nerveuse, dépression physique et intellectuelle.

Usure organique : sénilité, ralentissement fonctionnel des glandes vitales.

Troubles de croissance : rachitisme, chlorose, anémie.

Troubles de ménopause : psychoses génitales qui accompagnent la période cataméniale. Pré tuberculose, déminéralisation, fractures, caries osseuse et dentaire. Grossesse. Convalescences post-hémorragiques et infectieuses.

Doses journalières :

Adultes : 1 cuillerée à dessert, pur ou dissous dans de l'eau au début des 3 repas. *Enfants (4 à 8 ans) :* 1/2 cuillerée à café.

Jeunes gens (8 à 16 ans) : 1 cuillerée à café aux mêmes heures.

Prix : 16 fr. 50. — Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires F. MARIOTTE, 15, rue Pasteur — BOURG (Ain).

Dépôt : O. C. P., C. N. P. F. et toutes drogueries.

N. B. — Peut être prescrit pour les A. S. Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1637-1.

PHYTOGYL

Granulé reminéralisateur.

Vitamine D cristallisée chimiquement pure, associée à la Germiné (phosphore, chaux, magnésium), d'origine végétale et assimilable.

Indications. — Toutes décalcifications : anémies, convalescence, surmenage, dépressions nerveuses, états ganglionnaires, pré-tuberculose. Stimulant de la nutrition.

Présentation. — Granulé fondant au premier contact avec la muqueuse buccale, en flacon de 125 cc.

Une cuillerée à café contient 1/5 de mgr. de Vitamine D cristallisée et 10 cgr. de Germiné.

Doses journalières.

De la naissance à 1 an : jusqu'à 1 cuillerée à café.

De 1 à 10 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : 2 à 3 cuillerées à café.

La cure peut être continuée pendant 2 ou 3 mois ; si elle a été interrompue, elle peut ensuite être reprise sans aucun inconvénient.

Prix au public : Le flacon 18 fr. 70.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

PHYTOJAVA

Composition. — Extrait de *Temoæ Lawaq* (*Curcuma xanthorrhiza*) associé à l'*Orthosiphon stamineus* (plantes originaires de Java).

Indications. — Le *Temoæ Lawaq*, cholérétique, augmente la sécrétion de la bile sans provoquer de spasmes ni de coliques.

L'*Orthosiphon* diurétique hépato-rénal favorise l'excrétion de l'urée et des chlorures.

(D^r Leclerc, *Presse médicale*, 9 nov. 1935 ; *Courrier médical*, 30 mai 1935 ; *J^{al} Méd. et Chir. pratiques* mars 1937.)

(D^r Decaux, *Presse médicale*, 22 mai 1935 ; *Communication Société thérapeutique*, janv. 1936.)

Ictères, Cholécystites, Congestion du foie, Cholestérinémie.

Formes. — Comprimés dragéifiés. Gouttes.

Posologie. — 1 à 2 comprimés avant chaque repas. X à XXX gouttes avant chaque repas.

Enfants : gouttes 1/2 dose.

Prix : 16 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PHYTO-KOLA

Toni-stimulant complet. Association de phosphore organique d'origine végétale Hexa-inositol phosphate de calcium et de magnésium, *Suractivée* par les Noix fraîches de Kola.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Réminéralisateur, excitant puissant du métabolisme, Stimulant de l'activité cérébrale, donnant des résultats rapides et très constants, dans toutes les déficiences organiques, toutes les convalescences : médicales, chirurgicales, obstétricales.

Toutes les dépressions : Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

Présentation. — Boîte de 60 comprimés en trois tubes.

Posologie. — Croquer 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 1/2 dose.

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1244-2.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 01-35.)

PHYTOLAX

Laxatif-cholagogue végétal.

Stimulant des fonctions hépatiques et intestinales. A base d'extraits de végétaux, rigoureusement exempt de phénolphtaléine et de laxatifs chimiques.

Composition. — Artichaut, Cascara, Podophylle, Bourdaine, Hydroxyde d'alumine colloïdal.

Avantages. — Evacuation rapide et totale sans colique et sans irritation surajoutée.

Apport d'hydroxyde d'alumine colloïdal qui tapisse la muqueuse sensible d'un véritable pansement mucilagineux doux et protecteur.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par 24 heures pris *ad libitum*.

Prix : 9 fr. 05

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Synergie opothérapique et minérale : lipoides spléniques, poudres de thymus, moelle osseuse rouge, surrénales, parathyroïdes, d'os frais, Nucléinate de fer et de manganèse, composé phosphoré organique végétal et Vitamine A stabilisée.

Propriétés. — A tous les âges relève le tonus neuro-végétatif, active les échanges, reminéralise, favorise la croissance staturale et pondérale.

Indications. — Asthénies, Allaitement, Amaigrissement, Anorexie, Convalescences, Croissance, Déminéralisation, Dentition, Grossesse, Fractures, Rachitisme et pré-rachitisme, Spasmophilie.

Présentation. — En granulés aromatisés (150 grammes) et en dragées également aromatisées (50 dragées).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (Fac. Pharm.) sous les nos 82-7 et 82-8.

Posologie. — Prescrire avant ou au cours de deux repas journaliers

Nourrissons : 1 cuiller à café de granulé.

Enfants : 2 cuillers à café de granulé ou 2 dragées.

Adolescents et adultes : 3 cuillers à café de granulé ou 3 dragées.

Prix : 18 francs.

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie.

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3°).

(Tél. : Archives 83-52.)

PHYTOTHÉRAPIE COLONIALE

Thé Malgache ou Voafotsi : toutes les affections du foie.

Thé Bourbon : Angrecum fragans ou Faham : indigestions dues à maladie fébrile, Vomissements des femmes enceintes.

Uvarion : Mélange de Uvaria et maté, en macération pour vin neurotonique et apéritif.

Aphilex : association de Aphloia, combretum, angrecum fragans et ilex paraguayensis : mauvaises digestions, ictères, fièvres.

Littérature et échantillons :

Angelini, Pharmacien de la Faculté de Paris.

61, rue de Seine — PARIS.

(Tél. : Dan. 92-73.)

PHYTOVEINOL

(Gouttes.)

Formule entièrement originale, exclusivement végétale, très bien supportée par les voies digestives.

Composition. — Ficaire (vaso-constricteur), Berbéris (veino-tonique), Millefeuille (astringent), Gossypium (décongestionnant).

Indications. — Insuffisance veineuse dans ses diverses manifestations, Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Etats congestifs de la ménopause.

Mode d'emploi :

XXV gouttes au début des deux principaux repas.

Traitement d'entretien : 20 jours par mois (soit un flacon).

Prix : 16 fr. 65.

Suspendre cette médication au moment des règles.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie,
Successeur.

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 12-35.)

PHYTO-VITAMINES PLÉ

Solution non huileuse des vitamines A et D étalonnées à l'état *colloïdal* associées aux vitamines B, à la chlorophylle pure, soluble, d'action vitaminique semblable à la vitamine C, et aux acides aminés.

Propriétés. — Haute activité vitaminique en synergie. Aucune toxicité. Est miscible directement à l'eau. Saveur agréable.

Indications. — A titre prophylactique : chez les enfants en fin d'hiver et au printemps, régimes alimentaires, femmes enceintes et allaitantes, nourrissons ; à titre curatif : comme adjuvant aux traitements anti-infectieux, le lymphatisme, les anémies, états ganglionnaires, chez les prématurés et les athrepsiques ou hypotrophiques, les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Présentation. — Liquide aqueux d'emploi aisé avec son « Compte-gouttes Doseur ». Une dose = XX gouttes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 82-9.

Posologie : Avant les deux repas :

Nourrissons : 1 dose. Enfants : 2 doses. Adolescents et Adultes : 3 doses.

Prix : 16 fr. 50.

Littérature et échantillons aux

Laboratoires J. PLÉ, Docteur en Pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3^e).

(Tél. : Archives 83-52.)

PICRICOL

Réparateur des tissus.

Antiseptique, Kératoplastique, Lénifiant.

Composition. — Acide Picrique (0 gr. 06 par c.), Sulfate de Zinc-Amidon.

En comprimés parfumés, très solubles (usage externe).

Indications. — Cicatrisation des plaies et muqueuses.

Plaies chirurgicales. — Lavages, pansements, 2 à 3 comprimés par litre.

Gynécologie. — Hygiène et traitement des affections vaginales, Vulvite, Infections gonococciques, Pertes blanches, Sécrétions fétides, Métrites du col avec ou sans ulcérations, Métrites en général, Salpingites, Ovarites.

Injectons (4 à 5 comprimés pour 2 litres d'eau.)

Plaies accidentelles. — Coupures douloureuses et souillées, brûlures (2 à 4 comprimés par litre).

Gargarismes antiseptiques et cicatrisants.

Emploi. — Faire dissoudre les comprimés dans l'eau bouillie chaude, utiliser la solution atténuée.

Pas de réactions douloureuses. — Pas d'irritations.

Action sédative très réelle.

Remarque. — Le borax fait disparaître facilement les taches de Picricol,

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63).

PILULES DU D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 20, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée et boldine.

Ne renfermant aucun drastique ni laxatif.

Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Durée moyenne : 25 jours.

Le flacon de 100 pilules : 17 francs.

— 50 — : 9 fr. 35.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PILULES DU D^r MOUSTIER

Formule :

Digitale stabilisée.....	0 gr. 05
Scille stabilisée.....	0 gr. 05
Scammonée d'Alep.....	0 gr. 05
Gentiane pulvérisée.....	0 gr. 02
par pilule.	

Indications :

Toutes les *affections cardiaques* pour lesquelles la digitale est recommandée : asystolie, accidents gravido-cardiaques, œdèmes dus à l'insuffisance cardiaque.
Toutes les contre-indications de la digitale.

Présentation :

Originale : sous forme de *grain de café sucré*, rendant son emploi commode et agréable, *inaltérable* de par sa fabrication ; enrobage dragéifié, de conservation indéfinie.

Posologie, durée du traitement : 1 ou 2 pilules matin et soir, suivant les cas, **10 ou 15 jours par mois**.

Prix de vente au public : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires du D^r MOUSTIER,
SAINT-VALLIER (Drôme).

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée, protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du D^r E. PARIZOT) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires LACROIX

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Nord 54-57.)

PILULES LEMARY

Ces pilules kératinisées suivant le procédé du D^r Henri Philippe constituent un traitement mercuriel discret très tolérable et efficace.

Indications. — Traitement d'entretien (malades éloignés des centres médicaux) très utile pour le praticien dans les affections douteuses ou réelles d'origine spécifique (cœur, yeux, système nerveux), pour les organismes usés supportant mal les traitements d'attaque.

Formule A. — Dupuytren du Codex. Bichlorure de mercure à 0,01 cgr. : 17 fr.

Formule B. — Ricord du Codex. Iodure mercurieux à 0,05 cgr. : 17 fr.

Formule C. — Bi-iodure Hg 0,005 mgr. et Ki à 0,25 cgr. (formule de Gibert) : 19 fr.

A et B : 2 à 4 pilules par jour.

C : 2 pilules par jour (avant chaque repas).

Le flacon porte une étiquette discrète.

Produits du Docteur Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PILULES MYOSOTIS

Molles

Composition :

Bichlorure de Hg	0,005
Poudre d'opium	0,005
Poudre fraîche de coca	0,15
Extrait de gentiane	0,04

Indications. — Traitement mercuriel *per os* suivant technique adoptée par le D^r Vernes.

Emploi :

1^{re} semaine : 1 pilule par jour au repas du midi.

2^e semaine : 2 pilules par jour aux repas : midi et soir.

3^e semaine : 3 pilules par jour aux repas : matin, midi et soir.

4^e et 5^e semaines : 4 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 1 soir.

6^e et 7^e semaines : 5 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 2 soir.

8^e et 9^e semaines : 6 pilules aux repas : 2 matin, 2 midi, 2 soir.

En cas d'intolérance, redescendre à la dose immédiatement inférieure.

Prix : Flacon de 50 pilules, 10 fr. 65.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-00.)

PILULES PHILIPPE

Kératinisées.

Pilules Philippe.

<i>KI</i> à 0,10, 0,20, 0,50	19 fr.
<i>NaI</i> à 0,10, 0,20, 0,50	19 —
<i>Iodure de Lithium</i> 0,25	22 —
<i>Harlem Philippe</i> Kérat-Harlem (Voir <i>Harlem Philippe</i>)	17 —
<i>Pancréatine Philippe</i> (Voir <i>Pancréatine Philippe</i>)	17 —
<i>Kérasalicyl salicylate</i> 0,50 (Voir <i>Kérasalicyl</i>)	17 —
<i>Kéraspirine</i> , aspirine kératinisée à 0,50, 0,25.	9 85

Pilules Lémery.

A. <i>Dupuytren</i> (Codex)	16 fr.
B. <i>Ricord</i> (Codex)	16 —
C. <i>Bi-iodure Hg KI</i> (Voir <i>Pilules Lémery</i>)	

Antidote Malaria :

Quinine, extrait biliaire, méthylarsinate disodique, oxalate de fer	18 fr.
---	--------

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PILULES V.-E. DOUMER

Formule :

Chaque pilule contient 5 cgr. de bleu de méthylène *chimiquement pur*.

Doses :

De 3 à 10 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

PINEOLEUM

Composition. — *Forme simple* : Eucalyptus, Pin Pumilionis, Cannelle, Camphre, Menthol, Huile de Paraffine pure.

Forme éphédrinée : même formule + éphédrine.

Propriétés. — Antiseptique spécifique des affections rhino-pharyngées.

Formes. — *Pulvérisateur* vendu garni de PINEOLEUM.

Applicateur avec compte-gouttes spécial. *Grand flacon* pour recharger le pulvérisateur ou l'applicateur.

Important. — Chacune de ces trois formes existe en deux formules :

Simple ou *éphédrinée*.

Prix :	{	Pulvérisateur garni.	23 fr. 40	} Simple	
		Applicateur	14 fr. 60		ou
		Grand flacon	20 fr. 80		

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Galvani 84-41.)

PIORÉFAGINE

Technique et formules de Ch. Hulin.

Traitement rationnel des Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites, Suppuration, Douleur, Congestions gingivales, Angines, Muguet.

Auto-traitement.

Onguent Pioréfagine (pâte).	Le tube	15 fr. 60
Topique	— (élixir). Le flacon .	39 fr.
—	— (élixir). 1/2 flacon..	20 fr. 80
Pastille	— La boîte	6 fr. 90
Anaphylène (pilules).	Le flacon	17 fr. 25

Traitement chirurgical.

Fibrogénine injectable.	La boîte	46 fr.
— applicable.	Le flacon	28 fr. 75
Kératoline (caustique).	Le flacon	28 fr. 75
Ulosane (pâte sclérogène).	Le tube	17 fr. 25

Laboratoire HYGIO-DONTIS

CROISSY-SUR-SEINE (Seine-et-Oise).

Toutes Pharmacies. — Dépôt général : O. C. P.

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{NH} \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH}_2 \\ \text{CH}_2\text{-CH}_2 \end{array} \text{NH}$, alcalin organique du groupe des Pyridines inscrit au Codex français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0 gr. 20 de PIPÉRAZINE pure par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif ; 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique : réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artério-Sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue (cœur, estomac, vaisseaux).

Prix : 20 fr. 80. — **Durée du traitement :** une semaine.

Remboursée à 80 % aux Assurés Sociaux (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

PLASMA DE QUINTON

Nom déposé en 1907.

Composition. — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite ; transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques, mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

Le Plasma de Quinton (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) *est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.*

Bibliographie. — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références in R. QUINTON : *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2^e éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références in JARRICOT : *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

Indications :

Traitement prénatal. Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'arme plus puissante. On sait qu'il a été fondé (D^r ARNULPHI, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1^o de conduire à terme le produit conçu ; 2^o de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3^o d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

Entérites des adultes et des grands enfants. Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

Gastro-entérites des nourrissons. Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme), la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

Intolérance lactée, Athrepsie. L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsique s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

Maladies de la peau (Acné, Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées) ; *Maladies du Système nerveux* (Névralgies, Enuresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie) ; *Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.* Les succès sont habituels, impressionnants parfois de rapidité.

Régimes, doses d'injections. — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine par le *Plasma de Quinton*, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

Présentation. — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

Renseignements et littérature (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance ; envois de notices sur les applications et la posologie du *Plasma de Quinton* : DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrivée, Paris (Gare Montparnasse).

Commandes et ordres d'expéditions :

Produits Biologiques CARRION

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45 et 46.)

Adresse télégr. Rioncar-Paris-123.

PLASMARINE

Analeptique marin polyminéralisé.

Composition. — Calcium en combinaisons minérale et organique assimilables ; Phosphates et acide phosphorique calco-manganique ; Iode en solution marine ; Manganèse glycérophosphorique assimilable ; éléments en combinaison et solution dans le Plasma Marin naturel isotonique.

Action thérapeutique :

- 1° Réveil immédiat de l'appétit.
 - 2° Reminéralisation intégrale intensive.
 - 3° Action tonique et réparatrice.
 - 4° Action dépurative.
 - 5° Modification favorable du terrain.
- Energique, agréable, atoxique.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Grands enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Petits enfants : 2 à 3 cuillerées à café.

Soit au début, soit à la fin des repas.

Prix : 18 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires « LA BIOMARINE »

DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

PLASMOSTHÈNE

Médication sthénique totale des débilités, surmenés physiques et intellectuels.

Formule. — Gouttes :

Méthylarsinate de soude.....	3 gr. 25
Glycérophosphate de magnésium.....	3 gr.
Glycérophosphate de manganèse.....	3 gr. 50
Cacodylate de fer.....	0 gr. 30
Cacodylate de strychnine.....	0 gr. 075
Acide phosphorique.....	20 gr.
Gluconate de cuivre.....	0 gr. 50
Carbonate de zinc précipité.....	0 gr. 25
Sérum de Quinton }	
Glycérine	à Q. S. p. 100 gr.

En flacon compte-gouttes de 45 cc. Prix : 17 francs.

Particularités. — Association synergique complète phosphorique, magnésienne, ferrique en milieu d'eau de mer, associée à la strychnine et au manganèse. Présence des diastases métalliques cuivre et zinc.

Adultes : XX gouttes 2 à 3 fois par jour. } Existe en ampoules.

Enfants : V gouttes 2 fois par jour. } 1 ampoule par jour.

Ampoules : Cacodylate de soude : 0 gr. 15 ; Glycérophosphate de soude : 0 gr. 15 ; Cacodylate de manganèse, Strychnine, Fer, pour 2 cc

Indications. — Tous les états de dépression physique et morale, Anémies, Phosphaturie, Sénilité, Ménopause.

Laboratoires du NORMOGASTRYL

J. OLIVE — 14, rue des Minimes — Paris.

O. O. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PLEXALGINE LALEUF

Composition. — Extraits spéciaux de : muscle strié, myocarde, pancréas, foie et rein, parathyroïde, phényléthylmalonylurée, extraits végétaux (datura, mandragore, jaborandi, lobélie).

Propriétés et indications. — Sédation et suppression des désordres causés par le déséquilibre vaso-sympathique. La **PlexalGINE** agit non seulement sur les effets (algies et spasmes), mais aussi sur les causes (carences métaboliques, spasmophilie).

Spécialement indiquée dans : douleurs précordiales et solaires, aérophagie, palpitations, spasmes, angoisses, dysthyroïdie, troubles de la ménopause.

Forme. — Dragées.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 6 dragées par 24 heures, de préférence en plusieurs prises.

Prix : 21 fr. 30 l'étui de 60 dragées (de 10 à 30 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF
Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie
51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Trocadéro 62-24.)

PLEXAMINE

Indications. — Sédatif des plexus sympathiques, Douleur des règles, Rhumes des foins, Ulcères gastro-duodénaux, Épigastalgies, Angine de poitrine, Syndrome de Raynaud. Hypertension artérielle. Toutes les algies (Névrites, Zona, etc.).

Composition. — La Plexamine est une solution de chlorhydrate d'histidine à 4 p. 100, présentée en boîtes de 6 ampoules de un centicube avec l'aiguille spéciale pour l'injection intradermique.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection intradermique du contenu d'une ampoule chaque jour.

Prix : boîte de 6 amp. : 22 fr. 90. Cure : 6, 12, 18 jrs.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Enregistré au L. N. C. M. — n° 111-5.

Laboratoire LAURENT-GÉRARD
40, rue de Bellechasse, 1 et 3, rue Las-Cases
PARIS. (Tél. : Invalides 78-44.)

PLURIBIASE

Indications. — Cholagogue doux. Antiseptique intestinal. États anaphylactiques, Urticaire, Cholécystites, Intoxications alimentaires.

Composition. — Comprimés à 2 noyaux.

Noyau externe.		Noyau interne.	
Pepsine T. 500.....	0,05	Extr. Boldo	0,005
Extr. de Belladone .	0,001	Bile dépigmentée et	
Extr. de Jusquiame.	0,001	décholestérinée ...	0,10
Sucre.....	0,20	Pancréatine T. 200.	0,10
		Kinase	0,10
		Erepsine	0,10
		Ferments lactiques	
Gluten.....	0,05	concentrés	0,03

Doses. — 2 comprimés avant chaque repas, 20 jours par mois.

Prix : 19 fr. 20.

Laboratoires Gastro-Entérologiques ODINOT

Pharmacien.

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 69-13.)

PLURINATRYL

Granulé.

Composition. — Benzoate de soude, citrate de soude, hyposulfite de soude, sulfate de soude, phosphate de soude, bicarbonate de Na.

Pesologie :

Adultes : 1 ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun.

En cas de brûlures d'estomac, 1 ou 2 cuillerées à café au moment des douleurs.

Enfants : en général la moitié des doses pour adultes.

Indications. — Insuffisance hépatique, Hyperchlorhydrie, Dyspepsie, Constipation, Anaphylaxie (urticaire, eczéma, migraine, asthme), Hypertension artérielle, Obésité, Arthritisme.

Laboratoire du PLURINATRYL

151, rue de Charenton — PARIS (XII^e).

PLURION

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hémopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 ampoules par jour dans les *anémies graves*, 1 ampoule par jour dans les *anémies des convalescents, paludéens, syphilitiques, cancéreux*, 1 ampoule tous les 2 jours dans les cas plus bénins.

Prix : 34 fr. 30 pour 4 à 16 jours de traitement. A. S. C.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS
(Tél. : Carnot 18-75.)

PNEUMOGÉINE RENARD

Composition. — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine) combiné à 0,08 d'iode combiné et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE, par son action :

régulatrice respiratoire, assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel ;

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle ;

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

Indications. — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

Posologie. — Pendant les crises paroxysmiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées. A prendre dilué dans de l'eau bien sucrée.

Dragées : 15 fr. 60 — Liquide : 16 fr. 90.

Durée moyenne du flacon : 7 jours.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY.

(Tél. : Pereire 14-08.)

PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

Composition. — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olive et de chènevis camphrée, débarrassée de ses acides. Quatre concentrations n^{os} 1, 2, 3, 4.

Mode d'emploi et indications :

INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES, INTRA-PULMONAIRES : Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes. Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme. Emphysème.

INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES : Tuberculoses laryngées.

INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES : Tuberculoses méningées.

INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES : Tuberculoses péritonéales.

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES : Prétuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections grippales, bronchites chroniques, infections urinaires, (prostatites, etc.).

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires H. YVRARD, 17, rue Soufflot — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 56-67.)

PNEUMOSTYL DAGUIN

Forme :

Ampoules de 2 cc. Injections hypodermiques. Boîte bleue 18 fr. 70

Ampoules de 6 cc. Injections Intra-trachéales. Boîte rouge 24 fr. 95

Composition. — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre, goménol, eucalyptol, essences de labiées et huile neutre.

Indications. — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande au :

Laboratoire DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

Tél. : Gravelle 00-27.

POFENANE

Composition. — Bourgeons de Peuplier, fenugrec, hoang-nan.

Indications. — Débilité, Asthénie, Hypotrophie, Bronchite chronique, Asthme, Tuberculose, Diabète, Neurasthénie, Atonie digestive, Troubles de la croissance, Perte de poids, Déminéralisation, Perturbation du métabolisme, Lymphatisme, Anémie, Impuissance, Enurésie.

Remarque importante. — Dans les affections broncho-pulmonaires, l'action du POFENANE se traduit par une diminution de la purulence des sécrétions bronchiques, par une plus grande facilité de l'expectoration et par la cessation de la toux.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 6 à 8 dragées par jour.

Enfants de 10 à 15 ans : 3 dragées par jour, à prendre avant les repas.

Avaler sans sucer ni croquer, avec une gorgée d'eau.

Présentation et prix :

La boîte de 60 dragées : 15 fr. 60.

L. N. C. 428-9.

Laboratoire du Dr VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Association du *phosphore* avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 mgr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

Indications. — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

Trois formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 20.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire des Produits du Dr CHURCHILL

P. DESCHAMPS, Pharmacien

92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII°).

(Tél. : Did. 74-02.)

POLYBROMURE GONNON

Bromures de sodium, potassium, ammonium et strontium.

Forme et Posologie.

<i>Sirop</i> : 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure).	Prix public 16 fr.
<i>Poudre</i> : 1 mesure = 1 gr. de polybromure.	11 fr.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium qui est un excellent eupeptique.

Indications. — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Durée moyenne de l'unité de vente :

Sirop : 15 jours. — Poudre : 30 jours.

Produits GONNON — J. et G. GONNON, Pharmaciens
14, rue Victor-Hugo — LYON. (Tél. : Franklin 36-80.)

POLYCALCION

Solution titrée agréablement aromatisée (gouttes et dragées).

XL gouttes ou une dra- gée correspondent à :	{	Chlorure de calcium.....	0 gr. 40
		Phosphate di-acide de calcium.....	0 gr. 08
		Gluconate de calcium.....	0 gr. 04

C gouttes correspondent à 1 cuiller à café.

Propriétés thérapeutiques. — Antihémorragique, déchlorurant, neuro-sédatif, anti-infectieux, recalcifiant, anti-anaphylactique.

Indications. — Hémorragies de toutes natures : épistaxis, hémoptysies, hématuries, métrorragies, purpura, hémophilie, hémorragies des maladies infectieuses. Etats spasmophiles. Tétanie, Cardiopathie, néphrites, œdèmes, épanchements séreux. Décalkification, tuberculose, ostéomalacie. Accidents anaphylactiques, sériques.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : XL à C gouttes 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée avant les repas ; ou 3 à 8 dragées par jour en trois fois.

Enfants : Il est préférable d'employer les gouttes de Polycalcion. X à XL gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée avant les repas.

Les doses peuvent être augmentées ou diminuées suivant l'avis du médecin.

Prix au public : le flacon de 100 gr. : 17 fr. 50

La boîte de 60 dragées : 17 francs.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 29-29.)

POLYFERMENTS LALEUF

Composition. — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de Magnésium.

Propriétés et indications. — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

Formes. — Granulé et tablettes.

Posologie et mode d'emploi. — Une ou deux cuillerées à café ou 2 à 4 tablettes à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

Durée moyenne des unités de vente : 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :

L'étui de granulé ou la boîte de 48 tablettes : 18 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

POLYOIDURE GONNON

(*Iodures de Sodium, Ammonium, Strontium.*)

Forme. — Sirop comprenant 1 gr. par cuil. à soupe d'iodures alcalins, associés aux écorces d'oranges amères et au vin de Bordeaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique dépuratif, non toxique, action rapide, tolérance parfaite.

Indications. — Engorgements, tumeurs, abcès, asthme, rhumatisme, goutte.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au milieu des repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Prix public : 19 fr. 20.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80 .

POLYNA

Composition :

Sulfate de soude	0 gr. 30
Phosphate de soude	0 gr. 20
Bicarbonate de soude	0 gr. 15
Citrate de soude	0 gr. 05
Benzoate de soude	0 gr. 05
Tartrate de soude	0 gr. 10
Salicylate de soude.....	0 gr. 05
Hypophosphite de soude	0 gr. 05

Pour 1 cuillerée à café.

Indications. — Insuffisances hépatiques, dyspepsies, intoxications alimentaires, dermatoses, etc.

Propriétés. — Toutes celles de la solution de Bourget avec adjonction des cholagogues : benzoate et salicylate de soude.

Présentation. — Granulé soluble de saveur agréable.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café à jeun ou avant les repas dans un peu d'eau légèrement tiédie.

Laboratoires HALLEANA

G. VENNE, Pharmacien,

102, avenue Michelet — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 07-53).

POLYPEPTONAL

Composition. — Peptonates polyvalents de Magnésie. Digestats chlorhydropeptiques de Foie total et d'Albumines végétales.

Indications. — Nouvelle médication polyvalente, antichoc, cholagogue et antianaphylactique. Troubles digestifs. Troubles anaphylactiques généraux. Insuffisances hépato-biliaires.

Posologie :

Comprimés : Adultes : 1 à 5 une 1/2 heure avant les repas.

Enfants : 1 comprimé une 1/2 heure avant les repas.

Granulé : Adultes : 1 à 2 cuillerées à bouche.

Enfants : 1 cuillerée à café dissous ou non dans un peu d'eau une 1/2 heure avant les repas.

Prix :

La simple dose (comprimés ou granulé). 18 fr. 20.

La triple dose (comprimés ou granulé). 40 fr. 60.

Société Industrielle de thérapeutique scientifique appliquée.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

POLYTONYL

Médication sthénique totale des débilités, surmenés physiques et intellectuels.

Formule. — Gouttes :

Cacodylate de strychnine.....	0 gr. 075
Carbonate de zinc.....	0 gr. 25
Cacodylate de fer.....	0 gr. 30
Gluconate de cuivre.....	0 gr. 50
Glycérophosphate de magnésium.....	3 gr.
Méthylarsinate de soude.....	3 gr. 25
Glycérophosphate de manganèse.....	3 gr. 50
Acide phosphorique.....	20 gr.
Sérum de Quinton.....	} aa Q. S. p. 100 gr.
Glycérine.....	

Particularités : Association synergique des catalyseurs métalliques indispensables à l'organisme, en quantités électivement dosées.

Présence des éléments toniques de premier ordre : fer, manganèse, phosphore, magnésium; addition de strychnine comme réparateur des fonctions nerveuses.

Adultes : XX gouttes 2 à 3 fois par jour.

Enfants : V gouttes 2 fois par jour.

Ampoules : Cacodylate de soude 0 gr. 15, glycérophosphate de soude 0 gr. 15, strychnine, un milligramme, cacodylate de manganèse, fer pour 2 cc.

Granulé : pour enfants. Éléments minéraux avec addition d'extraits d'organes.

Indications : Tous les états de dépression physique et morale, Anémies, Phosphaturie, Sénilité, Ménopause.

LABORATOIRES P. TAVERNIER, Docteur en Pharmacie.
32, rue de l'Ouest — PARIS.

POLYVALINE

du Dr Bayle

Nature. — Extrait spléno-surrénal.

Indications. — Les maladies infectieuses : Grippe Typhoïde, Paratyphoïdes, Pneumonie, Bronchopneumonie, Erysipèle, Fièvres éruptives, Oreillons, etc., où il agit comme un sérum spécifique très actif.

Emploi. — 1 ou 2 injections par jour (intramusculaires à la fesse ou sous-cutanées abdominales) jusqu'à la défervescence.

Doses. — *Adultes :* POLYVALINE injectable A (10 cc. La boîte de 2 ampoules de 10 cc. : 24 francs.

Enfants : 1 cc. par année d'âge de POLYVALINE injectable B.

Polyvaline buvable

2 par jour dans les maladies aiguës, les convalescences, les anémies avec asthénie.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon (ancienne rue de l'Orne)
PARIS (XV°).

(Tél. : Vaugirard 16-11.)

POLYVEININE

(Comprimés).

Composition. — Dose pour 4 comprimés :

P. de Surrénale	0,020
P. d'Hypophyse.....	0,008
P. de Thyroïde	0,020
Ext. stab. de Marron.....	0,040
Ext. stab. d'Hamamelis	0,20
Ext. stab. d'Hydrastis	0,02
Ext. stab. de Viburnum.....	0,04
Excip. gomme et sucre.....	Q. S.

Indications. — Médicament scientifique dans lequel les effets curatifs des glandes à sécrétions internes sont joints aux vertus vaso-constrictrices des extraits végétaux stabilisés.

Association judicieuse des toniques veineux opothérapiques aux toniques veineux végétaux, la *Polyveinine* est le parfait tonique des parois veineuses, en s'attaquant directement à la cause de leurs affections. C'est en quelque sorte la digitale du système veineux périphérique.

Posologie. — Avaler sans les croquer deux comprimés avant chacun des deux repas, vingt jours par mois.

Formule du professeur Sicard.

L. CASTERAN, Pharmacien,
152, Côte-Pavée — TOULOUSE.

POMMADE AIPHÈME

Traitement Acide des Dermatoses Prurigineuses et subaiguës.

Composition. — Pommade genre Pâte de Lassar à acidité ionique élevée : $\text{pH} = 3,2$.

Action. — A. *Calmant*, quoique sans stupéfiant, de tous les symptômes douloureux des dermatoses, grâce à son acidité ionique libre (Principe de Darier).

B. *Kératoplastique* grâce à son excipient (Pâte de Lassar).

S'emploie contre... tous les Prurits qu'elle calme rapidement. Les Eczémas subaigus. Les Dermites professionnelles (eczémas des laveuses, des cimentiers, des chimistes), ou accidentelles (piqûres d'insectes, coups de soleil, urticaires). — Les Mycoses cutanées, les Dermatoses sèches, Pityriasis, Erythèmes, Eczématides, Lichen plan, Impétigos et, d'une façon générale, contre toutes les Dermatoses subaiguës qui ont tendance à diminuer l'acidité cutanée.

Le tube contenant 45 gr. de pommade net :
8 fr. 50

En conformité avec les principes thérapeutiques de la Pommade Aiphème, il existe un savon Aiphème à alcalinité atténuée qui peut être prescrit pour tous les cas où la pommade est employée et en particulier contre la Séborrhée grasse du visage et les Acnés.

Le savon Aiphème de 120 gr. net : 5 fr.

Echantillons et Littérature.

Envoi gracieux de savons.

Laboratoires Aiphème

54, rue d'Étretat — FÉCAMP (Seine-Inf.)
(Tél. : 70.)

POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur ou démangeaison dans : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire ou anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Dermite infantile, Prurigo, Hémorroïdes, Brûlures, Engelures, Gerçures, Crevasses du sein, Vaginisme, Vulvites, Pansements douloureux, Plaies post-opératoires, Escarres, Radio-dermites, Zona, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Lupus, Chancres, Urticaire, Herpès, Ampoules, Intertrigo, Erythèmes solaires, Boutons de chaleur, Piqûres d'insectes, en résumé tous les Prurits, Dermatoses, Lésions des muqueuses.

Conditions d'efficacité. — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse) ; un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion, sous forme de pansement par exemple.

Posologie. — Aucune limite ni dans les doses ni dans la durée du traitement. Prix : 13 fr. 40.

Laboratoires P. BAUDE,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : LABOBOD — PARIS.

POMMADE BEBIA

Composition :

Pommade à base de sous-nitrate de bismuth, oxyde de zinc, acide benzoïque, acide borique.

Propriétés :

Antiseptique, kératoplastique, anti-prurigineuse.

Indications :

Puériculture, rougeurs des nourrissons, crevasses, gerçures, engelures, toutes dermatoses irritées.

Présentation et prix :

La boîte : 6 fr. 35. — La triple boîte : 14 fr. 85.

AUTRES PRODUITS BEBIA

Poudre Bèbia, la boîte : 7 fr. 40.

Boîte poudreuse : 4 fr. 75.

Savon Bèbia : 2 francs.

Suppositoires Bèbia, miel et glycérine contre la constipation.

La boîte de 15, pour bébés : 3 fr. 70

— — — pour enfants : 4 fr. 75

— de 16, pour adultes : 5 fr. 85

Laboratoire BEBIA

5, avenue E.-Boissier — NANTES.

POMMADE BERNAMONT

A base de peroxyde de zinc, d'oxyde de zinc et d'amidon, la *Pommade Bernamont* constitue le traitement spécifique des Ulcères variqueux et des Plaies atones.

Indications. — Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies, Fistules, Crevasses, Eczémas, Maladies de la peau.

Mode d'emploi. — Après un nettoyage soigneux à l'éther de la plaie à traiter, appliquer une couche épaisse de *Pommade Bernamont* et recouvrir d'un pansement.

Prix : Le pot de 120 grammes, 13 fr. 50.

Durée moyenne du traitement : 3 à 4 semaines.

Utilisation : un pot par semaine.

Littérature et Échantillons.

Autorisé par les Assurances sociales.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro : 1602-2.

Laboratoires BERNAMONT

87 et 89, rue du Commerce — NEVERS
(Tél. : 0-23 Nevers.)

POMMADE-CRÈME LUDIN

Spécifique des affections de la peau et du cuir chevelu.

Composition. — Hg. + As. + B. du Pérou.
+ H. de Cade + Soufre + Acide Salicylique
+ Oxyde de Zinc.

Propriétés thérapeutiques. — Dermatophylactique, Antiseptique, Innocuité absolue.

Indications thérapeutiques. — Staphylococcies et Streptococcies cutanées, Psoriasis et Eczématides psoriasiformes, Dermatoses sèches et squameuses, Pelade, Plaies atones cicatrisant mal, Dermatoses exotiques d'origine microbienne ou ulcérées, Rougeurs, Affections prurigineuses de cause externe, etc., Erythèmes.

Mode d'emploi. — Par massage de quelques minutes, bien faire pénétrer la pommade dans la peau.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-4.

Laboratoires REY — Dijon (Tél. : 22-12.)

POMMADE DU D^r BUTLER

Composition. — Précipité blanc (Chlorure mercurieux), Acide salicylique, Acide borique, Oxyde de zinc, Excipient spécial.

Propriétés. — Anti-prurigineuse, analgésique, cicatrisante. Supprime démangeaisons et douleurs, antiseptique puissant.

Indications. — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits avec ou sans lésion cutanée, Psoriasis, acné, folliculite, impétigo, boutons de toutes natures. Prurigo, dartres, brûlures, herpès, ulcères, coups de soleil, érythème fessier. En applications aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Emploi. — En onction douce, massages légers, recouvrir d'une compresse de gaze. Un pansement par jour maximum, ne pas laver la région traitée avant complète guérison, se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge doux.

Présentation. — Tube G. M. : 14 fr. Tube P. M. : 8 fr. 50. Pot : 12 fr. Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1205-1.

POUDRE DU D^r BUTLER

Mêmes éléments actifs que dans la *Pommade Butler*. Dermatoses sèches et suintantes. Toilette de Bébé : 7 francs, présentée en élégante boîte poudreuse de 150 grammes environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1205-2.

Laboratoire du D^r BUTLER — BOGUET, Pharmacien.
1, rue Bossuet — DIJON (Côte-d'Or).

POMMADE ET SUPPOSITOIRES INSÉVA

Traitement des affections ano-rectales par vaccinothérapie locale.

La pommade et les suppositoires **INSÉVA** sont à base de bouillon-vaccin de colibacilles et d'entérocoques, auxquels sont imputables, pour la plupart, les infections hémorroïdaires.

Indications. — Hémorroïdes internes, hémorroïdes externes, eczéma anal, ano-rectal ou péri-anal, tumeurs hémorroïdaires.

Action. — Guérison rapide des hémorroïdes et tuméfactions hémorroïdaires, sédation du ténésme.

Mode d'emploi. — Appliquer localement, ou introduire dans l'anus, au lever et au coucher, et après chaque selle.

Présentation :

Le tube : 16 fr. 65.

Le 1/2 tube : 9 fr. 35.

La boîte de 10 suppositoires : 16 fr. 65.

INSÉVA

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches,
151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Echantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées);

POMMADE FORNET

à l'Insuline Fornet

Cicatrisant parfait.

Principe actif :

L'Insuline FORNET véhiculée par un excipient spécial, à pouvoir transdermique remarquable. Titrage régulier. Aucun adjuvant.

Indications :

Ulcères variqueux. Plaies de toute nature.
Hémorroïdes.

Recommandations spéciales.

Cancers ulcérés de la peau : *Presse médicale*, du 21 octobre 1931.

Prurits : Hôpitaux de Paris.

Orgelets récidivants, Blépharites-Ulcères de la cornée : Service Ophtalmologie d'Ambroise Paré.

Radiodermites : Communications Gomès da Costa.

Brûlures : Service chirurgical. Hôpital de Lyon.

La Pommade FORNET est utilisée dans tous les hôpitaux de Paris.

Prix : 15 francs.

Renseignements et échantillonnage :

Laboratoires THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine.

Traitement spécifique des *dartres chroniques* ; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la ténacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en décrapant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrayer la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sébum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruques plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *javus*.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 14 fr. 55.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 47-00.)

POMMADE LOGEAI

Composition :

Extrait total d'hamamélis.....	6	Cupressus.....	0,29
Sulfocetylolate de soude..	6	Genêt.....	0,29
Onguent populéum.....	69	Jusquiame.....	1,45
Lanoline anhydre.....	5,70	Teskra.....	1,45
Marron d'Inde.....	0,29	Pour 100 grammes.	

Propriétés :

ATOXIQUE : Ni stupéfiant, ni adrénaline.

ANALGESIQUE : Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTE : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTISEPTIQUE : Action antiseptique de l'huile sulfitée sur la muqueuse rectale.

Indications. — Hémorroïdes externes et internes. Prurits anal et vulvaire. Prostatites.

Mode d'emploi. — Après bain savonneux, onction matin et soir avec le doigt enduit d'une forte couche de pommade LOGEAI et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes). Une canule permet le traitement des hémorroïdes internes.

Prix : Le tube P. M. : 10 fr. 40. — Le tube G. M. : 16 francs.

Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAI
GOBERT, Pharmacien.

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

POMMADE MIDY

(Adrénostyptique).

Adrénaline	0,0066
Stovaine	1 gr.
Anesthésine	1 gr.
Extrait de Marron d'Inde frais	
stabilisé	2 gr. 50
Extrait d'Hamamélis	0 gr. 50

Pour 100 grammes de pommade.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les garde-robes. Précéder d'une application, pendant 10 minutes, ou de glace ou de compresses à 45°.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes, haut placées.

Prix : 15 fr. 60. **Durée du traitement :** 10 jours.

Remboursé à 80 % aux Assurés Sociaux (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

POMMADE NOËLLINE

Composition. — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

Action. — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés.

Durée d'utilisation : une ou deux semaines suivant gravité.

Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif :* en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

A titre curatif : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : le tube 7 francs.

Laboratoire de la NOËLLINE

GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.

POMMADES KLÉOS

Pâtes à l'eau.

Pommade Kléos Douce.

Indications. — Feux, rougeurs, eczéma, éruptions dues à la dentition des bébés. Brûlures, Gerçures, Coups de soleil.

Composition. — Baume du Pérou, Silicate de Magnésie hydratée, Oxyde de zinc, Dermarone, Oléate de zinc, Essences naturelles, excipient non gras.

Pommade Kléos Forte.

Indications. — Maladies de peau anciennes, gourme, acné, intertrigo.

Composition. — Essences naturelles, Ichtyol, Baume du Pérou, Magistère de Soufre, Carbonate de Chaux, Stéarate de zinc, Oxyde de zinc, excipient non gras.

Forme. — Pommade non grasse renfermée en tube étain. Ces pommades, étudiées spécialement pour les enfants, sont tout indiquées pour les épidermes particulièrement délicats.

Prix du tube : 6 francs. Le double tube : 11 francs.

Littérature et échantillons.

Laboratoires QUÉRET

2, rue des Cordeliers — MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret).
Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous les n^{os} 963-4 et 5.

POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET

Pommades en tubes à canule dévissable et stérilisable, et à canule fixe, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Ecarlate, Cuivre (hémocuvire), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmium, Zinc Tuméol, Zinc Ichtyol, Calomel, Fondante (K_2CO_3 , $CaCl_2$), Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Peroxyde de zinc, Collargol, Argyrol, Azotate d'argent, Protargol, Cocaïne, Ethylhydrocupréine (Optochine). Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence de Niaouli (Goménol), Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet Rose, Colorant Composé, Esérine, Euphtalmine, Scopalamine, Atropine, Pilocarpine, Adrénaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu, Chibromercurobrome. Choloformercuro (Bile Ethylhydrocupréine (Optochin) Chibromercurobrome).

Radio Bleu (Radio Activé au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

Ampoules fondantes chloro-iodo-calciques (Bains d'yeux pour cataracte). **CEILLÈRES Chibret** à rebord caoutchouté.

Extrait corps ciliaire en amp. pour inj. et instil.

Solution composée en amp. de 1/2 cc. (pour inj. s.-conjonctivales).

Humeur aqueuse artificielle (pour opération de la cataracte).

Pommade pour le nez : Baume du Pérou, Adrénaline.

(Voir à Collyres la suite des Produits Chibret.)

(Voir à Chibromercurobrome, le libellé spécial.)

LABORATOIRES CHIBRET,

5. Saint-Herem-CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). (Tél. : 33-36.)

POMMADES PROBIOS

PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Pommade

Formule. — Antivirus et Bactériophages Staphylococciques, Streptococciques et Bacilles Pyocyaniques.

Présentation. — En tube d'étain.

Indications thérapeutiques. — Infections cutanées, Acné, Panaris-Furoncles, Anthrax, Abscesses, Phlegmons, Pyodermites, Plaies infectées, Eczéma.

Mode d'emploi. — En applications locales.

POMMADE NASALE PROBIOS

Formule. — Antivirus-Bactériophages, Antistreptococciques, Antistaphylococciques, Friedlander, Proteus, Antivirus Bac. Pfeiffer, Antipneumococciques.

Présentation. — En tube à injection.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Sinusites, Rhino-pharyngites, Ozène, Grippe et certaines formes d'asthme, Préventif dans la Grippe et le Coryza.

Mode d'emploi. — Introduire le produit aussi loin que possible dans les fosses nasales, en aspirant fortement, 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e)

(Tél. : Turbigo 40-83.)

POMMADE VITAMORRHUINE

agréablement parfumée.

A base d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50, associé à la graisse de laine, l'huile d'olive, le stéarate de zinc, les essences de lavande et bergamote.

1 gramme de *Pommade Vitamorrhaine* contient :

4550 unités internationales Vitamines A naturelles.

975 unités internationales Vitamines D naturelles.

Indications. — Plaies atones, ulcères, ulcères variqueux, dermatoses chroniques, brûlures, engelures, toutes les irritations de la peau, etc.

**PHARMACIE CENTRALE DE
BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

POMMADE ZYLOR

Traitement local des hémorroïdes internes et externes et de leurs complications. Prostatite.

Extrait d'Hamamelis	3 gr.
Extrait de Rathania	3 gr. 90
Extrait fl. de Marrons d'Inde.	3 gr.
Extrait fl. de Saturne	2 gr.
Oxyde de zinc	2 gr.
Stovaïne	0 gr. 10
Solution de Suparénine 1000°.	3 gr.
Lanoline	23 gr.
Vaseline.....	60 gr.

En un tube canulé.

Mode d'emploi. — Application matin et soir après compresse à l'eau tiède et séchage.

Propriétés. — Analgésique, Décongestif antiseptique. Existe aussi en suppositoires.

Prix. — Le tube de pommade : 9 fr. 90 ; la boîte de suppositoires : 10 fr.

Laboratoires COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-01.)

PORODERMAL

Composition. — Pâte poreuse, toujours tolérée, même par les dermatoses aiguës et suintantes.

Présentations. — PORODERMAL simple : eczémas aigus, pyodermites, érythèmes.

PORODERMAL au peroxyde de Zinc : antiseptique cicatrisant, plaies atones, brûlures.

PORODERMAL à l'Ichtyol : kératoplastique anti-prurigineux : eczémas érythémateux, lichens, prurigo.

Indications. — Les applications combinées du PORODERMAL au peroxyde de zinc et du PORODERMAL à l'ichtyol cicatrisent rapidement les plaies atones, les ulcères variqueux sans interrompre ni le travail, ni la marche.

Prix :

PORODERMAL simple : 12 fr. 50.

Ichtyol : 15 fr. 60.

Peroxyde de Zinc : 15 fr. 60.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX. Tél. : 840-78.

POSTERISAN

(Nom déposé.)

Traitement spécifique des Hémorroïdes.

(Pommade et Suppositoires.)

Composition. — Antivirus du Colibacille, Acide carbolique.

Propriétés. — Action rapide et sans danger. Aucun effet secondaire.

Indications. — Remède spécifique des Hémorroïdes et de toutes les maladies cutanées causées par les bactéries intestinales.

Présentation. — Boîte de 10 suppositoires. Tube de Pommade avec canule rectale.

Emploi. — *Hémorroïdes externes* : Oindre avec la pommade après chaque selle, ainsi qu'au lever et au coucher.

Hémorroïdes internes : Introduire 1 ou 2 suppositoires ou de la pommade, à l'aide de la canule qui se visse sur le tube.

Laboratoires LOBRU

L. Brun, Pharmacien

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

POST-HYPOPHYSE CHOAY

Nature. — Extrait purifié injectable, désalbuminé, stérilisé, de lobe postérieur d'hypophyse.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi :

Post-hypophyse n° 2. — Solution *obstétricale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Inertie utérine secondaire, en l'absence de toute dystocie. Injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc., à dilatation complète (tête fixée).

Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 4. — Solution *chirurgicale*.

Ampoules de 1 cc. titrées à 10 unités internationales.

Indications. — Prévention des hémorragies opératoires : 1/2 à 1 cc. avant l'intervention.

Parésie intestinale : 1/2 à 1 cc. Diabète insipide : 1 cc. par jour.

Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 5. — Solution *hémostatique* diluée dans du sérum.

Ampoules de 10 cc. titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Hémoptysies des tuberculeux : Injection intraveineuse à pousser *très lentement*.

Boîtes de 3 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48 venue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

POTION ADOL

Composition. — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Spartéine, *Stovaine*, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

Action thérapeutique. — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

Avantages. — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

Indications. — Douleurs aiguës, quelle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lombago, sciaticques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

Mode d'emploi. — 1 à 6 cuillerées à bouche par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 18 fr. 20.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe

78, Cours de la Liberté — LYON.

(Tél. : Moncey 13-37.)

POTION DIOGA

Traitement rationnel et radical de toutes les affections des voies respiratoires

Composition :

Gaïacol	0 gr. 25
Glycérine	5 gr.
Eau de Laurier-Cerise	5 gr.
Benzoate de soude.....	2 gr.
Dionine.....	0 gr. 06
Sirop de Tolu	50 gr.
Eau chloroformée.....	10 gr.

Eau q. s. pour 100 gr. de potion colorée en vert et parfumée à la menthe.

D'un goût très agréable, la **Potion Dioga** peut être supportée par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Rhumes de poitrine, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Emphysème.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 5 cuillerées à soupe par jour (loin des repas).

Enfants au-dessus de 10 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert (loin des repas).

Prix : le flacon 16 fr. 65.

Laboratoire BIOSEDRA

E. ESTRADER, Docteur en Pharmacie,

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23.)

POUDRE ANTI-H

(H = Symbole de l'acidité.)

Médication stomacale.

Composition. — Silicate double d'alumine et de sodium.

Indications. — Toute la pathologie gastrique. (Voir également *Ampoules Anti-H.*) D'une façon générale, réserver les *Ampoules Anti-H* aux *cas complexes* (Maladie de Reichmann, Ulcères et Ulcérations, Hypermotricité, Spasmes du pylore), et la *Poudre Anti-H* aux *cas simples* (Hyperchlorhydries, Gastralgies, Dyspepsies). Les ampoules peuvent également s'employer en traitement d'attaque et la poudre en traitement d'entretien.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau après les deux repas, ou au moment des douleurs, ou selon indications médicales.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoires REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS.

(Tél. : Gobelins 90-00.)

POUDRE BEAU CHLOROFORMÉE

(Ou Éther)

Deux formes : Poudre Beau Chloroformée et Poudre Beau Éther.

Formule :

Ext. gr. Chanvre Indien	0,125
Menthol naturel	0,10
Chloroformé (ou Éther)	0,50
Bic. de soude chim. pur	75
Suc. Q. S. pour	100

Propriétés thérapeutiques. — Sédation immédiate des phénomènes douloureux gastriques. Antiacide, Antispasmodique.

Indications. — Hyperchlorhydries, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Ulcères, Vomissements incoercifs et tous les syndromes douloureux de l'estomac.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un 1/3 de verre d'eau après les principaux repas et au moment des douleurs.

Pas d'accoutumance. Pas de contre-indications.

Prix : 12 fr. 25. — Durée du traitement : 10 à 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

POUDRE CASSARINI

Médication Sédatrice du Système Nerveux

ÉPILEPSIES — HYSTÉRIE — NÉVROSES DIVERSES

(En Comprimés.)

Nouvelle combinaison antitoxique bromée aux extraits végétaux.

Spécifique héroïque des épilepsies et des affections nerveuses avec hyper-excitation du système nerveux.

Prix au public : 26 fr. 50 la boîte (un mois de traitement environ).

Posologie:

Adultes : 6 comprimés par jour, 2 immédiatement avant chacun des trois principaux repas. Dissous dans un demi-verre d'eau.

Adolescents : 10 à 15 ans : 3 jusqu'à 4 comprimés par jour. Un ou deux immédiatement avant les trois principaux repas, dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage.

Enfants de 6 à 10 ans : 2 jusqu'à 3 comprimés par jour, un immédiatement avant le petit déjeuner, un avant le repas du soir, dissous dans n'importe quel liquide.

Enfants au-dessous de 5 ans : Demander renseignements.

Littérature sur demande.

R. COLUMEAU, Pharmacien spécialiste

Laboratoire COLUMEAU, 24, rue Flégier — MARSEILLE

(Tél. : National 50-06.)

POUDRE CHAUMEL

Hygiène de la Femme.

Borate de soude et Essence de Lavande, entièrement soluble dans l'eau, Odeur agréable et discrète.

Indications. — Décongestionnante, Anti-septique, Adoucissante.

Hygiène intime de la femme.

Hygiène des yeux (blépharites, etc.).

Traitement des plaies.

Mode d'emploi. — Un sachet pour un à deux litres d'eau chaude.

Prix : La boîte de 20 sachets, 19 fr. 20.

Durée moyenne de l'unité de vente :

28 à 30 jours.

Établissements FUMOUE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

POUDRE DANICA

Anisée, d'une finesse extrême, se délaye très facilement, très agréable dans l'eau gazeuse, calme la soif instantanément.

Composition. — Carbonaté de Ca et Mg. Silicate de Mg.

Indications. — Toutes affections d'estomac, intestin et foie, Solarites, Régularise les garde-robes. Efficace contre hyperacidités et hypertension. Equilibre le pH sanguin. Stimule la fonction rénale. Fait passer dans le sang des chlorures de Ca et Mg et des silicates solubilisés. Reminéralise. Préviend le cancer. Supprime l'insomnie digestive.

Mode habituel d'emploi. — Toutes variantes possibles. Une 1/2 cuillerée à café avant les repas : une cuillerée à café au coucher et au réveil.

Durée : 3 à 4 semaines.

P. BLOUIN, Pharmacien

50, rue de Turenne — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 93-14.)

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmatiques.

Composition. — A base de nitre et de solanées les mieux triées (récoltes de 1^{er} choix).

Indications thérapeutiques et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fins de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 11 fr. 75 (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laborat. ESCOUFLAIRE — BAISIEUX (Nord).
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

Forme et composition. — Insuline purifiée de fabrication française ; présentée en poudre et en pommade.

Mode d'action. — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

Indication. — Ulcères variqueux, plaies atones, cicatrisation rapide de la plaie.

Mode d'emploi. — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de la plaie, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

Prix pour 20 pansements : 24 fr. 50.

Prix pour 10 pansements : 13 francs.

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRIQUE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

POUDRE NOELLINE

Composition.

Poudre à base de Dermatol et Acide Borique.

Indications.

Rougeurs des bébés, Intertrigo, Escarres.

Mode d'emploi.

En application locale tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Durée d'utilisation : plusieurs semaines.

Boîte spéciale permettant à la fois le tamisage et l'imprégnation d'une houppette.

Prix : 7 francs.

Boîte décorée de luxe, pour table de toilette : 19 fr. 20.

Laboratoire de la NOELLINE

GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.

POUDRE PATERSON

Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, léger. Magnésie calcinée. Sucre pur.

Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses.*
Saturant gastrique neutre présenté en pastilles, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Très supérieur au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin, etc.).

Indications :

Poudre en paquets : Pansement gastrique, Saturation, Gastropathies douloureuses, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Acidités anormales, Ulcus gastrique et duodénal, Entérites et infections intestinales, Dyspepsies gravidiques, Troubles digestifs du nourrisson.

Pastilles : Traitement d'entretien, Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la **grossesse**.

Forme et posologie :

Paquets : (2 gr.), 2 à 5 p. jour et plus au moment des crises douloureuses.

Pastilles : 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.

Prix au public : *Poudre* : la boîte (40 paquets), 17 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 9 fr. 35. *Pastilles* : la boîte, 8 fr. 80 ; la demi-boîte, 4 fr. 80.

15-20 jours de traitement environ.

Laboratoires des Produits PATERSON, G. et M. Armingeat.
46, rue de Saintonge — PARIS (Arch. : 15-10).

POUDRE ROCHER LAXATIVE

Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

Composition. — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

Posologie. — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

Échantillon franco à Messieurs les Docteurs.

Prix : 6 fr. 30.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).
(Tél. : Danton 98-45.)

POUDRE SATINE

Composition :

Stéarates	24 gr.
Acide borique	6 gr.
Silic. de Magnésie.....	4 gr.
Carbonate de chaux.....	6 gr.

Par boîte.

Propriétés thérapeutiques. — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Indications. — Toilette des bébés, irritations cutanées, eschares des malades alités, feux du rasoir.

En vente, toutes pharmacies et grands magasins (Hygiène). 8 francs la boîte.

Laboratoires NOGUÈS
7, rue Galvani — PARIS.

PRAGMOLINE

Solution stable de bromure d'Acétycholine.

Hypotenseur et antispasmodique.

Indications. — Accidents de l'hypertension en général. Affections spasmodiques d'origine artérielle (artérites sténosantes des membres, maladie de Raynaud, localisations cérébrales, rétinienes, auriculaires, etc.). Hypovagotonie. *Sueurs des Tuberculeux.*

Présentations et Posologie. — Boîtes de 10 ampoules.

Solution A : Dosée à 6 p. 100 de bromure d'acétylcholine (ampoule de 1/2 cm³). Prix : 23 fr. 50.

Solution B : Dosée à 12,5 p. 100 (ampoule de 1 cm³).

Prix : 41 francs.

Injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0 g. 03 à 0 g. 06 pour les sueurs des tuberculeux ; 0 g. 25 à 0 g. 50 pour les angiospasmodiques. Débuter par de petites doses.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PRÉFAGYL

Gastriques fonctionnels. Petits hépatiques. Aérophages.

Particularités. — Comprimés effervescents de 2 gr. permettant de réaliser immédiatement, en tous lieux, une Solution de Bourget bromurée citratée, avec addition de chlorure de magnésium.

Procédé spécial de conservation en tubes.

Indications. — Tous les gastriques fonctionnels, dyspeptiques, aérophages, hépatiques.

Emploi. — Dyspeptiques, hépatiques, nerveux : 1 comprimé effervescent le matin à jeun et avant chaque repas dans un demi-verre d'eau tiédie ou froide.

Hyperchlorhydrie : 1 comprimé au moment des douleurs ou des brûlures.

Formule :

Chlorure de magnésium	0,03
Bromure de sodium sec	0,25
Bicarbonate de soude sec.....	0,60
Sulfate de soude desséché	0,285
Phosphate de soude sec	0,195
Acide citrique	Q. S. p. 1 comprimé effervescent.
Boîtes de 3 tubes de 12 comprimés. Prix : 15 francs.	

Laboratoires P. TAVERNIER

Docteur en pharmacie

32, rue de l'Ouest — PARIS.

PRÉMALINE

Médication antipaludique totale.

Composition. — Association d'une partie de rodo-præquine et de 10 parties de quinacrine.

Présentation :

Comprimés dosés à :

Quinacrine	0 g. 10
Præquine (plasmochine).....	0 g. 005
Rhodoquine	0 g. 005

Indications. — Application des nouvelles méthodes de lutte contre le paludisme.

Posologie. — Pour 1 journée :

Adultes : 3 comprimés.

Enfants : de 1 à 5 ans : 1/2 comprimé.

Enfants : de 6 à 10 ans : 1 comprimé.

Vente autorisée seulement en France, aux Colonies françaises, en pays de protectorat français et sous mandat français.

Prix de vente :

le tube de 15 comprimés : 16 frs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PRESSYL

Composition :

Ampoules de 2 cc. contenant chacune :

Camphramine 20 cgr.

Pressédrine 5 cgr.

Injection indolore, pas de réaction hypotensive secondaire.

Comprimés contenant chacun :

Camphramine 10 cgr.

Pressédrine 2 cgr.

Grande marge thérapeutique, tolérance générale parfaite.

Propriétés. — Tonicardiaque et analeptique respiratoire par la Camphramine. Hypertenseur par la Pressédrine (Excitant du sympathique).

C'est le médicament type des défaillances cardio-vasculaires et respiratoires aiguës et des hypotensions chroniques.

Indications :

Ampoules.

États de choc, syncopes cardiaques et respiratoires, Collapsus, États lipothymiques, Comas, États asphyxiques, Crises d'asthme.

Traitement préventif de la syncope anesthésique et des accidents de la rachianesthésie et des anesthésies locales et régionales.

Traitement curatif du choc opératoire, du choc obstétrical.

Comprimés.

Hypotensions essentielles idiopathiques, Hypotensions symptomatiques des maladies infectieuses, Asthme, Urticaires, Accidents sériques, Intolérances thérapeutiques, Hypervagotonies digestives.

Posologie :

Ampoules.

Injection intraveineuse réservée aux situations graves où il faut agir vite et énergiquement.

Injections sous-cutanées ou intramusculaires : leur effet dure de six à huit heures, elles peuvent être renouvelées toutes les deux à quatre heures.

Comprimés.

Chez l'adulte : 2 à 5 comprimés par jour.

La parfaite tolérance du PRESSYL autorise des doses nettement plus élevées.

Chez l'enfant, à partir de 6 ans, 1 à 3 comprimés par jour

La boîte de 6 ampoules : 22 francs.

La boîte de 36 comprimés : 20 francs.

Assurances Sociales, Classe B.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-32. — Télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.)

PRÉVALIDINE

Forme. — Pommade résorbable en tube gradué.

Composition :

- 1° Camphre et huiles essentielles aromatiques ;
- 2° Baume du Pérou, Acide cinnamique ;
- 3° Extrait opothérapique de peau animale.

Indications. — Grippe, Bronchite, Broncho-pneumonie, Emphysème, Coqueluche, Tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

Présentation. — Tube gradué par onction.

Prix : 12 fr. 80.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.
(Tél. : Trudaine 92-52.)

PRÉZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition :

Peptone de poisson, peptone de viande, extrait sec de quinquina.

Mode d'action :

Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal, Méthode de Pagniez, et Pasteur-Vallery-Radot).

Posologie :

Une à deux dragées une demi-heure avant chaque repas.

Prix : 20 fr. (20 jours de traitement.)

Laboratoires LEBOIME

1-3-5, rue Fernand-Widal - PARIS (XIII^e).
(Tél. : Glacière 24-48.)

PROBIOS

Thérapeutique mixte. Antivirus. Bactériophage.

PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Présentation. — 4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophages
4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages. Anti-Streptococcique, Staphylococciques et Pyocyaniques.

Indications. — Infections pyogènes : Abscesses, Phlegmons, Panaris, Plaies suppurées, Brûlures infectées, Pyodermites et toutes les suppurations. A titre préventif sur les plaies en chirurgie, avant, pendant et après les interventions septiques.

Mode d'emploi : Buvable, injections locales, pansements.

Pommade (Voir à *Pommades PROBIOS*)

Comprimés (Voir à *Comprimés PROBIOS*)

PROBIOS ANTISTAPHYLOCOCCIQUE

Présentation. — 4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.
4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage Anti-Staphylococciques.

Indications. — Acné, Sycosis, Furoncles, Anthrax et toutes les infections à Staphylocoques.

Mode d'emploi : Buvable, injections locales, pansements.

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

Présentation. — 5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophages.
5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

De plus, chaque boîte contient un instillateur nasal.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages, Anti-Streptococciques, Staphylococciques, Friedländer, Proteus, Antivirus Pfeiffer, Pneumocoque.

Indications. — Coryza, Sinusites, Rhinites, Ozène, Otites, Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, Angines, certaines formes d'Asthme. Préventif dans la Grippe et le Coryza.

Mode d'emploi : Buvable, instillations nasales, Gargarismes.

Pommade (Voir à *Pommades PROBIOS*)

Comprimés (Voir à *Comprimés PROBIOS*)

PROBIOS ANTI B. COLI

Présentation :

Adultes :

4 ampoules incolores 5 cc. = Bactériophages.

4 ampoules jaunes 5 cc. = Antivirus.

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores de 1 cc. = Bactériophages.

3 ampoules jaunes de 1 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages Anti-B. Coli, B. Par-Coli, Friedländer et Proteus.

Indications. — Toutes infections provoquées par B. Coli, Para-Coli, Friedländer et Proteus, notamment, Bactériuries, Cystites, Pyélites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Vulvo-Vaginites, etc.

Mode d'emploi : Buvable, instillations vésicales ou dans le bassin.

PROBIOS ENTÉRO-RÉNAL (Voies urinaires.)

Présentation. — Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. (5 ampoules de bactériophage claires et 5 ampoules d'antivirus jaunes).

Principes actifs. — Antivirus et bactériophages de *B. Coli*, para *B. Coli*, typhoïdiques et para-typhoïdiques, A et B ; *B. Friedlander*, *Proteus*, staphylocoques, streptocoques, entérocoques, *B. pyocyaniques*, *B. dysentériques*.

Indications. — Infections de l'appareil génito-urinaire, uréthrites, Cystites, Prostatites, Métrites, Salpingites, Pelvipéritonites, Fièvre puerpérale, Coli-bacilliose, Syndromes entérogénital ou entérorénal.

Mode d'emploi — Par voie buccale ou par voie rectale, ou en injections vaginales.

PROBIOS INTESTINAL

Présentation :

Adultes :

5 ampoules incolores 2 cc. = Bactériophages.

5 ampoules jaunes 2 cc. = Antivirus.

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores 1 cc. = Bactériophages.

3 ampoules jaunes 1 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages Anti-*B. Coli*, *Dysentériques*, *Typhiques* et *Para*, *Friedländer*, *Proteus*, *Staphylococciques*, *Streptococciques*, *Entérococciques*, *Pyocyaniques*.

Indications. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases et tous états toxi-infectieux : Diarrhées des nourrissons : Diarrhées des enfants ; Diarrhées saisonnières : Dysenterie bacillaire.

Mode d'emploi. — Buvable, instillations par voie rectale.

Comprimés (Voir *Comprimés Probios*).

PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE BUvable

Présentation. Traitement complet.

20 ampoules incolores de 5 cc., limpides, contenant le Bactériophages.

20 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps bactériens.

Demi-traitement :

10 ampoules incolores de 5 cc. limpides, contenant les Bactériophages.

10 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps Bactériens.

Principes actifs. — Antivirus Corps Bactériens bactériophages, Antigonococciques, Pseudo-Gonococciques, *B. Coli*, Entéro-cocciques, Streptococciques, Staphylococciques, Bactériophages Anti-entéro-cocciques, Streptococciques, Staphylococciques, *B. Coli*.

Indications. — Urétrites aiguës et chroniques à Gonocoques. Infections urinaires.

Mode d'emploi. — Buvable, applications locales, pansements mèches à demeure.

Vaccin Probios Antigonorrhéique injectable (Voir : Vaccinothérapie Probios).

OVULES PROBIOS

Présentation. — En boîtes de 6 ovules sous cupules.

Principes actifs. — Extraits mous de mélange d'Antivirus et de Bactériophages de staphylocoques, streptocoques, entérocoques, B. Coli, extrait mou d'Antivirus de Diplococcus de Neisser.

Indications. — Affections gynécologiques, Vaginites, Métrites, etc.

Mode d'emploi. — Application locale, laisser l'ovule fondre dans la cavité vaginale.

DENTIFRICE PROBIOS

Présentation. — En tube d'étain.

Indications thérapeutiques. — Antipyorrhéique, Prévient et guérit toutes les affections inflammatoires de la bouche, des gencives et des dents.

Mode d'emploi. — Habituel aux dentifrices.

PROBIOS CREAM

Antipyogène

Présentation. — En tube d'étain.

Indications thérapeutiques. — Contre boutons, dartres, crevasses, engelures, rougeurs de toute nature.

Mode d'emploi. — En applications locales.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

PROCOLYL

Comprimés dragéifiés.

Composition. — Opothérapie hépato-intestinale associée à une action crypto-toxique de premier ordre, douce et très puissante.

Indications. — Toutes les affections atoniques du foie et de l'intestin. Toutes les constipations.

Doses moyennes :

Adultes : 2 comprimés après le repas du soir.

Enfants : 1 comprimé après le repas du soir.

Prix. La boîte de 56 comprimés : 18 francs.

Dépôt chez tous les Grossistes.

Laboratoires du PROCOLYL

E. ROCHE, Pharmacien

9, rue de la Platière — LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

PROCUTA

Topique au Thiodiméthoxyanthranol.

Propriétés thérapeutiques. — Topique actif, non odorant, non irritant. Agent de rénovation et de réfection épidermique.

Le Procuta exerce une action incontestable sur le psoriasis (D^r Brocq).

Indications. — Psoriasis. Pityriasis. Parakératoses psoriasiformes. Kératose pilaire. Dermatoses à formes squameuses.

Mode d'emploi. — Étendre le *Procuta* sur la région malade. Protéger par un pansement.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et Oie, Pharmaciens,
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,

157, rue Championnet. — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

PRODUITS LEMARY

Cartouches Lémary (boîte de 10) pour frictions à l'*Onguent Hg double*.

Suppos Lémary :

Adultes : Boîtes de 10 suppos Hg double 0,04 par suppos.

Enfants : Boîtes de 12 suppos Hg double 0,02 par suppos.

Nourrissons : Boîtes de 12 suppos Hg double 0,01 par suppos.

Un suppositoire chaque soir en se couchant.

Ampoules Lémary, à 3 dosages :

Cy-Hg 0,01 pour 1 cc. de solution stérilisée.

Cy-Hh 0,01 pour 2 cc. de solution stérilisée.

Cy-Hh 0,01 pour 3 cc. de solution stérilisée.

Pilules Lémary (Formules A, B, C) Voir Pilules Lémary.

Produits du D^r Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PRODYNASE

Médication Phosphorée, Calciqne, Magnésinée.

Composition. — Comprimés comprenant :

Méthylphosphate de Chaux	0 gr. 20
Méthylphosphate de Magnésie	0 gr. 05

Propriétés. — Produit introduit nouvellement en thérapeutique par les auteurs. Médication spécifique du système nerveux. Puissant facteur de croissance. Contribue à la formation du squelette. Régulateur de la Nutrition.

Indications. — Surmenage, Croissance, Dystrophie phosphocalcique, Rachitisme, Fractures, Altérations dentaires, Grossesse, Allaitement, Tuberculose, Diabète, Asthénie, Cancer.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 comprimé au début des repas, midi et soir.

Adultes : 2 comprimés au début des repas, midi et soir.
Prix : 21 fr. 30.

Laboratoires A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

PROGASTER

Procédé Hély.

(Nom déposé.)

Sous forme de comprimés.

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Superoxyde de magnésium préparé par une méthode spéciale (procédé Hély), permettant sa décomposition instantanée en présence du suc gastrique en oxygène et en chlorure de magnésium naissants. Chaque comprimé dégage 5 cgr. d'oxygène actif.

Propriétés. — Désinfectant remarquable du tube digestif. Amélioration surprenante de l'état général chez tous les chroniques. Action combinée de l'oxygène et du chlorure de magnésium à l'état naissant.

Indications. — Troubles digestifs, hépatiques, arthritisme, artériosclérose, diabète, toutes asthénies, convalescents. Tous les chroniques, tous les sédentaires.

Mode d'emploi. — Pas de contre-indication, pas d'accoutumance du nourrisson au vieillard.

Chez tous les chroniques : 2 comprimés le matin à jeun.

Dans les troubles digestifs : 2 à 6 comprimés et plus au moment de ces troubles.

Prix : 11 fr. 70.

Dépôt chez tous les Grossistes.

9, rue de la Platière, LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

PROGONE

Chimiothérapie anti-infectieuse par l'Acridine.
Ampoules pour injections intraveineuses et comprimés.

PROGONE (Ampoules) :

Chlorhydrate du 2-7 diméthyl, 3-6 diéthanol amino-acridine en solution glucosée. Ampoules de 10 cc. (boîtes de 5 ampoules).

Indications :

Le Progone est un puissant agent anti-infectieux ; il permet l'acridinothérapie des septicémies, des infections urinaires et surtout de la blennorrhagie avec les meilleurs résultats et sans aucun incident thérapeutique. (Thèses de S. Lurié et de P. Porret, travaux de P. Barbellion, J. Fuchs, etc.).

Propriétés :

Le Progone ne donne pas de choc acridinique ni d'accidents rénaux ou hépatiques, il ne sclérose pas les veines et ne colore pas les téguments.

Posologie :

Blennorrhagie aiguë : 4 à 5 injections intraveineuses par semaine pendant 2 à 3 semaines, ou de préférence une injection quotidienne pendant quinze jours.

Blennorrhagie génito-urinaire chronique de l'homme et de la femme. Complications. Infections urinaires diverses : 1 injection tous les deux jours par série de 15 injections.

Septicémies : un jour sur deux, 2 à 3 injections selon l'état du malade.

Compléter l'action des injections de Progone en prescrivant les jours intercalaires 4 à 8 comprimés de Progone.

Le Progone peut également être administré par voie rectale à raison d'une ampoule pour 1/2 verre d'eau tiède (un lavement le soir et au besoin un autre le matin.)

PROGONE (Comprimés) :

Les comprimés de Progone associent au dérivé d'acridine de la forme injectable :

La Kawaïne (seul balsamique utilisable à la période aiguë); l'Arbutine (calmant et antiseptique bien connu).

Indications :

La blennorrhagie masculine et féminine à toutes ses périodes : urétrites, cystites, prostatites, etc.

Les infections urinaires (pyélonéphrites, colibacillose, etc.).

Posologie :

Blennorrhagie aiguë : 4 à 8 comprimés par jour.

Blennorrhagie génito-urinaire chronique de l'homme et de la femme. Complications. Infections urinaires : 4 comprimés par jour.

BUCCO-PROGONE (Pastilles).

Traitement et prophylaxie des affections bucco-pharyngées.

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 13-31.)

PROLAX **Granulé.**

Simple et Composé.

Laxatif doux, Constipation sous toutes ses formes.

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Le granulé doit être avalé sec en s'aidant d'une gorgée d'eau.

Composition. — Mucilage, Bourdaine, Casse, Sucre glacé.

Laboratoire AUCLAIRE

36, rue de la Tour d'Auvergne

PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 66-15.)

PROLYSES

(Ovules).

Lysats sodiques à 1/10^e d'émulsion microbienne de *gonocoques*, *streptocoques*, *staphylocoques*, *B. coli* et *cuti communis*.

Indications. — *Gynécologie générale*. Métrites, Salpingites et toutes infections microbiennes de l'appareil génito-urinaire chez la femme.

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Prix au public : 22 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N^o 1236-10.

Ch. VERGELOT, Docteur en pharmacie,

6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. Trud. 10-88.)

PROMÉTHINE

Cholagogue et Décongestionnant physiologique.

Forme. — Granulé de saveur agréable.

Composition. — Peptone sèche pure, Sulfate de magnésie anhydre, Salicylate de soude, Extrait fluide de Romarin, Excipient spécial.

Indications. — Insuffisances hépato-biliaires, Lithiasse biliaire, Congestion hépatique et vésiculaire, Ictère et tous troubles d'origine hépatique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, le matin dans 1/2 verre d'eau tiède.

Laisser passer la phase aiguë des Cholécystites. Tâter la susceptibilité des Lithiasiques en commençant par des doses faibles.

Durée moyenne : 10 jours.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS

(Tél. : Danton 81-53.)

PROPAVINE

Propyl-phényl-acétate de diéthylaminoéthanol
(Chlorhydrate).

Propriétés. — Médication spasmolytique agissant électivement sur éléments nerveux et musculaire, non toxique, n'ayant pas les inconvénients de la belladone.

Indications. — Tous les spasmes ; en pathologie digestive, génito-urinaire, pulmonaire, circulatoire ; Maladie de Parkinson, mal de mer.

Présentations :

Solution à 10 p. 100 (flacons de 15 cc.).

Solution à 5 p. 100 (pour injections sous-cutanées, boîtes de 10 ampoules de 1 cc.).

Suppositoires à 0 gr. 10 (boîtes de 10).

Posologie :

Voie buccale : XXX à LX gouttes par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Voie parentérale : 2 à 3 cc. en 2 ou 3 injections.

Voie rectale : 2 à 4 suppositoires.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.

Bactériothérapie cutanée.

Indications :

Toutes plaies suppurées ou exposées à la suppuration. Furoncles, Brûlures : Ulcérations, Engelures, Excoriations, etc.

Présentation. — Tubes étain de 30 grammes.
Prix : 11 fr. 70.

Mode d'emploi. — Applications deux fois par jour ; recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

PROPIDON

(Bouillon stock-vaccin du Professeur Pierre Delbet.)

L'association de cultures de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

Indications :

Staphylococques fébriles, Anthrax, Phlegmons, Panaris, Lymphangites, Erysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination préopératoire.

Posologie et mode d'emploi :

Injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde du contenu d'une ampoule. A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à 3 ampoules.

L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'ailleurs bien supportée.

Présentation. — Boîte de 3 ampoules de 4 cc. Prix : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

PROPIDON

Applications à la Bactériothérapie locale.

Propidon-Pansement :

Étui renfermant 1 ampoule de 5 cc.,
1 compresse, 1 coton, 1 imperméable.

Prix : 5 fr. 85.

Propidon usage externe.

Boîtes de 10 ampoules de 5 cc. sans
pansement. Prix : 26 fr. 50.

Indications. — Plaies cutanées de
toute nature, plaies chirurgicales,
angines, stomatites.

Propidon Stilligouttes :

Boîtes de 6 ampoules compte-gouttes.
Prix : 14 fr. 50.

Indications. — Oto-rhino-laryngologie
(Instillations, méchages).

Suppositoires au Propidon :

Boîtes de 10 suppositoires : Prix : 17 fr. 50.

Indications. — Lésions de la région
anale, hémorroïdes, rectites.

Ovules au Propidon :

Boîtes de 6 ovules. Prix : 17 fr. 50,
avec tampons stériles.

Indications. — Affections gynécolo-
giques, métrites, vaginites, panse-
ments post-opératoires.

Société Parisienne d'Expansion chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines
du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac : 22-94.)

PROSTAL

Suppositoires Sédatifs.

Composition. — Extraits de Jusquiame, Ciguë, Ratanhia, Bromure de camphre, Prostatine, Hypophyse, Surrénine, Stovaine, Anesthésine, Menthol.

Propriétés. — Suppositoires analgésiques, décongestifs, opothérapiques.

Indications. — Affections douloureuses de la prostate et du petit bassin, Hémorroïdes.

Posologie. — 2 à 3 suppositoires par jour. La boîte de 10 suppositoires : 17 francs.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).
(Tél. : Invalides 52-73.)

PROSTALYSE

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition.

Hypophysine...	0,0001	Extrait de belladone...	0,001
Surrénine	0,01	— piscidia	0,01
Prostatine.....	0,02	— cupressus...	0,02
Orchitine	0,02	— œsculus	0,02
		Phosphate de Magnésie.	0,05

Propriétés pharmacodynamiques. — Stimule et régénère les fonctions de la prostate par une association synergique d'extraits de glandes endocrines, décongestionne la prostate par des extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives.

Indications. — Prostatites aiguës et chroniques. Hypertrophie de la Prostate. Congestions pelviennes.

Mode d'emploi. — 2 à 3 dragées à chacun des deux principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

Prix : 17 francs la boîte de 60 dragées pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX
21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

PROSTATIDAUSSE

(Chalones testiculaires prostatolytiques)

Nature du Médicament. — L'adénome prostatique provient de l'hypertrophie de l'utricule, résidu embryologique femelle inclus dans la prostate.

Cette formation reste atrophiée tant que le testicule fonctionne et exerce son action empêchante (effet de chalone); quand le déficit testiculaire survient, l'utricule se développe anormalement, écrase le canal de l'urètre et le prostatisme apparaît.

Le Prostatidausse est un extrait testiculaire de pouvoir chalonique très élevé. — Son activité est maintenue grâce à la dissolution de la chalone dans son milieu quasi naturel, c'est-à-dire le sérum de taureau. — Il est présenté sous forme d'ampoules de 5 cc. à utiliser par la voie buccale.

Indications thérapeutiques. — A titre préventif, le Prostatidausse sera pris par tous les sujets avoisinant la cinquantaine, surtout s'ils présentent un peu de dysurie et de la pollakiurie nocturne.

A titre curatif, il peut être utilisé à toutes les périodes de l'hypertrophie de la prostate, même dans les cas avancés; il fait parfois réapparaître la possibilité des mictions spontanées.

Posologie et Mode d'emploi. — (Ampoules buvables, à prendre le matin à jeun.)

A titre préventif, 6 à 12 ampoules par mois.

A titre curatif, 12 ampoules par mois à raison d'une ampoule par jour, pendant 12 jours consécutifs, ou une ampoule tous les deux jours pendant 24 jours, le matin à jeun demi-heure avant le petit déjeuner dans demi-verre d'eau sucrée. Le médicament ne provoque aucune réaction; il est bien toléré par l'estomac et ne comporte aucune contre-indication.

Laboratoire DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — Tél. : Turbigo 63-40.

PROSTATOLS BEAUXIS LAGRAVE

Suppositoires calmants, fondants, décongestifs, anti-infectieux, résolutifs de toutes affections prostatiques, aiguës ou chroniques.

Composition. — Ion Hg + (très petite dose) extrait de solanées et de papavéracées, Hamamélis, Hormones prostatiques totales.

Indications thérapeutiques. — Toutes douleurs, Inflammations (prostatites aiguës ou chroniques), Blennorrhagie et ses complications génito-urinaires, Ténésmes, Contractures, Spasmes divers, Pollakiurie nocturne, Pesanteurs et irradiations périnéales,

Hypertrophie (adénomes-tumeurs) et toutes affections de la prostate, opérables ou non (suites opératoires).

Mode d'emploi. — Le plus habituel, un le soir au coucher.

(En boîte de dix suppositoires.)

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergique.

Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 cgr. de fer et 5 mgr. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 16 fr. 65:

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer, St-Mandé (Seine).

(Tél. : Daumesnil 10-38.)

PROSTIGMINE « ROCHE »

Péristaltigène synthétique.

Composition. — Ester-diméthylcarbamique du *m*-oxyphényltriméthylammonium-méthyl-sulfate.

Propriétés. — Action rapide et sûre sans aucun effet sur l'activité cardiaque et la pression sanguine.

Indications. — *En Injections*, (ampoules de 1 cc. dosées à 1/2 mgr.). Atonie intestinale post-opératoire, Atonie réflexe post-partum et post-abortum, Douleurs abdominales, Rétention d'urine post-opératoire, Spasme de l'uretère, Obstruction intestinale du nourrisson intoxiqué, etc.

En comprimés (dosés à 15 mgr.), Dystrophies musculaires, Myasthénies, Myopathies, etc.

Posologie et modes d'emploi. — Pour provoquer l'évacuation des gaz : 1 ampoule de 1 cc. le lendemain de l'opération. Pour provoquer l'évacuation alvine : 1 ampoule de 1 cc. suivie d'un lavement de 200 cc. d'une solution glycinée à 10 p. 100 une demi-heure après l'injection. **Dans les myopathies** et surtout dans la **myasthénie**, la prostigmine s'administre à des doses variant de 2 à 5 ampoules de 1 cc. par voie sous-cutanée 2 à 3 fois par jour ou mieux 2 à 6 comprimés par jour par voie buccale.

Présentation. — La Prostigmine « Roche » se présente sous deux formes : *Ampoules* de 1 cc. dosées à 1/2 mgr. pour injections sous-cutanées ou intramusculaires et *Comprimés* dosés à 15 mgr.

Ampoules : boîte de 6. Comprimés : flacon de 20.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 504-56 (ampoules), 504-85 (comprimés).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

PROSYMPAL

(883 F.)

Chlorhydrate de benzo (diéthylaminométhyl)-dioxane
Chimiothérapie sympathicolytique.

Indications. — Traitement symptomatique de l'angine de poitrine.

Présentations et Posologie :

Comprimés : Dosés à 0 gr. 05 (tubes de 20).

Ampoules : De 2 cc. dosées à 0 gr. 05 (boîtes de 10).

Un comprimé midi et soir avant les repas. Injection sous-cutanée ou intramusculaire de 1 ampoule à renouveler dans la journée en cas de besoin.

Prix de vente :

Le tube de 20 comprimés : 25 fr.

La boîte de 10 ampoules : 25 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

PROTENSÈNE LEJEUNE

Composition. — V gouttes contiennent :

Iode bisublimé	1 cgr.
Peptone de cœur	4 cgr.
Extrait fluide stabilisé de gui	5 cgr.
Extrait fluide stabilisé de genêt	1 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — Propriétés de l'iode et des iodures sans *iodisme*.

La *Peptone de cœur* est un agent thérapeutique précieux de la débilité myocardique constitutionnelle et de la dégénérescence myocardique acquise.

L'*extrait de gui* est un hypotenseur éprouvé, il régularise les battements du cœur.

Le *genêt* est en même temps un toni-cardiaque et un diurétique.

Indications. — Hypertension, artériosclérose, affections cardio-vasculaires.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes à chacun des 2 principaux repas.

Prix : 17 fr. 70.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél. Dorian 47-00.)

PROTÉODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Composition. — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses.

Formes. — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injectons hypodermiques **indolores**.

Jamais de **choc**, ni de **réactions anaphylactiques**.

Propriétés. — Par ses effets **préventifs** et **cura-tifs** des infections fébriles et des intoxications, la **Protéodyne** est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications. — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, **puerpérales**, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furunculose ; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique : Asthme vrai, Asthme des foins, Migraines, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protéodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

Prix : La boîte 4 ampoules Protéodyne, 20 fr. 80.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

Littérature et Echantillons sur demande au

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.

29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

PROTIODYNE DRAGÉES

Composition. — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

Propriété. — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

Indications. — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

Forme. — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

Doses et mode d'emploi. — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées.

Enfants : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau.

Prix : la boîte de 50 dragées Protidyne ; 18 fr. 70.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.
29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

PROVAC'S

Vaccin polyvalent, injectable par voie sous-cutanée, constitué par les microbes anaérobies pathogènes de la flore bucco-pharyngo-dentaire.

Composition. — Spirochæta microdentium, Spirochæta macrodentium, Leptospira buccalis, Bac. fusiformis, Bac. ramosus, Staphylococcus parvulus, Micrococcus foetidus.

Indications :

Préventivement : avant toute opération effectuée dans la cavité buccale ou ses annexes.

Curativement : toutes les affections dues à la flore bucco-dentaire : angines, stomatites, abcès et phlegmons de l'amygdale, adénoïdites, sinusites, accidents de la dent de sagesse, arthrites dentaires aiguës et chroniques (pyorrhée), alvéolites, suppurations chroniques broncho-pulmonaires, asthme.

Posologie et mode d'emploi :

Lieu d'injection : face postérieure du bras.

Mêmes doses pour les enfants et pour les adultes.

La grossesse n'est pas une contre-indication.

Cas aigus : 2 cc. d'emblée et 1 cc. matin et soir.

Cas subaigus : 0,5 cc. à 1 cc. par jour.

Cas chroniques : débiter par 0 cc. 1, augmenter lentement, espacer les injections (2-3 jours).

Précautions. — Les asthmatiques, les eczémateux, les malades atteints de suppurations fétides broncho-pulmonaires sont quelques fois hypersensibles au Provac's ; il est indispensable de ne commencer leur traitement que par de très faibles doses 1/20^e ou 1/10^e de cc.

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 1 cc., pour la vente au public. Boîte de 20 ampoules, pour dentistes et hôpitaux exclusivement.

Laboratoire Pharmaceutique DAUFRESNE
42, rue Thiers — LE HAVRE.

PROVEINASE MIDY

(Comprimés) Type de l'Endocrino-Phytothérapie veineuse.

Composition :

- 1° Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : Cupressus, Genêt, Marron d'Inde, Hamamélis et Viburnum.
- 2° Poudres *titrées* d'organes *frais*, prélevés aux abattoirs de Paris, obtenues dans nos Laboratoires par procédé spécial MIDY : **Thyroïde** 0,005, **Surrénale** 0,025, et **Hypophyse** 0,015.

Ces poudres sont mises en comprimés *dès fabrication*.

Propriétés thérapeutiques. — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictives de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi :

États chroniques : 2 à 4 comprimés par jour.

États aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Prix : 17 fr. 20.

Durée du traitement : 10 à 15 jours.

Remboursée à 80 % aux Assurés Sociaux (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

PROXYTOL

Composition. — Association des diastases tissulaires des organes de la digestion (foie, estomac, intestin, pancréas).

Propriétés. — Régénérateur des fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies, Entérites, Insuffisance hépatique, Gastro-entérite des nourrissons.

Forme. — Boîte de 36 comprimés.

Posologie.

Adultes : Croquer de 4 à 6 comprimés par jour, le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-dose.

Nourrissons : 2 à 4 comprimés dissous dans l'eau à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

Prix : 14 fr. 50.

Remboursement aux Assurés Sociaux : Cat. B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

PRUNAGAR

Pruneaux, Agar-Agar, Cholagogues végétaux.

Le **PRUNAGAR** est sans danger ; son efficacité est souveraine pour le traitement de la constipation chronique ou accidentelle et de toutes ses conséquences (vertiges, migraines, énervements, pituites, glaires, états nauséeux, dyspepsies, congestions, etc.), il devient un parfait régulateur de l'intestin.

Le **PRUNAGAR** n'irrite pas l'intestin en forçant sa muqueuse à sécréter ; il provoque des contractions douces, semblables à celles qu'on obtiendrait par un massage bien fait.

Le **PRUNAGAR** est en dragées, en forme de lentilles ; d'un emploi facile, en avaler sans croquer une ou deux dragées, avant ou pendant le repas du soir, suivant le résultat cherché. La selle arrive naturellement le matin, sans colique, ni douleur.

En boîte aluminium de 50 dragées. Prix : 14 fr. 55.
L. N. C. 428-1.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH,
Pharmacien

18, rue des Écoles — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 18-54.)

PRURILYSE

Spécifique du Prurit.

Composition :

Chloral, acide acétique, eau distillée double d'Hamamélis, glycérine, eau de menthe.

Indications :

Prurit anal, vulvaire, sénile, etc. Urticaire, Herpès, Prurigo, Piqûres d'insectes et toutes démangeaisons.

Mode d'emploi :

Lotionner les parties atteintes de Prurit, une ou plusieurs fois par jour.

Produit non toxique, ne tache pas, ne graisse pas.

Prix : 17 fr. le flacon.

— 8 fr. le flacon d'essai.

Laboratoire R. ROUSSEL

72 Grande Rue — FLERS (Orne).

PSORÉAL DRAGÉES

Traitement interne du psoriasis et autres dermatoses.

Composition. — Soufre — Hyposulfites de Na et Mg. — Bi-Tartrate de K. — Résine de Gayac — Rhubarbe.

Propriétés. — Médication anti-choc et de désensibilisation. Action du S. sur cellule hépatique et élimination de la peau. Action stimulante de tous les composants sur les glandes de défense : Hépatobiliaires, Rénal, Sudoripares.

Indications. — Traitement interne du *Psoriasis*, des *Eczémas*, Herpès, Prurits, Urticaires et autres dermatoses pouvant provenir d'une auto-intoxication, anaphylaxie, floculation ou d'une imprégnation de l'organisme par des toxines alimentaires, médicamenteuses, etc...

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 dragées au début des 3 repas (moyenne 6 par jour).

Enfants : 1 à 3 dragées par jour, suivant l'âge. Durée habituelle du traitement : un mois.

Enregistré au L. N. C. M. et autorisé pour les Assurances Sociales.

Prix : le flacon de 60 dragées : 18 fr. 75 franco France et Colonies.

Laboratoire ÉON

à DINAN (Côtes-du-Nord).

PSORÈNE GOUTTES

Traitement interne du psoriasis.

Composition. — Gouttes iodo-arsénicales-hydrargyriques-méthylarsinées.

Propriétés thérapeutiques. — Action spéciale de As — I — et Hg pour combattre l'imprégnation de l'organisme par les toxines microbiennes d'origine suspecte, acquise ou héréditaire (Φ ou Σ souvent associées).

Indications. — *Traitement interne du psoriasis* (ou d'entretien avec piqûres ou cures thermales). Affections héréditaires, Déchéance organique hérédos-spécifique, Lupus.

Mode d'emploi. — 1° *Enfants*. 1 à 11 gouttes par jour et par année d'âge, en 2 ou 3 fois, à partir de 2 ou 3 ans.

2° *Adultes* : X à XX ou même XXX gouttes 2 à 3 fois par jour, soit de XXX à LX ou XC gouttes par 24 heures. Dose habituelle LX gouttes par jour. Commencer par XXX gouttes par jour en augmentant, rester 20 jours à la dose maxima, revenir au point de départ et suspendre 10 jours. Recommencer le traitement.

Produit enregistré au L. N. C. M. et autorisé pour les Assurances Sociales.

Prix : le flacon : 18 fr. 75. Envoi franco France et Colonies.

Laboratoire ÉON

à DINAN (Côtes-du-Nord).

PSORÉON

Traitement local du Psoriasis seulement.

Composition. — Médication Chrysophanique-Hydrargyro-Cadique, sous forme pommade en tubes.

Propriétés. — Spécifique du *Psoriasis*. Réducteur complet, anti-prurigineux et kératoplastique. Spécialité efficace, pratique, non irritante.

Indications. — Unique en son genre, ce médicament est réservé au traitement local du *Psoriasis* et des affections psoriasiformes.

Mode d'emploi. — En applications pendant la nuit après un sérieux nettoyage des plaques.

Présentation. — Tube ordinaire : 20 fr. 80. Tube très grand modèle : 52 francs. Conditions spéciales aux Hôpitaux, Sanatoria, Cliniques, Dispensaires, etc... Envoi franco France et Colonies.

Enregistré au L. N. C. M. et autorisé pour les Assurances Sociales.

Laboratoire ÉON, à DINAN (Côtes-du-Nord).

PSORYL

Composition. — Dérivé anthranolique.

Indications. — Traitement externe :

- 1° *Dermatoses squameuses* ou sèches non irritables.
Psoriasis, Parakératoses, Eczémas squameux ou secs, non irritables, Eczématides, Lichens plans chroniques, Lichénifications secondaires.
- 2° *Dermatoses parasitaires* : Trichophyties, Epidermophyties, Erythrasma, Pityriasis, Eczémas mycosiques, Teignes, Tokeleau.
- 3° *Dermatoses diverses* : Pelades.

Formes. Mode d'emploi :

- 1° **Solution.** S'emploie dans le *Psoriasis* du tronc et des membres (action rapide, procédé propre, sans odeur), les parakératoses, les pelades.

Un badigeonnage léger le soir.

- 2° **Pommade.** Une application le soir.

Prix : Psoryl solution ou Psoryl pommade : 18 fr. 70.

Laboratoire R. SAVOIRE

Docteur en Pharmacie,
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

VENDOMÉ
(Téléph. 26.)

PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

Indications thérapeutiques. — Parakératoses psoriasiformes. Psoriasis avec ou sans arthropathies.

Présentation. — Ampoules de 3 cc. avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. sans anesthésique pour injections intraveineuses.

Posologie. — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule au maximum, et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Séries de 30 injections.

Boîte de 10 ampoules : 30 fr. 75.

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire : Psothanol en amp. de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 25 fr. 65.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Europe 49-50.)

PSYLLIUM LANGLEBERT

Composition :

Semences de Psyllium noir de Provence, sélectionnées et triées à la main, ne renfermant ni pierre ni débris végétaux.

Indication :

Par le mucilage qu'elles contiennent, les semences de Psyllium Langlebert augmentent le volume du contenu intestinal ; ramollissent les selles dures et agglutinent les selles liquides. Recommandé aussi bien dans la constipation que pour l'entérite.

Mode d'emploi :

Une à deux cuillères à soupe le soir dans le potage, ou pur, et après, absorption d'un demi-verre d'eau.

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 04-49.)

PULMO BAILLY

Anciennement

PULMOSÉRUM

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 363-5).

Forme. — Solution.

Solution codéinée de Gaïacol synthétique en milieu phosphorique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Modificateur de l'expectoration. Sédatif de la toux. Antiseptique des voies respiratoires. Reconstituant de l'état général.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires. — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau, à prendre dans la journée ou au milieu des deux principaux repas.

Le flacon de 270 cc. : 17 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome - PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 62-30.)

PULMOCARDINE

SIMPLE

Indications. — Affections dyspnéiques pulmonaires et cardio-pulmonaires : *Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Scléroses pulmonaires, Gazés de guerre.*

Composition. — *Dragées faciles à prendre.*

Iodure de Caféine. Grindélia. Lobélia. Quebracho.

Doses. — 2 dragées au début des 2 repas.

Traitement pour 10 jours : 18 francs.

CONTRE TOUTE CRISE AIGÜE DE DYSPNÉE :

Remplacer la Pulmocardine simple
par **Pulmocardine ÉPHÉDRINÉE**

1 dragée toutes les 1/2 heures, jusqu'à effet.

Soulagement Immédiat.

Littérature et échantillons :

Laboratoires J. PERROCHON

TOURS

PULMODION

1° Tube de 30 comprimés à base de Dionine.

Chaque comprimé représente :

Dionine (chlorhydrate d'éthylmorphine)	0,004
Extrait d'Aconit	0,003
Extrait de Belladone	0,003
Extrait de Marrube	0,10
Extrait de Drosera	0,01
Terpine	0,05

2° Sirop à base de Dionine, Sulfogaiacolate de potasse, Bromoforme.

Indications. — Affections respiratoires, Traitement énergique de la toux et de l'oppression dans les cas de bronchite, Trachéite, Laryngite, toux nerveuses.

Grâce à la Dionine, activité remarquable sans *accoutumance* et tolérance parfaite par l'estomac.

Mode d'emploi. — Par 24 heures :

1° *Comprimés* : enfants à partir de 10 ans : 2 à 4 comprimés suivant l'âge.

Adultes : 4 à 6 comprimés à prendre en dehors des repas.

Avaler sans sucer ni croquer.

2° *Sirop* : enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 5 cuillerées à café.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Contenance du flacon de sirop : 220 grammes.

A prendre le plus loin possible des repas. Prix : 17 francs.

Laboratoires JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Marcadet 37-98.)

PULMODYNOL

Spécifique broncho-pulmonaire tonique et eupnéique.

Formule :

Chlorhydrate d'Ephédrine	0 gr. 05	Codéine	0 gr. 015
Sulfate de Spartéine... ..	0 gr. 075	Alcoolature rac. d'acé- nit.....	0 gr. 36
Chlorhydrate d'éthyl- morphine	0 gr. 015	Teinture de Belladone..	0 gr. 36
Acide phosphorique ..	1 gr.	Teinture de Drosera ..	0 gr. 72
Sulfogaiacolate de po- tasse	1 gr. 10	Teinture de Grindelia..	0 gr. 72
		Essence de Rhum.....	0 gr. 09
		Sirop de sucre q. s. p...	100 gr.

Flacon de 210 gr. environ. Prix : 16 francs.

Particularités. — Contient éphédrine, spartéine et acide phosphorique associés aux sédatifs de la toux et aux antiseptiques pulmonaires. Goût très agréable. Tolérance absolue.

Emploi. — De 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. } Existe en ampoules
1 à 2 par jour.

Ampoules : Lécithine, Goménol, Eucalyptol, Cholestérine, Strychnine.

Ampoules de 2 cc.

Indications. — Affections pulmonaires aiguës et chroniques. Bronchites, Emphysème, Asthme, Catarrhe, Grippe, Laryngites.

Laboratoires du SEDARTHRYL

(Antirhumatismal.)

A. GONTARD

22, rue de Nemours — PARIS.

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PULMOFLUIDE

Élixir glycéro-**Alcoolique** sucré de **Terpine** et **Terpinol** associés aux principes balsamiques du **Tolu**, **benjoin**, **eucalyptus**.

Fluidifiant et aseptisant les sécrétions bronchiques, dont l'expectoration est facilitée par l'**Ipéca**.

Les propriétés décongestives de l'**ipéca** s'ajoutent à celles de l'**Aconit**. La **sédation** de la toux est obtenue par de faibles doses de **Belladone** et surtout par la **Codéine**, le plus sûr et le plus inoffensif des alcaloïdes de l'opium.

Indications. — **Rhumes**, **Bronchites**, **grippe**, **Congestions pulmonaires**, **Broncho-pneumonie**, **Tuberculose pulmonaire** et, en général, tous les cas où un **Dégagement broncho-pulmonaire** s'impose rapidement.

—— Le Pulmofluide fluidifie ! ——

Pas de contre-indications.

Doses. — 3 à 5 petits verres à liqueur par jour, pur ou dans un liquide quelconque.

Prix : 13 francs le flacon de 180 cc.

PULMOFLUIDE ÉPHÉDRINE

Même formule que le précédent avec 1 centigramme de chlorhydrate d'**Ephédrine g.** par cuillerée à soupe.

—— Eupnéique incomparable. ——

Indications principales. — **Asthme bronchique**, **Emphysème**, **Tra-chéo-bronchite**, **Bronchite chronique**, **Oppression**, **Tuberculose pulmonaire ouverte**.

Contre-indications. — États hypertensifs, **Myocardites**, **Néphrites**.

Mode d'emploi. — **Doses :**

Adultes : 1 cuillerée à soupe 4 à 5 fois par jour.

Au-dessus de 10 ans : 1 cuillerée à dessert 4 à 5 fois par jour.

Au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café 4 à 5 fois par jour.

Comme préventif et curatif de la crise d'asthme :

1 cuillerée au début de l'accès, puis de 2 heures en 2 heures, sans dépasser la dose quotidienne.

On pourra prévenir la crise en prenant 1 cuillerée 1 heure ou 2 heures avant son apparition habituelle.

Présentation. — En flacon de 180 cc. Prix : 14 fr. 50.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 46.

Laboratoire LEURQUIN
DREUX

PULMOGROG

Seul sédatif de la toux ne produisant ni constipation, ni inappétence, ni dépression.

Aucune notice intérieure.

Pulmogrog adultes, sans stupéfiants.

Élixir agréable (Dionine, bromoforme, aconit, noix vomique et cannelle).

Prix : 12 fr. 50.

Doses :

3 à 5 cuillerées à café de 5 à 10 ans.

3 à 5 — à dessert au-dessus et vieillards.

3 à 5 — à bouche pour les adultes.

Pulmogrog enfants, sans toxiques.

Sirop agréable aux bromures (Ca, Mg, AzH_4 , chloral drosera, belladone). Toux spasmodiques, coqueluche.

Doses :

Par demi-cuillerées à café jusqu'à 1 an.

3 à 5 cuillerées à café de 1 à 3 ans.

3 à 5 — à dessert de 3 à 5 ans.

Par cuillerées à soupe au-dessus.

Prix : 10 fr. 50.

Laboratoire FERCOCQ, Licencié ès Sciences

LA VARENNE-SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 03-97.)

PULMONAIRE ^{Dr} PAUL BOURGOGNE

Le calmant de la Toux.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient :

Extrait d'Opium	0 gr. 01	Teinture Aconit	0 gr. 08
Codéine	0 gr. 01	Teinture de Grindelia ..	0 gr. 05
Thiocolum	0 gr. 15	Teinture de Lobélie ..	0 gr. 05
Eau de Laurier-Cerise..	0 gr. 40	Sirop de Punch. Q.S.	20 gr.

Avantages. — Formule très active et très agréable : donne dans une tasse d'eau chaude un véritable grog au punch.

Posologie. — 3 cuillerées à soupe par jour :

Une à 9 heures du matin, une à 3 heures après-midi, une à 9 heures du soir, dans une infusion de fleurs pectorales.

Au besoin une 4^e cuillerée au cours de la nuit.

Indications. — Bronchites chroniques, gripes, rhumes négligés, asthme.

Présentation. — Flacon contenant 12 cuillerées à soupe.

Comme complément pour les affections de la gorge : Collutoire et gargarisme concentré :

BORSALYL

Triple association de Borate, Benzoate et Salicylate de Soude.

Flacon de 45 cc.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). (Tél. : Gobelins 36-96.)

PULMORECTOL

(Ampoules).

(Suppositoire adultes et enfants).

Forme. — Ampoules et Suppositoires (Adultes et enfants).

Composition. — Héléline, Codéine et essences balsamiques pures.

Indications. — Bronchites, Pneumonies, Broncho-Pneumonies, Coqueluche, Tuberculose et abcès fistuleux.

Posologie. — Une ampoule de 2 cc. à mélanger dans une cuillerée à soupe de lait en lavement à garder, ou suppositoires.

Prix : (Ampoules : 22 francs.
(Suppositoires : 18 fr. 75.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, r. des Moines, Paris 17^e. (Tél. : Mar. 04-02.)

PULMOREX

(109 M.).

Traitement des Streptococcies et des Affections broncho-pulmonaires.

Composition. — Nouveau dérivé soluble de la paraaminophénylsulfamide, très actif, ne donnant pas d'anémie, sans action nocive sur le sang.

Indications. — Bronchites chroniques, Affections du cavum, Affections broncho-pulmonaires aiguës et subaiguës, Traitement des Streptococcies, Erysipèle, Fièvre puerpérale, Traitement des Ménin-gococcies et des Gonococcies.

Formes. — Comprimés, ampoules pour injections intraveineuses.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour au milieu des repas. Dans les formes aiguës, 6 à 10 comprimés par jour.

Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine). (Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

PULMOSEPTINE

Dragées.

Composition. — Eucalyptol, Phosphate de Gaïacol, Terpène, Cinnamate de Soude, Codéine, Lactate de Chaux.

Indications. — 1° *Toutes affections aiguës et chroniques des voies respiratoires supérieures* : Rhino-pharyngites, Laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, bronchites aiguës, gripes à forme respiratoire, etc...

2° *Etats chroniques* : Laryngites chroniques, catarrhe respiratoire des fumeurs, bronchites chroniques, etc.

3° *Toux nerveuses de toute origine* : toux spasmodique, coqueluche et toux coqueluchoïde, accidents mineurs de l'asthme, etc.

Forme et posologie. — Un flacon de 48 dragées.

Adultes : 6 à 8 dragées par jour dans les états aigus, 3 à 4 dragées par jour dans les états chroniques.

Enfants : demi-doses.

A prendre à n'importe quel moment de la journée (avant, pendant ou après les repas).

Prescrire par exemple : 3 dragées à avaler avant le repas du soir et 3 avec une infusion chaude avant dormir.

Aucune contre-indication. — Ne provoque pas de constipation. N'irrite pas l'estomac.

Prix : 15 fr. 75, taxe comprise.

Laboratoires des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Docteur en Pharmacie,
183, rue de Rome — MARSEILLE.

PULMOSITOIRES

Forme. — Suppositoires créosotés.

Formule :

Adultes : XXX gouttes créosote par suppositoire.

Enfants : X gouttes créosote par suppositoire.

Indications. — Bronchites, broncho-pneumonies, pneumonies, prévention des complications post-opératoires.

Prix : 17 fr. 70.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Mon. 33-86.)

PULMO-THIORINE

Opothérapie pulmonaire. Extrait trachéo-broncho-pulmonaire. Hypo-sulfite de soude et de magnésie granulé.

Thérapeutique de fond de toutes les affections pulmonaires subaiguës et chroniques et de toutes les suppurations de l'arbre respiratoire et de ses annexes.

Indications. — Ozène, Sinusites. Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge, et des bronches. Adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites. Trachéo-bronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Gangrène pulmonaire. Catarrhes chroniques. Bronchites persistantes des gazés et des vieillards. Tuberculose pulmonaire (formes torpides et formes sécrétantes). Pneumonies et séquelles de pneumonies. Pleurésies séro-fibrineuses. Pleurésies purulentes de la grande cavité de l'interlobe ou du médiastin. Kystes hydatiques pulmonaires suppurés, fistulisés. Ostéo-arthropathies pneumiques.

La cuillerée à café 5 gr. de granulés renferme : 0,25 d'extrait pulmonaire, 0,20 d'hyposulfite de Na, et 0,05 d'hyposulfite de Mg.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café 3 fois par jour avant les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose.

Prix : 17 fr. 65.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien,

39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

PULSAMONE

Antispasmodique végétal.

Composition. — Anémone pulsatille, Gui, Passiflore, Saule Blanc, Mélisse, Aubépine.

Forme. — Solution aromatique, de saveur agréable.

Propriétés. — Médication équilibrante du système nerveux central ; action complémentaire efficace dans les névroses liées à l'irritabilité du sympathique.

Avantages. — Composition strictement végétale ; absence rigoureuse de stupéfiants et de barbituriques.

Indications. — Nervosisme, Insomnies, Anxiété, Aéro-phagie, Troubles cardiaques et menstruels d'origine nerveuse, et tous cas de déséquilibre vagosympathique.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 fr. 65.

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol (*faible dose*), eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

INDICATIONS. — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.*

— Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du cavum, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

Affections respiratoires. — Trachéo-bronchites, grippe à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies ; dentifrice en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

MODE D'EMPLOI. — **Poudre** : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche. Contenance du flacon 100 grs.

Pastilles. — 8 à 10 par jour. Boîte de 40 pastilles.

Prix : Poudre : 14 fr. 90 — Pastilles : 5 francs.

Laboratoire JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Marcadet 37-98.)

PULVITA

Poudre des 4 Gluconates (Mn, Mg, Ca, AzH⁴).

Licence exclusive Sandoz.

Pulvita est employé en pansement local dans les affections pulmonaires en particulier.

Prix : 22 francs et boîte grand modèle contenant 7 boîtes ordinaires, au prix de 6 boîtes : 130 francs.

Traitement appliqué en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur électrique ou à alcool, dit pulvérisateur « Pulvita » appareil indispensable pour pouvoir suivre un traitement par **Pulvita** dans de bonnes conditions.

Prix : Elect. : 170 fr. 50. — Alcool : 128 francs.

Pulvita est admis aux Assurances sociales.

Pour toute documentation écrire aux

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Auteuil 11-86.

PURARGOL

Composition. — Solution stérilisée et titrée d'Argent colloïdal chimiquement pur à 5 p. 100.

Présentation. — Ampoule compte-gouttes scellée, très pratique à l'emploi.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant dénué de toute causticité et toxicité. Action surtout catalytique s'opposant au développement des bactéries.

Indications. — Antisepsie préventive et curative dans les maladies infectieuses (grippe, scarlatine, etc.) ; en Rhino-Laryngologie (coryzas, sinusites, rhinites, angines, laryngites) ; en Otologie (otites, abcès, écoulements) ; en Oculistique (inflammations et infections oculaires, conjonctivites, blépharites, etc.).

Mode d'emploi. — *Rhinologie* : IV à V gouttes dans chaque narine, une ou plusieurs fois par jour.

Otologie : quelques gouttes dans l'oreille malade deux ou trois fois par jour.

Oculistique : introduire deux fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

Obstétrique : introduire I ou II gouttes dans chacun des yeux du nouveau-né, sitôt sa première toilette faite.

Durée de traitement : 15 à 25 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS — OULLINS (Rhône).

PURGANOL DAGUIN



Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 25 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage. Laxatif préféré des nourrices.

Le flacon contient 20 pastilles soit 40 doses laxatives. Prix : 8 fr. 50.

Échantillons sur demande aux

Établissements DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine). (Tél. : Gravelle 00-27.)

PURGAREX

Comprimés plats dragéifiés inaltérables.

Toutes les constipations.

Ne donne pas de coliques.

Composition. — Produit phyto-opothérapique formé par l'association de principes végétaux (Podophyllin, Boldo, Artichaut, Evonymine, Cascara, Agar-Agar, Jusquiame, Belladone), avec des extraits de glandes intestinales et biliaires.

Propriétés. — Laxatif doux et sûr. — Cholagogue. — Rééducateur des fonctions hépatiques et intestinales.

Indications. — Toutes les *constipations*. — Toutes les affections *hépatobiliaires* et leurs conséquences. — *Artériosclérose* et Hypertension. — *Cholestérinémie*.

Doses et mode d'emploi. — Une ou deux dragées le soir au repas. Avaler sans croquer. Ne donne pas de coliques.

Autorisé par les Assurances Sociales.

S. G. R. Pr. Ph.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoire du PURGAREX

Louis CAVALLIER, Pharmacien

Lauréat de l'Ecole de Pharmacie

58, rue du Rempart — VALENCIENNES (Nord).

PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyogène.

Composition. — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pomme ni un pansement gélosé. C'est une gelée *molle, non grasse*, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyogène (*staphylocoques, streptocoques, b. coli, entérocoques, b. pyocyaniques*).

Avantages. — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

Indications. — Abcès, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intertrigo, Eczémas suintants, Ulcères, Syco sis, Mastites, Orgelets, Plaies infectées, Brûlures, etc...

Mode d'emploi. — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

En tubes de 70 grammes.

Laboratoires des *Ampho-Vaccins Ronchèse*.

A. D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Tur. 72-34.

PYOCOLINE

Acidifiant, Antiseptique urinaire Diurétique.

Composition. — Chlorure d'Ammonium, Chlorhydrate d'Ortho-oxyquinoléine, Terpène.

Indications. — Colibacilloses, Cystites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Lithiases (oxaluriques et phosphaturiques), Cystites des prostatiques.

Forme. Mode d'emploi. — Comprimés glutinisés, 6 à 10 par jour au milieu des repas.

Prix : 18 fr. 70.

Laboratoires R. SAVOIRE

Docteur en Pharmacie

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

VENDOME (Loir-et-Cher).

(Tél. : 26.)

PYODARSÉNOL « INAVA »

Fuso-Strepto-Vaccin Inava « B »
associé au **Sulfarsénol**.

BACTÉRICIDE — SCLÉROSANT —

ANTISPIRILLAIRE.

Trois formes :

Pâte dentaire bleue immunisante pour l'hygiène quotidienne (Voir à *Inava*).

Gelée pour massage gingival.

Injectable (boîte de 10 ampoules).

Laboratoires INAVA

E. Guignier, Pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

PYODOLYSINE

Dentifrice antipyorrhéique

Méthode de désensibilisation des muqueuses buccale et gingivale par l'hyposulfite de sodium.

Action topique et antiseptique (phénol camphré, iode, thymol).

Action hémostatique, tonique et astringente (acide gallotanique).

Formes : 1^o *Pâte Gingivale en tube.*

2^o *Solution Topique.*

Mode d'emploi. — 1^o. — A) Brossage biquotidien des dents et des gencives avec une brosse dure ou demi-dure recouverte d'un ruban de pâte.

B) Rinçage de la bouche avec un verre d'eau bouillie auquel on aura ajouté de 30 gouttes à une demi-cuillerée à café de Solution Topique.

2^o. — Attouchements des gencives 2 à 3 fois par semaine avec la Solution Topique pure.

Particularités. — Pâte dentifrice colloïdale. Grâce à un excipient spécial, la pâte PYODOLYSINE constitue un Gel maintenant ses principes actifs dans un état moléculaire parfaitement dispersé, ce qui leur assure un meilleur contact avec les muqueuses.

Indications. — Pyorrhée alvéolaire, Stomatites mercurielles, Gingivites, aphtes ; Gencives sanguinolentes, tuméfiées ou douloureuses ; Dents déchaussées.

Employé comme Dentifrice courant, assure une parfaite hygiène dentaire.

Prix au public : Pâte : 12 fr. 50. — Topique : 20 fr. 80.

Durée du tube de pâte : environ trois mois.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les Nos 1569-2 et 1569-3.

Echantillons sur demande :

Laboratoire de la PYODOLYSINE

F. MARTIN, Pharmacien

2, rue des Trois-Mages, MARSEILLE. — (Tél. Lycée 60-31.)

PYOFORMINE

Ampoules de 2 cc.

Mélange de leucocytes et ferments sécrétés par les globules blancs en suspension dans une solution physiologique d'*Uroformine Gobey* (Leucocytothérapie).

Propriétés thérapeutiques. — Médication préventive et curative de toutes les infections microbiennes non chroniques. Doit être injectée dès l'apparition des symptômes infectieux qu'elle fait, alors, souvent avorter.

Indications. — Grippe traînante ou compliquée. Septicémies. Etats puerpéraux. Infections pleuro-pulmonaires, Angines, Typhoïdes et Paratyphoïdes, Colibacilloses, Péritonites, Cholécystites, Pyélonéphrites, Suppurations, Méningites, Encéphalites.

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Posologie. — Voie intramusculaire ou, en cas d'urgence, voie intraveineuse.

Chez les *Adultes* : 2 à 3 ampoules par jour. Chez les *Enfants* : Demi-dose. La *Pyoformine* doit être employée précocement ; elle ne détermine aucune réaction, ni locale, ni générale.

Prix au public : la boîte de 4 ampoules : 22 fr. 85.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie A.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

PYOREX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous le n° 363-40.

Forme. — Pâte dentifrice.

Composition. — Arsolithol Bailly (sel de Lithium de l'acide acétylaminoparaoxyphénylarsinique), Lactate d'éthoxydiaminoacridine et Ricinoléate sodique insipide adsorbés par le kaolin colloïdal.

Propriétés pharmacodynamiques. — Pâte gingivale antispirillaire, antimicrobienne, antitoxinique polyvalente à pouvoir microbicide extrêmement élevé, parce que ses éléments ont leurs propriétés antiseptiques dirigées sur des groupes d'espèces pathogènes d'origine et de spécificité différentes. Modifie le milieu buccal et le rend impropre à la vie microbienne.

Indications. — Gingivites, stomatites, adjuvant au traitement chirurgical de la pyorrhée alvéolaire, préventif des associations fusospirillaires.

Mode d'emploi. — En massages gingivaux dans les gingivites, comme pâte dentifrice dans les caries et les affections dentaires et l'hygiène buccale biquotidienne.

Le tube de 75 grammes: 11 fr. 50

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 62-30.)

PYO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Streptocoques et de Staphylocoques.

Indications. — Suppurations : phlegmons, abcès, panaris, adénophlegmons, plaies infectées, fractures ouvertes, pyodermites du nourrisson : pemphigus, etc...

Posologie. — Ampoules de 1 cc. Une première injection de 1/2 de cc. les suivantes un centicube tous les jours, puis tous les 2 jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 27 francs.

PYO - VACLYDUN PANSEMENTS

Vaccination locale ampoules de 5 cc.

Mode d'emploi. — Imbiber de vaccin une compresse stérilisée. Mettre sur la plaie et recouvrir d'un imperméable. Pour les cavités, introduire une mèche imbibée de Pyo-Vaclydun pansement.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

Prix : 19 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

PYRALLIUM

Composition :

Extrait stabilisé d'*Allium sativum*. 0,10

Pyrophosphate diacide de calcium.. 0,20

pour 1 dragée. Ces 2 éléments sont unis en un complexe colloïdal.

Indications. — Tous états hypo-acides : *Asthénies*, Déminéralisations, Vieillesse prématurée, Ralentissements de la Nutrition.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant ou au cours des repas. Avaler sans croquer.

Tolérance absolue.

Prix : 18 fr. 20 la boîte de 50 dragées.

Laboratoire COUDERO

28 et 30, rue du Four — PARIS (VI^e).

(Tél. Littré 17-42.)

PYRÉLAINE COLLAS

Composition. — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 04 de soufre organique combiné non oxydé doué de son pouvoir catalytique, Excipient balsamique.

Propriétés. — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre *per os*, la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

Indications. — Toutes celles du soufre. *Carences Sulfurées*, Résulfuration thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, *Cholécystite*, *Rhumatismes chroniques*, *Goutte*, *Dermopathies*, *Parasites intestinaux*.

Pas de contre-indications.

Forme et posologie. — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 01 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crises aiguës : 4 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 14 francs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1024-3.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT

MOUGNAUD et C^{ie}, pharmaciens

LONGJUMEAU (Seine-et-Oise), — (Tél. : 96).

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

Composition. — Diméthylaminopyrazoline phenazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée) 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

Gouttes. — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C, si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

Enfants : I à II gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A. — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B. — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (XXV-L à répéter), chercher la dose-levier ; Dysménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, *permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espace*) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L., 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — Echantillons et Littérature.

Gouttes : (25 cc.) 21 fr. 50.

Ampoules $\left\{ \begin{array}{l} A (2 \text{ cc.} \times 6) \\ B (5 \text{ cc.} \times 6) \end{array} \right\}$ 18 fr. 75.

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Laboratoires CAMUSET
18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.
(Tél. : Gobelins 00-70.)

PYRI-PYRIDIUM

(Phényl-azo- α '- α -diamino-pyridine.)

Corps chimique nouveau, antiseptique génito-urinaire réellement actif, car il agit dans la profondeur des muqueuses et s'élimine en partie par les glandes des voies génito-urinaires.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Gonorrhées, Colibacilloses.

1° *Dragées par voie buccale.* Le flacon de 20 dragées
26 francs, 3 à 6 par jour.

2° *En ampoules pour voie intraveineuse.* Traitement d'attaque des affections génito-urinaires graves par la stimulation du système réticulo-endothélial. La boîte de 10 ampoules : 17 fr. 50 1 à 4 par 24 heures.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

PYROCUROL

Traitement des Brûlures.

Solution tannique composée, stérilisée, d'une efficacité remarquable par ses qualités antiseptiques et cicatrisantes. Le Pyrocurool possède également de puissantes propriétés anesthésiques dues à l'adjonction d'un produit de la série des éthers de l'acide paramino-benzoïque qui en font un excellent remède dans le traitement des brûlures.

Grâce à un nouveau procédé de tannage par pulvérisation, il réalise l'application la plus rationnelle et la plus efficace, permettant d'obtenir une guérison rapide en atténuant ou supprimant la douleur, et en favorisant la reconstitution des tissus sains.

Le *Pulvérisateur*, modèle déposé, s'adapte à tous les flacons et peut servir indéfiniment.

Mode d'emploi. — 2 à 3 pulvérisations par jour sur la surface brûlée, selon indication du médecin.

LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien

47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

PYROLÉOL EDET

Composition. — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

Propriétés. — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

Indications. — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

Présentation. — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

Résultats. — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Pharmacie Centrale de France
25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 18-67.)

PYROSELLINE

Diurétique exclusivement végétal.

Médication Phytothérapique.

Composition. — Extraits totaux de Combretum, Chimaphylla, Piloselle.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Infections aiguës et chroniques des voies urinaires (Cystite, Urétrite, Blennorragie), Maladies infectieuses aiguës (Septicémies, Grippe, Collibacilloses).

Maladies chroniques : Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Insuffisance hépatique, Cholécystite, Lithiases. Rétentions d'urine et hydrique.

Posologie. — Dose moyenne : 2 comprimés au petit déjeuner et 2 au repas de midi.

Les doses peuvent être doublées sans aucun inconvénient.

Prix : 18 francs.

Laboratoires CHAPOTOT
AUBRIOT, Pharmacien
56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII°).
(Tél. : Mon. 28-90 et 30-65.)
R. C. 231-917 B.

PYUROL

Composition. — C'est une combinaison de l'urotropine avec :

1° Deux métaux qui en suractivent les propriétés et augmentent l'acidité urinaire, le calcium qui l'oriente vers le rein, le magnésium qui augmente le flux biliaire ;

2° Le buchu, antiseptique urinaire, le boldo, cholagogue puissant.

Indications. — Action antiseptique sur l'appareil urinaire, action sur l'appareil digestif et sur le foie, action sur la diurèse.

Forme et mode d'emploi. — Granulé soluble.

Adultes : infections urinaires moyennes, 3 cuillerées à café dissoutes dans un verre d'eau ou de tisane prises :

La première à jeun.

La seconde une heure avant le déjeuner,

La troisième une heure avant le repas du soir.

Infections urinaires aiguës, 3 cuillerées à entremets aux mêmes heures

Enfants : ces doses sont diminuées de moitié.

Dose pour 7 jours. Prix : 15 francs.

Laboratoire A. LE BLOND

Pharmacien de 1^{re} classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36.)

QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.

VIN: Un verre à madère aux 2 principaux repas.

Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix : 26 fr. 65.

DRAGÉES : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes :* 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants :* 1/2 dose. — Prix : 12 fr. 50.

GRANULÉ : Convient particulièrement aux enfants. *Adultes :* 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants :* 1/2 dose. Prix : 12 fr. 50.

Les Établissements C. DAVID-RABOT

C. DAVID et ses Fils, pharmaciens

49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 01-41.)

QUASSINOL

Gouttes

Anorexie, Surmenage, Anémie, Stimulant des fonctions digestives.

Formule : Teinture Quassia..... 40 grammes.

Teinture Colombo 20 —

Teinture Noix vomique 20 —

Excipient alcool-glycérine. Q. S.... 100 —

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments sous le n° 1610-1.

Présentation. — Flacon compte-gouttes de 24 cc. Prix au public : 15 fr. 60.

Mode d'emploi : *Adultes :* XV gouttes dans un peu d'eau ou de vin, avant chaque repas.

Enfants au-dessus de 5 ans : demi-dose.

Durée du traitement, 15 jours environ.

Laboratoires du QUASSINOL

J. OLIVE, pharmacien de 1^{re} classe.

73, bd Baille, et 109, rue de Lodi — MARSEILLE

(Tél. : Garibaldi 55-06.)

R. C. Marseille 117-209.

Compte Chèques postaux : Marseille 43-564.

QUINA BOURCET

GRANULÉ

Composition. — Saccharure fondant exactement titré à 4 % d'extrait sec de Quinquina. Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. N° 754-1.

Mode d'emploi. — Granulé titré à 0 gr. 20 par cuillerée à café avant les repas pour les enfants ; granulé titré à 0 gr. 60 par cuillerée à soupe pour les adultes.

Indications. — Anémie, Tuberculose, Grippe, Convalescence, Neurasthénie, Paludisme, Maladies infectieuses. Anorexie.

QUINA BOURCET

SOLUTION

Composition. — Cette solution, exactement titrée à 4 % d'extrait sec de Quinquina. Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. N° 754-2.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe (0 gr. 60 d'extrait) avant les repas pour les adultes. Une cuillerée à café (0 gr. 20 d'extrait) avant les repas pour les enfants.

Indications. — Stimulant de la Digestion; recommandé dans l'Anémie, l'Anorexie, le Diabète, la Grippe, la Neurasthénie, les Convalescences et dans toutes les maladies aiguës, dans la Cachexie palustre et le Paludisme.

Laboratoire du QUINA BOURCET
7, avenue du Doyenné — LYON.
(Téléphone : F 25-35.)

QUINACRINE (ATÉBRINE)

Noms déposés.

Dichlorhydrate de la chloro 2-diéthylamino-pentylamino 5-méthoxy-7-acridine. — Vente limitée à la France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français. — Médication antipaludique essentiellement schizonticide, créant dans l'organisme un état réfractaire contre l'hématozoaire. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes les formes du paludisme. Traitements curatifs et préventifs.

Présentations. — Chocolatés de tannate de quinacrine (pour très jeunes enfants) (Boîtes de 12). Un chocolaté correspond à un comprimé.

Comprimés dosés à 0 g. 10 de Quinacrine. Tubes de 15 et 30 comprimés. **Ampoules** de Quinacrine pour préparation extemporanée de solutions injectables. Boîtes de 5 ampoules à 0 g. 10 et boîtes de 5 ampoules à 0 g. 30 (avec même nombre d'ampoules bidistillées).

Dose habituelle.

Adultes et enfants de plus de 8 ans : 0 g. 30 par jour.

Enfants de 5 à 8 ans : 0 g. 20 par jour, jusqu'à 4 ans : 0 g. 10 par jour.

Durée du traitement : 5 jours au minimum, 8 jours au maximum.

Périodes de repos de 3 à 4 jours. A titre prophylactique : deux comprimés deux fois par semaine. Absorber les comprimés, sans les faire dissoudre, au moment des repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique « SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Balzac 22-94.)

QUINA PEPSINÉ BLOT

Gouttes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 950-1.

Composition. — Extrait total dosé de quinquina succirubra, combiné à la pepsine. Obtenu *sans sucre ni alcool*.

Caractéristiques. — Agit à doses dix fois moindres que les teintures courantes. Pas de phénomènes d'intolérance.

Indications. — Faiblesse générale. Dénutrition. *Paludisme*. Maladies pneumococciques. Tuberculoses. Nervosisme et maladie de Basedow. Constipation. Diabète.

Doses. — Comme stimulant de la nutrition : XV gouttes un quart d'heure avant chaque repas.

Dans la prophylaxie de la grippe : II gouttes (5 mgr. d'alcaloïdes) le matin.

Dans le traitement du paludisme : L à LX gouttes deux fois par jour.

Comme tonique du système nerveux et du cœur : X gouttes à chaque repas.

Le flacon : 18 francs.

Laboratoires du QUINA BLOT

38, boulevard de Strasbourg — TOULOUSE.

QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

(Nouvelle dénomination : Phosarkyl).

Extrait de quinquina Grandval
associé aux Strychno-Phospharsinates.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique. — Stimulant général. — Apéritif.

Composition. — *Chaque comprimé contient :*

Quinquina Grandval	0 gr. 30
Glycérophosphates composés	0 gr. 30
Strychnine combinée.....	1 mgr. 60
Arsenic combiné.....	0 mgr. 18

Indications. — Anémie, Surmenage intellectuel et physique, Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine

Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

La boîte de 32 comprimés : 12 fr. 75.

(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS.

Tél. : 31-63.

QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique
avec fer et arsenic assimilable.

Composition. — *Chaque comprimé contient :*

Quinquina Grandval (à hauttitre). ..	0 gr. 60
Fer combiné.....	0 gr. 015
Arsenic combiné	0 mgr. 90

Propriétés thérapeutiques :

Antipaludique. — Permet, suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique**, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 17 fr. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS. (Tél. : 31-63.)

QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

Indications. — Paludisme, grippez, asthénie, convalescences, anémies.

Prix au public : 16 fr. 65.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS

(Tél. : Trinité 29-29.)

QUINICARDINE

(Sulfate de quinidine pur).

Forme. — Comprimés à 0 gr. 20.

Indications. — Arythmie complète par fibrillation auriculaire — Arythmie extrasystolique — Tachycardie paroxystique de Bouveret — Auricular flutter — Eréthisme cardiaque (Basedow).

Doses. — Consulter la notice complète qui sera adressée sur demande.

Prix : 17 francs.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

QUINIMAX

Alcaloïdes totaux suractivés du Quinquina.

Composition. — Sel complexe obtenu par combinaison des alcaloïdes totaux du quinquina (dans la proportion exacte où ils existent dans l'écorce du *Cinchona succirubra*) avec un dérivé phénolique activant.

Propriétés. — *Antithermique, antipaludique et reconstituant* agissant à faibles doses. Ne provoque aucun des inconvénients de la quinine, ni bourdonnements d'oreille, ni brûlures d'estomac, ni vertiges, ni inflammation locale.

Indications thérapeutiques. — *Paludisme, Asthénie et Cachexie palustre. États fébriles, gripes* et toutes indications habituelles de la quinine.

Formes :

Comprimés à 0 gr. 10.	La boîte de 20.	Prix au public.	12 fr.
—	— 40.	—	22 fr.
Ampoules. de 1 cc à 0 gr. 10	La boîte de 10.	Prix au public.	19 fr.
— 2 cc à 0 gr. 20	— 10.	—	22 fr.
— 4 cc à 0 gr. 40	— 10.	—	29 fr.
Suppositoires Enfants 0 gr. 05	La boîte de 10.	Prix au public.	19 fr.
— Adultes 0 gr. 15	— 10.	—	24 fr.
Granulé chocolaté pour enfants		24 fr.

Posologie. — Même mode de prescription que la quinine, mais à doses 3 à 4 fois moindres.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

QUININE-CALCIUM-SANDOZ

Combinaison de Gluconate de quinine et de « Calcium-Sandoz ».

Indications. — Pneumopathies aiguës, grippe, rhumatisme, pyrexies. En obstétrique, comme ocytocique. Fièvre puerpérale. En chirurgie : prophylactique des affections respiratoires.

Posologie. — Moyenne. *Adultes* (voie intramusculaire ou endoveineuse) : 1 ampoule de 10 cc. par jour.

Par voie veineuse, il convient de tâter la susceptibilité du malade avec de faibles doses avant de recourir à la posologie normale.

En obstétrique, comme ocytocique : 2 à 4 cc. à la fois. Si nécessaire, après une à deux heures injecter de nouveau 2 cc., une à deux fois, par la voie intramusculaire.

Enfants (voie intramusculaire) : jusqu'à 3 ans, 1 cc. par jour.

De 3 à 6 ans, 2 à 3 cc. par jour. Au-dessus de 6 ans, 5 cc. par jour.

Formes. — Ampoules de 2 cc. 5 cc. et 10 cc. pour injections intramusculaires et endoveineuses. Une ampoule de 10 cc. contient 0 gr. 60 de gluconate de quinine (corresp. à 0 gr. 37 de quinine basique anhydre) et une solution de « Calcium-Sandoz » à 10 p. 100.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

QUININE PELLETIER

Marque des Trois Cachets.

Composition et présentation. — La QUININE des TROIS CACHETS se présente sous forme de perles renfermant le sel de quinine en nature, légèrement comprimé sans addition de gomme, sucre, amidon ou poudres inertes.

Elles sont dosées à 10 cgr. et se délivrent en tubes de 10, 20, 50, 100 capsules.

Indications. — Névralgies, fièvres intermittentes, paludisme, fièvres pernicieuses, fièvre typhoïde, affections hépatiques et spléniques des pays chauds, anémies.

Posologie. — Variable suivant les indications.

Prix : variable suivant les différents sels.

Le LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE fabrique des capsules aux sels de quinine suivants : Sulfate ; Bisulfate ; Chlorhydrate ; Valérianate ; Bromhydrate ; Bichlorhydrate ; Chlorhydrosulfate. Chaque perle porte imprimé en noir le nom de PELLETIER.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et C^{ie}

Laboratoire de Pharmacologie Générale
8, rue Vivienne — PARIS (II^e): (Tél. : Gutenberg 27-03.)

QUININO-PHYTINE

Inosito-hexaphosphate de quinine.

CIBA

58 p. 100 de Quinine — 9 p. 100 de Phosphore.

Phosphate organique de quinine, très soluble, d'une parfaite tolérance, unissant à l'action spécifique de la quinine l'action tonique et reconstituante du phosphore végétal.

Indications. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Tube de 20 comprimés.

Flacon de 50 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

QUINIO-STOVAR SOL

4-oxy-3-acétylamino-phényl-
1-arsinate de quinine.

Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

Indications :

Paludisme viscéral : hépatite, splénomégalie, anémie et cachexie palustres.

Traitement eutrophique complémentaire des divers traitements antimalariques. Quinacrine (Atébrine), Præquine (Plasmochine) — noms déposés. —

La Quinacrine et la Præquine ne sont vendues qu'en France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français.

Présentation : Tubes de 20 comprimés à 0 g. 25
Prix : 17 fr. 50.

Posologie et mode d'emploi. — 4 comprimés par 24 heures (3 ou 4 séries de 10 jours, séparées par 5 jours de repos).

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

QUINOBORE

Poudre Antiseptique, Astringente, Cicatrisante, Désodorisante, Décongestive.

Produit idéal pour l'hygiène intime de la femme.

Mode d'emploi. — Injection : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie.

Prix : 12 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 25 jours.
Non toxique, Usage externe. Non caustique.

Laboratoire du **PHOSOL**

L. QUINET, Pharmacien-Préparateur.

143, rue du Temple — PARIS.

(Tél. : Archives 42-27.)

QUINOCARBINE

Charbon suractivé bismuthique.

Modificateur du milieu.

Indications. — Aérophagie, Dyspepsie, Aérocolie, Entérites, Colites, Colibacillose et oxyures.

Deux formes : Granulés, Cachets.

Prix : 15 francs.

Posologie. — Trois cuillerées à café ou 3 cachets par jour.

Enfants : 1/2 dose.

Oxyures : 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun pendant 21 jours.

Aucune toxicité.

Charbon suractivé	1 gr.
Bismuthate d'Orthoxyquinoléine	0 gr. 50
Excipient	Q. S. pour 1 cuillerée à café.

Laboratoire Émile CHARPENTIER

7, rue du Bois-de-Boulogne — PARIS.

(Tél. : Passy 55-46.)

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine. Le plus riche en quinine (87,56 p. 100) des sels basiques ou neutres. Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques :

Ampoules : 6 et 12 ampoules de 0,25, 0,50, 0,75, 1 gr., 1,25 et 1,50.

Cachets : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés : 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules : 0,10.

Ampoules, boîtes de 6. Prix : 12 fr. 75, 17 fr. 70, 23 fr. 40, 29 fr. 60, 34 fr. 85, 40 fr. 50

Boîte de 12. Prix : 20 fr. 30, 31 fr., 40 fr. 50, 49 fr. 90, 60 fr. 85, 69 fr. 15.

Cachets, boîte de 6. Prix : 8 fr. 85, 15 fr. 85.

Boîte de 12. Prix : 15 fr. 85, 27 fr. 55.

Comprimés, boîte de 10. Prix : 6 fr. 75, 12 fr. 75, 15 fr. 85, 23 fr. 40.

Boîte de 20. Prix : 12 fr. 75, 20 fr. 30, 27 fr. 55, 37 fr. 20.

Pilules. Prix : 14 fr. 80.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Laboratoires H. LACROIX

V. Merobian et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Nord 54-57.)

QUINOÏDINE DURIEZ

Dérivé du quinquina exempt des intolérances de la quinine, supérieur à elle dans les états chroniques. (Communications à l'Académie de médecine de Paris, etc..., littérature sur demande.)

0 gr. 10 principe actif par dragée.

Indications. — Grippe, paludisme et leurs séquelles : prévention et traitement. Névralgies grippales ou palustres.

Tonique général : convalescence des maladies infectieuses : diphtérie, pneumonie, typhoïde, etc.

Tonicardiaque : petites défaillances, nervosité ou irrégularité du cœur, avec ou sans lésion.

Posologie. — Comme tonique et préventif, contre les séquelles de grippe ou de paludisme ou en thérapeutique du cœur : selon l'âge et la sensibilité du sujet : 1 à 2 dragées par jour, au début des repas.

Comme fébrifuge et antinévralgique (états aigus) : 2 à 6 dragées par jour, à intervalles égaux, pendant une ou plusieurs semaines, à doses décroissantes.

Prix : le tube : 14 fr. 60.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-1.

DURIEZ — 20, place des Vosges — PARIS.

QUINOLAX

Composition. — A base de Cinnamate de Quinine, Phénacétine, Aloïne, Podophyllin, Guaranine, Essence de Cannelle de Ceylan.

Forme : Comprimés.

Propriétés. — Anti-infectieux, anti-thermique, analgésique, laxatif stomachique et cholagogue, tonicardiaque, diurétique et myosthénique, tonique général.

Indications. — *Infections* : Grippe, coryza, fièvres infectieuses (préventif et curatif) ; *Etats douloureux* : céphalées, névralgies, sciatique, lumbagos, rhumatismes, migraines. *Paludisme*. *Affections hépatiques*.

Posologie. — Avaler avec un peu d'eau 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Prix : la boîte de 24 comprimés : 11 fr. 25 (4 à 8 jours).

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

Tél. : Galvani 84-41.

QUINOSIPHON

Formule :

Acide phénylquinoléique Carbonique.	0,10
Extrait aqueux Orthosiphon stamineus.	0,016
Ether salicylique de l'Acétylparami- nophénol	0,10
Extrait total de boldo	0,035
Pour un comprimé dragéifié.	

Posologie. — 4 à 6 comprimés espacés dans la journée.

Indications. — Lithiases hépato-rénales, Favorise excrétion de l'urée et des chlorures, Analgésique des manifestations uricémiques et arthritiques.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du CYTOBIASE

A. MARTIN, 25-27, rue du Commandant-Rivière — COLOMBES (Seine).
(Tél. : Charlebourg 03-62.)

QUINQUINA GMET

Composition. — Extrait total obtenu directement et exclusivement à l'aide du *Quinquina succirubra*. Coloration et amertume parfaitement naturelles. *Sans alcool.*

Propriétés. — Stimulant apéritif fébrifuge. *Active remarquablement la phagocytose.*

Indications. — Anémie, anorexie, grippe, tuberculose, épidémies, paludisme, tous les états fébriles ou non où l'activité leucocytaire doit être stimulée. Aménorrhée. Athrepsie. Angines, Panaris, Furoncles, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de vin *immédiatement avant un repas* ou l'absorption d'une tisane, d'un peu de lait, d'un biscuit.

Le grand pouvoir apéritif du Quinquina GMET pouvant occasionner (si le malade ne mange pas aussitôt après) la sensation nauséuse consécutive à la faim non apaisée.

Le flacon de 135 cc.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

QUINSAL

Médication Quino-salicylique-lithinée
en tablettes glutinisées.

ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE

Calmant immédiat de la Douleur par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

Antithermique par la Quinine.

Diurétique et Uricolytique par le Sel de Lithine et la Quinine.

Spécifique antirhumatismal par l'ion salicylé. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

Indications. — Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grippales et en général toutes les Algies.

Posologie. — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures de préférence loin des repas afin que l'action sédative soit plus rapide.

Cas chroniques : Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

Enfants : de 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 16 francs. Peut être prescrit aux A. S.

Laboratoire du QUINSAL

F. BOLLA, Docteur en pharmacie.

Licencié ès sciences.

GRAY (Haute-Saône) — (Téléphone : 126)

Échantillon et littérature sur demande.

QUINTHÉRYL

Composition. — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-camphre.

Applications. — Traitement curatif de la coqueluche, correctif de toutes les toux quinteuses émetisantes, de l'asthme et de l'emphysème. Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires.

Présentation :

1° Ampoules de 1 cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° Ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

Posologie. — Une injection intramusculaire (pratiquement indolore), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

Prix : Série A : 14 francs.

— Série B : 17 francs.

DÉPOT GÉNÉRAL,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

M. LÉONARDON, Docteur en pharmacie

Licencié ès sciences. Ancien Elève de l'Institut Pasteur.

Lauréat de l'Académie de Médecine.

1, rue Paul-Bert — ANGERS

(Tél. : 38-61.)

QUINTOZONE

(Inhalant-Révlusif)

Médication naturelle et externe des maladies de l'appareil respiratoire.

Formule. — Essences balsamiques ozonisées (Pin, Eucalyptus, Lavande, Serpolet... etc.), 13 + Benzoate de benzyle, 1 + Iodure d'éthyle, 0,5 + Acétate d'éthyle, 0,2 + Excipient, 85,3.

Indications et mode d'emploi :

Coqueluche, bronchite, broncho-pneumonie, badigeonnages et frictions sur le thorax.

Asthme, Rhume des foins, Coryza : Inhalations fréquentes sur un mouchoir.

Laryngites, trachéites, Angine : Compresses, Inhalations. *Assainissement des chambres des malades :* Vaporisation, Evaporation.

Propriétés. — **Avantages.** — Odeur agréable, analgésique, antispasmodique, anticongestif.

Le QUINTOZONE agit par évaporation et endosmose.

Présentation. — Flacon stilligoutte pour usage externe.

Prix : 12 francs.

Laboratoires de l'OLIPHÉDROL

18, rue Daval — PARIS (II^e).

QUINURYL

Cachets :

Acide quinique	0,25
Théobromine.....	0,10
Poudre Myrtilles (feuilles)	0,25 par cachet.

Comprimés:

Acide quinique.....	0,125
Extrait aqueux sec d'Orthosiphon Stamineus	0,15
Poudre Myrtilles (feuilles)	0,05 par comprimé

Indications :

Antiurétique, Spécifique de l'Azotémie, Adjuvant du régime hypoazoté. L'Orthosiphon Stamineus est un diurétique hépato-rénal agissant sur l'élimination de l'urée et des chlorures.

(Comm. Soc. de Thérapeutique, janv. 1936.)

Symptômes de la petite Azotémie : vertiges, céphalées, éblouissements, bourdonnements d'oreilles.

Arthritisme, Oligurie.

Cachets (Quinuryl), Comprimés (Quinuryl-Ortho).

Mode d'emploi :

2 à 4 cachets ou 4 à 8 comprimés par jour.

La boîte : 18 fr. 50 (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

RADIO-BARYX

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif. Aliment opaque en poudre contenant 60 p. 100 de sulfate de baryum chimiquement pur, aromatisé au cacao débeurré et sucré.

Enregist. au labor. nat. de Contrôle des Médicaments sous le n° 1143-1.

Avantages. — Facile à diluer, Agréable au goût, met l'estomac en présence de produits familiers, ne provoque aucun spasme réflexe. Expulsion du bol fécal facilitée mécaniquement par l'addition d'une petite quantité d'agar-agar. Conservation parfaite.

Posologie :

Estomac 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 fois.

Région cæco-appen-

diculaire 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.

Transit 400 gr. dans 500 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.

Mode d'emploi. — Verser la poudre dans un grand bol et délayer peu à peu avec de l'eau chaude ou froide (ou du lait) en évitant les grumeaux jusqu'à obtention d'une crème liquide.

Présentation. — Boîte de 200 grammes : Prix : 15 fr. 60

Conditions spéciales à MM. les médecins.

Présentation réservée au corps médical et aux hôpitaux : Boîtes de 2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, 18 kgs et fûts de 50 kgs.

Tarif, Echantillons et Littérature sur demande aux :

Laboratoires du RADIO-BARYX

1, rue de Paris — LIMOURS (Seine-et-Oise). (Tél. : n° 71).

R. C. Rambouillet 5-184. — Compte chèques postaux Paris 1857-27.

Commandes pour Paris : Trudaine 55-77.

RADIOBAUME ADRIAN

A base de stovaine, baume du Pérou, gaïacol, extrait de noyer et naphtolate de soude.

Présentation. — Pommade en tube.

Indications thérapeutiques. — Préparation kérato-plastique et kératogénique. Protège, cicatrise, vitalise. A utiliser au cours des traitements par l'électricité, les rayons X, les rayons ultra-violet, l'héliothérapie. Traitement idéal des brûlures, coups de soleil, rougeurs, crevasses, irritations de la peau, etc...

Posologie. — A utiliser en onctions.

Le tube : { Grand modèle : 17 fr. 05.
 { Petit modèle : 10 fr. 65.

Société Française

de Produits Pharmaceutiques,

Anc^t ADRIAN et Cie,

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

RADIOMAGNÉSIUM

Dragées de chlorure de magnésium (0,30) radioactivé par le bromure de mésothorium (0,001 de microgramme) et possédant à la fois les propriétés décrites par le P^r Pierre Delbet, à l'Académie de Médecine (séance du 10 juillet 1928) et les propriétés radioactives du Bromure de Mésothorium, vitalisant cellulaire de premier ordre et excitant des produits auxquels il est associé.

Indications du Radiomagnésium

1° Reconstituant dans tous les cas de fatigue et d'asthénie; neurotonique puissant, dépression, convalescence, surmenage. — 2° Infections intestinales, entérites, fermentations intestinales, constipations, insuffisance hépatique, toutes infections de voies biliaires. — 3° Tremblements et prurits séniles ou autres, maladie de Parkinson, contractures, crampes. — 4° Troubles nerveux, hypervagotonie. — 5° Dermatoses autotoxiques, prurits, eczéma, acné, psoriasis. — 6° Verrues et lésions de type précancéreux. — 7° Prophylaxie du cancer et traitement adjuvant des néoplasmes.

Contre-Indication du Radiomagnésium. — Aucune.

Prix au public : Boîte de 96 dragées : 22 fr. 30.

Mode d'emploi. — Avaler sans croquer avec un peu d'eau 4 à 8 dragées par jour. A prendre moitié avant le coucher et moitié au réveil, ou un quart d'heure avant chaque repas, suivant indication du Médecin.

La dose de 4 dragées peut être continuée indéfiniment, mais on peut également l'interrompre huit jours par mois.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien, 51, r. d'Alsace — COURBEVOIR (Seine).

Tél.: Wagram 58-89, R. C. Seine 255 068 B.

RADIO SALIL

Composition. — Bromure de Mésothorium, Salicylate de Glycol, Capsicine, Menthol.

Action. — Analgésique, révulsif, résolutive. Combat efficacement et rapidement l'élément douleur, la radioactivité produite par le Bromure de Mésothorium exaltant les propriétés thérapeutiques des autres éléments actifs.

Indications. — Toutes douleurs aiguës : rhumatismes, goutte, sciatique, lumbago, névralgies faciales et intercostales, foulures, etc... Comme révulsif, dans la congestion des voies respiratoires.

Présentation. — Crayon fondant, pour usage externe, d'un emploi pratique, ne tachant ni les mains ni le linge, et sans odeur désagréable.

Mode d'emploi. — Applications *loco dolenti*, non suivies de frictions. Recouvrir légèrement de coton ou de flanelle. Avant chaque application, nettoyer la peau à l'alcool.

Laboratoires UROMIL

L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 04-00.

RADIOTÉTRANE GÉRARD

Composition. — Tétra-iodo-phénol-phtaléine disodique.

Mode d'action. — Opacifie la vésicule biliaire aux Rayons X.

Avantage. — Stable, de composition constante, non toxique, goût agréable.

- 1° A. Forme dragées : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.
 - 2° B. Forme colloïdale : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.
 - 3° C. Forme poudre : préparation à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz.
 - 4° Formes ampoules : pour injection intraveineuse.
- Indications.** — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

Forme et mode d'emploi :

- 1° A. Dragées : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maxima entre la 14^e et la 16^e heure : 28 fr. 60.
- 2° B. Forme colloïdale : mélanger le contenu des deux flacons immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 60 cc.) : 28 fr. 60 (dose unique).
- 3° C. Forme poudre : faire dissoudre dans un tiers de verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz : 22 fr. 90 (dose unique).
- 4° D. Forme colloïdale grand modèle, créée pour l'application de la méthode Sandström : 57 fr. 20.
- 5° E. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 3 gr. pour application de la méthode de Sandström : 45 fr. 80.
- 6° G. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 2 grammes pour application de la méthode de Sandström : 31 fr. 75.
- 7° F. Forme intraveineuse : Faire dissoudre dans 50 cc. d'eau bidistillée et injecter très lentement : 14 fr. 60.

Enregistrés au L. N. C. M. { dragées — N° — 111-3.
 { liquide — N° — 111-2.
 { poudre — N° — 111-8.

Laboratoire du Dr LAURENT-GÉRARD

40, r. de Bellechasse — PARIS (VII^e). — (Tél. : Inv. 78-44).

RADIO TOPIC C.

Action stano-physiologique RADIO-MARINE

Destruction rapide du staphylocoque. Vitalité cellulaire et phagocytaire.
Composition. — Sérum physiologique au lactate d'étain et éthers benzeno-camphrés, salicylés, géranisés, émulsionnés à la gélose marine.

Propriétés. — Action remarquable sur toutes les staphylococcies prouvée par de hautes références médicales.

Indications. — Traitement énergique des furoncles, anthrax, folliculites, sycosis, abcès, plaies, panaris, pyodermites, lymphangites, suppurations, zonas, certaines formes d'eczémas.

Précieux dans le traitement externe des furoncles du nez, des oreilles et de la lèvre supérieure par suite de sa rapidité d'action. (24 à 48 heures.)

Mode d'emploi. — Applications sur gaze avec taffetas et bande ou sparadrap adhésif, matin et soir ; percement au bout de 24 à 48 heures : application ensuite avec le baume balsamique cicatrisant contenu dans la même boîte.

Présentation et prix.

Grand modèle avec baume balsamique.....	20 francs.
Tube petit modèle	12 francs.

Laboratoire marin de Royan-Pontallac

P. CASTANET, Pharmacien de 1^{re} classe.

Lauréat Médaille d'Or de la Faculté de Lyon.

Dépôt : O. C. P. Office Commercial Pharmaceutique,
 71, rue du Temple — Paris (III^e).

C. N. P. F. Comptoir National

Ile-de-France pharmaceutique 4, rue de l'Alma — ASNIÈRES (Seine).

RANGOL

Forme. — Comprimés.

Formule :

Gardénal, Tartrate borico-potassique, NaBr,
 Extraits de datura, jusquiame, gelsemium, cratægus, ballote, passiflore, valériane stabilisée, pancréas.

Indications :

Irritabilité du sympathique, angor, névroses, insomnies, spasmes.

Posologie :

2 à 8 comprimés par 24 heures par doses fractionnées.

Prix. — 19 fr. 20.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 403-26.

Laboratoire **HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine PARIS.
 (Tél. : Diderot 04-71.)

RAPHABIL

Association des principes actifs du suc de *Raphanus sativus niger* et d'acide déhydrocholique.

Propriétés. — Action cholérétique, cholécystokinétique. Drainage du cholécyste. Propriétés laxatives par excitation du péristaltisme intestinal.

Indications. — Insuffisance hépatique et foie torpide. — Insuffisance biliaire. — Atonie et stase vésiculaires. — Troubles digestifs gastriques qui en dérivent : sensation de pesanteur gastrique, ballonnement, somnolence après les repas, difficile digestion des corps gras, mi-graines, etc. — *Constipation.* — Selles irrégulières.

Posologie et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 3 dragées par jour, après les repas. Dans les cas de constipation opiniâtre, prendre le matin à jeun 2 dragées de Raphabil.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

RAPHARÈNE

Composition. — Extrait fluide glyciné de *Raphanus sativus barbiens* (procédés d'extraction du Dr H.-R. Olivier, permettant l'action des principes actifs de la plante à l'état frais).

Propriétés. — Étudié par tubage duodénal, il excite la contraction vésiculaire, fait apparaître la bile B, décuple la sécrétion de la bile A hépatique.

Médication cholagogue et cholérétique au plus haut degré. Il combat la constipation chronique essentielle par suppléance de l'insuffisance hépatique biliaire. Aucune accoutumance ni irritation.

Indications. — Tous états morbides hépatiques ou vésiculaires (Lithiase et stases biliaires, insuffisance hépatique), Angiocholites, Convalescence des maladies infectieuses. Traitement de choix du foie des colonaux.

Posologie. — Une cuillerée à entremets ou deux pilules un quart d'heure avant les deux principaux repas, 10 jours par mois. Pour les enfants, une cuillerée à café ou une pilule dans les mêmes conditions.

Prix :

Rapharène liquide : 31 fr. 20.

Rapharène pilules : 20 fr. 80.

Laboratoires JOURNET

18 et 20, rue Vavin — PARIS (VI^e)

(Tél. : Danton 70-07.)

RAVIX

Lait en poudre Guigoz irradié, 300 unités internationales de Vitamine D pour 100 gr. de poudre.

Soumis aux radiations ultra-violettes en couche extrêmement mince, il conserve, du fait de son conditionnement sous vide, son pouvoir antirachitique pendant plusieurs mois. (Délai d'utilisation mentionné sur la boîte.)

En raison de son activation par les U.V., il présente une légère odeur d'ozone, témoin de son irradiation, néanmoins il est bien accepté par les nourrissons.

Indications. — Rachitisme, prérachitisme, convalescence, débilité, leucorrhées banales.

Mode d'emploi. — 5 gr. de poudre pour 25 à 30 gr. d'eau tiède ou froide, jamais bouillante.

Posologie. — a. Préventive : 20 à 30 gr. de poudre par jour.

b. Curative : 50 à 80 gr. de poudre par jour, dose à ne pas dépasser, sauf pour les adultes.

Pour les bébés, compléter avec le lait habituel.

Le traitement curatif est de 6 à 8 semaines.

Voir :

Lait en poudre GUIGOZ.

Lait Déchloruré GUIGOZ.

Lait Dextrosé Malté GUIGOZ.

Babeurre GUIGOZ.

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). (Tél. : Wagram 66-76 et 77)

RÉALPHÈNE

Composition. — Ether phosphorique du glucose (2 cgr. par mesure ou cuillerée de granulé et d'éllixir, et Acétylaminooxyphénylarsinate (5 cgr. par mesure ou cuillerée de granulé ou d'éllixir).

Indications. — Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, Convalescences, Anémies, Surmenage, Entérites chroniques.

Présentation. — Granulé, éllixir.

Posologie :

Adultes : Granulé et éllixir : 2 à 4 mesures ou cuillerées par jour au début des repas.

Enfants : Granulé : 1 à 2 mesures au début des repas. Une semaine de traitement sur deux.

Nourrissons : Granulé : 1 à 3 demi-mesures par jour. 4 jours de traitement sur 8.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

RECONSTITUANT MARY

Propriétés thérapeutiques. — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

Nature à base de Noix vomique, Arrhénal, Kina, Coca, Kola, Colombo, Gentiane, etc.

Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

Prix : 25 francs.

Laboratoire

du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

RECRESAI

Composition. — Orthophosphate monosodique.

Indications. — 1° Toutes les maladies infectieuses aiguës.

2° Faiblesse constitutionnelle ; anémie, rachitisme, scrofuleuse, tuberculose, y comprise la tuberculose osseuse.

3° Etats d'épuisement général, physique ou psychique, par suite de surmenage, spécialement aussi chez les enfants en âge scolaire ; stimulation de la capacité de rendement physique et mental.

4° Stimulation énergique de la guérison après interventions chirurgicales et gynécologiques.

Posologie. — Comprimés de Recresal : 3 fois par jour 1 à 3 comprimés 1/4 d'heure après le petit déjeuner et le déjeuner de midi.

Présentation :

Petite boîte : 30 comprimés : 8 fr. 35. "

Grande boîte : 60 comprimés : 15 fr. 60.

Laboratoire RECRESAI

Pharmacie Normale L. BÉLIÈRES,

Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX°).

RECT'ACOLITOL

Pansement recto-sigmoïdien.

Composition. — Sous-gallate de Bismuth ; carbonate de Bismuth ; carbonate de Calcium ; Ferripyrrine ; Extrait de Jusquiame ; Extrait de Cupressus ; Antipyrine ; Oxyquinoléine ; Mucilage végétal.

Présentation. — Granulé fondant permettant la préparation d'un lavement crémeux.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement protecteur antiseptique, antiparasitaire, cicatrisant, sédatif. Traitement local par lavement des affections inflammatoires, infectieuses ou parasitaires des segments terminaux de l'intestin.

Indications. — Recto-sigmoïdites, Recto-Colites, Rectites, ano-rectites, hémorroïdes internes.

Posologie. — Affections ano-rectales : une cuillerée à potage mélangée à 5 cuillerées à potage d'eau chaude. Affections recto-sigmoïdiennes : 2 cuillerées à potage mélangées à 10 cuillerées à potage d'eau chaude.

Enfants : quart ou demi-dose selon l'âge.

Prix : 20 fr. 80.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élysées 17-46.)

RECTAGINE

Suppositoires décongestifs.

Composition. — Argent colloïdal, Hydrargyre, sulfoléo sulfonate de sodium camphré et Extrait de Jusquiame.

Indications. — 1° *Hémorroïdes*, rectites, prurit anal, oxyures.

2° *Chez l'homme* : Agit sur les complications de la blennorragie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

3° *Chez la femme* : Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou inflammatoires de l'utérus, des trompes et des ovaires.

Posologie. — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 16 fr. 50.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Orthocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 14 francs, complète.

Tube de rechange : 12 francs

Laboratoire de la Varilaxine.
SURGÈRES (Charente-Inférieure).
(Tél. : 59.)

RECTOPANBILINE

Formes. — Solution pour lavement et suppositoires.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée, dans les suppositoires, de glycérine solidifiée.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose*, dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — *Enfants* : demi-dose.

Prix au public :

Frcs : 15 le pôt de Rectopanbiline.

Frcs : 12,50 la boîte de suppositoires.

Laboratoires du Docteur PLANTIER
ANNONAY (Ardèche).

RECTO PANSEMENT AMIBIASINE

Ampoule lavement de 125 cc.

Composition. — Le Recto Pansement Amibiasine est un composé gélose Amibiasine à 5 % d'Agar Agar et 20 % d'Amibiasine normale.

Propriétés. — L'action désinfectante, calmante et cicatrisante de l'Amibiasine y est mise à profit. La gélose maintient l'Amibiasine en contact intime avec la muqueuse rectale congestionnée et ulcérée.

Calme le ténesme, les coliques intestinales.

Le Recto Pansement : *panse, désinfecte, cicatrise.*

Indications. — Rectolites diffuses ou localisées, hémorragiques ou purulentes, Entérocolite, colites légères ou graves, diarrhées profuses des tuberculeux, des cancéreux, des anémiés, des vieillards. Dysenteries aiguës et chroniques, parasitaires ou microbiennes. Dermatoses d'origine digestive. Eczéma, Colibacilliose, etc. Diarrhées rebelles, ténesme. Rectites de toutes origines.

Mode d'emploi. — *a.* Faire prendre au malade un lavement évacuateur à l'eau bouillie salée à 7 gr. par litre. *b.* Deux heures après administrer le Recto Pansement comme un lavement après avoir eu soin de liquéfier le contenu de l'ampoule en la chauffant au bain-marie. Une ampoule de 125 cc. en lavement tous les 2 jours. Compléter le traitement local par 3 comprimés d'Amibiasine quotidiennement.

La boîte (une ampoule de 125 cc.) : 12 fr. 50.

Laboratoires de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII^e).

RECTOSEPTOL

Suppositoires anti-infectieux permettant de réaliser l'imprégnation créosotée suractivée.

Action bactéricide sur toute la flore pathogène.

Composition : Ad. Enf.

Créosote pure..... 0 gr. 50 0 gr. 30

Sulfate double d'orthoxyquinoline..... 0 gr. 02 0 gr. 012

Essences antiseptiques..... 0 gr. 04 0 gr. 024

Camphre..... 0 gr. 05 0 gr. 03

Ephédrine base..... 0 gr. 005 0 gr. 003

Indications. — *Toutes affections broncho-pulmonaires et bacilloles ; prophylaxie des complications pulmonaires de la grippe et de la rougeole et des accidents pulmonaires post-opératoires.*

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

Pour les nourrissons, employer 1/2 supp. enfant.

La boîte de 8 sup. : *Enfants*, 16 fr. ; *Adultes*, 19 fr.

Supprime toute intolérance gastrique.

Aucune action irritante.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

RECTOSOL **Suppositoires** **Antihémorroïdaires.**

A base d'iodorésorcinosulfite de Bismuth avec excipient Rectoline.

Indications. — Hémorroïdes internes et leurs complications.

Dose et mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires le matin une heure environ avant la selle, après l'application de la Rectoline, ou le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont congestionnées et douloureuses, par suite de la fatigue de la journée.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGERES (Charente-Inférieure).
(Tél. : 59.)

REINICALCINE

Thérapeutique Mangano-calcique Opothérapique.

Forme. — Cachets.

Composition. — Fluorure de calcium, Hydrate de Magnésie, Lactate de Manganèse, Nucléinate de soude, Diastase pure, Poudre de Pancréas, Poudre de foie, Poudre de rein, Poudre de rate, Inositolphosphate de chaux et Magnésie, Lactate de chaux, Phosphate tricalcique.

Posologie. — 1 cachet au milieu des 2 principaux repas, sauf avis du médecin traitant.

Indications. — Phosphaturie, Anémie, Amaigrissement, Surmenage, Prétuberculose, Lymphatisme, Rachitisme, Déficience organique, Dénutrition, Convalescence, Manque d'appétit, Carence.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments N° 403-11.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

RÉNOCARDINE

Le cardiotonique de la soixantaine.

Indications. — Cardiopathies décompensées, Insuffisance myocardique, Néphrites et Cirrhoses, Œdèmes et Ascites, Urémie et toutes insuffisances cardio-rénales.

Ni toxicité. — Ni accoutumance. — Ni accumulation.

La Renocardine est un cardio-tonique d'entretien et un diurétique rénal aussi actif que le théobromine, mais ne provoquant ni céphalée ni intoxication urique.

Composition. — Dragées d'extraits physiologiquement titrés, de plantes fraîches stabilisées :

**Adonis vernalis. Pyrole. Fleur de genêt.
Orthosiphon stamineus.**

Doses. — Deux dragées au début des deux repas.
Traitement pour 8 jours : 18 francs.
Littérature et échantillons.

**Laboratoires J. PERROCHON
TOURS.**

RÉNOLINE

Cachets.

Bleu de Méthylène.....	0,01
Salicylate de Phénol.....	0,50
Buchu pulvérisé.....	0,07
Benzoate de lithine.....	0,20
Bicarbonate de soude.....	0,10
Benzoate de soude.....	0,10

Pour 1 cachet.

Indications. — Antisepsie vésico-rénale, Diathèse urique et ses conséquences.

Doses. — 2 cachets par jour.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).
(Tél. : Louvre 53-16.)

RENOVITASE

Maladies de la Nutrition. — Maladies arthritiques.

Composition :

Sulfate de calcium.....	0,052	Sulfate de magnésium	0,091
— cuivre.....	0,028	— manganèse	0,071
— fer.....	0,072	Pour 1 cc. quantité en milligramme	

Oléate métallique parfaitement osmosable grâce à la dilution extrême de ses composants, réveille l'activité des hormones qui lui sont associées.

Forme : Voie buccale : Capsules (étui de 20) et Elixir.

Voie intramusculaire : Ampoules de 2 et de 5 cc. Boîte de 6 et de 12.

Voie intrarectale : *Huile rénovitase*, lavement de 10 cc. à conserver 5 à 6 heures. *Pansements* : Pommade en pot de 30 et 90 grammes ; pour coupures et brûlures (effet rapide et indolore).

Indications : Rhumatismes chroniques — Goutte — Rhumatisme déformant — Asthme thyroïdien — Fibrome — Goitre — Infantillisme — Métrorrhagies — Retards menstruels — Psychose — Certaines Dermatoses — Consolidation de Fractures — Anémie — Convalescence — Artériosclérose — Emphyseme — Hémorrhoides. — Grossesse.

Posologie : Au début des deux principaux repas pendant 10 jours, une Capsule ou une cuillerée à soupe d'Elixir. Après 10 jours, arrêter 5 jours avant de faire une nouvelle dizaine.

Tous les 3 jours, ou tous les 2 jours (suivant le cas), une injection intrarectale de 10 cc. ou une piqûre intramusculaire de 2 ou de 5 cc. (faite très lentement avec aiguille de 9/10). Les deux pour intensifier.

En pansement, la pommade. Pour les brûlures, elle supprime la douleur rapidement et évite les cicatrices. S'applique aussi pour toutes blessures, coupures.

L. N. C. M. N° 1024 2. — Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires des HORMOMÉTALIONS

50, avenue Jacqueminot, MEUDON (Seine-et-Oise). (Tél. : Obs. 13-33.)

RENOXYL

Toutes insuffisances rénales.

Comprimés contenant l'extrait de salsepareille.

Propriétés thérapeutiques. — Provoque la diurèse, active l'élimination de l'urée, augmente l'excrétion de l'acide urique.

Indications. — Néphrites chroniques, azotémie, uricémie, albuminurie, migraines, céphalées, asthénie.

Présentation. — Boîte de 50 comprimés titrés à 5 cgr. de principe actif.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour administrés en deux fois au moment des principaux repas.

Enfants : demi-dose.

Prix au public : 15 fr. 60.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie C.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

RÉSOCAÏNE

Spécifique du Coryza et des affections douloureuses du Nez et des Sinus.

(Sédation et décongestion immédiates.)

Forme. — Pommade nasale, en tube spécial pour injections nasales.

Composition. — Adrénaline physiologique ; Bismuth sous-gallate ; Essence de Niaouli ; Cocaïne ; Chlorhydrate d'amyléine ; Résorcine ; Menthol ; Essence de Thym ; Excipient stérilisé.

Indications. — Coryza, sinusites, obstructions nasales, rhume des Foins, ozène, surdité. Antisepsie du nez et de la gorge.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, plusieurs fois par jour.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

RÉSYL

Éther glycéro-gaïacollique
CIBA

ANTISEPTIQUE PULMONAIRE, ANTICATARRHAL.
Non caustique, libérant du gaïacol à l'état naissant. Puissant modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indications. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites, catarrhe bronchique et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — *Sirop* : 2 à 6 cuillères à café par jour.

Comprimés : 2 à 6 par 24 heures.

Ampoules : Une tous les 2 jours.

Médecine infantile. — Chez les nourrissons, XXV à CXX gouttes de sirop mélangées aux biberons.

Petit flacon sirop.

Grand flacon sirop.

Tube de 20 comprimés.

Boîte de 12 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

RÉTHRAGINE

(Bougies antiblennorragiques radifères.)

Médication bactéricide et radio-active des affections urétrales aiguës et chroniques chez l'homme et chez la femme.

Présentation :

Bougies Réthragine « H » pour les hommes ;

Bougies Réthragine « F » pour les femmes.

Il existe deux concentrations radifères : 1 et 2 micros.
(Pour les femmes, 1 micro seulement.)

Prescrire : *hommes* : Bougies Réthragine « H » à 1 ou 2 micros ; *femmes* : Bougies Réthragine « F ».

Prix :

La bougie <i>Réthragine H.</i> (1 micro)	12 fr.
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine H.</i> (1 micro)...	55 —
La bougie <i>Réthragine H.</i> (2 micros)	15 —
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine H.</i> (2 micros) ..	70 —
La bougie <i>Réthragine F.</i> (1 micro)	12 —
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine F.</i> (1 micro) ...	55 —

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

RÉTROPITUINE CARRION

Composition. — Extrait injectable de lobe postérieur d'hypophyse, titré physiologiquement en unités internationales (*deux, cinq et dix* unités en ce qui concerne, respectivement, la Rétropituite n° 2, n° 5 et n° 10).

Formes :

Ampoules de 1 cc. (Rétropituite 2 et 10).

Ampoules de 10 cc. (Rétropituite 5).

Indications :

N° 2 : Inertie utérine au cours des accouchements.

N° 10 : Inertie utérine à la délivrance. Hémorragies post-partum. Métrites hémorragiques. Ménorragies. Prévention des hémorragies post-opératoires. Atonie de la musculature de l'estomac, de l'intestin et de l'appareil urinaire. Ulcère gastro-duodénal. Diabète insipide.

N° 5 : Hémoptysies des tuberculeux.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire de 1 cc. (Rétropituite n° 2) ; de 0 cc. 5 à 1 cc. (Rétropituite n° 10). Injection intraveineuse lente (Rétropituite n° 5).

Présentation et prix :

La boîte de 1 ampoule n° 2 ou 10 : 5 fr. 70.

— de 4 ampoules n° 2 ou 10 : 20 fr. 30.

— de 6 — n° 2 ou 10 : 28 fr. 10.

— de 3 — n° 5 : 18 fr. 70.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-St-Honoré — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

RÉVULSIF ADRIAN

Composition :

A base de terpènes retirés de diverses essences aromatiques et en particulier de l'essence de serpolet (ne contenant ni essence de moutarde, ni teinture de capsicum).

Présentation :

Révulsif médical et chirurgical.

Indications :

1° Révulsif médical :

a. Affections des voies respiratoires : bronchites, trachéites, asthme, grippe, etc.

b. Douleurs rhumatismales et névralgiques.

2° Révulsif chirurgical :

Préventif des complications pulmonaires par emploi systématique chez tous les opérés, avant et après l'intervention.

Posologie et mode d'emploi :

1° Révulsif médical :

En badigeonnage avec un pinceau sur le dos ou la poitrine du malade (voies respiratoires) ou sur la région douloureuse (douleurs rhumatismales ou névralgiques). Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

2° Révulsif chirurgical :

Badigeonnages le matin ou la veille de l'opération et quelque temps après l'opération en avant et en arrière de la cage thoracique. Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

Prix :

Le flacon révulsif médical : 10 francs.

— révulsif chirurgical : 14 fr. 50.

**Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

RÉVULSIF FISCH

(Anciennement Proclpha.)

Forme. — Liquide, incolore, aromatique.

Composition. — Mélange d'essences : Terpène Pinène, Carvacrol, irrite légèrement l'épiderme; odeur très agréable.

Indications. — Rhume, Laryngite, Bronchite, Maladies des voies respiratoires aiguës et chroniques; Affections rhumatismales et névralgiques.

Mode d'emploi. — Badigeonner avec un pinceau la surface à révulser.

Pour bains de pieds, 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants : diluer à 50 p. 100 avec alcool ou eau de Cologne.

Prix : 10 fr. 10.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X^e).

(Tél. : Trudaine 92-52.)

RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ;
- 2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ;
- 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ;
- 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ;
- 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ;
- 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins ;
- 7° il n'entre dans sa composition ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

Indications thérapeutiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-Pneumonie ; —
- 2° Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; —
- 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticollis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ;
- 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

Laboratoire BOUDIN

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 23-15.)

RÉVULSIF MANOR

Présentation. — Liquide incolore, d'odeur agréable.

Composition. — Essences complètes extra-distillées hexahydrothymol et hydrate de térébenthène.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires. Toutes les algies, superficielles ou profondes.

Mode d'emploi. — Badigeonnage sur la poitrine et sur le dos pour les voies respiratoires et *loco dolenti* pour les algies.

Particularités : Le *Révulsif Manor* ne produit jamais la moindre irritation de l'épiderme, pas même chez la femme, ni chez le nourrisson. Il convient donc pour tout le monde. Son action n'est pas simplement due à ce qu'il a une action topique locale, mais à ce qu'il pénètre dans les voies respiratoires par inhalation de ses vapeurs et à travers la peau.

Prix : le grand flacon, 12 fr. 50.

Laboratoires MANOR

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (Saône-et-Loire).
Tél. 35.

RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

Composition. — Essences naturelles. Terpènes, Alcool. (Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

Présentation. — 3 concentrations différentes :

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 7 francs.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 8 francs.

N° 3. *Pour adultes* : 9 fr. 65.

Le *Révulsif Milko* détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. Ne *tache ni n'altère les téguments*, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

Action secondaire : Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

Indications. — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE
Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

REXACARBINE

1 forme : granulé anisé sucré ; 2 formules.

Rexacarbine simple : Charbon animal purifié, Hexaméthylène-Tétramine chimiquement pure.

Rexacarbine naphtolée : Même association + 5 p. 100 benzonaphtol.

Indications. — Toutes affections et infections gastriques, intestinales, biliaires, urinaires et troubles digestifs d'origine hépato-biliaire (auto-intoxication intestinale).

Posologie :

1 à 3 cuillerées de granulé à la fin des repas croqué ou délayé dans un peu d'eau.

Contenance : 125 grammes (25 cuillerées à café).

Prix : 15 francs.

Laboratoires de la REXACARBINE

LAVIT_z (Tarn-et-Garonne).

RHAGADINE BRACQUEMOND

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et composition. — Pommade en tubes. Composé organique à base de kératine. Excipient gras.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de l'épiderme. Cicatrisant. Calmant aseptique et non toxique.

Indications thérapeutiques. — Crevasses des seins, érythèmes des nouveau-nés, fissures anales, écorchures, brûlures, ulcères variqueux, plaies atones, toutes irritations et érosions cutanées.

Prix. — Le tube : 9 fr. 75.

Échantillons sur demande :

Pharmacie ROUSSEAU

71, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 73-94.)

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.

Constitution. — Stock vaccin polyvalent, formé de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisées et desséchées à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

Propriétés. — Seule la méthode vaccinothérapique, qui agit par voie humorale, est susceptible d'assurer la destruction des germes infectieux dans les localisations à distances (vessie, testicules, utérus, ovaires, rein, articulations, etc.), où il est impossible de les atteindre par des médications locales.

Elle est toujours parfaitement tolérée, même par les malades les plus délicats.

La **Rhéantine Lumière** est un vaccin anti-gonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre.

Indications. — Affections gonococciques locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидidymites, ophtalmies d'origine gonococcique, etc.

Dose courante. — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Formuler. — Boîte de **Rhéantine Lumière**.

VACCINS-AUTOGÈNES. — L'expérience a montré que l'efficacité de la **Rhéantine Lumière** est très étendue, mais qu'elle ne saurait s'appliquer à des infections associées à des espèces très éloignées des cultures représentées dans le stock vaccin.

Les **Laboratoires Lumière** préparent des vaccins autogènes et fournissent le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45 rue Villon — LYON.

RHINADROL

(Baume nasal.)

Forme pharmaceutique et composition. — Vaseline semi-liquide, avec Camphre, traces de Menthol, baume du Pérou, Soufre colloïdal, Adrénaline huileuse et essences.

Propriétés. — Décongestionnant, calmant, bactéricide.

Avantages. — Consistance *semi-liquide*, introduction d'adrénaline à l'état huileux, ce qui assure une *homogénéité* parfaite du baume.

Indications. — Toutes inflammations de la muqueuse nasale. Toutes *rhinites* et à titre préventif contre les maladies contagieuses.

Présentation. — *En tube avec embout* pour faciliter l'introduction dans les narines. (Tube de 20 gr. environ.)

Prescription. — Un tube *Rhinadrol Falvy*.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences.

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

RHINAQUINTINE LESCÈNE

Anaquinine gouttes nasales.

Composition. — Aldéhydes, Thymoforme, Eucalyptol, Thymol, Ephédrine (à faible concentration). Huile neutralisée.

Forme. — *Flacon avec stilli-compte-gouttes stérilisable* à l'alcool comme un thermomètre, (breveté) sans caoutchouc et sans verre, permettant aux gouttes de pénétrer sans pression dans le nez et le cavum et sans blesser les sujets rebelles.

Indications. — Rhumes, Rhume des foins, Coryza des nouveau-nés (facilite les tétées). Rhinites, Sinusites, Ozène, Adénoïdites, Toux, Grippe, Coqueluche, Laryngites, Croup, Faux-croup.

Désinfection du Rhino-pharynx dans les maladies contagieuses. Prophylaxie des contagions. Désinfection du cavum avant et après ablation des végétations. Eclaircit la voix des chanteurs et des orateurs.

Mode d'action. — Sédatif puissant. Décongestionnant doux. Détersif non irritant. Nettoie les muqueuses, draine les sinus et le cavum. Empêche la stagnation du pus. Débouche le nez d'une façon douce et prolongée et facilite l'action des inhalations.

Evite la sécheresse des muqueuses (climats secs, chauffage central).

Indiquée en injections intratrachéales dans toux laryngées, asthme, croup, laryngites striduleuses.

Mode d'emploi. — *Affections aiguës* : 2 à 8 gouttes dans chaque narine 2 à 8 fois par jour. Injections intratrachéales : 2 à 4 cc. en une fois.

Affections chroniques : 2 à 3 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, r. de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19). LIVAROT (Calvados).

RHINASPIR

Poudre soluble et non caustique en étui saupoudreur pour aspirations et pulvérisations nasales.

Composition. — Adrénaline au 1/100, Scruroforme, Aristol, Benzonaphtol, Salicylate de soude, Lactose, Acide borique, Terpinéol, Essence de pin.

Propriétés. — Décongestionne et antiseptise la pituitaire, fluidifie, puis tarit les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, obstruction nasale par hypertrophie des cornets, ozène, sinusites.

Mode d'emploi. — 5 à 6 fois par jour, priser une pincée ou mieux la projeter dans chaque fosse nasale avec le lance-poudre Rhinaspir.

Prix de l'étui :

10 francs pour 8 à 10 jours de traitement.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

RHINO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'ampho-vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Le Rhino-Amphogel n'est pas une pommade. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une forte proportion (75 %) de bouillon-vaccin rhino-pharyngien) (pneumocoques, pneumobacilles, entérocoques, streptocoques, micrococcus catarrhalis, coccobacilles de Pfeiffer, staphylocoques).

Indications. — Affections du nez, Rhino-prophylaxie de la grippe et du coryza.

Avantages. — La gelée non grasse ne fond pas au contact des muqueuses, elle est absorbée lentement d'une façon remarquable et assure ainsi la protection continue du rhyno-pharynx. Sa présentation sous forme de gelée confère à ce produit des qualités d'ordre pratique (badigeonnages faciles à faire dans la journée) et d'ordre économique (le tube assure un long usage).

Mode d'emploi. Le Rhino-Amphogel s'applique en pansement nasal. Introduire le produit dans les narines à l'aide d'un porte-coton joint à la boîte. Par un mouvement circulaire en tapisser les muqueuses. Renouveler l'application 4 à 5 fois par jour.

Très grande activité. — Innocuité absolue.

En tube de 25 grammes environ.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie.

21, Bd de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Trud. 72-34.

RHINO-ANTIPIOL

Crème immunisante pour le traitement préventif et curatif des affections du Rhino-pharynx et la prophylaxie des maladies contagieuses.

Composition. — Crème adhérente à base de filtrats et autolysats immunisants associés à un complexe calmant, balsamique et décongestionnant.

Indications. — Coryza, Rhinites aiguës ou chroniques, Sinusites, amygdalites, Rhume des foins, Prophylaxie des maladies contagieuses.

Mode d'emploi. — Introduire un peu de crème dans les narines, 3 ou 4 fois par jour. Faire pénétrer par un léger massage en reniflant doucement. Le tube muni d'un embout pour l'introduction dans les narines : 10 fr. 75.

Ce produit peut être prescrit pour les Assurances Sociales.

Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.

8, avenue Walkanaer — NICE.

RHINO-BOROSTYROL

Composition : Huile au Borostyrol : 100 + Ephédrine basique 1 % + Larocaïne 0,50 %.

Formes. — Huile : flacons pour pulvérisation, rhino-capsules.

Propriétés. — Analgésique, antiseptique, cicatrisant et vaso-constricteur à effets durables, malgré que la teneur en éphédrine soit faible.

Avantages. — Jamais d'incidents ou accidents dus aux doses élevées d'Ephédrine.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Sinusites, Rhume des foins.

Posologie. — Les pulvérisations nasales 3 à 6 fois par jour donnent les meilleurs résultats; à défaut : Instillations de quelques gouttes dans chaque narine, 3 à 4 fois par jour.

Prix : le flacon de 25 grammes : 12 fr. 30 (15 jours de traitement).

La boîte de 24 capsules : 12 fr. 30 (8 jours de traitement)

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A Bruxelles : **LE MARINEL, Pharmacien,**

4, avenue Orban.

RHINO-COLLOÏDOL

Emulsion nasale antiseptique, décongestionnante, calmante et bactéricide.

Composition. — Chlorhydrate de phénylméthyl-aminopropanol naturel de l'Ephedra vulgaris, Essences antiseptiques déterpénées, Acide borique, excipient spécial émulsionnant.

Indications. — Affections nasales (coryza aigu, rhume des foins, sinusite, ozène et suppurations nasales).

Affections de la gorge (Angines, végétations, polypes, pharyngite).

Affections des bronches (asthme, toux, catarrhe).

Mode d'emploi. — Se moucher une narine après l'autre. Mettre ensuite de la pommade, gros comme un petit pois, à l'entrée de chaque fosse nasale. Masser légèrement et renifler doucement. Remettre de cette pommade plusieurs fois dans la journée en très petite quantité.

Laboratoires du VIOPHAN

81-83 rue de Lille — ROUBAIX (Nord).

RHINODROPS BÉRAL

Capsules nasales à l'huile d'Ephedra chlorétonée.

Propriétés. — *Balsamiques, Antiseptiques, Décongestifs.* Assurent la perméabilité des fosses nasales. Préservent des complications naso-pharyngées.

Indications. — *Toutes inflammations, congestions et obstructions nasales. Insuffisances respiratoires des Adénoïdiens et des Déformés du naso-pharynx. Toutes affections aiguës susceptibles de se compliquer d'infection naso-pharyngée.*

Mode d'emploi. — Couper l'extrémité du Rhinodrops et en vider la moitié dans chaque narine. (Faire incliner la tête du côté injecté.)

Formuler : *Rhinodrops Béral*, une boîte.

La boîte de 20 Rhinodrops : 11 francs.

Laboratoire de l'Éphédrine BÉRAL
194, rue de Rivoli — PARIS

RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jaborandi.

Forme. — Ampoules (instillateur spécial dans les boîtes).

Indications thérapeutiques. — Action élective sur les terminaisons sensibles des nerfs trijumeau et pneumogastrique, au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

Rôle essentiel: Régulation de la sensibilité des troubles congestifs et sécrétoires.

1° En Rhinologie. — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

Congestions et Obstructions Nasales
(Vaso-motrices).

Rhino-Pharyngites

Rhinites Atrophiques — Ozène

Rhume des foins

et Rhino-Bronchites Asthmatiques

Céphalées Rhinogènes

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foins en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits de jaborandi (Néopancarpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

2° En Ophtalmologie. — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hypersécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensibles et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaires et périorbitaires sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

Mode d'emploi:

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

Pour les yeux, il sera toujours préférable de faire l'instillation de I à II gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

Pour le nez et la gorge, les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III à IV gouttes chaque fois dans chaque narine).

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire de Pathologie générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI°).
(Tél. : Auteuil 35-25.)

RHINO-GLOTTYL

Composition. — A base d'extraits huileux totaux d'Érysimum, Belladone, Euphorbia pilulifera, Ephedra, avec adjonction d'essence de Niaouli et d'Amyléine.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique. Puissant décongestif. Antispasmodique.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites, Maladies infectieuses (grippe, rougeole, scarlatine, etc.), Asthmes, Rhumes des foins, Insuffisances respiratoires. Toutes manifestations congestives des voies respiratoires supérieures.

Formes :

- 1° *Solution huileuse* (Instillations et pulvérisations nasales. Injections intratrachéales).
- 2° *Capsules nasales* (Couper l'extrémité effilée de la capsule et en vider le contenu dans les deux narines).

Durée moyenne des unités de vente :
10 jours.

Prix : 16 francs.

Remboursement aux Ass. Soc., Cat. B.

Laboratoires R. DENIS

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 75-60.)

RHINOL

A base de Menthoforme, éther, non irritant, dérivé du menthol et du formol.

1° **OUATE RHINOL.** — Véritable filtre nasal, spécifique du coryza, Céphalée, Rhume des foins. Indispensable en temps d'épidémie, et dans tous les cas de grippe, influenza, bronchite, enrouement.

La boîte 3 fr. 90.

2° **POMMADE RHINOL.** — Vaseline au menthoforme, eucalyptol, essences volatiles. Mêmes indications.

Le tube avec canule : 7 fr. 30.

3° **COMPRIMÉS RHINOL.** — A base de menthoforme, borate de soude, baume du Pérou, essences de pin et d'eucalyptus.

Inhalations, gargarismes, pulvérisations, dans tous les cas de rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, maux de gorge, amygdalites, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites.

La boîte de 24 comprimés : 15 fr. 60. — 1/2 boîte : 8 fr. 35.

Laboratoire du Docteur DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 13-03.)

RHINO-LIPOSEPTINE

Solution concentrée de l'antitoxine du Professeur Lemoine pour pulvérisations dans le nez et la gorge.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. — Possède toutes les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

Indications. — En pulvérisations ou instillations dans le nez et la gorge dans tous les cas de maladies infectieuses où ces cavités sont atteintes : Angines, Coryza, Rhinopharyngites, Ozène, Sinusites, Grippe, Bronchites, Diphtérie, Rougeole, Scarlatine.

Mais ne présente aucun des inconvénients du menthol, pas d'irritation des muqueuses.

Mode d'emploi. — La Rhino-Liposeptine se présente en solution huileuse et en Capsulines auto-rhino-injectables. Pulvériser ou instiller plusieurs fois par jour.

En flacon ou en boîte de 20 Capsulines.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

RHINO-SPÉCIFIQUE FAVROT

A base d'Éphédrine végétale.

Solution pour pulvérisations nasales.

Composition. — *Ephédrine végétale, Atropine, Novocaïne, Lobéline* dans sérum physiologique.

Indications. — Remède abortif du Rhume de cerveau, *Rhume des foins*, troubles congestifs et hyperesthésiques de la muqueuse nasale, coryza anaphylactique, Hydrorrhée, Eternuements paroxystiques.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pulvérisations par jour.

Laboratoire Docteur H. FERRÉ
6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

RHINO-SULFORGAN

A base de soufre organique naturel en solution huileuse isotonique, le *Rhino-Sulforgan* peut être considéré comme le plus puissant désinfectant du rhino-pharynx.

Indications :

- 1° Prophylaxie de la Grippe et des maladies contagieuses par voies respiratoires ;
- 2° Toutes infections O. R. L.

Posologie :

- 1° En pulvérisations nasales 2 à 8 fois par jour ;
- 2° En tampons d'ouate imbibés du produit 2 à 8 fois par jour ;
- 3° En instillations intra-trachéales.

Prix : 16 francs.

LABORATOIRES SOUFFRICE

16, rue de Grammont — PARIS (II^e).
(Tél. : Richelieu 66-12.)

RHINO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Vaccination locale.

Composition. — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée détermine une immunité cellulaire locale.

Indications. — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites, Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

Posologie. — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le Rhino-Vaclydun n'est pas injectable.)

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Prix : 19 francs.

Nécessaire Rhino-Vaclydun contient 2 ampoules de lysat-vaccin et un petit pulvérisateur spécial.

Prix : 20 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

RHIZOTANIN CHAPOTOT

Composition. — Tanin de rhizome de fraisier extrait à l'eau, évaporé dans le vide à 0°. Phosphates et glycérophosphates de chaux et de magnésie. Cardamome.

Formes. — Cachets pour *adultes*. Poudre pour *enfants*. Granulé pour *adultes et enfants*.

Indications. — Tuberculose pulmonaire. Etats tuberculeux et pré-tuberculeux. Anémies. Bronchites chroniques (diminution des sécrétions et de l'expectoration). Amélioration rapide des accidents diarrhéiques quelle qu'en soit l'origine. Néphrites albuminuriques.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 cachets ou 2 à 4 cuillerées à café de granulé par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées mesure de poudre ou 2 à 4 1/2 cuillerées à café de granulé par jour.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoire CHAPOTOT

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 28-90 et 30-65.) — R. C. 231 917 B.

RHOCYA

Rhodate de potassium pur.

(Solution titrée : 1 goutte = 1 centigramme.)

Le rhodate de potassium possède toutes les propriétés biologiques des iodures et des préparations iodées, *sans contenir d'iode dans sa molécule* et sans en présenter les inconvénients (iodisme, réactions congestives ou thyroïdiennes).

Indications. — *Rhumatismes chroniques.* — Puisant effet analgésique, décongestif et trophique dans :

- 1° Les polyarthrites déformantes chroniques ;
- 2° Les séquelles des pseudo-rhumatismes infectieux, en particulier gonococciques ;
- 3° Les rhumatismes diathésiques.

Hypertension artérielle. — Abaissement des chiffres manométriques (Mx et Mn) dans les deux tiers des cas. Action directe sur l'athérome artériel.

Emphysème. — Asthme vieilli, séquelles respiratoires des gazés.

Scléroses viscérales. — Sénescence précoce, polyscléroses, scléroses par intoxications chroniques endogènes (goutte, oxalémie) ou exogènes (saturnisme, hydrargyrisme, bismuthisme, éthylisme). Lésions scléro-gommeuses de la syphilis tertiaire.

Oreillons. — Agit sur la localisation parotidienne et sur les localisations secondaires (orchite).

Avantages. — Aucune toxicité. Ni intolérance ni accoutumance.

Pas d'iode, donc pas d'iodisme.

(Thèse Géraud, Paris 1936.)

Posologie. — X à XX gouttes avant les 3 repas, 3 semaines par mois.

Remboursable par les Caisses d'Ass. Soc. à 80 %.

Société d'Applications Pharmacodynamiques
39, Bd de la Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).
(Invalides 43-60.)

RHODARSAN

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfoxyrate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

Présentations :

Doses unitaires de : 0 g. 15 — 0 g. 30 — 0 g. 45 — 0 g. 60 — 0 g. 75 — 0 g. 90. Prix suivant dosage.

Indications :

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Angines, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections graduées de 0 g. 15 à 0 g. 90.

Applications en poudre ou collutoires comme topique local.

Le Rhodarsan est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations et rigoureusement conforme au Codex 1938.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODAZIL

Benzoate de Benzyle. Antispasmodique non toxique.

Indications :

Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée, Hoquet, Coqueluche, Spasmes divers, Mal de mer, Vomissements du nourrisson.

Présentations :

Solution alcoolique à 25 % (flacon de 30 cm³).

Prix : 11 fr. 70.

Posologie :

Adultes : Une demi-cuillerée à café de solution, à renouveler plusieurs fois par jour.

Enfants : IV gouttes de solution, par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODIACARBINE

Ex-pâte Specia granulée antidyentérique.

Indications. — Entéro-colites cryptogénétiques, colites diverses. Formes subaiguës et chroniques de la dysenterie amibienne.

Présentations.

Boîte de 150 grammes de granulés. Prix : 29 francs.

Tubes de 20 comprimés. Prix : 14 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — Amibiase : Cure de 20 jours : un jour sur deux 1 à 3 cuillerées à café de granulés (ou 1 à 3 comprimés) aux deux principaux repas ; le jour intermédiaire, un sel arsenical (**Stovarsol**).

Colites : cures de 4 à 5 jours, 1 à 2 cuillerées à café aux 2 principaux repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODOBORYL

Présentation. — Poudre blanche, très soluble dans l'eau à laquelle elle communique une belle couleur rose. Génératrice d'oxygène naissant.

Mode d'action. — Antiseptique, astringent, décongestionnant et sédatif.

Indications. — Infections des muqueuses : Gorge (angines, pharyngites, laryngites, amygdalites) ; Bouche (stomatites, gingivites, aphtes) ; Nez (coryza, ozène, rhinites) ; Prévention des maladies contagieuses.

Mode d'emploi. — En lavages ou en gargarismes : une cuillerée à café par verre d'eau.

Prix : 12 fr. 80

Laboratoire MAUCHANT

J. EURY, Docteur en Pharmacie.

GENNEVILLIERS (Seine).

RHOFÉINE

Association d'acide acétylsalicylique (0^g. 50) et de caféine (0 g. 05) pour un comprimé (tubes de 20) ou un cachet (étuis de 10).

La caféine ajoute à l'aspirine ses propriétés tonicardiaques.

Indications. — Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.

Posologie. — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Prix de vente :

Tube de 20 comprimés.. 6 fr. 40

Etui de 10 cachets 5 fr. 80

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHUMOFAN

Cachets

Composition. — 1 cachet =

Acide phénylcinchoninique.... 0,30

Soufre colloïdique..... 0,20

Sels de lithium..... 0,05

Indications. — Spécifique du rhumatisme goutteux, rhumatisme articulaire, myalgies, sciaticque, névrites.

Mode d'emploi. — 2 à 10 cachets par jour, pris 2 par 2, dans un grand verre d'eau minérale ou tisane diurétique. Commencer par 6 cachets par jour, pendant deux jours, ensuite diminuer progressivement 2 par 2 ; dans les états aigus, augmenter au contraire jusqu'à 10 cachets par jour, puis rediminuer à nouveau.

Présentation. — Boîte de 20 cachets, prix : 19 fr. 80 pour 4 à 10 jours de traitement.

Littératures et échantillons :

Laboratoires OPOS

60, rue Nationale ; 1 et 3, rue Soumet,
CASTELNAUDARY. Tél. 3-10

RICIGONOL

Traitement de l'infection blennorrhagique et de ses complications

Complexe savonneux d'acridine suractivé par le Cristal violet, et débarrassé des inconvénients par la présence du chlorure de platine.

Mode d'action. — Antiseptique puissant très diffusible, action élective à l'égard du gonocoque. Décongestif, sédatif. Aucun accident veineux, pas de coup de soleil, pas de nausée.

Action certaine sur la toxine gonococcique. Disparition rapide de la douleur. Augmente la résistance du malade. Évite l'urétrite postérieure. Permet de commencer plus vite les soins locaux.

Indications. — Affections gonococciques et leurs complications, Epididymites, Rhumatismes.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. en boîtes de 4.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection, de préférence intraveineuse, le premier et le deuxième jour, puis une injection tous les deux jours.

Prix : 31 fr. 20.

Laboratoire TERRASSE

2, Rond-Point du Centre — LA GARENNE-COLOMBES (Seine).
(Tél. : Charlebourg 22-84).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 795-6.

RICILAX**Formule :**

Ricinoléate de magnésie... 1 gr.
Diacétyldioxyphénylisatine 2 mmg.
Pour 1 cachet.

Combinaison nouvelle d'huile de ricin et d'oxyde de magnésie.

LAXATIF DOUX

Avantages. — Contient uniquement l'acide ricinoléique ; dépourvu de ricinine et de ricine qui sont toxiques.

Chaque composant renforce l'action du produit auquel il est associé, l'acide ricinoléique agissant immédiatement et l'oxyde de magnésie prolongeant l'effet laxatif.

Aucune action congestive sur le tractus et les glandes digestives, ni sur les organes du petit bassin. Peut être administré à tous les malades, en particulier : enfants, femmes enceintes, nourrices.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes, banales ou spasmodiques, et toutes leurs conséquences. Entérocolite muco-membraneuse. Colites. Appendicite chronique.

Formes. — *Adultes* : Cachets.

Enfants : Granulé sans isatine.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 1 cachet le soir au coucher.

Enfants : 1/2 cuillerée à café par 3 années d'âge de granulé.

Posologie pouvant être modifiée suivant les tempéraments.

Prix : 14 francs pour 20 jours de traitement.

Laboratoire ROUX

60, route de Châtillon — MALAKOFF.

(Tél. : Alésia 12-55.)

RIODINE

$(C^{12} H^{22} O^8)^2 (I H)^2 C^2 H^6$.

Composition. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20% d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. *Action prolongée et durable sans iodisme.*

Pour obtenir une *action rapide et intensive* prescrire la **Néo-Riodine** : mêmes applications.

Indications. — Artériosclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 13 francs.

LABORATOIRES du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52, 53 et 54.)

ROB OBERLIN

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure	3 mgr.	6 mgr.	1 cgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 06
Arséniate de soude	1/2 mgr.	1 mgr.	1 mgr. 1/2

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

Enfants de 5 à 10 ans : 2,3 et jusqu'à 4 cuillerées à café par jour.

Le **Rob Oberlin** se vend en flacons d'environ 420 cc.

ROB CABANÈS

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure	1 mgr.	2 mgr.	3 mgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 004	0 gr. 008	0 gr. 012

En moyenne, 1 cuillerée à café par jour et par année d'âge, soit :

Un an : 1 demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

Deux ans : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Trois ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour.

Quatre et cinq ans : 1 cuillerée à entremets 2 fois par jour.

Six à sept ans : 1 cuillerée à soupe 2 fois par jour.

Le **Rob Cabanès** se vend en flacons d'environ 280 cc.

Leur présentation est discrète.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

ROBRODYNE

Reconstituant général.

Élixir d'un goût agréable, qui pour 100 cc. d'excipient liquide contient :

Teinture de noix vomique.....	0,20
— d'orange amère	0,50
— d'orange douce	0,50
— cannelle	0,50
Méthylarsinate de soude	0,08
Glycérophosphate de soude.....	1 gr.

Indications. — Faiblesse générale ; Convalescence ; Anémie, Croissance.

Doses :

2 verres à liqueur par jour avant les repas.

Prix. — 17 fr. 40.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 1403-3.

L. ROBERT, pharmacien.

Rue des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : n° 70.)

ROCHE-POSAY (LA)

Laboratoires des produits dermiques R. P.

Composition. — Produits aux sels silicatés naturels de La Roche-Posay spécialement préparés et gradués par des dosages de titane et de sélénium pour le traitement des affections de la peau depuis les eczémas aigus, prurits rebelles, dermatoses irritables jusqu'aux soins et entretien des peaux sensibles.

Nomenclature et prix :

1. Sels de bains R. P.	La boîte	5 et 10 fr.
2. Savon dermique R. P.	Le pain	8 —
3. Poudre dermique R. P.	La boîte	10 —
4. Pâte à l'eau R. P.	Le pot	14 —
5. Lotion blanche R. P.	Le flacon	14 —
6. Cérat inaltérable R. P.	Le tube	8 —
Cold cream naturel R. P. ...	Le tube	10 —
7. Cold cream naturel R. P.	Le pot	14 —
Cold cream naturel R. P. .	Le grand pot	25 —
8. Cold cream salicylé R. P. ...	Le tube	10 —

Laboratoires des **PRODUITS DERMQUES R. P.**
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

RODILONE

(1.399 F.)

Di (p. acétylaminophényl) sulfone.

Chimiothérapie anti-infectieuse polyvalente.

Indications. — Gonococcies aiguës ou chroniques (traitement par voie buccale à associer aux lavages), Pneumococcies, traitement et prévention des Complications pneumococciques, Infections à méningocoques, Staphylococcies et Streptococcies.

Présentations et Posologie :

Comprimés : Dosés à 0 gr. 50 (tubes de 20).

Adultes : 2 à 6 comprimés par 24 heures (7 à 14 jours de traitement).

Enfants : 1 à 2 comprimés par 24 heures.

Prix de vente : Le tube de 20 comprimés : 20 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

ROGERMA

Traitement cytophyllactique des affections de la peau et des muqueuses.

Phagocytogène, reconstituant cellulaire.

Indications. — Anthrax, Brûlures, Plaies atones, Ulcères variqueux, Blépharites, Conjonctivites, Otites externes et moyennes.

Traitement adjuvant de choix des néoplasmes.

Mode d'emploi. — Pur et tiède en pansements très humides.

Présentation :

Flacon courant	16 fr. 50.
Grand flacon (1 litre)	32 fr.
Flacon ophtalmique	18 fr.
Flacon otorhino.....	16 fr.

Échantillons :

Laboratoire ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

ROMARÈNE

Présentation. — Granulé aromatique fondant de saveur agréable.

Composition. — Association de végétaux cholérétiques (*romarin, taraxacum, combretum*) et de sels alcalins (*citrate de soude*).

Action thérapeutique :

Cholérétique : stimule la fonction hépatique, accroît la sécrétion biliaire.

Cholofluidifiant : modifie la nature de la bile et facilite son drainage.

Stomachique : résout les syndromes gastro-hépatiques.

Favorise la *diurèse* et la *régularité intestinale*.
Évite les réactions vésiculaires.

Indications :

Insuffisances hépatiques de toutes natures, cholémie, congestion du foie, **hépatisme**, ictères bénins, cholécystites, asthme hépatique, etc...

Syndromes gastro-hépatiques, dyspepsies, gastralgies, flatulences, état saburral, etc...

Cures d'entretien hépatique.

Mode d'emploi :

1 à 3 cuillerées à café par jour, croquer ou dissoudre dans 1/2 verre d'eau chaude ou de tisane aromatique.

Indications hépatiques : à jeun ou entre les repas.

Indications gastro-hépatiques : après les repas.

Cures d'entretien hépatique : 15 à 20 jours par mois.

Durée de consommation d'une boîte : 8 à 15 jours.

Prix : 17 fr. 15.

Laboratoire BEAUFOR

Docteur en Pharmacie,

Licencié : s Sciences,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

DREUX (E.-et-L.).

(Tél. : 145.)

ROMARINEX

Granulé.



Médication des Insuffisances Hépatiques.
Cholérétique, Diurétique, Laxatif.

Extrait fluide de Romarin	2,50
— mou d'Artichaut	0,15
— — de Boldo	0,50
— — de Pissenlit	0,45
— — de Combrétum.....	0,15
Agar-agar pulvérisé.....	1,00
Sel de Seignette	2,50
Salicylate de soude	5,00
Citrate de soude.....	10,00
Lactose	10,00
Sucré	Q. S. pour 100 gr.

Mode d'emploi. — Prendre à jeun, avant les repas du matin et de midi ou entre les repas, 1 à 2 cuillerées à café de Romarinex dissous dans un verre d'eau chaude ou mieux une infusion, suivant avis du médecin.

Laboratoire PHARMA-SPES

7, avenue Louise — LA MADELEINE-LEZ-LILLE
(Nord).

ROSALYL

Composition :

Ail.....	0 gr. 80
Thym	2 gr. 00
Marrube	1 gr. 00
Drosera	0 gr. 40
Grindelia	0 gr. 20
Bromure de sodium	0 gr. 60
Excipient liquide sucré et glyciné Q. S. P.	100 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant, sans toxiques, des grandes toux quinteuses et spasmodiques. Puissant désinfectant des bronches. Vermifuge par l'ail et le thym.

Forme. — Liquide sucré et glyciné. Une seule forme maintenant.

Indications. — *Coqueluche.* Toux nerveuses. Bronchites.

Posologie. — 1 an et 2 ans : 4 et 6 cuillerées à café par 24 heures.

3 ans et 4 ans : 4 et 5 cuillerées à café par 24 heures.

5 ans et au-dessus : 6, 7, 8 cuillerées à dessert par 24 heures.

Prix au public : 18 francs le flacon de 200 cc.

Préparé par : **Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien, Docteur ès sciences.

Vente et échantillons:

Laboratoires Drouet et Plet — RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 124.)

ROSASEPTOR

Poudre émolliente, tonique, décongestionnante et antiseptique. Spécifique de l'inflammation oculaire ainsi que de la bouche, des amygdales et du pharynx.

Indications. — Conjonctivites, Blépharites, Iritis, Chalazions, Orgelets, Ophtalmies, etc...

Mode d'emploi. — Le contenu d'un sachet ROSASEPTOR dans la valeur d'un verre d'eau bouillie chaude donne environ 150 gr. d'une solution stérilisée, antiseptique, **tonique** et émolliente pour lavages, compresses et bains d'yeux et traitement des stomatites, abcès dentaires, angines, pharyngites, etc.

La boîte de 10 sachets : 10 francs, pour 1 semaine de traitement.

La boîte de 20 sachets : 18 fr. 50, pour 2 semaines de traitement.

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

ROZIODE

Iode colloïdal organique complètement assimilable.

Variété d'iode à l'état de molécules extrêmement fines, de diffusion très rapide. — Ni toxique, ni irritant.

Propriétés. — D'une assimilabilité organique complète, d'une puissance thérapeutique rapide et augmentée. Agit comme l'iode et les iodures, sans en avoir les inconvénients. Pas d'iodisme.

Indications. — États congestifs, Hypertension, Hyperviscosité sanguine, Artériosclérose, Scrofule, Lymphatisme, Asthme, Angine de poitrine, Eczémas, Dermatoses.

Formes et prix :

Dragées Roziode	18 fr. 75
Pommade Roziode	15 fr. 60
Ovules Roziode.....	22 fr. 90

Mode d'emploi. — *Dragées :* Adultes : 4 à 6 par jour. *Enfants :* demi-dose.

Pommade : Dermatoses, Anthrax, Fissures anales, Blépharites, Conjonctivites.

Ovules : Un ovule le soir, maintenu par un tampon de coton hydrophile.

Laboratoires Gaston ROZE, Docteur en Pharmacie,
2, allée de Chelles — LE RAINCY (Seine-et-Oise).

DÉPOT GÉNÉRAL :

Laboratoires Ch. VERGELOT, Docteur en Pharmacie,
6, rue de Navarin, Paris (IX^e). (Tél. : Trudaine 50-18.)
Enregistré au Labor. de contrôle sous les N^{os} 680-7-8-9.

RUBIADERM

Pommade dans laquelle le *Rubiazol* est incorporé à un excipient représenté par des phospholipides.

Par son principe actif, détermine la stérilisation rapide des lésions septiques du revêtement cutané ; l'excipient, qui est soluble dans l'eau, assure une pénétration immédiate et intime de l'élément stérilisant dans toutes les parties de la région infectée.

Indications. — Plaies superficielles et anfractueuses, Dermites septiques, Trajets fistuleux, furoncles, anthrax, abcès, brûlures, etc...

Mode d'emploi. — D'une façon générale, on l'appliquera en couche épaisse ; si la plaie est anfractueuse, veiller à ce que toutes les parties soient bien imprégnées de *Rubiaderm*.

Prix au public :

Est également préparé par les Laboratoires du Docteur Roussel:

Le *COLLUBIAZOL*: Solution hydro-glycérinée de *Rubiazol*. Est utilisable pour le traitement des lésions inflammatoires des muqueuses.

Prix au public : le flacon : 16 fr. 60.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

RUBIAZOL

Première application de la chimiothérapie antibactérienne.

Produit sans aucune toxicité.

Indications. — A une action *curative et préventive* sur toutes les infections aiguës ou chroniques provoquées par le streptocoque, le staphylocoque, le colibacille.

Présentations :

Flacon de 40 comprimés à 0 gr. 20.

Boîte de 5 ampoules de 5 cc. contenant chacune 25 cgrs de principe actif (voie intramusculaire).

Posologie. — De 4 à 10 comprimés par jour, ou 2 à 3 ampoules de 5 cc. (voie intramusculaire).

Le traitement ne doit pas être prématurément interrompu, mais continué pendant 5 à 7 jours, à doses décroissantes, après l'apparition de la défervescence.

Prix : 40 comprimés : 20 fr. 80.

Boîte de 5 ampoules : 27 francs.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Voir aussi *Rubiaderm*.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

RUBROPHÈNE

**Chimiothérapie des tuberculoses
extrapulmonaires.]**

Composition. — Le Rubrophène (composition ci-dessous) est une nouvelle matière colorante. Il n'est ni un sel d'or ni un dérivé sulfonique.

Action. — Action directe et élective sur toutes les tuberculoses extrapulmonaires ; En moyenne, réduit de moitié le temps de l'évolution. Permet, en général, un traitement conservateur évitant les mutilations. En corollaire, amélioration marquée de l'état général. Toxicité nulle.

Indications. — Tuberculoses ganglionnaires : adénites, adénopathies trachéo-bronchiques. Tuberculoses péritonéale et intestinale. Tuberculoses des os et des articulations, abcès, fistules. Tuberculoses de l'appareil génito-urinaire. Tuberculoses cutanées. Tuberculoses des yeux.

Posologie. — (Pour détails, voir prospectus.)

Adultes : En général, 5 à 10 dragées par jour prises à la fois au cours du petit déjeuner.

En cas d'intolérance gastrique, un jour sur deux, remplacer les dragées par une ampoule intra-veineuse.

Traitement local (s'ajoute au traitement général) : tous les deux jours, injection d'une ampoule dans le trajet des fistules. Dans la tuberculose cutanée : application quotidienne de la pommade.

Enfants : Même principe que pour adultes. Doses initiales *pro die*, à augmenter suivant la nécessité :

Jusqu'à 3 ans : 1 dragée ou 1/6 d'ampoule.

— 10 — : 2 — — 1/3 —

— 15 — : 3 — — 2/3 —

Présentation :

Boîte de 100 dragées de Rubrophène dosées à 0 gr. 15. de triméthoxy-aurine (triméthoxy-dioxy-oxotri-tane).

Boîte de 10 ampoules de Rubrophène dosées à 0 gr. 30 de triméthoxy-aurine-bisulfite de soude et 10 ampoules d'eau bidistillée.

Tube de 50 grammes de pommade dosée à 5 p. 100 de triméthoxy-aurine

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE, M. LEFEBVRE, Pharmacien
25, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Tél. : Ségur 60-77.

RUTONAL

Phényl-méthyl-malonylurée.

Hypnotique et anti-épileptique succédané du gardénal, destiné aux malades intolérants ou résistants à ce médicament.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 20 (tubes de 20) ... 11 fr. 70
— à 0 g. 05 (tubes de 30) ... 6 fr. 90

Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, Constitution épileptoïde.

Posologie. — *Adultes* : Deux à quatre comprimés à 20 ctg. par 24 heures.

Enfants : Deux à quatre comprimés à 5 ctg. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc, 3/4; Adonis vernalis, 1/4.

Formes : *Dragées, Gouttes.*

Propriétés. — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

Posologie. — *Dragées* : 10 par jour.

Gouttes : LX par jour. — Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n^{os} 103-1 et 2.

Prix : 16 fr. 65. Durée 4-6 jours.

COMTE, Pharmacien

60, rue Saint-Guilhem

MONTPELLIER

SABURRASE

Présentation. — Granulé soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Possède une action légèrement laxative sans modifier brutalement le pH intestinal, comme la plupart des laxatifs salins. A cette action sur l'intestin s'ajoute celle des composés magnésiens sur le foie et les voies biliaires.

Un antiseptique puissant libère progressivement du guéthol dans l'intestin et en assure la désinfection totale, sans troubler la concentration hydrique du milieu.

Indications thérapeutiques. — Médicament des affections du tractus digestif, des intoxications générales et des syndromes hépato-biliaires.

(Dyspepsies, Constipation, Gastro-entérites, Insuffisance hépato-biliaire, Intoxications générales, Suites de grippe, etc...)

Mode d'emploi. — Prendre le matin, à jeun, une ou deux cuillerées à café dissoutes dans un demi-verre d'eau.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC

COURBEVOIE (Seine).

(Tél.: Défense 09-71).

SACNEL

(Lotion)

Composition. — Soufre colloïdal, acide dithiosalicylique, oxydes de zinc et de titane, extrait d'hamamélis, excipient aqueux.

Propriétés. — Par son action sur les cellules à cystéine des couches profondes de la peau, le SACNEL remédie aux troubles du métabolisme du soufre, il est antiphlogistique, non irritant.

Indications. — Traitement de l'acné (acné juvénile, acné ponctuée, rosacée, séborrhéique) et toutes affections pour lesquelles l'emploi du soufre est indiqué.

Forme. — Un flacon contenant 120 grammes de lotion très homogène.

Mode d'emploi. — Le SACNEL s'applique à l'aide d'un coton le soir avant le coucher. Il sèche, ne tache pas le linge, son odeur est agréable. Enreg. au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments sous le N° 1-11.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS (IV^e).

SAINT-ARÉ

(Même minéralisation que Carlsbad)

Sulfatée sodique à 6 ‰.

Chlorurée, bicarbonatée, magnésienne, calcique.

Propriétés :

Cholagogue, diurétique, hypotensive.

Indications thérapeutiques :

Syndromes vésiculaires et hépato-coliques.

Alcalose. Insuffisance hépatique. Dyspepsie biliaire. Stase du côlon droit.

Traitement à domicile.

**Société des Eaux Minérales de Decize
(Nièvre)**

Bureau à Paris, 49, boulevard de Port-Royal.
(Tél. : Gobelins 23-90.)

SALANTALE

Vaccins polyvalents polymicrobiens antiseptiques.

Antivirus. Antigènes.

Formes et indications :

AURICULO-SALANTALE

Vaccin glycériné. Flacon pipette auriculaire.

Affections purulentes otogènes.

CYSTO-SALANTALE

Pommade-Vaccin. Traitement par frictions cutanées.

Cystites, Pyélonéphrites, Colibacillosés.

GINGIVO-SALANTALE

Gelée pour massage gingival.

Gingivites, Stomatites, Pyorrhées et autres affections buccales.

OPHTALMO-SALANTALE

Pommade ophtalmique en tube. Ni irritante, ni caustique,
ni toxique.

Orgelets, Blépharites, Conjonctivites purulentes et autres suppurations.

OTO-SALANTALE

Pommade auriculaire en tube avec canule pour le conduit auditif.
Furoncles et affections purulentes du conduit auditif, Eczéma impétigineux, Otites externes, Pansements postopératoires.

OVULES SALANTALE

Odeur agréable. Désodorisants. Ne tachent pas le linge.
Leucorrhées et autres affections purulentes des voies génito-urinaires.
Pour fillettes : ovule petit format.

POMMADE SALANTALE

Applications par larges pansements et vaccination par voie
cutanée.

Furoncles, Anthrax, Panaris, Plaies infectées, Suppurations postopératoires et autres affections purulentes. Prophylactique de la Mastite.

RECTO-SALANTALE

Pommade calmante et décongestive, en tube avec canule rectale.
Affections du rectum et de l'anus, Hémorroïdes.

RHINO-SALANTALE

Pommade nasale en tube avec embout. Soulagement immédiat.
Rhumes, Grippe, Sinusites et autres Inflammations rhino-pharyngées.

SUPPO-SANTALE

Action calmante et décongestive.
Hémorroïdes, Fistules et Fissures anales.

TRACHO-SALANTALE

Pommade ophtalmique en tube avec canule breveté à l'usage oculaire.
Affections trachomateuses.

Echantillons et Littérature sur demande.

Laboratoires SALANTALE — STRASBOURG. Téléphone 53-26.

SALBINE DU D^r FAYÈS

Pommade réalisant l'action simultanée de ZnO porphyrisé et du Soufre précipité.

Indications. — Eczéma, Prurits, Folliculites, Intertrigo, Cicatrisant des plaies ou brûlures superficielles, en particulier après diathermo-coagulation.

Les applications locales deux ou trois fois par jour n'irritent jamais, ce qui permet un usage prolongé.

Ne tache pas le linge.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du D^r FAYÈS**

3, rue d'Alexandrie — PARIS.

SALÈNE SALÉNAL CIBA

ANALGÉSIIQUES EXTERNES.

Le Salène, mélange des éthers méthyl et éthyl-glyco-salicyliques, possède à un haut degré les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais a sur ce dernier l'avantage de son absence d'odeur et de toute action irritante.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Se formule magistralement, pur ou en liniment, par 5 ou 10 gr.

Le SALÈNE (liquide) se prescrit en frictions.

Le SALÉNAL (pommade en tube) se prescrit en applications.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

SALIBRA

Complexe Phospho-Chloruré
du **tonus** en Ampoules.

Composition. — Phosphates acides et Chlorures de calcium, magnésium, sodium, potassium, lithium, manganèse.

Indications. — Anémies, Asthénies, Surmenages. Convalescences, Grippe, Fatigues.

Tous états Alcalosiques (Dermatoses, Asthme, etc.).

Phosphaturie, Colibacillurie, Décalcification.

Rhumatisme chronique, Déminéralisation, Grossesse.

Rachitisme, Tuberculoses, Sénilité.

Tous les états psychiques.

Tonique général puissant.

Forme. — Ampoules buvables de 4 cc.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour pendant les repas.

Prix : 23 francs.

Durée : 10 jours.

Laboratoires du SALIBRA

1, rue des Jardins — ASNIERES. (Tél. : Grés. 27-94).

SALICAIRINE

Gouttes et comprimés.

Composition. — La *Salicaïrine* est une solution à 5 p. 100 de tanno-glucoside de la Salicaire. (*Lythrum Salicaria* ; *Lythracées*.) Comprimés titrés à 2 p. 100.

Propriétés. — Antidiarrhéique et hémostatique intestinal, agissant en particulier par dédoublement diastasique du tanno-glucoside en polyphénols antiseptiques et atoxiques. Agit très rapidement et très efficacement sur les phénomènes douloureux. (Action supérieure à celle des dérivés opiacés, sans en avoir les inconvénients.)

Indications. — Toutes les diarrhées des enfants et des adultes. Entérites aiguës et chroniques.

Posologie :

Enfants : de LX à C gouttes.

Adultes : de LXXX à CL gouttes, et plus (ou de 8 à 20 comprimés).

Doses d'autant plus élevées que l'état est plus aigu, les selles plus nombreuses. (Ni danger. Ni accoutumance.)

Présentation : Flacon de 24 gr. : 15 fr. Etui comprimés. : 15 fr

E. VIEL

37, avenue de l'Opéra — PARIS.

(Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.)

Usine à Rennes : 11 et 12, boulevard de Chézy. (Tél. : 20-61.)

SALICURE

Sel Naturel des Eaux Mères de Lons-le-Saulnier (Salines de Montaigu (Jura)).

Indications. — Cure hydrominérale hyperchlorurée, sodique, magnésienne et bromurée.

Nourrissons et enfants : Lymphatisme, Troubles de croissance, Rachitisme, Prétuberculose, Paralysies infantiles, Tuberculoses osseuses ou ganglionnaires.

Adultes : Anémie, Dépression, Surmenage, Troubles endocriniens, Rhumatisme, Arthrites et Périarthrites, Varices, Ostéomyélites, Troubles trophiques des fractures, Tuberculoses osseuses ou génitales.

Gynécologie : Métrites et Salpingo-Ovarites chroniques, Fibromes, Dysménorrhées, Stérilité, Déviations utérines.

I. — BAINS

	Eau	Salicure	Température	Durée
Nourrissons	30 litres	250 à 500 gr.	36°	5 minutes
Enfants	100 litres	750 à 1 kg. 500	32° à 37,5	5 à 15 minutes
Adultes	200 litres	1 à 3 kg.	32° à 37,5	5 à 15 minutes

II. — TRAITEMENTS LOCAUX

	Salicure	par litre d'eau	Température	Durée
Bains locaux	25 à 300 gr.		de 20 à 40°	10 à 30 minutes
Compresses	25 à 300 gr.		de 20 à 45°	1 à 3 heures
Plaies	7 à 20 gr.		36°	Renouveler souvent
Injectons	100 à 200 gr.		40 à 50°	Très lentement

Laboratoire A. LUCIEN, Pharmacien, 19, rue du Bac, PARIS (7^e)

SALICYLATE DE SOUDE CLIN

Toutes les préparations de Salicylate de Soude Clin sont à base de Salicylate de soude cristallisé, d'une pureté chimique absolue, exempt de phénols et d'acides libres.

Le dosage rigoureux, la composition toujours fixe, la stabilité, l'excipient adéquat assurent l'activité et facilitent la tolérance locale ou générale.

Indications et Formes.

Salicylothérapie : Rhumatisme articulaire aigu et ses complications. Rhumatisme chronique. Arthralgies, myalgies, névralgies. Affections biliaires. Encéphalite, chorée et zona. Sclérose en plaques. Psoriasis. Affections oculaires.

Voie buccale : *Solution de salicylate de soude du Docteur Clin.* — 2 grammes par cuillerée à soupe. Excipient d'un goût agréable et permettant une tolérance parfaite.

Voie veineuse : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 5 o/o* Ampoules de 20 cc. (1 gr. par ampoule) de 40 cc. (2 grammes par ampoule), de 60 cc. (3 gr. par ampoule).

Solution de Salicylate de Soude Clin glucosé à 10 o/o. (Formule du docteur René Benard) : Ampoules de 10 cc. et 20 cc., boîtes de 3 ampoules.

Médication sclérosante (Méthode du professeur Sicard) : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 20, 30 ou 40 o/o*, en ampoules de 3 cc. Boîte de 6 ampoules.

Polysalicylates Clin (Formule du Docteur Lutembacher)

Solution buccale — 0,75 par cuillerée à soupe.

Ampoules 10 et 20 cc. à 5 o/o.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SALICYLATE SURACTIVE « ANA »

Définition. — Solution, en eau de mer, de Salicylate de Soude chimiquement pur, en milieu calco-magnésien thiosulfaté.

Présentations :

- a. Solution : 1/2 cuillerée à café (incluse dans chaque boîte) ou LXX gouttes = 1 gr. de Salicylate de Soude ;
1 cuillerée à café = 2 gr.
- b. Dragées glutinisées à 0 gr. 50 (ne se dissolvant que dans l'intestin).
- c. Ampoules pour injections intraveineuses = 1 gr. par ampoule 10 cc.

Indications. — Toutes les indications du Salicylate de Soude.

Posologie. — Identique à celle du Salicylate de Soude.

Avantage. — Suractivé (170 p. 100), Goût agréable, Tolérance parfaite, Concentration forte.

Prix adapté (32 gr. de Salicylate par flacon) :

Solution	17 fr. 50
Ampoules	17 fr. 50
Dragées : le flacon de 64 dragées.....	17 fr. 50

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dor. 52-12.)

SALICYLNA

Dragées de Salicylate de Soude chimiquement pur, dont le mode de préparation spécial supprime les inconvénients habituels de la médication salicylée.

Trois avantages :

- 1° *Pureté chimique absolue*, assurant une efficacité régulière maxima ;
- 2° *Tolérance parfaite*, l'enrobage spécial des dragées évitant tout contact avec l'estomac ;
- 3° *Commodité d'emploi*, le dosage rigoureux (0 gr. 50 ou 0 gr. 25) permettant toutes les modalités de prescription.

Salicylna, 0,25. Étui de 120 dragées : 22 francs.

Salicylna, 0,50. Étui de 80 dragées : 22 francs.

Laboratoire du Docteur LAVOUE

RENNES (Ille-et-Vilaine).

SALIFORMIODE BOUCHEREAU

Chimiquement : Méthylidodosalicylate d'Hexaméthylène-amine et de sodium. Nouveau dérivé aminé iodosalicylé cristallisé, hydrosoluble, non toxique, d'action antiseptique 4 à 5 fois supérieure à celle de l'urotropine et du salicylate de sodium, d'une tolérance parfaite.

Indications. — *Spécifique des Rhumatismes aigus et infectieux*, arthrites, sciatiques, et troubles circulatoires ;

L'action vaso-motrice de l'iode se manifestant aux doses thérapeutiques.

Formes. — 1° Ampoules dosées à 0,70 de saliformiode par 10 cc. sérum glucosé : 1 à 2 ampoules par jour cas aigus de rhumatismes ;

1 tous les 2 jours, formes chroniques et troubles circulatoires, en intramusculaires profondes, à employer aussi comme *anti-infectieux général*.

2° Gouttes contenant 16 gr. pour 100 ; 30 à 60 gouttes 2 fois par jour.

Boîtes Ampoules (6). Prix public..... 45 fr. »

Flacon gouttes. Prix public 15 fr. 60

Laboratoire Contrôle n° 1621-4. Dépôt O. C. P.

Laboratoire de Chimie thérapeutique.

P. BOUCHEREAU

Docteur en Pharmacie, lauréat de la Faculté de Paris.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

Boulevard A.-Briand — (Tél. : Pompadour 197)

SALITROPINE AGUETTANT

Contre tous les états infectieux aigus,
localisés ou généralisés.

Composition essentielle. — Salicylate de Soude, Formine, en milieu glucosé.

Indications principales. — Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippe aiguë, Encéphalite aiguë et phlegmo-neuse, Fièvre puerpérale, Erysipèle, Rhumatisme polyarticulaire aigu et Maladie de Bouillaud, Infection des voies biliaires et urinaires, Etats typhiques et paratyphoïdiques, Colibacillozes.

Formes :

Ampoules de 5 et 10 cc. dosées à 0,10 de chaque composant par cc. *Comprimés* dosés à 0,165 de chaque composant.

Pilules kératinisées. — Même dosage que les comprimés. L'enrobage de ces pilules ne se dissout que dans l'intestin, elles n'éprouvent donc pas l'estomac, souvent sensible au salicylate (Procédé du Dr Philippe).

Posologie. — *Ampoules* : 1 à 2 par jour de 5 ou 10 cc. en injections intramusculaires ou de préférence intraveineuses, ou par voie rectale. Enfants, demi-dose.

Comprimés : dose moyenne, 6 par jour avant les repas ; pour les enfants, demi-dose.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-63.

SALSANOS

Complexe sodique.

Minéro-organique effervescent.

Composition. — Après effervescence la répartition des sels de sodium est approximativement :

Citrate trisodique naissant ($C^3H^3O^7Na^3$)	
IIH ³ O)	50
Tartrate naissant ($C^4H^4O^4Na^22H^2O$)	35
Sulfate (SO^4Na^2)	5,5
Phosphate (PO^4Na^3)	5,5

Propriétés. — Spécifique des troubles de l'équilibre. Acide-base. Met à la disposition de l'organisme les éléments ioniques et les tampons permettant la reconstitution et le maintien de la réserve alcaline.

Indications. — Acidose, Alcalose, Arthritisme, Artériosclérose, Lithiases hépatiques et rénales, Goutte, Hyperviscosité sanguine, Constipation.

Doses. — Une à deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun.

Prix : Le flacon 18 fr. 75 (15 jours de traitement).

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Galvani 84-41.)

SAL-SODYL

Sal-Sodyl N (Normal).

Sal-Sodyl S (Sulfaté).

Sal-Sodyl B (Bromuré).

Présentation. — Boîte de 30 prises de sel anhydre et pur.

Composition et indications. — *Sal-Sodyl N*: Phosphate, Citrate, Sulfate et Bicarbonate de Soude. Spécialement indiqué pour le traitement des gastrites, gastro-entérites et surtout hyperchlorhydries. *Sal-Sodyl S* (Sulfaté) : Pour les hépatiques avec ralentissement des fonctions intestinales. Action particulièrement remarquable dans le syndrome gastro-entéro-hépatique.

Sal-Sodyl B (Bromuré) : Pour le traitement des dyspepsies nerveuses et des troubles spasmodiques viscéraux.

Traitement. — *Adultes* : à jeun ou au début des repas à la dose de 1 ou 2 prises dissoutes dans un demi-verre d'eau.

Enfants : 1 demi-prise.

Bébés : 1 quart de prise.

Prix : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 496 27.

Laboratoire du SERPENT,

5, boulevard Gambetta, à GRENOBLE (Isère).

(Tél. : 16-40.)

SALVACID

Association de Bile, de Cholestérine, de Sauge et de Para-Thyroïde.

Indications thérapeutiques. — Aigreurs, Hyperacidité, Aérophagie, Gastrites. Spécifique des Ulcères d'estomac et du duodénum.

Mode d'emploi. — 2 comprimés dragéifiés après les 3 principaux repas et 1 comprimé en plus après les repas complémentaires, soit avec un peu d'eau, soit avec une tasse de tisane chaude.

Ne jamais les croquer (grande amertume). Ne jamais les avaler à jeun.

Conservation cinq années.

50 comprimés. Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

Tél. : Richelieu 35-10.

SALVATYL

Adopté par les Ministères de la Marine, des Colonies et de la Santé Publique.

Prophylaxie antivénérienne individuelle.
Pommade polyvalente agissant à la fois contre le tréponème et le gonocoque.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable. (Voir *Comprimés Proto-Gambier*.)

Mode d'emploi. — En applications dans le canal de l'urètre, sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. A employer le plus tôt possible; au plus tard dans les 6 heures consécutives à un contact suspect.

Présentations :

Salvatyl G. M.	14 fr. 60.
— Rech	10 fr. 40.
— P. M. (3 utilisations)..	6 fr. 25.

Laboratoire du GAMBÉOL

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 17-67.)

SALVÉ

A base de poudre grise (Hg cum creta), 1 centigramme par comprimé et 3 centigrammes par cachet et de carbonate de bismuth. Traitement bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

Indications. — Hérédo-syphilis, Traitement d'entretien, Insuffisance hépatique et ses manifestations, Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie, Dermatoses (eczéma, prurigo, strophulus), Helminthiase et plus particulièrement oxyurase.

Comprimés : avant 6 mois : 1/2 comprimé par jour.

6 mois à 1 an : 1 compr. en 2 fois.

1 an à 2 ans : 3/2 compr. par jour.

2 ans à 4 ans : 2 comprimés par jour.

4 ans à 15 ans : 3 comprimés par jour.

Adultes : 4 comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait, avant les repas.

Cachets : Traitement arsénico-bismutho-mercuriel.

Adultes : 2 cachets par jour.

Comprimés : 13 fr. 50.

Cachets : 15 fr. 60.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

SALVEBYL

(Granulé)

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire à base de poudre grise (Hg cum creta), hyposulfite de soude et d'extraits végétaux : artichaut, boldo, romarin, etc.

1 cuillerée à café contient 0,005 de poudre grise.

Indications. — Insuffisance hépatique, Migraines, Constipation chronique, Dyspepsie, Calculs biliaires, etc..., Eczéma, Urticaire, Prurigo strophulus.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires RICHER

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien —
PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

SALVENASE LEGOUX

Usage féminin.

Composition :

Traitement interne.

A. Comprimés
non enrobés se
désagrégeant
très rapidement :
constitués de :

Extraits secs.

Poudre de glandes.

Marron d'Inde
(stabilisé).
Cupressus.
Hamamelis.
Viburnum.
Boldo.
Surrénales.
Thyroïdes.
Ovaires.

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau de citrate
de soude pur.

Traitement externe.

Sels pour bains { Sulfate de potasse et d'alumine.
à base de : { Hydrochlorate de soude.
{ Carbonate de soude acide.

Indications. — Affections du système vei-
neux. Traitement complémentaire de la
cure aux eaux ou à défaut son meilleur suc-
cédané. (Bagnoles-de-l'Orne, La Léchère.)

Mode d'emploi :

Traitement interne. { 1° Matin à jeun, 1 cuillerée à café
pleine de granulé, dissous dans un
demi-verre d'eau.
(Prix : 18 fr. 65) { 2° A chaque repas de midi et du soir,
prendre 2 à 3 comprimés.

Traitement externe. { 1 bain ou 2 par semaine dans lequel
on aura fait dissoudre le contenu
d'une boîte Salvenase (sels pour
bains).
(Prix : 4 fr. 85)

Unité de vente { traitement interne, pour 10 jours,
{ traitement externe, pour 1 bain.

N° d'inscription au Lab. de Contrôle :

Traitement interne. { Comprimés 146-4.
{ Granulé .. 146-5.
Traitement externe..... 146-6.

**Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU
LEGOUX frères, Pharmaciens.**

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Charlebourg 20-79.)

SALYFRÈNE

« Salicylate de Soude Actif, Toléré, Agréable. »

Composition. — Chaque demi-cuiller à café-Mesure (LXXX gouttes) renferme :

Salicylate de Soude	1 gr.
(Recristallisé très pur)	
Extrait de Frêne	0 gr. 37
(Plante Fraîche stabilisée)	
Extrait de Reine des Prés	0 gr. 03
(Glucosides Salicylés).	
Extrait de Pommes Reinettes	0 gr. 33
(Laxatif doux).	

Avantages. — Salicylate extrêmement pur, activé par des extraits végétaux diurétiques. Saveur très agréable remplaçant totalement le goût nauséux du Salicylate. Gouttes concentrées permettant de mieux fractionner les doses.

Prix adapté : 20 fr. les 30 gr. Salicylate.

Indications. — Toutes celles du Salicylate de Soude.

Mode d'emploi. — De 4 à 10 mesures par jour, toujours bien dilué (Eau alcalinisée ou Lait chaud).

Petites doses : LX gouttes (= 0 gr. 50 Salicylate) de 3 à 5 fois par jour.

Nouvelle Forme. — Dragées Glutinisées à 0 gr. 50 Salicylate. Les seules Dragées Glutinisées renfermant des extraits diurétiques « entourant » et « divisant » le Salicylate, et reconstituant la forme. Gouttes dans l'intestin. (Traitements ambulatoires. Cures de complément.)

Laboratoires du SALYFRÈNE

17, Avenue de la Capelette — MARSEILLE.

Téléphone : Gar. 01-93.

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

Composition. Propriétés. — Extrait balsamique aux principes actifs de l'eucalyptus et du pin maritime, Bromoforme-Codéine, Belladone d'Aconit et d'Opium, Hypnal. Excipient glycéro-balsamique sucré.

Calmant énergique de la toux, Antifébrifuge, Anti-bronchitique, Anti-grippal.

Indications. — Rhumes, Laryngite, Trachéite, Bronchites aiguës et chroniques, Affections pulmonaires, Grippe et toutes ses formes, Coqueluche.

Formes. Posologie. — *Elixir (adultes)* : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.

Gouttes (enfants) : jusqu'à 10 ans, X gouttes par jour et par année d'âge ; jusqu'à 1 an, I goutte par jour et par mois.

Elixir : 21 francs. 20 cuillerées à dessert.

Gouttes : 17 francs. 600 gouttes.

Laboratoires Georges TINARD

134, bd Péreire — PARIS (XVII^e). Wag. 56-16.

SANALEPSI RUSSI

Pilules et gouttes.

Composition. — Chaque pilule ou XXV gouttes contiennent :

Ethylphénylmalonylcarbamide.....	0,05
Rhamnus pursh	0,10
Extraits antispasmodiques (Datura, Scopolia, Valériane)	0,04
Saccharine	0,002

Indications. — Epilepsies ; états spasmodiques ; troubles nerveux légers (agitation, insomnie, états d'angoisse, etc.).

Particularités thérapeutiques. — Action synergique des composants ; faible toxicité ; élimination rapide.

Doses :

Adultes : de 1 à 6 pilules (ou de XXV à CL gouttes) par jour.

Enfants : de V à L gouttes.

Suivant l'ordonnance médicale.

Prix :

Gouttes	26 fr.
Pilules, petit modèle.....	9 fr. 35
Pilules, grand modèle.....	26 fr.

Laboratoires SASSÉ

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

SANARGOL

Composition :

Argent colloïdal, hexaméthylène tétramine recristallisée dans l'alcool, salicylate de phényle, charbon de peuplier porphyrisé, charbon animal activé.

Une seule forme : granulé friable, aromatisé à l'anis.

Indications :

Désinfection intestinale, vésicale et biliaire. Fermentations, entéro-colites, flatulence, intoxications d'origine exogène et endogène. **Colibacillose**
Affections rénales, vésicales : cystites, néphrites.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas.

Enfants : 1/3 à 1/2 de la dose.

Un flacon suffit pour un traitement de 15 jours.

Le **SANARGOL** ne constipe pas.

Laboratoires BARDOU

13, quai Ragobert — JOIGNY (Yonne).

SANARTERYL

Hypotenseur.

2 formules : Masculine et Féminine.

Composition. — Gui, Belladone, Cratægus, Hamamelis, peptone iodée, phényléthyl-malonylurée, Orchitine ou Ovarine, Renine.

Thérapeutique. — Hypotenseur, sédatif des troubles cardio-vasculaires et nerveux des hypertendus, antispasmodique neurotonique. Ménopause.

Posologie. — Une cuillerée à soupe 1 quart d'heure avant les repas de midi et du soir.

Prix : 28 francs.

Laboratoire SANARTERYL

P. COLLIOT, Pharmacien

124, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 09-30.

SANAS

Composition :

Extrait glycéринé concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, facteurs A et D, sans trace d'huile ; ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre-Neuve).

Formes :

- 1° Gouttes ;
- 2° Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.

Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

Posologie :

Enfants : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

Adultes : Dose journalière : L à LX gouttes.

Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 16 fr. 05.

A. WELCKER et Cie

72, rue du Commerce — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 42-40.)

SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 20 cgr. d'isobutylallylmalonylurée.

Propriétés. — Assure un sommeil paisible et naturel, d'une durée normale, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite, également par les personnes âgées, les affaiblis, les convalescents.

Indications. — Toutes les insomnies.

Posologie. — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

Présentation. — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SANÉDRINE

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

Indications :

Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dysménorrhée, Prévention des accidents allergiques.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 025 (tubes de 20). **Prix :** 11 fr. 70

Solution aqueuse à 3 % Flacons de 30 cm³. — 23 fr. 50

Solution huileuse à 2 % Flacons de 15 cm³. — 17 fr. 50

Posologie et mode d'emploi :

Deux à six comprimés à 25 mg. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus et les prostatiques.

Pour l'administration par voie parentérale : ampoules de 1 cm renfermant : Sanédrine (0 g. 02), et Rénaleptine (0 g. 0002) — (boîtes de 10 amp.).

Pour l'usage externe : solution aqueuse de Sanédrine à 3 %, solution huileuse de Sanédrine Base à 2 %.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SANEX-INHALANT

Indications. — Traitement des affections aiguës et chroniques des voies respiratoires supérieures : Coryza, Rhinite, Laryngite, Trachéite, Coqueluche, Grippe, Ozène, Angine.

Composition. — Essences aromatiques et balsamiques rendues très volatiles par l'addition d'un solvant (Pin sylvestre, Thym, Lavande, Pinène, Niaouli). Ne contient pas de créosote.

Propriétés. — Décongestionne et aseptise la muqueuse rhinobronchique, atténue l'inflammation et réduit rapidement les sécrétions et l'expectoration.

Mode d'emploi. — Quelques gouttes sur le mouchoir plusieurs fois par jour et dans un verre d'eau chaude en inhalations.

Prix. — Le tube : 10 francs.

Échantillon sur demande aux

Laboratoires PILLIER

10, place Saint-Jacques — COMPIÈGNE (Oise).

SANGUIL

Reconstituant complet.

Composition. — Association de glycérophosphate de chaux, phosphate tricalcique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthyl-arsinate de soude, kola totale, noix vomique totale, surrénale.

Action thérapeutique. — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

Formes :

Cachets, la boîte de 42 : 19 francs.

Granulé de goût agréable, la boîte : 16 fr.

Mode d'emploi :

Cachets : Un cachet avant chacun des trois repas.

Granulés :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café par jour.

Adultes : trois cuillerées à dessert par jour.

A prendre au début des repas.

Laboratoires Ch. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 67-05.)

SANOCRYSINE DE MOLLGAARD

Thiosulfate d'or et de sodium.

OLÉO-SANOCRYSINE : (*Voir lettre O*).

Indications. — Tuberculose pulmonaire, cutanée, ganglionnaire, etc. Asthme bronchique, Maladies rhumatismales.

Forme. — Ampoules à doses progressives de 0 gr. 01 à 1 gramme, plus 1 ampoule appropriée d'eau bi-distillée stérilisée.

Mode d'emploi. — En injections intraveineuses ou intramusculaires (Leuret).

Posologie. — On débute par des doses faibles en augmentant progressivement selon la tolérance du malade, dosant et espaçant les injections suivant la méthode adaptée.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX
(Tél. : 80-989).

Dépositaire pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, pharmacien, 39, rue Fondaudège
BORDEAUX

SANOFORMINE

Composition. — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Forme. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques. —

- 1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;
- 2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre.

La boîte de 50 comprimés. Prix : 18 fr. 15.
15 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A BRUXELLES :

LE MARINEL, Pharmacien,
4, avenue Orban.

SANOGYL

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 7 fr. 25.

SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc.

Prix : 5 fr. 20

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens
Marques de « La Biothérapie »
5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e)
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

SANOQUINOL

A base d'Atoquinol (Cf. ce mot), d'hexaméthylène-tétramine, de chlorure de magnésium, citrate de soude et benzoate de lithine.

CIBA

MÉDICAMENT ANTI-ARTHRITIQUE.

CURES PROLONGÉES D'ÉLIMINATION URATIQUE.

Action thérapeutique. — Exerce sur l'organisme une action lixiviale caractérisée par la mobilisation lente et prolongée des dépôts uratiques, une stimulation de la fonction hépatobiliaire et de la fonction rénale, l'augmentation de la sécrétion de la bile et une diurèse abondante, éliminatrice des déchets de l'organisme.

Indications. — Toutes les manifestations de l'arthritisme. A titre préventif ou hygiénique, chez les sujets à complexion pléthorique, les obèses, herpétiques et rhumatisants. Après les maladies infectieuses.

Doses : 1 à 4 cuill. à café de granulé par jour (aux repas).

Flacon de 20/30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND.

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

SANTAL MIDY

Composition. — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Mysore, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

Forme. — Capsules.

Caractéristiques. — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

Indications. — Blennorragie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

Doses. — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et au moins un quart d'heure avant les repas.

Prix : 21 fr. 30.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et C^{ie}

Laboratoire de Pharmacologie Générale
8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

Forme. — Capsules gélatineuses.

Composition. — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques	0 gr. 16
Bleu de Méthylène.....	0 gr. 02

Propriétés. — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique, le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des affections des Voies urinaires.

Indications. — Blennorragie, Cystites, Pyuries, Prostatites, Colibacilliose urinaire.

Particularités. — Colore les urines en bleu.

Doses. — 6 à 10 capsules par jour.

Le flacon de 50 capsules : 21 fr. 30.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).
(Tél. : Invalides 52-73.)

SANTHÉOSE

Composition. — Théobromine d'une pureté parfaite, de préparation rigoureusement identique. S'administre seule ou associée.

Propriétés. — Diurétique cardio-rénal complètement inoffensif, d'une efficacité remarquable et d'une fidélité constante.

Six formules.

Santhéose pure. — Affections cardio-rénales, Artériosclérose, Albuminurie, Urémie. (Dose 0 gr. 50 et 0 gr. 25.)

Santhéose caféinée. — Asthénie, Asystolie, Œdèmes, Maladies infectieuses. (Dose 0 gr. 50.)

Santhéose lithinée. — Présclérose, Arthritisme Goutte, Gravelle. (Dose 0 gr. 75.)

Santhéose phosphatée. — Sclérose cardio-rénale, Anémie, Convalescences, Intoxications. (Dose 0 gr. 75.)

Santhéose scillitique. — Hydropisies d'origine cardiaque. (Dose 0 gr. 55.)

Santhéose spartéinée. — États asystoliques et Atonie cardiaque. (Dose 0 gr. 525.)

Forme. — Se présente en cachets ayant la *forme d'un cœur*. Boîtes de 24 cachets

Mode d'emploi. — 1 à 4 cachets par jour entre les repas.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires de la SANTHÉOSE

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arc. 95-60.)

SANTONIA

Vermifuge énergique pour la destruction des vers intestinaux, quelle qu'en soit l'espèce (sauf le ver solitaire).

Formule :

Santonine	0 gr. 01
Calomel	0 gr. 02
Semen contra, riche en essence	0 gr. 10

Par comprimé (tube de 12 comprimés). **Prix : 7 francs.**

Indications. — Le SANTONIA VENOT est le remède rêvé pour la destruction des oxyures, ascaris, tricocephales, ankylostomes, etc.

Mode d'emploi :

Enfants à partir de 3 ans : 1 comprimé le matin pendant 3 jours.

De 6 à 12 ans : 1 comprimé le matin pendant 6 jours.

Adultes : 2 comprimés le matin pendant 6 jours.

Laboratoires VENOT

139, avenue E.-Zola. — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 31-75.)

SANUBROL MARS

Formule. — Essences antiseptiques diverses : formol, camphre, borate de soude, etc...

Indication. — Solution antiseptique et bactéricide très puissante pour le lavage de toutes les plaies et la toilette intime.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe par litre d'eau bouillie pour le lavage des plaies, trois cuillerées à bouche par litre pour la désinfection des parquets, pure pour la désinfection des fèces à mettre directement dans le vase.

Échantillons sur demande.

Prix : 11 fr. 50. Le flac. contient envir. 12 cuil.

Laboratoire MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22.

Et chez tous les grossistes.

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.

Spécifique des Prurits. — Eczémas.

Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN, Adoucissante, antiprurigineuse, Dermites aiguës.

Sapocade. — (Sapolan et Huile de Cade.). Psoriasis, Séborrhée, Sycosis. Prix : 12 fr. 80.

Lait de Sapolan. — Erythèmes. } Prix : 13 fr. 90

Lait de Soufre Sapolan. — Acné. } et 21 fr. 30.

Lait de Cèdre Sapolan. — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu.

Poudre de Sapolan. — Dermites aiguës. 12 fr. 80.

Savon de Sapolan. — Savon surgras au Sapolan :

Peaux irritables. Prix : 5 fr. 35.

Sapobarbe. Infections cutanées.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

[(Tél. : Auteuil 65-97.)]

Détail : Ph^{ie} 116, bd Haussmann et ttes ph^{ies}.

SAPOREX (Liquide)

Non caustique. Non toxique.

Enregistré au Lab. Nat. de cont. des médicaments sous le n° 1074-1.
Composition de savon liquide, neutre, stérile, impeccable, associée
au thymol, glycérine et essences aromatiques naturelles déterpenées.

Formule :

Essence lavande.....	0,35	Santal.....	0,07
— thym.....	0,13	Thymol.....	0,10
— citronnelle.....	0,08	Glycérine chimiquement	
Verveine.....	0,07	pure à 30°.....	5,00
Savon liquide.. Q. S. p. 100.			

Indications :

Obstétrique-gynécologie : 1 cuillerée à soupe par litre d'eau.

Oxyures : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède, en petit lavement et
savonner la région anale, trait. : 40 jours. (Trait. : 5 jours, repos 5 jrs.)

Désinfection de toutes plaies : dilution 10 à 20 p. 100.

Désinfection buccale : quelques gouttes dans un verre d'eau.

Acnés juvénile et rosacée, sueurs profuses : massage au Saporex pur, jus-
qu'à absorption (application au coucher pendant 8 à 10 jours).

Furonculose, lavages et compresses chaudes : dilution 10 %.

Toilette intime, toilette des bébés : préventif de l'érythème fessier.

Flacons G. M. (500 gr.) : 18 fr. 75. — Flacons P. M. (250 gr.) : 12 francs.

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

Laboratoires LIP et SAPOREX

184, route de Genas — LYON (III^e). (Tél. : Villeurbanne 93-88.)

Voir *Ovules Saporex*.

SAPOSIDE

Composition. — Saponine du gayac, non hémoly-
tique et non toxique.

Indications. — Fixe la cholestérine, en favorise
l'élimination. Accélère la résorption du cal-
cium. Arthritisme, Dermatoses, Ulcérations traî-
nantes, Sang lourd.

Forme :

1° Ampoules de 5 cc. à 2/1 000°, injectables.

2° Flacon de solution à 4 % ingérable.

Posologie :

1° SAPOSIDE *Ampoules* : 2 à 3 ampoules de 5 cc.
par semaine.

2° SAPOSIDE *Gouttes* : XXV gouttes, 2 fois par
jour pendant 3 semaines.

Prix : SAPOSIDE *Ampoules* : 26 fr. 50.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e). (Tel. : Aut. 65-97.)

SAPROXYL

Composition et propriétés. — Complexe glucidique agissant physiologiquement sur les infections, fermentations et putréfactions intestinales, en favorisant le développement de la flore acidogène normale et en plaçant les bactéries de la putréfaction dans un milieu acide défavorable (pH trop bas).

Forme. — Comprimés.

Indications. — Entérites (aiguës, subaiguës ou chroniques). Gastro-entérites. Côlites (ascendante ou transverse). Fermentations intestinales. Diarrhées. Infections intestinales spécifiques : Fièvres typhoïde et paratyphoïde, Dysenteries, Salmonelloses, Cholérines, etc...

Posologie :

Trois fois 6 comprimés par jour, avalés avec un peu d'eau avant les repas. Au fur et à mesure de l'amélioration, diminuer progressivement jusqu'à la dose d'entretien : 3 fois 2 comprimés par jour.

Prix : La boîte de 140 comprimés environ (8 à 18 jours) : 16 fr. 15.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeanhin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Galvani 84-41.)

SARCOPTOL

Solution complexe à base de soufre colloïdal, acide-B-oxynaphtylortho-oxymétatoluilique, savons, essencés.

Indications. — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermites microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit, Prophylaxie de la Furunculose, Parasiticide. Spécifique de la gale, qu'il guérit en une seule application sans frotte et sans bain.

Avantages. — Ne tache ni le linge ni la peau, d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime instantanément les démangeaisons.

En flacons de 60 grammes : 16 fr.

— 120 — 30 fr.

Laboratoire du Sarcptol

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 29-54.)

SARIDON

Composition : Formule nouvelle :

Phényldiméthylisopropylpyrazolone .	0 gr. 15
Acétylparaphénétidine.....	0 gr. 25
Allylisopropylacétylcarbamide	0 gr. 06
Triméthylxanthine	0 gr. 05

Pour un comprimé.

Propriétés. — Jugule la douleur, supprime les maux de tête, apaise la fièvre, calme l'éréthisme nerveux. Aucune possibilité d'accumulation, aucun danger d'accoutumance, aucun risque de toxicomanie.

Indications. — Algies, névralgies, migraine, grippe, rhumatisme, maux de dents, sinusite, otite, etc..

Posologie. — 1 à 3 et même 4 comprimés par jour. A prendre avec un peu d'eau ou de liquide quelconque.

Enfants : 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Boîte de 10 comprimés.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-63.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SATURALGINE

Comprimés calcaires fluorurés friables.

Propriétés thérapeutiques. — Produit absorbant et alcalin, neutralisant l'acide chlorhydrique. Sédatif des douleurs gastriques. En cas de diarrhée, espase les selles et leur rend leur consistance normale.

Indications. — Toutes les gastralgies et tous les troubles dyspeptiques liés à l'hyperchlorhydrie. Les fermentations anormales de la digestion accompagnées ou non de diarrhée.

Posologie et mode d'emploi. — 1 comprimé à la fin des repas. Sucrer ou délayer dans un peu d'eau. Ensuite 1 ou 2 comprimés au moment des douleurs.

La boîte : 10 fr. 50.

Laboratoire Central de la Bastille

F. BAYLOT

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e)

(Tél. : Archives 38-31.)

SAVONS LIQUIDES RAMET

Pour l'hygiène et comme complément de traitement des maladies de la peau et du cuir chevelu.

Boraté.....	A l'huile de Cade vraie
Camphré.....	A l'huile spéciale pharmaceutique
Au coaltar.....	
Au coaltar concentré.....	A l'Ichthyol
Doux.....	A l'Oxycyanure de Mercure
Doux à la glycérine.....	Au Naphtol
Doux surgras à la lanoline.....	Au Sulfate de Quinine et teinture de Quinquina
A l'extraît de Camomille bleue...	A l'extraît de bois de Panama
A l'essence de Cèdre redistillée..	Au Pétrole
	Phénolé
A l'essence de Pin.....	Résorciné
A l'Eucalyptol.....	Au Romarin
Iodé.....	Salicylé
A la Formaldéhyde.....	Simple
Au goudron végétal.....	Sulfuré ordinaire
Thymol.....	Sulfuré concentré
Au Trioxyéthylène.....	

Prix : l'ampoule 3 fr. 95 Boîte de six ampoules
 11 fr. 1/4 de flacon 125 grammes environ
 16 fr. 50 1/2 — 250 —
 23 fr. 50 flacon 500 —

PHARMACIE GÉNÉRALE

54, Chaussée d'Antin — PARIS — (Tr. 21-06)
 Echantillons gratuits des SAVONS RAMET aux
 Laboratoires des SAVONS RAMET
 Fontenay-Mauvoisin, par Mantes-Gassicourt (S.-et-O.)

SCILLARÈNE

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Glucoside cristallisé, principe actif du Bulbe de la Scille.

Formes. — Comprimés à 0 mgr. 8 de substance active, solution à 0 mgr. 8 pour XX gouttes ; ampoules pour injections endoveineuses ou intramusculaires profondes de 1 cc. à 0 gr. 0005 ; suppositoires dosés à 1 mgr.

Propriétés. — Produit pur. Cardiotonique et diurétique général et azoturique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — 1° Cœur sénile ; 2° maintien de la compensation ; 3° puissant diurétique dans les néphrites, le diurétique azoturique vrai.

Posologie. — 1/2 à 1 ampoule par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
 20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SCILLITRINE

Composition. — Chaque dragée contient : II gouttes de la solution alcoolique de Trinitrine à 1/100^e, 2 cgr. d'Extrait de Scille stabilisé, 1 cgr. de Poudre de Scille stabilisée et 1 cgr. de Phényléthymalonylurée.

Propriétés. — Antispasmodique par la Trinitrine et la Phényléthylmalonylurée. Diurétique et toni-cardiaque par la Scille.

Noyau mou. — Ces substances sont réunies dans un noyau mou qui en permet l'absorption *per orale* lorsqu'on *croque lentement* les Dragées. A cette absorption *per orale* succède une action immédiate.

Posologie. — Elle est double du fait de l'existence du Noyau mou.

1. *Croquer lentement* de 2 à 4 dragées de Scillitrine en 10 minutes pour juguler les crises.
2. *Absorber*, aux repas, 3 dragées de Scillitrine, *pro die*, pendant 15 jours par mois pour faire disparaître les Troubles fonctionnels des hypertendus.

Indications :

- 1^o *Les crises* : Crises d'Angor, d'Hypertension paroxystique, de Tachycardie paroxystique, d'Aérogastrie, d'Aérocolie, d'Asthme, d'Anxiété, Crises des faux cardiaques, des Basedowiens, de vomissements de la Grossesse ;
- 2^o *Traitement d'entretien des hypertendus* chez lesquels l'absorption par voie gastrique fait disparaître les troubles fonctionnels.

Présentation. — Boîte contenant 45 dragées. Durée moyenne : 1 mois.

Prix : 22 francs.

Laboratoire PERRIER

12, rue Henner — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 51-03.)

SOLERANA

Ancienne dénomination **SOLÉROSERU V ANA**

MÉDICATION SCLÉROSANTE

(Formule de Vendel.)

Composition. — Solution à diverses concentrations de chlorhydrolactate double de quinine et d'urée ANA.

Présentations commerciales et concentrations à employer :

I^o Sclerana hydrocèle (30 %).

Indications : Hydrocèles, Hygromas, Bursites, Affections kystiques.

II^o Sclerana Varices (25 %).

Indications : Varices (diluer à 15 %), Fistules (diluer à 10 %), Hydarthroses (diluer à 5 %), Trachomes (diluer à 2 %).

III^o Sclerana O. R. L. (7,50 %).

Indications : Rhinites congestives.

IV^o Sclerana Hémorroïdes (5 %).

Indications : Hémorroïdes, Fissures anales, Hydarthroses.

Posologie. — Réclamer aux Laboratoires ANA l'opuscule édité par leurs soins.

Propriétés. — Activité, Innocuité, Fidélité des résultats.

Prix de chaque traitement :

Varices.....	52 francs
Hémorroïdes	35 —
O. R. L.	35 —
Hydrocèles	35 —

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS.

SCLÉROLYSINE DUCATTE

Thérapeutique de l'Artériosclérose et de l'Athérome.

Solution colloïdale de phosphatides organiques. Médication hypotensive dissolvante des dépôts artériels.

Action thérapeutique. — Est indiquée dans le cas d'artériosclérose confirmée, chez tous les sujets qui présentent les petits symptômes de la pré-sclérose. Prescrite toutes les fois que la tension artérielle est élevée, la *Sclérolysine* réussit à diminuer l'hypertension puis à la faire disparaître.

Posologie. Mode d'emploi :

Trois formes : *Solution*, Ampoules de 2 cc., *Dragées* : de 1 gr. 25.

Solution : 2 à 4 cuillerées à café par jour, une *demi-heure* avant chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

Ampoules : Une injection sous-cutanée chaque jour pendant 15 jours. Continuer le traitement *per os* avec la solution en alternant l'un et l'autre.

Dragées : 2 à 4 dragées par jour, une *demi-heure* avant les repas. Cette forme facilite l'usage de la *Sclérolysine* et assure une bonne conservation dans tous les pays chauds.

Aucune contre-indication.

Durée minimum du traitement : Séries de 1 à 3 mois.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré — PARIS.

SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique
Spécifique de l'Artériosclérose.

Composition. — Acide thyminique, Théobromine, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose :

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

SCLEROSERUM « ANA »**Méthode sclérosante.**

(Solution de Vendel.)

Solution à différentes concentrations de Chlorhydrolactate double de quinine et d'urée.

A partir du 1^{er} janvier 1939,
le *Scleroserum « Ana »* ne sera
plus mis en vente que sous la
dénomination de :

SCLERANA

(*Se reporter à cette référence.*)

SCLEROTENSYL

*Hypotenseur de choix ne choquant pas
le malade.*

Forme. — Gouttes.

Composition. — Extrait de gui, Benzoate de benzyle, Nitrite de soude, Gardénal.

Indications. — Hypertension.

Posologie. — XV à XX gouttes avant les deux repas.

Prix : 20 fr. 50.

Laboratoires ELSSE

Ph. CHAVANNE,

Docteur en Pharmacie

FONTAINE-GRENOBLE (Isère).

SCUROCAÏNE

Chlorhydrate du para-aminobenzoyl-diéthylaminoéthanol.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

Solutions : en ampoules stérilisées à divers titres, additionnées ou non de Rénaleptine, pour usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration. Anesthésie dentaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

SEDABIOS

Présentation. — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et en boîtes de 3 ampoules de 2 cc.

Principes actifs. — Bromhydrate des alcaloïdes totaux de l'opium renfermant 50 p. 100 de morphine, bromhydrate de scopolamine et bromure de sodium.

Indications. — Préanesthésique puissant, présente de très grands avantages en chirurgie. Analgésique et sédatif du système nerveux, hypnotique puissant. En médecine, est indiqué dans tous les phénomènes douloureux, insomnies, etc.

Mode d'emploi. — En injections hypodermiques soit intraveineuses ou intramusculaires à la dose de 1/2 ampoule, soit 1 cc., ou d'une ampoule entière de 2 cc.

En chirurgie, il est bon de faire une injection intraveineuse 45 minutes avant l'opération, et dans le cas où celle-ci se prolonge, en faire une autre 45 minutes après le début de l'intervention.

Tenir compte de ce que l'injection intraveineuse agit beaucoup plus vite que l'injection intramusculaire.

Laboratoires **PROBIOS**

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

SÉDACÔNES

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-38.

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Papavérine, allylisopropylmalonylurée, cupressus sempervirens.

Propriétés pharmacodynamiques. — Spasmodytique, sédatif de la douleur, décongestif.

Indications. — Toutes les douleurs du petit bassin et de la région ano-rectale : douleurs des règles et de la zone génitale chez la femme ; douleurs prostatiques chez l'homme ; spasmes et crises douloureuses de la musculature lisse ; Sédatif hypnogène, assure un sommeil calme et un réveil normal.

Posologie. — Un à deux suppositoires par jour suivant l'intensité de la douleur.

La boîte de 6 suppositoires : 15 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

SÉDACRINE

Gouttes

A base de Sédum acre, Polygonum hydropiper et Pœonia avec comme excipient :

Extrait stabilisé de marrons d'Inde et Hamamélis.

Indications. — Toutes affections du système veineux.

Mode d'emploi. — De XX à XXX gouttes avant chacun des deux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

SEDANGOR

Dragées à noyau mielleux.

Formule :

Erythrite tétranitrée.....	0,001
Trinitrine à 1 %.....	0,025
Caféine.....	0,015
Théobromine.....	0,01
Phosphate sodique.....	0,01
Chl. éthylmorphine.....	0,0032
Excipient spécial.....	Q. S.

P. 1 dragée à noyau mielleux.

Indications. — Hypertension artérielle et ses manifestations, *Angor Pectoris*, Asthme cardiaque, Œdème pulmonaire, Aortites, etc.
L'érythrite tétranitrée renforce et prolonge l'action immédiate, mais fugace de la trinitrine.

Posologie. — Croquer les dragées par une à la fois.

Dose maxima : 10 par jour, 3 en cinq minutes.

Présentation. — Etui de : 60 dragées.

Prix au public : 22 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1025-6.

M. GADREAU, Docteur en pharmacie.

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

SAVIGNY-SUR-ORGE (Seine-et-Oise).

(Tél. Juvisy 398.)

SÉDAORTINE

Préventif et curatif de l'angine de poitrine.

Composition. — Dragées rouges à noyau pâteux contenant exactement par dragée :

Trinitrine en solution au centième.....	III gouttes.
Codéine.....	1 cgr.
Phényléthylmalonylurée.....	15 mgr.
Caféine.....	3 cgr.
Benzoate de soude.....	10 cgr.
Excipient sucré, Q. S. pour une dragée.	

Propriétés. — La Sédaortine est un médicament préventif d'abord et toujours curatif de l'Angine de Poitrine, elle calme toutes les douleurs voisines du cœur et de l'aorte.

Indications thérapeutiques. — Angine de poitrine, spasmes artériels, aortites douloureuses, insuffisance ventriculaire gauche (Cf. *Journal de Médecine de Paris*, avril-mai 1935).

Mode d'emploi. — Croquer une de ces dragées :

1° Le matin dès le réveil.

2° Avant tout effort physique.

3° Avant l'horaire des douleurs (s'il en existe un).

4° Pendant une douleur.

Dose moyenne : 5 à 6 dragées par 24 heures. Après amélioration, continuer pendant un an à prendre 1 à 2 dragées par jour.

En boîte de 30 dragées.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X°). (Tél. : Botzaris 38-78.)

SÉDARTHRYL

Médication synergique du rhumatisme articulaire et des arthrites.

Salicylate de Sodium .	18 gr. 1629	Azotate de Potasse	6 gr.
Salicylate de Potassium	3 gr. 782	Iodure de Sodium	4 gr. 50
Salicylate de Calcium.	4 gr. 4392	Antipyrine	4 gr. 50
Teinture de Colchique	2 gr.	Sirop d'écorces d'o-	
Benzoate de Sodium ..	2 gr.	range amère	200 gr.
Benzoate de Lithine..	2 gr.	Glycérine.....	45 gr.
Aspirine	0 gr. 25	Eau distillée q. s. p....	310 cc.

Flacon pour 10 jours de traitement. Prix : 25 francs.

Particularités. — Association hyperactive des 3 salicylates, aux diurétiques et à l'iode de Sodium.

Emploi. — *Cas chroniques* : 3 fois par jour 2 cuillerées à café, au milieu des repas.

Cas aigus : De 8 à 12 cuillerées à café dans des tisanes bien sucrées.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu et surtout chronique, douleurs articulaires. Arthrites rhumatismales et tuberculeuses.

Laboratoires du PULMODYNOL

(Spécifique pulmonaire, tonique et eupnéique.)

A. GONTARD

22, rue de Nemours — PARIS

SÉDASTHMIINE

Composition :

Kl.....	0,10
Poudre thébaïque.....	0,005
Camphre.....	0,03
Benzoate de Soude.....	0,05
Extrait sec Polygala.....	0,01
— Lobélie.....	0,005
— Grindélia	0,01
Caféine	0,02

Pour une capsule.

Propriétés. — Active la circulation pulmonaire, désencombre les bronches, désaphyxie le malade, fluidifie l'hypersécrétion bronchique, facilite l'expectoration antispasmodique.

Indications. — Asthme et toutes dyspnées asthmatiformes, emphyseme, bronchites chroniques, gazés de guerre, tuberculeux, touseurs et cracheurs chroniques.

Présentation et prix. — Un étui de 40 capsules, enrobées dans du gluten toluisé : 15 francs.

Posologie et mode d'emploi. — Avaler sans croquer 2 capsules matin, midi et soir.

Prix : 15 francs.

Laboratoire Central de la Bastille.

F. BAYLOT,

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 38-31.)

SÉDATUSSINE

Composition :

Poudre de racine d'aconit.....	0,03	ctg.
Extrait de Belladone.....	0,01	—
Dionine.....	0,01	—
Bromhydrate de Codéine.....	0,01	—
Extrait de Drosera	0,02	—

Pour 1 comprimé.

Indications. — Par l'action synergique de ses cinq composants qui agissent sur toute l'étendue de l'appareil respiratoire, c'est le médicament spécifique de la *Toux*, quelle qu'en soit la cause : *Affections du Larynx*, de la *Trachée*, des *Bronches*, des *Bronchites*, crises dyspnéiques asthmatiformes, crises d'asthme ; *Tuberculose pulmonaire* ou *Maladies déterminant des toux réflexes*. C'est le complément indispensable de toute cure hydrominérale à Cauterets, Luchon, Amélie-les-Bains, Le Mont-Dore, La Bourboule, Bagnères-de-Bigorre, Ax-les-Thermes, etc.

Posologie :

Chez l'*Adulte* : de 2 à 5 comprimés par 24 heures.

Chez l'*Enfant* : au-dessus de 10 ans seulement : de 1 à 2 comprimés suivant l'âge. Prix : 16 fr. 80.

Laboratoires de la **SÉDATUSSINE :**

A. JOURDIN

6, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). (Tél. : Passy 92-54.)

SEDHÉPATINE

Cholagogue.

2 formes : Poudre et Granulé.

Composition. — Kaolin, bismuth, sulfate de magnésie, Boldo, Artichaut.

Thérapeutique. — Cholagogue, Sédatif des affections des voies Duodéno-Hépatobiliaires. traitement simultané des « Affections du carrefour », Constipation d'origine hépatique.

Posologie. — Une cuillerée à dessert pour la poudre, à soupe pour les granulés, le matin à jeun ou avant les deux principaux repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de la **SEDHÉPATINE**

P. COLLIOT, Pharmacien,

124, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 09-30.

SED'HORMONE

Reconstitution des hormones bromées neuro-sédatives par le Dibromocholestérol.

Composition. — Le Dibromocholestérol est un composé bromé organique ; possédant pour l'hypophyse et les centres nerveux une affinité particulière, il exerce à la dose de quelques centigrammes une action neuro-sédative supérieure à celle de plusieurs grammes de bromure. Actif à faible dose, il n'expose jamais aux inconvénients et aux dangers des bromures. Il ne crée pas d'accoutumance. Son action, remarquable dans les grands syndromes d'excitation et contre l'insomnie, vient probablement de ce que son affinité pour l'hypophyse lui permet d'assurer dans les meilleures conditions la reconstitution des hormones bromées d'origine hypophysaire, qui sont la forme active du brome dans l'organisme (Zondek et Bier).

Indications. — Hyperexcitabilité nerveuse. Insomnie. Anxiété. Tous les grands syndromes d'excitation. Les manifestations convulsives et notamment les crises épileptiques et leurs équivalents. L'énurésie. Le médicament peut encore être utilisé comme anesthésique de base.

Formes. — *Dragées* dosées à 2 cgrs de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 6 par jour.

Le tube de 30 dragées : 16 francs.
Suppositoires dosés à 10 cgrs de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 3 par jour.

La boîte de 8 *suppositoires* : 19 fr. 20

Laboratoires AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél ; Archives 41-65).

SÉDIBAÏNE

Comprimés glutinisés.

Composition. — Extrait de Strophantus, Phényléthylmalonylurée, Extrait de Jusquiame, Extrait de Cratægus, Extrait de Ballote, Extrait de Valériane, Poudre de Belladone.

Indication. — Sédatif nerveux, tonique cardiaque.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, de préférence avant les repas ou le soir au coucher.

Prix : 17 fr. 40 les 33 comprimés (8 à 20 jours de traitement).

Laboratoires de l'ARGYROPHÉDRINE

20, avenue Jean-Jaurès

SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp. 17-37.

SEDLITZ CHANTEAUD

Composition. — Granulé effervescent composé de Sulfate de Magnésie parfaitement déshydraté, rendu légèrement effervescent par l'addition d'une petite quantité d'Acide tartrique et de Bicarbonate de soude.

Indications. — Dépuratif, Laxatif, Purgatif.

Doses et mode d'emploi :

Laxatif : 1 cuillerée à café.

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Se prend à jeun dissous dans un peu d'eau.

Prix de vente au public : 11 fr. 50.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas

SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 02-28.)

SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré.

Tablettes. — 1 tablette = 1 gr. NaBr.
(Boîte de 30).

Mode d'emploi et doses. — *Adultes* :
1 à 5 tablettes par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes par jour, selon
l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait
dissoudre une ou deux tablettes de *Sédobrol*
« Roche » : on prépare ainsi instantané-
ment un bouillon particulièrement savou-
reux que l'on peut prendre à n'importe
quel moment de la journée.

Propriétés thérapeutiques. — Médica-
ment sédatif, hypnotique et calmant
donnant des résultats certains et permet-
tant d'imposer un *traitement bromuré*
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-
ble le régime déchloruré.

Indications thérapeutiques. — Insom-
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-
diopathies, migraines, spasmes, convul-
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments sous le n° 504-31

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SÉDOFOLLINE

Composition et propriétés. — 1° *Folliculine* ovarienne : Dosage garanti, activité constante. — 2° Extrait ovarien spécial : Action naturellement synergique de toutes les hormones ovariennes à l'exclusion de l'hormone lutéinique. — 3° Thyroïdine (faible dose) : Synergie thyro-ovarienne. — 4° Sédobenzyl (non toxique) : Sédatif et antispasmodique.

Forme. — Dragées friables à enrobage soluble, dosées à raison de 12 unités physiologiques.

Indications. — Tous les troubles de la fonction ovarienne.

Dosage. — Chaque dragée est dosée à raison de 12 unités physiologiques de Folliculine.

Mode d'emploi. — 2 à 8 dragées par jour, loin des repas. Dose moyenne : 4 dragées par jour.

Traitement. — 8 jours de traitement, 8 jours de repos jusqu'à résultat satisfaisant. Continuer chaque mois pendant les 8 jours précédant l'époque présumée des règles.

Prix : 21 fr. 35 pour 10 jours.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII°).

(Tél. : Montmartre.25-51.)

SÉDOGASTRINE

Sédatif gastrique.

Formes. — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

Composition. — 1° *Substances neutralisantes* :

Hydroxyde de magnésium, Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion* : Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique* : Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.
Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

Indications. — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

Posologie. — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café.

Comprimés : quatre à six jusqu'à sédation.

Prix : 14 fr. 40.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

SÉDOGASTROL

Forme.

Poudre homogène, absorbante, aromatisée à la badiane.

Composition.

HOANG-NAN (*Strychnos Gauthierana*) pulv. (1), Belladone pulv., Carbonates alcalins (Ca, Mg, Na), Magnésie hydratée, Kaolin porphyrisé, Essence de badiane.

Propriétés. Avantages.

SÉDATIF et **ANALGÉSIQUE**, non stupéfiant, ni hypnotique, grâce à la belladone qui agit énergiquement sur les terminaisons nerveuses et sur l'élément « douleur » seul. Les opiacés et dérivés étant à rejeter, car, en calmant la douleur, ils anesthésient toutes les fonctions de l'estomac.

TONIQUE MUSCULAIRE, par la présence de **HOANG-NAN** (*Strychnos GAUTHIERANA*) (1), 6 fois moins toxique que la noix vomique, dont l'action stimulante s'exerce uniquement sur la contractilité des fibres musculaires de l'estomac et de l'intestin, sans agir sur le système glandulaire.

CICATRISANT, NEUTRALISANT, par l'emploi de sels alcalins à vitesses d'action différentes, associés à une petite quantité de kaolin qui ralentit le cheminement de ceux-ci dans l'estomac.

Médication équilibrée n'ayant aucune action laxative, ni constipante. Aucune contre-indication. Emploi prolongé sans aucun inconvénient.

Indications thérapeutiques.

Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Gastrites, Hypersecretion, Gastralgies, Aérogastrie, Ulcères.

Posologie et mode d'emploi.

Après les repas et au moment des douleurs, prendre : une cuillerée à café, dans un demi-verre d'eau. — Ces doses peuvent être renouvelées ou renforcées à n'importe quel moment et toutes les deux ou quatre heures.

Lab. Nat. Contrôle 518-6. — Prix : 14 francs.

(1) **Références scientifiques** : Dr Henri Leclerc, *Presse médicale*, 31 décembre 1927 ; *Année médicale pratique*, 1929, p. 326 ; *Courrier médical*, 21 février 1937. — Thèse : Dr B. Joyeux Mollinedo, Paris, 1936.

LABORATOIRES BARDET, fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

SÉDO-GYNŒSTRYL

Solution avec :

Di-hydro-Folliculine.....	1/10° de mgr.	} pour 1 cc.
Bromure de sodium.....	0 gr. 50	
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02	

Propriétés thérapeutiques. — Par la di-hydro-folliculine, agit sur le dysfonctionnement ovarien ; par les produits associés, remédie aux troubles nerveux concomitants.

Indications. — Nervosisme, anxiété, insomnies des aménorrhéiques. Phénomènes douloureux et dysménorrhéiques.

Présentation. — Flacon de 10 cc.

Posologie. — Dose quotidienne : 50 gout. (1 cc.) en plusieurs prises, à n'importe quel moment de la journée. Maintenir chaque mois pendant 10 à 12 jours le traitement, que l'on commencera 7 jours environ après la fin des règles précédentes.

Prix au public : 21 fr. 80, le flacon de 10 cc.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Voir aussi Gynœstryl, Benzo-Gynœstryl et Benzo-Gynœstryl 5.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

SÉDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Composition. — Comprimés de composés organiques nouveaux : le phényl-éthyl-barbiturate de yohimbine et le phényl-éthyl-barbiturate de quinine.

Propriétés thérapeutiques. — Baisse de pression par vaso-dilatation ; action cardiotonique, action sédativ. Cette préparation réalise pour la première fois un effet hypotenseur artériel concomitant d'un renforcement cardiaque et d'une sédation des troubles nerveux qui compliquent l'hypertension.

Indications. — Tous les cas d'hypertension artérielle (artériosclérose, spasmes vasculaires, palpitations, éréthisme cardiaque, extra systoles, angoisse, angine de poitrine).

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour, 1 avant chaque repas, par périodes de 8 à 12 jours, avec intervalle d'une semaine entre 2 cures.

Pas de contre-indication autre que l'hypotension artérielle.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV°).

(Tél. : Turbigo 63-40)

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine-Spartéine.

Mode d'emploi et doses. — 1° **Ampoules** : 1 à 3 injections hypodermiques par 24 heures ;

2° **Comprimés (Pérosédol)** : 1 à 3 par 24 heures.

3° **Suppositoires** : voir « **Supposédol** ».

Propriétés thérapeutiques. — Beaucoup plus actif que la morphine employée seule, suppression des inconvénients de cette dernière.

Indications. — Tous phénomènes très douloureux : Cancers, Crises tabétiques, Maladie de Parkinson, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, Suites opératoires, cachexies tuberculeuses.

Boîte de 12 ampoules.

Boîte de 6 ampoules.

Tube de 12 comprimés.

(Pérosédol)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SÉDONEUROL DEHAUSSY

« Calme sans déprimer. »

Composition. — Phényl-éthyl-malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine et correctifs variant suivant les comprimés :

Comprimés jaunes : Caféine 0,015
Comprimés roses : Strychnine.... 0,0002

Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalent, avec une dose moindre de phényl-éthyl-malonylurée.

Évite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs. Pour éviter l'accoutumance à ces derniers, administrer 8 jours les comprimés jaunes ; 8 jours les comprimés roses.

Indications :

Déséquilibres vago-sympathiques : Anxiété, agitation, hyperémotivité, désordres psychiques frustes, Instabilité des basedowiens et des hyper-tendus, etc.

Algies paroxystiques : migraines, angine de poitrine.

États convulsifs. Épilepsie et ses équivalences : Maladie de Parkinson et Parkinsonisme, Absences et vertiges, Asthme rebelle, etc.

Chez l'enfant et le nourrisson : manifestations spasmodiques du croup, des laryngites striduleuses et aiguës, coqueluche, tétanie, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.

Posologie :

Déséquilibres vago-sympathiques : 2 comprimés fractionnés dans la journée.

États convulsifs. Épilepsie : Commencer par 4 comprimés et augmenter progressivement la dose jusqu'à suppression des crises.

Enfants : 1/2 comprimé par année d'âge.

Nourrissons (tolérance parfaite) : 1/2 comprimé jusqu'à 6 mois, 1 comprimé de 6 mois à un an, en deux prises.

Un comprimé = 2 cgr. et demi de phényl-éthyl-malonylurée.

Petit modèle : 12 fr. 80 — Moyen modèle : 27 fr. 80

Grand modèle : 51 fr. 20

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

SÉDOPAVÉRINE

Sédatif Nerveux et Cardiaque.

Forme. — Comprimés.

Composition. — Chlorydrate, de Papavérine, 0,01 ; Phényléthylmalonylurée, 0,02 ; Bromhydrate de Quinine, 0,05.

Indications. — Troubles nerveux cardiaques, Tachycardies, Arythmie extra-systolique, Spasmes vasculaires, Hypertension paroxystique, Angines de poitrine et Algies cardiaques, Asthme essentiel, Toux spasmodiques et Spasmes de la glotte, Spasmes digestifs (gastriques et intestinaux), Coliques hépatiques et vésiculaires, Insomnie et Anxiété des vagotoniques, Mal de mer.

Posologie :

Adultes : 3 comprimés par jour avant les repas.

Enfants, au-dessus de 10 ans : 1 à 2 comprimés par jour.

Prix de vente au public : 17 fr. 05.

Laboratoire PHILIPPE

122, faubourg Saint-Honoré — PARIS.

SÉDOPEPTINE

Pansement gastrique sédatif.

Composition. — Bismuth, kaolin colloïdal, silice colloïdale, muqueuse gastrique, bromure de sodium, gomme sterculia.

Indications. — Hyperacidité, Dyspepsies douloureuses, Spasmes pyloriques, Régurgitations acides, Pyrosis, Ulcus.

Posologie et mode d'emploi. — Croquer 1 ou 2 cuillerées à café de granulé au moment des douleurs. Renouveler la prise, si besoin est, dans les 24 heures.

Prix : La boîte, 15 fr. 60.

Laboratoires de la SÉDOPEPTINE

Echantillons :

Laboratoires du D^r Debat

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

SÉDOPROSTYL

Traitement de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications.

Composition. — Association d'Extrait d'Hammélis et d'Extrait de Belladone, de Chlorure de Magnésium.

Agit sur les trois causes de l'affection : l'hypertrophie de la prostate, l'élément congestif de la glande, l'état spasmodique du sphincter lisse.

Indications. — Traitement médical rationnel de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications. Troubles urinaux aigus ou chroniques.

Posologie. — De 3 à 5 dragées immédiatement avant le petit déjeuner et de 1 à 3 dragées, si nécessaire, avant le repas du soir.

Prix : 21 fr. 30.

SPÉCIALITÉS PHARGÈNE — VIAL et C^{ie}

Laboratoire de Pharmacologie Générale

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

SÉDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

Indications. — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoïdites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

Trois formes. — A) *Sedorhinol mixte*, comprend dans une même boîte :

- 1° Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide : adrénaline huileuse, stovaine benzoate de soude, essences aromatiques.
- 2° Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antiseptie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse bucco-pharyngée).

Prix : Comprimés : 17 fr. 20 — Pommade : 10 fr. 40 — Mixte : 20 fr. 80
Durée moyenne du traitement 10 jours.

Laboratoires A. REGAGNON

276, rue Lecourbe — PARIS (XV^e). (Tél. : Vaugirard 26-30.)

SÉDORMID « ROCHE »

**Le grand médicament des petits insomniaques
et des petits anxieux.**

Composition. — Allylisopropylacétylcarbamide.

Propriétés. — Sédatif hypnogène doux et inoffensif
non barbiturique.

Indications. — Toutes les insomnies légères, de quelque
nature qu'elles soient (Surmenage, Préoccupation,
Convalescence, etc.), Angoisse, Appréhension, Anxiété,
Symptômes hypernerveux.

Posologie et modes d'emploi. — *Dose sédatif* :
1 comp. 2, 3 ou 4 fois dans la journée. — *Dose hypno-*
gène : 1 ou 2 comprimés le soir au moment de se
coucher.

Comprimés dosés à 0 gr. 25 (boîte de 20).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le N° 504-32.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).
(Tél. : Arch. 91-10.)

SÉDOSALYL

Médication spécifique du Rhumatisme.

A base de salicylate double de sodium et de pyramidon en milieu alcalin.

Association avec le Phénylcinchoninate de soude et le Campho-Sulfonate de pipérazine destiné à combattre le collapsus cardiaque.

Deux formes :

- 1° *Granulé* : Les produits actifs sont associés au bicarbonate de soude qui évite l'intolérance gastrique. La saveur nauséuse du médicament est masquée par un excipient aromatique de goût agréable.
- 2° *Dragées* : Mêmes principes actifs sous une forme plus pratique. Un enrobage spécialement étudié permet aux dragées d'éclater seulement à leur arrivée dans l'intestin.

Composition. — Salicylate double de Sodium et de Pyramidon, Phénylcinchoninate de Soude, Camphosulfonate de Pipérazine, Bicarbonate de soude.

Indications. — Rhumatisme aigu et chronique, Maladie de Bouillaud, Arthralgies, Diathèse urique, Névralgies, Douleurs articulaires, Infections hépatiques, Angiocholites.

Doses et Mode d'emploi :

- 1° Rhumatisme articulaire aigu : de 8 à 16 cuillerées à café, ou 2 dragées 4 à 8 fois par 24 heures.
- 2° Cure d'entretien (10 à 20 jours par mois) : 4 à 8 cuillerées à café ou 2 dragées de 2 à 4 fois par 24 heures.
- 3° Rhumatisme chronique : de 4 à 8 cuillerées à café ou 2 dragées de 2 à 4 fois par 24 heures.
- 4° Affections urinaires et hépatobiliaires : 2 à 4 cuillerées à café ou 1 dragée de 2 à 4 fois par 24 heures.

Nota. — Une ou deux cuillerées à café ou dragées de *Sédosalyl* devront être prises dans 1/2 verre d'eau de Vichy ou mieux de Tisane (régliasse, frêne ou reine des prés).

Prix : *Granulé* : 18 fr. 75. *Dragées* : 20 fr. 80.

Laboratoire du SÉDOSALYL

C. ROUX, Docteur en Pharmacie.

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).
(Tél. : Alésia 12-55.)

SÉDOSINE

Solution

Association végétale hyperactive.

Composition. — Extraits de : Passiflore, Jusquiame, Cratægus.

L'action antispasmodique de la Jusquiame utilisée à doses minimales est considérablement renforcée par la présence de la Passiflore et du Cratægus (H. Leclerc).

Indications. — Etats spasmodiques, Excitation nerveuse, Insomnie, Neurasthénie, Psychasthénie, Mélancolie.

Posologie :

Contre l'insomnie : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

Sédatif nerveux : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature, ou mieux dans un peu de tisane.

Prix : 19 francs.

Laboratoires **LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

SEDOTAN

Dragées

Composition. — Extrait de Gui stabilisé, Cholélate de Soude, Bromhydrate d'Yohimbine, Phényléthylbarbiturate de Quinine.

Indications. — Hypertension ; Spasmes cardiaques douloureux ; Éréthisme, palpitations, angoisses, points, céphalées des hypertendus.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour, avant les repas ; prendre pendant 10 à 12 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Prix : 20 francs. L. N. C. 1219-3.

Établissements pharmaceutiques

M. et P. LÉDENT

MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais).

(Tél. : 1-60.)

SÉDOTONINE GROS

Composition. — Extrait de Strophantus, phényléthylmalonylurée, extrait d'anémone.

Indications. — Médication tonicardiaque et antispasmodique. Traitement de l'hypertension artérielle. Sédatif général.

Forme. — Dragées.

Doses. — 3 dragées par jour, à prendre à intervalles espacés : 1 au réveil et 1 avant les deux principaux repas. A croquer ou à avaler avec un peu d'eau.

Prix : 15 fr. 60 (durée moyenne de l'unité : 15 jours).

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 60-55.)

SÉDOTYOL

Pommade antiprurigineuse et anesthésique.

Pommade non toxique, absolument inoffensive, ne contenant aucun produit du genre de la cocaïne, ni des tableaux A et B.

Indications. — Toutes les lésions épidermiques prurigineuses ou douloureuses : prurits, urticaire, piqûres d'insectes, brûlures, éruptions, zona, etc.

Action. — Le SÉDOTYOL calme instantanément le prurit et la douleur.

Mode d'emploi. — En larges applications *loco dolenti*, renouvelées selon les besoins.

Présentation :

Le tube : 14 francs.

Le 1/2 tube : 8 fr. 20.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

SEIGNET'FRUITS

Composition. — Limonade aux sels de fruits, Extraits végétaux et Eau diurétique. Goût réputé. Purgé sans nausées ni coliques.

Propriétés thérapeutiques. — Purgatif et laxatif.

Indications. — Désinfection de l'estomac, du foie, de l'intestin. Purgation douce (opérations, accouchements).

Mode d'emploi :

Adultes : Purgatif. Un flacon le matin à jeun.

Enfants : 1/4 à 1/2 flacon, suivant l'âge.

Laxatif : Un verre à bordeaux au réveil ou au coucher un jour sur deux.

Prix : 8 fr. 05.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

SEINDERM MARS

Composition. — Stovaine, acide tannique pur, essences diverses, lanoline vaseline, etc.

Indications. — Toutes crevasses, gerçures, etc., mais tout particulièrement pour les gerçures et les crevasses des seins.

Appliquer quelques minutes avant la tétée sur les lésions ; celle-ci se fait alors sans aucune douleur. Les crevasses sont guéries en 4 ou 5 jours.

Pour éviter les crevasses, enduire les seins pendant une huitaine de jours avant l'accouchement, et la peau sera suffisamment durcie pour éviter ces accidents si douloureux.

Remarque. — Laver les seins à l'alcool avant chaque tétée et enduire de pommade aussitôt après.

Prix : 11 fr. 50.

Laboratoires MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22.

Et chez tous les grossistes.

SELAMON

Composition et présentation. — Chlorure d'ammonium pur en comprimés glutinisés dosés à 50 centigrammes.

Dose et mode d'emploi. — 6 à 12 comprimés par jour au milieu des repas.

S'emploie avec succès dans tous les cas où il y a intérêt à modifier l'équilibre acide-base dans le sens de l'acidité. Médication prophylactique très active de la lithiase rénale.

Laboratoires LECLERC — S. A.
10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

SEL DE HUNT

Alcalin type

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypochlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 10 fr. 90 le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT
16, rue de Boulainvilliers — PARIS.
(Tél. : Auteuil 20-21.)

SEL D'EWALD

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments.

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac.

Le Sel d'Ewald se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonates de Chaux et Magnésie.

Le Sel d'Ewald trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyrosis, Vomissements de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café de granulé délayé dans 1/4 de verre d'eau avant les repas ou au moment des crises.

Le Sel d'Ewald ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

BRACQUEMOND et Cie,

Docteurs en Pharmacie,

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 05-54.)

SEL DIGESTIF BÉ ME CÉ

Forme. — Poudre ultra-tamisée, à l'état moléculaire.

Composition :

Bic. de Soude sursaturé...	2 gr. 50
Magnésie hydratée.....	0 gr. 50
Carb. de Chaux léger.....	1 gr. 50
Lactose pulv.....	0 gr. 50

Par cuillerée à café.

Indications. — Hyperacidose gastrique aiguë.
Tous les états dyspeptiques. Vomissements de la Grossesse.

Doses. — Une cuiller à café après chaque repas dans 1/4 de verre d'eau.

Prix : 9 fr. 10.

Laboratoires Gastro-Entérologiques

ODINOT, Pharmacien.

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 69-13.)

SÉLÉNIOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sélénol est une solution limpide de couleur brune ; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections néoplasiques, soit seul, soit associé à la Cytuline Couturieux.

Prix : 41 fr. 60 pour 8 jours de traitement. A. S. B.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

SELOR

**Complexe auro-médicamenteux assimilable
par voie buccale (cachets).**

SELOR N° 1.

Composition. — Chlorure d'or, codéine, extrait d'aconit, poudre de belladone, terpine, composé solide contenant du bromoforme, acide acétyl-amino-oxyphénylarsinique, ergostérine irradiée, extrait de quinquina, pepsine amyliacée, sels de chaux.

Propriétés et Indications. — Actif, facilement maniable, ne causant pas d'accidents.

Par sa quadruple action :

1° Spécifique ; 2° Reconstituant ; 3° Calmant de la toux ; 4° Eupeptique ;

est indispensable au traitement de toutes les maladies pulmonaires, aiguës ou chroniques, tuberculeuses ou non.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 32 francs la boîte de 30 cachets.

SELOR N° 2.

Composition. — Est celle du SELOR N° 1, mais sans calmant de la toux.

Indications. — Outre le traitement des affections pulmonaires ne nécessitant pas l'emploi de calmant de la toux, les SELOR N° 2 sont employés efficacement dans le traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 29 fr. 85 la boîte de 30 cachets.

Laboratoires des Produits L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV°).

(Tél. : Vaugirard 21-10.)

SELS DE BAINS R. P.

de La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés naturels de La Roche-Posay.

Indications. — Indispensable à toutes les peaux malades ou fragiles. Permet le lavage des lésions, en particulier, avant et après pansement. Enveloppements sédatifs.

Employés avec le « Savon dermique R. P. » écartent tout danger d'infection secondaire.

Mode d'emploi. — Un paquet pour un grand bain. 2 à 6 cachets dans l'eau bouillie à 40° pour bains locaux.

Pour les peaux simplement fragiles ou pour les bébés : 1 sachet pour une cuvette.

Toujours poudrer ensuite avec Poudre Dermique R. P.

Présentation et Prix :

Sels de bains R. P. de La Roche-Posay. Le paquet	5 fr.
— — — Boîte de 30 sachets.....	10 fr.
Savon Dermique R. P. Le pain	8 fr.
Poudre dermique R. P. La boîte.....	10 fr.

Laboratoires des PRODUITS DERMQUES R. P.
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

SELS INTAR

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Chlorure de Mg, Sulfate de Mg, Sulfate, phosphate, bicarbonate de Na, etc...

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des grandes fonctions organiques : Nutrition, Digestion, Sécrétion, etc.

Indications. — Rhumatismes, Obésité, Paresse intestinale.

Arthritisme et ses conséquences.

Asthénie, Dermatoses (eczéma, urticaire).

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun ou le soir au coucher. Cette dose peut être augmentée suivant les indications du médecin.

Laboratoire FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS.

Publicité : Société d'Expansion Thérapeutique

Société anonyme au capital de 20.000 francs.

Siège social : 129, rue de Turenne, PARIS (III^e).

R. C. 248.921.

SELS-MAGS

Composition. — Sulfate sec de magnésie, sulfate sec de soude, citrate monosodique, sel halogène du magnésium, phosphate de soude, etc.

Propriétés. — Favorise la sécrétion et l'excrétion de la bile, réalise le drainage des voies biliaires.

Indications. — Toutes congestions du foie et de la vésicule biliaire, jaunisse, cholécystite, angiocholécystite, dyspepsies, aérophagies, constipation, migraines, hypocondrie, vertiges, prurits, urticaire, langue sale, eczéma, etc.

Posologie et mode d'emploi. — 2 comprimés le matin dans un verre d'eau chaude ou dans 1/2 verre d'eau avant le repas de midi. La dose peut être augmentée ou diminuée suivant les prédispositions individuelles. Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Une boîte comprimés effervescents ; 19 fr. 25.

Inscrit aux Assurances Sociales.

Faire suivre d'une cure de BOLCITOL.

G. LESOURD, Pharmacien
88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

SELUNIC

Sel de fruits. Sel de santé.

Composition. — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de citro-tartrate de soude.

Forme. — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

Propriétés. — Régulateur simple et efficace de la santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

Indications et mode d'emploi. — **Maladies du foie et des intestins.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

N. B. — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

Estomac, impuretés du sang, maux de tête. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi-heure après les repas.

État bilieux, indigestion, excès de table. — Une cuillerée à dessert dans un verre d'eau en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

Désaltérant et rafraîchissant. — Contre la soif, état fébrile, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.

Obésité. — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

Comme breuvage. — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

Dans le vin et le cidre : une pincée combat l'excès d'acidité et produit une boisson de table pétillante.

Présentation. — En flacons de 240 grammes : **18 francs.**
Le modèle « Week-End » de 40 grammes : **6 francs.**

SELUNIC, grâce à son Citrate de Soude, liquéfie le Sang.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 333-1.

Laboratoire GLYCO-M.

Georges MIQUEL, pharmacien de 1^{re} classe.

1, avenue Lowendal — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 16-85.)

SEL VIAL**(Achloruré)**

Débilité rénale.

Affections cardiaques.

Affections du Tube digestif.

Laboratoires VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON.

Tél. : Burdeau 28-07.

SENEÇONINE

Médication régulatrice de la circulation pelvienne.

Décongestif sédatif pelvien.

Équilibrant du système nerveux végétatif pelvien.

Composition.

Extrait fluide de Seneçon ;	Extrait fluide de Gelsémium ;
Extrait fluide de Viburnum ;	Extrait fluide de Cimicifuga ;
Extrait fluide de Piscidia ;	Alcoolature d'Anémone.

Présentation. — Elixir de goût agréable, atoxique. Sans analgésiques chimiques. Sans opothérapiques.

Action thérapeutique et indications.

Chez la femme :

Calme les douleurs, régularise le flux menstruel, décongestionne le petit bassin, équilibre le système nerveux.

Troubles de la circulation utéro-ovarienne, *Aménorrhées, Dysménorrhées, Règles déviées, Congestion, Néuralgies pelviennes, Migraines cataméniales, Douleurs du post-partum, Déséquilibre vaso-moteur de la Ménopause, Troubles psychiques.*

Doses et mode d'emploi.

Médication régulatrice : 1 cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau. Commencer le traitement 10 jours avant la date présumée des règles.

Médication sédativ : Prendre, dès les premiers symptômes précurseurs de la période menstruelle, 1 à 6 cuillerées à café par jour, *les premières cuillerées à 3 heures consécutives.*

Chez l'homme :

Calme les douleurs, relâche les fibres lisses du sphincter vésical, décongestionne le petit bassin, équilibre le système nerveux. *Prostatisme vasculaire, Inflammation, Hypertrophie et sclérose de la prostate.* Toutes douleurs, tenesme, contractures, spasmes divers, irradiations périnéales, troubles circulatoires, Hémorroïdes.

Doses :

Une cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau. En cas de crise aiguë, 1 cuillerée à café toutes les heures, maximum 6 par jour.

Prix. — Flacon, dose pour un traitement : 17 fr. 15.

Laboratoire A. BESNIER

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

1, rue Raynouard — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 20-34.)

SEPTAZINE

(46 R. P.)

Benzyl-Amino-Benzène-Sulfamide.

Chimiothérapie antistreptococcique et anti-infectieuse, non colorante, bien tolérée par les voies digestives, non toxique.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 g. 50 divisibles en deux (tubes de 20.) Prix: 13 fr. 75.

Indications. — Erysipèle, Angines, Otites, Prévention et traitement de la fièvre puerpérale, des complications de la Scarlatine, Grippe et complications, Colibacilloses.

Posologie :

Adultes : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau 4 à 8 fois par jour.

Nourrissons : 2 comprimés par jour.

Grands enfants : 2 à 6 comprimés par jour.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SEPTICARBONE

Charbon antiseptique intestinal granulé.

Composition. — Oxyquinoléinate de bismuth, charbon suractivé, gomme sterculia.

Indications. — Diarrhées, Entérites, Colites, Fermentations, Intoxications alimentaires, Infections gastro-intestinales, biliaires et hépatiques, Aérophagie, Flatulence.

Posologie et mode d'emploi. — *Affections aiguës :* 4 à 6 cuillerées à café par jour, ou plus.

Affections chroniques : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Croquer à sec ou délayer dans un peu d'eau, avant ou pendant les repas.

Prix : La boîte, 18 fr. 70.

Laboratoires du SEPTICARBONE

Echantillons : Laboratoires du D^r Debât
60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

SEPTICEMA

Défense de l'organisme contre les affections aiguës médicales et chirurgicales

Composition. — Agissant comme stimulant du foie et provoquant le drainage des toxines.

Acide nucléinique d'origine végétale solubilisé par catalyse. Agent d'hyperleucocytose.

Chlorure de magnésium stimulant biologique de 1^{er} ordre favorisant la Phagocytose.

Présentation. — Boîte de 7 ampoules injectables avec 250 cc. de sérum phyto-logique : 35 fr.

Laboratoire COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 45-01).

SEPTICÉMINE CORTIAL

Composition. — Di-formine, iodobenzo-méthylée, corps cristallisé, dialysable, injectable, atoxique, *indolore*. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Microbicide et antitoxinique ; éliminateur hépatique et rénal.

Indications. — **Infections aiguës médicales :** Grippe; encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhinopharyngées.

Infections chirurgicales. — Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphrites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonite tuberculeuse.

Forme. — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

Injectons intraveineuses ou intramusculaires *indolores*.

Doses. — Septicémies à marche rapide, infections graves : 10, 20 cc. et plus dans les 24 h. Infections à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

Chez l'enfant en lavement à garder, 4 cc. dans 50 gr. d'eau bouillie sucrée.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations, pure ou étendue de sérum. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes. Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : Pulvérisations alvéolaires et gingivales. Injections intragingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

Prix :

La boîte de 8 ampoules de 4 cc. : 27 fr. 50 ; de 10 cc. 47 francs.

La boîte de 4 ampoules de 10 cc. : 24 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

SEPTISAN

Poudre Porphyrisée. Agréable au goût.

Forme et Composition. — Boîte cylindrique renfermant 130 grammes = 30 cuillerées à café de poudre blanche porphyrisée et desséchée dans le vide, en partie soluble dans l'eau, en partie en suspension homogène, agréable au goût, en dilution dans l'eau.

Prix : 16 fr, 80 pour 20 jours de traitement.

1 cuillerée à café de Septisan = $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ gr. de peroxyde de Mg} \left\{ \begin{array}{l} \text{O}^{\text{a}} \text{ naissant.} \\ \text{MgCl}^{\text{a}}. \end{array} \right. \\ 1 \text{ gr. de SO}^{\text{a}}\text{Na}^{\text{a}} \text{ desséché} \\ 0 \text{ gr. 50 de citrate de soude.} \\ 0 \text{ gr. 50 de phosphate de soude.} \\ 0 \text{ gr. 50 de lactose.} \end{array} \right.$

Posologie — Dix jours par mois, une cuillerée à café, le matin à jeun, ou demi-cuillerée à café, au début ou un peu avant les repas de midi et du soir, dans un verre d'eau, en agitant afin d'obtenir une suspension homogène. Doubler la dose dans certains cas.

Action. — Stimule et régularise le métabolisme de la nutrition. (Assimilation. Elimination.)

Propriétés. — Oxydant, Activant échanges, Brûlant déchets, Antisep-tique, Antitoxique, Antiputride, Laxatif rationnel et doux, Stimulant, Diurétique.

Laboratoires OPOS

60, rue Nationale, 1 et 3, rue Soumet — CASTELNAUDARY
(Tél. : 3-10.)

SEPTOPLIX

(1162 F.)

Paraminophényl-sulfamide.

Chimiothérapie antimicrobienne.

Traitement des streptococcies, méningococcies, gonococcies, infections urinaires.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 gr. 50 (tube de 20); suppositoires (*Suppo-Septoplix*) dosés à 1 gr. (boîte de 10). Ampoules pour injections intrarachidiennes ou intrapleurales.

Indications. — *Toutes les infections, médicales, chirurgicales et obstétricales, à streptocoques, méningocoques, colibacilles, etc... (action préventive nette). Gonococcie et ses complications.*

Posologie. — **Adultes :** à titre curatif, dans une infection moyenne, 4 à 6 comprimés ou 2 à 3 suppositoires par jour ; dans une infection grave, 10 à 15 comprimés ou 5 à 7 suppositoires par jour ; à titre préventif, 4 comprimés ou 2 suppositoires par jour.

Enfants, nourrissons :

de 5 à 12 ans, 2 à 6 ou même 8 comprimés par jour ;

de 1 à 5 ans, 1 à 3 comprimés par jour ;
au-dessous de 1 an, 1/2 à 1 comprimé par jour.

Diviser, autant que possible, la dose journalière en 6 parts, à prendre toutes les 4 heures. Terminer par des doses décroissant progressivement, en 5 à 6 jours. (On peut alterner comprimés et suppositoires.)

Tube de 20 comprimés.

Boîte de 10 suppositoires.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

“ THÉRAPLIX ”

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e). Tél. : Ségur 13-10.

SÉRÉNOL

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur des troubles de l'hypertonie nerveuse par déséquilibre neuro-végétatif.

Indications. — Émotivité. États anxieux. Insomnies. Neurasthénies. Migraines. Vertiges. Palpitations. Syndrome solaire. Certains prurits.

Composition. — A base de Phényl-Ethyl-Malonylurée. — Teinture de Belladone. — Hexaméthylène-tétramine. — Peptones polyvalentes. — Extraits de Boldo, Cratægus, Passiflore, Anémone.

Formes. — Comprimés, Liquide et Suppositoires.

Doses et mode d'emploi :

- 1° *Liquide ou comprimés* : A prendre dans ou avec une infusion de tilleul, de fleurs d'oranger ou d'eau sucrée : 2 à 3 cuillerées à café ou 3 à 5 comprimés dans les 24 heures (1 centigramme de Phényl-Ethyl-Malonylurée par cuillerée à café, 1/2 centigramme par comprimé).
- 2° *Suppositoires* : 1 à 2 suppositoires au coucher, un troisième dans le courant de la nuit si nécessaire (3 centigrammes de Phényl-Ethyl-Malonylurée par suppositoire).

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées).

SERICRINE-REY

**Complexe Endocrino-Sérique.
Médication Hormostimulatrice.
Anti-Hémorragique-Recalcifiante.**

Présentation. — Deux formes :

Pour l'adulte : Ampoules buvables de 5 cc.

Pour l'enfant : Ampoules buvables de 3 cc.

Composition :

Sérum d'équidés.....	}	Désalbuminés.
Extrait Hépatique		
Extrait Splénique		
Extrait Médullaire		
Extrait Surrénal		
Extrait Hypophysaire	}	
Nucléinate de Fer.		
Nucléinate de Manganèse		

Indications thérapeutiques. — Toutes anémies, quelle que soit leur origine. Toutes carences et déficiences de l'organisme. Convalescences de maladies aiguës ou infectieuses ; états hémorragiques (préventif et curatif), asthénies avec dépressions physique et nerveuse (neurasthénie, anémie cérébrale), accidents de la croissance et de la puberté, troubles de la calcification, bacillooses et états prétuberculeux.

Posologie :

Adultes : 2 ampoules Sérocrine-Rey adultes par jour.

Adolescents : 1 ampoule Sérocrine-Rey adultes par jour.

Enfants :

de 7 à 15 ans : 2 ampoules Sérocrine-Rey enfants par jour.

de 3 à 7 ans : 1 ampoule Sérocrine-Rey enfants, par jour.

Aucune contre-indication. Absence totale d'accidents sériques.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 302-6/1 et 302-6/2.

Laboratoires REY
DIJON (Tél. : 22-12.)

SÉRIFER

Traitement des déficiences sanguines par le fer vitalisé rendu assimilable après absorption par des Levures vivantes.

Composition. — Ions fer et manganèse, Sérum de cheval, Hormones antianémiques de foie frais, Arsenic organique.

Indications. — Toutes déficiences sanguines, Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, Etats hémorragiques, Suite d'Opérations, Paludisme.

Forme. — Délicieux granulé chocolaté.

Posologie :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enfants : Demi-doses.

Prix : 18 fr. 70.

Laboratoire d'Actino-Biologie

LAURENÇON & Cie, Pharmaciens

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

SÉROBIOL

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc.

Formule. — Extraits de foie, rate. Acide phosphorique. Nucléinate de manganèse. Phosphate acide de sodium, Vitamine B tirée des levures. Sérum de cheval. Sérum de mouton.

Indications. — Carence, déficiences organiques, anémies, pré tuberculose, convalescences.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule matin et soir aux repas, dans un peu de liquide.

Enfants : 1 ampoule par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 403-8.

La boîte de 10 ampoules : 21 fr. 30.

Laboratoire **HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

SÉROCALCINE

Composition. — Poudre d'os frais, vitamines A (carotène) et D, rigoureusement titrées en unités biologiques antirachitiques, phosphatides cérébraux, extraits parathyroïdiens totaux, chlorophylle pure à pouvoir phyto-sensibilisateur extrême.

Propriétés. — Régulateur rapide du métabolisme calcique, reminéralisant, recalcifiant, activant de l'uréogénie, anti-toxique.

Indications. — Hypo-calcémie et hypo-phosphaturie, retards de croissance ou d'ossification, dystrophie osseuse, rachitisme, fractures, ulcères gastriques, cataracte post-opératoire.

Présentation { 25 francs la boîte de 25 cachets.
et prix : { 25 — — — de granulés.

Posologie. — Un cachet midi et soir au moment du repas ou 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Les Laboratoires Lorrains de Produits purs.

ÉTAIEN (Meuse). — (Tél. : 74.)

SÉRO-COMPRIMÉS I. M.

Etués de 40 et 100 comprimés de Sérums des-séchés.

Prophylaxie des affections de la gorge : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement local des angines courantes, pharyngites, porteurs de germes, etc. : 1 à 2 comprimés toutes les heures et le soir au coucher.

SÉROLACTYL

(Autopulvérisable) I. M.

En pulvérisateurs de 5 gr. de sérums des-séchés, lactosés.

Prophylaxie des affections rhino-pharyngées : 2 pulvérisations par jour.

Traitement local des rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, Coryzas tenaces, etc... : 4 à 5 pulvérisations par jour.

SÉRO-LIQUIDE I. M.

En flacons de 30 gr. de sérums liquides, gly-cérinés.

Prophylaxie des affections oto-rhino-pharyngées : 4 à 5 instillations ou pulvérisations par jour.

Traitement local des otites, sinusites, rhinites, rhino-pharyngites, etc... : 4 à 5 instillations ou pulvérisations par jour.

N. B. — Dans la diphtérie, les injections de sérum constituant la base du traitement, n'employer ces trois produits qu'à titre complémentaire (prévention et convalescence).

Durée d'utilisation des 3 produits : 10 années.

TUBERCULINE I. M.

pour cuti et percuti-réaction

(Voir ce texte.)

**Laboratoires des PRODUITS
BIOLOGIQUES I. M.**

S. SAVIGNEUX, pharmacien.

18, cours Suchet — LYON.

SÉRODAUSSE

(Sérum activé de taureau.)

Ce sérum contient les hormones circulantes des jeunes animaux mâles et les anticorps des poisons séniles.

Le médicament est indiqué contre l'asthénie des personnes âgées ; il améliore leur capacité de travail physique et intellectuel et produit une orientation de leur caractère vers l'optimisme.

Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau, sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose mensuelle de 3 ampoules, prises à raison d'une ampoule tous les deux jours, est suffisante.

SÉRODAUSSE OVARIEN

(Sérum activé de génisse.)

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Séro-dausse ordinaire.

SÉRODAUSSE INFANTILE

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance. Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé.

Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

SÉROGLOBINE

Dynamogène complet.

Composition :

Sérum musculaire de cheval..	3 gr.
Extrait hémopoiétique de foie frais de veau.....	0,30
Arrhénal	0,04
Hypophosphite de sodium	0,30
Glycérophosphate de magné- sium à 50 p. 100	0,40
Chlorure de manganèse.....	0,10
Ecorce de Quinquina.....	0,60
Noix de Kola.....	1 gr.
Véhicule délicieux au Rancio des Papes. Q. S. pour	100 gr.

(Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 440-14.)

Posologie :

Un verre à liqueur à chaque repas pour les adultes. Demi-dose pour les enfants à partir de 10 ans.

Action :

Dynamogène complet, agit comme exciteur de défense organique par son sérum musculaire, comme antitoxique, hémato-poiétique par son extrait de foie, et comme anti-anémique par son arrhéno-manganèse.

Indications :

Toutes les carences organiques, Toutes les anémies, Amaigrissement, Epuisement, Anorexie, Tuberculose, Convalescence, Déphosphorisation.

Prix :

24 francs la bouteille de 500 grammes, pour un traitement de 10 jours.

Laboratoires AUBÉRY
AVIGNON (Vaucluse).

SÉROMA REY

Sérum granulé, Activé, normal.

Composition :

100 grammes de Séroma contiennent :

Sérum normal d'équidés.....	90 gr. 90
Calcium	0 gr. 05
Fer	0 gr. 30
Manganèse	0 gr. 15

Indications. — Surmenages, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies.

Doses moyennes :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

Enfants : demi-doses.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-3.

Laboratoires REY

DIJON (Tél. : 22-12).

Séroma contient près de son poids de sérum activé.

SÉRO-NEUROPSYCHIQUE

Ampoules

Propriétés thérapeutiques. — Préparation tonique et reconstituante injectable. Contre tous les cas d'anémie, dépression nerveuse, surmenage physique intellectuel, neurasthénie.

Forme. — Ampoules injectables.

Mode d'emploi — 1 ampoule par jour.

Formule. — Glycérophosphates composés, Cacodylate de Manganèse.

Prix : 21 fr. 30.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-32.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

SEROXEMA

Complexe séro-opothérapique. Traitement par voie buccale.

Composition. — Sérum de jeunes taureaux, activé par transfusion; organes opothérapiques sélectionnés (dessiccation sous vide à basse température).

Indications. — Dermatoses d'origine hépatique ou endocrinienne et tous phénomènes d'ordre anaphylactique.

Prurits (même généralisés); Eczémas secs, suintants, squameux; Eczématides, Herpès, Herpès des muqueuses, Urticaires, Dartres, Intertrigo, certains Psoriasis, Acné, Prurigo, Erythèmes des enfants, Lichen, Maladie de Quinck, Asthme, Aérophagie.

Présentation. — Flacons de 60 dragées.

Un flacon suffit dans les cas bénins. Les affections anciennes exigent un traitement plus prolongé. (Intervalle de 20 jours entre chaque cure.)

Doses moyennes.

De 1 à 2 ans,	2	dragées	par jour	fondues	dans un peu de lait.
De 2 à 5 —	3	—	—	—	—
De 5 à 10 —	4	—	—	—	—
De 10 à 16 —	5	—	—	—	—
Adultes :	6	—	—	—	—

{ En 3 fois ; le matin à jeun et
avant les 2 principaux
repas.

Nouveau prix en France : 25 fr. 50.

Laboratoires du SEROXEMA

G. BARTHET, Pharmacien

1, rue de Phalsbourg — PARIS (XVII^e). (Tél. : Wag. 02-76.)

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE

de HECKEL

Composition. — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales, stabilisé dans un liquide isotonique.

Mode d'emplol. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

Indications. — Toutes les formes d'asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, chez les cardiaques, les hypertendus et chez les sujets présentant un foyer de gangrène pulmonaire.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 23 fr. 50.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 17 francs.

Laboratoire pharmaceutique OORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

SÉRUM ANTITYPHOÏDIQUE

du Professeur Rodet.

Sérum de chevaux immunisés.

Actif contre le bacille d'Eberth et le Para A.

Partiellement contre le Para B.

Documentation. — Communication Académie de Médecine (9 mars 1915, 4 juillet 1915, 3 juin 1919).

Journal de Médecine de Lyon (5 novembre 1925).

Pas de contre-indications, il n'y a que des conditions de moindre efficacité.

La gravité n'est pas une contre-indication, au contraire.

Commencer le traitement dès que le diagnostic est posé ou même seulement probable.

Posologie. — Pour la conduite du traitement, suivre avec soin les indications données sur l'imprimé joint aux ampoules.

Le traitement normal correspond à une série de trois ampoules 20 cc., puis 15 cc., puis 10 cc.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. Franklin 24-63.)

SÉRUM DE JOUSSET

Sérum antibacillaire.

Sérum de chevaux immunisés contre les toxines du bacille de Koch.

Combat l'infection, non les lésions. Traitement de choix des primo-infections (s'aider pour le diagnostic de la cuti-réaction) : enfants : typhobacillose, pleurésie séro-fibrineuse, pleuro-péritonite des jeunes, polyarthrite tuberculeuse aiguë, hémoptisie, spléno-pneumonie tuberculeuse, etc., rechutes survenant parfois au cours d'une tuberculose précocement traitée par l'Allergine.

Si après une semaine d'observation la température reste régulière ou peu oscillante, aborder la sérothérapie.

Contre-indication à l'emploi en injections. — Température irrégulière (oscillation atteignant 3°). Asthmatiques, Emphysémateux.

Aucune contre-indication à l'emploi en lavements.

Posologie. — Injections hypodermiques, face antérieure de la cuisse, 3 à 6 cc. par kilog. de poids du sujet, répartis en trois injections à deux jours d'intervalle ou lavements quotidiens à conserver, inoffensifs, de 2 à 3 cc. par kg. pendant 6 à 8 jours, le soir. Fortes doses salicylate si arthralgies 12^e jour.

Demandez notice explicative aux Dépositaires généraux.

Les Laboratoires BRUNEAU et Cie

17, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

SÉRUM OLIVIÉRO

Equisérine

Sérum normal de cheval, créé en 1906.

Le *Sérum normal de cheval* possède de nombreuses propriétés qui en font un agent thérapeutique de tout premier ordre. Son action est des plus manifeste dans les *Anémies*, les *Asthénies*, les *Consumptions*, les *Hémorragies*.

Son action est héroïque et nettement spécifique dans le pansement des plaies à cicatrisation rebelle, dans les *brûlures*.

Ampoules buvales de 10 cc., 1 par jour; de 2 cc., 2 à 4 par jour. Peuvent s'employer en pansements. Ces ampoules contiennent du sérum pur, sans addition d'antiseptique ou de conservateur quelconque.

Prix amp. de 10 cc. la boîte : 21 fr. 30.

— 2 cc. — 19 fr. 20.

Comprimés, — Capsules. — Prix : 19 fr. 20.

Sérum desséché pour pansements. Prix : 12 fr. 80.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoire OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE. Tél. : Molitor 27-06.

SÉRUM POLYVALENT de Leclainche et Vallée.

Provient de chevaux solidement immunisés contre les variétés les plus multiples et les plus virulentes des germes capables de produire la suppuration des plaies et les grandes septicémies courantes : streptocoque, staphylocoque, colibacille, pyocyanique, etc.

Indications et mode d'emploi. — Sérothérapie interne (voie intramusculaire, intraveineuse, sous-cutanée, rectale) : Septicémie et Pyohémies.

Posologie. — *Dose d'attaque* : 1^{er} jour, 80 cc. ; 2^e jour, 80 cc. ; 3^e jour, 60 cc.

Dose d'entretien : 30 cc.

En injection intramusculaire. Dans les cas très graves, recourir à l'injection intraveineuse.

Présentation. — Sérum injectable : boîte de 2 ampoules de 10 cc.

Prix : 26 francs.

Remboursement aux Assurés sociaux : Catégorie A.

Laboratoires du Dr ROUSSEL
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

SÉRUMS CLIN

Les sérums thérapeutiques Clin, antimicrobiens et antitoxiques, sont purifiés par *électro-osmose*, procédé n'altérant en rien leur efficacité et leur conférant les avantages suivants : disparition ou diminution des accidents de choc et des accidents sériques, très grande stabilité et très longue conservation. S'emploient en injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, ou localement.

SÉRUM CLIN ANTICOLIBACILLAIRE

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Indications. — Toutes les infections à colibacilles ou à association colibacillaire : Colibacillozes, pyélonéphrites, appendicite aiguë et ses complications, péritonites (avec le sérum antigangreneux), fièvre urinaire, périostite.

Doses. — Variables suivant le degré d'infection (de 10 à 60 cc. par jour pendant 4 à 5 jours).

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Ce sérum existe également sous forme *non purifiée*, pour l'administration par voie buccale.

SÉRUM CLIN ANTIDIPHTÉRIQUE

Sérum antitoxique et antimicrobien purifié. Sérum concentré en unités antitoxiques, mais d'une teneur normale en protéides. Hyperimmunsification des chevaux à l'aide de toxine diphtérique et de corps microbiens provenant de diphtéries graves et malignes récentes.

Formes. — Délivré en ampoules de 10 cc., sous deux concentrations :

1° Ampoules de 10 cc. à 1.000 U. A. par cc., soit 10.000 U. A. par ampoule.

2° Ampoules de 10 cc. à 500 U. A. par cc., soit 5.000 U. A. par ampoule.

3° Ampoules de 2 cc. à 1.000 U. A. par ampoule, en boîte de 2 ampoules pour usage préventif.

Posologie. — Se référer à notices plus détaillées.

SÉRUM CLIN ANTIGANGRENEUX

(Préparé d'après la méthode de H. VINCENT et G. STODEL.)

Sérum antigangreneux multivalent.

Indications. — Gangrène gazeuse, phlegmons, abcès gazeux, traumatisme avec gros délabrement musculaire, fractures ouvertes, appendicites graves, péritonite, gangrène pulmonaire, diabétique, etc...

Doses. — Préventives : 10 à 20 cc. ; curatives : 20, 30, 40 cc.

SÉRUM CLIN ANTISTREPTOCOCCIQUE MULTIVALENT

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Sérum équin hyperimmunisé contre les diverses races sélectionnées de streptocoques variés et très virulents.

Indications. — Toutes les infections graves, locales ou générales et septicémies à streptocoques.

Doses. — Variables suivant la gravité de l'infection, de 20 à 100 cc. (par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse).

Agir vite, suffisamment longtemps.

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SÉRUM-VÉGÉTAL

Du docteur Cuguillère.

Composition. — Le sérum-végétal du docteur Cuguillère à base d'essences d'ail rendues indolores par un procédé spécial ne présente aucune toxicité sur l'organisme, tout en possédant un pouvoir bactéricide très puissant contre le bacille de Koch.

Il renferme en outre de la *myrrhe* lui conférant des propriétés balsamiques remarquables et des sels de chaux à l'état naturel dans les végétaux et de ce fait entièrement assimilables.

Références scientifiques. — Le sérum a été expérimenté au Château Savignac, à Saint-Denis-de-Piles (Gironde), sous le haut patronage de M. le Marquis de Castellane. Les guérisons cliniques des bovidés traités furent constatées par l'éminent vétérinaire M. Faure; c'est à l'hôpital Bichat que le célèbre anatomo-pathologiste le docteur H. Martin-Roux reconnaît ces guérisons sur les pièces examinées.

L'Académie de Médecine reçoit en séance publique du 10 mars 1908 le compte rendu complet des travaux effectués sur le sérum-végétal du docteur Cuguillère. Depuis, le sérum est employé avec le plus grand succès et il recueille chaque jour un nombre d'adeptes de plus en plus considérable.

Indications. — Le Sérum-Végétal du docteur Cuguillère est le traitement de choix et quasi spécifique des tuberculoses osseuses et ganglionnaires. Il guérit souvent en quelques injections des coxalgies, des maux de Pott remontant à plusieurs années et même compliqués de mauvais état général et de fistulisations. Il donne également des résultats remarquables dans toutes les formes de tuberculoses.

Un traitement de trois mois à raison d'une à deux injections de 5 cc. par semaine, hypodermiques profondes (*adultes*), et d'une cuillerée à potage de sirop iodotannique associé à de l'arrhénal (et sur spécification « vitaminé » sur l'ordonnance, à 4 000 unités internationales, *pro die*), est suivi:

Cliniquement: par une amélioration de tous les signes stéthoscopiques et une reprise de l'état général.

Radiologiquement: par une régression des images pathologiques.

Bactériologiquement: par la diminution des B.K. par champ.

Chimiquement: par l'élévation du cholestérol et de la courbe de séroflocculation de Vernes.

Hématologiquement: par une amélioration très rapide de la formule sanguine.

Echantillons permettant un essai loyal et littérature ouvrage édité par la Lib. Norbert-Maloine de Paris, in-8, 140 p.: *Traitement phytothérapique de la Tuberculose.*

Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE

du Dr Cuguillère. ☉

Docteur en médecine, Ancien externe des Hôpitaux, pharmacien de la Faculté de Paris, membre de la Société Botanique de France

19, rue des Chalets — TOULOUSE.

SERVO-FREINYL

Médicament type de la spasmophilie
et des états spasmodiques.

Propriétés Thérapeutiques. — 1^o Action sédative purement symptomatique par la *phényléthylmalonylurée*. 2^o Modificateur humoral par les *borotartrates* et les *ions calciques* et *magnésiens*. 3^o Régulateur endocrinien par la *parathyroïdine* et de carence par la *vitamine D*.

Indications. — Chez l'enfant : manifestations du terrain tétanique. — États convulsifs. — Tics. — États choréiques du terrain comitial. — Troubles du caractère. — Instabilité. — Spasmes du pylore. — *Toutes les manifestations spasmophiliques.*

Chez l'adulte : Crises comitiales et équivalents. Névroses cardiaques. — Agitations. — Troubles du sommeil. Tous les états spasmodiques.

Présentation. — Granulé d'un goût très agréable.

Formule.

Borotartrate de magnésie	0,35
Borotartrate de calcium.....	0,35
Carbonate de calcium.....	0,25
Phényléthylmalonylurée.....	0,015
Parathyroïdine.....	1/2 mm.
Ergostérine irradiée.....	500 U. I.
Extrait de piscidia.....	0,05 par cuillerée à café.

Posologie. — *Enfants*..... 3 cuillerées à café.
 Adolescents..... 2 cuillerées à dessert.
 Adultes..... 3 cuillerées à dessert.

(Doses moyennes que le médecin adapte à chaque cas particulier.)

La boîte : 20 francs. — Durée moyenne : 10 jours.

Dépôt chez tous les grossistes.

Laboratoire INNERVA.

52, rue de Cambrai. LILLE.

Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

SETI

**Ampoules jumelées de Soufre et d'Iode
en milieu magnésien.**

Propriétés thérapeutiques. — Les ampoules jumelées SETI permettent d'injecter une solution aqueuse magnésienne de Soufre et d'Iode ; c'est l'application de la méthode de Sulfoiodothérapie préconisée par André LERI et DEDET pour lutter contre le Rhumatisme chronique et ses complications — pratique, efficace et sans danger.

Indications. — Rhumatismes chroniques. Arthrites. Névralgies rebelles. Périphlébites. Asthme.

Mode d'emploi. — Le médecin, dans une seringue de 5 cc., aspirera 2 cc. de chacune des solutions, il agitera le liquide jusqu'à décoloration. Il fera l'injection intramusculaire profonde de la solution incolore obtenue en suivant très exactement la technique indiquée par A. LERI et DEDET. Le SETI s'injecte aussi par voie intraveineuse.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens,
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e)
(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

SICOVAIRE

Indications. — Troubles de la puberté ou de la ménopause chirurgicale ou naturelle.

Aménorrhées, dysménorrhées.

Agit dans tous les cas de déficience ovarienne, avec insuffisance ou excès de folliculine.

Composition. — Extrait total d'ovaire.

Forme. — Ampoules buvables.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 16 fr. 50.

La boîte de 18 ampoules : 47 fr.

Posologie. — Une ampoule par jour avant le repas dans de l'eau sucrée, après les règles, ou la période présumée des règles s'il y a absence de règles.

Laboratoires du SICOVAIRE

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

SIDÉRANYL

Spasmolytique Magnésien

(Borotartrate de Magnésium).

Propriétés Thérapeutiques. — Le type de la médication à la fois sédativ et stimulante, respectant intégralement les fonctions mentales. — Sédatif cortical par le borotartrate. — Spasmolytique par l'action inhibitrice du magnésium sur la fibre musculaire lisse. — Vitalisant, cytophylactique et excito-sécrétoire par le même magnésium.

Indications. — Médication de choix des troubles nerveux, relevant à la fois de l'asthénie et de l'hyperesthésie par carence magnésienne. États dépressifs avec irritabilité. — Émotivité, états choréiformes. Tics. — Relâchement mental, rêvasserie, somnolence, inattention. Léiasthénie viscérale (ptoses avec spasmes). Agitations. Instabilité.

Et surtout : paraépilepsie, crises nerveuses fonctionnelles

Présentation. — Solution pour Adultes et Enfants, 15 p. 100 : 20 fr

Sirop pour Nourrissons, 6 p. 100 : 12 fr. 50.

(Durée moyenne : 10 jours)

Formule. — Borotartrate de Magnésie.

Posologie. — Solution : Adultes..... 2 à 3 cuillerées à soupe
Adolescents..... 2 à 3 — à dessert
Enfants..... 1 à 2 — —

Matin, Midi, Après-Midi.

Sirop Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge.

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.

En dépôt chez tous les grossistes.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA

P. CORDONNIER, Pharmacien, 52, rue de Cambrai. — LILLE

Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

SILGUINE

Composition. — Chaque comprimé contient :

0,05 Extrait sec stabilisé de gui de pom-
mier.

0,01 Extrait sec d'aubépine.

0,10 Poudre de prêle.

0,03 Extrait de glandes endocrines mâles.

Action. — La « SILGUINE », à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artériosclérose.

Indications. — Tous les symptômes de l'« Automnose », hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

Prix : 16 francs.

G. RÉAUBOURG et Cie,

Docteur en Pharmacie,

115, rue de Paris,

BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

SILICYL

Médication de base et de régime des carences siliceuses et des états artérioscléreux, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la *lésion initiale* et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, P. M. 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffer et Pélissier, *Acad. Sciences*, Août 1920.)

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^2 \text{O}^{12} \text{Na}^2$ et K^2 stables solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

GOUTTES : Seule préparation titrée à 25 p. 100 de SiO_2 , X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

COMPRIMES : Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse ; 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscléreux, angor.).

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma, Viscosité ramené à la normale. Elimination chlorurée. Diurèse. Action anti-athéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — 1° Action minéralo-tissulaire : Bacillose, Consolidation accélérée des fractures. Surdit   (Ionisation). Etats elastopatiques.

2° Art  rioscl  rose, Hypertension, Aortite, Ath  rome aortique, Scl  rose r  nale, Angine de poitrine, Endart  rite obl  t  rante progressive. Prophylaxie de l'ath  rome et de l'h  morrhagie c  r  brale, Troubles c  r  braux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scl  reuse, Scl  rose auriculaire, Troubles oculaires, Presbytie, Fatigue et Scl  rose cardiaque, An  mie siliceuse.

Gouttes : 32 cc. 21 fr. 30

Ampoules : (5 cc. \times 6) 17 fr. 05

Comprim  s : (50 comp.) 21 fr. 50

D  POT, Paris : Pharmacie P. LOISEAU

61, boulevard Maiesherbes — PARIS.

  CHANTILLONS — LITT  RATURE

Laboratoire CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

(T  l. : Gobelins 00-70.)

SILIGONE

Hypotenseur Antiscléreux.
Médication Silico-Phytothérapique.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Mode d'emplol. — 4 à 6 comprimés par jour, 15 à 20 jours par mois, de préférence à jeun et un bon moment avant les repas.

Composition. — Silicate sodique, Ballote, Yohimbine (000066 par comp.), anémone pulsatile.

Action. — Abaisse la tension, régularise la circulation, dilate les artérioles, diminue la viscosité sanguine, s'oppose au processus sclérosant.

Indications. — Hypertension quelle qu'en soit la cause, angiospasmés, artério-sclérose, athérome, vertiges, sclérose rénale et auriculaire, angine de poitrine, etc.

Prix. — L'étui de 50 comprimés : 18 fr. 70.

Concessionnaires :

Laboratoires R. BERNARDO

47, avenue de la République
VILLENEUVE-LE-ROI (Seine-et-Oise).

SILIPLASTINE

Composition. — Pâte à l'eau à base de silice colloïdale, oxyde de titane, oxyde de zinc, talc.

Indications. — Les dermatoses suintantes. — les dermites irritatives — toutes les lésions que les pommades grasses « échauffent ».

Avantages. — La Siliplastine, très agréable à appliquer, est parfaitement blanche. Elle ne graisse pas et ne tache pas le linge; elle s'enlève facilement à l'eau tiède (bouillie).

Présentation : { Le tube..... 14 francs.
 { Le demi-tube.. 8 fr. 20.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

SILISODE

Forme. — Granulé.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40.

Benzoate de lithine : 0 gr. 10.

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

Action. — Hypotensive, antisccléreuse.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes. Artério-sclérose. Aortites, Angine de poitrine, Athérome.

Laboratoires MICHELS

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)
(Tél. : Galvani 73-50, 51.)

SINAPLASME

**Cataplasme sinapisé instantané
du docteur Jean Faure.**

Le premier en date. Le plus régulier.
Le moins cher.

Mode d'action. — Agit comme un cataplasme de farine de lin sinapisé et non comme un sinapisme.

L'enveloppe contenant un Sinaplasme
double : 2 francs.

La boîte contenant trois Sinaplasme
double : 6 francs.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} Classe
AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

SINAPOL

Pommade révulsive aux essences (en tubes)

Composition. — Essence de Sinapis Nigra, Teinture d'euphorbia resinifera, Eucalyptol, Goménol, Gaïacol, Menthol.

Indications. — Toutes celles des cataplasmes et enveloppements sinapisés, des sinapismes ou autres applications révulsives. Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires, douleurs, rhumatismes, névralgies, etc...

Posologie. — SINAPOL, 1 tube, étendre en onction *très légère*, puis recouvrir de coton cardé ou flanelle. Pour les épidermes spécialement sensibles, étendre au préalable une petite couche de vaseline, puis faire l'application de SINAPOL comme il est dit plus haut.

Laboratoires DEODAX

R. RENAUD * ❧

ANOULD (Vosges).

SINASEPTIC

Sinapise. — Aseptise.

Mélange de 5 essences balsamiques, d'essence de Moutarde noire, de Camphre, de Menthol et de Gaïacol en dilution huileuse.

Action sinapisante et vaso-dilatatrice.

Action antiseptique par absorption cutanée et élimination par les voies respiratoires.

Indications. — Angine, Laryngite, Bronchite aiguë ou chronique, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Formes respiratoires de la Grippe, Congestion pulmonaire. Certaines formes de Tuberculose.

Révulsion préventive post-anesthésique.

Emploi. — Appliquer au pinceau et recouvrir de ouate. Pour les enfants et les peaux sensibles, diluer avec de l'huile ordinaire.

Laboratoire P. MORAND

197, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).

(Tél. Auteuil 64-08.)

SINUSYL

Indications. — Toutes désinfections nasales. Sinusites, Coryza, Rhinites, Ozène, Rhume des foins.

Composition. — Résorcine, Camphre, Myrtol, Essence de violettes, Excipient huileux.

Forme et mode d'emploi. — Se fait :
En *huile* pour instillations nasales.
En *huile éphédrinée* à 1 p. 100, en pulvérisations.
En *pommade* dans un tube spécial ;
En *rhino-capsules* pour auto-instillations.
Employer également en période d'épidémie.

Laboratoires Pierre CHATEAU

33, rue du Bois — VINCENNES (Seine).
(Tél. : Daumesnil 25-30.)

SIPHURYL

(Orthosiphon Longuet)

Composition. — Extrait d'Orthosiphon Stamineus, en *gouttes aromatisées* (LX gouttes = 0,50 extrait sec) ou *comprimés* (1 comp. = 0,25 ext. sec).

Remplacelatisane impraticque et peu agréable.

Indications. — Diurétique hépato-rénal, sans aucune contre-indication.

Eliminateur d'eau, urée, acide urique et chlorures, Oligurie, Arthritisme, Lithiase rénale, obésité.

Doses :

LX gouttes dans 1/2 verre d'eau, 3 fois par jour ou 2 comprimés 3 fois par jour.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS.

(Tél. : Roquette 21-95.)

SIROP BERTHÉ

Composition. — A base de codéine, 15 milligrammes de codéine par cuillerée à soupe de 20 grammes de sirop ; 11 milligrammes environ par cuillerée à entremets, 4 milligrammes par cuillerée à café.

Indications. — Préparation d'un goût agréable qui s'emploie contre les rhumes et les autres affections des voies respiratoires, maladies nerveuses, souffrance et insomnie dues à une maladie quelconque.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à soupe, 1 à 6 cuillerées à café.

Enfants au-dessous de 3 ans, on prépare une petite potion en additionnant une cuillerée à café de sirop Berthé de deux cuillerées à soupe d'eau. On donne dans les 24 heures autant de cuillerées à café de cette potion à l'enfant que cela est nécessaire pour le calmer.

Enfants au-dessus de 3 ans, une 1/2 cuillerée à café par année d'âge.

Prix : le flacon 13 fr. 90.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Pro. 21-55 et 21-58.)

SIROP BRAHMA

Composition. — Thiocolum, benzoate de soude, codéine, chlorhydrate d'éthylmorphine, aconit, belladone, grindélia.

Action. — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, 1 heure avant ou 2 heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane. Pour 4 à 5 jours de traitement.

Laboratoires G. COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).
Tél. : 0-21.

SIROP CASSIBOR

Sirop à base de teinture d'aconit, substances pectorales, séné, cassis et borate de soude.

Goût agréable, ne fatigue pas l'organisme, ne constipe pas.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 cuillerée à café par année d'âge.

Indications. — Prescrit contre rhumes, angines, bronchites, gripes et névralgies. C'est le sirop type pour les enfants.

On l'emploie également après les opérations chirurgicales chez les malades enrhumés.

Le flacon : Prix : 13 fr. 90.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

SIROP DE CRÉOSOTE VACHERON

Composition. — 0 gr. 15 de créosote par cuillerée à soupe.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire et antiseptique puissant des bronches et du poumon.

Avantages. — De saveur agréable, nullement caustique, très bien toléré par l'estomac. Excellent sirop pectoral.

Indications. — Rhumes de toutes natures, bronchites aiguës et chroniques, toux rebelles, catarrhes, laryngites, grippe, influenza, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures, à prendre dans l'intervalle des repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

SIROP DE GAÏARSOL

Composition. — Méthylarsinate de Gaïacol.

Indications. — Calme immédiatement la toux, Désinfecte les voies respiratoires, Stimule la résistance organique. Tolérance absolue, assimilation parfaite.

La toux, les affections pulmonaires, les complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses.

Forme. — Sirop.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : de 8 ans et plus : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants de moins de 8 ans : selon l'âge, par cuillerée, ou fraction de cuillerée à café.

Prix : 16 francs.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

SIROP DE GLYCÉROPHOSPHATES VACHERON

Au Gaïacol de synthèse cristallisé
et aux glycérophosphates de chaux, de soude et de potasse.

Composition. — Cette préparation contient par cuillerée à soupe :

0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé.

0 gr. 30 de glycérophosphates.

Avantages et Propriétés thérapeutiques. — Ce sirop possède le même pouvoir antibacillaire que le sirop Vacheron au Gaïacol (*voir plus loin*), et en plus l'action reconstituante des phosphates organiques.

Indications. — Affection des voies respiratoires, chez les anémiques, les lymphatiques, les rachitiques et contre la tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr. ; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique. Pas de contre-indications.

Dépôt : **Laboratoires H. NOGUÈS**
7, rue Galvani — PARIS.

SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges	0 gr. 02
Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia	0 gr. 20
Phosphate monocalcique cristallisé.....	0 gr. 25

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.

Préparation très recommandée aux enfants.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

SIROP D'EUCALYPTINE

Antiseptique pulmonaire, Calmant de la toux, Orexique, Phagocytogène.

Composition :

Essence déterpénée d'Eucalyptus	0,025
Phénolsulfonate de Sodium	0,15
Camphosulfonate de Sodium.....	0,25
Gaiacolsulfonate de Potassium	2,50
Codéine	0,10
Bromoforme	0,10
Teinture de Belladone et Aconit	0,50
Pour 100 grammes.	

Indications. — Toutes pneumopathies aiguës ou chroniques, gripes et complications pulmonaires, broncho-pneumonie, bronchite, coqueluche trachéo-bronchique, toux spasmodique, d'irritation ou catarrhales.

Posologie :

Adultes : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café ou à dessert selon l'âge.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

SIROP DUBOIS au CRÉOSAL

Composition. — Le Créosal réunit dans sa composition le Gaiacol, l'Acide Phosphorique et le Calcium, que la Thérapeutique a toujours associés.

Propriétés et indications. — Récalcifiant puissant. Accélérateur de la Nutrition. Sédatif de la toux quelle qu'en soit l'origine. L'emploi du SIROP DUBOIS au CRÉOSAL est tout spécialement indiqué au début et au cours des gripes, bronchites, affections pulmonaires.

Forme. — Sirop de goût très agréable, malgré haute teneur en principes actifs.

Posologie et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants (de 10 à 15 ans) : 2 à 4 cuillerées à café.

Le SIROP DUBOIS au CRÉOSAL se prend de préférence dans une infusion ou de l'eau très chaude, à distance des repas.

Durée moyenne des unités de vente : de 5 à 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon : 13 fr. 50.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.

SIROP DU DOCTEUR CANAC

Formule :

Essence pure de Térébenthine	5 gr.
Essence pure de Cyprés.....	2 —
Sirop simple.....	Q. S. pour 150 —

Bien agiter avant l'emploi.

Les Docteurs Germain See et Trousseau ont préconisé la Térébenthine pour son action dans les catarrhes chroniques de la vessie et des poumons. Rossbach a observé que l'inspiration d'air térébenthiné diminue la sécrétion bronchique. L'essence de térébenthine diminue l'excitabilité des appareils respiratoire et circulatoire et abaisse la température. C'est un puissant décongestionnant des glandes sécrétrices.

Indications. — Bronchites aiguës ou chroniques. Catarrhe des vieillards et des Mineurs (régions minières). **Coqueluche.** En traitement combiné avec les gouttes Géha "B" comme *Spécifique* de la *Coqueluche*. (Voir à "GECAN".)

Présentation. — Sirop en flacon de 150 cc. : 13 francs au public.
— — — 310 cc. : 22 francs —

Mode d'emploi et doses :

Enfants : de 1 mois à 2 ans : 3 à 5 demi-cuillerées à café par jour ; de 2 à 7 ans : 5 à 8 cuill. à café ; au-dessus de 7 ans : 4 à 6 cuill. à dessert.
Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire Médical « GEHA »

à PORT-DE-BOUC, près Marseille (B.-du-R.). (Tél. : 30.)

SIROP EFRYL

à base d'Ephédrine et de Codéthyline.

Action. — Sédation constante de la toux, de la dyspnée. Diminution rapide de la congestion des organes respiratoires.

Action particulière de l'Ephédrine sur le système nerveux sympathique (ramifications des bronches) : suppression du spasme bronchique, excitation du centre respiratoire, diminution du travail du cœur par une élévation légère de la pression sanguine.

Indications. — *Toux en général.* Rhumes, Trachéites, Laryngites. Bronchites aiguës et chroniques, Complications pulmonaires de la grippe, *Emphysème, Asthme, Rhume des foins, Coqueluche.*

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à bouche par jour.
Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour (au-dessus de 2 ans).

A prendre 1/2 heure avant les repas, ou 2 heures après.

Éviter de donner le Sirop ÉFRYL immédiatement avant le coucher.

Flacon de 150 cc.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

« THÉRAPLIX »

98, rue de Sèvres, PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SIROP ET PÂTE PECTORALE ROBIN

(Formule du D^r Bousquet)

Composition. — Chlorhydrate d'éthylmorphine (Méthylocodéine), non stupéfiant. Teintures de Drosera et d'Aconit, Bromoforme, Eau distillée de laurier-cerise.

Indications :

Sirop : Sédatif rapide de la toux et de l'oppression.

Pâte : Pharyngites, Laryngites.

Formes. — Sirop et Pâte de goût agréable.

Sirop : 1 cuillerée à potage renferme 0 gr. 01 de chlorhydrate d'Éthylmorphine, II gouttes Bromoforme, VI gouttes Teinture de racine d'Aconit, VI gouttes Teinture de Drosera, 0 gr. 75 eau distillée de laurier-cerise.

Pâte : 10 grammes renferment 0 gr. 015 de chlorhydrate d'Éthylmorphine.

Posologie :

Sirop : 4 à 8 cuillerées à potage par jour (*adultes*) ;

2 à 4 (*enfants* au-dessus de 10 ans).

Pâte : une vingtaine de bonbons (*adultes*). Moitié pour les *enfants*.

Prix : Sirop : 17 fr. 20 ; boîte : 6 fr. 75.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55,38-75)

SIROP FAMEL

Antiseptique. — Lactocréosote soluble. Cicatrisant non caustique, bien toléré.

Calmant. — Codéine, Aconit.

Récalcificateur. — Lactophosphate de chaux.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe le matin avant déjeuner et une le soir au coucher ; délayer dans infusion chaude non sucrée. En cas de besoin, troisième cuillerée à midi.

Enfants : de 8 à 14 ans, par cuillerée à dessert ; de moins de 8 ans, par cuillerée ou demi-cuillerée à café, ou moins selon l'âge, toujours dans infusion non sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poulmon.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches et du poulmon : bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés, toux. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires P. FAMEL

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e).

SIROP GÉRAUDEL

Pectoral à l'Éphédrine.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 223-7.

Ephédrine chlorhydrate ...	0 gr. 07
Sirop de capillaire	50 grammes
Teinture de vanille	IX gouttes.
Teinture de safran	IX gouttes.
Sirop de tolu	Q. S. pour 100 grammes.

Toux. Asthme. Emphysème.

Une cuillerée à soupe matin et soir. Cette dose n'est pas limitative. Elle peut être répétée dans la journée et dans la nuit.

En cas de crise prolongée, de demi-heure en demi-heure une cuillerée à café.

Prix, le flacon : 16 fr. 50.

Laboratoire GÉRAUDEL

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-36.)

SIROP GIRARD

Iodo-tannique

Iode, Tannin, Lactophosphate de chaux.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 cuillerée à soupe avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à dessert avant chaque repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique, reconstituant, reminéralisateur, dépuratif. Goût agréable. Assimilation parfaite. Le meilleur succédané de l'huile de Foie de Morue.

Indications :

Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Hypertrophies amygdaliennes, Végétations adénoïdes, Débilité, Rachitisme, Troubles de croissance et de formation, Toutes convalescences.

Prix : 15 fr. 80.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-3.

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 11 fr. 45.

PATE GRIBELL

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 4 fr. 20.

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

Mode d'emploi. — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 9 fr. 40.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e)

SIROP HERCELL

Composition :

Bi-iodure d'Hg	0,005
KI.....	0,25
Extrait végétal de Larrey.....	0,20
Par cuillerée à soupe.	

Forme. — Sirop stabilisé.

Indications. — Toute la thérapeutique par l'Hg. dissimulé.

Médicament d'entretien. Tonique et dépuratif bi-iodé.

Doses :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : par cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 22 francs le flacon de 310 cc.

Durée du flacon : dix jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle, sous le n° 1356-1.

G. MAHÉ, Pharmacien.

85, rue de Trignac

SAINT-NAZAIRE-PENHOET (L.-I.) — Tél. : 115.

SIROP IODOCALCIUM

La forme moderne du sirop iodotannique.

Association iodocalcique assimilable.

Composition :

<i>Gluconate de calcium.....</i>	<i>0 gr. 10</i>
<i>Chlorure de calcium.....</i>	<i>0 gr. 10</i>
<i>Iode en combinaison organique.</i>	<i>0 gr. 01</i>

Par cuillerée à café.

Indications. — Toutes celles de l'iode et de la chaux. Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, lymphatisme, pré-tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

Posologie :

Enfants : au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café, 2 fois par jour.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert, 2 fois par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France.

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

SIROP LAXATIF GOBEY

Ses principes actifs, exclusivement végétaux, sont incorporés à un sirop à base de sucs de fruits.

Action douce et constante, saveur agréable. Convient aux enfants et aux vieillards, aux opérés et pendant la grossesse.

Prix : 12 fr. 50.

Il existe également des dragées laxatives Gobey.

Flacon de 50 dragées, prix au public : 9 fr. 35.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

SIROP LECŒUR

Rhus aromatica, Noix vomique, Belladone, Quinquina, Acide phosphorique ; Glycérophosphates calciques, magnésiques, potassiques et sodiques.
Contre l'incontinence d'urine.

Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau, avant les repas ou le coucher.

De 2 à 5 ans : 1 cuillerée à café le 1^{er} et le 2^e soir, 2 cuillerées à café les soirs suivants.

De 5 à 10 ans : 1 cuillerée à dessert les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à dessert les soirs suivants.

Plus de 10 ans : 1 cuillerée à soupe les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à soupe les soirs suivants.

Adultes : 1 cuillerée à soupe matin et soir pendant 2 jours, 2 cuillerées à soupe matin et soir les jours suivants.

Prix : 16 fr. 50 le flacon de 187 cc.

Laboratoires GAVIN, *
VIMOUTIERS (Orne). — Tél. : 22.

SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.
Approbation scientifique de l'Académie de Médecine de Paris.

Indications thérapeutiques. — Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans : 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

Prix : 12 fr. 80. — Durée moyenne : 8 à 10 jours.

Admis aux Assurances Sociales.

Voir : « **SUFROL** » CROSNIER.
Comprimés ayant les indications du sirop.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.
(Tél. : Avron 35-04.)

SIROP MIREILLE

Le plus agréable au goût, le plus actif pour le traitement polyvalent des affections de l'appareil respiratoire.

Calmant, sédatif de la toux, hypnotique, balsamique, antiseptique, diurétique, expectorant, émollient, sudorifique, à base de bromhydrate de codéine, terpine, aconit, belladone, benzoate de soude, etc...

Se prend à toute heure, aucune contre-indication, pas de toxicité, pas d'intolérance, pas d'accoutumance.

Prix au public : 13 fr. 80.

Laboratoires LEGENDRE et Cie

Section DS. — HOUILLES (S.-et-O.).

Avec Dépôts Généraux pour la vente en gros :
France et Colonies :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique :

M. RAMLOT

72, rue de l'Escaut — BRUXELLES-MARITIME

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments sous le n° 1045-2.

SIROP MORLAS

Pour nouveau-nés et enfants.

Iodo-lactate de Hg : 0,001. Fowler 1/10 mgr. par cuillerée à café.

Tonique et spécifique discret pour les petits malades à hérédité douteuse (végétations, glandes, eczéma, convulsions, hérédosyphilis, etc.).

Doses :

Jusqu'à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café, etc...

35 cuillers à café par flacon.

Échantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

Laboratoire MOURÉ

COTARD, Pharmacien,

Passage des Princes — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 82-56.

Dépôt général :

O. C. P., Paris et ses succursales.

SIROP NOGUÈS

Composition :

Alcoolature d'aconit	} aa.....	0,030
Teinture de belladone		
Teinture de grindelia		0,075
Bromoforme.....		0,016
Codéine.....		0,009
Benzoate de soude.....		0,079
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise.....		Q. S.
pour une cuillerée à bouche.		

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

Indications. — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

SIROP PECTORAL GOBEY

Contient des extraits végétaux sans opium ni dérivés de celui-ci.

Donne toute sécurité, même chez les jeunes enfants.

Indications. — Bronchite aiguë, toux grippales et nerveuses, laryngites striduleuses, séquelles de coqueluche.

Prix au public : 12 fr. 50.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

SIROP POLÉRY

Composition :

Sirop erysimum composé.....	46 gr.
Sirop polygala senega.....	23 —
Laurus cerasus	5,75
Natrium benzoate.....	1,75
Codéine	0,138
Teinture belladone	0,95
Teint. rac. aconit Napel	0,75
Bromure sodium.....	0,40
Codéthyline	0,019
Excipient.....	Q. S. pour 100 grammes.

Propriétés. — Spécifique des irritations chroniques de la gorge, Anti-spasmodique, Calmant de la toux, Expectorant, Décongestif de l'appareil pulmonaire supérieur.

Indications. — Toux d'irritation, toux rebelles et chroniques, bronchites, grippe, catarrhe, asthme, enrouements, trachéites, pharyngites, laryngites.

Présentation et prix. — Le flacon de 240 grammes : 15 francs.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, loin des repas.

Enfants : au-dessus de 10 ans, par petites cuillerées à dessert.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires Biochimiques de l'Est

J. FRECHIN, Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur.
LURE (Haute-Saône).

SIROP RAMI

Au Bromoforme. Spécifique de la toux.

« Le remède d'élection de la muqueuse pharyngée. »

Composition. — Bromoforme-Codéine-Aconit-Tolu-Laurier-Cerise.

Mode d'action. — La formule du sirop Rami, judicieusement équilibrée, en fait un auxiliaire précieux dans le traitement des affections broncho-pulmonaires et un sédatif remarquable du système nerveux et de la toux spasmodique.

Indications. — Laryngites, Pharyngites, Trachéo-bronchites aiguës et chroniques, Coqueluche, Asthme et Emphysème.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à soupe, espacées dans les 24 heures ; le Sirop Rami se prend pur ou dans un peu d'eau ou de tisane, et en dehors des repas.

Pâte Rami. — Hors de chez soi, elle remplace le Sirop. Elle est plus spécialement destinée aux maux de gorge et aux enrouements, et très appréciée pour la souplesse et la sonorité qu'elle donne à la voix.

LABORATOIRES FOUGERAT

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine). (Tél. : Pereire 00-32.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge
et le Grand-Duché de Luxembourg :
Sirop Rami, 53, rue du Poinçon, Bruxelles.

SIROP « ROCHE » AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe de Sirop « Roche » = 1 gr. de Thiocol « Roche ».

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. de gâiacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. = *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café selon l'âge.

Prop. théér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytoène, Eupéptique, Orexiue.

Indic. théér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-51.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

SIROP SÉDATIF DE L'ENFANCE

Neurocalolum

Composition. — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du bromure de calcium les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du chlorure et du gluconate de calcium.

Indications. — Tous les syndromes nerveux, spasmodie, troubles de la dentition, convulsions, cris, terreurs nocturnes, etc.

Gluconate de calcium 0 gr. 10

Chlorure de calcium..... 0 gr. 10

Bromure de calcium..... 0 gr. 05

Par cuillerée à café.

Posologie. — *Nourrissons* : 2 cuillerées à café par jour, jusqu'à 6 cuillerées à café en cas d'accidents aigus.

Après un an : 2 à 5 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV°).

SIROPS HENRY MURE

Rigoureusement dosés à 2 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 0 gr. 65 par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Potassium.
Maladies du Système Nerveux : Epilepsie, Hystérie, Chorée, Névroses.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Sodium.
Maladies de l'Estomac : Gastralgies, Crampes, Contractures.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Strontium.
Maladies du système nerveux sympathique : Estomac, Reins, Intestins.

Sirop HENRY MURE Polybromuré.

Potassium, sodium, ammonium.

Action décuplée des Bromures en association.
Epilepsie, Névroses.

Prix : 18 fr. 70.

L. N. C. 428-5.6.7.8.

Laboratoire du Docteur A. VERMERSCH,
Pharmacien

18, rue des Écoles — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 18-54.)

SIROP au SOLUCAMPBRE DELALANDE

Pectoral et Eupnéique.

Composition. — Solucamphre, Ephédra total, Codéine et Dioninum, Constituants essentiels du sirop Desessartz (Ipéca et Séné).

Actions thérapeutiques. — Calme immédiatement la toux, relève le cœur et facilite la respiration. Facilite l'expectoration.

Indications. — Toux en général, et en particulier la toux des bronchiteux, la toux spasmodique (coqueluche) et la toux des tuberculeux.

Posologie :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. Chez les chroniques, des doses moindres suffisent.

Enfants au-dessus de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix du flacon : 19 fr. 50.

Laboratoire Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 18-33.)

SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur
Médecine du nourrisson.

Indications thérapeutiques. — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

Doses. — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 6 fr. 75 le flacon.

Laboratoire TEYSSÈDRE

74, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.

SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté.

Contenant pour 100 cc. :

Iode bi-sublimé 0 gr. 15

Extrait sec de ratanhia 1 gr. 10

Lactophosphate de chaux.... 2 gr. 25

Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc.

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

Indications. — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

LABORATOIRE OBERLIN

J. TINARDON

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

SIROP VACHERON

au Gaïacol de Synthèse.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de gaïacol absolu.

Avantages. — Le gaïacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

Propriétés thérapeutiques. — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

Indications. — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau à prendre dans l'intervalle des repas.

Enfants : De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

SISTOMENSINE

CIBA

EXTRAIT OVARIEN LIPOIDIQUE.

Action physiologique. — Régularise la fonction menstruelle et limite le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.
- IV. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec l'Agomensine).

Comprimés — Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comp. par 24 h. — 1 amp. tous les 2 jours.

Flacon de 40 comprimés.

Flacon de 100 —

Boîte de 4 ampoules.

(Voir Agomensine.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103-117, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

SODAMINE

Composition :

Salicylate de soude cristallisée ..	8 gr. 75
Benzoate d'urotropine	4 gr. 12
Acétate ammoniacque	2 gr.
Essence d'anis	0 gr. 055
Extrait de belladone	0 gr. 033
Teinture aconit	1 gr. 10
Teinture drosera	1 gr. 10
Glycérine	33 gr.
Eau	Q. S. pour 100 cc.

Indications :

Rhinites, sinusites, otorrhées, expectorations purulentes, suites de broncho-pneumonies, pharyngites, laryngites, trachéites.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 3 cuillères à café par jour au moment des repas dans un verre d'eau, de tisane ou grog.

Enfants : 1 à 2 cuillères à café selon l'âge.

Présentation et prix. — Un flacon de 90 cc. : 12 francs.

Laboratoires COUSSINET

22, rue des Martyrs — PARIS.

SODERGYL

Modificateur de la Viscosité sanguine.

Composition :

Citrate de soude	12 gr.
Sulfate de soude sec	3 gr. 5
Bicarbonate de soude	4 gr.
Phosphate de soude sec	6 gr.
<i>Hyposulfite de magnésie</i>	1 gr. 50

Forme. — Granulé soluble.

Indications. — Etats congestifs, Hypertension, affections du système veineux, migraines, constipation.

Doses :

Le Sodergyl, *granulé citaté, sulfaté sodique et magnésien*, se prend à la dose de 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Durée de la boîte : 10 jours environ.

Prix : 15 francs.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 10 82-3.

A. MIRONNEAU, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres). (Tél. : 18).

SODERSÉINE

Indication. — Coqueluche.

Composition. — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme. — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières :

<i>Enfants</i> jusqu'à 6 mois.....	100 gr.
— de 6 mois à 2 ans.....	150 —
— de 2 ans et au-dessus	200 —

(Échelle de doses sur le flacon.)

Prix du flacon de 500 gr. : 12 francs.

J. DEPRUNEAUX, Pharm. de 1^{re} classe,
18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).
(Tél. : Tremblay 12-04.)

SODÉSYL

Paquets de Bourget.

Estomac — Foie — Intestin.

Préparation intégrale de la solution de **Bourget**.

Sulfate de soude.	} Chaque paquet dosé pour obtenir un verre de la solution de Bourget.
Phosphate de soude.	
Bicarbonate de soude.	

Forme. — Paquets.

Emploi et dose. — 1 paquet le matin à jeun dans un verre d'eau de Vichy tiédie au bain-marie.
Enfants : demi-dose adultes.

Indications. — Toutes les applications de la solution de *Bourget* : insuffisance hépatique, congestion du foie, hyperchlorhydrie, gastro-entérite de l'enfance, intoxication intestinale et toutes affections du tube digestif.

Prix : 14 fr. 50.

« Jamais d'insuccès ».

Laboratoire du SODESYL

R. JACQUET, Docteur en Pharmacie.
VIERZON (Cher). (Tél. : 89.)

SODOLACTINE

(Estomac.) Δ 0,38.

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle *facilite physiquement l'évacuation de l'estomac*.

(Thérapeutique clinique de Martinet, p. 1125.)

Posologie :

Une mesure dans une tasse à *thé* d'infusion ou d'eau tiède.

Après les repas : Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons : (1 cuillerée à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

Avant les repas (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

Remarque importante. — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide*.

(A titre indicatif : une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

Prix : 14 fr. 40.

Laboratoires GERDA

163, boulevard Croix-Rousse — LYON.

SODOTHIOI

Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable, de thio-sulfate de sodium (Hyposulfite).

Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques, intramusculaires, ou intraveineuses si le médecin le juge utile.

Indications thérapeutiques :

Affections du foie et de la vésicule. — Insuffisance, Lithiase, Coliques hépatiques, Cholécystite calculeuse, Angiocholite lithiasique, Cholémie, Ictère émotif ou catarrhal, Hépatisme, Ascite, etc.

Manifestations arthritiques. — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculeuse, Calculs vésicaux, Rhumatismes chroniques noueux et déformants, Ankyloses fibreuses articulaires, et toutes manifestations arthritiques justiciables de la médication soufrée.

Accidents cutanés récidivants. — Eczémas, Prurits, Dermites, Acnés, Dyshidrose palmaire.

Manifestations anaphylactiques. — Urticaires, Accidents sériques, Accidents d'origine mercurielle, arsenicale, etc., et toutes manifestations anaphylactiques.

Etats congestifs chroniques des muqueuses respiratoires. — Bronchites chroniques, fétides, Pharyngites chroniques, etc.

Mode d'emploi :

A. *Cure d'assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'entretien.* — 10 injections six mois, puis un an après la première série.

Coliques hépatiques ou néphrétiques. — Les doses peuvent être portées à 2 ou 3 ampoules par jour en période de grande crise.

Dans les cas de *Rhumatismes chroniques noueux* ou *déformants* et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de complément A bis* après 15 jours de repos.

Manifestations anaphylactiques. — Urticaire chez l'adulte : 2 ampoules chaque jour, en une seule injection, pendant 10 jours. Autres cas d'anaphylaxie, désensibilisation : doses ordinaires.

Le SODOTHIOI étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé pendant tout le temps jugé nécessaire.

Prescrire :

Sodothiol : 1 boîte d'ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules : 21 fr. 30.

Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise) (Tél. : 0-50).
Echantillons et Littérature médicale sur demande.

SOJA « SOYOLK »

Farine de soja stabilisée.

Saveur agréable. Inaltérable.

Analyse. — **Protéines végétales** 43 p. 100.

Matières grasses, 20 p. 100 ; Hydrates de carbone solubles, 13 p. 100.

Lécithine. Vitamines. Absence d'amidon.

Valeur alimentaire : 1 gr. = 3 calories 60.

Indications :

Enfants : **Dyspepsie** et intolérance pour le lait et les farineux. **Eczéma**. (Voir **VEGELACT**)

Adultes : **Diabète**, Colites, *Colibacillurie*.

(Le soja acidifie urines et fèces.)

Mode d'emploi. — Incorporer 5 à 10 p. 100 de SOYOLK aux bouillies et potages.

(Une notice détaillée donne tous les emplois culinaires.)

Le **SOJA « SOYOLK »** est employé dans les services de l'Assistance publique.

Prix : 8 fr. 30 la boîte de 350 gr.

Dépôt général O. C. P.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-51.)

SOLARSAL

Solution stabilisée d'Arsénobenzol pentavalent à 5 p. 100 et d'Argent colloïdal pour l'usage externe.

Indications. — Toutes Affections rhinobucco-pharyngées, Angines, Stomatites, Gingivites, Pyorrhée, Amygdalites, Rhinites, Catarrhe naso-pharyngien, Etat grip-pal.

S'emploie : Collutoire. — Gargarisme. — Bains de bouche. — Gouttes nasales. — Badigeonnages.

La forte concentration permet la plus large utilisation.

Prix : 17 fr. 50 le flacon de 30 gr.

L. N. C. M. n° 574-5.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS.

SOLHERMOL

« MÉTÈRE »

Composition :

Mercure en solution huileuse colloïdale contenant 0,15 mgr. de métal par cc.

Indications :

Toutes les Indications du Mercure dans le traitement anti-syphilitique. Traitement mixte arsenico-mercuriel. Manifestations tertiaires. Traitement d'entretien ou de consolidation.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires, 2 injections par semaine, 10 piqûres par série. En même temps prendre 2 capsules par jour de Solhermol-capsules par la bouche.

Laboratoire MÉTÈRE

24, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-91.)

SOLUBÉOL

Composition. — Solution aqueuse d'huiles essentielles provenant exclusivement de produits de distillation de plantes fraîches, sans adjonction d'aucun produit de synthèse.

Formule par cc. : Rosmarinus officinalis..... 0,03
Abies balsamea..... 0,01
Satureja montana..... 0,01

Indications. — Toutes les affections et infections des bronches et des poumons :

a. Affections aiguës : trachéite, bronchite, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, abcès du poumon, gangrène pulmonaire.

b. Affections chroniques : bronchite chronique, emphysème pulmonaire, dilatation des bronches.

Tuberculose pulmonaire subaiguë et chronique.

Agent de désinfection générale.

Présentation :

A. Ampoules de 3 cc. Boîte de 8 ampoules.
— 5 cc. — —
— 10 cc. — —

Injectons sous-cutanées, intramusculaires, ou intraveineuses en cas d'urgence.

B. Gouttes (solution alcoolique).
— (essences pures).

C. Suppositoires Adultes Boîte de 8 suppositoires.
Enfants — —
Bébé — —

L. CHAUVIN, Pharmacien

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

SOLUCALCINE

Chlorure de calcium pur et stable.

Composition. — Préparée à partir du calcium et de l'acide chlorhydrique purs, cette solution concentrée est stable et ne présente pas d'oxychlorures, même à la longue.

XXX gouttes de la solution contiennent 1 gramme de chlorure de calcium.

Action. — Le chlorure de calcium est un recalcifant, un antihémorragique, un déchlorurant, un anti-hémoclasique.

Indications. — Tuberculose et prétuberculose. Hémorragies internes. Hémorragies opératoires, chirurgicales et obstétricales (traitement préventif), Spasmophilie, Tétanie, Eclampsie, Urticaire, Asthme, Rhume des foies.

Accidents post-sériques. Ascite, Œdèmes.

Posologie et mode d'emploi. — Doses faibles comme recalcifant.

Doses fortes comme antihémorragique et déchlorurant.

Doses moyennes pour les autres indications.

Doses faibles : 1 gr., soit XXX gouttes par jour, en deux fois.

Doses fortes : 4 à 6 gr., soit CXX à CLXXX gouttes par jour en deux fois.

Faire tomber les gouttes dans 1/4 de verre d'eau très sucrée ou de vin, à prendre pendant les repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS. (Tél. : Ségur 02-79.)

SOLUCAMPHRE

Associations diverses.

Solucamphre adrénaliné. — Contenant 0,001 d'adrénaline naturelle dissoute dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 50.

Solucamphre caféiné. — Camphosulfonate de caféine, 0,30 correspondant à 0,189 de caféine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 50.

Solucamphre éphédriné. — Camphosulfonate d'éphédrine, 0,07 correspondant à 0,032 d'éphédrine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 50.

Solucamphre strychniné. — Camphosulfonate de strychnine, 0,0015 correspondant à 0,001 de sulfate de strychnine.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 50.

Solucamphre gaïacolé. — Camphosulfonate de gaïacol, et camphosulfonate de strychnine, correspondant à 0,024 de gaïacol pur et à 0,0005 de strychnine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 50.

Solucamphre quininé. — Camphosulfonate de quinine, 0,60 correspondant à 0,418 de quinine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 22 francs.

Camphosulfonate de quinine, 0,20 correspondant à 0,14 de quinine base.

Tube de 20 comprimés : 22 francs.

Solucamphre cholestériné. — Cholestérine et Lécithine, 2,50 p. 100 en suspension colloïdale dans le Solucamphre.

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. : 27 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 5 cc. : 43 fr. 50.

Laboratoire Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE
(Seine)

SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

Avantages. — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle. Le Solucamphre à base de Camphosulfonate de pipérazine a une action beaucoup plus prolongée que le camphosulfonate de soude et se rapproche à ce point de vue de l'huile camphrée.

Action physiologique. — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

Mode d'emploi:

Ampoules : 2 à 8 cc. par jour en médecine. 2 cc. en intraveineuse, 10 à 15 cc. en chirurgie

Gouttes : XXV à C gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc. et 5 cc., gouttes et comprimés.

Le Solucamphre en solution et en comprimés à prendre *per os*.

Prix : 6 ampoules de 1 cc., 12 fr. ; 6 ampoules de 2 cc., 15 fr. 50 ;

6 ampoules de 3 cc., 17 fr. ; 6 ampoules de 5 cc., 20 fr. ;

Gouttes, 17 fr. ; Comprimés, 13 fr. 50.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

SOLUCAMPHRE SPARTÉINÉ DELALANDE

Sel de Spartéine du Solucamphre en dissolution dans le Solucamphre lui-même.

Correspondant à Sulfate de Spartéine : 0,05 par ampoule de 2 cc. et de 5 cc.

Avantages. — Tous les avantages du Solucamphre et de la Spartéine réunis.

Injections indolores.

Indications. — Toutes les indications de la Spartéine et du Camphre.

Présentation

Ampoules : Boîtes de 6 ampoules de 2 cc..... 17 fr. 25

— — de 6 — de 5 cc..... 24 fr.

Comprimés : Tubes de 20 comprimés 13 fr. 50

Gouttes...... 19 fr.

Mode d'emploi

Ampoules : 2 à 4 cc. en injection intramusculaire.

Comprimés : Adultes : 2 à 6 par jour ; Enfants : 1 à 2 par jour.

Gouttes : XXV à C gouttes par jour.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

Bien prescrire *Solucamphre spartéiné*, ampoules bleues, à l'exclusion de tout autre nom générique.

SOLUPHÉDRINE

(Solution aqueuse)

Une action **décongestive** et **analgésinante** rapide, intense, durable.
Une toxicité nulle.

Une action régulière sans aucun palier sur la muqueuse nasale qui présente à son égard une grande tolérance.

Une grande diffusibilité.

Composition — 1° Une petite proportion bien déterminée de phénylpropionate d'éphédrine ; action immédiate sur la muqueuse nasale ;
2° une proportion plus grande de gluconate d'éphédrine : action lente et très prolongée ; 3° un mélange à partie égale de phénylpropionate et de gluconate de paraminobenzol diéthyl amino éthanol : action anesthésique rapide intense et de longue durée.

Présentation :

1° En flacon compte-gouttes (Frs 18,75).

2° Avec pulvérisateur spécial (Pulvo-Soluphédrine) (Frs. 26).

3° 1 flacon de recharge pour Pulvo (Frs. 16,15).

(Peut être prescrit aux assurés sociaux.)

Mode d'emploi :

En instillation : 4 à 5 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour (enfants au-dessous de 5 ans : demi-dose).

En pulvérisation (Pulvo-Soluphédrine) : pulvériser dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

Indications : Prophylaxie et traitement des affections nasales : Coryza, rhume des foins, sinusites, catarrhe rhino-pharyngien, grippe, états asthmatiformes.

Publicité strictement médicale.

Laboratoires M. de RIVE.

J.-O. MOITY, Docteur en médecine, Docteur en Pharmacie, ancien interne des hôpitaux de Paris.

Services Commerciaux : 11 bis. et 13, rue Levert — PARIS (XX^e).

SOLUPROTINE « ROCHE »

Solution à 10 p. 100 de Protéine Solubilisée (Peptone de Caséine « Roche ») de composition constante, stérilisable et inaltérable.

Indications. — Toutes celles de la Protéinothérapie.

Posologie. — Injections intramusculaires.

États aigus : doses croissantes de 1/4 à 1 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

États subaigus et chroniques : de 1/2 à 2 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Injections endoveineuses. — De 1/4 à 1/2 cc. dans 10 cc. de sérum physiologique pour une injection tous les 3 ou 4 jours.

Boîte de 12 ampoules de 1 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-34.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SOLUSEPTAZINE

p (γ phényl-propyl) amino-phényl
sulfamide α — γ disulfonate de sodium.

Dérivé soluble de la *Septazine*. Solution aqueuse injectable à 6 p. 100 de sel. Toxicité nulle, activité très marquée sur le streptocoque. Médication complémentaire des traitements par la *Septazine*.

Indications. — Mêmes indications générales que la *Septazine* : érysipèle, streptococcémies, fièvres puerpérales, scarlatines graves, phlegmons, angines graves, phlébites, gripes compliquées d'infections pleuro-pulmonaires.

Présentations. — Ampoules de 5 et 10 cc. (boîtes de 5 ampoules), pour hôpitaux et cliniques (boîtes de 25 ampoules).

Mode d'emploi et Posologie. — Injections intramusculaires 10 à 20 cc. en 1 fois ou Injections intraveineuses 20 cc. en 1 fois pouvant être renouvelées 2 à 3 fois par jour.

Enfants : 20 à 30 cc.

Nourrissons : 20 cc. en 2 fois.

Traitement mixte avec la *Septazine* dans les cas graves.

Prix de vente :

Boîte de 5 amp. 5 cc. 16 fr.

Boîte de 5 amp. 10 cc. 26 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SOLUSOUFRE LABOCIP

Sulfothérapie Intégrale.

Traitement rationnel des états séborrhéiques.

Solution saturée éthylénique de soufre possédant un pouvoir dégraissant remarquable.

Totalement ininflammable.

Non irritant.

Non toxique pour les voies respiratoires.

Non caustique pour la peau.

Indications et mode d'emploi. — *Acné, séborrhée* : application le soir avec un coton après savonnage à l'eau chaude et séchage en évitant de frotter et d'en répandre dans les yeux.

Alopécie séborrhéique : Tous les soirs, friction rapide, mèche par mèche, à la racine des cheveux, la tête penchée en arrière.

Epidermomycoses : Frictions locales.

Prix : 27 fr. le flacon pour traitement d'un mois.

Échantillons sur demande même par téléphone.

Spécialités pharmaceutiques LABOCIP

S. COUTIERE-BAZILLE

Docteur en pharmacie,

19, boulevard du Parc, à NEUILLY (Seine).

(Tél. : Maillot 81-91.)

SOLUTION DU Dr J. JACOBSON

Composition :

Solution huileuse d'éther benzyl cinnamique.

Forme :

Ampoules de 1 cc.

Indications :

Lésions inflammatoires tuberculeuses : ganglionnaires, articulaires, testiculaires, buccales, laryngées, vésicales, et non tuberculeuses : salpingites, périviscérites. Trachome, opacités cornéennes.

Posologie et mode d'emploi :

1 injection intramusculaire quotidienne pendant 12 jours. Faire trois séries séparées par deux intervalles de 15 à 18 jours.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 23 fr. 90.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

SOLUTION du docteur WATELET

**A l'extrait sec de Quinquina sans alcool
ni sucre.**

Composition. — 0 gr. 50 extrait sec des meilleurs quinquinas sauvages, par cuillerée à soupe.

Propriétés. — Tonique par excellence.

Indications. — Anémie, anorexie, convalescence.

Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe avant les repas.

Enfants : 1 cuillerée à café avant les repas.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires BLANCHOT

15, av. du Parc-Montsouris, PARIS (XIV^e).
(Tél. : Gobelins 03-09.)

SOLUTION HEPATOUM

Composition. — Solution alcalino-glycérinée d'un macéré de plantes fraîches.

Mentha piperita.....	0 gr. 215	Calycantus floridus....	0 gr. 522
Curcuma xamphorisa .	0 gr. 015	Ononis spinosa.....	0 gr. 705
Ocimum basilicum	0 gr. 573	Piscidia erythrina.....	0 gr. 058
Corydalis formosa.....	0 gr. 601		

Eau du bassin de Vichy, Glycérine Codex Q. S. pour 100 grammes.
Atoxique, goût très agréable. Cholagogue complet (cholérétique, cholécystokinétique à action douce). Sédatif. Déplétif.

Indications. — Toutes affections douloureuses ou congestives du foie, de la vésicule biliaire, des reins, de la vessie. La *Solution Hepatoum* est la médication spécifique de la Lithiase biliaire : guérit la colique, élimine le calcul. Par son action décongestive, la *Solution Hepatoum* agit également sur les douleurs menstruelles.

Posologie. — *Adultes* : par verre à madère. *Enfants* : par verre à liqueur. *Crises aiguës* (Coliques hépatiques, néphrétiques, menstruelles) : 1 verre de 5 en 5 minutes jusqu'à l'obtention du calme.

Laboratoire HEPATOUM
150, rue de Paris — PANTIN (Seine).
(Tél. : Botzaris 12-25.)

SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — 1) Anesthésie des muqueuses ou des plaies : cathéters et bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cautérisations, rectoscopie, changement de pansements, etc. ; et, d'une façon générale, tous examens et interventions superficielles d'urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie et soins cliniques. 2) Analgésie des Plaies, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions et excoriations, soit comme médication d'urgence avant l'emploi continu de la pommade, soit comme médication à suivre, dans les cas où l'excipient huileux est plus particulièrement indiqué (certains eczémas rebelles aux pommades, douleurs de la dentition chez les enfants, dents cariées, otites, etc...).

Posologie. — Anesthésie des canaux : instiller quelques cmc. dans le canal quelques minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution. Anesthésie de la vessie : instiller quelques cmc. (dose générale suffisante : 15 à 20 cmc.). Anesthésie des plaies et muqueuses : nettoyer et sécher la région à insensibiliser et la recouvrir de solution par badigeonnage, pulvérisation, aspersion, instillation, mèche ou compresse ; pour obtenir un effet prolongé, maintenir en contact par un pansement. Anesthésie rectale : une cuillerée à entremets introduite avec une poire suivant les besoins. Anesthésie vaginale : tampon vaginal imbibé de solution.

Prix : 16 francs.

Laboratoires P. BAUDE
72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod — Paris.

SOLUTION NORMET

Chirurgicale.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (calcium, sodium, magnésium, fer et manganèse).

Présentations. — Ampoules de 20 cc. (boîte de 2). Ampoules de 10 cc. (boîte de 4).

Indications. — Grandes hémorragies, métrorragies.

Mode d'emploi. — Par injections intraveineuses après dilution de 20 cc. de sérum Normet dans 1 litre de sérum physiologique (chlorure de sodium à 7 p. 1 000).

SOLUTION NORMET

Médicale.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (les mêmes que ci-dessus, mais avec une très faible proportion de manganèse).

Présentations. — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6). Ampoules de 5 cc. (boîte de 12).

Indications. — Anémies graves, hypotension, myocardites, hémophilie, états infectieux.

Mode d'emploi. — En injections hypodermiques, 1 à 15 cc. En goutte à goutte rectal après dilution dans du Sérum physiologique, à raison de 20 cc. par litre de sérum. En injections intraveineuses (non dilué) à raison de 1/2 à 5 cc. et plus, en surveillant la réaction du sujet.

Laboratoires LECLERC S. A.

10, rue Vignon — PARIS.

SOLUTION NORMET SCLÉROLYTIQUE

Composition. — Solution polycitrâtée de composition analogue à la solution Normet médicale, mais sans calcium et un peu plus riche en magnésium.

Propriétés. — La solution attaque par double décomposition les sels de chaux insolubles qui s'accumulent dans l'organisme.

Présentation. — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).

Indications. — La solution Normet Sclérolitique constitue actuellement le traitement le plus sûr de toutes les scléroses organiques et de l'hypertension artérielle.

Mode d'emploi. — Une ampoule (15 cc.) en injection sous-cutanée tous les deux jours, pendant un mois ou deux, puis deux fois par semaine. Abaisser les doses à 10 cc. dès que les résultats cherchés auront été obtenus. Interrompre le traitement un ou deux mois par an.

Laboratoires LECLERC — S. A.
10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition.

Par cuillerée	créosote pure de hêtre.....	0 gr. 10
à potage	chlorhydro-phosphate de chaux.....	0 gr. 50

Action. — A l'action anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydro-phosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : bronchite chronique — rhumes — catarrhes — complications de la grippe — pré-tuberculose — tuberculose — coqueluche.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants au-dessus de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessous de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Mode d'administration. — De préférence avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou gazeuse, de café léger ou de bière.

Prix : 19 fr. 50 le flacon de 350 cc. (6 à 10 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 26-47.)

SOLUTION QUINQUINA BARDET

Solution d'Extraits secs de Quinquinas.

Adoptée par le Ministère des Colonies.

Diplôme d'honneur : Exposition Internationale Paris 1931.

Composition. — Solution, *sans sucre et sans alcool*, contenant 0 gr. 50 de principes actifs par cuillerée à soupe et titrant au minimum 10 p. 100 d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques. — Teneur constante en principes actifs assurant une action rapide et fidèle. Tonique de premier ordre. Fébrifuge à forte dose.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Convalescences ; Lymphatisme.

Pyrexies diverses, Paludisme en particulier.

Mode d'emploi et doses :

Tonique : *Adultes* ; 1 cuillerée à soupe ;
Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, au début des 2 repas principaux.

Fébrifuge : *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe ;
Enfants : 4 à 8 cuillerées à café, par 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et imitations.

Formuler : « SOLUTION QUINQUINA BARDET ».

Laboratoire National de Contrôle 518-5.

Échantillons et Littérature :

LABORATOIRES BARDET

fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

SOLUTION SCHOUM

Du Docteur de Lannoïse.

FOIE, REINS, VESSIE

Composition. — Solution chloroformée et glycéринée d'extraits de plantes décongestives, cholagogues et calmantes (menthe, bugrane, basilic, corydalis, etc.) dans eau minérale naturelle du bassin de Vichy (et non eau bicarbonatée).

Propriétés. — SCHOUM est le spécifique de toutes les affections cellulaires du foie, des reins, de la vessie et de l'utérus comme calmant et décongestif. Il calme en quelques minutes les crises hépatiques, néphrétiques, vésicales ou menstruelles ; il peut même les prévenir.

Décongestif et antitoxique, il donne des *résultats absolus* dans les lithiases biliaires et rénales ainsi que dans leurs complications ; ces résultats sont obtenus par désagrégation, puis dissolution des calculs qui se transforment en sable facilement entraîné.

L'urémie et l'albuminurie de *cause rénale* sont jugulées en quelques jours.

Mode d'emploi. — 6 verres à madère par jour pendant 12 jours, puis descendre à 4 verres pendant 1 semaine. Dans les cas graves ou très anciens, prolonger la dose de 6 verres pendant 15 à 18 jours ; enfin, en cas d'urgence, 1 flacon par jour à raison d'un verre toutes les 2 heures, pendant plusieurs jours.

N. B. — Douée d'une saveur particulièrement agréable, d'une innocuité absolue et garantie, la SOLUTION SCHOUM a donné depuis 40 ans des résultats remarquables ; elle constitue la boisson de choix, « utile et agréable », des fébricitants et des anuriques. C'est enfin le « préventif » recommandé pour l'appareil hépatique des coloniens.

Laboratoire SCHOUM

Maurice PY, Pharmacien de 1^{re} classe,

15, rue de la Sablière — BÉCON-LES-BRUYÈRES
(Seine).

(Tél. Défense 12-33.)

SOLUTION TISCH

Cure hépato-alcaline à domicile.

Composition. — *Solution alcaline à base de sucs de plantes fraîches, reconnues pour leurs vertus cholagogues, hépatiques et stomacales.*

Originalité. — Véritable liqueur très agréable : ne contient ni sucre, ni alcool, ni opium ou dérivé, ni iodure ou composé iodé.

Posologie. — Affections hépatiques et arthritiques : 1 à 6 verres à madère par jour en dehors des repas.

Digestions difficiles : 1 à 2 verres à madère de *Tisch* après les repas copieux.

Indications. — Celles de la cure alcaline : Arthritisme, maladies d'Estomac, du Foie, des Reins, de la Vessie.

Calmant et décongestif dans les Coliques hépatiques, néphrétiques et menstruelles.
Apéritif et digestif.

Présentation. — Grand flacon de plus de 500 cc.

Le « Tisch » est de prescription strictement médicale.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux.

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (Ve).

(Tél. : Gobelins 36-96.)

SOLVURIC

Forme. — Granulé effervescent à base de formine et benzopyruvate de soude et de lithine.

Indications. — Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Prix : 17 fr. 40.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine)
(Tél. : Grésillons 05-21.)

SOMNICONES

Suppositoires hypnotiques, sédatifs et antipasmodiques.

Composition. — Chaque Somnicone contient :

Phényl éthyl barbiturate de soude	0 gr. 20
Scopolamine	1/10 ^e milligr.
Extrait de Valériane	0 gr. 10

Propriétés. — Assurent un sommeil calme, tranquille et réparateur sans mauvais réveil et sans aucun trouble des fonctions digestives. Action lente et progressive. Calmants électifs des centres hypnogènes.

Indications. — Insomnies au cours des affections les plus variées. Affections aiguës, Algies de toutes natures (Sciatique, Douleurs tabétiques, Névralgies), Excitations cérébrales, Douleurs méningées, États neurasthéniques, Préoccupations obsédantes, Nervosisme, Céphalées, Vomissements d'ordre central, Mal de mer, etc.

Posologie. — Un Somnicone en se couchant. Si l'effet semble insuffisant, en introduire deux ensemble ou l'un après l'autre. Dans les affections chroniques, éviter l'accoutumance en suspendant l'emploi pendant 2 jours sur 6.

Formuler : Somnicones. Une boîte.

Prix : 14 francs.

Laboratoire BÉRAL
194, rue de Rivoli — PARIS.

SOMNIFÈNE « ROCHE »

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Étienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloëtta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des D^r Perlis, Vullien, Assoignon, Kindler, Boisnière, Jourdan, Journiac, de Teys-sieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bar-det, etc., etc.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insom-nies simples ou compliquées, Agitation, Délires, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles ner-veux, Épilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE « ROCHE » Gouttes

Flacon de 12 cc.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spé-ciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de *donner à chacun sa dose*, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE « ROCHE » Ampoules

Ampoules de 2 cc. (Boîte de 6).

pour injections intramusculaires.

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.)

Ampoules de 5 cc. (Boîte de 3).

pour injections endoveineuses.

Delirium tremens, Éclampsie, Tétanos, État de mal épileptique, etc.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-36 (*gouttes*), 504-35 (*ampoules*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SOMNOTHYRIL

(Traitement de l'insomnie.)

Composition :

Une pilule =	{ Diéthylmalonylurée.....	0,20 gr.
	{ Analgésine	0,05
	{ Thyroïdine	0,001
	{ Salicylate d'Esérine.....	0,0002

Caractéristiques. — Seuil d'activité thérapeutique fort éloigné du seuil de toxicité.

Pas d'accoutumance, sommeil calme et réveil agréable. Effet secondaire apaisant.

La diéthylmalonylurée arrive à réaliser à doses *réduites* et *atoxiques* un effet hypnotique rapide et sûr, grâce à l'action *sensibilisatrice* de l'ésérine à doses minimales, qui prépare l'état *vagotonique* favorable au sommeil.

Indications thérapeutiques. — Toutes insomnies et particulièrement insomnies rebelles, Anxiété, Excitation psychique et maniaque, Cures de désintoxication, Insomnies de la Ménopause, Insomnies pré et post-opératoires.

En psychiatrie. — Action très nette chez les *mélancoliques anxieux*, *hypocondriaques*, *déprimés* et *psychoneurasthéniques*.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer, ni croquer, avec un demi-verre d'eau ou mieux de tisane chaude le soir au coucher ou 2 heures environ après le repas.

D'une façon générale, prendre le premier soir une pilule. En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à 2 pilules prises au même moment.

En *thérapeutique psychiatrique* (grande agitation), donner 3 pilules d'emblée et essayer par la suite d'abaisser à 2 et 1 pilule.

N. B. — Éviter l'emploi simultané de médicaments tels que la Belladone, etc., qui peuvent contrarier l'action de l'Esérine.

Posologie en deux temps. — Chez certains malades dont l'excitation très rebelle (et non provoquée par un état fébrile) entrave la venue du sommeil, même par hypnotiques, il est souvent indiqué de procéder comme suit :

1° Absorption vers les 5 heures de l'après-midi d'une pilule de SOMNOTHYRIL, qui agit surtout comme *calmant de l'excitation vago-sympathique*.

2° Absorption à l'heure habituelle du coucher d'une seconde pilule de SOMNOTHYRIL.

Tube de 20 pilules pour 12 à 20 jours de traitement.

Prix : 14 francs.

Laboratoires CANTIN
PALAISEAU (Seine-et-Oise).

SONAGAR

Composition :

Association de farine de son et d'agar-agar aromatisée avec essence de légumes.

Propriétés thérapeutiques :

Aliment laxatif doux, Educateur et régulateur de l'intestin avec action nutritive marquée.

Indications :

Paresse intestinale. Spasmes de l'intestin.

Mode d'emploi :

Une cuillerée à bouche tous les soirs dans le potage.

Prix : 15 francs.

SONAMEL

Présenté sous forme de cubes de pain d'épices.

Composition :

Sonamel *adultes* : son, miel, bourdaine désamérisée, faible dose de phénol-phtaléine. Aromatisé à l'anis.

Sonamel *enfants* : son, miel, manne, traces de bourdaine, angélique.

Indications :

Constipation, atonie intestinale, légère insuffisance hépatique.

Mode d'emploi :

Adultes : Un cube, le soir après dîner.

Enfants : Un demi, ou un cube-enfant.

Prix : 13 francs.

Laboratoire MICHELON

Docteur en pharmacie

20, boulevard Heurteloup — TOURS.
(Tél. : 308.)

SONÈNE

Son purifié.

Propriétés. — Action émolliente régulière sur l'intestin.

Indications. — Traitement végétal, préventif et curatif de la constipation.

Mode d'emploi. — Le *Sonène* se présente sous formes de cachets, de poudre et de granulés.

Dose journalière. — 1 à 3 cachets par jour, ou 1 à 3 cuillerées à café de poudre, ou 2 à 6 cuillerées à soupe de granulés.

Boîte de 36 *Cachets*.

Boîte de 100 *Cachets*.

Poudre. — *Granulés*.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

SONÉRYL

Butyl-éthyl-malonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

Indications. — Insomnies de toute nature, même celles qui sont provoquées par la douleur.

Présentation :

Comprimés à 0 g. 10, le tube de 20 : 7 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — Deux comprimés à 10 ctg. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (*adultes*) : 6 comprimés par 24 heures.

SONÉRYL SODÉ

Dragées à 0 g. 15 pour la narcose préparatoire aux anesthésies générales par l'éther (Méthode de Desplas-Launoy, Chevillon.) Ampoules unitaires de 1 g. de poudre pour solution destinée à l'injection intraveineuse (anesthésie de base).

Prix de vente :

Dragées, le flacon : 17 fr. 50 — l'Ampoule : 17 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e). (Tél. : Balzac 22-94.)

SOPORALOSE

Composition. — Chloralose et dérivés cinnamiques.

Propriétés. — Agit comme sédatif à la fois sur le système nerveux encéphalique et sur la moelle.

Provoque un sommeil calme suivi d'un réveil euphorisant.

Atoxique, même aux doses très élevées.

Élimination totale et rapide.

Aucune action sur la circulation, la digestion, la respiration.

Indications. — Toutes insomnies : des surmenés, des nerveux, des intellectuels, des anxieux.

Pas de contre-indication. Peut être prescrit même aux organismes déficients par suite de sa complète inaction sur le cœur, les reins, le foie, l'estomac.

Convient même aux cardiaques, rénaux, hépatiques, dyspeptiques, artério-scléreux, vieillards, tuberculeux, affaiblis.

Posologie. — La dose à prendre varie de 1 à 3 cachets. Dose moyenne : 1 cachet.

Prix. La boîte de 12 cachets : 12 fr. 50.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

SOPORIGÈNE

Composition :

Cachets de butyl-éthyl-malonylurée, dosés à 0 gr. 20 en milieu alcalin.

Action thérapeutique. — Hypnotique, analgésique.

Avantages :

Le moins toxique des hypnotiques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

Indications. — Toutes les insomnies nerveuses et douloureuses.

Mode d'emploi :

1 à 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, une 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Présentation : en boîtes de 10 cachets.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

SORBOCALCION

Sels calciques solubles (saccharate et sucrate) associés au phosphore végétal organique, à la papaine et à la vitamine D cristallisée.

Médication calcique scientifique respectant les données physiologiques modernes sur la digestion, l'assimilation et la fixation du Calcium.

Cachets. — 2 à 3 par jour pendant 15 jours.

Granulé. — *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour aux repas.

Indications. — Troubles calciques, Croissance, Allaitement, Rachitisme, Fractures, Prétuberculose, Hémorragies, Acidose, États neurospasmodiques.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

SOUTENSA

(Traitement pathogénique des hypertensions.)

Composition. — Association de Nitrate de Pilocarpine et de Silicate de Soude.

Propriétés thérapeutiques. — Agit sur le syndrome endocrino-sympathique et parasympathique par l'effet vaso-dilatateur du nitrate de pilocarpine et sur les vaisseaux eux-mêmes et les troubles humoraux par le silicate de soude.

Unit l'action vaso-dilatatrice à l'action cardiotonique.

Indications. — Toutes les hypertensions et particulièrement les hypertensions essentielles, humorales et nerveuses.

Soulagement rapide des troubles des hypertendus.

Préparation pharmaceutique. Posologie. — Pastilles contenant chacune :

Nitrate de Pilocarpine..... 2 mgr. 5

Silicate de Soude..... 30 cgr.

Une pastille matin et soir, un quart d'heure avant les repas. Ne pas dépasser 5 pastilles par 24 heures.

Séries de 8 à 10 jours de traitement séparées par un repos d'une semaine.

Prix, le tube de 20 pastilles : 16 francs.

Laboratoire ARMORIL

7, rue de l'Armorique — PARIS (XV^e). (Suffren 53-70.)

SPARTÉINE HOUDÉ

C¹⁵ H²⁶ N².

Propriétés :

- 1° Toni-cardiaque énergique et progressif. Agit plus rapidement que la digitaline (1/2 heure après l'absorption). Régulateur du rythme cardiaque. Renforce l'impulsion systolique après l'action de la digitale. Pas d'accumulation (POUCHET). Augmente la pression moyenne (SOULA).
- 2° Sur le rein : Diurétique déchlorurant (MERCIER, BALANSARD et SIGAL).
- 3° Action antitoxique et antitoxinique marquée (BILLARD, PERRIN et CUENOT, DUJARRIC DE LA RIVIÈRE).

Indications :

- a. *Cardiaques* : Insuffisances cardiaques au début (dyssystolie et hyposystolie). Préparation à la cure digitalique. Tonique d'entretien après celle-ci. Défaillances myocardiennes des maladies infectieuses (typhoïde, diphtérie, pneumonie). Palpitations nerveuses, arythmies légères, tachycardies, tachyarythmies. Fibrillation auriculaire. Préventif des troubles cardiaques dans la rachianesthésie (RAMOND).
- b. *Rénales* : Rétention chlorurée et œdèmes.
- c. *Générales* : Dans la diphtérie, associée au sérum ou employée seule (Mme FRONTARD). Tétanos. Cure de désintoxication des morphinomanes. Delirium tremens. Intoxications phalloïniques ou par venin de vipère.

Présentation. — Granules à 2 cgr.

Posologie. — 4 à 8 granules par jour en 2 ou 4 fois, avant les repas. Sans toxicité, ces doses peuvent être largement augmentées jusqu'à 12 granules et plus, le maximum étant de 25 à 40 cgr. *pro die*.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

SPARTO-CAMPHRE

Composition. — Solution aqueuse de campho-sulfonates de spartéine (à 5 p. 100) et de sodium (à 15 p. 100,) représentant 1,75 p. 100 de spartéine base.

Propriétés. — Celles du *camphre* et de la *spartéine*. Réalise une véritable synergie médicamenteuse. Les effets thérapeutiques propres du camphre et de la spartéine s'y trouvent associés et renforcés. Action immédiate et prolongée.

Indications — Traitement d'urgence du collapsus cardiaque, des états adynamiques des maladies infectieuses, pneumonies, broncho-pneumonies, typhoïdes, gripes, etc...

Traitement préventif et curatif des accidents cardio-vasculaires des anesthésies générales, locales et de la rachianesthésie, du choc opératoire.

Indiqué également dans tous les états de déséquilibre du système nerveux vago-sympathique.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou de préférence intramusculaires, 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Formes. — Dragées et ampoules de 2 cc. ou de 5 cc.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SPARTOPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 cc. dosées à 3 cgr. d'Éphédrine et 5 cgr. de Spartéine par centicube.

Représentent la meilleure préparation injectable d'Éphédrine pour la pratique courante.

Posologie et mode d'emploi. — Pour injections hypodermiques, musculaires ou veineuses.

1 à 2 centicubes en une fois.

2 à 4 centicubes par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli PARIS. —

SPASA**Comprimés glutinisés.****Présentation.** — En tube d'aluminium de 25 comprimés.**Principes actifs.** — Phényléthylmalonylurée, Extrait de Cratægus, Extrait de jusquiame, Extrait de belladone, Extrait d'anémone.**Indications.** — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Troubles névralgiques et névrosiques, Spasmes, Asthme, Palpitations, Algies, Insomnie, Migraine.**Mode d'emploi.** — 1 comprimé au moment de la douleur. 3 par jour si nécessaire. Ne pas prendre plus de 4 comprimés par 24 heures.**Laboratoires PROBIOS**8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

SPASÉDOL

« Supprime la douleur, lève le spasme »

Composition :

Phénylpropionate de morphine ..	0 gr. 004
Isobutyrate de morphine	0 gr. 004
Bromométhylate d'homatropine..	0 gr. 0015
Chlorhydrate de papavérine.....	0 gr. 040

pour une ampoule injectable d'un centimètre cube
ou un suppositoire (**Suppospasédol**).

Propriétés et avantages. — Le phénylpropionate et l'isobutyrate de morphine ont une *toxicité plus faible* que le chlorhydrate, bien que leur *action soit plus puissante*. Enfin, le bromométhylate d'homatropine et le chlorhydrate de papavérine sont des *spasmodiques remarquablement actifs*.

Le **Spasédol**, qui ne provoque ni nausées ni vomissements et ne diminue pas la diurèse, *doit remplacer la morphine dans toutes les affections douloureuses spasmodiques*.

Indications. — Coliques hépatiques, néphrétiques, saturnines, spasmes viscéraux, vomissements d'origine spasmodique, crises d'asthme rebelles, dyspnées angoissantes, douleurs angineuses, œdème aigu du poulmon, infarctus du myocarde, hypertonie et tranchées utérines, etc...

Posologie. — *Adultes* : une demi ou une ampoule (ou suppositoire), à répéter au besoin 2 ou 3 fois par 24 heures.

Enfants, nourrissons (doses à répéter 2 fois par 24 heures si nécessaire).

De 5 à 15 ans : 1/2 ampoule ou 1/2 suppositoire.

De 3 à 5 ans : 3/10 de cc.

3 ans : 2/10 de cc.

Au-dessous de 1 an : 1/10 de cc.

Boîte de 12 ampoules.

Boîte de 10 suppositoires.

(Le **Suppospasédol** ne fait pas partie du tableau B.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
" **THERAPLIX** "

98, rue de Sèvres - PARIS (VII^e) (Tél.: Ségur 13-10.)

SPASMACOL

(NORMACOL ATROPINÉ)

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alcaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

- 1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du bol intestinal.
- 2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alcaloïde.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Dosage. — 1/4 de mgr. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

Indications. — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

Emploi. — 2 ou 3 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 17 francs.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 08-00.)

SPASMALGINE « ROCHE »

Antispasmodique vrai.

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé ou 1 suppositoire contient :

1 centigramme	PANTOPON « ROCHE » (Opium total injectable).
2 centigrammes	PAPAVÉRINE « ROCHE » (Alcaloïde de l'opium le moins toxique à propriétés spasmolytiques spéciales).
1 milligramme	ATRINAL « ROCHE ». (Ester sulf. d'atropine, sans action sur le centre parasympathique).

Propriétés. — Les *propriétés antagonistes* des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine « Roche »* expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques*, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante- et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyper-excitation, etc.

Doses et modes d'emploi :

Voie buccale	{	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour.
Comprimés (Flacon de 20).		Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
Voie hypodermique ou intramusculaire.	{	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour.
Ampoules (Boîte de 6).		Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.
Voie rectale	{	Dose moyenne : 1 à 2 suppositoires par jour.
Suppositoires (Boîte de 6.)		Dose forte : 2 à 4 suppositoires par jour.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n°s 504-38 (*comprimés*), 504-37 (*ampoules*), 504-67 (*suppositoires*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

SPASMALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée (anti-spasmodique et analgésique).

Diméthylaminoantipyrine (analgésique classique).

Cratægus (sédatif, du système nerveux, cardiaque et vasculaire).

Médicament du spasme par excellence. Sédatif du système nerveux. Analgésique puissant et rapide.

Indications. — *Tous les spasmes* : Laryngite striduleuse, spasme de la glotte, de l'œsophage, Hoquet, Crampes d'estomac, Coliques de toute nature, Règles, douloureuses, Coliques du post-partum, etc..., etc..., Palpitations, Eréthysme cardiaque, Angine de poitrine. *Toutes les algies.*

Présentation. — Le Spasmalone est présenté sous forme de solution concentrée aromatisée, qui se prend dans de l'eau sucrée,

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour (1/2 dosés pour les enfants). Ces doses peuvent être augmentées et même doublées sans inconvénients.

Dans les crises très douloureuses, donner 2 cuillerées à café en une fois.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires du MALONE

J. VINCENT, pharmacien

ANCENIS (Loire-Inférieure). Tél. : 18.

SPASMINE JOLLY

Phytothérapie atoxique des névropathies et des cardiopathies.

Combinaison physiologique stabilisée de Valériane fraîche et d'Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

Le plus actif des hypnotiques doux.

Formes. — Liquide et Comprimés.

Composition :

Intrait de Valériane..... 0 gr. 10

Extrait d'Aubépine..... 0 gr. 10

Par comprimé ou cuillerée à café.

Posologie :

Sédatif : 1 à 2 comprimés ou cuillerées à café matin et soir.

Hypnotique : 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café le soir.

1/2 dose pour les enfants.

Action. — Par l'Aubépine, la Spasmine Jolly exerce sur le sympathique une action inhibitrice qui est prolongée et renforcée par la Valériane ; elle obtient et maintient l'équilibration du système neuro-végétatif et régularise le fonctionnement du muscle cardiaque. Aucune accoutumance. Aucune contre-indication.

Indications. — Angor, anxiété, petits nerveux, émotivité, éréthisme cardiaque, tachycardies, extra-systoles, hypertension, aérophagie, syndromes solaires, spasmes, prurit nerveux, mal de mer, énurésie, etc.

Comprimés : le tube de 30 12 francs.

Élixir : le flacon de 25 cuillerées à café 16 francs.

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine - PARIS (VI^e). (Tél. : Danton 49-39.)

L. N. C. M. 40-1 et 40-7.

SPASMOCALCYL

Spasmolytique Calcique (Boro-Tartro-Iodo-Bromé).

Propriétés Thérapeutiques. — Le plus complet des sédatifs minéraux. Modérateur de l'excitabilité générale et neurotrophique par ses *ions calciques*.

Triplement sédatif. — 1° Par sa molécule *iodée* sur la fonction thyroïdienne; 2° par sa molécule *bromée* sur l'excitabilité nerveuse; 3° par son *borotartrate* sur le cortex et sur l'équilibre acido-basique. Protecteur de la cellule nerveuse par sa *vitamine B*.

Indications. — Médication de choix des états neurotiques, organiques ou fonctionnels, relevant de l'*hypocalcémie* et du *terrain tétanique*. — Hyperexcitabilité neuro-musculaire. — Agitation psycho-motrice, « énervement », « prurit ». — Eréthisme végétatif avec angoisse, anxiété, mélancolie. Spasmophilie viscérale, crampes. Troubles du sommeil : insomnies, agitations, terreurs, et surtout états convulsifs habituels des enfants.

Présentation. — Sirop. — Durée moyenne : 15 jours. — Prix : 20 francs.

Formule. — Une cuillerée à café contient :

Borotartrate de calcium ...	0,20	Iodure de calcium	0,06
Bromure de calcium	0,12	Peptones de levures de Bière (Vit. B.)	

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à dessert 2 à 3 fois par jour.

<i>Enfants</i> :	1	—	café	—
<i>Nourrissons</i> :	1/2	—		—
			Matin, Midi et Soir.	

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.

En dépôt chez tous les grossistes. Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA.

P. CORDONNIER, Pharmacien

52, rue de Cambrai. — LILLE (Nord).

SPASMOFLORINE

Comprimés.

Antispasmodique, Sédatif nerveux.

Formule :

Phényl-Ethyl-Malonylurée	0 gr. 01
Hexaméthylène tétramine	0 gr. 05
Peptone de viande	0 gr. 03
Bromhydrate de quinine	0 gr. 01
Extrait de cratægus	0 gr. 02
Extrait de passiflore	0 gr. 02
Extrait de saule	0 gr. 02
Extrait de boldo	0 gr. 01
Extrait de valériane	0 gr. 01

Pour 1 comprimé.

Indications. — États spasmodiques, Déséquilibre vago-sympathique, Insomnies, Angoisses, Palpitations, Syndromes solaires, Troubles nerveux de la puberté et de la ménopause.

Mode d'emploi. — 1° Comme régulateur du système nerveux : 2 à 6 comprimés par jour, par doses fractionnées au début des repas.

2° Contre l'insomnie : 2 à 4 comprimés le soir.

Présentation. — Tube de 40 comprimés.

Inscrit au L. N. C. M. sous le N° 1244-10.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteurs en Pharmacie et en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}). (Tél. : Cent. 01-35.)

SPASMONAL GROS

Composition. — Papavérine, phényléthylmalonylurée, Diurocalcine.

Propriétés. — Analgésique, antispasmodique et diurétique.

Indications. — Hypertension artérielle. Crises douloureuses angiospasmodiques, Tachycardies, Palpitations, Insomnie nerveuse, Troubles de la ménopause.

Forme. — Dragées.

Doses. — 3 dragées par 24 heures : 1 au réveil, 1 dans le courant de l'après-midi, 1 au coucher. Avaler avec un peu d'eau.

Prix : 15 fr. 60. **Durée moyenne de l'unité :** 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 60-55.)

SPASMONEURAL

Sédatif nerveux utilisant de faibles doses de Phényléthylmalonylurée renforcées par des antispasmodiques végétaux.
(Formule Méglin modifiée.)

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0,02
Extrait de Belladone	0,001
Extrait de Jusquiame.....	0,02
Extrait de Valériane.....	0,06

pour une dragée friable.

Indications :

Spasmes viscéraux, musculaires et vasculaires. Palpitations, Angor, Gastronévroses, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques (asthme, laryngite striduleuse). Tremblements, Artériospasmes, Migraines, Vertiges, Mal de mer.

Nervosisme, Anxiété, Angoisses, Insomnies, Prurits, Neurotonies de la menstruation et de la ménopause.

Syndromes convulsifs, Spasmophilie, Chorée, Tics, Mal comitial.

Posologie :

Enfants : 2 à 10 ans, 1 à 3 par 24 heures (à écraser dans la confiture).

Adultes : 1 à 8 par 24 heures (avalé avec une infusion).

Prix du flacon (50 dragées) : 18 fr. 50.

Laboratoire du SPASMONEURAL

Jean LE COULANT, Pharmacien.

239, cours de l'Yser — BORDEAUX. Tél. : 922-64.

SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.
(Thérapeutique cardio-vasculaire.)

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0 gr. 015
Bromhydrate de quinine	0 gr. 05
Extrait de <i>Cratægus</i> stabilisé ...	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé	glutinisé.

Présentation :

Flacon de 40 comprimés glutinisés.

Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 jours par mois).

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires, en particulier chez les hypertendus (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois).

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

Digibaine, Cardibaine, Théoxanthine, etc.

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

Composition. — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

Indications. — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse ou rhumatismale.

Doses. — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

Cas chroniques : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

Pour les enfants et les vieillards, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Prix : 42 fr. le flacon de 100 cc.

Dépôt général :

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS
(Tél. : Archives 03-92.)

SPÉCIFIQUE ELDÉ

Composition. — Solution stabilisée de Bromoforme et Drosera. Une cuillerée à café renferme : 1 goutte de Bromoforme et 10 cgr. de teinture de Drosera.

Indications. — Toutes les Toux sèches et quinteuses, Coqueluche, Rougeole, Grippe, Trachéites saisonnières.

Posologie. — *De 6 mois à 1 an* : une à deux cuillerées à café au maximum dans une tasse d'infusion de violettes que l'on fera prendre dans les 24 heures.

1 à 2 ans : trois à quatre cuillerées à café par 24 heures.

2 à 5 ans : quatre à huit cuillerées à café par 24 heures.

5 à 10 ans : quatre à huit cuillerées à dessert par 24 heures.

Au-dessus de 10 ans : quatre à huit cuillerées à soupe par 24 heures.

J. BARAIGÉ

Docteur en médecine,

Pharmacien de 1^{re} classe,

24, rue Paul-Bert — PARIS (XI^e).

(Tél. Roquette 21-22.)

SPÉCIFIQUE ET APPAREIL LANCELOT

L'usage de l'*Appareil* et du *Spécifique Lancelot* est une modification avantageuse de l'inhalation de la fumée, des poudres anti-asthmiques.

Le *Spécifique* contient tous les principes actifs de ces poudres, et rend les muqueuses respiratoires moins sensibles aux actions nuisibles extérieures.

Composition :

Nitrite de soude, 12,5 ; Résorcine, 0,125 ; Sulfate d'atropine, 0,10 ; Eau de laurier-cerise, 0,20 ; Sulfate d'hyosciamine, 0,05 ; Chlorhydrate de pilocarpine, 0,20 ; Chlorhydrate de benzoylepseudotropine. Excipient : Q. S. p. 100 grammes.

Indications. — Asthme, Emphysème, Coryzas et Toux spasmodique, Asthme des foin, Séquelles d'intoxication par les gaz.

Mode d'emploi. — Le *Spécifique Lancelot* s'emploie en pulvérisations avec l'*Appareil Lancelot*.

Spécifique : 18 francs le flacon de 20 grammes environ.

Appareil : 50 francs.

Laboratoire LANCELOT

100 ter, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 49-04.)

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

Composition. — Sérum frais hémopoiétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine.

Propriétés thérapeutiques. — Agent d'hémo-poïèse.

Indications. — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques.

Présentation. — Sirop agréable à prendre.

Posologie. — Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude). Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Prix : 19 fr. 25.

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie

9 rue Paul-Baudry, Paris (8^e) — (Tél.: Élysées 40-26).

SPIROCHTAN

Bismuthique à faible dose, hydrosoluble, indolore, associé au Mercure (catalyseur) et à l'Arsenic (antianémiant).

Formule :

Pentanoldioate mét hyloate de bismuth	0 gr. 0333
Oxycyanure de mercure	0 gr. 0003
Arséniate de soude	0 gr. 00134
Eau distillée, Q. S. pour	1 cc.

Ampoule de 1 cc.

Posologie: — Traitement d'attaque : 1 cc. tous les jours. Traitement d'entretien : 1 cc. tous les 4, 5 ou 6 jours.

Avantages. — Cette synergie métallique exalte l'activité du Bismuth grâce à l'action catalytique du mercure, permettant une thérapeutique antiseptique intensive et peu toxique avec de petites doses de Bi. Enfin, l'anémie bismuthique est compensée par l'arsenic agissant ici comme tonique.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Concentration spéciale pour enfants, au 1/5 de la dose pour adultes.

La boîte de 10 ampoules : 16 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél.: Odéon 73-92.)

SPIROGYL

Onguent gingival à base d'Antivirus
fuso-spirochétique.

Pour le traitement des stomatites, gingivites rebelles, pyorrhées alvéolaires graves.

A employer 3 fois par jour en massage des gencives.

Prix : le tube : 9 fr. 35.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Marque de la Biothérapie

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

SPLÉNIQUE (Extrait)

du docteur Bayle.

L'Académie de Médecine a décerné en 1931 le prix Boggio au Dr Bayle pour ses travaux cliniques et expérimentaux, sur l'action de la rate dans la tuberculose.

Tuberculose, Anémies, Déficiences organiques
(voir **COLLOIDOGÉNINE**).

Maladies infectieuses
(voir **POLYVALINE**).

Ces deux produits, préparés selon les indications précises de l'auteur de la méthode, sont **LES SEULS** qui peuvent se réclamer du nom et des travaux du Dr Bayle.

Ils permettent d'appliquer l'opothérapie splénique avec le maximum de résultats.

SPLÉNOCRISINES

Extraits de rate désalbuminés à hautes concentrations.

Forme. — 5 ampoules de 3 cc.

Splénocrisine « 15 » « 30 » et « 60 » correspondant à 15, 30 et 60 grammes de glande fraîche par ampoule.

Splénocrisine « 15 ».....	22 fr. 90
— « 30 ».....	35 fr. 35
— « 60 ».....	52 fr. »

Indications. — Dermatoses rebelles prurigineuses, Asthme, Anaphylaxie, Tuberculoses.

Posologie. — Une ampoule par jour en injection intramusculaire, par série de 10 à 15 injections.

Affections anciennes : débiter à 15 gr.

— récentes : à 30 gr.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

SPLÉNOGASTRINE

Complexe opothérapique gastrosplénique.

La *Splénogastrine* couple en une association judicieusement établie la méthode de Castle et les indications hématopoiétiques de l'opothérapiésplénique (Travaux de l'Ecole de Toulouse sur la rate (Soula), avec la médication cuivro-ferreuse.

Indications. — Toutes les anémies : graves, secondaires (tuberculose, paludisme, rhumatisme, cancer, saturnisme), légères ou moyennes, consécutives aux accouchements, aux interventions chirurgicales, aux hémorragies, aux traitements radiothérapique, bismuthique ou arsénobenzolique.

Présentation. — Sous les deux formes complémentaires suivantes, réunies dans la même boîte et qui doivent être prises concurremment :

1^o Complexe opothérapique gastrosplénique : ampoules buvables de 5 cc.

2^o Pilules de fer et de cuivre.

Posologie. — Dans les anémies graves : 2 ampoules et 4 pilules par jour.

Dans les anémies de moyenne intensité : 1 ampoule et 2 pilules par jour au moment des repas.

Laboratoires des Lipides J. OLIVE, pharmacien.

14, rue des Minimes — PARIS (III^e). Tél. : Archives 03-94.

SPLÉNOMANGANOL

Propriétés thérapeutiques. — Réparateur puissant, reconstituant, reminéralisateur physiologique.

Indications. — Convalescences difficiles, grossesse, allaitement, amaigrissement, rachitisme, bacilloles pulmonaires et osseuses, anémie, neurasthénie.

Formule. — Extrait de vitamine B, fluorure de calcium, extrait de rate, nucléinate de manganèse, os frais pulvérisé, surrénale, foie, moelle osseuse rouge, céréaline, arseniate de strychnine 1/2 mgr.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose et mode d'emploi. — Deux à trois comprimés à chacun des deux principaux repas.

Prix : 21 fr. 30.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 403-4.

Laboratoires HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

SPLENOMEDULLA

Opothérapie Splénique et Médullaire associée.

Indications. — Anémie, Chlorose, Leucémie, Paludisme, Rachitisme, Lymphatisme, Troubles de croissance.

Emploi. — *a.* Par voie gastrique : Extrait fluide ou sirop. Ampoules buvables.

b. Par voie hypodermique : Ampoules injectables pour injections intramusculaires quotidiennes.

Doses :

Adultes : Sirop 2 cuillerées à soupe par jour.

Ampoules buvables 1 tube par jour, matin et soir.

Enfants : Sirop 1 cuillerée à café matin et soir.

Voir la notice pour indications plus détaillées.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon
(ancienne rue de l'Orne) — PARIS (XV^e).
Tél. : Vaugirard 16-11.

SPLÉNYL

(Vitaminé.)

Composition. — Le SPLÉNYL est un reconstituant général à base de : rate, foie, muqueuse gastrique, surrénale, acides aminés et vitamines B ; sa formule, rigoureusement étudiée, en fait une médication réellement active et que son prix de vente très bas rend accessible à tous les malades.

Indications thérapeutiques. — Le SPLÉNYL est le type du reconstituant général, indiqué dans toutes les Anémies, Convalescences, la Tuberculose, l'Epuisement, l'Amaigrissement, les Maladies par carence, etc...

Présentation et posologie. — Le SPLÉNYL est vendu sous deux formes : *Ampoules ingérables* de SPLÉNYL de 5 cc. (boîtes de 6, 12 et 30 ampoules) et *Sirop de Splényl* (flacon de 190 cc.).

Adultes : 2 à 4 ampoules ou 2 à 4 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules ou 1 à 2 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Prix : *Sirop* : 22 fr. 90.

Ampoules. Boîtes de 6 : 13 fr. 55 ; boîte de 12 : 23 fr. 95 ;

boîte de 30 : 58 fr. 25.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

SPYROLIDES

Composition. — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, méthylbenzénols, tanin, perborate de sodium (oxygène naissant).

Présentation. — Dernier mot de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques. Emploi commode et discret : dissolution complète et instantanée ; ni caustiques, ni irritants, ni toxiques. Désodorisants, décongestionnants, antiseptiques. Ne tachent pas. Parfum agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact de l'eau, les *Spyrolides* produisent instantanément un vif dégagement d'oxygène, donnant une solution puissamment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses, favorisant au contraire leur rapide régénération et assurant la défense de leur vitalité.

Mode d'emploi. — Un ou 2 comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou biquotidienne de propreté et d'hygiène.

A titre curatif : 2 à 3 comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrites, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau *Spyrolidée* par 1 ou 2 comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des paisselles, des pieds, etc.).

Prescrire : *Spyrolides* : 1 tube (faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer).

Tube de 28 comprimés : Prix : 10 francs

Échantillons et Littérature :

Laboratoires du D^r NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS (Tél. : Louvre 35-36.)

STADRHINE

Anciennement Stovoléine.

Baume nasal aseptique, vaso-constricteur, anesthésique, non toxique, non caustique.

Composition. — Acide borique, Stovaïne, Solution d'Adrénaline à 1/1000, Essence de Géranium rosat.

Propriétés. — Lubrifie, décongestionne et lénifie la muqueuse nasale.

Indications. — Effet incontestable et rapide dans tous les cas de rhinite aiguë spasmodique. Souveraine dans le coryza chez l'adulte et chez l'enfant. Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Après avoir mouché l'une et l'autre narine alternativement, gros comme un petit pois dans chaque narine, 3 fois par jour.

Présentation. — Tube d'étain avec olive nasale.

Prix : 8 fr. 55.

L. N. C. 314-36.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 14-14.)

STAL-KOSAL

« La poudre qui calme ».

Coréine bismuthée.

Pansement gastro-intestinal.

Poudre et tablettes.

Formule. — Coréine (mucilage pur) et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au Co²Ca.

Indications. — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum.

Mode d'emploi :

Poudre : Une cuillerée à soupe *bien délayée* dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

Tablettes : dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

Prix : 22 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

(Tél. : Auteuil 11-86.)

STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique.

Indications. — Furunculose, anthrax, acné, ostéomyélites, zona et toutes affections d'origine staphylococcique.

Double supériorité : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

Formes : Buccale, *la plus pratique* (10 ampoules de 3 cc.). Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.

Injectable, *la plus rapide et la plus sûre*. Une ampoule de 1 cc. par jour.

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules, 26 fr. 75. — 5 ampoules, 14 fr.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

STANION

Description. — Étain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage glutinisé (50 capsules par flacon).

Ampoules ; contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies, où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculite, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Prix : Ampoules : 34 fr. 30 pour 2 à 4 jours de traitement.

Capsules : 28 fr. 60 pour 5 à 12 jours de traitement. A. S. C.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

STANNOBARDANE HENRY

1. *Étain* sous forme de *Peptonate* produit les effets suivants :

- 1° Soulage la douleur dès le début du traitement ;
 - 2° Arrête la marche de l'inflammation, fluidifie le pus et fait résorber le bourbillon sans qu'il soit besoin d'exercer une pression.
 - 3° Produit rapidement la guérison ;
 - 4° Empêche la formation de nouveaux foyers.
- Il existe deux préparations à base de *Peptonate d'étain* :

1° Le **Stanno-Bardane Henry** (*Peptonate d'étain* + Extrait de Bardane stabilisée) ;
Le *Stanno-Bardane Henry* est présenté sous deux formes :

A. *Stanno-Bardane-gouttes* (LX gouttes répondant à 0 gr. 018 d'étain pur).

Doses. — LX gouttes à 1 cuillerée à café 3 fois par jour dans un liquide. Le flacon : 16 fr. 50. Traitement : 5 jours.

B. *Stanno-Bardane-pilules* (chaque pilule répondant à 0 gr. 015 d'étain pur).

Doses. — 3 pilules par jour. Le flacon : 19 francs pour un traitement de 15 jours.

2° Le **Peptonate d'Étain Henry** (solution sans Extrait de Bardane permettant un traitement *interne* et *externe*. Dosage en étain pur : 0 gr. 015 par XX gouttes).

Doses. — De XX à XL gouttes 3 fois par jour. Le flacon : 18 francs pour 10 jours.

En *lavages*, employer 1 cuillerée à café pour 100 gr. d'eau distillée, l'eau ordinaire provoquant un précipité.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÈGE.

STANNO-SUFROL CROSNIER

Composition :

Étain, Oxyde d'étain, Soufre actif, Bardane stabilisée, Extrait splénique.

Indications :

Furonculose et Affections à staphylocoques.

Posologie :

2 à 3 comprimés et plus à chaque principal repas.

Prix : 10 fr. 70 la boîte de 40 comprimés.

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS
(Tél.: Avron 35-04.)

STANNOXYL

Composition. — Oxyde d'étain et étain métallique absolument purs (d'après les travaux de Frouin).

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoques, Acné, Anthrax, Abscess du sein chez les nourrices, etc.

Propriétés. — Traitement pratique et rapide : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Formes. — Pour l'usage interne : comprimés, cachets, ampoules. Pour l'usage externe : liquide, pommade.

Posologie. — Comprimés : 4 à 8 par jour.

Autres formes. — Suivant indications du médecin.

Prix : Comprimés : 19 fr. 50 ; Ampoules : 29 francs
Cachets : 22 francs ; Liquide : 23 francs ; Pommade 18 francs.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylococcique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + *anatoxine*.

Indications. — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et *infections rebelles* à Staphylocoques. Zona.

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Les 6 ampoules. Prix : 32 francs.

Littérature et échantillons :

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS.
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes.)

STAPHYLASE du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

Prix : 23 fr. 50 le flacon de 300 gr.

Laboratoires **LEBEAULT**

BESINS et Cie, pharmaciens

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

Propriétés thérapeutiques. — Agent de la phagocytose. Abaisse la glycémie.

Indications. — Furonculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses, Diabète, Acidose.

Doses et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— : 4 à 10 comprimés —

Enfants : Moitié de ces doses au moins suivant l'âge.

Prix au public :

Solution : 17 fr. 65. Comprimés : 17 francs.

Autorisé par les *Assurances sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS (Tél. : Trinité 29-29.)

STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications thérapeutiques. — Toutes les staphylococcies : Furoncles, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

Posologie et Présentation :

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules 18 fr. 45.

Boîte de 10 suppositoires 18 fr. 45.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules 13 fr. 35.

Boîte de 10 suppositoires..... 15 fr. 40.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

STAPHYLO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Staphylocoques.

Indications. — Furunculose, Anthrax, Abscess et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

STREPTO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Streptocoques hémolytiques.

Indications. — Erysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, grandes infections à Streptocoques.

Posologie. — Les lysats vaccins s'emploient à la dose de 1/2 cc. pour la première injection, les suivantes à 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 27 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

STAPROLYSAT

Vaccin neurotrope.

Indications. — Tous les accidents du système nerveux, central ou périphérique auxquels on attribue une origine infectieuse. Séquelles des staphylococcies.

Névrites, Polynévrites, Névralgies, Névraxies, Radiculites, Myélites, Encéphalite et ses séquelles, Sclérose en plaque, Tabès, Parkinson, Herpès, Zona. Ulcères gastriques et duodénaux.

Composition. — Autolysat neurotrope de *Staphylocoque* et de *B. Prodigiosus*.

Forme. — Ampoules de 1 cc., à doses progressivement croissantes divisées en quatre séries.

Série I. — 6 ampoules numérotées de Dose 1 à Dose 6, dosées de 0 cc. 02 à 0 cc. 75 d'autolysat neurotrope.

Série II. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1, d'autolysat neurotrope.

Série III. — 6 ampoules semblables, dosées 0 cc. 2 d'autolysat neurotrope.

Série P. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1 d'autolysat renforcé par 5 milliards de corps microbiens pyocyaniques.

Mode d'emploi. — Une injection *intramusculaire* tous les 2 ou 3 jours. Injecter en tous cas, sans arrêt, les 3 premières séries et *au besoin* la série P.

Dans les cas aigus, difficiles ou rebelles, on choisira les injections *intramusculaires* de série P (sans passer par les premières séries) ou les injections *intraveineuses* prudentes de séries I et II. Associer le traitement iodé. (Nous demander renseignements et voir Iodassium.)

Les trois premières séries sont en général indolores et apyrétiques. La série P employée dès le début provoque une réaction fébrile légère (38° à 39°).

Les trois premières séries : 30 francs l'une.

Série P : 35 francs.

Nota. — En prescrivant, bien spécifier la série demandée et rappeler :

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

STAVAFAER

(Ancienne dénomination **STOVAFER**)

Granulé

Médication reconstituante à base d'acide oxyacétylamino-phénylarsinique, Fer, Mg, Soude, Chaux, Manganèse.

1 cuillerée à café contient 0,05 d'acide oxyacétyl amino-phénylarsinique.

Indications. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Maladies infectieuses et parasitaires.

Mode d'emploi. — *Enfants*, à partir de 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix de vente : 20 fr. 80.

Laboratoires RICHER

Docteur en pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien
PARIS (Tél. : Provence 34-87.)

STÉAROL

Antiseptique général.

NEUTRE

STÉRILISE

Détruit tous germes Pathogènes, respecte la cellule vivante.

Action triple : *Détergène, Antiseptique, Cicatrisante.*

Composition. — Complexe de savon liquide neutre stérilisé, très fluide, avec présence de *formol* et d'essences aromatiques déterpenées parmi lesquelles *thym* et *lavande*. (PH = 7.)

Indications :

Plaies de brûlures : Employer pur, pouvoir analgésique puissant.

Plaies vives : Solution au 1/10 en lavages et compresses.

Plaies atones : solution à 50 p. 100 en lavages et compresses.

Soins gynécologiques : *Accouchement, métrites*. Emploi de la solution : 1 cuillerée à bouche par litre d'eau bouillie, en injections et savonnages externes. Désinfection vulvaire.

Constipation, traitement des oxyures : Lavements avec la solution, 1 cuillerée à bouche par litre d'eau bouillie.

Prurits, Acné, Furunculose : Solution au 1/10 en lavages et compresses.

Lavage des oreilles : Brossage des *dents*, *Gargarismes* : Solution au 1/10. Désinfection des mains et des régions pileuses par savonnage avec une solution étendue sans irritation consécutive.

Prix. Petit modèle : 9 francs. Grand modèle : 15 francs.

Laboratoires du STÉAROL

5, rue Émile-Combes — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

STENIC

Forme. — Ampoules buvables.

Composition. — Extrait désalbuminé de rate, chlorure de Magnésium et de Manganèse, acide phosphorique, sérum de Mouton et de Cheval.

Indications. — Anémies, Prétuberculose, Tonique général, Amaigrissement, Convalescence.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 ampoules par jour dans un peu d'eau ou de vin avant ou après les repas.

Enfants : 1 ampoule par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 882-7.

A. COUSIN

Pharmacien de 1^{re} classe.

ESTISSAC (Aube).

STÉRAMINE

Crème antiseptique hydrosoluble.

Composition. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Échantillons médicaux sur demande.

Laboratoire Pharmaceutique.

DAUFRESNE

42, rue Thiers — LE HAVRE.

STERANDRYL

Propionate de testostérone.

Composition. — Ether sel de l'hormone testiculaire cristallisée, obtenue synthétiquement.

Forme. — Le *Sterandryl* est une solution huileuse de propionate de testostérone.

a. Boîte de 2 ampoules 1 cc., 25 mgr.

b. Boîte de 5 ampoules 1 cc., 10 mgr.

c. Boîte de 4 ampoules 1 cc., 5 mgr.

Indications. — Hypertrophie prostatique au début. Hypertrophie prostatique avec rétention incomplète ou rétention complète par crise. Castrés chirurgicaux ou fonctionnels. Insuffisants génitaux. Asthénies. Retards puberté. Syndrome adiposo-génital.

Posologie. — On variera la posologie suivant les cas à traiter en se basant sur les directives puisées dans la littérature du *Sterandryl*.

(Voir *Acéto-Sterandryl*.)

Prix au public : Boîte de 5 amp. 1 cc. 10 mgrs. 75 fr.

— 4 amp. 1 cc. 5 mgrs. 45 fr.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

STÉROGYL

Solution huileuse de Vitamine D cristallisée, chimiquement pure : substance inaltérable dénuée de toute toxicité et dont l'action est constante.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antirachitique, le *Stérogyl* est le traitement de toutes les décalcifications. La Vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue ; elle la remplace dans toutes ses indications.

Indications thérapeutiques. — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates : les états ganglionnaires, les anémies pré-tuberculeuses et gravidiques, la carie dentaire. Facilite la consolidation des fractures.

Présentation. — Flacon de 10 cc. contenant 5 milligrammes de Vitamine D (X gouttes : 0 gr. 0002).

La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif, même chez les nourrissons les plus fragiles.

Posologie. — Jusqu'à 1 an : X gouttes par jour ; de 1 à 10 ans : X XX gouttes ; au delà de 10 ans et chez l'adulte : XX à XXX gouttes.

Prix au public : le flacon 18 fr. 70.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.)

STHÉNOBIOSE

Élixir à base de Vin de Muscat (goût très agréable).

Composition. — Nucléinate de soude, Méthylarsinate de soude, Sulfate de strychnine, Glycérophosphates de soude, Potasse, Magnésium, Manganèse, *Vin de Muscat*.

Indications. — Anémie, Débilité, Anorexie, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences.

Posologie :

Enfants : 1/2 verre à liqueur, au début des repas.

Adultes : 1 verre à liqueur, au début des repas.

Contenance : 500 cc.

Prix : 22 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire national du contrôle des médicaments.

Laboratoires de la REXACARBINE
LAVIT (Tarn-et-Garonne).

STHÉNOXAL

Médication réparatrice et reconstituante, en comprimés dragéifiés. Fer et Arsenic organiques, Kola ; Strychnos.

Indications. — Syndromes d'hypovitalité générale. Insuffisances, appauvrissements et affaiblissements organiques. Grossesse, allaitement, vieillesse. Anémies, chlorose, hérédité. Déchéances progressives. Convalescences. Intoxications et toxi-infections.

Emploi et doses :

Adultes : 3 comprimés par jour au total, aux repas ; avaler sans croquer.

Vieillards : 2 comprimés par jour.

Enfants : A partir de 6 ans : 1 comprimé par jour ;
de 10 à 15 ans : 1 ou 2 comprimés par jour ;
de 15 à 18 ans : 2 comprimés par jour.

Prix : 17 francs.

Durée moyenne 15 à 20 jours.

Echantillons grandeur normale sur demande :

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique
appliquées**

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

STILLARGOL

Solution de protéinate d'argent convenable, aux concentrations de 1, 2, 5, 10 p. 100.

Antiseptique puissant, ne donnant pas sur le linge de taches indélébiles comme le nitrate d'argent. Son emploi, qui a été étendu aux cas les plus variés de la pratique médicale et chirurgicale, ne donne des résultats satisfaisants que si le protéinate d'argent est très pur.

Présentation. — En flacons compte-gouttes M.S. à pointe mousse de 30 cc. D'où les avantages suivants :

1° *Commodité* : Point n'est besoin de couper les pointes du flacon.

2° *Sécurité* : Aucun risque de blesser le patient par les petites aspérités résultant d'une ouverture défectueuse de la pointe.

Usages. — *Oculistique* : Désinfection de l'œil, quelques gouttes, 2 ou 3 fois par jour de STILLARGOL à 2, 5, 10 p. 100, suivant les cas : Conjonctivites, Blepharites.

Obstétrique : Désinfection des yeux du nouveau-né, avec 2 gouttes de STILLARGOL à 1 ou 2 p. 100.

Rhino-pharyngologie : Coryza, Rhinites, Sinusites, etc., STILLARGOL à 1, 2 ou 5 p. 100.

Affections de l'oreille : STILLARGOL à 5 ou 10 p. 100.

Pédiatrie : Désinfection nasale, oculaire et auriculaire.

Prix : 1 %, 2 % : 14 fr. 40. — Prix : 5 %, 10 % : 15 fr. 50.
20 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12.

LE MARINEL, pharmacien
4, avenue Orban — BRUXELLES

STIMULAXINE

Stimule le foie, relaxe l'intestin.

Cholagogue et laxatif doux.

Indications. — Insuffisance hépato-biliaire, cholécystites, lithiase, entérocélite, constipation chronique, dermatoses, hémorroïdes.

Composition. — Extraits végétaux, cholagogues et cholérétiques, adjuvants du péristaltisme intestinal : curcuma xanthorriza, boldo, artichaut, podophyllin, rhamnus pursh.

Extraits opothérapiques : bile desséchée et dépigmentée, poudre de glandes intestinales.

Antiseptiques : ferments lactiques.

Antispasmodique : extrait de belladone.

Posologie. — De 1 à 6 dragées par jour, selon les indications du médecin traitant. Demi-dose pour les enfants. La boîte contient soixante dragées, soit en moyenne un traitement de trois à cinq semaines.

Inscrite au Laboratoire National de Contrôle, donc remboursable aux assurés sociaux.

LABORATOIRES BARTIER

ARMENTIÈRES (Nord).

(Tél. : 254.)

STINERGYX

Complexe Bio-Chimique.

Médicament type des fatigués et surmenés intellectuels.

Composition. — Extrait surrénal, androïque, cérébral, Thyroïde; Manganèse, Acide Phosphorique.

Indications. — Asthénie, Fatigue Générale, Fatigue cérébrale, Surmenage, Paresse intellectuelle, Nonchalance, Apathie, Lenteur psychique, Distraction, Inattention.

Propriété. — Tonifie la cellule nerveuse, élève le rendement intellectuel. Combat toutes les formes du surmenage physique.

Présentation. — Comprimés.

Posologie :

Enfants : 1 à 3 comprimés (avaler ou écraser).

Adultes : 2 à 4 comprimés (avaler).

De préférence 1/2 heure avant les repas.

Laboratoire THERINEX

R. CONDY, Pharmacien,

6, rue de Dunkerque — PARIS (X^e).

Enregistré au L. N. C. Admis aux Assurances sociales.

STOMAROL

**Estomac de porc desséché et délipéïdé
(Méthode de Castle.)**

Composition. — Le Stomarol est un Extrait d'estomac de porc desséché et délipéïdé selon un procédé spécial qui permet de conserver intégralement au produit les ferments résolutifs de la viande tels qu'ils se trouvent dans un estomac normal.

Présentation. — Forme poudre, insoluble, sans mauvais goût, dont :

16 gr. 50 représentent 100 gr. estomac frais de porc.

Indications. — Le Stomarol est recommandé dans tous les cas d'insuffisance gastrique et particulièrement dans l'anémie pernicieuse accompagnée d'achylie.

Posologie:

Adultes : 20 à 30 gr. par jour (2 à 3 cuillerées à soupe).

Enfants : 10 à 15 gr. par jour (2 à 3 cuillerées à dessert).

Mode d'emploi. — A prendre au début des repas délayé dans : potage, lait, purée de légumes, confiture, etc.

Prix : 32 francs.

Laboratoire Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren. 67-73, 74.)

STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

Propriétés thérapeutiques. — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique* par le Kaolin.

Antiseptique : par le Carbonate de bismuth.

Absorbant : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

Sédatif : par le bromure de sodium, la belladone, la codéine.

Musculopoiétique : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

Reconstituant : par le phosphate tricalcique et la strychnine (*noix vomique*) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

Indications. — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

Présentation et mode d'emploi. — *Poudre* : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 17 francs.

Laboratoires CLAVERIE

Place Carnot — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Botzaris 10-10.)

STOPRAL

Analgésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement atoxique. Formule établie pour adultes seulement.

Comprimés à avaler ou à déliter dans l'eau auparavant.

Indications. — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme.

Névralgies.

Règles douloureuses, spasmes douloureux.

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives.

Exerce sur le cœur une action tonique.

Agit rapidement.

Ne présente pas de contre-indication.

Doses. — Pour adultes seulement :

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et constitue la dose maxima.

Prix : 13 francs.

Échantillon grandeur normale sur demande (15 comprimés).

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

STOVARSOL

Acide 4-oxy-3-acétylamino-phényl-1-arsinique.

Forte teneur en arsenic (27,2 p. 100). S'administre par la voie buccale.

Indications. — Traitement des diarrhées toxi-infectieuses, cryptogénétiques, parasitaires et des tuberculeux. Amibiase, Lambliose, Spirochétoses intestinales, Syphilis, Pian.

Présentations :

<i>Comprimés</i> à 0 g. 25. Le flacon de 15	13 fr. 50
<i>Comprimés</i> à 0 g. 25. Le flacon de 30	23 fr. 50
<i>Comprimés</i> à 0 g. 05. Le flacon de 70	13 fr. 50
<i>Comprimés</i> à 0 g. 01. Le flacon de 200	11 fr. 40

Posologie et mode d'emploi :

Doses moyennes. — *Adultes* : 50 ctg. à 1 g. par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 ctg. par 24 heures et par kilogramme de poids.

Le *Stovarsol sodique*, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

STOVÉDRINE

Pommade. Solution.

Pommade nasale atoxique.

Formule normale :

Stovocaïne	6	p. 100
Ephédrine (Chlorh.)	5	p. 100

Formule B. B. déconcentrée :

Stovocaïne.....	1,50	p. 100
Ephédrine (Chlorh.).....	1,25	p. 100

Solution aqueuse pour pulvérisations :

Formule :

Stovocaïne.....	5	p. 100
Ephédrine (Chlorh.).....	5	p. 100
Chlorétone	1	p. 100

La *Stovédrine* est une association de Stovocaïne (Chlorhydrate d'Amyléine) et d'Ephédrine *naturelle* à un taux de concentration indispensable pour combattre efficacement les affections aiguës et chroniques de la pituitaire.

Indications. — Coryza, Sinusite, Céphalées, Obstruction nasale, Asthme, Rhume des Foins.

Posologie. — *Pommade*: Introduire gros comme un pois dans chaque narine. Masser pour répartir la pommade.

Solution: Pulvériser à une ou deux reprises, 3 fois par jour, dans chaque narine, la solution de *Stovédrine*.

Prix :

Pommade	14 fr. 50
Solution avec pulvérisateur	26 fr.
Solution (flacon rechange).....	17 fr. 50
La <i>Stovédrine</i> sous toutes ses présentations est remboursable aux Assurés sociaux.	

Laboratoires LICARDY

38, bould Bourdon, NEUILLY-SUR-SEINE
(Tél. : Maillot 17-75.)

STRAGOL MERLET

Aromaticothérapie.

Composition. — Association d'huiles essentielles rigoureusement pures et naturelles, sélectionnées pour leur action stimulante, désinfectante, digestive, carminative et même cicatrisante.

Indications. — Aérophagie, dyspepsie, hoquet.

Mode d'emploi :

Gouttes : V à X gouttes sur un morceau de sucre. Ne pas omettre d'agiter avant usage.

Non toxique.

Pastilles : 1 pastille correspond à une goutte.

Laboratoire MERLET

24, bd Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Molitor 03-91.)

STREPTODERME

N'est pas une pommade-vaccin.

Traitement des Strepto-staphylococcies cutanées.

Formule. — Résorcine, Ac. salicylique, Oxyde jaune, Ichtyol du Tyrol, Oxyde de zinc, Talc.

Excipient gras enlevable à l'eau.

Indications. — Après lavage avec le Microderme, **Solution au 1/20**, appliquer le STREPTODERME sur les Pyodermites, Eczéma impétiginé, Dermoépidermites streptostaphylococciques, Parakératoses, Eczématides microbiennes, Intertrigo, Lichénification infectieuse, Dysidrose streptococcique et même mycosique, Ulcère de jambe, furoncles, etc...

Contre-indication. — Ne pas associer le Streptoderme à une médication iodée externe (formation de HgI²).

Prix du tube de 70 gr. : 14 francs.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-51.)

STRONGÉNOL

Du Docteur Moity

Granulé soluble basé sur des notions de conception nouvelle.

1° Action anti-anémique des *proto-sels de fer* assurée par des traces de sels de cuivre.

2° Augmentation de l'acidité chlorhydrique stomacale par cation électif. Développement de propriétés anti-anémiques par cet acide.

3° Absorption intégrale du *phosphate de calcium colloïdal naissant* et de son *phosphore* en présence d'un sel alcalin à radical organique. Rétention tissulaire catalysée par la *vitamine D*.

Indications. — Anémies pernicieuses, Troubles de la croissance et de la minéralisation, Rachitisme, Caries Dentaires, Hypocalcémie, Tuberculose, Faiblesse, Surmenage, Phosphaturie, Convalescence, Fractures. Grossesse, Allaitement, Neurasthénie, Splénectomie, Traitement préliminaire aux interventions chirurgicales.

Posologie. — *Nourrissons et enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adolescents : 1 à 3 cuillerées à dessert.

Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe.

Prix de la boîte : 18 fr. 65, 170 gr.

Triple boîte : 46 fr. 80 (économie de 8 fr.), 510 gr.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux. Diffusion strictement médicale.

Laboratoire du D^r J.-O. MOITY

D^r en médecine. D^r en pharmacie, ex-interne des hôpitaux de Paris, 199, boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE.

STRONTIODE

Le *Strontiode* est une préparation nouvelle, dans laquelle nous avons associé la médication iodée et la médication silicique, en y adjoignant un élément synergique : l'Ion Strontium.

Nous avons pu réaliser une suspension colloïdale stable d'acide silicique d'une très grande dispersion, et par suite facilement assimilable par l'organisme.

Formule :

Acide Silicique Colloïdal.....	1 gr. »
Acide Phosphorique.....	0 gr. 30
Chlorure de Sodium.....	1 gr. 20
Iodure de Sodium.....	7 gr. 50
Iodure de Strontium.....	0 gr. 50
Véhicule Q. S. pour.....	100 gr.

Deux gouttes de *Strontiode* correspondent à 0.001 d'acide silicique colloïdal, et 0.008 d'iode combiné.

Indications : Artériosclérose et ses suites.

Hypertension, Troubles cardiaques, Aortite, Angines de poitrine, Troubles cérébraux (Vertiges, Angoisses, Céphalées ; Insomnies, Diminution de la mémoire), Troubles auriculaires (Bourdonnements d'oreille, Surdité, Paresse auditive), Troubles oculaires (Mouches volantes, Affaiblissement de la vue), Troubles de la circulation en général et en particulier troubles de la ménopause, maladie de Raynaud, etc...

Posologie : VI gouttes 3 fois par jour, après les principaux repas, dans un peu d'eau pendant six semaines, repos de 15 jours et reprendre la cure 4 semaines.

Laboratoires de l'ATOSPIRINE et du STRONTIODE
19, rue du Bac — PARIS.

STROPHANTINE CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée
extraite de *Strophantus gratus*.

Synonyme : **Ouabaïne.**

Indications. — Affections mitrales, Dyspnée, Oppression, Œdèmes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, Lésions cardiaco-aortiques. Artériosclérose avec ou sans néphrites.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

Le flacon de 50 granules.

STROPHANTUS CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,001 Extrait titré de *Strophantus*.

Indications. — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique*.

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Le flacon de 50 granules.

Prix de l'Académie de médecine.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin — PARIS.

STRY-CALCIUM AGUETTANT

Nom nouveau du

STRY-CAL AGUETTANT

Première association stable de *Strychnine* et *Gluconate de Calcium*.

Tolérance parfaite de la *Strychnine*.

Indication. — Tonique musculaire et recalcifiant par l'action stimulante de la *Strychnine* et les propriétés de l'ion Calcium assimilable.

Action. — Evite sûrement les effets souvent violents de la *Strychnine*, ne surmène pas le foie. Le *Stry-Calcium* est donc sans danger pour les distoniques sympathiques, nerveux, convalescents, déprimés, particulièrement faibles et sensibles, souvent hépatiques.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour. Commencer par une demi-ampoule.

Forme. — Ampoules injectables (2 cc. = 0,002 de *Strychnine*, et 0,20 de *Gluconate*). Conditionnements et prix spéciaux aux hôpitaux.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON (Rhône).

(Tél. : Franklin 24-63.)

STRYCHNAL

Sulfate d'éthylbétaine de l'acide *Strychnique*, 10 fois moins toxique que la *Strychnine*.

Asthénie, Anémie, Anorexie, Paralysies post-diphthériques, Névrites, Surmenage, Paralysie du nerf optique.

Granules à 0,01, 2 à 4 par jour (flacon de 50 : 17 fr.).

Ampoules à 0,01, 1 à 2 par jour (boîte de 12 : 20 fr.).

Gouttes (Phospho-Strychnal : association Strychnal, 0,005 ; acide phosphorique, 0,15 ; Glycérophosphates, 0,24 pour XX gouttes), XL à LX gouttes par jour : 16 fr. 50.

Arsi-Strychnal (Strychnal et cacodylate), 1 à 2 par jour : 20 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI°).

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable.

Glycérphosphate de soude, nucléinate de soude et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 2 cc.
par 24 heures.

Indications.

Coup de fouet à l'organisme, Asthénie, Convalescence.

Prix : 19 fr. 75.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.
(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

STRYCHNOPHYL

Gouttes Strychno-Phosphatées-Magnésiennes.

Acide phosphorique ; Phosphate disodique ; Chlorure de Magnésium ; Sulfate de Strychnine, 1 milligramme par dose de XXX gouttes.

Indications. — Toutes Asthénies, Surmenage, Neurasthénie, Atonies Gastro-intestinales, Dépression, Convalescence des maladies infectieuses, Arthritisme, Alcalose, Etats pré-néoplasiques, etc...

Doses et mode d'emploi. — Sauf indications contraires du médecin :

Adultes : XXX gouttes dans un peu d'eau au début ou au cours des repas de midi et du soir.

Enfants : demi-doses.

Présentation. — Flacon pour 15 jours de traitement :

Prix : 14 fr. 50.

Dans les cas où la Strychnine est contre-indiquée, prescrire :

STHÉNOPHOS

Gouttes Phosphatées-Magnésiennes.

Même composition sans Strychnine, mêmes doses.

Laboratoires CREUZÉ

74, rue de Lourmel — PARIS (XV°).
(Tél. : Vaug. 30-05.)

STRYCHNOTONINE

Composition. — Une dragée =
0,7 gr. 0030 de méthylarsinate de calcium.
0 gr. 0005 de chlorhydrate de strychnine.

Action. — Tonique général et nervin, accélérateur de la nutrition, léger stomachique.

Indications. — Asthénie nerveuse, neurasthénie essentielle, psychasthénie, pithiatisme, mélancolie, anémies, convalescences, énurésies nocturnes infantiles.

Posologie. — 1 à 3 dragées 3 fois par jour avant les repas.

Présentation. — Flacon de 75 dragées.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien

25, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

SUBTENSÈNE

Les pilules *Subtensène* constituent une association judicieuse de médicaments d'origine végétale sélectionnés, chacun d'eux ayant déjà fait ses preuves, mais mélangés à des doses très étudiées afin d'obtenir de chaque composant une action optima.

Résine de scammonée : Suc concret extrait de la racine du « convolcus scammonine » contenant un glucose, la scammonine, isomère de la jalapine. La résine de scammonée de bonne origine doit contenir environ 70 % de ce glucose.

Scille : « *Urginea scilla* » (Liliacées) contenant de la scillotoxine, de la scillipicrine, de la saposcilline et de la scilline.

Cupressus : Cette plante contient un alcaloïde très actif, la cupressine mélangé à plusieurs glucoses.

Berberis : « *Berberis vulgaris* » (épine vinette). Les baies oblongues rouges sont employées. L'alcaloïde est la berberine spécialement étudiée par BÆDEKER et retiré également du colombo.

Pissenlit : « *Taraxacum dens leonis* ». On emploie un extrait non aqueux des feuilles dentelées de cette plante. Les feuilles contiennent en effet des alcaloïdes et glucosides dont l'action thérapeutique est certaine.

Hypotenseur idéal et sans danger, le *Subtensène* s'emploie aux doses suivantes :

Une ou deux dragées un quart d'heure avant les principaux repas.

V. et G. de MONTMOROT, Pharmaciens

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

Dépôt à l'Office Commercial Pharmaceutique.

SUCRE ÉDULCOR

dit le Sucre des Diabétiques:

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical. Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

Prix : la petite boîte : 6 fr. 30.

La grande boîte : 17 francs.

LITHARSYNE

Indications. — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

Posologie: *Gouttes* : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

Comprimés : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e)
(Tél. : Danton 98-45.)

SUCRE « VITA D »

Juxtaposition de saccharose et vitamine D cristallisée (calciférol).

Composition :

Vitamine D.. 10 000 unités internationales.

Saccharose.. 100 grammes.

Chaque morceau de sucre pèse 5 grammes et contient 500 U. I. de Vitamine D.

Propriétés. — Associe les propriétés anti-rachitiques de la Vitamine D aux propriétés toni-nutritives du saccharose.

Le morceau de sucre « Vita D » est dosé rigoureusement à 500 U. I. de Vitamine D.

Indications. — Rachitisme, tous les cas de décalcification et de déminéralisation de l'organisme, Poussées dentaires chez l'enfant, Caries dentaires chez l'enfant et chez l'adulte, Fractures, Grossesse, Allaitement, Convalescences.

Présentation. — Le sucre « Vita D » se présente sous forme de morceaux de sucre de 5 grammes (boîtes de 320 gr. net).

Posologie et mode d'emploi :

Remplace, à quantité égale, les qualités nutritives et caloriques du sucre ordinaire.

Peut être facilement mélangé aux biberons du nourrisson ou croqué par les enfants et adultes.

Nourrissons : 1 à 4 morceaux par 24 heures dans les biberons.

Enfants de 1 à 10 ans : 4 à 8 morceaux par 24 heures.

Enfants au delà de 10 ans et adultes : 8 à 10 morceaux par 24 heures.

Laboratoires Français du Sucre

M. CURIE, Pharmacien

40, rue François-I^{er} — PARIS (VIII^e).

SUFROL CROSNIER

(Comprimés.)

Composition. — Complexe de Soufre sous ses 3 formes actives : Hydrogène sulfuré naissant, Hyposulfites alcalins, Soufre micellaire ; Térébenthine colloïdale.

Indications. — Toutes les indications du soufre, en particulier affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, pharyngites ; lymphatisme ; dermatoses ; arthritisme ; rhumatisme chronique ; goutte.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 comprimés au début des deux principaux repas.

Enfants : 1/2 doses.

Prix : 10 fr. 70 l'étui de 40 comprimés.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

SUISERYL

Composition. — Sérum normal de porc.

Propriétés. — Thérapeutique biologique des infections d'origine intestinale à colibacilles, à Éberth et à bacilles paratyphiques.

Indications. — *Colibacilloses* : Entérites, Entérocolites, Diarrhées infantiles, Diarrhées saisonnières, Angiocholites, Pyélonéphrites gravidiques, Pyélites, Cystites.

Typhoïdes et Paratyphoïdes.

Forme. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — 2 à 3 ampoules par jour, par voie buccale, loin des repas.

Prix : 26 francs.

Remboursement aux Assurés Sociaux : Catégorie B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

SULFAGONE

Agent chimio-thérapique anti-infectieux.

Composition :

4-Amino-phényl-1-sulfamide	0 gr. 25
Carbonate neutre de sodium	0 gr. 05
pour 1 comprimé	

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Infections gonococciques aiguës ou chroniques, Cystites, Urétrites chroniques à germes banaux, Pyélo-néphrites, Phlegmons, Abscesses, Otites, Angines, Mastoidites, Erysipèles, Septicémies à streptocoques, Méningites à streptocoques et à méningocoques, Pneumococcies.

Schémas, modifiables, de posologie. — (Ne jamais absorber plus de deux comprimés à la fois.) *Angines* : 6 comprimés par jour pendant 2 jours. — *Blennorragie aiguë* : 8 par jour pendant 2 jours et 4 par jour pendant 8 jours, si on associe d'autres traitements (sinon 12 comprimés par jour, puis 6).

Infections graves à méningocoques, streptocoques et pneumocoques : 16 à 20 comprimés par jour.

Enfants : demi-doses. *Nourrissons* : quart de doses.

Incompatibilités. — Purgatifs salins (Sulfate Na ou Mg), médicaments chryso ou arsénotherapiques.

Présentation et prix. — Le flacon de 30 comprimés : 22 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

SULFAN

Forme. — Comprimés à sucer lentement.

Composition. — Monosulfure de sodium, Borate de soude, Extrait d'Erysimum, Teinture d'Aconit, sucre et réglisse.

Propriétés. — Type par excellence du gargarisme sec fondé sur l'action élective du soufre, de ses vapeurs et de ses dérivés sur les muqueuses et les ganglions des voies respiratoires. Agent essentiel de métabolisme.

Indications. — Toutes les affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx, du pharynx, du larynx, de la trachée et des grosses bronches. Tous états infectieux ou toxi-infectieux.

Posologie. — 2 à 5 comprimés par jour.

Prix : le tube de 24 comprimés : 10 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire DALAYEUN, pharmacien
15, rue de Paris — SANNŌIS (Seine-et-Oise).
(Tél. : 19.)

SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de sodium. Teneur en arsenic : 19 p. 100.

Injections (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

Indications. — Syphilis, Hérédo-Syphilis, Angine de Vincent, Aphtes, Athrepsie, Anorexie des nourrissons, Blennorragie, Dermatoses chroniques, Dysenterie amibienne, Eléphantiasis, Enurésie, Erysipèle, Fièvre de Malte, Goitre endémique, Infection puerpérale, Paludisme, Typhoïde, Variole, Zona.

Doses :

A	B	C	D	E	1	2	3	4
5 milgr.	1 ctgr	1,5	2	3	6	12	18	24
5 6	7 8	9 10	11	12	13			
30 36	42 48	54 60	72	84	96 ctgr.			

Voir *Arsénos-Solvant* :

Durée moyenne des unités vente.

On considère généralement que 12 ctgr. sont éliminés en 24 heures.

Laboratoires de Biochimie Médicale.

Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

SULFARSIODE

Composition et dosage :

Iode.....	0 gr. 006 par cc.
Arsenic.....	0 gr. 002 —
Soufre allylique	0 gr. 004 —
1 cc. représente XLII gouttes.	

Indications :

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

Posologie :

Bébés, selon l'âge, VI à XII gouttes par jour.

Adolescents — X à XX — —

Adultes — XV à XXX — —

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas, par périodes de dix jours.

Forme et prix : Gouttes : 17 fr. 70 le flacon.

Préparé par le D^r ROGER, Pharmacien.

Echantillons et vente en gros :

H. PERRIN — 11, quai Saint-Clair — LYON

D^r A. IMBERT, Pharmacien — (Tél. : Burdeau 28-96.

Dépositaire à Paris : E. MOREAU, Pharmacien

13, rue des Nonnains-d'Hyères — (Tél. : Turbigo 87-05.)

SULFEX

Traitement synergique.
Séborrhées, Acnés, Folliculites.

Forme. — Lotion.

Composition. — Soufre, Borate de soude, Chlorure mercurique, Éther, Camphre dans excipient glycé-
riné aromatisé.

Indications. — Kérose, Acnés, Comédons, Folli-
culites, Eczématides, Séborrhée.

Posologie. — Tamponner les parties malades le
soir avant de se coucher.

Nota. — Dans les cas rebelles, ajouter au traitement
externe le traitement interne suivant : *prendre deux
fois par jour une mesure de SULFEX POUDRE
dans un peu d'eau après les repas.* (Chaque
boîte de poudre est accompagnée d'une mesure.)

Prix: Lotion : 19 fr. 80. Poudre : 19 fr. 80.

Le flacon vente est suffisant pour un traitement
moyen d'environ 3 semaines.

Laboratoire du SULFEX

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE. Tél. : 19-84.

SULFHYDRAL CHANTEAUD

Composition. — Granules contenant chacun 1 cgr.
de Sulfure de Calcium pur. Au contact des
liquides organiques dégage de l'hydrogène sulfuré
naissant.

Présentation. — Boîtes de 10 tubes contenant
chacun 20 granules.

Indications. — Antiseptique très actif des voies
aériennes et digestives. Angine, Grippe, Rhume,
Rougeole, Scarlatine, etc.

Mode d'emploi, doses. — Sans danger. Non
toxique. On peut sucer les granules ou les dis-
soudre dans de l'eau plus ou moins chaude pour
gargarisme ou boisson.

Enfants : Jusqu'à 5 granules par jour.

Adultes : Jusqu'à 12 ou 15 granules par jour.

Prix de vente : 14 francs.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas

SAINT-OUEN (Seine). (Tél. : Clignancourt 02-28.

SULFOBIOL AGUETTANT

Antianaphylactique, antitoxique, anti-choc.

Granulé. — Groupement de soufre et d'Hyposulfite alcalin.

Ampoules. — Plasma naturel isotonisé, renforcé d'Hyposulfite, Anti-choc.

Indications principales. — Déséquilibres humoraux.

a. Insuffisance hépatique, Foie torpide, Langue saburrale, Inappétence, Lassitude, Maux de tête au réveil.

Intoxication intestinale et ses conséquences, Acné, Urticaire, Strophulus infantile, Prurigos, Psoriasis.

b. Inflammations chroniques du tube digestif (Pharyngite chronique, Entérocolite), et de l'arbre respiratoire (Asthme, Rhinite, Bronchite catarrhale).

c. Rhumatisme articulaire chronique, Algies musculaires, Névralgies

Action. — Apport au foie de la molécule de soufre nécessaire à sa fonction thiopexique ; destruction des indols, scatols et poisons d'origine intestinale. Dissolution des floculats par l'hyposulfite.

Doses. — *Granulé* à croquer ou faire dissoudre. Matin et soir, une cuiller à dessert (enfants : une cuiller à café).

Ampoules en injection intramusculaire ou intraveineuse, ou en lavement à garder le soir au coucher. 3 à 6 par semaine.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

SULFOBYL

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Soufre colloïdal	0,02
Extrait de bile	0,05
Extrait de foie	0,05
Entérokinase	0,02
Extrait de pancréas.....	0,02
Urotropine	0,05
Aloïne	0,005

Par dragée.

Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoclasique de Widal.

Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 12 fr. 20.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien.

3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).
(Tél. : Clignancourt 02-28.)

SULFOCAÏNE FAYÈS

Pastilles.

Composition. — Soufre naissant, Stovaïne, les alcaloïdes de la Belladone et de l'Aconit, arom. à l'essence de menthe et menthol.

Indications. — Affections aiguës du pharynx et du larynx, Séquelles d'amygdalites, état congestif pharyngien des chanteurs, pharyngite des fumeurs.

Mode d'emploi. — 4 à 8 pastilles par 24 heures. Une pastille = 1 cuillerée à café de potion.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du Dr FAYÈS**

3, rue d'Alexandrie — PARIS.

SULFOCALCYL

Composition. — Gouttes stabilisées à base de soufre et de calcium ionisés.

Action rapide, sédatif puissant.

Aucune toxicité, sans alcaloïde ni opiacé.

Indications. — Toux rebelles, nerveuses, spasmodiques, émétisantes, coqueluche, trachéites, trachéo-bronchites, asthme, emphysème, prurit laryngé, spasme glottique.

Posologie. Mode d'emploi. — A prendre loin des repas, dans une infusion très sucrée (violettes, fleurs pectorales).

De 1 à 2 ans	4 à 5 gouttes	3 ou 4 fois par jour.
De 2 à 4 ans	8 à 12 —	4 ou 5 —
De 4 à 8 ans	15 à 25 —	4 ou 5 —
De 8 à 12 ans	30 à 35 —	4 ou 5 —
Adolescents	40 à 50 —	4 ou 5 —
Adultes	60 à 80 —	5 ou 6 —

Prendre, suivant l'âge, le nombre de gouttes indiqué, pour obtenir un résultat rapide.)

Prix : 18 francs.

Durée moyenne du traitement de l'unité de vente : 4 à 20 jours suivant les cas.

Laboratoire L. ROY

29, avenue Charras — CLERMONT-FERRAND

SULFOCRÈME LILESS

Composition. — Crème non grasse, contenant 20 p. 100 de Soufre précipité, desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

Indications. — Séborrhée, acné.

Mode d'emploi. — Appliquer la crème à la toilette du soir, en massant la peau à chaque apport, pour favoriser sa pénétration ; les couches peuvent être légères dans les cas bénins et épaisses dans les cas rebelles.

La peau se nettoie avec des tampons d'ouate imbibés d'eau chaude ou par simple lavage.

Le jour, une couche légère reste invisible sous un soupçon de poudre de riz.

Prix : 12 fr. 80.

Laboratoires FISOH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X°).

(Tél. : Trudaine 92-52.)

SULFODERMOL FLAHAUT

Composition. — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

Forme. — Cachets.

Indications. — Eczémas, Etats séborrhéiques, et dermatoses associées, Acné, Pityriasis, Psoriasis, Alopecies, Furunculose, Impetigo, Sycosis, Urticaire, Troubles de la Nutrition soufrée des rhumatisants chroniques.

Mode d'emploi. — Un cachet avec un 1/2 verre d'eau avant chacun des trois repas. La boîte 30 cachets.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V°).

(Tél. : Gobelins 39-44.)

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules. Pommade.

Doses et mode d'emploi. — Granulé : 2 cuillers-mesures 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 cgr. de soufre colloïdal. — Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires, 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques, Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritisme. Syphilis.

Prix: *Granulé:* 17 fr. 70. — *Ampoules:* 19 fr. 75.
Pommade: 1/15, 2/15, : 15 fr. 60; 12 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 37-85.)

SULFOLAX

Laxatif doux, toni-hépatique, antitoxique.

Composition. — Soufre de l'Ichthyol, Extraits biliaires, Artichaut, Boldo, Combretum, Evonymine verte, Cascara, Agar-Agar.

Posologie. — 1 ou 2 comprimés au repas du soir.

Indications. — Constipation, Insuffisance hépatique, Auto-intoxications et tendances toxémiques, Manifestations du Neuro-Arthritisme.
Innocuité absolue, Aucun toxique, Aucun drastique. Pas d'accoutumance.

Prix du flacon de 60 comprimés : 12 francs.

Laboratoires du VAGOSÉDYL

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

A. COUSSINET, Pharmacien

Licencié ès sciences.

SULFOLIVE

Composition. — Pommade à base d'Huile d'Olive concrétisée par catalyse et de soufre en combinaison organique avec l'Huile d'Olive.

Propriétés et Indications. — Spécifique du Rhumatisme et de toutes les douleurs articulaires par pénétration du soufre *in loco*. Analgésique. Indiqué également pour les dermatoses dans lesquelles la combinaison Soufre-Huile d'Olive a son application.

Mode d'emploi. — Le *Sulfolive* fond aussitôt au contact de la peau et pénètre par léger massage.

Grand tube. — Petit tube.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.
19, rue de Pontevès — MARSEILLE.

ARNOUX-BERENGUIER, Pharmacien.

(Voir *Boldolive*, *Suppolive* et *Dermolive*.)

SULFORGAN

Soufre organique naturel assimilable.

A haute teneur en soufre (13 p. 100 de soufre à l'état sulfinique), le *Sulforgan* recharge les tissus et liquides humoraux en soufre organique.

Composition. — Huile soufrée organique dans un véhicule approprié.

Avantages. — A doses thérapeutiques, le *Sulforgan* est parfaitement bien toléré.

Il ne présente aucune contre-indication. Piqûres indolores, sans aucune réaction fébrile.

Indications. — Douleurs rhumatismales récentes ou chroniques, lithiases hépatiques et rénales et leurs complications, maladies de la peau (eczéma, psoriasis, etc...), affections nerveuses (paralysies, névrites, zona), affections chroniques (ostéites, fistules, etc...), affections chroniques de l'appareil respiratoire, urinaire, etc... Infections intestinales.

Présentation, Posologie et prix. — Ampoules de 2 cc. Une ampoule intramusculaire tous les deux jours, tous les jours dans les cas aigus. 31 fr. 20 la boîte de 6 ampoules.

Pilules : 2 à 6 par jour, 15 fr. 60 la boîte de 50 pilules.

Pommade : 12 fr. 50 le tube de 35 grammes environ.

Laboratoires du Soufre Organique.

16, rue de Gramont — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 83-83.

SULFO-RHINOL DU D^r FAYÈS

Baume nasal au Soufre précipité naissant aromatisé à la teinture de benjoin.

Indications. — Affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx; modificateur des sécrétions nasales en particulier dans l'ozène. Préventif en cas d'épidémies.

Propriétés. — L'H²S naissant, qui se produit dans les voies aériennes supérieures, permet une inhalation prolongée de ces vapeurs à action bactéricide incontestable.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois dans chaque narine matin et soir.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du D^r FAYÈS**

3, rue d'Alexandrie — PARIS.

SULFOSALYL

Complexe médicamenteux à base de Soufre, Polysalicylates et Calcium associés à l'Opothérapie. Capsules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin.

Traitement de fond total des *Rhumatismes chroniques* par modification du terrain.

Composition. — Pour une capsule glutinisée :

Salicylate de Sodium.....	0,20	Gluconate de Calcium...	0,05
Salicylate de Potassium ..	0,01	Thiosinamine	0,005
Salicylate de Calcium....	0,006	Poudre de Thyroïde....	0,001
Hyposulfite de Sodium....	0,10	Poudre de Parathyroïde..	0,0001

Indications. — Tous les Rhumatismes chroniques, Arthrites, Arthroses, Algies rhumatismales (compléter le traitement par Histalgine en piqûres intradermiques), Rhumatisme articulaire aigu (dans les cas de Salicylo-résistance).

Posologie. — 8 à 15 capsules et plus par 24 heures. De préférence pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

Traitement très prolongé (plusieurs mois) dans les cas de Rhumatismes déjà évolués.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-16.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI°).

(Tél. Jasmin 00-37.)

SULFOSINE « LEO »

Pyrétothérapie

Suspension huileuse de soufre à 1 et 2 p. 100.

(Huile soufrée stérilisée.)

Indications. — Paralyse générale. Syphilis nerveuse et autres affections syphilitiques ou non du système nerveux central, telles que la démence précoce, la Shizophrénie, l'Encéphalite épidémique chronique, etc...

Forme. — Deux dosages :

1° Faible : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 1 p. 100 de soufre.

2° Fort : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 2 p. 100 de soufre.

Deux séries : 1°. Une boîte de 10 ampoules de 10 cc. 2°. Une boîte de 10 ampoules assorties : 2 de 1 cc. ; 3 de 5 cc. ; 5 de 10 cc.

Sulfosine anesthésique à 1 et 2 p. 100 et comme ci-dessus.

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires profondes.

Posologie. — Pour la solution à 1 p. 100 la dose initiale dans le premier traitement est de 1 à 2 cc. ; on augmente ordinairement chaque dose de 1 cc. jusqu'à 8 à 10 cc. La dose de début pour la solution à 2 p. 100 est également de 1 à 2 cc.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX (Tél. : 80-989).

Dépôt pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

SULFO-THIORINE

Soufre-Hyposulfite de Soude agréable au goût, granulé

1° Affections des voies respiratoires (Subaiguës ou chroniques)
Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches.

Ozène, adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites traînantes. Trachéobronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Expectorations tenaces (la Sulfo-Thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). Bronchites persistantes des gazés. Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

La cure de SULFO-THIORINE prépare et complète la cure thermique par les eaux sulfureuses ; en cas d'impossibilité de faire la cure aux sources thermales, elle peut à la rigueur y suppléer.

2° Auto-intoxication intestinale chronique et des affections qui en découlent :

Accidents anaphylactiques, aigé, eczéma, urticaire, etc.*

Laxatif léger. — Désinfectant sûr.

3° Maladies par ralentissement de la nutrition.

Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc...

4° Adjuvant indispensable des traitements par les sels d'or, de mercure, de bismuth, d'arsenic.

Renforce leur action — Empêche les phénomènes d'intoxication.

Posologie

Adultes : 1 ou 2 cuillerées à café 3 fois par jour au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau (diminuer la dose en cas de diarrhée très abondante).

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Prix : P. M. 14 fr. 45 — G. M. 37 fr. 35.

Laboratoire de la Sulfo-Thiorine

39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

SULFOXAL

La seule pommade à base de soufre libre et dissous.

Composition. — 4 p. 100 de soufre dissous dans un excipient gras, non volatil et absorbable par la peau (exempt de vaseline et d'huiles minérales).

Indications. — Séborrhée et ses applications acnéiques (visage ou région dorsale). Surséborrhéides des vieillards. Formes érythrodermiques du Psoriasis. Dermatoses rouges, prurigineuses (séborrhéides et eczématides) ainsi que Prurigo et Lichen. Dermatoses parasitaires. Rhumatismes.

Mode d'emploi. — Appliquer le *Sulfoxal* sur la partie malade et sur son pourtour. Frictionner si possible. Protéger du frottement des vêtements par un linge fin.

Sulfoxal est le seul produit actuel présentant le soufre libre et dissous dans un excipient de pommade. Il constitue une véritable découverte chimique basée sur une réaction toutenouvelle. Il possède de ce fait une supériorité incontestable sur les soufres précipités ou colloïdaux. Il agit directement en surface et en profondeur.

Sulfoxal offre, de plus, l'énorme avantage de ne jamais irriter et d'éteindre instantanément la démangeaison.

Prix : 19 fr. 50 le pot de 30 grammes.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1517-1.

Laboratoire du SULFOXAL

48, rue Claude-Lorrain — LILLE.

SULFOXYL

(Hydrogène sulfuré à l'état naissant.)

Propriétés. — Médication sulfureuse active, régulière, pouvant être réalisée partout et à toute époque de l'année.

Quatre formes. — a. *Pastilles* ; b. *Granulé* : composition stable, saveur très agréable, aucun goût sulfureux lors de l'ingestion. c. *Comprimés inhalants* : très fort dégagement sulfureux instantané ; d. *Ampoules buvables* : 1 ampoule permet d'obtenir immédiatement 1 litre d'eau sulfureuse synthétique, très économique.

Indications. — Infections du rhino-pharynx. Toutes infections catarrhales, traînantes, rebelles et récidivantes des voies respiratoires. Toutes affections traitées par les médicaments Arsenicales, Bismuthiques, Mercurielles, etc. (accroît leur tolérance et débloque les réserves toxiques accumulées par l'organisme).

Posologie et prix :

Pastilles. — États aigus : 4 à 10 par jour ; états chroniques : 2 à 5 par jour. *Enfants* : 1 à 5 par jour.

Granulé. — 4 à 9 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Inhalant. — 1 à 3 comprimés dans un verre d'eau.

Ampoule. — Diluer 1 ampoule dans un litre d'eau ; en prendre 1/2 verre matin et soir.

Concessionnaires exclusifs

Les Laboratoires NOVALIS — OULLINS (Rhône).

SULFUR CONCENTRÉ DAX

Soufre colloïdal par voie buccale.

Composition. — Soufre colloïdal, 0 gr. 10 pour une ampoule de 10 cc. 3 ampoules par boîte.

Posologie. — Agiter légèrement puis diluer l'ampoule dans 250 cc. d'eau (1/4 de litre). De la dilution : 2 à 3 cuillerées à soupe au coucher. C'est donc une AMPOULE-SEMAINE.

Avantages. — Etat colloïdal, véritable pseudo-solution conservant les mouvements browniens. Pas de mauvaise odeur sensible.

Indications. — *Arthritisme* : Rhumatisme aigu et chronique, lumbago, Dermatoses (eczéma, acné), Bronchite emphysémateuse, catarrhe. — *Oto-rhino-laryngologie* : faire 4 ou 5 inhalations avec une ampoule diluée, y associer le traitement par voie buccale. — *Adjuvant du traitement syphilitique* (Hg As Bi) forcer les doses : 6 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire MORELLET, Pharmacien,

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

BAGNOLES-DE-L'ORNE,

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

MÉDICATION SULFUREUSE A DOMICILE

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie aux Arts et Métiers à Paris.

Mode d'action. — Au contact de l'eau, formation de Monosulfures de sodium et de calcium à l'état naissant.

Indications thérapeutiques. — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles prises à la source.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, **Extinctions de voix**, Fatigue des cordes vocales, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales et en lavements contre les oxyures.

L'effet désensibilisateur et curatif est certain dans l'Eczéma, l'Acné et toutes les affections de la peau.

L'emploi simultané de la boisson et du bain sulfureux prévient et guérit les intoxications par métaux lourds (Hg, Bismuth, Plomb, Or, etc.).

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson, en bains et en comprimés inhalants. Il est des plus efficaces en *inhalations* et pulvérisations.

Mode d'emploi :

- 1° *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait tiède, le matin à jeun ou matin et soir.
- 2° *Pour oxyures* : 5 jours de suite un lavement de un verre d'eau tiède avec une mesure de poudresulfureuse ; à garder quelques minutes. Répéter 3 séries de 5 jours avec intervalles de 8 à 10 jours.
- 3° *Pour inhalations* : 1 mesure ou mieux 1 ou 2 comprimés dans un verre d'eau très chaude.
- 4° *Pour pulvérisations* : se servir d'un pulvérisateur pour solutions aqueuses.
- 5° *Pour prévenir ou guérir l'intoxication par les métaux lourds* : Hg, Bis, Or Pb ; un verre d'eau sulfureuse le matin ou matin et soir.

SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte.

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix et durée moyenne :

Boisson : 13 fr. 50, 20 jours. — Bain : 6 francs, 1 bain

Comprimés inhalants : 14 fr., 15 jours.

Laboratoire POMPANON

62, rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V°).

(Tél. : Trudaine 95-69.)

SULFURINE DU D^r LANGLEBERT

A base de soufre associé au carbonate sodique.

Présentation :

- a. Boîte pour bains contenant des tablettes cristallines nécessaires pour un bain entier. Chaque boîte contient, en outre, un comprimé permettant de parfumer le bain à volonté.
- b. Savon.

Indications thérapeutiques :

- a. *Bain*. — Bain soufré alcalin, sans odeur ou parfumé, réalisant à domicile le bain hygiénique par excellence. Tonique, fortifiant. Beauté et souplesse de la peau. Dermatoses, rhumatismes, blessures, diabète, lymphatisme, scrofule, rachitisme, convalescence.

- b. *Savon*. — Le meilleur des savons de toilette complète l'heureuse action de la sulfurine pour bains.

Posologie. — Bains : une boîte entière pour un bain d'adulte. 2 ou 3 tablettes pour un bain local. Un quart de boîte pour un petit bain d'enfant.

Savon pour la toilette journalière.

La boîte	6 fr. 40
Le savon	6 fr. 40

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81-82.)

SULFURION

Description. — Complexe colloïdal isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Prix: 34 fr. 30 pour 8 à 12 jours de traitement. A. S. C.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

SULFURYL MONAL

Médication Sulfureuse. — 2 Usages, 5 Formes.

Cinq formes. — Pastilles, Granulé, Comprimés inhalants, Bain inodore, Savon.

Usage interne. — Pastilles et granulé agréables à sucer ou à croquer.

Usage externe. — Comprimés inhalants pour inhalations, humages, gargarismes, pulvérisations, etc. Bain tonique inodore ; Savon, soins de la peau, dermatoses.

Composition. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

Propriétés. — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges. Permet d'instituer d'une façon active partout, et en toute saison, la médication sulfureuse interne et externe.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Etats infectieux et post-infectieux.

Doses. — *Usage interne :* Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour ; Croquer ou prendre délayé dans un peu d'eau 1 à 3 cuillerées à café de granulé 4 fois par jour (forme recommandée pour les enfants).

Usage externe. — Inhalations : Un comprimé dans un récipient d'eau chaude toutes les 2 minutes.

Un paquet Bain SULFURYL MONAL pour un bain d'adulte et 1/2 paquet pour un bain d'enfant. Savon au SULFURYL MONAL pour la toilette des peaux délicates.

Prix. — Sulfuryl Monal :

Pastilles. Le tube.....	14 fr. 90
Granulé. La boîte	14 fr. 90
Comprimés inhalants. Le flacon.	14 fr. 90
Bain (sans odeur). La boîte..	6 fr. 40
Savon. Le pain.....	6 fr. 40

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

SULFYPÈNE

Solution Forminée d'*Hyposulfite de soude* cristallisé chimiquement pur à 20 p. 100.

Spécifique des états de choc.

Ampoules de 10 cc.

Pour injections intra-veineuses.

Composition. — Hyposulfite de soude chimiquement pur avec adjonction de traces d'Hexaméthylènetétramine qui vient renforcer l'action de l'Hyposulfite de soude en favorisant, à dose infinitésimale, l'élimination des déchets.

Indications. — *Prurits, Eczémas, Urticaires, Dermites.* Déficiences hépatiques, Syndromes entéro-rénal et entéro-hépatique.

Contre-indications. — Néphrites albuminuriques et cardiopathies non compensées.

Mode d'emploi. — Une injection intra-veineuse chaque jour ou tous les deux jours. On peut doubler la dose comme traitement d'attaque dans les cas sévères au cours de la première journée.

Sulfypène forme buccale.

Hyposulfite de soude chimiquement pur en tubes de 0 gr. 50.

Mode d'emploi. — Au début de chaque repas, verser le contenu d'un tube dans une cuillerée à soupe d'eau qui sera absorbée au cours du repas.

Laboratoires BARDIAUX et COLOMB

39, rue de Reims — VICHY (Allier).

SULSOD

Désinfection intestinale par osmose. Carence soufrée.

Comprimés renfermant 0,44 de SO^4NA^2 anhydre pur.

Indications. — Toutes maladies de l'appareil digestif, et conséquences : constipation, entérite, diarrhée, infections intestinales, aérophagie, affections cutanées. Adjuvant dans le traitement des affections hépatiques, biliaires, rénales, colibacillose, pyélo-néphrites.

Action. — Soluble très lentement dans l'intestin, détruisant les bactéries par plasmolyse. Absence de toxicité.

Emploi. — Généralement associé au LEPTAB à raison de 5 Sulsod et 1 leptab à la fin des repas. On peut augmenter les doses si nécessaire.

Présentation. — 2 modèles, sous boîtes aluminium : 9 francs (8 jours) ; 26 francs (1 mois).

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

SUNALCOL

Solution alcool-acétonique

à 2 p. 100 de **Chlorhydrate d'ortho-oxyquinoléine**.

Propriétés. — Puissant antiseptique cutané dépourvu de toute toxicité et de causticité. Très pénétrant, stimule les moyens de défense de l'organisme.

Supplante la Teinture d'Iode dans tous ses emplois antiseptiques et antimycosiques. Inaltérable.

Indications. — Asepsie du champ opératoire. Désinfection des plaies traumatiques. Traitement des dermites microbiennes, des mycoses, des levurides.

Stomatologie. — Tous les usages de la teinture d'iode comme antiseptique et désodorisant.

Mode d'emploi. — Emploi à l'état pur en badigeonnages et seulement en applications externes.

Présentation :

Forme normale. — Non colorée, ne tache pas.

Forme chirurgicale. — Colorée, pour la désinfection des champs opératoires.

Flacons de 25 cc., 125 cc., 500 cc.

Produits R. A. L. Spécialisés

Établissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e). (Tél. : Élysées 99-51.

SUNOXIDON

Composition :

Salicylate d'oxyquinoléine.....	0 gr. 110
6-Méthyl-5-Sulfo-8-Oxyquinoléine.....	0 gr. 035
5-Sulfo-8-Oxyquinoléine	0 gr. 130
Diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone .	0 gr. 160
Hexaméthylène tétramine	0 gr. 065

pour 1 cachet

Propriétés. — Action calmante et antithermique de la diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone (Pyramidon) associée aux propriétés antiseptiques et anti-infectieuses de l'oxyquinoléine et de l'acide salicylique.

Indications. — Élévations thermiques quelle qu'en soit la cause : Algies de toutes natures (névralgies intercostales, douleurs articulaires, Algies viscérales et génitales en particulier) Gripes, Angines. Le *Sunoxidon* est particulièrement indiqué comme antithermique et antialgique chez les tuberculeux.

Mode d'emploi. — Dose usuelle : 2 à 3 cachets par jour, pouvant être portée à 4 ou 5 cachets, mais seulement en cas de nécessité.

Produits R. A. L. Spécialisés.

Etablissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Élysées 99-51.)

SUNOXOL

Sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine.

Propriétés. — Antiseptique non toxique, non caustique, non irritant pour usage général. Ne coagule pas les albumines, stimule les moyens de défense de l'organisme. Inaltérable.

Indications. — Antisepsie en dermatologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie, gynécologie, obstétrique.

Présentation et mode d'emploi.

I. Comprimés à 0 gr. 50 de Sunoxol.

1 comprimé à 0,50 dans 1 litre d'eau (0,5 p. 1 000) : Asepsie générale, soins intimes.

2 comprimés à 0,50 dans 1 litre d'eau (1 p. 1 000) : Gargarismes, Irrigations rhino-pharyngiennes. Lavages des plaies complexes. Injections vaginales.

2 comprimés à 0,50 dans 100 cc. d'eau (1 p. 100) : en lotions, badigeonnages.

Tube de 10 comprimés à 0 gr. 50.

II. Solution hydroglycérinée à 33 p. 100 de Sunoxol.

Cette solution ajoutée à l'eau permet, comme les comprimés, d'obtenir toutes les dilutions voulues de Sunoxol : une mesure jointe au flacon équivaut à 2 comprimés à 0 gr. 50 (voir ci-dessus).

Elle peut également s'employer pure pour le badigeonnage des plaies infectées et ulcérées, de certaines dermatoses.

Flacon de 25 cc., 125 cc. et 500 cc.

III. Comprimés de Sunoxol à 5 centigr. pour Stomatologie.

Sunoxol 5 centigr.

Excipient aromatisé. Q. S pour 1 comprimé.

1 comprimé par verre d'eau pour bains de bouche et gargarismes.

Flacon de 25 comprimés à 5 centigrammes.

IV. Ovules au Sunoxol à 0 gr. 20 par ovule.

Boîte de 6 ovules.

V. Pommade au Sunoxol à 1 p. 100.

Impétigo, eczéma, intertrigo, prurits, brûlures, engelures, hémorroïdes.

VI. Pansements sur adhésif au Sunoxol.

Produits R. A. L. Spécialisés

Etablissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Elys. 99-51 à 57.)

SUPPABAÏNE

Ouabaïne rectale.

Composition. — Ouabaïne pure, un demi-milligramme.

Phényléthylmalonylurée et belladone à petites doses.

Forme. — Petits suppositoires faits d'un excipient très délitescents.

Propriétés. — Cardiotonique puissant et antidyspnéique.

Avantages. — Facilité d'emploi, *très grande activité* (Thèses de Paris 1922, 1937 et nombreux essais), moins brutale que la voie intraveineuse, absorption en 20 minutes.

Indications. — Toutes défaillances cardiaques, affections pulmonaires aiguës s'accompagnant d'une défaillance du myocarde (pneumonie, broncho-pneumonie, asthme, etc...). Maladies douloureuses syncopales (coliques hépatiques, néphrétiques).

Mode d'emploi. — 1 à 3 par jour. Dans certains cas, deux suppositoires à quelques instants d'intervalle.

Prix : 17 francs la boîte.

Laboratoires **RENAUD**

Ed. **RENAUD**,

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie

2, place de la Duchesse-Anne

NANTES (Loire-Inférieure).

SUPPARGYRES

du Docteur **FAUCHER**

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne.

Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — *Adultes.* — Suppositoires à 0 cgr. 04 de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrissons : 0 cgr. 01 et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0 cgr. 02.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours. repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif est et reste supérieur à tous les sels, toujours instables. Le seul anti-syphilitique indiscutable et indiscuté. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif. On mélange à une solution d'arséno-benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'**EXTRAIT de FOIE**, les tréponèmes sont foudroyés. **Peuvent être prescrits comme désinfectants ou hépatogènes.** (Expériences de Levaditi.)

Prix, Taxe d'état comprise :

Adultes : 16 fr. 80. — Enfants : 14 fr. 40. — Nourrissons : 14 fr. 40.

Laboratoires du Docteur **TISSOT**

L. **ÉCHEMAN**, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

SUPPOALGOS

Composition :

Extrait de belladone	0,015
Extrait de jusquiame	0,025
Extrait de piscidia.....	0,025
Amidopyrine	0,30
Citrophénétidine.....	0,50
Dionine	0,03
Beurre de cacao	Q. S. pour 3 gr.

Actions thérapeutiques. — Spécifique de l'élément douleur. Antispasmodique, Hypnotique, Analgésique, Sédatif, Antithermique.

Indications. — Névralgies, Douleurs tabétiques, rhumatismales et utérines. Spécifique des règles douloureuses, Accès d'asthme et d'emphysème, Coliques intestinales, Néphrétiques, Hépatiques, Angines, Otites, Mastoïdites, Hémorroïdes, Prostatites, Insomnie causée par la douleur.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 6 : 16 francs (Impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON

(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOCAMPHYL

Composition :	Adulte.	Enfant.	Bébé.
Sulfocamphonate de soude.	1 gr.	0,50	0,25
Beurre de cacao. Q. S. P.	3 gr.	2 gr.	1,40

Actions thérapeutiques. — Stimulant des affections pulmonaires et cardiaques et du système nerveux. Antispasmodique.

Indications. — Les mêmes que celles de l'huile camphrée. Adynamie, Collapsus cardiaque, Pneumonie, Broncho-pneumonie. États de shock traumatiques et opératoires.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance. — La boîte de 10 :

Adultes : 18 francs. — *Enfants* : 15 fr. 50. — *Bébés* : 13 francs. — (Impôt compris.)

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.

(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOGLANDINES

Suppriment les piqûres et leurs ennuis.

Traitement des déficiences glandulaires par suppositoires d'**extraits d'organes frais** et de **lécithine** (0 gr. 50 par suppositoire) qui tonifie le système nerveux et régularise l'assimilation.

Nos dosages sont en organes frais et non en extraits.

Les boîtes sont de 10 suppositoires : Un au coucher.

Nous exécutons toutes formules sur prescription, avec lobe antérieur, corps jaune, folliculine, mamelle, moelle, rate, etc.

Formule

Prix à titre indicatif.

1	Ovaire 1. gr.	Insuffis.; Ménop.; Ovariot.	22 fr.
2	Surrénale 0,25 Testicules 0,50	Défic. sexuelle, surmenage Toutes psycho-asthénies	20 fr.
3	Thyroïde 0,05	Défic. et Instabilité, Obésité	18 fr.
4	Testicules 2 gr. Prostate..... 0,20 M Gl. Interstitielle . 0,30 Hypophyse 0,20 Yohimb.; Nucléin. Mn.	Impuissance Prostatite Neurasthénie sexuelle Sénilité précoce	37 fr.
5	Hypophyse 0,25 F Thyroïde 0,05 Ovaire 0,70	Troubles interglandulaires et adiposo-génitaux 5M avec testicule	28 fr.
6	Cortico-surrénal 0,50	Hypotension, Interv. chirurg.	23 fr.
7	Parathyroïde..... 0,02	Tr. du Métab. calcique, etc.	26 fr.
8	Post-hypophyse 6. U. I	Hypoviscosité sanguine	37 fr.
A	Thyroïde 0,01 Hypophyse 0,10 Surrénale 0,05 Ext. belladone .. 0,01 Ext. Lobelia..... 0,01 Ext. Euphorbia . 0,04 Chl. Ephédrine . 0,08 Iodure caféine .. 0,10	Asthme 1 à 2 suppositoires par jour	31 fr.50
C	Post-hypophyse 5 U. I. Parathyroïde..... 0 05 Thyroïde 0,02	Constipation chronique Stase, Atonie, Parésie intest. 1 tous les 2 jours	28 fr.
D	Foie et rate aā.. 5 gr. Thyroïde 0,02 Surrénale 0,10 Caséinates fer et Cu.	Toutes affections cutanées : Eczéma, Psoriasis Prurit, Urticaire	29 fr.75
V Y	Foie..... 10 gr. Sels biliaires 0,05 Peptone sèche... 0,01	Tous les troubles de la fonction hépatique	28 fr.

SUPPOGLANDINES INFANTILES

J F	Ovaire	0,20	Troubles et retard de la puberté et de la croissance. Insuffis. glandul. des fillettes Troubles adiposo-génitaux Instabilité et nervosisme	22 fr.
	Hypophyse	0,10		
	Surrénale	0,10		
	Lécithine	0,25		
	Caséinates de cuivre + fer aa,	0,001		
	Nucléinate de Mn.	0,001		
J G	Testicule	0,15	Troubles de la puberté des jeunes garçons Adynamie des fillettes Troubles adiposo-génitaux Enurésie	21 fr.
	Hypophyse	0,10		
	Surrénale	0,10		
	Lécithine, Caséinate, Nucléinate (Voir J. F.)			
R I	Thyroïde	0,01	Retard de développement physique et psychique Cryptorchidie, Ectopie Enurésie, Crétinisme Rachitisme infantile Etc., etc.	28 fr.
	Parathyroïde,	0,01		
	Thymus	2 gr.		
	Hypophyse	0,10		
	Lécithine ; Caséinates, Nucléinate (Voir J. F.)			

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochecouart — PARIS. (Tél. : Trudaine : 45-18.)

SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de senecion, beurre de cacao.

Propriétés thérapeutiques. — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un Suppo-Gynal. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

En raison de leur faible teneur en morphine les Suppo-Gynals ne font pas partie du tableau B.

Prix. — La boîte de 6 : 16 francs.

La boîte de 3 : 9 francs.

Laboratoires LEES

Directeur : Docteur Pierre Rolland.

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 22-01.)

SUPPOLIVE

Composition. — Le *Suppolive* en suppositoire de 4 grammes n'est que de l'Huile d'olive neutre extra-pure solidifiée et saturée par procédé catalytique des *Laboratoires du Pugétol* (Oléostat : nom déposé). Il ne renferme ni glycérine, ni gélatine, ni beurre de cacao.

Propriétés. — Réalise le lavement d'Huile d'Olive Vierge adoucissant et riche en vitamines.

Pansement intestinal.

Indications. — Colites, constipation chronique, amibiase, rectocolites, hémorroïdes, stase intestinale.

Forme Belladonnée : 1 suppositoire de 4 grammes contient :

Huile d'Olive hydrogénée (Oléostat).....	3 gr. 97
Extrait de Belladone	0 gr. 01
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 02
Total	4 gr.

Antispasmodique.

Dose : 1 ou 2 suppositoires le soir ou un suppositoire au coucher et un autre le lendemain matin.

Boîte de 12 suppositoires *adultes*.

Boîte de 12 suppositoires *enfants*.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE

ARNOUX-BERENGUIER, Pharmacien.

(Voir *Boldolive*, *Dermolive* et *Sulfolive*.)

SUPPONÉRYL

Composition. — Suppositoire à base de Butyl-éthyl-malonylurée (« Sonéryl », nom déposé) et camphre.

Propriétés. — Hypnotique, analgésique (par le « Sonéryl »), calmant, eupnéique, cardio-tonique (par le camphre).

Indications. — *Toutes les insomnies* : des vieillards, des anxieux, des maladies infectieuses ou fébriles, toutes les insomnies nerveuses tenaces, provoquées ou entretenues par la douleur (suites d'interventions).

Hypoalgésie opératoire et obstétricale.

N. B. — Le *Supponéryl* ne contenant aucun alcaloïde (morphine ou autre) peut être administré en toute sécurité après les opérations abdominales.

Posologie. *Adultes* : — Un ou deux *Supponéryl* par 24 heures. *Enfants* : de 7 à 12 ans, un demi-*Supponéryl* et un entier à partir de 12 ans.

Boîte de 10 suppositoires.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SUPPOIRINE SECLO

Suppositoires à l'aspirine.

(Pureté absolument garantie.)

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antithermique, contient en outre un anesthésique non toxique. Supprime les inconvénients dus à l'absorption de l'aspirine par voie buccale. Combat en même temps la constipation nuisible dans tous les états fébriles.

Présentation :

Adultes : 0 gr. 50 et 1 gr. d'aspirine par suppositoire.

Enfants : 0 gr. 25 et 0 gr. 50 d'aspirine par suppositoire.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires ou plus par jour selon avis médical. Pour les enfants au-dessous de 5 ans, ne pas employer sans avis médical préalable.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires **SECLO**

J.-P. PINTA, Pharmacien.

6, rue Adolphe-La-Lyre — COURBEVOIE.

Tél. : Wag. 62-71.

SUPPOPULMOS LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	Adult.	Enfants.		Bébés.
		N° 2	N° 1	
Créosote	0,50	0,25	0,10	0,05
Tanin.....	0,50	0,25	0,10	0,05
Scuroforme	0,10	0,05	0,02	0,01
Beurre de cacao. Q. S..				
pour.....	3 gr. 60	3 gr.	2 gr.	1 gr. 40

Actions thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Anticatharrhale, Stimulant de l'état général, Suppositoires indolores et non caustiques.

Indications. — Toux rebelles, Bronchites aiguës et chroniques, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculoses suspectées et confirmées, Gangrène pulmonaire, Préventif des affections grippales et des complications pulmonaires, Anti et post-opératoire.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 10. *Adultes :* 19 francs. *Enfants :* 8 et 17 francs. *Bébés :* 16 francs (impôt compris).

Laboratoires **LAGOUTTE**

85, cours Albert-Thomas — LYON

(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOQUINOL

Suppositoires anti-infectieux et anti-pyrétiques pour nourrissons et enfants.

Composition et formes. — 2 présentations :

	<i>Enfants.</i>	<i>Nourrissons.</i>
Diméthylaminoanalgésine.....	0,10	Jusqu'à
Sulfamide	0,05	2 ans 1/2.
Chl. de quinine chim. pur	0,15	0,08
Argent coll. à petits grains.....	0,08	0,05

Présentation nouvelle : Boîte de 6 suppositoires ; chacun entièrement isolé dans un étui assurant une conservation rigoureusement aseptique.

Indications. — Toutes fièvres chez nourrissons et enfants, Maladies infectieuses : rougeole, grippe, scarlatine. Pyrexie des affections respiratoires, bronchites, angines.

Mode d'emploi. — 1 suppositoire matin et soir.

Aucune contre-indication.

Prix :
La boîte de 6 supp. } rose pour nourrissons. } 13 francs.
 } orange pour enfants. }

Laboratoire THIERS
LE RAINCY (Seine-et-Oise).

SUPPO-SÉDOL

Association de Morphine-Scopolamine-Spartéine en suppositoires.

Toutes les indications du Sédol (ampoules et comprimés, voir à Sédol) ; sédation de la douleur intense, obstétrique, pré-anesthésie et suites opératoires, etc...

Les **Suppo-Sédol** sont, toutefois, plus particulièrement indiqués dans les :

Affections gynécologiques, règles douloureuses, prostatites, cystites, hémorroïdes, rectites, en un mot dans toutes les affections douloureuses des organes du bassin.

Efficaces pour combattre les menaces d'avortement, les **Suppo-Sédol** sont aussi utilisés avec succès dans le mal de mer.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

Boîte de 10 suppositoires.

N. B. — *Le Suppo-Sédol ne fait pas partie du tableau B.*

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SUPPOSITOIRES ALMINE LOUVEAU

Composition pour 100 gr. :

Intrait de Marron d'Inde.....	1 gr.
Dithymol bi-iodé.....	2 gr.
Gaiacol-Phénol-Menthol, aa	0 gr. 20
Camphre Japon	1 gr. 40
Salicylate Bismuth	5 gr.
Oxyde pur de Zinc	30 gr.
Excipient spécial. Q. S. p.	100 gr.

Cette masse pour 20 suppositoires.

Propriétés. — Décongestifs et résolutifs remarquables. Action rapide, soulagement immédiat ne contenant aucun toxique.

Indications. — Hémorroïdes externes et internes. Prostatites, Rectites.

Posologie et mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir au coucher jusqu'à résultat satisfaisant.

Prix : 18 francs la boîte de 10.

Laboratoires A. LOUVEAU

Pharmacien de 1^{re} classe

78, boulevard des Batignolles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 65-49.)

SUPPOSITOIRES AMIBIASINE

Extrait mou de *Garcinia Mangostana* 0 gr. 0996

Extrait mou de *Simarouba* 0 gr. 0498

Beurre de Cacao Q. S. pour 2 gr.

Propriétés. — Calmant du ténésme, du prurit anal, décongestionnant, désinfectant, cicatrisant de la muqueuse ano-rectale, vermicide, anti-helminthique. Non toxique.

Indications. — Toutes affections d'origine parasitaire (amibes, lamblias, trichomonas, etc.), oxyures, ascaris, tricocephales, prurit anal, ténésme rectal, rectites de toutes natures et origines.

Posologie :

Adultes : Un suppositoire chaque soir en se couchant. Série de 10 suppositoires.

Enfants : Un suppositoire tous les deux jours.

Première série de 5 suppositoires, repos 10 jours.

Deuxième série de 5 suppositoires, un tous les 2 jours.

Administration. — Mouiller légèrement le suppositoire et l'introduire le plus profondément possible.

Remarque. — La sensation de chaleur ou de fourmillement éprouvée parfois tient à l'action des principes actifs sur une muqueuse altérée. Ne pas s'en inquiéter.

Prix de la boîte de 10 suppositoires : 15 fr. 60.

Laboratoires de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII^e). Tél. : Dorian 75-52.

SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide de la douleur; anti-sepsie et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, Prurit anal, Fistules, Fissure, Plaies anales ou rectales, Prostatite, Cystite, Ténésme, Règles douloureuses, etc.

Posologie. — Délai nécessaire à l'action du suppositoire : 1/2 heure environ. Renouveler l'introduction d'un suppositoire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*. Dans les pays tropicaux où le suppositoire est inutilisable, y substituer la *Solution huileuse* introduite avec une poire.

Prix : 17 fr. 70 la boîte de 12 suppositoires.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr : Labobod — Paris.

SUPPOSITOIRES CALMOVARINE

Analgésiques et Sédatifs.

Composition. — Extractum viburnum Prunifolium, Extractum belladonæ, Novocaïnum, Extractum opii, Pomatum hydrargyricum gallicum, Extractum artemisiæ officinalis, Beurre de cacao.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique presque immédiat, Aucune toxicité, Aucune irritation pour les tissus, Administration facile, Décongestionnant fondant et cicatrisant.

Indications. — Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, Dysménorhées, Règles douloureuses, Ovaires sclérokystiques, Adhérences douloureuses, Hémorroïdes, Fissures anales, Spinctéralgies, Spasmes douloureux, Toutes affections et complications des appareils génitaux et urinaires chez la Femme, Douleurs du petit bassin, Blennorragie, Cystite, Prostatite, Affections de l'appareil urinaire chez l'homme.

Posologie. — Introduire dans le rectum tous les matins ou tous les soirs un suppositoire. Cas très douloureux : un suppositoire matin et soir suivant avis du médecin traitant.

Laboratoire CALMOVARINE

192-194, rue St-Denis — PARIS (II^e).

Tél. : Gut. 85-65.)

SUPPOSITOIRES CALMOPELVINE

Médication idéale de toute algie de la sphère pelvi-uro-génitale.

Composition. — Extrait de belladone ; Extrait thébaïque ; Camphre ; Extrait d'anémone ; Extrait d'hamamelis, Chlorydrate de para-hamino-benzoyl ; Diétyl ; Amino-éthanol ; Onguent hydrargyrique double ; Calmopelvine (Thiosulfonates de sodium).

Propriétés. — Aucune toxicité, aucune irritation pour les tissus, administration facile, très puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

Indications. — Blénnorrhagies aiguës, cystites aiguës, blénnorrhagies chroniques, prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, adénome, rétention, cancer de la vessie, endoscopie, affections du rectum et toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Introduire dans le rectum un suppositoire tous les matins ou tous les soirs en suivant les indications du médecin traitant.

Laboratoires CALMOPELVINE-CALMOVARINE

192-194, rue Saint-Denis — PARIS (II^e).

(Tél. : Gutenberg 41-01.)

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée et à tous les principaux médicaments, pour adultes et pour enfants.

Mode d'emploi. — Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'anus par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

Indications. — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments pour leur administration par la voie rectale.

Prix : *Adultes*, 8 fr. 55 ; *Enfants*, 6 fr. 40.

Durée moyenne : 12 applications.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol.

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 d'arsénobenzol.
Prix : 19 francs.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03 id.
Prix : 17 francs.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01. id.
Prix : 16 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

SUPPOSITOIRES DE CAMPHOCALYPTOL

Pour adultes. Pour enfants.

Application du traitement créosoté sous une forme *pratique, active, non caustique.*

Propriétés. — Antithermiques, bactéricides (pneumocoques), vermifuges (oxyures). N'incommodent pas le malade, car ils ne piquent pas.

Composition. — *Adultes*: Créosote, 0, 25 ; eucalyptol et camphre, à 0,03 ; stovaine, 0,005 pour 1 suppositoire.

Enfants: Le tiers environ des doses ci-dessus.

Indications. — Affections pulmonaires aiguës ou chroniques, Gripes, Bronchites, Complications grippales, Infections à pneumocoques et pour prévenir les accidents anesthésiques. Vermifuge très efficace contre oxyures.

Prix. — Suppositoires adultes ou enfants, la boîte : 16 fr. L. N. C. n° 314-42 et 43.

Laboratoire ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. Marcadet 14-14.)

SUPPOSITOIRES EUCALYPTINE

Antiseptique pulmonaire, Antithermique, Antioxydant.

Composition :

Eucalyptol	0,12
Acide phénique.....	0,01
Camphre	0,05
Gaiacol.....	0,05
Codéine	0,01
Larocaïne	0,001
Beurre de cacao.....	Q. S.

Pour 1 suppositoire.

Avantages. — Remplacent l'injection lorsqu'elle est impossible (notamment chez l'enfant) : éloignement, pusillanimité du malade, etc.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 4 suppositoires.

Enfants : 1 à 2 —

Indications. — Celles de l'*Eucalyptine*, c'est-à-dire les affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires. Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Tuberculose pulmonaire (dans certaines formes d'évolution à tendance scléreuse), Maladies infectieuses.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI°).

SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

2 Titrages :

Adultes : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal,

Enfants et Nourrissons : 0,03 Onguent napolitain, soit, 0,015 Hg. métal,

Originalité. — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

Présentation dissimulée. — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

Posologie. — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

Prescription. — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

SUPPOSITOIRES LOGEAI

Composition :

Marron d'Inde.....	0,04
Genêt	0,01
Cupressus.....	0,01
Jusquiame	0,012
Teskra.....	0,012
Lanoline anhydre.....	0,015
Extrait total d'hamamélis.....	0,33
Sulfoichtyolate de soude.....	0,33

Pour 1 suppositoire.

Indications. — Hémorroïdes internes et rectite concomitante, Prostatites.

Propriétés :

ATOXIQUES : Ni stupéfiant, ni adrénaline.

ANALGESIQUES : Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTS : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTISEPTIQUES : Action antiseptique de l'huile sulfitée sur la muqueuse rectale.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir, après lavage, un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Prix au public : 14 fr. 65.

Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAI

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

SUPPOSITOIRES MICTASOL

Réalisent la décongestion pelvienne et la sédation rapide des symptômes subjectifs et fonctionnels.

Composition :

Malva purpurea	0,50
Stovaïne.....	0,01
Extrait de Jusquiame.....	0,05
Ichtyol	0,25

Indications thérapeutiques. — Prostatisme vasculaire, rétentions, incontinence, cystites, séquelles de blennorragie, hémorroïdes.

Posologie. — 1 ou 2 par jour.

Laboratoire du MICTASOL

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptiques.)

Adrénaline	0 gr. 00015
Stovaïne	0 gr. 025
Anesthésine.....	0 gr. 025
Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé	0 gr. 05
Extrait d'Hamamelis.....	0 gr. 01

Pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi. — Introduire 1 ou 2 suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin 1 heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

N. B. — Action d'autant plus active qu'un lavement évacuant (de 100 gr.) à une température de 45°, aura précédé l'introduction de SUPPOSITOIRES MIDY.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, Astringents, Anesthésiques, Calmants, Antiseptiques.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Prix : 15 fr. 60. Durée du traitement : une semaine.
Remboursés à 80 % aux Assurés Sociaux (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram, PARIS (XVII^e). — Tél. : Etoile 51-37 et 38.

SUPPOSITOIRES PACHAUT

Huile de Palma Christi, Glycérine, Beurre de Cacao.

Traitement de la CONSTIPATION

S'introduisent par la grosse extrémité. Leur forme bi-conique spéciale permet, sous l'effet des contractions du sphincter, une ascension dans le rectum.

Présentation :

1° Boîte de 12 suppositoires pour *adultes*.

2° Boîte de 12 suppositoires pour *enfants*.

Prix :

Adultes : 12 fr. 25. — Enfants : 9 fr. 40.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS
(Tél. : Laborde 16-72.)

SUPPOSITOIRES PAUTAUBERGE

Composition. — Chaque suppositoire contient :

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants.</i>
Créosote de hêtre.....	0 gr. 40	0 gr. 125
Para-Amino-benzoate butylique.....	0 gr. 01	Néant.
Camphre du Japon.....	0 gr. 025	0 gr. 01
Gluconate de Calcium.....	0 gr. 50	0 gr. 25
Excipient au beurre de cacao.....	Q. S.	Q. S.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant et antithermique par sa créosote, reminéralisateur par son gluconate de calcium.

Indications. — Affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques de l'enfant et de l'adulte.

Action curative spécifique dans les affections à pneumocoques.

Action préventive des complications pleuro-pulmonaires de la grippe et des complications pulmonaires post-opératoires.

Posologie. — *Adultes* : un suppositoire matin et soir.

Enfants à partir de 2 ans : un suppositoire d'enfant matin et soir.

Nourrissons : 1/2 suppositoire d'enfant le soir.

Prix de la boîte : *Adultes*, 17 francs. — *Enfants* : 15 francs (5 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE
10, rue de Constantinople — PARIS.
(Tél. : Laborde 26-47.)

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao — Glycérine)
pour Bébés, pour Garçonnetts,
pour Adultes.

CONSTIPATION. HÉMORROÏDES

La boîte : 17 francs.

La 1/2 boîte : 10 fr. 15.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire.

PARIS

(Tél. : Wagram 33-70.)

SUPPOSITOIRES PYRAX

Médication sédatrice et antithermique de choix, complétée par une action tonique diurétique et désinfectante.

Aspirine, Quinine, Caféine.

Administration facile chez l'enfant.

Médication précieuse chez l'adulte.

Ne fatigue pas l'estomac. Respecte le foie.

Soutient le cœur. Favorise le rein et la fonction respiratoire.

Trois dosages : *Bébés* jusqu'à 3 ans. — *Enfants* au-dessus de 3 ans et *adultes*.

Présentation. — 3 étuis de 2 suppos par boîte.

Posologie. — 1 à 3 par jour.

Prix la boîte de six :

Bébés : 9 francs. — *Enfants* : 9 fr. 75. — *Adultes* : 12 francs.

Échantillons.

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (Seine-et-Oise).

(Tél. : Observatoire 01-83.)

SUPPOS SÉDABIOS

Présentation. — En boîtes de 3 et en boîtes de 10 suppositoires.

Principes actifs. — Même composition que le SÉDABIOS, mais à doses diminuées.

Indications. — Toutes les indications du SÉDABIOS : Préanesthésie et suites opératoires, Affections douloureuses, Prostatite, Cystite, Hémorroïdes, Rétention et affections gynécologiques.

Mode d'emploi. — 1 à 3 suppositoires par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

SUPPOTHERMOS LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	Adultes.	Enfants.	Bébés.
Bromhydraté de quinine	0,25	0,10	0,05
Amidopyrine	0,25	0,10	0,05
Phénacétine	0,25	0,10	0,05
Citraté de théine ...	0,10	0,05	0,02
Beurre de cacao. Q.			
S. pour	3 gr.	2 gr.	1 gr. 40

Actions thérapeutiques. — Antithermique et analgésique.

Indications. — Toutes les fièvres en général, Grippe, Infections purulentes, Courbatures fébriles, Maux de tête.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 6. *Adultes* : 14 francs. *Enfants* : 12 francs. *Bébé* : 10 francs (impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON

(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOTONIC LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	Adultes.	Enfants.
Méthylarsinate de soude.	0,05	0,025
Méthylarsinate de strychnine	0,001	Néant.
Nucléinate de soude ...	0,05	0,02
Nucléinate de manganèse	0,05	0,02
Glycérophosphate soude	0,10	0,05
Beurre de cacao. Q. S.		
pour	3 gr.	2 gr.

Actions thérapeutiques. — Tonique reconstituant. Antidépandeur.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, Rachitisme, Phosphaturie, Cachexies chroniques, Convalescences, Tuberculose pulmonaire, Dyspepsies atoniques, Paralysies d'origine périphérique.

Mode d'emploi. — 1 suppositoire le soir pendant 10 jours.

Prix et contenance

La boîte de 10. *Adultes* : 17 francs. *Enfants* : 13 fr. 50. (impôt compris).

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON. — Tél. : Moncey 14-35.

SUR-BI-CAL

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Cachets.

Composition. — Phosphate bicalcique, 0 gr. 50 ;
Solution d'adrénaline au millième, 1 goutte pour
1 cachet.

Propriétés. — Particulièrement assimilable en
raison de sa solubilité dans tous les acides faibles,
y compris les acides de fermentation.

Indications. — Toutes les indications des phos-
phates de chaux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cachets par jour
au milieu des repas.

Enfants : 1 cachet par jour.

On peut aussi délayer le contenu du cachet dans un
peu d'eau ou de lait.

Prix : 17 francs pour 20 jours.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

SUROXYDAL

Catalyseur suroxydant Dinitrophéno-Manganeux.

Présenté en tubes de 42 comprimés dragéifiés dosés selon le poids du sujet. (Un milligr. de Dinitrophénol par kilog. et par dragée.)

6 dosages : Tubes pour personnes pesant respectivement :

50 à 59 kg. (prix : 17 fr.) ; 60 à 69 kg. (18 fr.) ; 70 à 79 kg. (19 fr.) ; 80 à 89 kg. (20 fr.) ; 90 à 99 kg. (21 fr.) ; 100 à 109 kg. (22 fr.).

Économie. Un tube pour trois semaines de traitement.

Avantages. — De la spécialité et de la formule magistrale. Permet de réaliser la *Cure d'Amaigrissement* selon la *Méthode du Dr A. Marguet*, gage d'*Efficacité* et de *Sécurité*.

1° Restrictions alimentaires minima.

2° Doses de Dinitrophénol minima.

3° Elimination des sujets incapables de restrictions.

Posologie. — Débuter, après perte de poids par le régime seul, par 2 dragées par jour. Ne passer à trois que lorsqu'il y a amaigrissement inférieur à 2 kg. par mois et après mesure de la valeur exacte du régime.

Longues périodes de Désimprégnation obligatoires : 1 mois de repos après 3 mois à 2 dragées ou après 2 mois à 3 dragées.

Ne pas envisager de cures d'entretien de durée indéfinie pour corriger les reprises de poids par suralimentation. (Danger d'opacification du cristallin par surimprégnations prolongées).

Grosses améliorations à espérer, mais prudence particulière au début pour traiter les complications de l'Obésité : Cardiopathies, Fortes Hypertensions, Albuminuries notables.

Indications en dehors de l'Obésité : Augmentation des oxydations cellulaires ; suractivation des échanges nutritifs ; réchauffement corporel ; activation de la circulation périphérique ; action générale euphorique. (A la dose de 2 dragées par jour, pas d'amaigrissement avec régime normal).

Toutes les affections arthritiques. Rhumatisants frileux. Plaies atones. Ulcères variqueux, Acrocyanose. Engelures.

Etats nerveux dépressifs avec asthénie, anorexie, mélancolie.

Affections gastriques atoniques. Insuffisance hépatique avec intolérance pour les graisses. Enfants inadaptés urbains. Nourrissons débiles.

Séquelles de paralysie infantile, réveil de l'activité musculaire latente.

Echantillons. Littérature. Service gratuit de la *Revue de l'Obésité*.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments,
n° 1536/2/1, 2, 3, 4, 5, 6.

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoires C. LE FOLLET

NOZEROY (Jura).

(Tél. : Nozeroy 5.)

SURPARINE

Spasmodytique de choix.

Composition :

1 comprimé 0 gr. 06 de Perparine — 0 gr. 002 de Novatropine
 1 ampoule 0 gr. 04 de Perparine — 0 gr. 0015 de Novatropine
 1 suppositoire 0 gr. 04 de Perparine — 0 gr. 0015 de Novatropine
 0 gr. 015 d'acide phényléthylbarbiturique.

Mode d'action et avantages. — L'antispasmodique par excellence. La Perparine, d'effets comparables à ceux de la Papavérine, est 3 fois moins toxique pour une activité triple. Sans action sur le système nerveux central ne déterminant pas d'accoutumance, d'effet prolongé, sans réaction atonique secondaire, elle est administrable par voie buccale. La Novatropine, pour une toxicité 50 fois moindre, produit l'effet total de l'atropine.

Indications. — Tous les spasmes. Spasmes du pyloré et du cardia, vomissements, ulcus gastriques et duodénaux, hyperacidité, colites aiguës, constipation spasmodique, coliques hépatiques, cholécystites, crises d'asthme, spasme glottique, angiospasmé, dysphée paroxystique, angoisse, coliques néphrétiques, cystites, spasmes du col vésical, dysménorrhée, etc. Hoquet. Rétention gazeuse post-opératoire.

Références. — Communication à l'Académie de Médecine du 19 décembre 1933.

Posologie adultes. — La « SURPARINE » s'ordonnera de préférence avant les repas ou au moment des douleurs :

1° Per os : 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

2° En injection sous-cutanée ou intra-musculaire : 2 à 3 ampoules par jour.

3° Par voie intraveineuse : 1/2 à 1 ampoule.

4° En suppositoires, 2 à 3 par jour.

Il s'agit là de doses moyennes, qui peuvent être sensiblement augmentées selon les indications du médecin.

Posologie infantile. — a. *Nourrissons* : dans les vomissements habituels on donnera 1/4 comprimé dissous dans du lait avant chaque tétée, ou l'on fera une injection de 0 cc. 2 sous-cutanée. Dans ces deux cas on pourra répéter ces doses 3 à 4 fois par jour.

b. *Enfants* : jusqu'à 1 an, 1/4 comprimé ou 0 cc. 2 en injections sous-cutanées 3 à 4 fois par jour.

De 2 à 5 ans, 2 à 6 demi-comprimés ou 0 cc. 4 en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

De 6 à 12 ans, 2 à 4 comprimés ou 1 cc. en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

Présentation :

20 comprimés : 20 frs 80 : 100 comprimés : 93 frs 60

5 ampoules : 22 frs 90

6 suppositoires : 18 frs 75 : 30 suppositoires : 83 frs 20

SYNTHESIS

R.-L. MATHIVAT

Docteur en pharmacie Ex-Interne des hôpitaux de Paris

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Trocadéro 30-52 et 32-91)

SURPAVER

Chlorhydrate de papavérine pur associé au benzoate de benzyle.

Propriétés physiologiques :

Antispasmodiques agissant tous deux par leur groupement benzyle. Aucune toxicité sur le cœur ni les reins.

Indications :

Tous les spasmes de la musculature lisse. Spasmes bronchiques, vésicaux, du pylore. Cholécystites, Angiospasmes. Colites aiguës. Angine de poitrine. Hypertension.

Présentation :

Tube de 20 comprimés dosés à 0 gr. 04 de Chl. de papavérine et V gouttes de solution de benzoate de benzyle à 20 p. 100 par comprimé.

Posologie :

4 à 6 comprimés par jour suivant prescription.

Laboratoires J. LAVALLE

Docteur en Pharmacie

245, rue de Vaugirard — PARIS (XV°).
(Tél. : Suf. 78-88.)

SURRASTHÉNINE

Composition. — La Surrasthénine est à base d'Exo-Surrénine Byla, de quinine, de nucléinates, d'hypophosphites et de glycérophosphates, dont les propriétés toniques et reconstituantes sont universellement connues.

Indications thérapeutiques. — La Surrasthénine, médicament stimulant et tonique par excellence, est le véritable spécifique de *toutes les asthénies*, et notamment de l'asthénie post-grippale.

Posologie. — De goût très agréable, la Surrasthénine se prend dans un peu d'eau, *au milieu des repas du matin et de midi*, à la dose de 2 ou 3 cuillerées à dessert par jour pour les adultes, et de 2 cuillerées à café pour les enfants.

Prix : 22 fr. 90.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.
(Tél. : Danton 08-11.)

SURYALI

Granulé effervescent agréable. Se dissout dans peu de liquide.

Formule :

Tartrate sodique	30 gr.
Sulfate sodique.....	10 gr.
Bicarbonate sodique	16 gr.
Acide tartrique.....	18 gr.
Edulcorant	Q. S. P. 100 gr.

Indications. — Purgatif. Laxatif. Merveilleux et rapide décongestionnant du foie. Parfait diurétique.

Mode d'emploi. — *Pour le foie et comme laxatif :*

1 cuillerée à café tous les matins au réveil.

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe au réveil.

Apéritif : une demi-cuillerée à café un quart d'heure avant les repas.

Durée : 2 à 4 semaines.

P. BLOUIN, pharmacien

50, rue de Turenne — PARIS. Tél. : Archives 93-14.

Dépôt général : **DARRASSE Frères**

13, rue Pavée — PARIS. — (Tél. : Turbigo 84-40)

SYLCASE

Silicium, Calcium.

Formule du Docteur **CRETIN**.

Rachitisme, Décalcifications, Croissance, Fractures, Carie dentaire, Allaitement.

Evite l'hypertension.

Présentation. — Comprimés, granulés, poudre, ampoules injectables.

Posologie. — 1 à 5 comprimés ou cuillers à café par jour suivant l'âge, 1 ampoule par jour.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GRYSA

7, rue Saint-André — LE MANS (Sarthe).

C. LÉTANG

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Paris.

SYMPATHOCRINE

Médication Sympathico-régulatrice en Élixir.
Formule :

Ethylphénylmalonylurée.....	0,20
Extrait fluide de Passiflore	2,00
Alcoolé de Cratægus	2,00
Teinture de Jusquiame.....	0,80
Thyroïde (extrait glyciné).....	0,02
Ovaires { — — }.....	1,00
Surrénales { — — }.....	0,10
Excipient et parfum Q. S. pour 100 cc.	

Indications. — Troubles de la tonicité nerveuse, Etats anxieux, Émotivité, Troubles circulatoires, Palpitations, Vertiges, Rééducation du Sommeil.

Emploi. — 1 à 2 cuillerées à café au moment du coucher.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie
 37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).
 (Tél. : Marcadet 10-23.)

SYMPATHORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance sympathique.

Formule :	Salicylate d'ésérine.....	1/10 de mgr.
	Lobe postérieur d'hypophyse	0,002
	Camphre monobromé.....	0,10
	Glycérophosphate de Manganèse	0,02
	Valérianate de Zinc	0,025
	Extrait de Basilic	0,01
	Extrait de Ballote	0,01
	Extrait de Passiflore	0,03
	Poudre de Guarana	0,015
	Poudre de Fenugrec désodorisé	0,03
	Poudre de Jusquiame.....	0,015

Par comprimé dragéifié.

Indications. — SYMPATHICOTONIE. Hyperémotivité, Hyperactivité, Hyperesthésie, Fausse angoisse, Agitation, Tremblements, Sommeil capricieux, Spasmes, Instabilité des fonctions gastro-intestinales, Douleurs épigastriques, précordiales, neurotonie à prédominance sympathique.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix : 18 fr. 75 (40 dragées par boîte).

Pour les Vagotoniques, voir : VAGORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le N° 988-I.

Laboratoire FOSSET

21, Grande Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél. : 11.)

SYMPATHYL

Synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

Forme. — Comprimés.

Indications principales. — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Éréthisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires et toutes insomnies d'origine neuro-végétative.

Composition :

Extrait spécial de cratægus	0,06
Extrait de boldo	0,01
Phénylméthylmalonylurée	0,01
Hexaméthylènetétramine	0,06
Peptone polyvalente	0,03

Pour 1 comprimé.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

Prix : 19 francs le tube de 40 comprimés.

Produits Innothéra

Laboratoire CHANTEREAU

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

SYMPAX

Troubles du système Vago-Sympathique.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Extrait valériane stabilisée, Extrait Jaborandi, Extrait passiflore, Extrait de Cratægus, Extrait de ballote, Extrait muguet, Phényléthylmalonylurée, Bromhydrate de quinine, Bromure de camphre, Anémone pulv.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour, à prendre avant les repas, selon les indications du docteur.

Indications. — Céphalées, Vertiges, Insomnies, asthénie, Dépression générale, Anxiété, Angoisse, spasmes, artériosclérose, hypertension, Sédatif nerveux.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-20.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

SYNCRINES CHOAY

Nature. — Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes glandulaires.

Formes pharmaceutiques et posologie :

Cachets et Comprimés, en tubes hermétiques :
2 à 4 par jour.

Ampoules injectables, désalbuminées, stérilisées : 1 cc. tous les 2 jours.

Nomenclature des principales formules :

- 1..... Pluriglandulaire F.
- 1 *bis.*.. Pluriglandulaire M.
- 2..... Surréno-Hypophysaire.
- 2 *bis.*.. Thyro-Hypophysaire.
- 3..... Thyro-Surréno-Hypophysaire.
- 3 *bis.*.. Thyro-Surréno-Ovariennne.
- 4..... Thyro-Ovariennne.
- 4 *bis.*.. Surréno-Ovariennne.
- 5..... Thyro-Orchitique.
- 5 *bis.*.. Surréno-Orchitique.
- 6..... Hypophyso-Orchitique.
- 6 *bis.*.. Hypophyso-Ovariennne.
- 7..... Thyro-Hypophyso-Ovariennne.
- 7 *bis.*.. Thyro-Hypophyso-Orchitique.
- 8..... Pluriglandulaire digestive.
Peptosthénine (Voir ce mot).
- 9..... Surréno-Hypophyso-Ovariennne.
- 10..... Placento-Mammaire.
- 11..... Ovaro-Mammaire.
- 12..... Spléno-Médullaire.

Boîte de 24 cachets ou de 30 comprimés.

Boîte de 6 et de 12 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e)
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

SYNTHEMA

L'Hématopoiétique intégral.

Composition. — Une dragée contient : 0,150 de muqueuse gastrique spécialement préparée ; 0,020 de protosalate de fer ; 0,0002 de sulfate de cuivre ; 0,001 d'hypophosphite de manganèse.

SYNTHEMA réalise ainsi la synthèse des grands principes hématopoiétiques de l'organisme sain.

Mode d'action et avantages. — 1^o SYNTHEMA reconstitue et catalyse la fonction hématopoiétique. — 2^o SYNTHEMA augmente la qualité hématique par élévation rapide du taux de l'hémoglobine. — 3^o SYNTHEMA suractive le métabolisme général, et, partant, fortifie l'organisme. Action particulièrement rapide.

Indications. — Anémies secondaires de toute origine, médicales, chirurgicales, obstétricales, Asthénies, surmenage, convalescences, Anorexies, amaigrissement, lymphatisme, rachitisme, troubles de croissance. Cachexie infectieuse ou néo-plasique.

Aucune contre-indication. Pas d'action secondaire indésirable.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 dragées après chacun des trois principaux repas. *Enfants* : jusqu'à 6 ans : 3 dragées par jour ; jusqu'à 12 ans : 5 dragées par jour.

Présentation. — Boîte de 100 dragées.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE. M. Lefebvre, Pharmacien,
25, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Tél. : Ségur 60-77.)

SYNTROPAN « ROCHE »

Composition. — Phosphate de l'ester-β-diéthylamino-2,2-diméthyl-propylique de l'acide tropique.

Propriétés. — Antispasmodique puissant, d'action qualitativement voisine de celle de l'atropine, sans action sur la pupille (mydriase), sur la sécrétion salivaire et sur la pression sanguine.

Indications. — Tous les Spasmes, estomac, pylore, cardia, Constipations spasmodiques, Coliques, Dysménorrhée, Ulcères, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Comprimés* à 2 cgr. : 1 à 3 par jour. — *Ampoules* de 1 cc. à 1 cgr. : 1 à 3 par jour. — *Suppositoires* à 3 cgr. : 1 à 2 par jour, selon les cas.

Ampoules (boîte de 6). Comprimés (flacon de 20). Suppositoires (boîte de 6).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les Nos 504-66 (comprimés), 504-68 (ampoules), 504-69 (suppositoires).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

SYPHONÉOL

Pilules de protolodure Hg, arrhénal, Fer, Quinquina.

Propriétés thérapeutiques. — Cure d'entretien de la syphilis, Anémie, Asthénie, Action régulatrice sur le métabolisme. Cure préventive des néoplasmes (théorie de Pfeiffert). Paludisme. Ulcères variqueux.

Posologie. — 1, 2 ou 3 pilules par jour 1 heure avant le repas, midi et soir.

Prix : 16 francs le flacon de 30 pilules.

Pharmacie BAUDE
SAINT-AUBERT (Nord).
(Tél. : 16.)

SYSÉROS

Composition. — Hông Nan, Berce, Cascarille.

Indications. — Le *Syséros* est un stimulant de la sécrétion et de la motricité de l'appareil génital. Le *Syséros* est d'une efficacité certaine dans le traitement de l'impuissance. Aphrodisiaque le plus énergique, le plus rationnel avec absence complète de toxicité.

Posologie. — De 6 à 8 pilules par jour, avant les repas. Cette dose, le cas échéant, pourra être élevée jusqu'à 10 pilules, sans qu'on ait à craindre d'effet nocif de cette augmentation.

Le tube compte-pilules contient 60 pilules dragéifiées.

Prix : 30 francs.

L. N. C. 428-10.

Laboratoire du Docteur A. VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

Tél. : Odéon 18-54.

TABLETTE PERROUD

La « Tablette Perroud » est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *Gastralgie*, *Hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la « Tablette Perroud » rendra toujours de réels services.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire PERROUD

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON
(Anciennement 3, rue Sébastien-Gryphe.)

TABLETTES HOVA

Composition. — Dialysés de H^oOublon et de VALériane.

Propriétés. — Sédation inoffensive et progressive du système nerveux.

Indications. — Toutes les affections d'origine nerveuse : surexcitations, insomnie, neurasthénie, troubles de la ménopause, angoisses, cure de désintoxication.

Avantages. — Produit naturel d'une innocuité parfaite, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

Posologie. — 1° Sédatif :

Enfants : 1 à 2 tablettes trois fois par jour.

Adultes : 2 à 4 tablettes quatre fois par jour.

2° Hypnotique :

Adultes : deux fois 3 tablettes le soir dans l'intervalle d'une heure.

Ces doses peuvent être élevées et prolongées sans inconvénient.

Laboratoire ZYMA

Dépôt général

Laboratoires LOBRU

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

TABLETTES SÉDATIVES ROBIN

(Formule du Docteur BOUSQUET)

Composition. — Comprimés, dosés à 0,02 Chlorhydrate d'Ethylmorphine (méthylcodéine, non stupéfiant).

Indications. — Toux et douleur de toute nature.

Posologie. — Dose quotidienne : 3 à 4 tablettes (*adultes*).

Prix : 21 fr. 85.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

TABLETTES ZEVA

Formule. — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits secs d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola, Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

Présentation. — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr. 03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

Posologie. — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois. (Aucune contre-indication.)

Indications. — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 16 francs.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or Strasbourg 1927.

TACHYGASTRINE DUCLOY

**Accélérateur physiologique des sécrétions
gastriques totales.**

Forme. — Ampoules buvables.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-Albumoses-chlorures de sodium-magnésium-calcium.

Propriétés thérapeutiques. — *Eupeptique complet excitant ; des nerfs gustatifs et sécrétoires par l'acide fumaro-protocétrarique amer et antinauséux ; de la sécrétion acide par les alcalins choisis ; de la sécrétion peptique par l'albumose.*

Indications. — *Toutes les insuffisances sécrétoires de l'estomac :*

Primitives : Dyspepsies et gastrites qui s'accompagnent d'hypo-pepsie ou d'apepsie, d'hypochlorhydrie ou d'anachlorhydrie, d'achylie, atonie gastrique — cancer de l'estomac.

Secondaires : Intoxication cancéreuse quelle que soit la localisation du néoplasme ; — dyspepsie et anorexie des tuberculeux, des chloroanémiques, des névropathes, des enfants débilités ou rachitiques, des femmes enceintes, des brightiques anorexiques, des convalescents, des nourrices ; diarrhées gastrogènes des achyliques, des gastro-entérostomisés, des nourrissons ; — anorexie et dyspepsie des nourrissons ; — anaphylaxies.

Contre-Indication. — Hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Posologie :

Adultes : Une ou deux ampoules avant les repas.

Prendre le médicament *dix minutes avant les repas* matin, midi et soir ou midi et soir seulement ; dans une demi-tasse à thé (50 à 60 cm.) d'eau bien chaude ou mieux de bouillon de viande ou de légumes non salé.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée sans inconvénients.

Nourrissons : V gouttes 2 à 3 minutes avant chaque tétée dans une cuillerée à café d'eau.

Enfants : De 5 à 12 ans accomplis : VIII gouttes par année d'âge, 5 minutes avant les repas principaux.

A partir de 12 ans : comme chez l'adulte.

Prix : 31 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

TÆNIFUGE BARDET

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

Diplôme d'Honneur, Paris 1931.

Composition. — Préparation liquide à base d'Aspidium Filix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

Indications. — Médication anthelminthique complète : Tænias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales et tous parasites intestinaux.

Présentation. — Dans la même boîte se trouvent :
a) Le Tænifuge proprement dit; b) Le Purgatif.

Posologie. — **Tænias** — La veille, alimentation lactée. Absorber à jeun en 2 fois, à 20 minutes d'intervalle le Tænifuge aux doses suivantes :

Adultes : la totalité du contenu du flacon.

Adolescents de 15 à 20 ans : 8 à 10 cuillerées à café.

Enfants de 10 à 15 ans : 6 à 8 cuillerées à café.

Enfants de 3 à 10 ans : 2 à 6 cuillerées à café.

Une heure après, prendre le Purgatif mélangé à une infusion tiède, aux doses respectives suivantes : contenu du flacon, 4 à 5, 5 à 4, 1 à 3 cuillerées à café.

Tous les autres vers. — Pendant 4 à 5 jours consécutifs, donner le Tænifuge le matin à jeun aux doses suivantes :

Adultes : 1 cuillerée à soupe ;

Adolescents de 12 à 20 ans : 1 cuillerée à dessert ;

Enfants de 3 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Le 5^e ou 6^e jour, administrer le Purgatif à jeun, aux doses ci-dessus. Renouveler le traitement, plusieurs fois s'il y a lieu, à intervalle de 10 jours maximum.

Formuler : « TÆNIFUGE BARDET ».

Laboratoire National de Contrôle 518-1 et 2.

Echantillon et Littérature détaillée :

LABORATOIRES BARDET

Fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

TÆNIFUGE CASTEL

Cachets

Composition :

Cachet Rose (Laxatif).

Cascara sagrada pulv...	0 gr. 30	Scamonnée résine pulv..	0 gr. 20
Podophylline.....			0 gr. 02

Pour 1 Cachet.

Cachets Gris (Taenifuges).

Filicine pulv.....	2 gr. 50	Calomel chimiquement pur.....	0 gr. 30
Oxyde stanneux pur.....	2 gr.	Thymol.....	0 gr. 10
Etain pulv. pur.....	2 gr.	Aspidium pulv.....	2 gr.

Pour 9 Cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des taenias de toute espèce.

Présentation. — Tube aluminium contenant 1 cachet rose (laxatif) et 9 cachets gris (Taenifuges).

Mode d'emploi (*Adultes* seulement). — Médicament très bien supporté, efficace et inoffensif. Après un repas du soir peu abondant, prendre le cachet rose avec une infusion. Dès le lendemain matin, l'effet laxatif obtenu, absorber de 10 minutes en 10 minutes chacun des 9 cachets gris avec un peu de café, d'eau ou d'infusion. Ne prendre aucun purgatif huileux ni aucun aliment avant le repas de midi qui sera normal.

Prix : 22 francs.

Laboratoires CASTEL, 1, place Bouquerie — NIMES

A. CASTEL, Pharmacien. Ingénieur-Chimiste, Licencié ès Sciences.

TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

Indications. — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

Caractéristiques. — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt de travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

Mode d'emploi. — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

Doses. — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* de 7 ans à 11 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 15 fr. 50.

Unité de vente : 1 traitement pour adultes.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 146-2.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

TÆNIFUGE DU D^r JACQUÈME

Composition :

Liquide en capsules à base d'*Aspidium Filix Mas* et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

Indications :

Expulsion radicale du Tænia.

Avantages :

Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

Mode d'emploi :

Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

Effet : deux heures au maximum.

Prix : 26 francs.

Temps de conservation : un an.

Préparé par

E. LARROUYET, Pharmacien

Laboratoires CHIARINI

68, bd du Roi-René — AIX-EN-PROVENCE

(Tél. : 3-95.)

TÆNIFUGE KIRN

En capsules

à base de *filicine*, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des ténicides, comme la pelletière.

(Travaux de thèse de Kirn et Schmidt).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1° Avant-veille, purgation ; 2° la veille, diète presque absolue (lait) ; 3° le matin à jeun l'absorption, de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

Enfants : Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires.

Prix : *Adultes* : 21 fr. 30. — *Enfants* : 16 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-S/S. (Tél. : Auteuil 11-86.)

TÆNIFUGE LARIX

(en 5 capsules).

Expulsion du *Tænia* en 2 heures.

Composition. — Extrait de fougère mâle, calomel, éther et chloroforme. Prix : 13 fr. 50.

Indications. — *Tænia*s, ankylostomes, parasites intestinaux.

Posologie. — *Adultes* : les 5 capsules, une toutes les 2 minutes.

Jeunes gens au-dessus de 16 ans : 4 capsules.

Enfants âgés de 10 ans : 3 capsules. Ne pas en donner aux enfants âgés de moins de 10 ans.

Une demi-heure après l'absorption de la dernière capsule 10 à 15 gr. sulfate de soude (*enfants*) ou 10 à 15 gr. eau-de-vie allemande (*adultes*).

La veille s'être tenu à la diète depuis midi, sauf café, thé, lait. Si nausées pendant l'absorption des capsules, prendre limonade ou champagne. Observer diète hydrique durant la journée d'évacuation du *Tænia*. Durée du traitement : 24 heures.

Laboratoires Félix ABADIE

20, rue Thiers — TARBES, (Htes-Pyr). (Tél. : 1-39.)

TAMAR INDIEN GRILLON

Laxatif végétal doux et agréable.

Présentation. — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au séné ; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

Doses. — Un bonbon le soir en se couchant.

Enfants : un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir,

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances Sociales.

Société du TAMAR INDIEN GRILLON

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

TAMARINE

Délicieuse confiture laxative à base de Casse muette et de Tamarin, infailible dans tous les cas de constipation et de stases intestinales.

Posologie :

Enfants au-dessus de 5 ans : 1/2 cuillerée à café.

Adultes : 1/2 à 1 cuillerée à café à la fin du repas du soir.

Prix : 14 fr. 45.

Laboratoire de la TAMARINE

4, route du Médoc

LE BOUSCAT, près Bordeaux.

TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

Le *Tampol « Roche »* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet. (Boîte de 6.)

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol « Roche »* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

N. B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol « Roche »* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-42.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

TANNO-CALCINE

Médication reminéralisante.

Gluconate de Ca, Phosphate de Ca. Extrait hépatique, Tannin purifié.

2 formules :

TANNO-CALCINE A contenant 0,05 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

TANNO-CALCINE B contenant 0,15 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

Indications. — Convalescence, Grippe, Surmenage, Tuberculose, Croissance, Lymphatisme, Adénopathie.

2 cachets par jour.

Prix : 12 fr. 80.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-s-SEINE

(Tél. : Auteuil 11-86.)

TANNURGYLdu Docteur **LE TANNEUR****Sel de Vanadium non toxique.**

Tonique général puissant avec modification humorale profonde.

Indications. — Colibacillose, Déficience organique.

Posologie :

Adultes :

1 ^{re} Sem.	10 gttes	par repas.	} Doses élevées et progressives nécessaires.
2 ^e	— 20	—	
3 ^e	— 30	—	
4 ^e	— 40	—	

Enfants : demi-dose.

Nourrissons : 1/4 de dose dans le biberon.

Prix : Grand flacon : 23 francs. Petit flacon : 14 francs

Durée : 20 à 30 jours.

Renseignements médicaux : **D^r LE TANNEUR**,

87, avenue Borriglione — NICE.

(Vente : **FAURE et DUSSUEL, Pharmaciens**)

AIX-LES-BAINS (Savoie).

TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

Forme. — Cultures liquides.

Composition. — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assiègent l'individu continuellement.

Indications. — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites colibacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

Posologie. — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récurrence.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Laboratoires MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 09 83.)

TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur à faire dissoudre au moment de l'emploi.

Conservation parfaite.

Indications. — Épilepsie, troubles névropathiques.

Présentation. — En boîtes de 30 tubes dosés à : 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr.

Posologie. — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité, doit être pris chaque jour sans interruption jusqu'à guérison.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre le contenu d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

(Tél. : Laborde 16-72.)

TARTROBOROL

Composition. — Tartrate borico-potassique.

Indications. — Traitement des Maladies nerveuses : Épilepsie, Hystérie, Névroses, Danse de Saint-Guy, Affection de la moelle épinière, Convulsions, Vertiges, Eblouissements, Fatigue cérébrale, Migraines, Insomnie, Spermatorrhée, etc.

Posologie. — Comprimés dosés à 0 gr. 50. 2 gr. par jour pour les enfants, soit 4 comprimés. 4 gr. par jour pour les adultes, soit 8 comprimés. Jusqu'à 10 gr. par jour, chez les adultes sans aucun danger.

Les prendre avant les repas du matin, de midi et du soir. Faire dissoudre le nombre de comprimés fixé dans un verre d'eau sucrée ou non, chaude ou froide, ou dans une infusion et on avale.

La solution n'a aucun mauvais goût.

En flacon de 60 comprimés. Prix : 14 fr. 55.

L. N. C. 428-3.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

TAXOL

Composition :

Poudre de muqueuse intestinale	0 gr. 05
Extrait biliaire.....	0 gr. 10
Agar-Agar	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance.

Indications. — Constipation, Entérite chronique, Entérocolite, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par deux comprimés par jour après un des repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées.)

TEINTURE DE COCHEUX

(Origine 1832)

Goutte, Arthritisme, Rhumatisme.

Composition. — Teinture alcoolique de colchique d'automne privée de son principe drastique ; c'est la mieux supportée des préparations à base de **Colchicine**. Elle n'occasionne aucun trouble.

Au Congrès de la Goutte, à Vittel, en 1935, plusieurs rapporteurs ont parlé de la « Colchicine, spécifique de la Goutte ».

En reconnaissant, il y a peu de temps, l'action désensibilisatrice très efficace de la Colchicine, on a établi scientifiquement la valeur thérapeutique de la Teinture de Cocheux empiriquement adoptée jusqu'alors.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau sucrée, à jeun. Souvent il est bon de prolonger la cure.

En pharmacie : flacon de 180 cc. et demi-flacon.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-36.)

TENSÉDINE

Médication sédatrice, antispasmodique et régulatrice du tonus artériel.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Pour un comprimé :

Crème de tartre soluble	0,15
Aminophylline	0,03
Ether trinitrique de la glycérine.....	1/2 goutte
Phényléthylmalonylurée	0,005
Bromure d'acétylcholine.....	0,0025
Extrait de pancréas.....	0,20
Extrait de muscle strié	0,05

Indications. — Hypertension artérielle et ses troubles fonctionnels. Troubles vaso-moteurs et spasmes vasculaires. Artério-sclérose, Aortites, Artérites. Troubles de la circulation périphérique. Troubles de la ménopause. Maladie de Raynaud.

Posologie :

Dose moyenne : 2 comprimés au début de chacun des trois repas. Dose d'entretien : 3 comprimés par jour, une semaine sur deux.

Prix : 19 fr. 20.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, av. de Ségur — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 52-73.)

TENSOL

Composition. — Association synergique de médicaments hypotenseurs (Cholalate de soude, Silicate de soude, Iode organique). Sédatifs antispasmodiques (dérivés barbituriques, Benzoate de Benzyle), Tonicardiaque, Diurétique (Spartéine, Carbonate de Lithine).

Présentation et doses. — Médication par voie buccale, 4 à 6 comprimés par jour, par 2 à la fois.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension, Arthritisme, Asthme et tous les accidents secondaires qui en découlent, d'origine artérielle, cardiaque, cervicale, rénale, nerveuse et pulmonaire.

L'étui de 48 comprimés : 17 fr. 45.

Laboratoire d'Actino-Biologie

LAURENÇON et Cie, Pharmaciens

11, rue François-Giraud,

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

TENSORYL

Médication hypotensive.

Composition. — Complexe végétal-minéral à base d'éléments hypotenseurs et régulateurs de l'appareil cardio-vasculaire, présenté en pilules glutinisées renfermant :

Silicate de soude	0,10
Nitrite de soude	} à 0,05
Poudre de scille	
Extrait stab. Cratægus.....	} 0,05
— — Gui	
— — Muguet	

Indications. — Hypertension en général, Spasmes artériels, Angine de poitrine, Artério-sclérose et ses complications.

Emploi. — Une ou deux pilules avant chacun des trois repas pendant 10 jours par mois.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-3.

Prix : 17 fr. 60 l'étui de 60 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS — (Roq. 49-22.)

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,
Docteur en Pharmacie.

TERBINTHIOL THOMAS

Présentation et composition. — Capsules à base de sulfure de térébenthène ($C^{10}H^{14}S$), soit 19 % de soufre inoxydé (Thèse de Paris, D^r Lefèvre, 11 juillet 1934).

Propriétés. — Le TERBINTHIOL apporte à l'organisme du soufre organique inoxydé indispensable au métabolisme cellulaire et à la neutralisation de toxines et déchets.

Indications. — Cholagogue. Cholérétique.

Infections hépatiques et vésiculaires.

Lithiases biliaires et rénales.

Infection de l'appareil urinaire.

Gonorrhée.

Colibacillose.

Rhumatismes et tous états uricémiques.

Posologie et mode d'emploi. — *Dans les cas aigus* : 6 capsules par jour en trois fois aux repas.

En dehors des cas aigus : 3 capsules par jour en trois fois aux repas, 20 jours consécutifs par mois.

Remarque. — Faire continuer le traitement malgré les éructations qui pourraient être signalées et qui ne constituent pas un signe d'intolérance.

Prix : 16 francs les 50 capsules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 650-10,

Assurances Sociales : Catégorie B remboursée à 80 %.

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. Provence 49-77.)

TERCODAL

Traitement symptomatique des toux, bronchite, catarrhe, asthme, Emphysème.

Formule :

<i>Sirop.</i>		<i>Comprimés.</i>	
Benzoate de soude.....	4,16	Ephédrine	0,003
Codéthyline	0,042	Terpine	0,10
Anesthésine	0,04	Aconit (extrait)	0,001
Peptone	1,666	Codéthyline.....	0,003
Teinture racine aconit...	0,833	Excipient Q. s. p. un	
Teinture drosera	0,833	comprimé terminé à ..	0,35
Teinture de belladone....	0,833		
Sirop de tolu	45, gr.		
Sirop capillaire	45, gr.		
Excipient.. Q. S. pour...	100 gr.		

Prix : 12 fr.

Prix : 15 fr.

Posologie :

Sirop : *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 10 à 17 ans, 3 cuillerées à dessert.

Comprimés : avaler sans croquer 5 à 6 comprimés entre les repas par jour.

Enfants à partir de 5 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

TERKAL MONAL

Sédatif de la toux.

Forme. — Dragées.

Composition. — Carbonate de gaïacol terpino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

Propriétés. — Calmantes, Expectorantes, Antiseptiques, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Le flacon de 30 dragées : 12 fr. 80.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

TERPINE GONNON

Présentation et composition. — *Elixir* : Terpène et sirop de Tolu (1 verre à liqueur = 0 gr. 20 de terpène).

Granulé : Terpène, Phosphate de codéïne, Aconit, Tolu, Polygala, Erysimum et galacosulfonate de potassium.

Pilules : Terpène, 0 gr. 10 ; Codéïne, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

Pâte : Terpène, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

Pastilles : Terpène 0 gr. 05 et Tolu.

Propriétés thérapeutiques. — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

Posologie :

Prix public.

Elixir : 2 à 4 verres à liqueur par jour (pour 8 jours environ). 24 fr. 50

Granulé : 5 à 6 cuillerées à café par jour (pour 8 jours environ). 14 fr. 75

Pilules : 4 à 6 pilules par jour (pour 12 jours environ). 11 fr. »

Pâtes : 15 à 20 morceaux par jour (pour 4 jours environ). 7 fr. »

Pastilles : 8 à 10 pastilles par jour (pour 6 jours environ). 7 fr. »

Indications. — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphysème.

Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

Produit GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

TERPINE GRANULÉE BARON

Composition. — Terpène pure et benzoate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique des voies respiratoires, facilite l'expectoration et tarit les sécrétions bronchiques ; diurétique et antiseptique urinaire.

Indications. — Rhinites, Laryngo-Trachéites, bronchites aiguës, subaiguës, chroniques ; Catarrhe bronchitique des emphysémateux ; Bronchorrée ; Dilatation des bronches ; Coqueluche ; Cystites ; Infections urinaires, etc...

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : demi-dose.

Prix : 13 fr. 50 les 125 grammes.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

(Tél. : Gobelins 39-44.)

TERPOXYL EXTERNE

du Docteur Barinque.

Liquide générateur d'oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.

Composition. — Solution alcoolique faible de terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 00384 pour 10 gr.

Propriétés. — Bactéricide désinfectant et désodorisant parfait pour toutes plaies, même cancéreuses, cicatrisant rapide, atoxique et non caustique.

Indications. — Plaies, Ulcères variqueux, Gerçures des seins, Blennorrhagies, Affections de la peau, de la gorge, Angines, Coryzas, Otites, Pyorrhées alvéolaires, etc.

Posologie. — En solution de concentration croissante depuis 1/10 de TerpoxyL externe pour 9/10 d'eau bouillie ou distillée jusqu'à 1/2 ou pur suivant la sensibilité de la muqueuse traitée.

Prix du flacon : G. M., 18 fr. 50; P. M., 7 fr. 50.

OVULES au TERPOXYL

du Docteur Barinque.

Antiseptiques — Cicatrisants — Désodorisants.

Indications. — Leucorrhée, Métrites, Salpingites, etc.

Prix de la boîte de 8 : 16 francs.

TERPOXYL INTERNE

du Docteur Barinque.

Cède son oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.

Composition. — Solution alcoolique faible de Terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 00096 pour 10 gr.

Propriétés. — Anti-thermique, anti-toxique, bactéricide, tonique et vitalisant.

Indications. — Toutes dépressions ; choc hémoclasique ou autres ; Pneumonie (régression fébrile rapide). Toutes maladies infectieuses.

Posologie. — *Fièvre intense* : XV gouttes toutes les heures dans 1/2 verre d'eau sucrée ; espacer avec la régression fébrile.

Tonique : XV gouttes, quatre fois par jour.

Prix du flacon : 13 fr. 50.

Durée : 12 à 15 jours.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI°).

(Tél. : Danton 49-39.) — L. N. G. M. 40-2-3-4.

TÉTRANITROL ROUSSEL

Composition :

Comprimés de Tétranitrates d'Érythrol à
1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

Indications :

Hypertension : Angine de poitrine,
asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

Doses et mode d'emploi :

Laisser fondre les comprimés sur la langue
(de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Comp. à 1-2-5 mmgr. et 1 centgr.

Prix: 12 fr. 50 ; 15 fr. ; 18 fr. ; 25 francs.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 62-27.)

THAOLAXINE

(Laxatif-régime.)

Combinaison d'agar-agar et extrait de rhamnées.
Paillettes, cachets, comprimés, **granulé**.

Doses et mode d'emploi. *Paillettes*, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas ; *cachets*, 1 à 4 cachets à chaque repas ; *comprimés*, 2 et 8 comprimés à chaque repas ; *granulé*, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés thérapeutiques. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix :

Thaolaxine paillettes { La boîte : 16 fr. 15,
 { La boîte triple dose : 34 fr. 35.

Société Industrielle de thérapeutique scientifique appliquée.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

THÉÏSINE DUBAT

Granulé de Théobromine pure et Extrait de maïs.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

Indications. — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

Doses. — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

Cuillerée à café = $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 25 \text{ théobromine pure.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ extrait de maïs.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ phosphate de soude.} \end{array} \right.$
Prix : 17 francs.

Échantillons sur demande.

LABORATOIRE DU D^r DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 13-03.)

THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Diurétique puissant.

Indications. — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

Formes. — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e)
(Tél. : Arch ves 18-67.)

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé pur.

Propriétés. — 1° En raison de sa solubilité, la *Théobromose* agit plus rapidement que la théobromine et à des doses 4 fois moindres ; 2° En raison de cette solubilité et des faibles doses thérapeutiques nécessaires, elle est toujours bien tolérée.

Indications. — Dans tous les cas où l'on veut obtenir une action diurétique (urémie, artériosclérose, etc...).

Formes. — *Solution* 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.
Comprimés, 2 à 6 par jour.

et **PACHETS DE THÉOBROMOSE « N »**

(forme nouvelle).

Formule :

Théobrominate de lithium	0,25
Citrate de calcium	0,25
Citrate d'hexaméthylènetétramine	0,25
par cachet (1 à 3 par jour).	

Indications. — La *Théobromose « N »* permet d'obtenir, outre une action diurétique puissante, l'antisepsie du système réno-vésical et une désintoxication générale.

Enreg. au Lab. Nat. de Contr. des Médicaments sous les Nos 1-7, 1-5 et 1-13.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS (IV°).

THÉOBRYL « ROCHE »

Composition. — Allylthéobromine injectable (0 gr. 10 Théobryl Roche = 0 gr. 50 théobromine).

Propriétés. — Prépare, supplée ou continue l'action de la digitale.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiorénales, les cardiopathies artérielles, l'asystolie des vieillards, toutes les néphrites et surtout les néphrites hydropigènes, œdèmes viscéraux, etc.

Pesologie et modes d'emploi. — *Voie injectable :* Adultes : 1/2 à 1 ampoule 2 à 4 fois par jour, *Enfants :* 1/4 ou 1/2 doses.

Voie buccale : Adultes : X gouttes 4 à 8 fois par jour. *Enfants :* V gouttes 2 à 4 fois par jour dans une tisane diurétique quelconque.

Ampoules de 2 cc. (boîte de 6) ; gouttes (flacon de 40 cc.).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les Nos 504-44 (ampoules), 504-45 (gouttes).

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Arch. 91-10.)

THÉOCARDINE LALÉUF

Composition. — Association : *Théobromine et Crino-cardine.*

Propriétés et indications. — Diurétique puissant, déchlorurant de premier ordre. Action toni-cardiaque s'exerçant sur la contractilité du myocarde.

Toutes les indications de la *THÉOBROMINE*, en tenant compte toutefois que la *THÉOCARDINE LALÉUF* agit mieux, plus vite, à doses beaucoup plus faibles, sans provoquer de phénomènes d'intolérance.

Remède de choix du **CARDIO-RÉNAL.**

Forme. — Dragées à noyau glutinisé.

Trois formules différentes : Simple, Digitalique, Sparteinée.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 8 dragées par 24 heures (suivant avis du médecin traitant).

Durée moyenne des unités de vente : 15 jours.

Prix de vente au public ;

Étui de 60 dragées : 22 fr. 50.

Laboratoires LALÉUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trôcadéro : 62-24.)

THÉOPHYLLINE BRUNEAU

Médication pulmonaire et cardio-rénale.

Solution injectable par voie veineuse ou intramusculaire.

Présentation et composition. — 5 ampoules de 4 cc. à 6 p. 100 (24 centigr. de théophylline par ampoule).

Indications.

Affections pulmonaires : crises d'asthme, respiration de Chéynes-Stocke, paralysie respiratoire, dyspnée d'origine centrale.

Affections cardiaques et vasculaires : insuffisance cardiaque, asthme cardiaque, sclérose pulmonaire, oppression douloureuse des cardiaques.

Affections rénales : œdème cardiaque et rénal, oligurie des maladies infectieuses, tous les cas d'insuffisance du débit urinaire.

Mode d'emploi. — Une injection intraveineuse ou intramusculaire profonde tous les jours pendant 3 jours et ensuite une ampoule tous les 2 jours.

P. S. — La Théophylline se fait également en suppositoires (boîtes de 6 suppositoires dosés à 0.35 de Théophylline par suppositoire).

Les Laboratoires BRUNEAU et Cie

17, rue de Berri — PARIS (VIII^e)

THÉOPHYLLINE CARÉNA

La théophylline étant insoluble, les formes les p'us employées sont
La Théophylline-éthylène-diamine, ou aminophylline (*Caréna*).
La Théophylline calcique (*Caréna-Calcium*).

Propriétés thérapeutiques :

Antalgique cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde).

Diurétique sans toxicité (oliguries, œdèmes).

Eupnéique (dyspnées, asthme, Cheyne-Stokes).

La théophylline-éthylène-diamine est le plus puissant dilateur des artères coronaires (voir *Aminophylline* et *Caréna*).

La théophylline calcique, plus lentement absorbée par l'épithélium intestinal que l'aminophylline, possède une action moins rapide mais plus persistante (voir *Caréna-Calcium*).

Présentations :

Théophylline-éthylène-diamine :

Comprimés, gouttes, suppositoires (voir *Caréna*).

Ampoules intramusculaires et intraveineuses (voir *Caréna injectable*).

Théophylline calcique :

Comprimés, ampoules intraveineuses (voir *Caréna-Calcium*).

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, Bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e) (Invalides 43-60.)

THÉOSALVOSE

Composition. — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophanthique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Prix : 18 fr. 20 et 20 fr. 80.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

THÉOSTÈNE SCILLITIQUE

Formule :

Théobromine chimiquement pure.....	0,30
Poudre de scille stabilisée.....	0,10
Extrait sec de jaborandi.....	0,02

Action. — Diurétique cardio-rénal à action renforcée, puissant et sûr.
Agit quand la *Théobromine* se montre insuffisante.

Ne donne jamais de céphalées.

Indications. — Urémie, Uricémie, Artériosclérose, Albuminurie, Dyspnée cardiaque, Œdèmes, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Scarlatine et toutes les maladies infectieuses, Anurie toxémique, etc*

Posologie. — 2 à 3 cachets par 24 heures avant les repas.

THÉOSTHÈNE SIMPLE

Théobromine spéciale chimiquement pure, en cachets dosés à 0 gr. 50
Toutes les indications de la théobromine.

Posologie. — 2 à 4 cachets en 24 heures.

Laboratoires R. BERNARDO

47. avenue de la République, VILLENEUVE-LE-ROI (S.-et-O.)
(Tél. : 202.)

THÉOVERINE LALEUF

Composition. — Chaque dragée contient très exactement :

Théobromine pure	0,15
Papavérine chlorhydrate.....	0,01

Propriétés et indications. — Antispasmodique et hypotenseur remarquable. Grâce à son action vaso-régulatrice et dilatatrice, la THÉOVERINE rétablit une circulation normale et évite le retour des crises angineuses.

La THÉOVERINE présente une action favorable à l'augmentation de la Diurèse.

Spécialement indiquée dans :

Angine de poitrine (traitement symptomatique). — Artériosclérose. — Insuffisance aortique. — C'est le médicament par excellence des Cardio-Rénaux.

Forme. — Dragées.

Posologie et mode d'emploi. — De 3 à 6 dragées par jour suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente. — 15 à 20 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 22 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

THÉOXANTHINE

Association Théobromine crist. pure-Phosphate disodique
en comprimés *glutinisés*.

Le complexe Théobromine-Phosphate disodique constitue la forme de choix pour l'administration de la Théobromine. Mais la combinaison, assez instable, est en partie dissociée par l'acidité du suc gastrique. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons préparé ce complexe sous forme de comprimés glutinisés. L'enrobage de gluten, se désagréant seulement dans le duodénum, libère le principe actif en milieu alcalin où l'association Théobromine-Phosphate disodique est beaucoup plus stable. On obtient ainsi, au cours de la traversée intestinale, une absorption lente et continue de la Théobromine solubilisée par le Phosphate disodique. Il en résulte une activité sensiblement accrue et une tolérance parfaite.

Composition : { Théobromine cristallisée pure 0 gr. 25
Phosphate disodique 0 gr. 10
Excipient Q. S. pour 1 comprimé glutinisé.
Flacon de 40 comprimés.

Indications. — Toutes celles de la Théobromine. Activité plus grande à dose moindre. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par jour.

Echantillons et Littérature:

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 79-59.)

THÉRAMINE

Première application par les « microdoses »
de l'Histamine
à la Thérapeutique générale.

*Traitements des états allergiques et des Ulcères
gastro-duodénaux.*

Composition.

Soluté isotonique et de pH constant de bichlorhydrate d'histamine (B-imidazol-éthyl-amine).

Boîtes de 20 ampoules de 1 centicube comprenant 10 ampoules numérotées de 1 à 10, de concentration croissante (0 γ, 01 à 5 γ), et 10 ampoules (n° 11) contenant chacune 10 γ.

Contrôle rigoureux par un dosage double, biologique et colorimétrique.

Indications.

*Désensibilisation spécifique des Etats allergiques :
Asthme, Urticaire, Œdème de Quincké, Migraines
Intolérances digestives d'origine hépato-vésiculaire
ou colique, etc.*

*Traitement biochimique des Ulcères gastro-duodénaux
agissant non seulement sur la crise douloureuse,
mais vraisemblablement aussi sur la maladie
ulcéreuse elle-même.*

Posologie et mode d'emploi.

Injection sous-cutanée indolore tous les 2 jours suivant l'ordre numérique des ampoules. Délai de 4 à 12 semaines entre chaque série. L'effet thérapeutique apparaît habituellement entre la 8^e et la 12^e injection.

Médication atoxique : l'activité de la Théramine n'est pas le fait, en effet, d'une concentration élevée en produit chimique, mais elle est liée au pouvoir désensibilisant de doses, toutes largement infra-toxiques, et progressivement croissantes et calculées pour élever sans heurt le seuil de sensibilité allergique de l'organisme.

Posologie identique à tous les âges.

Aucune contre-indication.

Prix ; 38 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indications thérapeutiques. — Dermatologie, Otorrhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

Ovules « Roche » au Thigénol.

Tampol « Roche », pansement gynécologique idéal (Voir page spéciale).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n° 504-46 (*liquide*), 504-47 (*ovules*), 504-42 (*tampol*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 91-10)

THI-LIP AGUETTANT

Pyrétothérapie.

**Soufre en solution huileuse
spécialement préparée.**

Forme. — Ampoules injectables dosées à 1 p. 100 de soufre.

Propriétés. — Agent pyrétogène sans action nocive. Les injections sont immédiatement suivies d'une élévation de température. Celle-ci peut atteindre et dépasser 39° 5. La fièvre tombe dès qu'on interrompt les injections. Réactions douloureuses très faibles ou nulles.

L'amplitude du choc thermique varie largement avec les individus.

Tous les agents pyrétogènes sont soumis à cette relativité.

Les ampoules ne cristallisent pas à la température normale.

Emploi. — Injections intra-musculaires profondes (dans la cuisse).

On injecte généralement une série de doses progressives allant jusqu'à 10 cc. à des intervalles de 3 à 6 jours. Mais cette règle doit être adaptée aux réactions et à l'état général du malade. On peut prolonger le traitement avec quelques injections de 10 cc.

On reprend le traitement après une interruption de plusieurs mois.

La boîte contient 10 ampoules de 1 à 10 cc.

Sur demande : boîte de 6 ampoules de 10 cc.

(Aux hôpitaux : prix et conditionnements spéciaux.)

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

THIOBYL BOURCET

Composition. — Médication polyvalente (peptones, sulf. magn., hyp. de Na, extr. mou boldo, d'artichaut) enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 754-3 et 754-4.

Indications. — Toutes les affections du foie et des voies biliaires.

Formes pharmaceutiques. — Granulé et dragées.

Mode d'administration du granulé. —

Adultes : 1 cuillerée à café le matin à jeun ou 1/2 cuillerée à café 1/2 heure avant les repas (syndr. hépato-vagotoniques). —

Enfants : 1/4 à 3/4 de cuillerée à café suivant l'âge.

Mode d'administration des dragées. —

Adultes : 4 dragées le matin à jeun ou 2 dragées avant les deux repas. — *En-*

fants : 1 à 3 dragées suivant l'âge en une fois ou à dose fractionnée avant les repas.

Le flacon de granulés a une durée de 24 jours de traitement pour les adultes.

Le flacon de dragées a une durée de 14 jours de traitement pour les adultes.

Laboratoires du QUINA BOURCET

Échantillons :

7, avenue du Doyenné,
LYON-SAINT-JEAN.

Tél. 25-35.

THIOCITRAN THÉVENOT

Granulé soluble.

Citrates — Soufre — Magnésium — Peptone.

Composition. — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

Propriétés. — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

Indications. — Affections du foie et des voies biliaires, Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr. : 18 francs.

Laboratoire THÉVENOT

DIJON.

THIOL « ROCHE »

Dérivé du gaïacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 ctgr. de gaïacol cristallisé.

Doses et modes d'emploi :

SIROP « ROCHE » au Thiocol.

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol « Roche »)

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

(1 cachet = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 4 cachets par jour

COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.

(1 comprimé = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 4 comprimés par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

Indications thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-50 (*poudre*), 504-51 (*sirop*), 504-48 (*cachets*), 504-49 (*comprimés*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

THIODACAÏNE MIDY

Boîte de 4 ampoules injectables.

Composition :

Thiocarbamide	20 mmg. (42 % de soufre actif, soit 1 cgr.)
Iodazine M	100 mmg. (64 % d'iode libre, soit 6 cgr. 4)
Dunacaïne	100 mmg.

Pour une ampoule de 20 cc.

Dose et mode d'emploi. — Série de 1 à 6 injections *loco-dolenti*, une injection tous les 2 ou 3 jours.

Jamais d'accident de résorption.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation immédiate et définitive de la douleur rhumatismale.

Indications. — Arthrites et péri-arthrites, Algies rhumatismales, Névrites, Lumbagos, Sciaticques, Algies cervico-brachiales, Névralgies intercostales, Coxarthrie, Talalgie, Lipo-arthrite sèche du genou.

Prix : 26 fr. 70. Durée du traitement : 10 à 20 jours.

Remboursée à 80 % aux Assurés Sociaux (Catégorie B).

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS.

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

THIODÉRAZINE MIDY

Boîte de 10 ampoules injectables.

Composition :

Thiocarbamide	0,010
Iodazine M.....	0,100
Pipérazine.....	0,050
Chlorétone	0,005

Pour une ampoule de 5 cc.

Dose et mode d'emploi. — Série de 8 à 15 injections, une tous les jours ou tous les 2 jours, intramusculaires ou intraveineuses.

Jamais d'accident de résorption.

Propriétés thérapeutiques. — Amélioration du terrain rhumatismal, Suppression de la douleur et de l'impotence.

Indications. — Rhumatisme chronique généralisé, Arthrites, Arthroses.

Rhumatisme chronique localisé, Péri-arthrites, Coxarthrie, Rhumatisme vertébral, Spondylose rhyzomélique ankylosante, Rhumatisme déformant des mains et des pieds. Toutes névrites et myalgies rhumatismales.

Prix : 24 fr. 55. Durée du traitement : 10 à 20 jours.

Remboursée à 80 % aux Assurés Sociaux (Catégorie B),

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS.

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

THIOFÈNE ROBIN

Composition. — Solution huileuse de Thiofène (C^4H^4S : 38 p. 100 de soufre).

Indications. — *Antiprurigineux* : Psoriasis et maladie de Duhring.

Analgésique : Complications arthropathiques du psoriasis. Douleurs concomitantes ou consécutives du zona. Douleurs articulaires du Rhumatisme chronique.

Formes. — Capsules à 0 gr. 05.

Ampoules de 1 cc. à 0 gr. 10.

Posologie. — Capsules : 4 à 6 par jour, pour les adultes.

Ampoules (injections intramusculaires) : 1 à 3 par jour ou tous les deux jours. 1, deux jours consécutifs au début du zona.

Prix. Boîte de 30 capsules : 31 fr. 20 ;
10 ampoules : 26 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS. (Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

THIO-GOUDRON

Composition. — Pâte de zinc alliée au soufre et au goudron de houille rigoureusement purs.

Antiprurigineux et décongestionnant.

Indications. — Eczémas torpides et chroniques, Dartres et dermatoses.

Emploi. — Étendre sans masser une couche mince sur les lésions, recouvrir sans serrer d'une seule épaisseur de toile usée ou de gaze. Pour le nettoyage, employer un coton imbibé d'huile de paraffine.

Prix : 11 fr. 50 le tube de 35 gr.

Laboratoires CEBE

J. CHOL, Pharmacien, ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Lyon.

[[SAINT-JUST-SUR-LOIRE (Loire).

(Tél. : 18.)

Echantillons sur simple demande.

THIONAIODINE

(Comprimés glutinisés de)

Composition. — Complexe I-S-Mg associé aux sels de Lithine et à la Vitamine B₁.

Formule. — Chaque comprimé contient :

S ² O ³ Mg.....	0 gr. 20
NaI stabilisé Logeais....	0 gr. 04
Théobrominate de Lithine.	0 gr. 02
Benzoate de Lithine	0 gr. 02
Vitamine B ₁	15 U. I.

Propriétés. — *Antialgiques* de l'iodure de sodium ; *Neuro-sédatives* de l'ion magnésium ; *Antinévritiques et antialgiques* de la Vitamine B₁ ; *Antirhumatismales*, par le soufre labile de S²O³Mg et l'iodure de NaI ; *Désensibilisantes*, antianaphylactiques, néurosédatives, stimulantes de l'activité hépatique par S²O³Mg ; *Uricolytiques* des sels de Lithine.

Indications :

- 1° *Toutes algies rhumatismales et rhumatismes chroniques* : cure d'entretien et de complément de la maladie rhumatismale chronique entre les séries de *Thionaiodine injectable*, préparatoire à la cure hydro-minérale (eaux sulfureuses) et complément de celle-ci, arthritisme, etc. ;
- 2° *Voies respiratoires* : pharyngites, bronchites chroniques, scléroses bronchiques, asthme, emphysème, catarrhe naso-pharyngien, traitement préparatoire à une cure d'eaux thermales sulfureuses et son complément ;
- 3° *Insuffisance hépatique et maladies anaphylactisantes* : diarrhées post-prandiales, désintoxication par formation de sulfo-conjugués atoxiques, toxémies d'origine intestinale, migraines récidivantes.
- 4° *Maladies de la nutrition*, et en particulier les troubles de la nutrition sulfurée, arthritisme, goutte, auto-intoxications, toxémies d'origine intestinale, etc.

Doses moyennes. — De 4 à 6 comprimés par jour aux repas.

Prix. — L'étui de 40 comprimés : 20 fr.

Laboratoires Jacques LOGEAIS
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

THIONAÏODINE LOGEAI

injectable.

Pour le traitement de la *maladie rhumatismale chronique* et plus particulièrement de la *douleur rhumatismale*.

Formule. — Complexe *iode-soufre-magnésium*, sous forme de combinaison en solution aqueuse de NaI *Logeais* et de S^4O^6Mg , à l'exclusion de tout autre analgésique et de tout stupéfiant.

1° *Thionaiodine « A »* : pour intramusculaires, à 2 p. 100 de NaI et 1 p. 100 de S^4O^6Mg .

2° *Thionaiodine « B »* : pour intraveineuses, à 5 p. 100 de NaI et 5 p. 100 de S^4O^6Mg .

3° *Comprimés* (voir : *Thionaiodine*, comprimés glutinisés de).

Formes :

<i>Thionaiodine « A »</i>	{	6 ampoules de 5 cc	18 fr. 70
		6 — de 10 cc	26 fr. 95
<i>Thionaiodine « B »</i>	{	6 ampoules de 10 cc	31 fr. 60
		4 — de 20 cc	26 fr. 95

Propriétés. — Grâce à ses trois principes actifs : antirhumatismal (S), antalgique (NaI) et neuro-sédatif (Mg), la *Thionaiodine* (A ou B) réalise la médication injectable la plus puissante de tous les syndromes douloureux aigus ou chroniques et spécialement de la *douleur rhumatismale*.

Tolérance parfaite. Atoxicité absolue.

La *Thionaiodine A* en injections intramusculaires lentes est parfaitement indolore et dénuée de réactions secondaires.

Indications. — *Rhumatisme chronique* et plus particulièrement *douleur rhumatismale*.

Thionaiodine A : toutes douleurs rhumatismales, sciatiques, rhumatisme chronique, algies rhumatismales, arthrites et périarthrites douloureuses, etc.

Thionaiodine B : tous syndromes douloureux aigus ou chroniques, zonas, névrites, névralgies faciales, cervico-brachiales, intercostales, algies postencéphaliques, radiculalgies, etc.

Posologie :

Thionaiodine A : de 5 à 20 cc. par jour, dans une masse musculaire quelconque, jusqu'à sédation rapidement obtenue.

Thionaiodine B : de 10 à 40 cc. par jour, en intraveineuses très lentes. Dans les algies aiguës ou rebelles, prolonger sans inconvénient la série d'attaque de 40 cc. Peut être administrée aux enfants : demi-doses jusqu'à 10 ans ; deux tiers de doses de 10 à 15 ans.

Contre-indications. — Celles de l'iode chez certains bacillaires et celles des intraveineuses chez les cardio-rénaux, chez les vieillards grands hypertendus (au-dessus de 25 au Vaquez-Lauby), ou chez les malades dont l'état artériel athéromateux est par trop considérable.

Laboratoires Jacques LOGEAI
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

THIOPHÉOL « INAVA »

(Thiophène, Soufre colloïdal, Eucalyptol.)

En solution huileuse injectable.

SANS DOULEUR NI RÉACTION

Indications :

RHUMATISMES CHRONIQUES

Dermatoses, Parasitoses, Infections pulmonaires chroniques.

Mode d'emploi :

1 ampoule de 1 cc. à 10 % de Thiophène, chaque jour.

EFFET RAPIDE, AUCUNE TOXICITÉ

Prix : 25 francs (10 ampoules de 1 cc.).

Laboratoire INAVA

E. Guignier, Pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

THIOPHYL

Composition. — Association à la médication sulfureuse (H^2S) et à l'étain, antistaphylococciques, des équilibrants humoraux Ca, Mg, K, Na, du charbon activé et de la magnésie calcinée légère.

Avantages : Disparition rapide de la douleur. Régression des phénomènes inflammatoires dès le 3^e jour.

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoques, Anthrax, Acné, Folliculites.

Posologie et Mode d'emploi. — Prendre entre les repas :

3 fois une pilule le premier jour.

Augmenter d'une pilule par jour et par prise, jusqu'à 3 fois 9 pilules par jour.

Présentation et Prix. — Le flacon de 100 pilules pour une cure complète : 22 fr. 90.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARI

(Tél. : Nord 76-85.)

THIOSÉDAL BORNE

Composition. — Sirop et Comprimés.
1 cuillerée à café contient : Thiocol, 0,10 ctgr.;
Dionine, 0,005 mmg.; Extrait Jusquiame,
0,01 ctgr.

1 comprimé contient : Thiocol, 0,10 ctgr. ;
Dionine, 0,005 mmg. ; Extrait Jusquiame,
0,01 ctgr.

Action pharmacologique. — Par le Thiocol antiseptique pulmonaire, par la Dionine sédatif puissant de toutes les Toux.

Indications. — Toutes affections broncho-pulmonaires, Toux nerveuses et d'irritation, Toux des cardiaques, Insomnies, spasmes, Tuberculose, bronchites chroniques, Asthme, Emphysème.

Avantages. — Sans accoutumance, sans constipation, sans intolérance gastrique.

Mode d'emploi :

Adultes. — Sirop : 3 fois 2 cuillerées à café par jour.

Comprimés : 3 fois 2 comprimés par jour.

Toux rebelles :

3 cuillerées à soupe par jour.

3 fois 3 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Présentation. — Sirop : flacon de 30 cuillerées à café : 17 francs.

Comprimés : boîte de poche de 40 comprimés : 16 francs.

Produits enregistrés au Laboratoire National de Contrôle.

Laboratoires M. BORNE, Pharmacien,
Fournisseurs de l'Assistance Publique
et du Ministère des Colonies.

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 02-78.)

THIOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : A partir de 3 ans : (4 cuillerées à café par jour, à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

Nourrissons : XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Prix : 16 francs.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS.

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

THIOXYOL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Sodium thioélaïdinosulfonate, Zincum Oxydatum calibré chimiquement pur 999 pour 1000 prix liquida depurata.

Propriétés. — Le *Thioxyol* pâte réductrice très active.

Indications. — Eczémas secs, squameux, jambiers pré ou post-ulcéreux. Eczémas. Psoriasis, parakératoses, prurit circonscrit avec lichénification, trychophytie.

Mode d'emploi. — Après détersion à l'éther, appliquer en couche très mince et ne laisser sur les lésions que 24 heures au maximum. Surveiller l'action.

Demander les brochures des Docteurs P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

THORIX (THORIUM X RHEMDA)

En injections hebdomadaires intramusculaires indolores.

Ses indications. Sa posologie.

Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Sciatique, Spondylose Rhizomélisque, Psoriasis: 8 à 10 piqûres consécutives à raison d'une par semaine, activité augmentant progressivement de 100 à 300 unités par 50 unités, ne pas dépasser l'activité 300.

Leucémie. Lymphadénie, Maladie de Hodgkin, Tumeurs, Néoplasmes: 5 piqûres consécutives, à raison d'une par semaine. 2 à 400, 1 à 450, 2 à 500 unités.

Prix suivant dosage.

Le THORIX (médicament à décroissance rapide) se prépare une fois par semaine; il est donc indispensable de passer les commandes **le lundi au plus tard.**

Les ampoules sont livrées le mercredi à Paris et banlieue, et le jeudi en Province.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien,

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél.: Wagram 58-89, Défense 18-41. — R. C. Seine, 255-068 B.

THYMÉPHÉDRINE

Gouttes nasales à l'éphédrine.

Formule :

Ephédrine 0,01

Thymol..... 0,4

Gaïacol 0,05

Essence Niaouli 2

Excipient..... Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Toutes les affections rhinopharyngées, rhume, grippe, rhume des foins, coqueluche.

Posologie. — IV à VIII gouttes dans chaque narine de 4 à 8 fois par jour. Aspirer fortement.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél.: Lon 04-61.)

THYRÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande thyroïde.

Produit rigoureusement dosé, toujours identique à lui-même ; conserve indéfiniment ses propriétés, renferme tous les principes actifs du corps thyroïde ; exclusivement thyroïdien, sans parathyroïdes.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas d'insuffisance thyroïdienne, myxœdème de l'enfant, de l'adulte et post-opératoire, signes nerveux, respiratoires, cutanés, menstruels, etc...

Formes pharmaceutiques :

- 1° Pilules dosées à 2 cgr. de principes actifs. Correspondant à 0 gr. 20 de glande fraîche.
- 2° Tablettes pour enfants, dosées à un cgr. de principes actifs correspondant à 0 gr. 10 de glande fraîche.
- 3° Gouttes : X gouttes équivalent à 1 pilule, soit 0 gr. 20 de glande fraîche, ou 2 cgr. d'extrait.
- 4° Ampoules : 1 cc. correspond à 0 gr. 20 de glande fraîche, ou 2 cgr. d'extrait.

Prix : 22 francs. — Ampoules : 27 fr. 50.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

THYROCRÉINE GRÉMY

Médication polyglandulaire thyro-ovarienne.

Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais :

Corps jaune de l'ovaire 0 gr. 20

Glande thyroïde..... 0 gr. 005 d'extrait

2 à 6 pilules par jour pendant 20 jours.

Indications thérapeutiques. — Insuffisance ovarienne et insuffisance thyroïdienne associées. — Éveil des fonctions ovariennes au moment de la puberté. — Myxœdème fruste. — Basedow de la Ménopause. *Obésité* de la ménopause.

Rhumatisme chronique déformant de la ménopause.

Prix : 22 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

THYROÏDINE BOUTY

Composition. — Poudre de corps thyroïde desséché à froid sous vide profond. Cette poudre est standardisée et biologiquement contrôlée selon les conditions exigées par le Laboratoire national de Contrôle des médicaments qui procède, pour chaque lot numéroté, aux essais et titrage en iode tyroïdique.

Chaque produit porte le label du contrôle de son lot de poudre.

Indications. — Myxœdème. Crétinisme. Hypothyroïdisme. Incontinence d'urine. Certaines formes de somnolence pathologiques. Narcolepsie. Tous les cas où le métabolisme basal doit être activé. Obésité. Rhumatismes.

Cedèmes, Néphrites, Néphroses lipoïdiques, Troubles de la circulation sanguine, Thrombose, Embolies, Engelures, Erythrocyanose.

Formes. — Dragées, Ampoules (hypodermie), Liqueur.

Posologie :

Adultes : de 1 à 3 dragées par jour (dosage d'une dragée = 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché).

Enfants : prescrire la liqueur, dont une cuillerée à café contient 0 gr. 02 de corps thyroïde desséché.

Prix : 19 fr. 60.

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS.

THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

Ampoules (boîte de 6) : une ampoule de 1 cc. = 1 milligr. de thyroxine.

Comprimés (flacon de 30) : un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

Solution (flacon de 15 cc.) : 1 cc. = 2 milligr. de thyroxine.

Indications :

Obésité générale, Myxœdème, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

Modes d'emploi et doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés ou X à XV gouttes par jour et plus.

Voie intramusculaire : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-52 (*ampoules*), 504-53 (*comprimés*), 504-57 (*solution*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

TIODINE COGNET

$C^6S N^2H^{12}I$

Propriétés. — Réalise l'Association *Iode-soufre*. par la Thiosinamine Iodée, combinaison organique soluble. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications. **L'Anti-scléreux.**

Composition. — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %), avec la thiosinamine.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du soufre ensemble ou séparément. **Toutes scléroses.** Hypertension. **Rhumatisme chronique.** Tabes, Scléroses médullaires, Asthme, Emphysème, Syphilis, etc.

Formes et posologie. — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 3 à 6 par jour. *Enfants* : 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, de préférence).

Prix au public: Pilules — Le flacon : 15 fr. 50.
Ampoules — La boîte : 17 francs.
15 jours de traitement environ.

Laboratoires des Produits COGNET

Armingeat et C^{ie}

43, rue de Saintonge — PARIS (ARC. 15-10).

TISANE HÉPATIQUE DAUSSE

Composition. — Combretum et Boldo, associés aux stomachiques végétaux.

Propriétés thérapeutiques. — Médication cholagogue, provoquant par drainage la désinfection des voies biliaires.

Indications. — Lithiase biliaire, cholécystites, congestion hépatique, ictère et tous accidents de l'hépatisme.

Mode d'emploi. — 1 à 2 tasses à café, le soir au moment de se coucher.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

TISANE HÉPATIQUE LAHAYE

Phytothérapie hépato-biliaire.

Composition et action :

Cholérétique, grâce à la présence de boldo, de romarin et de menthe.

Cholagogue, par l'adjonction de bourdaine en faible quantité.

Diurétique, par l'action bien connue de l'Uva-Ursi.

Sédative, grâce aux vertus d'une plante de l'Inde « L'Andropogon Schoenanthus ».

Infusion très parfumée et agréable au goût. Chaque tasse d'infusion peut être additionnée de sucre ou de glycérine.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Jaunisse, Lithiase biliaire, Fièvre bilieuse hématurique. Entéro-colite muco-membraneuse. Constipation opiniâtre. Migraines. Dermatoses par dyshépatie. Hypercholesterinémie. Rétentions azotées.

Doses et mode d'emploi. — 1 pincée de plantes pour une tasse d'infusion. 3 à 4 tasses par jour selon les cas. La boîte : 7 fr. 25. La triple boîte cure : 15 fr. 85.

Laboratoire J.-B. LAHAYE

145, rue des Bourguignons — BOIS-COLOMBES.

TISANE TANIT

Emménagogue.

Composition. — Absinthe, Anémone pulsatile, Armoise, Hamamelis, Matricaire, Millefeuilles : parties égales.

Indications thérapeutiques. — Quelle que soit la préparation emménagogue, prescription magistrale ou spécialité pharmaceutique, la faire toujours prendre dans une infusion de Tisane Tanit bien sucrée.

Prix : 5 francs.

ROUANET, Pharmacien

ANTIBES (A.-M.).

**Approvisionnement pharmaceutique O. C. P.
et Grossistes.**

TONICARDINE GONNON

Composition :

	Par granule.
Adonidine	0 gr. 002
Convallamarine.....	0 gr. 02
Extrait de Strophantus ...	0 gr. 001
Extrait de Scille	0 gr. 004

Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine. Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas.
(pour 20 jours environ).

Prix public : 22 fr. 80.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON
(Tél. : Franklin 36- 0)

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine.....	1 mgr.
Cacodylate de soude	0,05
Glycérophosph. soude (Codex 1908).....	0,20
Eau de mer diluée	5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer, auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

6 ampoules de 5 cc. Prix : 15 francs.

12 ampoules de 5 cc. Prix : 24 francs.

Assurances Sociales, Classe B.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél.: Trinité 44-32. Télégr. Chevrematte-90 — Paris.)

TONI-PECTORAL ADRIAN

Bonbon pectoral et stimulant à base de chlorure de magnésium et parfumé à l'anis.

Présentation. — Pâte pectorale, forme boursier.

Indications thérapeutiques. — Produit béchique, calmant et antiseptique par l'action de ses constituants (réglisse, benzoate de soude, cachou, menthol, extrait thébaïque). Tonique général, grâce à l'action du chlorure de magnésium.

Posologie. — Chaque bonbon contient un dixième de milligramme d'extrait thébaïque et 1 centigramme de chlorure de magnésium. 20 bonbons en moyenne par 24 heures pour les adultes.

La boîte : 5 fr. 30.

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Ancⁱ ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

TONIQUE FAVROT

Élixir reconstituant.

Composition :

Teinture de noix vomique	0,15
Arrhénal.....	0,02
Nucléinate de soude	0,04
Glycéro soude	0,30
Phosphate de soude	0,10
Acide phosphorique	0,10
Excipient.....	Q. S. p. une cuillerée à soupe.

Propriétés et Indications. — Stimulant des échanges nutritifs. Faiblesse générale, anémie, débilité, surmenage, dépression nerveuse, etc.

Posologie. — Une cuillerée à soupe avant les 2 repas.

Échantillons et littérature.

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

TONIQUE GONNON

Aux Phosphoglycérates de soude, chaux et potasse.

Propriétés thérapeutiques. — Assimilation parfaite et certaine du phosphore, stimulant de l'appareil nerveux, il accélère la nutrition de tous les organes.

Indications. — Anémie, convalescence, neurasthénie, grossesse, médication infantile par excellence.

Forme et Posologie :

<i>Vin et sirop</i> : 2 à 4 cuill. à soupe par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).....	<u>Prix public.</u> <i>Vin</i> <i>Sirop</i> 16 fr. 20 16 fr. ;
<i>Granulé</i> : 2 à 4 cuill. à café par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).....	11 francs.
Demi-dose pour les enfants.	

Durée moyenne de l'unité de vente :

Vin : 8 jours. — *Sirop* : 6 jours. — *Granulé* : 12 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. (Tél. : Franklin 36-80.

TONIQUE NEDA

Composition :

Phosphore ..	{ Nucléinate de soude	0,03
	{ Glycérophosphate de soude..	0,20
Arsenic	Arséniate de soude.....	0,003
Strychnine .	Teinture de Noix vomique ..	0,30
Caféine	Teinture de kola	1
Catalyseur...	Sulfate de manganèse.....	0,02
Stomachique.	Elixir de Garus	1,50

Par cuillère à soupe.

Propriétés. — Tonique, Digestif.

Indications. — Asthénie, surmenage, convalescence, anémie, neurasthénie, inappétence.

Présentation. — Élixir en flacon de 400 cc. pour 15 jours de traitement : 18 francs.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux principaux repas.

Laboratoires DANÉY

134, cours de Verdun — BORDEAUX (Gironde).
(Tél. : 27-10.)

TONIQUE « ROCHE »

Composition. — Acide phosphorique, strychnine, kola, arsylène « Roche », manganèse.

Propriétés. — Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Redonne entrain, bonne humeur et optimisme.

Indications. — Prétuberculose, Anémies, Convalescences, Asthénie, Neurasthénie, Surmenage, Adénopathies, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (de 8 à 15 ans) : 1/2 doses.

Flacon de 120 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-54.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Arch. 91-10.)

TONIVEININE

Médication spécifique des affections veineuses.

Composition. — Association de *Sylibum marianum*, galbules de *Cupressus*, *Echinops viscosus*.

Avantages. — Effets stimulants sur les fibres lisses des veines, vaso-constricteurs et hémostatiques.

Légère excitation de la sécrétion biliaire.

Action générale sur la circulation veineuse.

Indications. — Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Troubles de la puberté et de la ménopause.

Posologie. — XX à XLV gouttes matin et soir. X gouttes dans la grossesse.

Dès que les symptômes pénibles sont amendés, le Docteur prescrira les doses diminuées 20 jours par mois.

Prix : 12 fr. 50, flacon de 30 cc. avec compte-gouttes.

Laboratoires BLANCHOT

15, avenue du Parc-Montsouris — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Glacière 03-09.)

Échantillons et Littérature sur demande.

TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi. — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de granulé avant chaque repas.

Injectable : 1 ampoule de 1 cc., tous les jours ou tous les 2 jours en injection intramusculaire profonde.

Indications. — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

Fortifie sans provoquer d'excitation.

Prix. Ampoules : 22 francs. — Comprimés : 17 francs.
Granulé : 17 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

TOPHISTA

(Histamine Injectable)

Composition et caractéristiques : Solution à 1/4000 de Chlorhydrate d'Histamine, présentée en ampoules de 1 cc. contenant chacune un quart de milligramme de produit actif; solution inaltérable, pratiquement indolore et sans adjonction d'aucun anesthésique local.

Indications : Toutes les manifestations douloureuses du rhumatisme chronique.

1° Les myalgies, lumbagos, torticolis.

2° Les manifestations douloureuses des arthrites sèches.

3° La goutte chronique.

4° Les séquelles douloureuses des traumatismes articulaires.

5° Les névralgies, sciatique, les séquelles douloureuses du zona.

6° Et enfin, d'une façon générale, toutes les douleurs vagues.

Contre-indications : 1° Les arthrites, les rhumatismes infectieux aigus ou subaigus.

2° Chez les sujets âgés, artérioscléreux, l'hypertension artérielle.

Résultats : Le plus souvent immédiats, après la première injection.

Dose et mode d'emploi : Injections intradermiques sur les points où la douleur est le plus vivement ressentie; une ampoule le premier jour; si la réaction vaso-motrice n'est pas intense, deux ampoules le deuxième jour. Continuer les jours suivants, sans jamais dépasser cette dose jusqu'à disparition complète des douleurs.

Présentation et prix : Boîte de 6 ampoules de 1 cc. avec une aiguille intradermique : 25 francs.

Laboratoires du TOPHOL

4, rue de la Liberté et 3, rue Condillac, à GRENOBLE.

TOPHOL

(C¹⁴H¹¹N²⁰.)

Acide phénylquinolique * carbonique *.

Indications :

Toutes les manifestations douloureuses de la diathèse urique : Rhumatisme articulaire aigu et chronique. Goutte, Gravelle, Arthrites fébriles et déformantes, Névralgies, Sciatique, Lumbago.

Posologie et mode d'emploi :

Présenté en cachets et comprimés dosés à 0 gr. 50. Suivant le cas, le TOPHOL se prend à la dose de 1 à 6 cachets ou comprimés par jour, dans de l'eau alcaline, aux repas.

Dès l'effet obtenu, diminuer progressivement la dose de 1 à 2 cachets ou comprimés par jour.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires du TOPHOL

3, rue Condillac — GRENOBLE (Isère).

TOTAL MAGNÉSIEN

Composition. — Chlorure de magnésium déshydraté en association synergique avec les sels halogénés du magnésium.

Indications. — Asthénie, impuissance, sénilité, entérite, insuffisance hépatique, cholécystite, dermatoses, verrues, hypertrophie prostatique.

Présentation et prix :

Granulé : Un flacon de 60 grammes : 15 fr. 60.

Comprimés : Un flacon de 100 comprimés : 17 fr. 20.

Dragées : Un flacon de 100 dragées : 17 fr. 20.

Posologie :

Granulé : 2 cuillères-mesures par jour, diluées dans un peu de liquide.

Comprimés : 2 par jour.

Dragées : 4 par jour.

La cuillère-mesure jointe au flacon de TOTAL MAGNÉSIEN représente, pleine, environ 0 gr. 60.

Laboratoires du Total Magnésien.

24, boulevard Sébastopol — PARIS.

(Tél. : Turbigo 62-30, lignes groupées.)

TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique
des Reconstituants.

Forme. — Élixir.

Action. — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

Indications. — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie, etc.

Composition. — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal)	0,05
Manganèse (sulfate)	0,0375
Phosphate de soude	0,50
Acide phosphorique officinal	0,25
Méthylarsinate de soude	0,015
Extrait de quinquina	0,25
Teinture de noix vomique	0,25
Teinture de coca	1,25
Extrait fluide de kola	0,32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

Adolescents (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

Enfants (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuiller à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 18 fr. 20.

Laboratoires B. C. L.

M. BERGER

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

TOT' COBRA**(Cobra total.)**

Soluté colloïdal injectable de venin de cobra *non filtré*.

Indications. — *Traitement des algies en général* (néoplasiques, rhumatismales, sciatiques, trigéminales, radiculaires, etc.).

Action vaso-dilatatrice des capillaires (traitement de certaines affections vasculaires du fond de l'œil, de l'hypertension artérielle, de certains syndromes azotémiques et hyperpolypeptidémiques, de la migraine, de l'épilepsie, de l'éclampsie).

Action sur l'état général des cancéreux et des tuberculeux.

Mode d'emploi. — En injections dans les muscles du triceps brachial, à raison de une ampoule tous les trois jours.

Prix : Boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 26 francs.

— 12 — 1 cc. : 46 fr. 75.

Contenant chacune 1/10^e de mmg. de Venin, soit 1 unité souris.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard du Montparnasse — PARIS (XV^e).
(Tél.: Littré 98-89)

TOT'HAMÉLIS

Composition. — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

Indications. — Stases veineuses, Varices, Hémorroïdes. États congestifs, Hypertension.

Posologie. — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (Hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

Prix :

Comprimés, Cachets : 17 francs.
(pour 15 jours de traitement).

Suppositoires
(boîte de dix) : 17 francs.

Produits Innothéra

Laboratoire CHANTEREAU

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 30-07.)

TOT'HEMA

HÉMATOPOIÉTIQUE TOTAL.

Composition. — *Tot'Héma* renferme sous une forme assimilable la totalité des éléments nécessaires à la régénération sanguine, associés à un tonique de la cellule nerveuse, soit :

- 1° Acides aminés (histidine et tryptophane) obtenus par photoclastase d'un lysat globulaire désalbuminé (communication à l'Académie de médecine de Paris, 21 mai 1935) ;
- 2° Caséinates de fer, de cuivre, de manganèse (sels ionisables) ;
- 3° Inosito-hexaphosphate de chaux et magnésie.

Indications. — Toutes les anémies et déficiences organiques simultanées ou consécutives.

Présentation. — 1° Granulé sucré agréable au goût.

2° Comprimés friables.

Mode d'emploi. — *Granulé* : Dose moyenne : 2 cuillerées à café par jour aux repas. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient (hémorragies). Pour les jeunes enfants elle peut être ramenée à deux demi-cuillerées à café ; pour les nourrissons une demi-cuillerée à café dissoute dans un biberon.

Comprimés : Dose moyenne : 6 comprimés par jour.

Prix :

Granulé : (pour 12 jours de traitement) : 23 fr. 50.

Comprimés : 20 francs.

Produits Innothéra

Laboratoire CHANTEREAU

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaug. 30-07.)

Ale. 11-39

TOURANOL

Composition. — Dionine, Pyramidon, Terpène, Benzoate de soude, Sulfogaiacolate de K, extraits de Grindelia, Aconit, Marrube.

Propriétés. — Sédatif, Expectorant, Modificateur des sécrétions, Antispasmodique, Asepsie des voies respiratoires.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour. De 12 à 16 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Indications. — Trachéobronchites aiguës, Bronchites chroniques, Toux spasmodiques, Broncho-pneumonie.

Laboratoires P. BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS.

Publicité : Société d'Expansion thérapeutique.
Société anonyme au capital de 20 000 francs.

Siège social : 129, rue de Turenne — PARIS (III^e).
R. C. : 248.921.

TRACHÉDRINE

GOUTTES

Composition. — Teintures antispasmodiques (gelsémium, drosera, ballote, thym, serpolet) associées à l'Orthoformiate d'Ethyle éphédriné et à la Cinnaméine du Baume du Pérou.

L'avantage de cette préparation sur les similaires est dû en grande partie à son absence presque totale d'odeur et de saveur.

Indications thérapeutiques. — Toux spasmodique et quinteuse en général. Coqueluche, Grippe, Toux rebelles et nerveuses, Asthme. Toux émétisante, Toux laryngée, Médication symptomatique de l'adénopathie trachéo-bronchique.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans un liquide tiède, sucré de préférence : tisane béchique, eau, grog ou lait.

Adultes : XL à L gouttes à renouveler 3 fois le 1^{er} jour. — 4 fois le 3^e jour. — 5 fois à partir du 6^e jour.

Ne pas dépasser 6 fois par 24 heures.

Enfants : V gouttes de 1 à 2 ans. — VIII gouttes de 2 à 3 ans. — X gouttes de 3 à 5 ans.

XV gouttes de 5 à 7 ans. — XX gouttes de 8 à 10 ans.

A renouveler 3 fois par jour.

Augmenter ces doses de 11 gouttes par jour, jusqu'à doubler les doses initiales, comme doses maxima.

Prix : 17 fr. 10.

Laboratoires de CINNAMATHÉRAPIE

C. ROUX, Docteur en Pharmacie

60, route de Chatillon — MALAKOFF (Seine). (Tél. : Alésia 12-55.)

TRAITEMENT AMBULATOIRE du Praticien.

Indications. — Le Traitement ambulatoire du Praticien doit être appliqué sur les ulcères de jambes par le médecin. Au moment des périodes aiguës des affections suivantes : phlébites, septicémie veineuse, périphlébites ou ulcères trop infectés, il serait prudent de surseoir à l'application du traitement.

Propriétés. — L'application de cette méthode suivant les concepts de P. Bourggraff, assure :

- 1° La reprise obligatoire de l'activité du malade dès l'institution du traitement ;

- 2° La suppression complète des douleurs dues à l'ulcère de jambe, et partant la disparition de l'insomnie ;

- 3° La guérison rapide de l'ulcère (dans la généralité en quelques semaines).

Présentation. — Le traitement ambulatoire du Praticien est présenté dans un coffret contenant :

- 1 flacon *Axyol* (Poudre noire) ;
- 1 pot grand modèle *Bioxyol* (pâte blanche) ;
- 1 pot grand modèle *Oxythyol* (pâte grise) ;
- 1 Bande du Praticien.

Prix du coffret : 127 fr. 90.

Avis important. — Chacun des éléments énoncés ci-dessus peut être prescrit séparément. Prière de se reporter aux textes correspondants.

Technique. — Le Traitement ambulatoire du Praticien doit être appliqué en suivant rigoureusement les instructions de la littérature publiée à ce sujet par les Laboratoires du Praticien.

Cette littérature est tenue par les Laboratoires à la disposition du Corps Médical, auquel elle est strictement réservée.

Les conditionnements ne contiennent aucun mode d'emploi.

Prière d'adresser les demandes, sur papier à en-tête, aux

Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANCE (M.-et-M.).

TRANSITOL

Produit entièrement nouveau pour le traitement de toutes les constipations.

Composition :

Paraffines amorphes suraffinées et émulsionnables *in vivo* 70 gr.
Saccharure d'hespéridées Q. S. p. 100 —

Propriétés essentielles. — Viscosité inégalable (à l'Engler, 6° à 50°) supprimant tout suintement ou fuite anale.

Composition absolument neutre ($pH \approx 7 \approx pH$ intestinal.) Absence d'accoutumance. Réduction progressive des doses au cours du traitement. Pouvoir maximum de rééducation du transit intestinal. Absence de tout produit irritant.

Goût très agréable. Tolérance parfaite.

Toutes les Constipations, quel que soit leur mécanisme et quelles que soient leurs causes :

Entérite aiguë ou chronique, Appendicite, Sigmoïdite, Hémorroïdes, Interventions chirurgicales Colite acide, Rectite, Obstacles mécaniques, Colite muco-membraneuse, Grossesse (allaitement).

Toutes les fermentations et putréfactions intestinales et leurs conséquences, Tous les syndromes ana-phylactiques d'origine intestinale.

Posologie :

Doses d'attaque. *Adultes* : 4 à 8 cuillères à café par jour, pendant 3 à 5 jours.

Enfants : 2 à 6 cuillères à café par jour, pendant 3 à 5 jours.

Doses d'entretien. *Adultes* : 2 à 6 cuillerées à café, par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Le pot de 200 grammes : 20 fr 30.

Enregistré au Lab. de Cont. des Médic. sous le n° 1812-1.

Laboratoires GRANGER

13, rue Basly — GENNEVILLIERS (Seine).
(Tél. : Grésillonis 16-06.)

TRAPHÉINE

Indications. — Puissant tonique : action rapide dans tous les cas de convalescence, anémies, pré-tuberculose.

Forme. — Poudre agréable au goût, à diluer dans un verre d'eau.

Composition. — Association synergique : Acide phosphorique-Kol. caféinée avec catalyseur de chlorure de magnésium par milieu marin.

Posologie :

Adultes : deux fois par jour aux principaux repas, une cuillerée à soupe dans un verre d'eau ordinaire.

Enfants : deux cuillerées à café de la même façon, suivant avis du médecin.

Aucune des contre-indications habituelles chez les hépatiques.

Prix de la boîte pour un traitement d'une semaine : 16 fr. 50.

La TRAPHÉINE se vend également en comprimés, de même formule et de mêmes indications, au prix de 10 francs les 20 comprimés.

Laboratoires S. I. C. A.

R. MICHY, Pharmacien,

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n^o 1248-2.

TRASENTINE

**Chlorhydrate de l'ester diéthylamino-éthylque
de l'acide diphénylacétique.**

CIBA

**ANTISPASMODIQUE D'ACTION NERVEUSE
ET MUSCULAIRE.**

Puissant antispasmodique de synthèse, agissant par voie nerveuse et musculaire, possédant à la fois l'activité physiologique des alcaloïdes de la belladone (atropine) et de la papavérine sans aucun de leurs inconvénients (mydriase, tachycardie, sécheresse des muqueuses) et avec une toxicité très atténuée.

Traitement le plus efficace de tous les phénomènes algiques ou des troubles fonctionnels liés au spasme. Sans effets stupéfiants, ne déterminant pas d'accoutumance, la Trasentine peut être administrée aussi longtemps que persiste l'état douloureux ou dysfonctionnel.

Indications. — Tous états spasmodiques viscéraux.

Tube digestif : Spasme de l'œsophage, du pylore. Gastralgie, entéralgie, cœlialgie. Constipation spasmodique, ténésme rectal. Coliques hépatiques, vésiculalgie. Hoquet, cholécystite.

Voies respiratoires : Laryngospasme. Asthme bronchique. Toux spasmodique.

Voies urinaires : Spasme urétral et vésical. Colique néphrétique. Cystite.

Gynécologie, Obstétrique : Dysménorrhée. Hypertonie utérine. Spasme du col. Vomissements de la grossesse. Spasmes vasculaires. Spasmes infantiles. Affections neurologiques.

COMPRIMÉS — AMPOULES — SUPPOSITOIRES

Doses. — *Adultes.* — Voie buccale : 1 à 2 comp. 2 à 3 fois par jour. Voie sous-cutanée : une ampoule. Voie rectale : 1 à 2 suppositoires par jour.

Enfants. — 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte suivant l'âge.

Flacon de 20 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

— 5 suppositoires.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

THE BATTLE

THE BATTLE OF BATTLE

TRÉPALLIX

Composition. — Lactate de mercure en solution stabilisée par un procédé de laboratoire, associé à l'arséniate de soude.

Avantages. — Le lactate présente sur les autres sels d'hydrargyre les avantages suivants :

Ne s'accumule pas dans l'organisme ;

Est le moins toxique et, en particulier, le mieux toléré par le tube digestif ;

Est *anti-diarrhéique*.

Indications. — Syphilis acquise, ancienne : Traitement d'entretien et de consolidation.

Syphilis héréditaire : Médicament complémentaire.

Médication d'attaque dans la syphilis massive du nourrisson, dans la syphilis avec organopathies spéciales (hépatiques, nerveuses, oculaires), dans la syphilis larvée.

Gouttes Trépallix A pour adultes, adolescents, enfants jusqu'au poids de 10 kgs.

Lactate correspondant à 0,529 de l'ion métal de P. A. 20.

Arséniate de soude : 0 gr. 10 pour 100 grammes.

Posologie « pro die ».

Lactate *pro die*. Arséniate de soude *pro die*

Ad. 25 à 50 gttes 1 ctg. à 2 ctg. 0,001 à 0,002

Adol. 20 à 40 — 8 mg. à 1 ctg. 60,0008 à 0,0016

Enf. 5 à 25 — 2 mg. à 1 ctg. 0,0002 à 0,001

En deux ou trois prises dans un demi-verre d'eau sucrée ou non, aux repas.

Un flacon de *Trépallix A* contient 24 cc., correspondant à 0gr. 126 de métal et 0 gr. 024 d'arséniate de soude par flacon.

Gouttes Trépallix N pour nourrissons jusqu'au poids de 10 kgs.

Lactate correspondant à 0,1058 de l'ion métal de P. A. 200.

Arséniate de soude 0 gr. 01 pour 100 grammes.

Posologie. — II à V gouttes par kg. et par jour, en 2 ou 3 prises, dans un peu d'eau sucrée ou dans du lait.

Enfants de	en 2 ou 3 prises pro die.	Lactate Hh pro die.	Arséniate de soude pro die.
3 kg. à 3 kg. 250	8 à 15 gouttes	0 mg. 6 à 1 mg. 2	0,00003 à 0,00006
3 kg. 500	9 à 18 —	0 mg. 7 à 1 mg. 4	
4 kg. 250	10 à 22 —	0 mg. 8 à 1 mg. 8	
5 kg.	12 à 25 —	1 mg. à 2 mg.	
5 kg. 500	15 à 28 —	1 mg. 2 à 2 mg. 2	0,00006 à 0,00011
6 kg.	18 à 30 —	1 mg. 4 à 2 mg. 4	
7 kg.	20 à 35 —	1 mg. 6 à 2 mg. 8	
7 kg. 500	22 à 38 —	1 mg. 8 à 3 mg.	
8 kg.	25 à 40 —	2 mg. à 3 mg. 2	0,0001 à 0,00016
8 kg. 400	28 à 42 —	2 mg. 2 à 3 mg. 4	
8 kg. 700	30 à 44 —	2 mg. 4 à 3 mg. 5	
9 kg.	32 à 45 —	2 mg. 6 à 3 mg. 6	
9 kg. 500	34 à 47 —	2 mg. 8 à 3 mg. 8	
9 kg. 850	36 à 49 —	2 mg. 9 à 3 mg. 9	0,00014 à 0,00016

Un flacon de *Trépallix N* contient 24 cc., correspondant à 0 gr. 025 de métal et à 0 gr. 0024 d'arséniate de soude par flacon.

Prix. — 18 fr 75 le flacon de 24 cc. de chaque préparation, ce qui équivaut à une dépense journalière maxima de :

0 fr. 45 à 1 fr. 50 pour les doses prescrites aux nourrissons.

0 fr. 75 pour la dose de XXV gouttes aux enfants.

1 fr. 20 pour la dose de XL gouttes aux adolescents.

1 fr. 50 pour la dose de L gouttes aux adultes.

SYNTHESIS — R.-L. MATHIVAT, docteur en pharmacie, Ex-interne des hôpitaux de Paris
66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

Tél. : Trocadéro 30-52 et 32-91.

TRÉPARSOL

Acide formyl méta-amino para-oxy-phényl-arsinique.

Indications. — Syphilis, à tout âge et à toute période. Hérédosyphilis, Dysenterie amibienne, Protozooses intestinales, Diarrhée des tuberculeux, Entérocolites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse), Pian et toutes spirochètoses.

Présentation et Prix :

Tube de 30 comprimés pour Adultes : Prix 26 francs.
 — 15 — — — : Prix : 16 francs.
 — 40 comprimés pour Enfants : Prix : 16 francs.
 — 60 comprimés pour Nourrissons : Prix 13 fr. 50.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 2 centigr. par jour et par kilog.

Traitement discontinu (3 à 4 jours consécutifs par semaine) et progressif (débuter par des doses faibles).

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET.

Dépôt :

Pharmacie générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

TREPHONYL

Composition. — Foie foetal, Extraits embryonnaires, Sérum hémopoïétique.

Indications. — Constitue la médication de choix de toutes les anémies. Accélère la croissance et assure la régénération des tissus. Toutes les anémies, toutes les déficiences organiques, toutes les cachexies.

Formes :

- 1° Boîte de 10 flacons-ampoules de 6 cc.
- 2° Coffret de 30 flacons-ampoules de 6 cc.
- 3° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc.
- 4° Coffret de 18 flacons-ampoules de 10 cc.
- 5° Sirop, flacon de 300 gr.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 10 cc. par jour voie buccale.

Enfants : 1 à 3 ampoules de 6 cc. par jour, voie buccale.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : La boîte : 23 francs. Le coffret : 63 francs.

Le flacon de sirop : 23 francs.

Remboursement aux Assurés { Ampoules. Catégorie B.
 Sociaux { Sirop. Catégorie B.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

TRÉPOSITOIRES

Composition. — Tréposan (succinate de bismuth).

Présentation. — Suppositoires, forme qui permet d'administrer facilement ce médicament spécifique aux malades qui ne peuvent recevoir d'injections.

Indications. — Infections et Parasitoses intestinales, Oxyures, Syphilis.

Posologie. — Chaque Trépositoire contient 0 gr. 20 de succinate de bismuth, ce qui correspond à 0 gr. 15 environ de bismuth métal et s'administre 3 fois par semaine, le soir au coucher. Après une série de 10 Trépositoires, repos de 15 jours, puis nouvelle série de 10 avec repos.

La boîte de 10 suppositoires : 14 francs.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL

43 et 45, rue des Fauvelles — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Carnot 07-13.)

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et magnésie nécessaires à l'organisme.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

Doses et mode d'emploi. — Tricalcine pure.

Adultes :

Poudre : 1 cuiller-mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers-mesures.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cachet.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine irradiée : 1 cachet ou 1 cuillerée à café de granulés.

Avant
ou
pendant
chacun
des trois
repas.

Tricalcine injectable : 1 ampoule, par jour : pendant 12 jours.

Tricalcine Opothérapique (1) 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : poudre, granulés, cachets, chocolat : comprimés : de 14 à 17 fr. 25; Méthylarsinée, adrénalinée, fluorée et opothérapique : 18 fr. 75.

Irradiée : 22 fr. 75. Injectable (12 amp.) : 20 fr. 50. Pour traitement de 3 semaines à 1 mois.

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluri-glandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium : Association Parathyroïdes, Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle osseuse.

Autorisé par les *Assurances sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél : Trinité 29-29.)

TRICALM

Sédatif rapide et durable des Névralgies Faciale, Rhumatismale et Utérine.

Comprimés dosés à :

Diméthylaminophényldiméthylpyrazolone	0,40
Diéthylmalonylurée	0,10
Dionine	0,005

Indications :

Migraines, Névralgies de toute nature et de toute intensité, Névralgie vraie, Névralgie faciale et intercostale, Sciatique, Algies fébriles, Grippe, Angine.

Manifestations articulaires et toutes douleurs rhumatismales, Règles douloureuses, Dysménorrhée.

Doses et mode d'emploi :

Migraines et Névralgies : 1 ou 2 comprimés à la fois.
Douleurs rhumatismales : 1 ou 2 comprimés à la fois, matin et soir.

Règles douloureuses : 1 ou 2 comprimés par jour.

Prix du tube (12 comprimés) : 12 fr.

Laboratoires du DONAGOL

PÉRONNE (Somme). (Tél. : 32.)

TRIDYNOL

Composition. — Cinnamate de soude, Collargol, Acide nucléinique.

Indications. — Traitement des tuberculoses, Médication spécifique des états infectieux (Salpingites, Entérites, Suppurations, Cachexie).

Leucopoiétique puissant.

Propriétés. — Augmentation des globules blancs, surtout des lymphocytes. Les cires bacillaires sont dissoutes par les lipases des globules blancs ; les bacilles s'agglutinant, diminuent et souvent disparaissent après 6 à 10 mois. La diathermie transpulmonaire, selon nos techniques, active l'action du *Tridynol*.

Tous les avantages des sels d'or sans aucun de leurs inconvénients.

Posologie. — 5 dragées par jour à doses fractionnées à 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Combiné aux rayons ultra-violets, le *Tridynol* à doses réduites est très efficace dans les états cachectiques et infectieux des enfants.

Laboratoires JOURNET

18 et 20, rue Vavin — PARIS (VI^e).

(Tél. Danton : 70-07.)

TRIGLANDINE

Composition. — Thyroïde, hypophyse, ovaire (glandes totales desséchées sous vide profond à basse température).

Indications. — Par l'administration de ces trois glandes nobles, rétablit l'équilibre d'ensemble du système endocrinien.

Asthénies endocriniennes féminines. — Puberté, stérilité, troubles de l'appareil génital, hypertension de la ménopause et des dysendocri-niens, rhumatismes endocriniens, troubles de la circulation.

Aménorrhée, olygoménorrhée, ménorrhagies.

Formes. — Dragées, Ampoules de 1 cc. et 3 cc.

Posologie. — 1 à 3 dragées (ou 1 ampoule de 1 cc. ou 3 cc.) par jour, pendant 10 jours par mois environ.

Prix : 20 francs.

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS.

TRIGOSTHÈNE

(Cachets bleus apéritifs et analeptiques.)

Composition. — Association intime de Trigonelle, Fenugrec, Rhubarbe et Gentiane, stabilisée au fluorure de Na et catalysée au sulfate de protoxyde de Manganèse (*procédé Angla*).

Propriétés. — Toni-reconstituant de valeur. Convoyeur d'oxygène et fixateur des graisses. Stimulant des fonctions nutritives *permis même aux hépatiques*. Ne constipe jamais.

Indications. — Débilisations de toute étiologie. Anémie, Anorexie, Amaigrissement, Etats pulmonaires chroniques, Lymphatisme, Grossesse et Allaitement, Convalescences, Suite d'affections coloniales, etc.

Posologie :

2-3 cachets et plus par jour aux repas.

Boîte de 30 cachets.

Littérature et échantillons à volonté :

Produits Spécialisés « Angla » — Monte-Carlo,
« La Barbiflore en thérapeutique ».

TRINIBAÏNE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine à 1/100..... II gouttes (3 cgr.).
Ouabaïne cristallisée 1/10 de milligr.

Propriétés et Indications. — Remède de la défaillance du ventricule gauche. La *Trinibaïne* réalise à la fois la médication d'urgence et la médication d'entretien. C'est le remède d'urgence par excellence de l'angine de poitrine de décubitus et de l'œdème pulmonaire aigu.

Forme. — Dragées rouges à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Médication d'urgence : Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : Avaler une dragée, une à trois fois par jour, aux repas.

Prix. — L'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement) : 21 fr. 30.

S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF
Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie
51, rue Nicolo — PARIS (XVI°)
Tél. : Trocadéro 62-24.

TRINITRAL LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée :

Trinitrine au centième..... II gouttes (3 cgr.).
Phényléthylmalonylurée 0,01
Extrait apocynum canabinum..... 0,003

Propriétés et indications. — Vaso-dilatateur à action immédiate. Sédatif puissant des algies cardiothoraciques et des spasmes vasculaires.

Diurétique et cardiotonique.

Médicament de choix des angoisses précordiales, des crises douloureuses d'origine aortique ou cardiaque, des troubles fonctionnels de l'hypertension, de l'aérophagie.

Forme. — Dragées jaunes à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Médication d'urgence : croquer 1, 2 ou 3 dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : avaler 1 dragée, 1 à 3 fois par jour.

Prix : 21 fr. 30 l'étui de 60 dragées (de 20 à 60 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF
Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.
51, rue Nicolo — PARIS (XVI°).
(Tél. : Trocadéro 62-24.)

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 centigr.).

Caféine..... 2 centigrammes.

Propriétés et indications. — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Médicament de choix de l'Angine de Poitrine, l'Asthme cardiaque, l'Œdème pulmonaire.

Forme. — Dragées blanches à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès.

Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente. — De 15 à 60 jours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.)

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 17 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

TRINITRINE-CARÉNA

Composition { Trinitrine au centième..... 11 gouttes.
Aminophylline 5 cgr.

Propriétés :

La *trinitrine* est vaso-dilatatrice et hypotensive ; elle agit rapidement, mais assez *brèvement*.

Caréna augmente le débit coronarien et assure l'irrigation *persistante* du myocarde.

Trinitrine-Caréna associe donc l'action instantanée de la trinitrine à l'activité synergique, mais plus prolongée et toni-cardiaque de *Caréna*. Elle *calme* les algies cardiaques et *prévient* la grande insuffisance ventriculaire gauche.

Indications : Crises intenses d'angine de poitrine, crises algiques des cardiaques ayant des signes de défaillance du myocarde, petits spasmes artériels, extrasystoles et palpitations.

Posologie et mode d'emploi :

Trinitrine-Caréna est présentée sous forme de dragées à noyau mou, permettant l'absorption per-linguale instantanée de la *trinitrine* et son action immédiate.

Médication d'urgence : croquer 1, 2 ou 3 dragées, à quelques minutes d'intervalle, au moment de l'accès ou à titre préventif. Ne pas dépasser 10 dragées par jour.

Médication d'entretien : avaler 1 dragée, deux ou trois fois par jour.

Remboursable par les Assurances Sociales à 80 %.

Société d'Applications Pharmacodynamiques.

9, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Inval. 43-60.)

TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :
Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 centigr.).
Chte Papavérine 5 milligrammes.

Propriétés et indications. — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.
Spécialement indiquée dans : Angine de Poitrine, Asthme cardiaque et pulmonaire, Aortites, Artérites, Urémie.

Forme. — Dragées roses à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et, par là même, une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées à quelques minutes d'intervalle, au moment ou en prévision des accès.

Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente : De 15 à 60 jours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.)

Prix de vente au public : Étui de 60 dragées : 22 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). (Trocadéro : 62-24.)

TRINITRINE ROUSSEL

Composition :

Comprimés nos I, II, III correspondant à I, II ou III gouttes de la solution au 1/100^e.

Indications :

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

Prix : 9 fr. 50-9 fr. 50-10 fr. 50.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élysées 62-27.)

TRINITRINE SIMPLE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à : Trinitrine à 1/100 : 1 gtte. (1 mgr.5).

Propriétés et Indications. — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée. Médicament de choix de l'angine de poitrine.

Forme. — Dragées blanches à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — La *Trinitrine Simple Laleuf* se recommande par son faible dosage (une goutte par dragée) chez les *sujets très sensibles* à la trinitrine.

Médication d'urgence : Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision des crises.

Maximum : 20 dragées par 24 heures.

Médication d'entretien : Avaler une dragée, une à trois fois par jour, aux repas.

Prix : 12 fr. 80 l'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). (Tél. : Troc. 62-24).

TRINIVÉRINE

Angine de Poitrine.

Forme. — Dragées vertes à noyau mou.

Composition. — Trinitrine (Vasodilatateur), Chlorhydrate de papavérine (antispasmodique), Caféine (toni-cardiaque, vaso-dilatateur des coronaires).

Indications. — Angine de poitrine, Cardialgie des aortiques, des hypertendus, Crises vasculaires, Angio-spasmes d'artérites, de l'hypertension (éclipses), Asthme cardiaque.

Mode d'emploi. — Croquer une dragée pour prévenir ou calmer l'accès. Si nécessaire, croquer 2 ou 3 dragées à quelques minutes d'intervalle. Ne pas dépasser 10 dragées par 24 heures.

Prix : 18 fr. 15.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

TRINO BENZYLE

Médication hypotensive.

Forme. — Comprimé dragéifié.

Composition. — Solution alcoolique de Trinitrine, poudre de Scille, Extrait de gui, Benzoate de benzyle, Phényléthylmalonylurée.

Indications. — Par son association de gui, scille, trinitrine, benzoate de benzyle et phényléthylmalonylurée, le TRINO BENZYLE est le médicament indiqué dans les hypertensions, artériosclérose, vertiges, angoisses, troubles cardiaques.

Posologie. — 4 à 6 comprimés à prendre par deux avant les repas. En cas de crises d'angor, croquer de 1 à 4 comprimés à 2 minutes d'intervalle.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-27.

P. BLOUIN

Pharmacien de 1^{re} classe,
50, rue de Turenne — PARIS.

TRIRADOL

Association d'iode organique, de menthol, de camphre et d'éléments radioactifs.

Indications. — Adénopathies cervicales et trachéo-bronchiques. Affections pulmonaires chroniques. Toute tuberculose pulmonaire et pleurale à évolution lente et à lésion limitée. Toute tuberculose chirurgicale.

Contre-indications. — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

Posologie. — 1 ampoule ou 2 à 6 capsules par jour pendant 15 jours par mois.

Boîte de 10 ampoules : 20 fr. 50.

Flacon de 60 capsules : 20 fr. 50.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

TRISALYL

Indications. — Traitement de la maladie rhumatismale. Rhumatisme articulaire aigu et toutes ses complications.

Composition. — Salicylates chimiquement purs de sodium, potassium et calcium, associés dans les proportions physiologiques du sérum de Ringer-Loeche.

Propriétés. — Le Trisalyl réalise l'association salicylée isoionique au sang, permettant l'emploi massif, continu, sans contre-indications ni intolérance, du Salicylate.

Formes :

Voie buccale : Solution dosée à 1 gr. 50 par cuillerée à soupe (250 cc.).

Comprimés glutinisés à 0 gr. 50.

Voie veineuse : Ampoules I, V.

8 ampoules 10 cc..... 0 gr. 50 par ampoule.

8 — 10 —..... 1 gr. — —

4 — 20 —..... 2 gr. — —

Posologie :

Voie buccale : à partir de 3 cuillerées à soupe, monter à 6 cuillerées pro die. Pour les comprimés de 4 à 16 en 24 heures.

Voie veineuse : d'abord 0 gr. 50, puis 1 gr., puis 1 gr. 50 par injection intraveineuse ; 2 injections par 24 heures.

Traitement d'entretien. — Moitié des doses ci-dessus ; au bout d'un certain temps, n'employer que la voie buccale.

TRAITEMENT EXTERNE ADJUVANT

BAUME TRISALYL

Composition. — Salicylate de glycol, Salicylate d'ammonium, Salicylate d'antipyrine, excipient *non gras*.

Indications. — Traitement externe des rhumatismes, lumbagos, douleurs, etc...

Propriétés. — Association d'un éther salicylique, absolument non irritant, au salicylate d'analgésine, calmant et antipyrétique. Absorption favorisée par salicylate d'ammonium. Excipient non gras. S'enlève à l'eau.

Mode d'emploi. — Onctions douces 2 fois par jour, *in loco dolenti*.

J. OLIVE, Pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-94.)

TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-magnésié, de goût très agréable.

Admise dans les Hôpitaux. Adoptée par les Ministères de la Marine et des Colonies après expérimentation.

Propriétés Thérapeutiques. — Excellent antiseptique des voies digestives, biliaires et urinaires, cholérétique et cholagogue, absorbant des gaz et des toxines, désensibilisant, diurétique, prévient la formation des calculs biliaires.

Originalité. — Produit d'une innocuité parfaite assurant, en même temps, l'évacuation des canaux biliaires et la désinfection des voies digestives, biliaires et urinaires. Contient une forte proportion de citrate de soude, lequel agit très heureusement sur le foie et les voies digestives, fait passer le sulfate de magnésie à l'état de citrate non irritant pour l'intestin, se transforme en carbonate dans l'organisme et, avec les benzoates de soude et de lithine, fluidifie la bile et les sécrétions, facilite la solution biliaire du cholestérol et modifie le pH biliaire dans le sens de l'alcalinité, ce qui aide à la stérilisation du milieu.

Indications. — Infections des voies digestives, biliaires et urinaires. Auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs conséquences (cholécystite, colibacillose, lithiase biliaire, entérite, cystites, furonculose, etc...) Séquelles fonctionnelles de la cholécystectomie.

Posologie habituelle :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. Une heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu d'eau aussitôt après ou délayer dans un peu d'eau.

Prix : 17 fr. 75.

Laboratoires G. LAMBERT, O. ✱, Docteur en Pharmacie
rue de la Paix — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54).

TRISILMAG

Composition. — Trisilicate de Magnésie à l'état colloïdal.

Présentation. — Poudre impalpable vendue en boîte métallique.

Indications. — Traitement des Ulcères gastriques, du jéjunum et du duodénum.

Mode d'emploi. — 1/2 à 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau une ou deux heures après les repas.

Lorsque les repas doivent être pris à intervalles réguliers, l'absorption du *Trisilmag* doit avoir lieu en général au milieu de l'intervalle entre deux repas.

Produit enregistré au L. N. C. M.

SCOTT et Fils, Pharmaciens.

348, rue Saint-Honoré — PARIS (1^{er}).

TRYNOL

(Comprimés.)

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base de silicate de soude, sels sodiques décholestérinisants, Gui, Parenchyme hépatique et thyroïdien. (Boîte de 50 comprimés.)

Propriétés et avantages. — Abaissant la tension artérielle, dissolvant la cholestérine et décalcifiant les parois artérielles, il tend à rendre de la souplesse aux artères, en empêchant les formations scléreuses.

Indications. — Artériosclérose, Athérome, Vertiges, Troubles circulatoires, etc.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour le matin à jeun ou 3 à midi et 3 le soir, de préférence avec une infusion rafraîchissante.

Prescription. — 1 boîte comprimés Trynol.

Prix : 15 francs.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

TUBERCULINES DE L'INSTITUT MÉRIEUX

Cuti-réaction. — Depuis plus de trente ans, l'Institut Mérieux fournit aux hôpitaux de Lyon la Tuberculine nécessaire pour la cuti-réaction classique de Von Pirquet.

Ce réactif est présenté soit en *trousses individuelles* permettant la pratique de 2 ou 3 épreuves, soit en *flacons compte-gouttes de 5 cc.*

Percuti-réaction. — Après quatre années d'expérimentation, l'Institut Mérieux délivre une Tuberculine spéciale pour percuti-réaction.

Plusieurs communications ont démontré que la percuti-réaction effectuée avec ce réactif donnait des résultats aussi sûrs que la cuti-réaction et était d'un emploi beaucoup plus pratique.

La percuti-réaction s'effectue sur la région sternale, après décapage préalable de la peau à l'éther. A l'aide d'une goutte de Tuberculine concentrée, il suffit de frictionner la peau pendant une vingtaine de secondes. Les réactions positives se manifestent dans les quarante-huit heures qui suivent l'application par une éruption caractéristique, alors que les réactions négatives n'amènent aucun changement dans l'aspect de la peau.

Institut biologique MÉRIEUX

17, rue Bourgelat — LYON.

TUBÉROL

TUBÉROL (pur)

Forme. — Liquide.

Composition. — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

Indications. — Toutes affections des poumons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — En enveloppements thoraciques : avec gaze hydrophile imbibée et en inhalations.

Prix : le flacon, 26 fr. 95 et 17 fr. 15.

TUBÉROL (onguent).

Composition. — Tubérol + Excipient adhésif.

Indications. — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

Mode d'emploi. — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

Prix : 13 fr. 90.

TUBÉROL (Oléo).

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — Tubérol + Huile stérilisée.

Indications. — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

Mode d'emploi. — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

Prix : 13 fr. 90.

TUBÉROL (Injectable).

Forme. — Ampoules.

Composition. — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

Indications. — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

Mode d'emploi. — 1 à 6 ampoules par jour suivant gravité.

Prix { ampoules de 5 cc. : 30 fr. ; la 1/2 boîte : 16 fr. 50
 ampoules de 2 cc. : 25 fr. 75 ; la 1/2 boîte : 14 fr. 50

TUBÉROL (Sirop).

Composition. — Tubérol + véhicule.

Indications. — Antiseptique des voies respiratoires. Calme la toux.

Mode d'emploi. — Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 4 cuillerées à café.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 04-02.)

TUBES BLACHE

**Toutes formules en pommades pour
l'Ophtalmologie.**

Liste des principales préparations :

Analgo-Contractine, Argovyl, Aristol, Bleu
de Méthylène, Cadmio-Zinc, Compositol,
Contractine, Hydrargyre composé, Hydro-
cupréine (Optochine), Ichto-zinc, Iodo-
forme, Iodure alcalino-calcique, Mydria-
tine, Nitrate d'argent, Ophtalmo-Chrome,
Organo-Bismuth, Oxyde Hg, Phocéol, Pré-
cipité blanc.

Tubes CHAUVIN

**Toutes formules en pommades
pour la Dermatologie et la Rhinologie.**

Etablissements Alfred CHAUVIN

(Laboratoire des Tubes Blache)

AUBENAS (Ardèche).

TUBES DULCIS POMMADES ASEPTIQUES

Argolène (1, 5 et 10 p. 100) : Bactéricide, conjonctivites aiguës.

Arlstol (1 et 2 p. 100) : Antiseptique.

Asepto-Bismuth (5 p. 100) : Bactéricide puissant, non irritant, inodore.

Atropine (0,50 et 1 p. 100) : Mydriatique.

Bleu de Méthylène 0,50 et 1 p. 100) : Colorant aseptisant, indolore.

Cadmiol-Zinc (1 p. 100) : Conjonctivites à diplobacilles.

Calomel (5 p. 100) : Antiseptique, résorbant.

Cuprinol (1, 2 et 5 p. 100) : Conjonctivites chroniques.

Diodéine (an' Dionine) (2 p. 100) : Lymphagogue, analgésique profond.

Eserine (Sulfate 0,50 p. 100) : Myotique.

Ichtyol-Zinc : Blépharites.

Iodo-Calcoique : Cataracte.

Iodo-Rubidium : Cataracte.

Iodoforme (1, 2 et 3 p. 100) : Antiseptique.

Kilogan : Antiseptique non irritant.

Mercurobrome : Antiseptique colorant.

Myosine faible : Myotique.

Myosine forte : Myotique puissant.

Mydriazine : Mydriatique énergique.

Novoptine : Ulcères à pneumocoques.

Oxyde Orangé de Mercure (1, 2, 3, 4 et 5 p. 100) : Antiseptique résorbant.

Ophthalmforme (1, 2 et 3 p. 100) : Antipurulent.

Pilocarpine (1,2 p. 100) : Myotique.

Polyvaccin-Antivirus Dulcis : Immunisent les cellules en contact et stérilisent le foyer infecté, sans réaction locale ni générale. Pommade Type Ophthalmo et Type Oto-Rhino.

Ampoules de 2 cc. Type Ophthalmo et type Oto-Rhino.

Précipité blanc (1, 2, 5 p. 100) : Antiseptique résorbant.

Sédargol (collyres ampoules) : 2 %, 5 % et 10 %. Toutes les infections.

Sédoleine (Brûlures des paupières et de la conjonctive).

Thiosinamine (1 p. 100) : Opacités de la cornée.

Vicamine A : Avitaminoses.

Xéroforme (5 p. 100) : Antipurulent.

Laboratoire du Docteur FERRY

MONTE-CARLO

TUBES DU D^r GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux
(Anciennement tubes DAVIEL).

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Prix : 9 et 10 francs.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Marcadet 37-98.)

TUBES FERLUX RATIO

Une gamme thérapeutique complète et rationnelle

Ils s'appliquent à 95 p. 100 des cas de l'ophtalmologie...

Tous les pharmaciens en sont approvisionnés,
vos ordonnances seront exécutées sans délai.

Une thérapeutique ophtalmologique en 7 formules :

Aseptoforme	Optochin, Bromo-phénate de bismuth, Aristol	Antiseptique Polyvalent : infections banales et à pneumocoques
Hydrargyl	Oxyde-jaune et orangé Calomel	Kératites justiciables des sels de mercure
Bléphargyl	Oxyde de zinc, Oxyde jaune Ichtyol, Thigénol, Résoreïne, etc.	Blépharites et Conjonctivites
Halocalcine	Iodure de sodium Chlorure de Calcium	Cataractes en évolution
Tracholéol	Huile de chaulmoogra Sels de cuivre	Trachome
Mydriatique Ferlux	Atropine, Scopolamine Duboisine	Mydriatique puissant et sûr
Myotique Ferlux	Pilocarpine-Esérine Adrénaline	Miotique

N. B. — Il existe également des Tubes Ferlux classiques à base de tous les médicaments utilisés en ophtalmologie.

Docteur G. BOUSQUET
à Albi — TARN

TUBES STRANA

Pommades ophtalmiques en tube breveté.
Toutes formules à partir de 9 fr. 75.

Liste des Préparations — Antipneumo, Argyrol, Bleu de Méthylène, Cadmio-Laro-Zinc, Calomel, Chlorhydrate d'Éthylmorphine, Eserine, Ichtyol, Ichtyol-Zinc, Iode-Calcium, Mydriatique puissant, Myotique puissant, Noviforme prov. Heyden, Oxyde jaune de mercure, Oxyde de zinc, Calmocaïne, Pilocarpine, Précipité blanc, Rouge écarlate, Sulfo-cuivre, Sulfo-laro-zinc, Tanargine, Xéroforme.

Laboratoires SALANTALE
STRASBOURG.

TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore de toutes plaies
(des plus bénignes aux plus graves).

Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail.

Constitution. — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques (activation considérable de la cicatrisation).

Propriétés. — Évite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

Le Tulle gras Lumière permet d'abréger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

Présentation. — Le Tulle gras Lumière est présenté en carrés de dimensions fixes :

0m07 × 0m09.	Boîte de 10 compresses.
0m10 × 0m10.	— 10 —
0m10 × 0m10.	— 20 —
0m10 × 0m10.	— 30 —
0m22 × 0m22.	— 30 —

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

Mode d'emploi — Placer un carré de Tulle gras sur la plaie, appliquer par-dessus le pansement stérilisé.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

TULLE ROSE BESLIER

Pansement gras.

Constitué par un carré de 13 × 13 imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli. Pélargonium.

Le **Tulle Rose Beslier** est un cicatrisant énergique ; il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures, plaies par vésication, ulcères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc...

Le **Tulle Rose Beslier** est livré en boîtes de 10 carrés de 13 × 13.

Prix : 12 francs la boîte.

M. GOQUELU, Pharmacien-Fabricant

DIGOIN (S.-et-L.).

(Tél. : 45.)

TYMPANYL MAY

Otités Catarrhales, Otitis.

Composition :

Novocaïne.....	1	gramme.
Diméthylamino-analgésine.....	4	grammes.
Alcool éthylique pur	16	—
Glycérine anhydre chim. pure	79	—
(En association anhydre).		

Indications. — Affections inflammatoires et congestives de l'oreille moyenne et de l'oreille externe : Otitis catarrhales et congestives, Otitis ; Furoncles du conduit.

Mode d'action. — Analgésique, antiseptique, décongestif par osmose per-tympanique.

Non toxique. Non caustique.

Mode d'emploi. — V à X gouttes en instillation dans l'oreille malade ; à renouveler toutes les heures ou deux heures.

Prix : Le flacon 15 cc. : 14 fr. 45.

Laboratoires P. MAY, Pharmacien.

Lauréat de la Faculté de Paris.

215, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 41-51.)

UCLARSYL

Novarsénobenzol Codex, voie intraveineuse.

Rigoureusement pur, instantanément soluble. Maximum de tolérance.

Poudre d'un jaune très clair, en ampoules scellées sous vide.

Syphilis à toutes les périodes. Traitement d'attaque et d'entretien.

Doses unitaires de 15 à 90 cgr. par fractions successives de 15 cgr.

Prix au public, suivant doses, de 3 fr. à 11 fr. 95.

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie A.

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

Dépre : **Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**
5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 20-20.)

ULCÉOPLAQUE - ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

Cicatrisation certaine des *Plaies aux jambes*, des *escarres*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîte de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions { Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim.
 { Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 24 ou 36 francs.

1 Ulcéobande. Prix : 30 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 19-04.

ULCÉOSINE

Poudre soluble.

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension artérielle, Varices, Congestions variqueuses et phlébitiques, Plaies atones, Ulcères variqueux, Rhumatisme chronique, Troubles hépatiques, Hyperglycémie, Diabète.

Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Prix : 12 francs.

ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-Sodique-Silicatée.

Par leur action sédative sur l'élément nerveux, les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses. Arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume. Font résorber l'œdème et l'empâtement. Guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

La boîte pour 4 bains de jambe. Prix : 8 francs.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS. (Tél. : Roq. 1904.)

ULCÉOSOL-POMMADE

Oxyde et peroxyde de zinc, acide orthobenzoïque, sulfate de cuivre, excipient spécial.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 10 francs.

ULCÉOSOL-POUDRE

Acide orthobenzoïque, magistère de bismuth, oxyde et peroxyde de zinc, acide boracique.

Poudre siccative, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 10 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 19-04.

ULCÉRINE BERGER

Spécifique des Ulcères Variqueux.

Composition. — Pommade stérilisée aux principes actifs suivants : populine, salicine, pectine, acide benzoïque, acide gallique, associés à certaines huiles volatiles nouvellement introduites en thérapeutique (*Thymus vulg.* et *Calendula off.*), dont les propriétés bactéricides et cicatrisantes sont remarquables.

Propriétés. — Décongestionnant. Suppression de la douleur et du prurit. Cicatrisation rapide de l'ulcération *par bourgeonnement*. Evite l'adhérence des pansements aux plaies et assure des cicatrices souples.

Indications. — *Ulcères variqueux*, même les plus rebelles.

Eczémas variqueux, secs et suintants.

Toutes les plaies atones : Radiodermites, Ulcérations chroniques, Brûlures anciennes, engelures, escarres, plaies diabétiques et par vésication, etc..

Mode d'emploi. — Nettoyer la plaie à l'eau bouillie, ou, si elle est infectée, avec de l'eau oxygénée au 1/3. Appliquer la pommade étendue sur une compresse de gaze stérilisée. Renouveler le pansement tous les jours, et 1 ou 2 fois par jours si les sécrétions sont abondantes.

Historique. — Présentée à la Société de Dermatologie par le Dr Gastou, chef du Laboratoire Central de l'Hôpital Saint-Louis, l'Ulcérine Berger a été admise dans les hôpitaux de Paris à la suite des rapports médicaux fournis par MM. les docteurs Brocq et Balzer, médecins des hôpitaux, Rieffel, chirurgien des hôpitaux, etc.

Prix : Le tube : 12 francs. — Le grand tube : 20 francs.

Laboratoires P. NADAUD

Docteur en Pharmacie, licencié ès Sciences.

31, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 66-58.)

ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

Présentation et composition. — Bande de 0 m. 13×10 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

Action. — Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

Indications. — Toutes les plaies atones des membres variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

Mode d'emploi. — Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Prix au public : 30 fr. la bande.

Pharmacie MAYAUD

6 ter, rue Voltaire

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

Tél. : Charlebourg 21-53.

ULTRACALCIUM IRRADIÉ

Reminéralisateur physiologique assurant toutes les propriétés physiologiques de l'Ion Calcium.

INDICATIONS. — Assimilation défectueuse du calcium, déminéralisations, déficiences constitutionnelles, troubles de croissance, anémie, lymphatisme, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, pré tuberculose.

Ergostérine irradiée.....	0 gr. 03
Poudre de parathyroïde.....	0 gr. 06
Poudre de surrénale.....	3 gr.
Poudre d'os frais.....	20 gr.
Poudre de thymus.....	5 gr.
Glycérophosphate de chaux.....	40 gr.
Glycérophosphate de manganèse.....	6 gr.
Fluorure calcium.....	5 gr.

Sucre aromatisé : Q. S. pour 1.000

Ultracalcium se présente sous la forme d'un granulé fondant, de goût très agréable et facile à prendre.

L'association d'extraits des glandes parathyroïdes, surrénales, etc., aux minéraux nécessaires à l'organisme (Phosphore, calcium, manganèse, magnésium), assure une reminéralisation optimale. La présence d'ergostérine irradiée ajoute à ces principes reminéralisateurs les propriétés considérablement augmentées de l'huile de foie de morue. Le granulé **Ultracalcium** peut être administré depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, sans aucun inconvénient.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, suivant prescription médicale. Prix : le flacon 16 fr.

LABORATOIRE AUCLAIRE,

Docteur Auclaire, Pharmacien de la Faculté de Paris.

36, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS (IX^e). — (Tél. : Trudaine 38-63.

ULTRACRINOL

Extraits désalbuminés de Foie, Rate, Moelle osseuse, frais d'animaux jeunes, préparés selon la méthode de Whipple.

Traitement adjuvant des Anémies pernicieuses. Anémies post-hémorragiques. Anémie des maladies infectieuses, Chlorose, Anémies des jeunes enfants. Toutes déficiences organiques, Convalescences.

Ampoules buvables, aromatisées au curaçao-orangé.

Boîte de 10 ampoules.

Coffret de 30 ampoules.

Adultes : 1 ampoule 1/4 d'heure avant chaque repas midi et soir dans un peu d'eau ; en cas de besoin, doubler la dose.

Adolescents : 2 ampoules par jour.

Enfants : A partir de 1 à 2 ans, 1 ampoule à boire par jour dans un peu d'eau sucrée en 2 fois.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 1750-2.

Laboratoires BIOPHARMAX

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.).

ULTRAFORMINE

B. et S.

Urotropine avec association de Benzoate de soude (B) ou de Salicylate de soude (S).

Composition. — Comprimés de 0,50 d'Urotropine et comprimés de 0,50 de Salicylate de soude ou de Benzoate, présentés en deux tubes différents dans la même boîte.

Propriétés. — Antiseptique urinaire, biliaire et général. L'association de Benzoate ou de Salicylate augmente fortement les propriétés diurétiques.

Indications. — Toutes infections générales, urinaires, Affections hépatiques, Affections rhumatismales (Ultraformine S).

Dose moyenne. — 2 ou 3 fois par jour 2 comprimés (un de chaque tube) dans un grand verre d'eau.

Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

ULTRA-LEVURE

Levure à température Ultra-Haute (37°)

Composition : 200 à 250 millions de globules de levure par ampoule de 5 cc. dans un milieu isotonique où la levure reste vivante pendant plus de 5 ans.

Propriétés : Température d'activité et de reproduction optimum correspondant à la température physiologique de l'intestin. Élimine les ferments pathogènes par concurrence vitale. Exerce cette action vivante sur tout le circuit d'élimination rénale.

Ne produit qu'une acidité insignifiante.

Facilite les phénomènes d'assimilation et de désassimilation — tonique par les diastases et les vitamines produites en grande abondance (principalement vitamines B). Action spéciale sur les dermatoses par la vitamine B.

Indications : *Infections intestinales*, états aigus et chroniques, diarrhées infantiles (peut se prendre mélangée au lait), diarrhées et dysenteries amibiennes ou bacillaires, entérites, furonculoses et dermatoses, *colibacilloses intestinales et urinaires* (résultats rapides), diabète.

Mode d'emploi : *dose normale :* une ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée ; *dans les cas aigus :* une ampoule deux fois par jour ; *dose d'entretien :* deux ampoules par semaine.

La boîte de 12 ampoules : 24 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (Ve).
(Tél. Odéon : 73-92.)

ULTRA-VIOLETS

- 1° Affections de la première et de la seconde enfance, hypotrophies, rachitisme, tétanie, anémies.
 - 2° Tuberculoses dites chirurgicales : ganglionnaire, osseuse et ostéo-articulaire, péritonéale, génitale.
 - 3° Affections cutanées : acné, psoriasis, engelures, lupus et affections du cuir chevelu, pelade.
 - 4° États de surmenage et d'asthénie, convalescence.
 - 5° Infections de l'oreille, tuberculoses oculaires, carie dentaire, pyorrhée, blanchiment des dents.
- Vente et location de tous appareils et accessoires à :

LA VERRERIE SOIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 90-13.)

ULTRAVITAMINE 4

" U 4 "

Puissant dynamogène. Recalcifiant intégral, plus actif et plus régulier que l'huile de foie de morue.

Composition. — Association des Vitamines avec des éléments minéraux : Phosphore, Manganèse, Calcium, et des éléments opothérapiques : Moelles et Poudres d'Os frais.

Indications. — Déminéralisation, Rachitisme, toutes Carences et Convalescences, Dépression nerveuse, Fatigue musculaire, Allaitement, Prétuberculose.

Forme. — Granulé bicolore, délicieusement parfumé.

Posologie. — La même pour enfants et adultes : 1 cuillerée à café de granulé sec ou dissous dans un peu d'eau froide, 1/2 heure avant les 2 ou 3 principaux repas

Prix : 18 fr. 70.

Laboratoire d'Actino-Biologie
LAURENÇON et Cie, Pharmaciens

11, rue François-Giraud —
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône.)

UMCKA

Gouttes

Phytothérapie antibacillaire

Composition. — Complexe végétal contenant les principes actifs de l'Umckaloabo, plante Africaine de la famille des Polygonacées.

Propriétés. — Amélioration du terrain. Augmentation des moyens de défense.

Indications. — Tous les états pré-tuberculeux pulmonaires et chirurgicaux.

Avantages. — Innocuité absolue, aucune contre-indication, parfaitement toléré, même par les organismes les plus délicats, convient particulièrement aux enfants (ganglions).

Présentation. — Petit modèle (P. M.). Extrait fluide inscrit au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 278-2. Durée moyenne 20 jours.

Grand modèle (G. M.). Extrait fluide concentré inscrit au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 278-1. Durée moyenne 4 mois.

Mode d'emploi :

Adultes : V à XXX gouttes 2 fois par jour.

Enfants : II à XV gouttes 2 fois par jour, dans une demi-tasse d'eau chaude ou tisane une demi-heure avant les repas.

Laboratoire E. REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 13-38.)

URALYSOL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites, Cystites.

Forme. — Granulés.

Formule. — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine. Lysidine, anhydro-méthylène-citrate d'hexaméthylène - tétramine, Sels de lithine.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café, matin et soir dans un verre d'eau.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées.)

URASEPTINE ROGIER

Principes actifs. — Hexaméthylènetétramine et son citrate, Benzoates de soude et de lithine, Diéthylènediamine.

Forme. — Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de matière active par cuillerée à café.

Action thérapeutique. — Puissant antiseptique urinaire et biliaire par dédoublement assuré de l'hexaméthylène, Antisepsie générale, Dissout et chasse l'acide urique.

Indications. — Pyélites, cystites et toutes affections vésico-rénales, cholécystites, Colibacillooses, maladies infectieuses, diathèse urique, arthritisme.

Posologie :

Adultes : Antisepsie vésico-rénale : 3 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Arthritisme : 2 à 4 cuillerées par 24 heures par périodes alternées de dix jours longtemps répétées.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par 24 heures suivant l'âge.

Le flacon : 15 fr. 50.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Pereire — PARIS.

(Tél. : Wagram : 33-70.)

URAZINE

Citro-salicylate de pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique. Action analgésique et antiseptique. Innocuité absolue.

Indications :

Goutte, Gravelle, Rhumatisme.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 30 ctg. : trois ou quatre par jour, au moment des repas (tubes de 20 comprimés). Prix : 9 fr. 60.

Granulés effervescents : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas (flacons de 85 g. env.).
Prix : 17 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

UR-CLAR

Antiseptique urinaire.

Forme : Capsules.

UR-CLAR BLEU

Composition. — Bleu de Méthylène, Citraminoxiphyène, Poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

Indications. — Toutes les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorragie.

Mode d'emploi. — 6 à 9 capsules par jour.

Prix : 20 fr. 80 les 60 capsules.

UR-CLAR BLANC

Forme : Capsules.

Composition. — Santalol citraminoxiphyène, poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

Indications. — La blennorragie et ses complications.

Mode d'emploi. — 9 à 12 capsules par jour.

Prix : 20 fr. 80 les 60 capsules.

Laboratoire M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS.

(Tél. : Trudaine 54-69.)

URÉINOL

Diurétique.

Granulé ou comprimés de goût très agréable.

Composition. — Hexaméthylène-tétramine recristallisée dans l'alcool, 20 cgr. par comprimé ou cuillère à café ; benzoate de soude ; extrait d'uva ursi ; orthosiphon stamineus ; camomille ; chendent, romarin.

Propriétés thérapeutiques. — Antisepsie des voies urinaires.

Indications. — Colibacillose, Arthritisme, Uricémie, Syndromes entéro-rénaux.

Pozologie. — De 2 à 8 comprimés ou cuillères à café par jour dissous dans de l'eau tiède ou froide.

Prix. — La boîte de granulés ou de 40 comprimés : 16 fr.

Laboratoire du MUXAGOL

43, rue de Chartres — NEUILLY-SUR-SEINE.

URÉMIASE

(Comprimés Anti-Urémiques.)

Composition. — Produit concret extrait du cerveau de certains poissons (Gadidés), associé à la Rénine (substance corticale rénale).

Propriétés thérapeutiques. — L'URÉMIASE rend d'immenses services dans le traitement de l'urémie d'origines diverses et des rétentions azotées. Douée de propriétés antitoxiques et en même temps diurétiques, elle produit un abaissement sensible du taux de l'urée sanguine, une diminution et même la disparition de l'albumine, l'activation de la diurèse dans l'Oligurie. On peut dire que, sous son action, le rein est débloqué.

Indications. — Crises d'Urémie, Néphrites chroniques, Azotémie, Hypertension, Artériosclérose, Oligurie, Insuffisance rénale, etc.

L'UREMIASE n'agit comme diurétique que dans les troubles fonctionnels du rein, dans tous les accidents de nature urémique, et non chez les sujets normaux.

Posologie. — *Adultes, Vieillards*: 3 comprimés dans une cuillerée d'eau toutes les deux heures. Après 5 ou 6 prises ainsi réparties, réduire à deux comprimés toutes les 2 ou 3 heures jusqu'à résolution.

Etats chroniques: 6 par jour, matin, midi, soir, pendant 2 ou 3 semaines.

Enfants à tout âge jusqu'à 14 ans environ: Même mode d'emploi avec 2 comprimés au lieu de 3.

Prix: 20 francs.

Dépôt: Laboratoire NOGUÈS
7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

URÉOL CHANTEAUD

Composition. — Granulé contenant par cuillerée à café:

Héxaméthylène tétramine	0 gr. 40
Benzoate de soude	0 gr. 30
Benzoate de lithine	0 gr. 10

Indications :

Désinfectant très actif des voies urinaires et biliaires.
Manifestations arthritiques, gouteuses, suppurations rénales et des voies urinaires.

Doses et mode d'emploi :

1 cuillerée à café 2 fois par jour que l'on fait dissoudre dans un peu d'eau.

Prix de vente: 12 fr. 50.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas

SAINT-OUEN (Seine). — (Tél.: Clignancourt 02-28.)

URICÉMINE

Excès d'acide urique, diurèse.

Antisepsie urinaire et biliaire.

Synergie médicamenteuse à doses non floclantes.

Composition de 2 cuillerées à café : Salicylate de pipézarine, 0,065 ; benzoate de soude, 0,25 ; benzoate de lithine, 0,25 ; silicate de soude, 0,025 ; urotropine, 0,25 ; citrate monosodique 0,30 ; sous forme de granulés. Doses fractionnées utilisables en totalité à l'état naissant par synergie et sans provoquer de précipitation.

Mode d'action. — Dissolvant de l'acide urique, anti-purinique, anti-floclant, anti-sclérosant, antiseptique.

Indications. — Hyperuricémie, Lithiase rénale, hypertension artérielle, artério-sclérose, athérome, goutte, sclatisme, asthme, pléthore, dermatoses. Infections urinaires et biliaires.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un verre de liquide, aux repas ou en dehors.

Prix : 17 fr. 50 le flacon.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 04-49.)

URICLARINE

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

Propriétés thérapeutiques. — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phénile et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales.

Indications. — Maladies infectieuses des Voies Urinaires, Cystites, Pyérites, Colibacilloses, Blennorrhagie.

Mode d'emploi. — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII°).

(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

URIFLUINE

Succinate de lithine.

Dissout l'acide urique, augmente la quantité des urines, empêche les coliques néphrétiques. Action anti-rhumatismale dans la Cellulite et le Rhumatisme chronique.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

URISANINE

Composition. — Une cuillerée à café représente:
0,75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine et 0,25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans un excipient balsamique (buchu).

Indications :

Antiseptique : par le benzoate d'hexaméthylène-tétramine toujours bien toléré.

Diurétique : par l'extrait spécial de maïs.

Sédatif : par le buchu et l'extrait de plantes balsamiques.

Toutes les affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésicorénale.

Solution aromatique concentrée, à prendre par cuillerée à café dans un demi-verre d'eau.

Posologie :

1 à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : X gouttes par jour et par année d'âge.

Prix du flacon : 16 fr. 50 (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 21-95.)

UROBLEU VERGELOT

Antiseptique urinaire.

Composition. — Bleu de méthylène : 0 gr. 03 ; Hexaméthylène-tétramine : 0 gr. 15, pour un comprimé.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires, par formation de formol, Tarit les sécrétions purulentes, Détruit les agents de fermentations, Cicatrise les muqueuses urinaires, Dissout l'acide urique, Diurétique, Permet de vérifier la perméabilité rénale.

Indications. — Affections des voies urinaires et leurs conséquences : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyuries, Colibacilluries. Aucun des inconvénients des balsamiques.

Présentation et mode d'emploi. — Comprimés dragéifiés, à prendre de 1 à 3, trois fois par jour, avant les repas, selon indications.

Prix : 17 fr. 70, le tube de 50 comprimés.

Laboratoires Ch. VERGELOT,

Docteur en Pharmacie,

6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-18).

Enregistré au Lab. de contrôle sous le n° 1236-3.

UROBOLDINE

Composition. — Pipérazine, Phosphate de soude, Phénylcinchoninate de soude, Carbonate de lithine, Hexaméthylène-tétramine, Chlorhydrate de boldine.

Présentation. — Granulé effervescent agréable au goût.

Propriétés thérapeutiques. — Dissolvant et éliminateur puissant de l'Acide urique, cholagogue. La Boldine associée aux plus actifs dissolvants actuels de l'acide urique assure à l'UROBOLDINE un pouvoir d'attaque et d'entretien.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Gouttes aiguë et chronique, gravelle, lithiase rénale, coliques néphrétiques, artériosclérose, arthritisme, troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires, auto-intoxications.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

Dans les crises aiguës, 3 à 5 cuillerées à café.

Laboratoires de l'UROBOLDINE

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

UROBUCCOL MALMANCHE

Composition :

Formine (uroformine, urotropine)...	25 centigr.
Benzoate de soude	20 —
— de lithine	10 —
Sirop de buchu.....	2 grammes.
— de maïs	2 —
— de térébenthine.....	2 —
— d'orthosiphon.....	2 —

par cuillerée à café.

Forme. — Liquide sirupeuse.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires, antiseptique général, balsamique et diurétique puissant. Dissolvant phosphatique, urique et uratique.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatite, Blennorragie, Uricémie, Goutte, Lithiase rénale, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion.

Prix au public : 14 fr. 60 le flacon de 90 cc.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences.

101, avenue Paul-Doumer,

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). (Tél. : 124.)

UROCHOLINE

Composition. — Salicylate d'hexaméthylène-tétramine, Peptones, Sulfate de magnésie, extrait d'artichaut, extrait de boldo, glycyrrhizine.

Indications thérapeutiques. — Lithiase biliaire, constipation, ictère, urticaire, hémorroïdes, cholestyrites simples et chroniques, intoxications du tube digestif.

Présentation. — Granulé soluble, odeur et saveur agréables.

Posologie et mode d'emploi. — De une à trois cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun. Enfants demi-dose.

Prix. — 18 fr. 20 pour un traitement moyen de 1 mois environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1.100.01.

Laboratoire de l'UROCHOLINE

20, pl. de la Mairie — PARC-SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 00-43.)

UROCLAROL

Antiseptique urinaire et biliaire.

Composition. — Urotropine purifiée par recristallisation dans l'alcool, 0,15 ; Benzoate de lithine, 0,10 ; Sulfate de magnésie, 0,25 ; Extrait de belladone, 0,005, pour un *comprimé* glutinisé dragéifié ou une demi-cuillerée à café de *granulé*.

Propriétés. — *Antiseptique* des voies urinaires et biliaires par l'Uroformine. — *Uricolytique* grâce au Benzoate de lithine. — *Cholagogue* et légèrement laxatif (Sulfate de magnésie). — *Antispasmodique* : l'Extrait de belladone agit sur le syndrome colique si fréquent au cours des Lithiases (biliaires et rénales) et des Suppurations rénales.

Indications. — Colibacillose, Coliques néphrétiques et biliaires, Cholécystites, Pyélites, Cystites, Prostatites, Blennorragie. Toutes infections urinaires.

Mode d'emploi. — Quatre à dix *comprimés* par jour ou deux à cinq cuillerées à café de *granulé*.

Il est recommandé de faire alterner les cures d'Uroclarol et de Buchobléu.

Boîte de 35 comprimés : 20 francs.

Boîte de granulé : 20 francs.

Laboratoires de l'UROCLAROL

117, rue Victor-Hugo — HOUPLINES (Nord). (Tél. 11.)
Médicament enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1480-2.

UROCLASE

Gouttes.

Traitement causal de l'Uricémie et des états pré-alcalosiques. — Anti-urique vrai (préventif et curatif). Non toxique. — *Acidifiant (chimiquement non acide)*.

Définition :

L'*Uroclase* agit exclusivement par l'état colloïdal dans lequel ses composants s'y trouvent, comme le prouve sa formule (pour 100 gr. de solution) :

Bioxyde de silicium : 0,25, uni par adsorption au Carbonate de K : 0,02, au Chlorure de Na : 0,19, et au Carbonate de Lithium : 0,005.

Dispersés en milieu aqueux par procédé spécial.

Mode d'action :

L'*Uroclase* est essentiellement un *modificateur du terrain*, bien que son action immédiate en fasse également le plus actif éliminateur des dépôts existants d'acide urique. Son efficacité est profonde, progressive et durable.

En effet, par sa forme colloïdale, il permet la self-acidification de l'organisme, corrige progressivement le métabolisme, rétablit l'équilibre acido-basique dévié vers l'alcalose et redresse jusqu'à la normale le pH humoral et tissulaire. La précipitation de l'acide urique endogène et exogène devient ainsi impossible dans l'organisme.

Il agit à la façon des diastases suivant les lois de la physico-chimie des colloïdes, sans altérer l'organisme ni déclencher les réactions alcalines de défense.

Indications :

- 1° *Uricémie*: Arthritisme, Goutte et Rhumatisme goutteux, Artériosclérose et son hypertension, Névralgies (Sciaticque, Lumbago, Migraines) et tous les troubles de même étiologie (Arthrite alvéolaire, Bourdonnements, Cataracte uricémique, etc.).
- 2° *Toutes les manifestations pré-alcalosiques*: Asthénies, Psychasthénies, Surmenage, Sénilité, etc.

Posologie :

Son inobservation diminuerait sensiblement l'efficacité du traitement.

Prescrire : V à X gouttes d'*Uroclase* à prendre dans *un peu* d'eau seulement, le matin à jeun (1/4 d'heure avant toute autre ingestion), par décades alternées de cure et de repos.

En bonne règle, commencer par V gouttes seulement (au delà, le traitement peut réveiller au début, tout comme une banale cure hydro-minérale, une légère manifestation arthritique de courte durée), puis atteindre graduellement (dès la 3^e décade de cure) la dose journalière optima, à savoir : I goutte par 10 kg. de poids.

Pas de contre-indication, ni intolérance, ni accoutumance. Inoffensif et sans saveur, il n'a pas d'action nocive sur le cœur ni sur aucun autre organe.

Pas de régime (une alimentation variée est à conseiller), mais proscrire l'alcool et tous excès en général.

Pour atteindre pleinement le but visé, la persévérance doit être exigée.

Contrôle de l'efficacité de l'Uroclase :

Avant de commencer le traitement (à instaurer dès terminaison de la période aiguë) :

- 1° Prendre la tension artérielle ;
- 2° Faire le dosage de l'acide urique : *a.* dans les urines ; *b.* dans le sang.

Au cours du traitement :

a. Constatations immédiates :

- 1° Augmentation du taux de l'acide urique dans le sang, et secondai-
rement dans les urines ;
- 2° Eventuellement, légère manifestation arthritique (sujets fortement
uricémiques).

b. Constatations ultérieures :

- 1° Chez les hypertendus : abaissement de la tension artérielle ;
- 2° Diminution du taux de l'acide urique d'abord dans le sang, puis
dans les urines (jusqu'à la normale) ;
- 3° Sensation de légèreté, de souplesse, d'euphorie, de lucidité mentale
avec une sorte de rajeunissement, de goût au travail, etc.

UROCLASE « M »

GOUTTES

Diathèses mixtes (uro-oxaliques, uro-phosphatiques).

Même composition que l'*Uroclase* normal, mais avec micelles colloïdales plus fines ; son emploi doit être réservé aux cas suivants : Lithiase urinaire (rénale ou vésicale), Rhumatismes déformants, Tophi, etc.

Posologie spéciale. — Prescrire un traitement prolongé, avec alternances d'*Uroclase* normal et d'*Uroclase* « M ».

Mêmes décades de cure séparées par des repos équivalents.

Commencer par V gouttes journalières, dose à porter progressivement, dès la 3^e ou la 4^e décade de cure, jusqu'à XV et même XX gouttes (selon la sensibilité du sujet).

On constate tout d'abord des éliminations de gravelle avec arrêt dans l'évolution des formations calculeuses ; puis, *avec le temps*, une lente désagrégation de ces dépôts ou calculs (que confirme l'examen radiologique). Ces résultats remarquables s'expliquent par le mode d'action physico-chimique d'*Uroclase*.

Prix de vente :

Le flacon <i>Uroclase</i> normal (pour 2 mois de traitement)...	24 fr. 50
Le flacon <i>Uroclase</i> « M »	26 fr. 50

Littératures spéciales et échantillons sur demande aux :

Laboratoires UROCLASE-CATHACIDE-CHOLAL

G. BERTIN, pharmacien,

95, rue de Prony — PARIS (XVII^e) — (Galv. 76-86).

UROCYLATE

Composition. — Hexaméthylène tétramine et Salicylate de soude.

Forme. — Liquide sirupeux.

Dosage. — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 75 d'Hexaméthylène tétramine + 0 gr. 75 de Salicylate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires. Antiseptique général.

Indications. — Celles de la médication urosalicylée. Tout état infectieux, gripes, voies urinaires, colibacillose, cholécystite, affection thyphoïde, état arthritique.

Posologie. — Voies biliaires : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun. Autres états infectieux : 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix au public : 19 fr. 25.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion, A. CHATAIN

Docteur en Pharmacie

Ex-interne en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon.

Diplômé de Bactériologie de l'Université de Lyon.

Dépôt général :

57, rue Pierre-Corneille — LYON.

UROFLUX

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Extrait rénal, 0 gr. 02, Tartrate de pipérazine, 0 gr. 05. Benzoate de lithium, 1 gr. Benzoate de sodium, 1 gr. Hexaméthylène tétramine, 3 gr. Pipérazine, 0 gr. 50. Excipient effervescent au citron Q. S. pour 100 gr.

Propriétés pharmacodynamiques. — Diurétique, antiseptique des voies urinaires et biliaires, régulateur de l'activité hépatique, dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Affections urinaires (urétrites, cystites, prostatites). — Manifestations arthritiques (goutte, gravelle, coliques hépatiques et néphrétiques).

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dissoute dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour entre les repas.

Prix : 14 fr. 50 pour 10 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

UROFORMINE GOBEY

Hexaméthylène-tétramine chimiquement pure, cristaux solubles dans l'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique sanguin pouvant être utilisé contre toutes les infections.

Indications. — Fièvres infectieuses, grippe simple, encéphalites, complications bronchiques et pulmonaires, etc... Infections des voies biliaires et urinaires, colibacillose.

Présentation :

Bte de 50 comprimés simples à. 0,05	Bte de 12 ampoules de 2 cc. à. 0,50
Bte de 50 comprimés efferv. à. 0,25	Boîte de 6 ampoules de 5 cc. à. 0,25
Boîte de 12 ampoules de 2 cc. à. 0,25	Boîte de 6 ampoules de 5 cc. à. 0,50
Boîte de 8 suppositoires associant Uroformine, Ichthyol, Jusquiame et Codéine.	

Posologie :

2 à 4 comprimés simples par jour.

1 à 8 comprimés effervescent par jour (dans un grand verre d'eau).

4 à 3 ampoules par jour.

2 à 3 suppositoires par jour.

Prix au public :

La boîte de 50 comprimés à 0,50 15 fr. 35

La boîte de comprimés effervescent 15 fr. 35

La boîte de 8 suppositoires 16 fr. 60

Remboursement aux assurés sociaux : catégorie B.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e). (Tél. : Littré 58-43.)

UROÏODINE

Composition. — Iodoéthylate d'hexaméthylène-tétramine, associé au salicylate de lithine.

L'*Uroïodine* n'est pas une simple association Iode-urotropine-lithine, mais une combinaison chimique nettement définie.

Elle ne peut donc être remplacée par une formule magistrale. Elle contient 43 p. 100 d'iode rigoureusement titré, au lieu de 17 p. 100 dans les iodopeptones.

Propriétés physiques. — Solution dialysable — se décomposant lentement — s'éliminant dans l'urine, sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique, pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques :

- 1° Par sa molécule iodée : excitateur puissant des fonctions lymphoïdes ;
- 2° Par sa combinaison iodo-salicylate-formine : agent anti-infectieux particulièrement énergique; antinévralgique et antithermique.
- 3° Grâce à l'association formine-lithine : diurétique très actif, urisolvant puissant.

Indications. — *Diathèse urique* : Goutte, gravelle, lithiases biliaire et rénale.

Diathèse arthritique : Rhumatismes chroniques et subaigus, sciatique.

Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires; tuberculose pulmonaire (formes non congestives); Toutes affections justiciables d'un traitement iodo-ioduré intensif : adénopathies, végétations, asthme, emphysème, scléroses viscérales, artério-sclérose, hypertension artérielle.

Toutes maladies infectieuses, du Système nerveux notamment.

L'*Uroïodine* agit sur la douleur et sur la cause.

Présentations. — Ampoules de 4 cc., injectables indifféremment en I. M. ou I. V. — sans réaction locale, ni choc — résorption parfaite. Comprimés de 0 gr. 50, enrobés de gluten : ne se dissolvant donc pas dans l'estomac, tolérance parfaite.

Posologie :

Chez l'enfant : au-dessous de 15 ans : 1/2 à 1 ampoule par jour ; 1 à 3 comprimés par jour.

Chez l'adulte : 1 à 3 ampoules par jour, simultanément (à la dose maxima, de préférence en I. V.) ; 4 à 8 comprimés par jour. Avaler les comprimés avec un peu d'eau, sans les croquer, de préférence avant les repas. Chaque ampoule correspond à 148 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Chaque comprimé correspond à 48 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Prix : Ampoules : 28 francs ; Comprimés : 25 francs.

Laboratoires de l'UROÏODINE

17 bis, rue Juge — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 41-22 et 08-02.)

UROMÉTHYL

Composition. — Hexaméthylènetétramine chimiquement pure, Citrate d'Hexaméthylènetétramine, Bleu de méthylène, Salol.

En association stable.

Formes et posologie :

a. Cachets à noyau médicamenteux glutinisés (3 à 6 par jour).

b. Dragées glutinisées (6 à 8 par jour).

Action thérapeutique. — La libération d'une partie des principes actifs a lieu seulement dans l'intestin : d'où *activité renforcée et tolérance parfaite*, même par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Antisepsie générale, Maladies infectieuses, Affections et infections des voies urinaires et biliaires, Manifestations des diathèses urique et arthritique.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

UROMÉTINE LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylènetétramine pure.

Formes. — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Ampoules : Prix 17 fr. 05. — **Comprimés :** 14 fr. 95.

Littératures et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

UROMIL

Composition. — Ether éthyl-phényl-cinchonique, pipérazine, hexaméthylène-tétramine, phosphate disodique.

Forme. — Granulés effervescents, instantanément solubles dans l'eau. Solution de goût agréable.

Action. — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Possède un pouvoir dissolvant double de celui des pipérazines granulées et est toujours bien toléré. Par ses éléments phosphoriques, empêche la néo-formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique. Combat ainsi efficacement la cause même de la diathèse urique.

L'ion H dérivé de ses phosphates acides et le CO² qui se développe au moment de son ingestion assurent l'équilibre acido-basique du plasma sanguin.

Indications. — Diathèse urique, rhumatismes, goutte, lithiases, coliques néphrétiques, cystite, pyélite.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dissoute dans un verre d'eau.

Laboratoires UROMIL
L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie,
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 04-00.)

UROPHÉNYL

Composition. — Acide phénylquinolique carbonique et hexaméthylène-tétramine recristallisée.

Action. — La puissance de l'acide phénylquinolique carbonique pour l'élimination de l'acide urique, sans ses inconvénients (ictère) par association en heureuse proportion avec l'urotropine recristallisée.

Indications. — Goutte et rhumatisme.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cachets par jour avant les repas, dans un grand verre d'eau alcaline.

Prix : 18 francs.

Laboratoires CROUY
Docteur en Pharmacie.
VERNON (Eure).

UROPHILE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 363-10.

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Uricolytique, Diurétique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

Indications. — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

L'étui de 90 grs : 17 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

UROQUINOL

Antiseptique urinaire et biliaire.

Action :

- 1° Mobilisatrice par le Phénylcinchoninate de Soude.
- 2° Cholagogue par l'extrait d'artichaut.
- 3° Antivisqueux par le citrate trisodique.
- 4° Empêche la formation des purines et entrave la précipitation de l'acide urique par son phosphate de soude.

Formule :

Phénylcinchoninate de soude	1
Urotropine	3
Tartrate pipérazine.....	1
Phosphate de soude pulvérisé	1
Citrate trisodique	2
Extrait mou artichaut repris.....	0,50

Pour 100 grammes.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, dans un verre d'eau, pris le matin à jeun et avant les repas.

Dans les crises aiguës : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Présentation. — Granulé soluble.

Prix : 19 fr. 25.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Lon 04-61.)

UROSALYL

Association Urotropine-Salol stabilisée par un excipient spécial qui augmente son pouvoir cholagogue et lui donne une remarquable activité.

Deux formules : I. — **UROSALYL SIMPLE**

Cachets (boîte blanche).

1 cachet correspond à :

Hexaméthylène - tétra -

mine..... 0 gr. 40

Salol..... 0 gr. 50

Granulé :

1 cuiller à café correspond à :

Hexaméthylène - tétra -

mine..... 0 gr. 10

Salol..... 0 gr. 10

II. — **UROSALYL-MÉTHYLE.**

(Sans Urotropine).

Cachets (boîte bleue) :

1 cachet correspond à :

Bleu de méthylène cristallisé chimiquement pur... 0 gr. 03

Salol..... 0 gr. 65

Particularités. — Grâce à l'heureuse association de ses composants qui retarde la décomposition de l'urotropine dans l'estomac, crée le milieu favorable à son dédoublement dans l'intestin et assure son élimination par les urines, l'Urosalyl est bien plus actif que chacun de ses éléments, qu'ils soient pris ensemble ou isolément.

Propriétés. — Puissant antiseptique des infections gastro-intestinales, urinaires, biliaires; rhumatismales et toutes maladies infectieuses. Le bleu de méthylène étant un puissant sédatif de l'élément douleur, l'Urosalyl méthylé est particulièrement indiqué dans toutes les affections douloureuses de l'appareil urinaire (cystites et prostatites tuberculeuses), ainsi que dans les crises aiguës de rhumatisme arthritique et toutes les fois qu'il y a intolérance à l'Urotropine.

Indications thérapeutiques.

Infections gastro-intestinales. — Fermentations intestinales, auto-intoxications, intoxications alimentaires, colibacilliose et toutes maladies d'origine infectieuse ou microbienne : agit comme antiseptique général interne par son urotropine, comme antiseptique intestinal par son salol.

Infections biliaires. — Angiocholites, cholécystites, lithiase biliaire et toutes les manifestations de l'hépatisme : agit comme antiseptique par son urotropine, comme cholagogue par son salol dont l'excipient vient renforcer son action sur le foie et la bile.

Infections urinaires. — Urines troubles, purulentes, microbiennes, toutes infections urinaires, rénales, vésicales, cystites, urétrites, prostatites, pyélonéphrites, syndrome entéro-rénal.

Rhumatismes. — Agit par son salol qui se décompose dans l'intestin avec mise en liberté d'acide salicylique, spécifique du rhumatisme.

Posologie :

Cachets (simple ou méthylé) : 2 à 3 par jour au début des repas.

Granulés : 2 à 6 cuillerées à café dans un peu d'eau au début des repas.

Présentation :

Cachets (simple et méthylé) : boîte de 24 cachets (8 jours de traitement) : 12 francs. — Boîte de 60 cachets (20 jours de traitement) : 25 francs.

Granulé : étui de 125 gr. (8-10 jours de trait.) : 15 fr.

Enregistrés au laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 300-1, 300-2 et 300-3 (peuvent être prescrits aux assurés sociaux).

Laboratoire Clément GARDIOL

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Montpellier,

6, rue Félix-Pyat — MARSEILLE (Tél. : National 49-10.)

Échantillons et littérature sur demande.

UROSERUM

Puissant diurétique polyvalent, Effet rapide et prolongé sur la diurèse, pas d'accoutumance. Antiseptique des voies urinaires. Dépuratif doux.

Composition. — Associations organiques et minérales, granulé soluble effervescent, 0 gr. 55 de principes actifs par cuillerée à café.

Posologie :

Antiseptique : 3 cuillerées à café par jour.

Anti-urique : 2 cuillerées à dessert par jour.

Dépuratif : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix. le flacon : 19 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1766-13.

Laboratoires LAUGIER

56, rue St-Lambert — MARSEILLE.

UROSIPHON

Forme. — Infusion, de goût agréable.

Composition. — Orthosiphon Stamineus de culture, sélectionné et desséché suivant un procédé spécial, conservant toutes les propriétés et tout l'arome de la plante fraîche.

Propriétés. — Puissant diurétique hépato-rénal, azoturique, déchlorurant, hydrurique, sédatif, stimulant de la dépuration urinaire.

Indications. — Oligurie, hyperazotémie, uricémie, hypochlorurie, cystite, pyélonéphrite, rhumatisme goutteux, œdèmes, hépatisme.

Posologie. — Chacun des 10 paquets contenus dans la boîte d'*Urosiphon* sert à préparer un demi-litre d'infusion qui représente la dose quotidienne à absorber en 3 ou 4 prises au cours de la journée.

Laboratoire de l'UROSIPHON

J. HUCHEDÉ, Docteur en Pharmacie.

1, rue de l'Odéon — PARIS.

UROVITINE

Composition. — Vitamine A, extrait d'Orthosiphon, Hexaméthylène-tétramine, Chlorure d'Ammonium.

Propriétés. — Antiprécipitant biologique, Diurétique, azoturique, déchlorurant. Antiseptique interne. Acidifiant léger du pH urinaire. Anticolibacillaire. Antiinfectieux.

Indications. — Affections des Voies Urinaires, Arthritisme, Hypertension, Maladies infectieuses, Chirurgie pré et post-opératoire.

Présentation. — *Dragées* — Prix : 18 francs.

Mode d'emploi. — 3 à 6 dragées par jour. en 2 ou 3 fois, avec un peu d'eau.

LABO-VITA

190, boulevard Haussmann — PARIS.

URTICIDE DRAGÉES

Antianaphylactique.

Composition. — Pancréatine, Hépatine et 12 peptones (Poissons, crustacés, sérum de cheval, caséine, gluten, ovalbumine, etc.).

Indications. — Urticaire alimentaire ou sérique. — Migraines rebelles. — Eczéma prurigineux. — Prurits. — Tous états anaphylactiques. — Zona.

Mode d'emploi. — Traitement d'attaque : 2 dragées toutes les heures pendant au moins 6 heures. — Les jours suivants, 4 fois par jour, 3/4 d'heure avant les 3 repas et le soir au coucher. — Prolonger le traitement 15 jours.

Cas chroniques : 2 dragées matin, midi et soir, 3/4 d'heure avant les repas.

L'étui de 80 dragées 21 fr. 35

L'étui de 40 dragées 13 fr. 40

CHARLES ROCHE, * * * , Pharmacien,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon, Ex-pharmacien major de l'armée, Ex-chef de travaux de chimie.

2, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 8-91.

URTICIDE LIQUIDE

Pour enfants et adultes.

Composition et Indications. — Les mêmes que sous forme dragées et comme indications particulières : Asthme infantile, Prurigo Stophulus, Prurit des fièvres éruptives, Vomissements des nourrissons.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café à prendre à la même fréquence que les dragées.

Contre les vomissements des nourrissons : 1 cuillerée à café 1/4 d'heure avant les tétées.

Observation importante. — Une cuillerée à café d'Urticide liquide correspond à une dragée d'Urticide et peut se donner aux adultes par cuillerées à dessert.

Le grand flacon (40 doses) 21 fr. 35
Le petit flacon..... 13 fr. 40

CHARLES ROCHE, ☼ ☼ ☼, Pharmacien.

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon, Ex-pharmacien major de l'armée, Ex-chef de travaux de chimie.

2, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 8-91.

Adr. télégr. : Gaipharmcy Alger. Dépôt général :

O. C. P. Paris.

UTERSAN

Décongestif Utéro-ovarien.

Composition. — Extrait mammaire, Extrait placentaire, Anémone pulsatille, Bourse à Pasteur, Cimicifuga, Hamamélis, Hydrastis, Marron d'Inde, Viburnum, Sépia.

Posologie. — 6 dragées par jour, 10 à 20 jours par mois. Cesser pendant les règles.

Indications. — Traitement *per os* des états congestifs, inflammatoires, douloureux et des hyperplasies de l'appareil utéro-ovarien. Métrites. Salpingites. Prolapsus, Rétroversions. Fibromes, Métrorragies et Leucorrhées. Suites de couches.

Prix de l'étui de 60 dragées argentées : 18 francs.

Laboratoire du VAQOSEDYL

22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

G. COUSSINET, Pharmacien

Licencié ès sciences.

UVARGOL

Argent colloïdal irradié. Plus actif et plus constant dans ses effets que l'Argent colloïdal ordinaire. Agit sans effet toxique en raison de la faible dose nécessaire.

Forme. — Dragées (à avaler) à 0,01, pour adultes 6 à 8 par jour.

Prix : 20 fr. 50

Comprimés Solubles à 0,01 pour enfants (3 à 5 par jour) ou adultes (6 à 8).

Prix : 19 francs.

Ovules à 0,05. 19 francs.

Pommade à 5 p. 100. 14 francs.

Indications. — Maladies infectieuses de l'intestin et des voies urinaires (Entérites, diarrhées, cystite, Syndrome entéro-rénal, etc.).

Antiseptique général.

Laboratoire MARTINIE

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 86-84.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 1122-1 à 1122-4.

UVASTHÈNE

ÉLIXIR DE GÉNOSTRYCHNINE AU MUSCAT

Forme. — Elixir.

Propriétés. — Reconstituant puissant. Stimulant de la nutrition et des fonctions vitales.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient :

Benzoate de génostrychnine.....	0,0012
Ester éthylorthophosphorique.....	0,06
Méthylarsinate de manganèse.....	0,012
Fluorure de sodium.....	0,003
Elixir de jus de raisin (Muscat 15°).	15 cc.

Posologie: Dose avant chaque repas :

Adultes: 1 verre à liqueur ou 2 cuillerées à soupe.

Indications. — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage physique et intellectuel, Déchéances organiques.

Avantages. — L'*Uvasthène* permet l'utilisation des remarquables vertus de la Génostrychnine sans donner lieu au moindre symptôme d'intolérance.

Prix au public : 20 fr. le flacon de 300 cc.

Admis aux Assurances Sociales.

Enregistré au Lab. Nat. de Contr. sous le n° 1142-5.

Laboratoires BOURDOU
FRONTIGNAN (Hérault).
(Tél. 21.)

UVÉ

(Gouttes.)

Composition. — Solution aqueuse de phosphate diacide de calcium, chlorure manganeux, chlorure de magnésium, chlorure ferreux, acide orthophosphorique, activés.

Ni arsenic ni strychnine.

Mode d'action. — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

Indications. — Toutes les anorexies (nourrissons, enfants, adultes), dont elles sont le véritable spécifique. Convalescence, Asthénies, Surmenage, Décalcifications, Alcalose.

Posologie. — *Adultes* : XL à C gouttes. *Enfants* : XX à L gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau pure ou bicarbonatée.

Nourrissons : I goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois ; I goutte et demie par mois de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

Prix : Le flacon :

Petit modèle : 11 fr. 20 Grand modèle : 20 fr. 80

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1. rue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV^e).
(Tél. Alésia 28-51.)

UVÉOLINE

Pommade antiseptique aux essences aromatiques, longuement irradiée par les Rayons Ultra-Violets.

Indications. — Pyodermites, Plaies atones, Ulcères variqueux, Furonculose.

Mode d'action. — Agit par les essences végétales, l'hydroxyde de magnésium, le peroxyde de zinc, le bismuth, le calomel.

Mode d'emploi. — En onctions ; en compresses imprégnées ; incorporée à la paraffine dans les brûlures.

Prix du tube de 40 gr. : 11 fr. 50.

Ovules à l'Uvéoline.

Traitement de toutes les lésions utéro-vaginales.

Prix de la boîte de 6 ovules : 18 fr. 75.

Laboratoire de l'UVÉOLINE

Pharmacie AMBARD

CARCES (Var).

(Téléphone n° 35.)

UVÉSTÉROL

Vitamine D + Cholestérine.

Composition. — Émulsion d'aspect et de goût non huileux; contenant par cc. (XXXV gouttes):

Vitamine D cristallisée..... 6 000 unités
antirachitiques

Cholestérol irradié..... 5 mgr.

Extrait de levure de bière vitaminé... 1 mgr. 3

Mode d'action. — Fixe chaux et phosphore, active la croissance. Antitoxique, bactéricide, hématopoïétique.

Avantages. — Remplace intégralement l'huile de foie de morue, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de la vitamine D (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique de la cholestérine.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.

Parfaitement toléré, même par les fébricitants.

L'absorption du produit dans le lait augmente considérablement son activité (Hess et Wieland).

Indications. — Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose, Rachitisme, Tétanie, Décalcification. Améliore rapidement l'état général des tuberculeux chroniques.

Conservation. — Garde son activité intacte même après plusieurs années.

Posologie. — *Adultes* : XL à LXXX gouttes.

Enfants : XV à L gouttes diluées dans une boisson lactée de préférence, ou une eau alcaline, du jus d'orange.

Chez le nourrisson sain (action préventive) : V à XX gouttes.

Chez le nourrisson rachitique : XX à XXX gouttes.

N. B. — Bien agiter le flacon avant l'usage.

Prix. — Le flacon :

Petit modèle : 11 fr. 20 Grand modèle : 19 fr. 70

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur-Lannelongue — PARIS (XIV^e).

(Tél. Alésia 28-51.)

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe. Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification « véritablement impressionnante du tableau classique de la pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée, dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc., congestion grippale. Enraye immédiatement toutes gripes légères ou graves dans leur évolution et évite ainsi leurs complications.

Mode d'emploi. — Voir « Vaccin Anti-Pneumonique. »

Produits " STÉNÉ "

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

VACCIN DE WEILL ET DUFOUT

Composition. — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

Indications :

Préventif : Bronchites profondes ou épidémiques, Broncho-pneumonies post-opératoires.

Curatif : Broncho-pneumonies de l'enfant et de l'adulte, Pneumonies.

Avantages. — Aucune contre-indication, aucune réaction.

Forme. — Ampoules de 2 cc.

Posologie :

Nourrissons : 1/3 de cc., puis 1/2 cc., puis 1 cc.

Adultes : 1 cc., puis doubler.

Ne pas injecter le vaccin à travers des téguments atteints d'eczéma, d'impétigo, de pyodermites.

Prix : 40 fr. 50 la boîte de 6 ampoules ; 23 fr. 45 la boîte de 3 ampoules.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS.

VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.
Médication causale naturelle.

A PRESCRIRE PAR N° ou PAR LETTRES SYMBOLIQUES

Innocuité absolue.

1. Vaccin Ao. Sa (acné).....	Cépède.
2. Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
3. Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
4. Vaccin C. E. (coli-entéroccoccique).....	Cépède.
5. Vaccin C. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
6. Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite).....	Cépède.
7. Vaccin E. (entéroccoccie).....	Cépède.
8. Vaccin E. S.....	Cépède.
9. Vaccin E. Sa.....	Cépède.
10. Vaccin G. (gonococcie).....	Cépède.
11. Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
12. Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorragiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
13. Vaccin G. C. S. E. S. Psd.....	Cépède.
14. Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë)....	Cépède.
15. Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
16. Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
17. Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
18. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca.....	Cépède.
19. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otitis, sinusites)...	Cépède.
20. Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
21. Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
22. Vaccin S (érysipèle).....	Cépède.
23. Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite).....	Cépède.
24. Vaccin S. E. S. (puerperalité, abcès chauds, phlébites).....	Cépède.
25. Vaccin S. P. E. S. (100 millions).....	Cépède.
26. Vaccin S. P. E. S. (400 millions).....	Cépède.
27. Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
28. Vaccin S. P. E. S. Ca. 100.....	Cépède.
29. Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.
30. Vaccin Sa (furoncles).....	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande
de MM. les médecins.

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajoutée

La boîte de 10 ampoules : 33 fr. 25 au public.

Institut de Biologie appliquée

57, 59, 60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bague — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 11-40).

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.
Adoptée par les Hôpitaux.

ALCOHOLIC BEVERAGES

and, institutions, persons, etc.

and, institutions, persons, etc.

and, institutions, persons, etc.

and, institutions, persons, etc.

and, institutions, persons, etc.

ALCOHOLIC BEVERAGES

and, institutions, persons, etc.

and, institutions, persons, etc.

VACCINOTHÉRAPIE PROBIOS

En outre des produits *Ampoules*, *Pommades*, *Comprimés* préparés avec des Antivirus et des Bactériophages associés connus sous le nom générique de *Probios* destinés aux *vaccinations locales* (ingestion buccale, instillations, pansements locaux), les **Laboratoires PROBIOS** préparent des émulsions et filtrats microbiens destinés aux injections sous-cutanées. Ces émulsions microbiennes ou vaccins sont préparés de façon à éviter les phénomènes de choc dont les effets souvent inquiétants pour les malades ou leur entourage peuvent détourner la clientèle d'une méthode thérapeutique cependant efficace.

VACCIN PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE

Formule. — Gonocoques de Neisser, Synocoques, Bac. de Hoffmann. Staphylocoques (d'origine urétrale).

Présentation. — 6 ampoules de 2 cc.

Indications. — Urétrites, Métrites gonococciques et complications.

Mode d'emploi. — Injections sous-cutanées, d'abord faibles, puis progressivement croissantes.

Pour la discrétion et la commodité des prescriptions, nous avons le même produit, qui peut être prescrit sous le nom *Vaccin Probios 365*.

INJECT-APYO

Formule. — Filtrat de cultures de :

Staphylocoques.....	50 parties,
Streptocoques	30 —
Bacilles Pyocyaniques	20 —

Présentation. — 6 ampoules jaunes de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Abscesses, Phlegmons, Anthrax, Erysipèle, Impétigo, Intertrigo, Staphylococcies, Lymphangites. Toutes les affections à germes Pyogènes.

Mode d'emploi. — a. *En injections.* — b. *Applications locales.*

PRÉV-AKINTYL

Vaccin préventif injectable.

Formule. — Bacilles de Bordet et Gengou : 100 millions par cc.

Présentation. — 3 ampoules claires de 2 cc.

Indications. — Traitement préventif de la coqueluche.

Mode d'emploi du *Prév-Akintyl*. Nous conseillons de faire 3 injections de *Prév-Akintyl* séparées par des intervalles de 5 à 7 jours à des doses différentes selon les âges.

INJECT-AKINTYL

Vaccin curatif injectable.

Formule :

Bacilles de Bordet-Gengou	100 millions.
Bacilles de Pfeiffer.....	10 —
Bacilles de Friedländer	100 —

Bacilles Pyocyaniques	50 millions.
Streptocoques.....	10 —
Staphylocoques	200 —
Pneumonocoques	10 —
Micrococcus Catarrhalis.....	50 —

Par centimètre cube.

Présentation. — 10 ampoules jaunes de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Traitement curatif de la coqueluche.

Mode d'emploi. — Il est recommandé de commencer dans tous les cas par utiliser des doses faibles en vue d'éviter les réactions de choc ou les réduire le plus possible.

BUV-AKINTYL

Vaccin Curatif buvable.

Formule :

Bacilles de Bordet-Gengou.....	1 milliard.
Bacilles de Pfeiffer.....	100 millions.
Bacilles de Friedländer	1 milliard.
Bacilles Pyocyaniques	500 millions.
Streptocoques.....	100 millions.
Staphylocoque	2 milliards.
Pneumocoque	100 millions.
Micrococcus Catarrhalis.....	500 millions.

Pour un centimètre cube dans un mélange d'Antivirus des mêmes bactéries, en proportions correspondantes.

Présentation. — 10 tubes scellés bleus de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Traitement curatif de la coqueluche et ses complications.

Mode d'emploi. — Réservé aux cas où, pour des causes diverses, les injections ne sont pas acceptées ou sont pratiquement irréalisables. Le *Buv-Akintyl* sera employé selon les indications du médecin.

INJECT-APLEURYL

Vaccins préventif et curatif dans les affections
des Voies respiratoires.

Formule :

Filtrats de cultures de Pneumocoques I-II-III.....	3 parties.
Filtrats de cultures Bac. de Friedländer	1 partie.
Filtrats de cultures de Streptocoques	2 parties.
Filtrats de cultures de Staphylocoques	2 parties.
Filtrats de cultures de Proteus	1 partie.
Filtrats de cultures Bac. de Pfeiffer	1 partie.

Présentation. — 6 ampoules de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, broncho-pneumonies, pneumonies, Grippe et ses complications, pleurésie, asthme, emphyseme.

Le Vaccin *Inject-Apleuryl* s'emploie en injections sous-cutanées à doses progressives en commençant par des doses faibles avec les précautions aseptiques d'usage.

Laboratoires PROBIOS

8 rue Saint-Martin — PARIS (IV°).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

VACCI NOVULES

(Adultes et fillettes).

Forme. — Ovules.

Composition. — Culture atténuée de gonocoque, synocoque, staphylo, strepto B. d'Hoffmann, Excipient Q.S.

Indications. — Métrites, Urétrites, Pertes blanches, toutes affections microbiennes.

Posologie. — Pansement gynécologique idéal (ne tache pas).

Prix : { *Adultes* : 22 francs.
 Fillettes : 20 fr. 75.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 04-02.)

VACCINS ANTIBRUCELLIQUES POLYMICROBIENS

des Docteurs DUBOIS et SOLLIER

Fièvre Ondulante, Fièvre de Malte

Composition. — Constitués par des *brucella abortus* et *melitensis* récemment isolés de l'homme et des animaux et en provenance des différentes régions où sévissent les brucelloses. Ces germes tués par la chaleur sont émulsionnés dans de l'eau de mer naturelle isotonique

Indications. Présentation. Mode d'emploi.

Vaccin préventif. — Se prescrit sous deux formes :

1^o *Vaccin préventif injectable* (3 ampoules de 1 centicube. Prix : 20 fr.). Trois injections sous-cutanées à 10 jours d'intervalle.

2^o *Vaccin préventif buvable* (3 ampoules de 10 centi cubes. Prix : 20 fr.). Pendant trois jours consécutifs, faire avaler le matin à jeun le contenu d'une ampoule.

Vaccin curatif. — Se prescrit sous deux formes :

1^o *Vaccin curatif injectable* (12 ampoules de 1 cc. Prix : 50 fr.). Une injection sous-cutanée tous les deux jours (1/4, 1/2, 3/4, puis 1 cc.). Le médecin reste seul juge du nombre des injections, ainsi que de la voie d'introduction du vaccin : sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse.

2^o *Vaccin curatif buvable* (6 ampoules de 10 cc. Prix : 30 fr.). S'emploie à titre d'adjuvant du vaccin injectable dans l'intervalle des injections ou pour remplacer celui-ci en cas de contre-indication. Faire avaler, le matin à jeun, le contenu d'une ampoule.

Vaccins autorisés par décret N° 95 du 22 décembre 1937. Enregistrés au L. N. O. M. sous les N°s 1782 (1, 2, 3, 4).

Laboratoire des « VACCINS en PLASMA MARIN »

17, rue de Sauve — NIMES (Gard)

(Tél. : 36-10. Adr. Télégraph. : Plasmavax Nîmes.)

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins,* constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire, composition polyvalente.

Nomenclature et Indications :

Néo-Dmègon : Antigonococcique. (Voir ce nom.)
Néo-Dmesta : Antistaphylococcique. (Voir ce nom.)
Néo-Dmètyls : Anticoquelucheux. (Voir ce nom.)
Aplexil : Préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des Fièvres éruptives.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie — Vaccinothérapie.

VACCINS : Antityphoïdique.

- Antistaphylococcique.
 - Polyvalents.
 - Pneumo-streptococcique.
 - Anticoquelucheux.
 - Antigonococcique.
 - Antistreptococcique.
 - Anticolibacillaire.
 - Antimélicococcique.
- (Injectables en injections sous-cutanées.)
 Vaccin-Pansements non injectables.

Pyophylaxines, Hémophylaxines, Entérophyloxine.

Prix : 25 francs.

Anasthmyl, Vaccin antispasmodique I. O. D	50 fr.
Rhino-Vaccin, Pansement I. O. D	31 fr.

Dépositaires généraux :

Éts DEFFINS et GRUAT, 40, faub. Poissonnière — PARIS

LABORATOIRE de BIOLOGIE MÉDICALE

16, rue Dragon — MARSEILLE

HAMELIN, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

AVIGNON et HAYAT, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

Pour littérature et échantillons : 16, rue Dragon — MARSEILLE

VACCINS BRUSCHETTINI

1° **Antipyogène Polymicrobien Polyvalent**
(streptocoques, staphylocoques, pneumocoques,
E colibacilles pyocyaniques) ;

2° **Antigonococclique.**

Forme. — 5 ampoules de 2 cc. : 29 fr. 10.

Indications :

1° **Vaccin Antipyogène Polymicrobien Polyvalent** : État infectieux, État grippal, Angines, Vaccination pré-opératoire, accouchements, Broncho-pneumonie, Pneumonie,

1, 2 et même 3 ampoules par jour en injection intramusculaire.

Aucune réaction générale ni locale, même en thérapeutique infantile ;

2° **Vaccin Antigonococclique** : Applications spécifiques.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII°).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

VACCINS CARRION

Le nombre de germes est exprimé en millions par centimètre cube.

1° Vaccins monomicrobiens. — Ampoules de 1 cc. Colibacillaire à 100 et 500 ; Coquelucheux à 100 et 500 ; Gonococcique à 100, 500 et 1 000 ; Paratyphique A ou B à 100 et 500 ; Pfeiffer à 100 et 500 ; Pneumococcique à 200, 500 et 1 000 ; Staphylococcique à 200, 1 000 et 5 000 ; Staphylo acné à 5 000 ; Staphylo anthrax à 1 000 et 5 000 ; Staphylo abcès de l'aisselle à 5 000 ; Staphylo ostéomyélite à 1 000 et 5 000 ; Streptococcique à 100, 500 et 1 000 ; Typhique à 100, 500 et 1 000. L'ampoule de 1 cc. : 5 fr. 35.

Entéroccoccique à 1 000 :

La boîte de 12 amp. : 19 fr. 20. — La boîte de 6 amp. : 10 fr. 65.

Streptococcique endocardite à 1 000.

L'ampoule : 12 fr. 80.

2° Vaccins polymicrobiens. — Vaccin polymicrobien polyvalent ; Pelli-Vaccin ; Vaccin polymicrobien antigrippal ; Vaccin coquelucheux mixte à 1 000 et 5 000 ; Vaccin typhique mixte T. A. B. à 100 et 500.

L'ampoule : 6 fr. 40.

Vaccin formule Delbet.

L'ampoule de 4 cc. : 8 fr. 50. — La boîte de 3 ampoules : 21 fr. 30.

Vaccin typhique mixte pour vaccination préventive à 3 000 pour 1 cc.

L'amp. de 1 cc. : 6 fr. 40. — L'amp. de 2 cc. : 8 fr. 50.

3° Vaccins régionaux. — Auriculo, Broncho, Intestino, Naso, Oculo, Pharyngo, Uro, Uréthro et Utéro-vaccin :

L'ampoule de 1 cc. : 6 fr. 40.

4° Lysats sodiques (Dr Mauté). — Colibacillaire, Staphylococcique, Streptococcique, à 1 mgr. pour injections sous-cutanées et à 1/10^e de mgr. pour injections intraveineuses.

L'ampoule de 1 cc. : 6 fr. 40.

5° Bouillons immunisants pour pansements. — En ampoules de 5 cc.

L'amp. : 5 fr. 35. — La boîte de 6 amp. de 5 cc. : 26 fr. 65.

Naso et Auriculo-Bouillon.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 21 fr. 30.

6° Vaccins buvables. — Ampoules de 5 cc. : Colibacillaire, Typhique, Typhique mixte.

La boîte de 6 ampoules : 16 francs.

Voir aussi « Entéroccoccène » et « Coliflorine ».

Entéroccoccique buvable en ampoules de 1 cc. (nourrissons).

La boîte de 12 ampoules : 19 fr. 20. — La boîte de 6 ampoules : 10 fr. 65.

7° Anavaccins (Dr Jaubert). — Voir : Gonagone, Staphylagone, Cardio-Streptine.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

VACCINS CLIN

Stocks-vaccins, lysés et détoxiqués, d'une concentration élevée en espèces microbiennes judicieusement choisis et fréquemment renouvelées.

Constitution constante, tolérance parfaite, conservation illimitée.

Formes : Vaccins injectables, en ampoules de 1 cc. de concentration microbienne.

Vaccin Clin antistaphylococcique.

Vaccin Clin antigonococcique. — N° 1 monomicrobien. — N° 2 polymicrobien (gonocoques, staphylocoques, pseudo-diphthériques, Friedlander, microcoques, entérocoques).

Vaccin Clin anticoquelucheux. — 3 concentrations. 1-2-3 milliards. (B. de Bordet-Gengou).

Pneumo-broncho-vaccin Clin. — *Adultes, Enfants.* (Pneumocoques, Friedlander, Pfeiffer, streptocoques, staphylocoques, entérocoques,

Coli-entéro-vaccin Clin. Injectable, Buccal.

Vaccin Clin antistreptococcique.

Vaccin Clin pré-opératoire antipyogène (streptocoques, staphylocoques, colibacilles, entérocoques, pyocyaniques).

PYOVARGOL

(Pommade colloïdo-vaccin Clin argentique antipyogène)

Vaccin pour usage local, constitué par une émulsion microbienne (streptocoques, staphylocoques, microcoques, colibacilles, pyocyaniques) ayant fixé par absorption une certaine quantité de micelles argentiques.

L'action curative spécifique du vaccin se trouve renforcée par les colloïdes.

Indications. — Plaies infectées, suppurations localisées, furoncles, anthrax, abcès, panaris, pyodermites, dermatoses infectées.

Forme. — Tube de 31 grammes.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

VACCINS CREUZE

Polyvalents et polymicrobiens.

Application de la théorie de l'antagonisme microbien.

Bactériolysothérapie.

Eucratol. — Blennorrhagie et ses complications chez l'homme et chez la femme.

Vaccin M. A. — Affections non tuberculeuses des voies respiratoires, bronchite chronique, asthme, emphysème, etc...

Antixénol. — Entérovaccin polyvalent, furunculose, arthritisme, etc...

Formes : 14 ampoules de 1 cc. ou 60 comprimés. Prix public, la boîte : 35 francs. La demi-boîte (7 ampoules) : 20 francs.

Modes d'emploi :

Ampoules : une injection un jour non l'autre, progressivement de 1/8 cc. à 1 cc.

Comprimés : 1 à 4 par jour au début des repas.

Crèmes-Vaccin Creuze à base de filtrats (méthode de Besredka).

Le tube avec embout : prix public, 12 francs.

N° 1 Derma : Eczéma, furoncles, plaies infectées, etc.

N° 2 Ophto : Blépharites, conjonctivites, orgelets, etc...

N° 3 O. R. L. : Grippe, rhume des foins, sinusites, ozène, etc.

Rhino Sec-Rhino Vaccin : Poudre à priser : le tube : 5 francs. Rhumes de cerveau, grippe, rhinites, etc...

Laboratoire CREUZE

74, rue de Lourmel — PARIS (XV^e). (Tél. : Vaugirard 30-05.)

VACCINS DEMONCHY

A forte concentration.

Antidiplococcique. — 25 milliards de gonocoques, de 12 souches différentes, au centimètre cube.

Posologie. — Injections (sous-cutanées) tous les 2, 3 ou 4 jours, la première de 1/4 ou de 1/8 de centimètre cube.

L'intensité des réactions générale et focale déterminées par chaque injection permettra de fixer la dose suivante, qui pourra ainsi, suivant les cas, être supérieure, égale ou même inférieure à la précédente. Donc, n'augmenter les doses que lorsqu'une amélioration se manifeste et que la réaction générale reste discrète.

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Antidiplo-entéro-staphylococcique. — (25 milliards de germes, comme le précédent.) *Vaccin mixte spécialement destiné aux affections gynécologiques, aux urétrites ayant subi de nombreux traitements locaux et à leurs complications.*

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Anti-staphylococcique. — Staphylocoques blancs et dorés de plusieurs souches, *vaccin puissant* (15 milliards de germes au centimètre cube).

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques.

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (7^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

VACCINS « INAVA »

(par voie sous-cutanée).

Souches sélectionnées. Lyse mécanique. Tyndalisation à froid
laissant intacts les antigènes concentrés et solubilisés.

Affections génitales.

Gynécologique « M » Inj.

Ovules-Vaccins « M » (Voir à)

Affections dermatologiques.

Antipyogène « P » Inj.

Pyogénol-Gelée.....

Infections grippales.

Antibronchitique..... « A » Inj.

Rhino-Vaccin Gelée

Infections intestinales.

Vaccin antitypique (dragées).

Infections bucco-dentaires :

Pyodarsénol (Fuso-Strepto-vaccin et Sulfarsénol) (injectable et en gelée).

Pâte Dentaire Bleue immunisante au Pyodarsénol. (Voir à)

Affections rhumatismales

Thiophéol (Thiophène, Soufre colloïdal, Eucalyptol). (Voir à)

Laboratoire INAVA

E. GUIGNIER, Pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

VACCINS IVAGO

(Procédé L. Goldenberg.)

Les vaccins Ivago se présentent sous trois formes : Vaccins injectables, — Vaccins buvables, — Gelées-vaccins par pansements.

Vaccins IVAGO Injectables (voie Intradermique).

Les procédés spéciaux de préparation des vaccins IVAGO leur assurent les principaux avantages suivants :

Haute teneur microbienne et pouvoir antigénique très élevé sous le plus petit volume.

Absence de choc et de toute réaction générale.

Efficacité égale à tous les âges, chez le tout jeune enfant comme chez le vieillard.

Possibilité d'étendre la vaccinotherapie aux états septicémiques qui contre-indiquent la voie sous-cutanée.

Les vaccins IVAGO empruntent la *voie intradermique* parce que la peau « revêtement protecteur » est, par destinée, un organisme de défense considérable en liaisons physio-pathologiques directes ou réflexes, avec tous les organes.

Ils sont injectés par gouttes (I à VI gouttes) dans la peau.

IVAGO « A » (antigrippal et broncho-pulmonaire).

IVAGO « B » (antipyorrhéique).

IVAGO « D » (antistaphylococcique).

IVAGO « G » (antigonococcique).

IVAGO « M » (gynécologique).

IVAGO « P » (antipyogène), avec *streptocoques*.

IVAGO « R » (antiozéneux).

IVAGO « U » (anticolibacillaire).

Vaccins IVAGO buvables.

La vaccinotherapie par voie buccale est indiquée comme thérapeutique adjuvante à la méthode de vaccination intradermique, 2 ampoules par jour dans un verre d'eau éloigné des repas.

IVAGO-COLI: pyélite, pyélonéphrite cystite, colibacillose.

IVAGO-STA: furonculose, anthrax, abcès, acné, sycosis.

IVAGO-GRIPPE: affections broncho-pulmonaires, bronchites, complications grippales.

IVAGO-PYO, états septicémiques et infections causées par pyogènes communs.

Gelées-Vaccins IVAGO (Usage externe).

Les gelées-vaccins réalisent l'*immunité locale* de la peau.

Gelée-vaccin IVAGO, Antistaphylococcique : furonculose, anthrax, sycosis, acné.

Gelée-vaccin IVAGO, Antipyogène (avec streptocoques) : infections causées par les pyogènes communs.

Gelée-vaccin IVAGO, Antipyorrhéique : pyorrhée alvéolaire, abcès dentaires.

Gelée-vaccin IVAGO, Gynécologique : métrites, salpingites, leucorrhée.

OVULES VACCIN IVAGO.

LUGHORHINE (Gelée-vaccin anticoryza).

Pâte Dentifrice Bleue IVAGO GM + PM.

Laboratoires IVAGO

L. BELIÈRES, docteur en pharmacie.

17, rue de Provence, PARIS (IX^e) (Tél. : Prov. 76-18.)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1865

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

VACCINS RONCHÈSE

« AMPHO-VACCINS »

AMPHO-VACCINS A INGÉRER.

Par cc. lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Amphoprophyl T. A. B. : (voir ce nom) Vaccin *préventif* anti-typho paratyphique.

Ampho-Quintivaccin : Traitement efficace de la coqueluche et de ses complications.

Anti-infectieux : Toutes infections générales ou locales. Dermatoses. Vaccination pré ou post-opératoire.

Anti-staphylococcique : Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

Antityphoïdique T. A. B. : Agent *curatif* remarquable des infections typhique et paratyphiques et, grâce à une association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

Intestinal : Auto-intoxications d'origine intestinale, entérites, appendicites, cholécystites, syndrome entéro-rénal, certains rhumatismes, insuffisance hépatique, préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux accouchements.

Pulmonaire : Grippe, bronchites, pneumonie, broncho-pneumonie, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

Urinaire : Toutes infections de l'appareil urinaire.

Présentations. — Les Ampho-vaccins à ingérer, sauf l'*Amphoprophyl T. A. B.* et l'*Ampho-vaccin intestinal*, sont présentés en : Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. :

D'autre part, l'*Ampho-Quintivaccin* et les Ampho-vaccins anti-infectieux pulmonaire et urinaire à ingérer sont également présentés en : Coffrets de 24 ampoules de 2 cc.

L'*Amphoprophyl T. A. B.* (préventif) est présenté en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile :

L'*Ampho-Vaccin intestinal* à ingérer est présenté :
En boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

En coffrets de 24 ampoules de 5 cc.

En coffrets de 50 ampoules de 5 cc.

AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Anti-infectieux : Toutes infections générales ou locales. Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis. Vaccination pré-opératoire.

Anti-staphylococcique : Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

Intestinal : Tous états intestinaux aigus et chroniques.

Pulmonaire : Pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite, grippe, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

Urinaire : Toutes infections de l'appareil urinaire.

Les Ampho-Vaccins injectables sont vendus en boîtes de 6 ampoules de 1,5 cc.

AMPHO-VACCINS PANSEMENTS

Filtrats de cultures additionnés par cc. de 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Antipyogène : Furoncles, anthrax, abcès, dermatoses infectieuses, interventions abdominales, curetages, cancers du col.

Trois présentations :

Boîtes de 3 ampoules de 10 cc.

Coffrets 12 ampoules de 10 cc.

Ampho-vaccin antipyogène pour petits pansements,
en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Rhino-Pharyngien : Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive. Traitement abortif du coryza. Présenté en ampoules auto-instillables.

Présentations :

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc.

Coffrets 20 ampoules de 2 cc.

Rhino-Amphogel (Voir ce nom). (Gelée à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien). Rhino-Prophylaxie de la grippe et du coryza.

Ampho-tablettes (Voir ce nom). (Comprimés à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien.)

Pyo-Amphogel (Voir ce nom). (Gelée à base d'Ampho-vaccin pansement antipyogène.)

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse
A.-D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie.

21, boulevard de Riquier — NICE.
Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III°).

(Tél. : Turb. 72-34.)

VACCINS " STÉNÉ "

Vaccin antifuronculeux « Sténé ». — Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques.

En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés.)

Bouillon-vaccin antifuronculeux « Sténé », pour pansements.

Vaccin anti-coryza « Sténé », polyvalent. — Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Ovules-Vaccin « Sténé ». — Métrites, Salpingo, ovarites, pertes blanches.

Vaccin « opératoire », Sténé. — Préventif des complications infectieuses post-opératoires. En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

Bouillon-Vaccin « opératoire », Sténé. — Pour pansements.

Vaccin antipyrogène Sténé. — Pour le traitement des plaies. Préventif et curatif de l'infection des plaies de toutes natures.

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En Bouillon-Vaccin pour pansements.

Vaccin Antistaphylococcique « Sténé ».

Bouillon-Vaccin Antistaphylococcique « Sténé »,

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En bouillon-vaccin pour pansements.

Produits « STÉNÉ »,

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 46-47.) Adr. télégr. : Sténé 21 Paris.

VACCINS « VIRULTRA »

Anti-Pyogène chirurgical « Virultra ». — Pré et postopératoire.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. — : 26 fr.

Anti-Pyogène général « Virultra ». — Toutes affections pyogènes et septicémies.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

— : 3 amp. de 2 cc. — : 20 fr. 80

Furunculose, Eczéma, Erysipèle.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. Prix public : 26 fr.

— : 3 amp. de 10 cc. — : 18 fr. 75

Brûlures, Plaies, Anthrax, Phlegmons, etc.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Broncho-Vaccin « Virultra ». — Grippe, Broncho-Pneumonies et toutes affections broncho-pulmonaires.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

— : 3 amp. de 2 cc. — : 20 fr. 80

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. — : 20 fr. 80

Dermultra « Virultra ». — Pour toutes affections dermatologiques.

Une seule forme : Pomade-Vaccin. Le tube : Prix public : 12 fr. 50

Enterultra « Virultra ». — Colibacillémies, Enterococcémies et toutes affections intestinales.

Une seule forme : Ampoules buvables.

6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Gynécologique « Virultra ». — Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc...

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. — : 26 fr.

— : 3 amp. de 10 cc. — : 18 fr. 75

Ophthalmologique « Virultra ». — Toutes affections oculaires suppurées.

Une seule forme : Pansement.

Prix public : 6 amp. de 2 cc. : 18 fr. 75

Oto-Rhino-Laryngologique « Virultra ». — Rhinites, Sinusites, Mastoïdites, Coryzas, Laryngites, Otites, Rhume des foins, etc.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement : 6 amp. de 5 cc. — : 25 fr.

— : 6 amp. de 2 cc. — : 18 fr. 75

Uro-Vaccin « Virultra ». — Toutes affections gonococciques.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement (pour homme) : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Forme pansement (pour femme) : 6 amp. de 10 cc. Prix public : 26 fr.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Nota. — L'Uro-Vaccin « Virultra ». — Pansement (H ou F.) peut être utilisé *in loco* pour le traitement de l'ophtalmie purulente du nouveau-né.

Ultrouvules « Virultra ». — Pour pansement génital de la femme dans toutes affections microbiennes utérines.

Une seule forme : ovules-vaccin. Prix public : 26 fr.

G. TAUPIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général pour la France : O. C. P.

Laboratoires « VIRULTRA »

LAUNAY-SERQUIGNY (Eure). — (Tél. : 19 à Serquigny.)

VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Louis Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un « vaccin vivant ».

Voir : Broncho-Vaclydun ; Coli-Vaclydun ; Entéro-Vaclydun ; Gynéco-Vaclydun ; Gono-Vaclydun ; Pyo-Vaclydun ; Rhino, Staphylo et Strepto-Vaclydun ; Grippe-Vaclydun.

VACLYDERM

Composition. — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

Indications. — Réalise une vaccinothérapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furonculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

Mode d'emploi. — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

Le tube : 19 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.) — Télégr. : Pantuto 74 Paris.

VAGODENAL

Puissant sédatif nerveux, Antispasmodique, Hypnotique de choix.

Extrait de Cratœgus	0,03
— de valériane stabilisée	0,05
— de jusquiame	0,01
Phényl-éthylmalonylurée	0,02

Pour 1 comprimé.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Indications thérapeutiques. — Tous les états de nervosité, d'émotivité, d'irritabilité, d'anxiété, éréthisme cardiaque, déséquilibre vaso-moteur, mal de mer, trouble nerveux de la puberté et de la ménopause, insomnie d'origine neuro-végétative, état dépressif et cure de désintoxication.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoire J. GUINZBOURG

48, avenue de la Porte-d'Ivry — PARIS (XIII^e).

(Tél. Gob. 06-63.)

VAGOGASTRYL

Traitement rationnel des Gastralgies, des Spasmes,
des Etats Anxieux.

Présentation. — Cachets.

Composition. — Belladone totale (1 cgr.). Kaolin colloïdal. Carbonate de Bismuth purifié. Bicarbonate de Soude.

Propriétés thérapeutiques. — 1° Saturant de l'acidité gastrique ;
2° Sédatif du Vague.

Indications. — 1° *Gastralgies* : Hyperchlorhydries, Ulcères, Aérophagie.
2° *Spasmes* : Gastriques, Intestinaux, Utérins, Vaginaux, Sphinctériens, Coliques hépatiques.

3° *Vomissements réflexes* : Mal de Mer, Mal de l'Air, Mal de Montagne, Etats gravidiques.

4° *Ets anxieux* : Psychasthénie, Neurasthénie, Mélancolie, Anxiété dans les Psychoses.

Posologie. — 1 à 2 cachets après chacun des 2 principaux repas et au moment des douleurs.

Pour un traitement d'une semaine. Prix : 12 fr. 80.

Prix spéciaux aux Etablissements hospitaliers.

Laboratoires de Vagothérapie.

M. Crozet, docteur en pharmacie.

SAINT-VENANT (Pas-de-Calais).

VAGORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance Vagale,

Formule :

Lobe antérieur d'hypophyse	0,01	Extrait de Cratægus	0,01
Camphre monobromé.....	0,05	— Valériane	0,015
Diéthylmalonylurée	0,05	— Boldo	0,015
Chlorure de Magnésium....	0,05	— Guarana.....	0,015
Extrait de Passiflore.....	0,025	— Jusquiame	0,0075
— Ballote	0,01	— Marron d'Inde.	0,005
— Combretum.....	0,01	— Belladone.....	0,005

Par comprimé dragéifié.

Indications. — VAGOTONIE, dépression, vertiges, anxiété, insomnies ou mauvais sommeil, torpeur et inquiétude, désordres psychiques frustes, douleurs erratiques variées, céphalées frontales et occipitales, état nauséux, auto-intoxication, spasmes, anabolisme, perturbations circulatoires, désordres mensuels chez la femme et dysgénésie chez l'homme.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix : 17 fr. 20 (40 dragées par boîte).

Pour les Sympathicotoniques, voir : SYMPATHORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le n° 988-2.

Laboratoire FOSSET

21, Grande Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél. : 11.)

VAGOSÉDYL

Sédatif du vague.

Phényléthyl-Malonylurée	} 50 gr. 017
Extrait de Jusquiame titré en alcaloïdes.....	
Extrait de Valériane fraîche et stabilisée	
Oxyde de zinc préparé par voie humide	

VAGOSÉDYL réalise une formule de Méglin améliorée.

Doses moyennes. — 2 à 4 comprimés par jour.

Indications principales. — Hypervagotonie, Spasmodophilie, Algies et Spasmes viscéraux, Entéronévroses, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des ptoses, Malaises en rapport avec la Menstruation, la Grossesse, la Ménopause, Symptômes subjectifs du Cœur, Artériosspasme, Dyspnées spasmodiques, Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Neurasthénie, Excitation psychique, Troubles du Sommeil.

Prix du flacon : 16 fr. 50.

Laboratoire du VAGOSÉDYL
G. COUSSINET, Pharmacien.

Dépôt : Laboratoire Valtry,
122, Champs-Élysées. — PARIS.

VAGOSTABYL MONIN

Comprimés dragéifiés.

A base de Marjolaine. — Sans Barbituriques.

Traitement phytothérapique de toutes dystonies Vago-Symphathiques.
Communication Société de Biologie, tome CXV.

Composition. — Oleosaccharure de Marjolaine (*Origanum majorana*, labiées). Lactate de Calcium, Cimicifugine. Hyposulfite de magnésie.

Propriétés. — Régulateur et stabilisateur très actif du système nerveux.
Action tonocardiaque : diminue la fréquence, augmente l'amplitude.

Indications. — Toutes Dystonies vago-symphathiques. — Insomnies. — Affections cardiaques : Tachycardie, Arythmie, Palpitation, Angor. — Troubles de la vie végétative : Basedow, Ménopause, grossesse, déséquilibre du métabolisme basal. — Asthme nerveux. — Symptômes nerveux pré et post-opératoires. — Algies : Céphalées rebelles, Névralgie faciale, Douleurs des sinusites — Troubles nerveux divers : Bourdonnements et sifflements d'oreilles, hoquet, mal de mer. Aérophagie, Vertiges, spasmes. — Epilepsie, Agitation. Dermatoses nerveuses.

Posologie. — 1^{er} jour : 6 à 8 dragées, doses fractionnées. Jours suivants : doses décroissantes jusqu'à 2 dragées.

Laboratoire MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX°).
(Tél. : Trudaine 37-45.)

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas ;
ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux
heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique
et puissant sédatif du système nerveux,
régulateur de la circulation et de la respi-
ration.

N. B. — La Valbornine n'est pas un sopori-
fique. Le sommeil n'est régularisé qu'au
bout de quelques jours par sédation du
système nerveux.

Le flacon : 12 fr. 30

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

Composition :

Extrait alcoolique de valériane <i>stabilisée</i>	0 04
Extrait alcoolique de jusquiame.....	0 005
Extrait de datura	0 005
Extrait alcoolique de passiflore	0 03
K Br	0 05
Extrait alcoolique de cratægus.....	0 03

pour une dragée de 0 gr. 16.

40 dragées par étui — Prix en France : 14 fr. 70

Propriétés. — Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jus-
quiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée
seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratægus agit syner-
giquement.

Indications. — Etats nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété, Insom-
nie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthylisme, affections car-
diaques ou vasculaires, digestives, génitales.

Posologie. — Etats nerveux : 1 à 2 dragées par jour.
Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

20 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

VALEDYL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

Indications. — Insomnies, vertiges, neurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques, troubles cardiaques.

Formule. — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratægus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballote, teinture de gelsénium.

Forme. — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur.

Mode d'emploi. — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

Prix : 17 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-34.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

VALÉNAL

Sédatif nerveux. Hypnotique doux.

Composition. — Pour 1 dragée :

VALÉ riane extrait	0,045
Cratægus extrait.....	0,015
Saule blanc extrait	0,015
Passiflore extrait	0,015
Hamamélis extrait	0,01
LUGO NAL (Phényléthylmalonylurée) ...	0,005

Association logique, bien dosée, active et sans danger.

Indications. — Déséquilibre du sympathique, Insomnies, Agitation nerveuse, Hyperémotivité, anxiété, palpitations. Etats nerveux de la ménopause. Hypertension (surtout spasmodique).

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour (dose pouvant être largement dépassée).

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

VALÉRIANATE GABAIL DÉSODORISÉ

Simple ou Bromuré.

Composition :

Simple : 0 gr. 50 d'extrait de Valériane, par cuillerée à café.

Bromuré (Élixir Gabail) : 0 gr. 50 d'extrait et 0 gr. 25 de Bromure de Strontium, par cuillerée à bouche.

Indications. — Toutes les affections nerveuses.

Simple : 4 cuillerées à café par 24 heures.

Bromuré : 4 cuillerées à bouche par 24 heures.

(Comme *Hypnotique* : 2 cuillerées à bouche au coucher).

Prix : Le flacon : 22 francs.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée.

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 10 francs.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

(Tél. : Opéra 30-50.)

VALÉRIANE GMET

Composition. — Extrait total obtenu exclusivement à l'aide de racines de valériane sans adjonction d'acide valérianique ou d'autres produits de synthèse. Sans alcool. Sans sucre.

Propriétés. — Puissant toni-sédatif du système nerveux central et périphérique.

Odeur conservée (indice de son activité), mais *goût peu prononcé*. Bien acceptée par les femmes et les enfants.

Indications. — Tous les états d'excitation et de dépression nerveuse, Névroses, Insomnie, Epilepsie, Chorée, Nervosisme, Convulsions, Terreurs nocturnes, Cauchemars. Dans la neurasthénie lui adjoindre le *Composé Gmet*. (Voir ce nom.)

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.
Le flacon de 135 cc.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX°).
(Tél. : Provence 43-10.)

VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

Indications. — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est **inodore** et d'une **saveur agréable**.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.
(Tél. : Laborde 16-72.)

VALÉRIANE PIERLOT

Composition :

Distillat représentant 2 fois son poids
de racines fraîches et sauvages de
valériane..... 5 cc.
Carbonate d'ammoniaque Q. S.
pour saturer, par cuillerée à café.

Indications. — Neurotrope, sédatif, inof-
fensif, le *Valérianate Pierlot*, rétablit
toujours l'équilibre du système nerveux
en supprimant l'excitabilité morbide des
neurones.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café
dans un peu d'eau sucrée ou non le soir
avant de se coucher et le matin à jeun.

Prix :

DRAGÉES PIERLOT

à la liqueur concentrée de *Valérianate Pierlot*,
associé au Cratægus.

Noyau liquide. Absence totale de produits
toxiques. Aucune odeur, goût masqué.

Indications. — Troubles du sommeil.
Troubles nerveux de la puberté et de la
ménopause. Troubles nerveux fonctionnels
du cœur.

Composition :

Distillat représentant 10 fois son
poids de racines fraîches et sau-
vages de valériane (*Valérianate*
Pierlot concentré)..... 1 cc.
Carbonate d'ammoniaque Q. S.
Extrait de cratægus..... 0,08
(Par dragée.)

Mode d'emploi. — Croquer de 1 à 3 dragées
par jour et avaler de préférence avec un
peu d'eau.

Prix : 00 fr.

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Alésia + 22-46.)

VALÉRINODOR MALMANCHE

Composition. — Préparation liquide sirupeuse contenant par cuillerée à café : 0 gr. 05 d'Intrait de Valériane stabilisée, 0 gr. 50 d'Extrait fluide de *Passiflora incarnata*, 0 gr. 15 de Véronal sodique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant sédatif du système nerveux central. Tolérance parfaite. Sommeil calme sans nausées au réveil.

Indications. — Insomnies, Palpitations, Spasmes musculaires, Excitation psychique, Angoisse, Chorée, Convulsions, Toux nerveuse.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion de tilleul.

Prix au public : 15 fr. 60 le flacon de 90 cc.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences.

101, avenue Paul-Doumer,

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). (Tél. : 124.)

VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de *Valérianate de Cérium*, sans odeur, de P. Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

Indications. — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

Posologie. — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible, 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de Valérium P. Thibault sont dosées à 0,05 de principe actif.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e). (Tél. : Gobelins 06-89.)
Enregistré au Laboratoire National n° 218-10.

VALÉROBROMINE LEGRAND

Composition. — Ethers-Sels de l'acide « Bromovalérianique ».



Avantages. — La VALÉROBROMINE LEGRAND (brome organique) offre, par rapport aux bromures (brome minéral), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (arsenic et phosphore organiques), par rapport aux arséniates et aux phosphates (arsenic et phosphore minéraux). Elle possède, contrairement au valérianate d'ammoniaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valérianates, sans avoir à redouter, quelles que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

Indications. — Toutes les névroses : Epilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc...

Formes. — Liquide : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café, 2 à 6 cuillerées à café par jour. — Capsules : 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule enrobée de gluten, ne se dissolvant que dans l'intestin. 4 à 12 capsules par jour.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Acide diéthylbarbiturique en solution

ammoniacale 3 gr 25

Intrait de Valériane 0,05

par 100 cc. d'excipient liquide.

Dose sédatif. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé
2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Pas de contre-indication.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS

VALLATHEN

Traitement des maladies de la peau.

Organothérapie Bellas.

Présentation. — En boîtes de 50 dragées : 40 francs.

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique, Soufre lavé.

Indications. — Eczémas, Furonculose, Anthrax, Blépharite, Orgelets, Séborrhée, Acné vulgaire, Acné rosacée, Urticaire et toutes dermatoses.

Posologie : *Adultes :* Dose moyenne, 2 dragées 3 fois par jour, 1/2 heure avant les repas ;

Enfants (au-dessus de 6 ans) : Dose, 1 à 3 dragées par jour selon l'âge.

Ces doses peuvent être augmentées ou diminuées selon la gravité des cas.

Veiller à ce que le malade ait tous les jours une selle régulière.

Enreg. au lab. nat. de cont. des médic. n° 167-16.

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, pharmacien,

3, pl. Intérieure-St-Michel - TOULOUSE. Tél. 213-06.

VAL'OVARINE FARMA

Déficiences ovariennes, Nervosisme, Douleurs, Malaises, Insomnies.

Composition : { Ovarine intégrale 20 cent.
(Par cachet) { Intrait de valériane fraîche stabilisée.. 12 —

Avantages. — Odeur agréable. Conservation garantie par procédé spécial. Présentation soignée. Tolérance parfaite. Assimilation facile.

Posologie. — Sauf indication spéciale du médecin traitant, la cure moyenne de VAL'OVARINE doit être faite chaque mois à raison d'une boîte de cachets à prendre au cours des dix jours qui précèdent les règles. (Un au milieu de chaque grand repas, soit deux par jour.) (Traitement à suivre également en cas d'obésité glandulaire.)

Pour obtenir un effet certain et durable, on continuera ce traitement pendant 3 à 4 mois consécutifs.

Les femmes ayant subi l'OVARIECTOMIE ou qui ont passé l'âge critique choisiront de préférence pour suivre un traitement de dix jours de VAL'OVARINE une période où elles constatent soit du nervosisme, soit de l'insomnie, soit une sensation de pesanteur.

Prix : 20 francs.

Laboratoire de la VAL'OVARINE

1, avenue Eugène-Thomas — KREMLIN-BICÊTRE (Seine).

(Tél. : Italie 20-18.)

VALOVOSAN

Régulateur de la fonction ovarienne
et sédatif nervin.

Composition. — Un comprimé = 40 U. I. d'hormone sexuelle femelle, 0 gr. 40 de poudre d'ovaires frais, 0 gr. 15 de bromisovalérylurée.

Indications. — Troubles psychiques de la puberté et de la ménopause, psycho-névroses génitales féminines, frigidité, dysménorrhées, aménorrhées accidentelles, troubles nerveux sous la dépendance de l'hypo-ovarie, vomissements de la grossesse.

Posologie. — 2 comprimés 3 fois par jour.

Présentation. — Flacon de 40 dragées.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien

25, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 60-77.)

VALTHÈNE

(Gouttes)

Antispasmodique puissant.

Indications. — Toux laryngées, coqueluche, asthme, toux rebelles des tuberculeux.

Composition. — Alcoolature d'Alium Cepa, Teinture de Drosera, Teinture de Cochenille.

Ne contient aucun toxique. Goût agréable.

Posologie. — *Doses moyennes* à prendre dans une petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois par jour.

Enfants au-dessous d'un an...	V à X gouttes.	
— de 1 an à 5 ans	X à XX	—
— au-dessus de 5 ans...	XX à XL	—
Adultes.....	L à LX	—

Flacon de 30 cc. Prix : 13 fr. 50.

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoire de la VALTHÈNE
VALAT

166, rue de la Roquette — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 25-47.)

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence, le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler : dose moyenne : X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

Prix : 15 francs.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES (Sérum Vanadarsiné)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cc.

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergétique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cc. par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos, recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. (prix 18 fr. 20), et de 3 cc. (dose forte) (prix 21 fr. 30).

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.
(Tél. : Littré 26-92.)

VANOXYLE MILLET

AMPOULES

Composition :

Solution isotonique et isoionique de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, non arsénée.

Propriétés :

Médication vanadiée oxydante, amélioratrice du terrain. Stimulante et tonique.

Indications :

Toutes les asthénies, anémies, convalescences, tuberculose, pré-tuberculose, paludisme, syphilis.

Présentation :

12 Ampoules de 10 cc. correspondant à 20 mgr. de Métavanadates, soit 8 mgr. 3 de Vanadium métal.

Mode d'emploi :

En injections intra-musculaires, chez les adultes. Commencer par une demi-ampoule, puis 3/4, puis l'ampoule entière, tous les deux jours.

Prix : 20 francs.

GOUTTES

Composition :

Solution stable de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, *non arsénée*, à 5 p. 1000.

XX gouttes correspondant à 5 mgr. de Sels de Vanadium.

Propriétés et Indications :

Celles des ampoules.

Mode d'emploi :

Les gouttes de Vanoxyle se prennent au début du repas, dans un peu d'eau.

Adultes : XX à XXX gouttes deux fois par jour.

Enfants : selon l'âge, V à X gouttes deux fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

(Provence 20-20 et 58-43.)

VAN-SOL

Cachets

Formule :

Poudre de colchique.....	0,03
Acide acétylsalicylique	0,50
Acide phénylcinchoninique	0,25

Forme. — Boîte de 20 cachets.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les formes de rhumatismes et névralgies de toute origine.

Mode d'emploi. — De 2 à 4 cachets par jour, pris de préférence au moment des repas, autant que possible à intervalles réguliers, en laissant un intervalle de 4 heures entre chaque cachet.

Ne pas en donner aux enfants.

Prix : 16 fr. 65 la boîte.

Laboratoire P. et R. PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES
(S.-et-O.)

VANUCLÉOL LACROIX

Soluté leucosthénique

Composition. — Nucléophosphate de Vanadium strychnarsiné.

Propriétés. — Oxydant par le Vanadium. Leucosthénique par les Nucléines. Tonique par l'arsénostrychnine.

Indications. — Neurasthénie, Asthénie, Surmenages, suite de grippe, Convalescences, Anémies.

Formes pharmaceutiques. — 1° *Ampoules indolores* de 2 cc. en boîtes de 12. Trois séries d'injections avec repos intercalaire de huit jours.

La boîte de 12 ampoules de 2cc. : 18 fr. 75.

2° *Gouttes* : X à XX gouttes au milieu des deux principaux repas.

Le flacon de gouttes : 12 fr. 50.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Échantillon sur demande.

Laboratoires LAOROIX

V. MEROBIAN et Fils, Successeurs

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Nord 54-57.)

VAPOSULPHIUM

Comprimés sulfurés pour inhalations.

Propriétés thérapeutiques. — Le Vaposulphium comprimés inhalants sulfurés rend pratique la cure soufrée externe par inhalation. Il complète la cure soufrée interne par le Sulphium.

Indications. — Rhumes, Enrouements, Laryngites, Pharyngites, Catarrhes.

Mode d'emploi. — Mettre un comprimé dans un bol d'eau bien chaude (salée, si on désire un liquide voisin de l'isotonicité), et respirer les vapeurs sulfureuses.

Laboratoires BRISSON

Docteur DEDET et Cie Pharmaciens.

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes,
numérotés de 1 à 5.

Doses et mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le sixième jour, et continuer la variation.

Propriétés thérapeutiques. — Action laxative toujours identique. — Jamais d'accoutumance ni d'irritation. — Tolérance parfaite. — Innocuité absolue.

Prix : 10 francs la boîte.

Laboratoire de la VARILAXINE

SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

VARIPHILE

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition. — Extrait de cupressus, 0,04 ; Extrait d'Hamamélis, 0,04 ; Extrait d'oesculus, 0,04 ; Poudre d'ovaire, 0,004 ; Poudre de surrénale, 0,004 ; Poudre de thyroïde, 0,004, pour une pilule.

Propriétés pharmacodynamiques. — Tonifie les vaisseaux, fluidifie le sang et active la circulation générale par une association médicamenteuse synergique d'extraits de glandes endocrines et d'extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives et hémostatiques.

Indications. — **Affections veineuses** (varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites).

Troubles circulatoires (accidents de la puberté et de la ménopause).

Mode d'emploi. — 2 pilules à chacun des 2 principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

Prix : 17 francs la boîte de 60 pilules pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

VARISCLÉRINE

(Ampoules).

**préparées selon les indications
du professeur Sicard.**

**Injectons sclérosantes intravariqueuses,
sans accidents, sans insuccès.**

Varisclérine A : Salicyl. de soude.

Varisclérine B : Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 31 fr. 20.

Prix spéciaux au corps médical.

Laboratoire Angelini,

61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous les commissionnaires
de droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

VASCOSODINE

Sa préparation demande environ deux mois.

Contre l'Artériosclérose et pour la circulation du sang en général. Dépourvue de toute action irritante et de toute toxicité. Ne contient pas d'iode.

Composition. — Hamamélis, Seneçon, Gui, Passiflore, Cimicifuga, Viburnum, Gossypium, Marron d'Inde, Citr. de Na., Organes frais : pancréas, foie.

Indications. — Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Artériosclérose, Vertiges, Bourdonnements d'oreille, Surdité, Otosclérose, Rougeurs du visage, Congestions, Chaleurs, Lourdeurs de tête, Dartres, Eczémas, Puberté, Menstruation, Angoisses, etc...

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée ou non, avant chacun des deux principaux repas.

Cure immédiate : 2 flacons. Cure d'entretien : 1 flacon tous les deux mois.

Prix : 12 francs

Laboratoire LORMEAU

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

VASCUROL

(Dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

Composition. — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

Indications. — Hypertension, Presclérose et Artério-sclérose, Troubles de la ménopause, Varices, Hémorroïdes, Obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

Prix : 21 francs.

Laboratoire P. QUÉRIN

86, rue de la Réunion — Paris (XX^e.)

VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques.

Troubles circulatoires : Troubles des règles et Ménopause, Congestions broncho-pulmonaires, Hémoptysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

Troubles glandulaires : Congestion thyroïdienne, ovarienne, pancréatique : Troubles sécrétoires, salivaires et cutanés. Sécrétion lactée.

Troubles sensitivo-moteurs : Arythmie, Tachycardie, Névralgisme facial, Névro-dermites.

Mode d'emploi. — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau, en commençant par la dose la plus faible.

Après les repas, matin, midi et soir.

Prix de vente au public : 18 fr. 75 le flacon.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS XVI^e).

(Tél. : Auteuil 35-25.)

VASONITRYL

Forme. — Dragées à enrobage spécial.

Composition. — Complexe Nitrite de Calcium—Théobromine calcique (0 gr. 20 par dragée), soit : Nitrite de Calcium 0,05, Théobromine Calcique 0,15.

Indications. — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, Angine de poitrine, Aortite, Artériosclérose, Spasmes vasculaires périphériques, Claudication intermittente, Sensation de doigt mort, Migraines, Bourdonnements d'oreilles.

Action thérapeutique. — Vaso-dilatation périphérique. Diminution des spasmes vasculaires. Légère action cardiotonique et diurétique. Tolérance parfaite.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 dragées de Vasonitryl jusqu'à 3 fois par jour, de préférence avant les repas. Avaler avec un peu d'eau sans croquer. Quand il s'agit de traitements de longue durée, y intercaler des repos de quelques jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-3.

Littérature et échantillonnage médical sur demande :

LABORATOIRES SUBSTANTIA
M. Guérault, Docteur en pharmacie.
13, rue Pages — SURESNES (Seine).
(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge et le Grand-Duché de Luxembourg :

LABORATOIRES SUBSTANTIA
53, rue du Poinçon — BRUXELLES

VASO-RHINOL

Simple et mentholé.

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — 1° (V. R. simple) : Oxyde de Terpilène, Résorcine, Camphre, Linalol ; Para-amido benzoate d'éthyle, Terpènes purifiés, Huile olive stérilisée.

2° (V. R. Mentholé) : Même formule plus menthol.

Indications. — 1° V. R. simple : Infections du Nez, du Pharynx, du Larynx et des Oreilles.

2° V. R. mentholé : Troubles sécrétoires, état congestif du Rhino-Pharynx, des Fosses nasales et du Sinus.

Doses. — X gouttes ou plus selon les cas, 2 à 4 fois par jour en position couchée.

Prix : 14 fr. 75.

Laboratoire des VASO-RHINOL
20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

VASO-RHINOL ADRÉNALINÉ

Forme. — Pommade pour enfants et adultes.

Composition. — 1° Pommade pour enfants : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Pétroléine ;

Prix : 9 fr. 40.

2° Pommade pour adultes : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Novocaïne, Pétroléine.

Prix : 10 fr. 40.

Indications. — Infections du Rhino-Pharynx, Etat catarrhal, Troubles Vasomoteurs.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, deux à trois fois par jour.

Laboratoires des VASO-RHINOL
20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

V. A. V.

Propriétés thérapeutiques. — Antitoxiques et curatives qui permettent d'éviter parfois les interventions chirurgicales, l'hospitalisation et les immobilisations prolongées.

Indications thérapeutiques. — Adénites, Ostéites, Arthrites bacillaires, Péritonites, Bacillooses rénales, Lésions oculaires, Granulomes annulaires, Pityriasis, certains Psoriasis, Lupus, etc., associés ou non aux lésions pulmonaires.

Forme et mode d'emploi :

- a) Emulsion forte pour les tuberculoses chirurgicales (injectable, doses croissantes; doses massives).
- b) Emulsion faible pour les tuberculoses chirurgicales et pulmonaires associées (injectable).
- c) Emulsion 3 souches pour les tuberculoses pulmonaires (à ingérer) en ampoules.

Valables 2 ans.

Prix au public : 62 et 66 francs.

Laboratoire ÉLOCINE

51, rue du Ranelagh — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 84-18.)

VAXITIOL BOUTY

Vaccin Intestinal Polyvalent
à support sulfo-sodique.

Composition. — 1° Du vaccin : Colibacilles (10 milliards), Entérocoques (6), Staphylocoques (2), *Proteus Vulgaris* (1) ;

2° Du support sulfo-sodique : Hyposulfite de soude et Solution de Bourget.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et associés, colibacilliose, auto-intoxication intestinale et séquelles anaphylactiques, entéro-colite...

Chirurgie et accouchements : vaccination pré- et post-opératoire des complications (infections, phlébites).

Gynécologie : séquelles des maladies infectieuses et d'accidents colibacillaires.

Forme. — Ampoules buvables.

Posologie. — Cas aigus : matin et soir.

Cas moyens et chroniques : une fois par jour.

Prix : Dosage adultes : 24 fr. 45.

Dosage enfants : 18 fr. 35.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

VÉGANINE

**Médicament Analgésique, Antipyrétique,
Antigrippe, à action renforcée.**

Comprimés assurant une désagrégation immédiate par
un procédé nouveau de fabrication.

Composition :

Phosphate de Codéine	0 gr. 01	} par comprimé.
Acide acétylsalicylique	0 gr. 25	
Phénacétine	0 gr. 25	

Action thérapeutique et Indications :

La Véganine, composée d'après les nouvelles théories de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés :

Sédatif puissant par la Codéine,

Analgésique par l'Acide acétylsalicylique,

Analgésique et antithermique par la Phénacétine.

Elle constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, **névrites**, **sciatique**, **lumbago**; également utile en neurologie (états anxieux) et en cancérologie.

Par son association synergique, l'action thérapeutique de la Véganine est considérablement renforcée, et cela sans intoxication secondaire.

Doses et mode d'emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec un peu d'eau, de café ou de thé.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-1.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérout, Docteur en Pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16.85-16.86.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge
et le Grand-Duché de Luxembourg :

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

VÉGÉCARNIS BENGUÉ

(Viande végétale.)

Composition. — Pour 100 gr. :

Farine de riz	4 gr.
Farine d'Arrow-Root	3 gr. 50
Phosphate tricalcique.....	1 gr.
Glycérophosphate de chaux	0 gr. 40
Poudre de champignons de Paris	4 gr.
Citrate de soude	0 gr. 70
Cacao pulvérisé	26 gr. 40
Sucre vanillé	60 gr.

Propriétés et indications. — Puissant reconstituant à base de champignons de couche et de cacao. Toutes maladies causes de débilité, tuberculose, lymphatisme, surmenage, phosphaturies, troubles de croissance, dépressions nerveuses.

Forme. — Poudre.

Posologie. — *Adultes* : Délayer une cuillerée à entremets de poudre dans un peu de lait. Ajouter une tasse de lait chaud et faire bouillir trois minutes environ.

Enfants : Une demi-cuillerée de poudre et une demi-tasse de lait suffisent.

N.-B. — Toujours utiliser le lait et toujours tenir la boîte fermée.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils, Pharmaciens,
16, rue Ballu, PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 85-60.)

VÉGÉLACT-SOJA

Lait sec végétal au Soja-Soyolk.

Analyse p. 100 : hydrates de carbone, 63 ; caséines de lait et de soja, 23 ; matières grasses, 8 ; sels minéraux, 6 (NaCl, Ca, Mg, Fe, Mn, phosphore assimilable).

Malt, Vitamines A, B, C, D.

(Vitamine C = 10 cc. de jus de citron.)

Indications. — *Régime lacté restreint*, Dyspepsie du nourrisson, Eczéma, Tétanie, Colites de l'enfant et de l'adulte, chez les vomisseurs, Sevrage.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe rase de **VÉGÉLACT** pèse 7 gr. 20 et équivaut à 40 gr. de lait de vache. Délayé au 1/5 dans de l'eau, le **VÉGÉLACT** est l'équivalent alimentaire du lait de vache et s'emploie aux mêmes doses (en biberons ou bouillies) dès la 6^e semaine. Se prépare comme toutes farines maltées.

Prix. — Le kilo : 41 fr. 60. La boîte de 350 gr. : 16 fr. 65.

VÉGÉLACT-SPÉCIAL

Pour les nouveau-nés, les prématurés et rebelles à toute alimentation, utiliser exclusivement, *en ne le faisant pas cuire*, le **VÉGÉLACT-SPÉCIAL**, solubilisé, prédigéré et survitaminé. Faire dissoudre à température tiède 10 gr. dans 60 gr. d'eau bouillie.

Préparé en boîtes hermétiques de 350 gr.
(Dose pour 35 biberons de 70 gr.)

Prix : 41 fr. 60.

Le **VÉGÉLACT** est employé dans les services de l'Assistance publique.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-51).

VÉGÉLAX

Laxatif végétal.

(Comprimés)

Composition. — Extraits de bourdaine, séné, cascara sagrada, boldo, artichaut. Poudres de scammonée et rhubarbe.

Indications :

Constipation rebelle. — Rééducation Intestinale. — Affections du foie. — Arthritisme. Action douce et progressive. Ne donne pas de coliques.

Doses :

De 2 à 4 comprimés par jour le soir au coucher.
Enfants : 1/2 dose.

LABORATOIRES NOLLET
Chenegros, Pharmacien
47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

VÉGÉPHOS

**Inosito Hexaphosphate de chaux
et de Magnésie.**

Composition. — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

Propriétés. — Recalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation. Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

Formes. — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Pharmacie Centrale de France
25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 18-67.)

VÉGUMINE

Aliment à base de poudres de légumes frais stabilisés.

Composition. — Poudre totale de légumes frais stabilisés (carottes, tomates, épinards, bananes mûres) associée aux hydrates de carbone et au dextromaltose. Riche en éléments minéraux ; apport de vitamines A, B, C.

Forme. — Poudre.

Propriétés. — Complément indispensable de l'allaitement artificiel, stimule et régularise les fonctions digestives, reminéralisateur, favorise la croissance et la dentition, pouvoir calorique élevé.

Indications. — Végumine facilite le sevrage, évite les carences, les accidents dyspeptiques dus au régime trop exclusif des farineux et du lait, éduque les voies digestives. Anorexie, avitaminoses.

Dose. — De 3 à 4 mois : 1/2 cuillerée à café par biberon.

De 5 à 6 mois : 1 à 2 cuillerées à café par biberon.

A partir de 7 mois : 1 cuillerée à soupe par repas.

Pour les poudres de légumes frais voir également : VÉGUVA et CAROTTASE.

Durée moyenne de consommation : 10 jours.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

VÉGUVA

Composition. — Aliment végétal concentré riche en vitamines A, B, C, renferme, à l'état de poudre impalpable, la totalité des substances azotées, des sels minéraux et de la cellulose des épinards, carottes et tomates.

Forme. — Poudre.

Indications. — *Nourrissons* : Anorexie, arrêt de croissance, troubles du développement, troubles nutritifs aigus et chroniques, alimentation de transition pour passer du régime lacté au régime mixte.

Adultes : Régime achloruré, acidose.

Doses. — *Nourrissons* (après 5 mois) : une mesure répartie dans les biberons de la journée.

Adultes : deux à trois mesures à répéter plusieurs fois dans la journée.

Délayer le Véguva à l'aide d'un liquide bouilli et refroidi (lait, eau, bouillon), puis l'incorporer à l'alimentation déjà prête.

Ne pas faire cuire.

Pour les produits à base de légumes frais, voir également : CAROTTASE et VÉGUMINE.

Laboratoires WANDER

CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

VEINICURA

Médication Spécifique des Troubles de la Circul. veineuse.

Composition et forme. — Association d'extraits végétaux à propriétés vaso-constrictives et toniques du système veineux, d'extraits glandulaires (thyroïde et hypophyse) modificateurs de la nutrition générale, et d'un sel fluidifiant du sang (citrate acide de soude).

Présentée en comprimés *bicolores* : comprimés rouges contenant les extraits végétaux et le Citrate; comprimés blancs contenant les extraits glandulaires seuls (Thyr. 1 cgt., hyp. 2 cgt. p. comp.), afin d'éviter leur altération qui se produit fatalement lorsqu'ils sont mélangés à d'autres produits, surtout lorsque ceux-ci sont hygro-métriques.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles circulatoires dus à la stase veineuse ; varices et varicosités, hémorroïdes, varicocèles, congestions passives de l'utérus et de la prostate, pesanteur et œdème des jambes, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés de chaque couleur en moyenne par jour, les rouges pendant le repas, les blancs entre les repas.

Prix : 18 fr. 20.

Laboratoire FABIU

132, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Passy 87-85).

VEINOGENE

Ovoïdes à base d'extraits de genêt, hydrastis, hamamélis, viburnum, marron d'Inde, iodure, bromure, phényléthylmalonylurée.

Circulation veineuse, Troubles de la puberté et de la ménopause, États congestifs, Phlébites, Hémorroïdes, Ulcères.

Posologie :

2 à 6 ovoïdes par jour avant les repas.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en Pharmacie.

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23).

VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

Composition. — Surrénales, Hypophyse, Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratœgus, Cœsculus, Viburnum, Valériane.

Indications. — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

Formes. — Pilules et gouttes.

Dose :

Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Gouttes : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

Prix : *Pilules* 16 fr. 65 ; *Gouttes* : 15 fr. 60.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

VEINOSÉROL

(ancien Veinosérum)

Enregistré au L. N. de C. des médic. sous le n° 167-10.

Indications. — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes et tous états congestifs.

1° Forme gouttes : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamelis, rhamnées).

Doses. — XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 20 fr. 80.

2° Forme liqueur, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses. — 1 cuillerée à soupe matin et soir 15 jours par mois. — 15 francs.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, place Intérieure-Saint-Michel TOULOUSE

(Tél. : 213-06.)

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica
Marron d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques. Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

Prix : 16 fr. 50, la boîte de 40 comprimés.

Laboratoires LEBEAULT

Beşins et Cie, pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VEINOTROPE

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la maladie veineuse et de ses complications.

Indications. — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la ménopause et de la puberté.

Composition :

A. — VEINOTROPE M.

(Usage masculin, comprimés roses.)

Poudre de Para-thyroïde	0,001
— orchitique	0,035
— de surrénales	0,005
— de pancréas	0,100
— d'hypophyse (lobe post.)	0,001
— de noix vomique.....	0,005
Extrait d'hamamélis virginica	0,010
— de marron d'Inde	0,005

Pour un comprimé.

B. — VEINOTROPE F.

(Usage féminin, comprimés violets.)

Poudre de Para-thyroïde	0,001
— d'ovaires	0,035
— de surrénales	0,005
— de pancréas	0,100
— d'hypophyse (lobe post.)	0,001
— de noix vomique.....	0,005
Extrait d'hamamélis virginica	0,010
— de marron d'Inde.....	0,005

Pour un comprimé.

Mode d'emploi. — 2 comprimés au lever et 2 comprimés au coucher, ou suivant prescription médicale ; 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

Formule F. — Interrompre pendant la période menstruelle.

VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du pancréas..	3 —
Calomel	4 —
Talc stérile, Q. S. pour	100 —

Mode d'emploi. — Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI°).

(Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées.)

BANDE DE CRÊPE VELPEAU

Bande de tissu élastique sans caoutchouc.

La *meilleure* des bandes de crêpe : **Légère, douce, extensible, chaude lavable.**

Filet bleu à utiliser lorsque la chaleur n'est pas nécessaire.

Plaies, Varices, Efforts. Prix marqués 5 cm. : 7 fr.
7 cm. : 9 fr. 25; 10 cm. : 12 francs.

Filet rouge. — Plus riche en laine. A utiliser lorsque la chaleur est nécessaire. **Douleurs, Rhumatismes.**
5 cm. : 8 fr. 75 — 7 cm. : 11 fr. 50 — 10 cm. : 16 fr. 75 ;
15 cm. : 23 fr.

Ceintures de 20 cm. : 31 fr. ; 30 cm. : 46 fr. ; pour **Grossesse et Opérations.**

Bande rose sans filet. Même qualité que la bande filet rouge, *Spécialement créée pour l'usage féminin. Pratiquement invisible sous les bas fins.*

5 cm. : 9 fr. 25 ; 7 cm. : 12 fr. ; 10 cm. : 17 fr. 25.

Toutes les bandes de crêpe ne sont pas des bandes de crêpe **Velpeau**. Exiger la marque **Velpeau**.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 18-67.)

VENAPRESSINE

(Gouttes.)

Composition. — Alcoolature et teintures stabilisées de plantes sélectionnées (marron d'Inde, hamamélis, viburnum, cupressus, noix vomique).

Propriétés. — Combat l'atonie de la paroi vasculaire par son action vaso-constrictrice énergique, active et régularise le débit circulatoire.

Stimulant ovarien. Sédatif utérin.

Indications. — Troubles du système circulatoire veineux (varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorroïdes, troubles de la ménopause, dysménorrhée, aménorrhée).

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 13 francs.

R. PAULY, Pharmacien,

7, rond-point Mirabeau — PARIS (XV^e).

VERACHOL

Cholagogue physiologique.

Augmente et fluidifie la sécrétion biliaire.

Composition. — Comprimés enrobés à base de sels biliaires associés à des laxatifs légers.

Indications. — Préventif et curatif de la lithiase biliaire. Ictères, Insuffisance hépatique, Gros foie des alcooliques et des coloniaux, Constipation par insuffisance biliaire.

Mode d'emploi. — Commencer par une dragée et jusqu'à trois, si nécessaire, le soir en se couchant, ou une dragée après chaque repas. A avaler sans croquer. Pas d'intolérance, pas d'incompatibilités.

Échantillons médicaux sur demande :

LABORATOIRES FOUGERAT

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

(Tél. : Pereire 00-32.)

VÉRALGINE

Supprime toute douleur. *Complète l'action du traitement curatif.*

Combinaison barbituro-analgésique (Phénétine-Amidopyrine-Sonéryl) agissant sur les centres encéphaliques de la douleur :

centres corticaux et pseudo-centres de Sherrington.

Non soumise aux formalités des Toxiques C,

Sans stupéfiant.

Sans intolérance.

Sans réaction cutanée.

Indications. — Tous les états douloureux quelles qu'en soient la cause ou l'origine : Névralgies, Rhumatismes, Douleurs opératoires, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Ulcères, Cancer, Menstruation, etc.

Art dentaire, Périostite, Pulpite, Extractions, Fraisages, etc.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants : 1/2 ou 1 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

12 Comprimés : 8 fr. 50 — 8 Cachets : 6 fr. 50.

Remboursable aux Assurés sociaux à 80 p. 100.

Laboratoire du MAINGUY

M. BASSIN, Docteur en pharmacie à BONDY (Seine).

Échantillons sur demande. (Tél. : 24 Bondy.)

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 d'amide barbiturique diéthyle et 1 gramme de Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle et inodore ; sommeil calme, réveil normal. Sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats.

Posologie :

Adultes. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café, espacées dans les 24 heures. Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 2 heures avant l'heure du sommeil dans une infusion ou dans de l'eau sucrée.

Enfants. — XXV gouttes par 24 heures et par année d'âge, soit espacées, soit avant l'heure du sommeil suivant les cas.

Le flacon contient environ 25 cuillerées à café.

Laboratoire BURIAT

37, rue Spontini — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 64-23).

VÉRICARDINE

Tube de 30 comprimés glutinisés à base de **Papavérine**.

Chaque comprimé représente :

Chlorhydrate de Papavérine	0,015
Bromhydrate de Quinine	0,02
Phényléthylmalonylurée	0,02
Extrait de Cratægus stabilisé	0,05

Excipient Q. S. pour 1 comprimé.

Indications. — Traitement énergique et rapide de l'instabilité cardiaque, Troubles cardiaques, Etats d'anxiété et de nervosité, Spasmes digestifs, Insomnies.

Grâce à la Papavérine, antispasmodique puissant de tous les muscles lisses.

Mode d'emploi. — Par 24 heures :

1 à 3 comprimés avant chacun des principaux repas.

Contre les insomnies : 2 à 4 comprimés en se couchant.

Avaler sans sucer ni croquer,

Prix : 17 francs.

Laboratoire de L'IODARSENIC GUIRAUD

10, Impasse Milord — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 37-98.)

VERMIFUGE CHIARINI

Vermifuge dont la formule a été créée il y a un siècle et demi.

Composition. — Essence de plantes anti-helminthiques récoltées en Provence, additionnées de K Br en petite quantité et soigneusement dosé, en solution hydro-alcoolique.

Indications. — Expulsion des vers intestinaux, principalement Oxyures et Ascaris, sauf le *Tænia* (Voir *Tæniifuge Jacquème*). Tous les troubles nerveux des enfants. Insomnies, irritabilité.

Présentation. — Elixir agréable.

Posologie. — Jusqu'à un an : 1/2 cuillerée à café ; de 1 à 3 ans : 1 cuillerée à café ; au-dessus de 3 ans : 1 cuillerée à dessert.

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Le matin à jeun, le soir en se couchant.

Laboratoires CHIARINI

68, boul. du Roi-René — AIX-EN-PROVENCE
(Bouches-du-Rhône).

VERMIFUGE CORNET

Composition. — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (*semen-contra*, mousse de corse, fougère mâle, etc.), de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

Forme. — Liquide, de conservation indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales).

Doses et mode d'emploi :

Jusqu'à 1 an	1/2 cuillère à café.
De 1 à 8 ans	1 —
De 8 à 15 ans	2 —
Adultes.....	1 à soupe.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

Prix : 7 fr. 50.

Échantillons sur demande.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Laboratoires SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX. Tél. : 840-78.

VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contra d'Alep de chœnopodium anthelmenthicum et de pyrethrum anthemis, présentée sous forme de sirop aromatisé à la vanille.

Agréablement accepté par enfants et adultes.

Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Chaque cuillerée à café renferme 42 mgr. 5 de semen-contra, 50 mgr. de pyrethrum anthemis et 2 mgr. 5 d'essence de chœnopodium.

Posologie :

Enfants de 1 à 5 ans : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

Enfants de 5 à 10 ans : Une cuillerée à dessert.

Adultes : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë doubler les doses.

Dans les cas d'*oxyurase*, en plus de l'administration par la bouche, donner en outre le Vermirène, aux mêmes doses que ci-dessus, en lavement à conserver, mélangé à une ou deux cuillerées à café d'eau tiède.

Prix : 11 fr. 50.

M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie.

Cinq-Cantons — BAYONNE.

VÉROGÉNOL

Le traitement des maladies nerveuses.

Formule :

Diéthylbarbiturate de soude 0 gr. 25

Extrait fluide valériane fraîche.. 0 gr. 10

Par cuillerée à café ou comprimé.

Indications. — Insomnie (quelle qu'en soit la cause), Nervosisme (tics, toux nerveuses, hoquet persistant, démorphinisation, etc...).

Mode d'emploi. — 2 cuillerées à café ou comprimés le soir en se couchant procurent le sommeil.

2 à 3 cuillerées à café ou comprimés en 24 h. calment les nerfs.

Prix du flacon : 17 francs.

Laboratoires VENOT

139, avenue E.-Zola — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 31-75.)

VÉRONIDIA

Composition. — Diéthylmalonylurée associée à l'extrait de Passiflore dans un véhicule synergique et agréable au goût.

Chaque cuillerée à soupe de solution renferme 0 gr. 25 de diéthylmalonylurée.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse, Traitement des insomnies, Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Terreurs nocturnes, Mal de mer, Tremblements, Bourdonnements d'oreilles, etc...

Doses pour 24 heures. Adultes : 1 à 4 cuillerées à café espacées dans le courant de la journée, comme antispasmodique ; 1 à 2 cuillerées à soupe comme hypnotique.

<i>Enfants :</i>	{	Au-dessous de 2 ans, nourrissons.	X à XXX gouttes.
		De 2 à 5 ans	XX à LX —
		De 5 à 7 ans	L à C —
		De 7 à 9 ans	1/2 à 1 cuillerée à café.
		De 9 à 11 ans....	1 cuillerée à café à 1 cuillerée 1/2.
		De 11 à 14 ans...	1 cuillerée 1/2 à 3 cuillerées à café,

dans une infusion de tilleul ou dans du lait, le mélange étant pris en plusieurs fois, comme une potion.

(Flacon de 175 cc.) (Flacon de 85 cc.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

VERRULYSE

Composition. — A base de phosphore, chaux, fer, manganèse, magnésie lourde et légère, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Forme. — Poudre divisée en petits cachets ouvrables. Boîtes de 80 cachets, quantité suffisante dans la plupart des cas.

Dose et mode d'emploi. — Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes : 2 cachets par jour pendant 40 jours au début des repas.

Pour les enfants de moins de 8 ans : 1 cachet tous les jours.

Pour les enfants, et même pour les adultes, dans les cas rebelles, pour augmenter l'assimilation, ouvrir le cachet et prendre la poudre délayée dans un peu de potage, purée, compote, etc., la poudre ne communiquant aucun goût désagréable.

Propriétés. — Reconstituant de la cellule. Antiverruqueux.

1° *Effet général* : Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants, de l'entrain, de l'appétit, du teint, des fonctions intestinales.

2° *Effet local* : La deuxième ou la troisième semaine, les verrues prennent une teinte rosée au pourtour ou deviennent le siège d'une légère démangeaison. Elles s'éliminent ou se résorbent peu à peu.

Condition essentielle : Suivre le traitement sans arrêt, régulièrement, avec patience, jusqu'au résultat escompté.

Indications. — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.).

Exerce une action de redressement dans toute production cellulaire anormale.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 4 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

Prix public : Boîte 80 cachets pour 40 jours : 16 francs.

Voir à **Formule JACQUEMAIRE n° 60.**

Laboratoires FLUXINE

Produits BONTHOUX

Edm. JOËT, Pharmacien.

VILLEFRANCHE (Rhône).

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude, colloïdal.

Action. — Hypotensive-antiathéromateuse, — déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux. Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque, Pré-sclérose. Vertiges, Ménopause.

Formes et doses. — 1° *Liquide* : chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas ; 2° *Comprimés* : chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comprimés à chacun des principaux repas.

Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.

Verticurine, liquide : le flacon, 20 fr. 70.

Verticurine, comprimés : le flacon, 15 francs.

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1^{re} classe.
47, rue Féry — CORBEIL (S.-et-O.).

VERTOX

Comprimés vermifuges pour parasites intestinaux (trichocéphales, oxyures).

Dosés à 0,15 de poudre de semen-contrà.

Action. — Se dissolvent dans la seconde partie du tube digestif et agissent électivement sur : trichocéphales, anguillules, oxyures, etc...

Doses. — (Moyennes) 5 Vertox et 2 comprimés Leptab, avalés avec un peu d'eau, loin des repas. Les adultes peuvent répéter 2 à 4 fois cette dose, dans la journée, si la crise de parasitisme est grave. Suivre le traitement pendant 3 à 4 jours, au moment des lunaisons.

Présentation. — En boîte aluminium 55 comprimés : 11 fr. 75 (11 jours effectifs).

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e)
(Tél. : Turbigo 51-12.)

VÉRYL

Composition. — Dérivé organique aminé du cyanure de mercure, nettement plus actif, beaucoup moins toxique que le cyanure ordinaire.
Pas d'intolérance.

Indications, Posologie et Mode d'emploi. —

Toutes les indications du cyanure de mercure, Syphilis à toutes les périodes. Même posologie que HgCy : 1 ampoule de 1 cc. par jour.

En injections intraveineuses ou intramusculaires profondes indolores.

Diurétique mercuriel de toxicité minimum, 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Présentation et Prix. — La boîte de 20 ampoules de 1 cc., 22 fr. 90.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

Au Cantharidate de Soude.

Le **Vésicatoire Rose Beslier** à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

Indications. — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonies, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc.

Présentation. — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10 × 10.

Prix : la pochette : 6 francs.

Chaque carré, mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et-L.) (Tél. : 45.)

VICALPHOS

VICALPHOS SIMPLE

Composition. — Parathyroïde, surrénale, thymus ; phosphate, glycéro-phosphate et gluconate de chaux, inositolphosphate acide de chaux et de magnésie.

Forme. — Granulé sucré aromatisé à la mandarine, d'un goût très agréable.

Prix: La boîte de 100 gr. env. : 16 fr. 50. G^d modèle (traitement) : 45 fr.

VICALPHOS IRRADIÉ

Composition. — Ergostérine irradiée, carotène ; parathyroïde, surrénale, thymus ; fluorure de calcium, phosphate et glycérophosphate de chaux, inositolphosphate acide de chaux et de magnésie.

Forme. — Granulé sucré, aromatisé à la framboise, d'un goût agréable, est très bien accepté par les enfants.

Prix: La boîte de 100 gr. env. : 22 fr. Grand modèle (traitement) : 60 fr.

Indications:

Tous les états de déminéralisation : Tuberculose et Prétuberculose, Troubles de croissance, Rachitisme, Convalescence, Surmenage, Fractures, Caries dentaires, Grossesse, Allaitement, etc.

Posologie :

Enfant	1/2	cuillerée à café	} Au début de chacun des 3 repas.
Adolescent..	1	—	
Adulte	2	—	

Aucune contre-indication. Peut être prescrit aux assurés sociaux.

Laboratoire du VICALPHOS,

P. LAURENT, Pharmacien, 48, rue Saint-Jean — LYON.

VICELIASE

Formule dragéifiée.

Antitoxique. Tonique. Cytophylactique.

Composition. — Citrate de soude, Phosph. de soude, Noix vomique, Chlorure de magnésium, Hypo-sulfite de magnésium.

Propriétés. — Reconstituant général, Tonique du système nerveux, Régulateur des fonctions digestives et nutritives, Prophylactique des néo-plasmes.

Indications. — Asthénies, Surmenage, Troubles digestifs par hypofonctionnement, Troubles de la nutrition, Hypertrophie de la prostate.

Toutes indications du Chlorure de Magnésium.

Tube de 80 dragées (traitement pour 1 mois) : 19 fr. 25.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue de la République — CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : 16.)

VIGOFRUITS

Composition. — Acide phosphorique associé aux divers glycérophosphates et aux chlorures de Calcium et de Magnésium, dissous dans des jus de fruits naturels.

Propriétés thérapeutiques. — Sans strychnine ni arsenic, sans alcool, stimule et tonifie sans exciter.

Indications. — Toutes les asthénies cérébrales ou musculaires, combat la fatigue et les effets du surmenage, abrège les convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 19 fr. 15, flacon 240 cc.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

VIGORAL

Rapide régénérateur des forces.

Composition :

Sulfate de calcium	1,3
— — cuivre	0,7
— — fer	1,8
— — magnésium	2,2
— — manganèse	1,7

Pour 100 gr. quantité en milligrammes.

Association de métaux catalyseurs. Sous forme d'Elixir digestif et tonique et de Capsules en étui.

Indications. — Anémie, Asthénie, Fatigue nerveuse, Dépression, Migraines, Fatigue cérébrale, Diminution de la mémoire, Grossesse.

Posologie. — Capsules : une *au début* des deux principaux repas.

Ou Elixir : une cuillerée *à soupe* au début des deux principaux repas pour adulte.

Pour enfants moins de 12 ans : une cuillerée *à dessert* mélangée avec de l'eau ; au-dessous de 6 ans : une cuillerée *à café*, mélangée avec de l'eau.

Après 10 jours, interrompre 5 jours avant de recommencer une nouvelle période de 10 jours.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1024-8

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires des Hormométalions

50, avenue Jacqueminot — MEUDON (S.-et-O.).

(Tél. : Obs. 13-33.)

VIN ANTI-DIABÉTIQUE TALON

Composition. — A base de quinium associé à des toniques végétaux et arsenicaux. Médication complémentaire de l'insuline.

Indications. — Diabète et ses conséquences. Revitalise les tissus, arrête la déminéralisation, empêche la formation du sucre.

Dose. — 1 verre à liqueur avant les 2 principaux repas.

Brochure franco sur demande.

Laboratoire du D^r TALON

153, boulevard Montparnasse — PARIS.

Paris c/c 1557-94 (Tél. : Danton 51-07.)

VIN AUBERY AU SUC DE VIANDE

Formule pour 1 litre.

Plasma musculaire de viande crue (concentré à froid)	26 gr. 54
Arrhénal	0 gr. 442
Extrait de noix vomique	0 gr. 069
Phosphate de soude	8 gr. 85
Ecorces de Quinquina.....	2 gr. 65
Noix de Kola	8 gr.
Feuilles de Coca	2 gr. 65
Ecorces d'oranges amères.....	1 gr. 56

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 440-1.

Avantages. — La Vinification du vin employé comme véhicule a été conduite d'une *façon spéciale* pour renforcer l'action tonique des médicaments.

Posologie. — Un verre à madère avant chaque repas pour les adultes. Demi-verre pour les enfants.

Action. — Véritable *aliment réparateur* exaltant la phagocytose. Générateur de vigueur musculaire et cérébrale.

Indications. — *Anémie, Débilité, Dépression physique, Surmenage, Épuisement, Tuberculose, Grippe, Trouble de Croissance, Convalescence.* En outre toutes les affections justiciables des Sucs musculaires de viande trouveront ici leur traitement avec une efficacité accrue.

Prix :

21 francs la grande bouteille, pour 10 jour de traitement ; 25 francs le litre pour 15 jours de traitement.

Laboratoires AUBERY,
AVIGNON (Vaucluse).

VIN BRAVAIS

Composition. — Kola, Coca, Caféine, Théobromine, Malaga.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, Débilité, Convalescence, Surmenage, Maladies nerveuses.

Posologie. — *Adultes* : le gobelet-mesure joint au conditionnement représente la quantité à prendre deux fois par jour avant les deux principaux repas.

Demi-doses pour les enfants à partir de 10 ans.

Prix : 20 fr. 50 le flacon de 500 cc.

NOTA. — Il existe également l'Elixir Bravais, même composition que le Vin mais à base de Curaçao, et le Granulé Bravais, spécialement indiqué dans les cas où le Vin et l'Elixir sont interdits.

AUBRIOT, Pharmacien

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 28-90.)

VINCE

Poudre antiseptique, désodorisante et cicatrisante.
Soluble dans l'eau.

Composition. — A base de parahydroxybenzoate de propyle, de perborate de soude spécialement préparé et d'une pureté absolue, additionnés d'essences antiseptiques et aromatiques qui en corrigent le goût et en augmentent l'activité.

Indications. — Spécialement l'angine de Vincent, les ulcérations fusio-spirillaires, les stomatites ulcéro-membraneuses, les gingivites ulcéreuses, les accidents de dent de sagesse et la pyorrhée. S'emploie également comme dentifrice.

Mode d'emploi. — Pour lavages, bains de bouche ou gargarismes : une cuillerée à café de Vince dissoute dans un verre d'eau tiède. En applications, sous forme de pâte, dans les cas d'angine de Vincent, stomatites ulcéro-membraneuses, pyorrhée ou irritation des gencives. A laisser de 4 à 10 minutes.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté.

Composition. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Indications thérapeutiques. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posologie. — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. sous le N° 544-2.

Prix : 23 fr. 50.

Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD

Docteurs en Pharmacie,

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

VIN DE VIAL ET SIROP DU VIN DE VIAL

A. VIN DE VIAL. — Strychnine. Quinine. Arséniate de Sodium. Viande. Lacto-Phosphate de chaux. Quinquina. Malaga.

Composition pour un verre à liqueur (30 cc.)	{	Sulfate de strychnine	1/2 milligr.
		Quinine pure	2 centigr.
		Arséniate de sodium.	1/2 centigr.
		Substances extractives de la viande.....	50 centigr.
		Lacto-phosphate de calcium.....	50 centigr.
		Ecorces quinquina	2 grammes
		Malaga et Muscat.....	Q. S.

Posologie et mode d'emploi. — Suivant indications — et couramment un verre à liqueur pour les adultes — une cuillerée à bouche pour les adolescents, dix minutes avant le repas. *Le goût est très agréable.*

Indications. — Asthénies de toutes espèces. Convalescences. Rachitisme léger. Croissance et puberté. Grossesse. Allaitement. Etats déficients des vieillards.

B. SIROP DU VIN DE VIAL — Même composition, *sans alcool, ni strychnine ni arsenic.*

Composition pour une cuillerée à soupe (20 grs.)	{	Substances extr. de la viande.....	1 gramme.
		Lacto-phosphate de chaux.....	1 —
		Quinine....	1/2 centigr.
		Sirop de gentiane	6 grammes.
		Sirop de quina.....	3 —
		Sirop simple.....	8 —

Posologie et mode d'emploi. — Suivant indications et généralement : *Adultes* : une cuillerée à soupe. *Enfants* : une cuillerée à café, pur ou dilué dans un peu d'eau pure ou minérale, avant les principaux repas.

Indications. — Le *Sirop du Vin de Vial* est en somme du *Vin de Vial*, sans strychnine, ni arsenic, et en outre sans alcool. Il est particulièrement réservé aux enfants et aux malades qui ne peuvent utiliser un produit alcoolique.

Laboratoires pharmaceutiques : H. VIAL

36, Place Bellecour — LYON

Tél. : Franklin 33-59.

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le VIN GIRARD est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage.

Un verre à madère ou deux cuillerées à soupe de Vin Girard correspondent à :

Iode	0 gr. 04
Tannin.....	0 gr. 08
Lactophosphate de chaux	0 gr. 30

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; 1/2 dose pour enfant.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, augmente la phagocytose.

Indications. — Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose apyrétique, toutes convalescences, en particulier infectieuses et grippales.

Prix : 19 fr. 80

Pour un traitement de 12 à 15 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-2.

VINOGRINOL

Vin hépato-minéral.

à l'extrait de foies de veau frais.

Médication des Syndromes Anémiques et des Déchéances Organiques par la méthode de Wipple.

Toutes anémies (pernicieuses, secondaires, post-hémorragiques), Convalescence, Tuberculose, Troubles de la croissance et de la puberté, Dépressions physiques et nerveuses.

Formule :

Extrait concentré de foies de veau sélectionnés.....	10
Arrhéнал.....	0,20
Carb. lithine	0,05
Sulfate strychnine	0,025
Teint. écorce orange amère	7
Teint. kola	10
Vin de liqueur, Q. S. pour.....	1 litre.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 verres à madère par jour.

Enfants : 2 à 3 verres à liqueur par jour.

Laboratoires du VINOGRINOL

30, rue de Sète — LONGUYON (Mthe-et-M.). Tél. : 80.

VIN RACI-BEL

RACIne de BELLadone
en décoction à 5 p. 100.

« Cure Bulgare. »

Traitement des rigidités extrapyramidales : maladies de Parkinson, Little, Wilson, Athétoses avec rigidité, spasme de torsion, etc...

Titré en alcaloïdes totaux.

Stabilisé, se conserve.

Avantages. — Egalité d'action, activité constante. Beaucoup moins toxique et plus actif que les fortes doses d'atropine.

Posologie. — Demander notre notice.

En principes, doses croissantes : de CXXV gouttes à sept cuillers à café par jour.

Flacons de 210 grammes à 22 francs ou de 500 grammes à 38 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

VIOFORME

Iodochloroxyquinoléine.

CIBA

ANTISEPTIQUE, CICATRISANT.

Poudre inodore. Non toxique, jamais irritant.

Indications. — Plaies atones, ulcères variqueux, eczémas, escarres, brûlures.

Doses. — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100. Se formule magistralement.

Boîte poudreuse : 12 francs.

Usage interne. — Voir **Entéro-Vioforme**.

OVULES AU VIOFORME. — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

Boîte de six ovules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

VIOPHAN

Acide phénylcinchoninique de synthèse spéciale :
fabrication entièrement française.

Propriétés. — 1° *Non toxique* : Le chien supporte plus de 2 gr. par kilo de poids.

2° Mobilisateur et éliminateur spécifique de l'acide urique et des insolubles après modification interne profonde empêchant l'irritation des muqueuses de l'appareil urinaire et permettant une *miction indolore*.

3° Antithermique, Antinévralgique, Antiphlogistique, Anticholestérinhémique.

Indications. — Goutte aiguë et chronique, Sciatique, Rhumatisme articulaire aigu et chronique, Névralgies rebelles, Lumbagos, Artériosclérose, Arthritisme.

Posologie. — 2 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures au repas, Boissons abondantes. Cure intermittente.

Présentation : 20 cachets ou comprimés 0 gr. 40.

Viophan injectable : associé à l'iodure de Na.

2 formes : **Viophan amp.** M (intramus.) avec novocaïne.
— amp. V (intraveineux).

5 ampoules : Prix 25 fr.

Laboratoire National de Contrôle, 196-1 et 2.

Laboratoire du Viophan

83, rue de Lille — ROUBAIX.

VIOSTEN

Composition. — Lipoïdes irradiés. Phosphatides (glycérophosphate de choline), Ether benzylcinnamique. Vitamines.

Comprimés. — Granulé. — Injections de 1 cc.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme, Grossesse, Suites de couches.

Chez les nourrissons et les déficients digestifs employer la **Zymatine irradiée** (Zymatine + Nucléinate de Ca + Ergostérol irradié).

Doses. — *Enfants* : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour avant les repas.

De 3 à 7 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 7 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Adultes : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

LABORATOIRES LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados).

VIOXYL

Médication Céro-arsénio-hématique.

Puissant Accélérateur de la Nutrition générale.

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Formes. — Elixir et Granulé.

Posologie :

Adultes : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).
(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

VIRADÈNE (Dragées de)

Synergie de glandes génitales, composé phosphorique, phytothérapique, extrait de noix vomique, nucléinate de manganèse, extrait de maté.

Indications. — 1° *Chez l'homme :* *dépression nerveuse, affaiblissement des facultés, neurasthénie, sinistrose, surmenage, sénilité prématurée, difficultés de l'acte génésique, frigidité, troubles de la puberté, convalescences difficiles, etc...*

2° *Chez la femme :* dans le cas de *troubles à tendance dépressive, d'asthénie, de surmenage, d'affaiblissement des facultés intellectuelles, physiques ou génésiques, etc.*

Doses. — 4 dragées par jour en moyenne.

La boîte de vente contient un traitement de deux semaines:

Laboratoires du FÉMINADÈNE
120, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

VIREDOX

Composition. — Levure de bière désamertumisée, purifiée, séchée et IRRADIÉE.

Protéines.....	56	p. 100
Hydrates de carbone.....	26	—
Lécithine.....	1	—
Glutathion.....	0,65	—
Vitamines B ¹ , B ² , B ³ , B ⁴ , B ⁵ , B ⁶ , et 165 unités internationales de Vitamines D par gramme.		

Indications :

Carie dentaire, rachitisme, fractures osseuses, hypogalactie, toutes les formes de la tuberculose.

Posologie et mode d'emploi :

Nourrissons : 2 à 5 grammes par jour.

Enfants : 5 à 10 grammes par jour.

Adultes : 10 à 20 grammes par jour.

Remarque. — Le goût agréable du VIREDOX en permet la prescription infantile. Il est recommandé de l'ajouter aux potages, bouillies, purées, ou de le mélanger aux légumes ou pâtes. Bien délayé, le VIREDOX se prend également très facilement dans un verre d'eau fraîche ou tiède.

Prix : 15 francs, le flacon de 150 grammes.

SANAVITA

7, rue Fontaine-Delsaux — LILLE. — (Tél. : 11-35.)

VIRMONAL « PIAM »

A base de phosphore organique.

Forme et dosage. — Comprimés contenant 0 gr. 0033 de phosphore organique.

Posologie. — 3 à 4 comprimés, 3 fois par jour, avant les repas, par périodes de dix jours. Ces doses peuvent être augmentées, le VIRMONAL ne renfermant ni alcaloïdes, ni substances toxiques.

Indications. — Neurasthénie, Hystérie, Hypochondrie, Faiblesse nerveuse, Tics, Epilepsie, Insomnie, Surmenage.

Prix. Le flacon de 90 comprimés : 26 francs.

Echantillons et vente en gros :

H. PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON.

D^r A. IMBERT, Pharmacien

(Tél. : Burdeau 28-96.)

Dépositaire à Paris.

E. MOREAU, Pharmacien

13, rue des Nonnains-d'Hyères.

(Tél. : Turbigo 87-05.)

VISCO-SÉRUM

Visco-sérum injectable reproduit exactement la formule minérale du plasma sanguin : $\frac{K + Na}{Ca + Mg} = 30$; $\frac{K}{Ca} = 2$.

Stimulation du système nerveux, de l'appareil cardio-vasculaire et des organes hématopoïétiques.

Indications. — Tous les états asthéniques. Les affections chroniques déprimantes. Convalescences. Neurasthénies, Surmenages. Débilité physiologique. Pré-sénilité.

Posologie. — Une ampoule de 5 cc. tous les jours ; voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Visco-sérum buvable. — Complète l'action du Visco-Sérum injectable, mais peut également être administré isolément.

Solution phosphorique acide radioactive. Fer, manganèse, zinc.

Catalyseur des métabolismes, fait l'appoint des carences minérales, ramène à la normale l'acidité humorale.

Indications. — Les déminéralisations, les anémies quelles que soient leurs causes. Tous les états asthéniques avec hypoacidité urinaire. Tous les états de dénutrition.

Posologie. — 2 ampoules buvables de 3 cc. par jour, 10 à 20 jours.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules injectables de 5 cc. : 18 fr. 45.
Boîte de 10 ampoules buvables de 3 cc. : 18 fr. 45.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

VISCOVEINE

Composition. — XL gouttes =

Citrate de soude.....	0,10
Ext. stab. de Marron d'Inde Dausse ...	0,10
Ext. stabilisé de Monesia.....	0,05
Ext. stabilisé de Gui (fluide)	0,02
Bourse-à-pasteur.	0,05
Ext. fluide de Viburnum, Cupressus, hamamelis aa.....	0,10
En milieu glyciné.	

Indications. — Hémorroïdes et tous états vari-
queux, Aménorrhée, Dysménorrhée, Règles
douleuruses, Troubles de la ménopause.

Posologie. — XXX à XL gouttes aux repas.
Enregistré au Laboratoire de Contrôle des
médicaments sous le n° 988-3.

Prix : 17 fr. 20

Laboratoire FOSSET

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (S.-et-O.).

VITACALCINE MONCOUR

Complexe reminéralisant et énergétique.

Reminéralisant par sa vitamine D, ses poudres de glande thyroïde et surrénale et son carbonate de calcium.

Energétique par sa vitamine A, sa poudre totale de foie de bœuf, son phosphate de magnésium et son nucléinate de manganèse.

Indications. — Toutes affections déminéralisantes et hyposthénisantes : carences vitaminiques, états de déchéance organique, convalescence des maladies infectieuses, rachitisme, fragilité des os, fractures, anémies, chlorose, cachexies, troubles de croissance, carie dentaire, neurasthénie, psychasthénie, scrofule, prébacillose, bacillose, etc.

Posologie :

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, ou 1 à 4 cachets.

Enfants : 1 à 4 comprimés ou 1 à 2 cachets (suivant l'âge).

Dose d'entretien : la moitié de la dose normale.

Le traitement sera poursuivi aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.

(Tél. Molitor 08-47.)

VITACHOLINE

Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques.

Puissant tonique du foie.

Composition. — VITAMINE A. Sulfate de Magnésie. Extrait d'Artichaut, Lacto-sérum.

Propriétés. — L'apport en VITAMINE A, qui s'accumule dans le foie, permet d'obtenir une *action tonifiante* et *anti-infectieuse* considérable de la cellule hépatique. Active la sécrétion et l'excrétion biliaires. Régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif. Diurétique. *Saveur agréable.*

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule, Lithiase, Ictère, Cholécystite chronique, Cholémie, Insuffisance. Constipation, Entérocologie. Urticaire. Prurit, Eczéma chronique, Acné chronique, Asthénie et fatigue générale.

Présentation. — Granulé soluble. Prix : 16 francs.

Mode d'emploi. — *Drainage biliaire* : 1 à 3 c. à café de granulé à jeun avec 1/2 verre d'eau tiède.

Cure d'entretien : 1/2 à 1 c. à café de granulé, 20 minutes avant les repas.

LABO-VITA

190, boulevard Haussmann — PARIS.

VITACRINE

Association hormono-vitaminique.

Deux formules : Vitacrine M (Masculine) et Vitacrine F (Féminine).

Composition. — Hormones génitales principales et accessoires, Lobe antérieur d'Hypophyse, Corps thyroïde, Surrénale, Vitamine E.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant pluriglandulaire et médication endocrinienne d'appoint.

Mode de présentation. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Asthénies, Convalescence, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle, Troubles de la puberté, Déficiences glandulaires de la ménopause.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour.

Laboratoire DEFFARGE

Docteur en Pharmacie

188, cours de la Somme — BORDEAUX

(Tél. : 91-609.)

VITADIASE

Composition et présentation :

Comprimés d'inositophosphate de chaux et magnésie associé aux extraits hydroalcooliques de levure de bière, de son et germe de blé.

Indications :

Surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, convalescence, rachitisme, tuberculose, grossesse et allaitement.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 comprimés.

Prix au public : 15 fr. 60.

Docteur J. GALIMARD O. * * * *

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES

VITADONE

Vitamines A et D en ampoules injectables.

Titrage: 20.000 u. i. de vitamine A. }
20.000 u. i. de vitamine D. } par ampoule de 2 cc.

Propriétés thérapeutiques. — La VITADONE agit puissamment contre la tuberculose pulmonaire, par sa vitamine D, qui calcifie les lésions tuberculeuses, et par sa vitamine A, anti-infectieuse et protectrice des épithéliums (notamment de l'épithélium pulmonaire).

Indications et posologie. — Dans la tuberculose pulmonaire, 2 injections intra-musculaires par semaine ; cures de 10 semaines, séparées par des périodes de repos de 15 jours.

La VITADONE, qui se fait aussi en GOUTTES (XX à C gouttes et davantage, par jour) et en CHOCOLATÉS (2 à 4 par jour en moyenne), peut remplacer, dans toutes ses indications, l'huile de foie de morue, dont elle contient tous les principes actifs. Elle est, en somme, une huile de foie de morue synthétique et hyperconcentrée.

Prix :

Ampoules : 29 fr. 15 la boîte de 6.
Gouttes : 21 fr. 85. — Chocolatés : 22 fr. 90.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.
(Tél. : Danton 08-11.)

VITAGAR

à base de Vitamine B

Composition. — Mucilage exclusivement végétal, à base de Vitamine B (300 U. I.), Agar-Agar, Bourdaine exempte de principes amers et irritants.

Forme. — Petits grains dragéifiés, faciles à absorber.

Action. — Déconstrictant complet. Par sa Vitamine B, régénère les fibres lisses de l'intestin auxquelles il restitue le tonus contractile. Combat ainsi en même temps la constipation et sa cause principale, l'atonie intestinale. — La Vitamine B agit également contre l'auto-intoxication due à la stase stercorale.

Indication. — Traitement complet et rationnel de la constipation. Laxatif purement physiologique. D'action douce et d'emploi agréable, particulièrement indiqué chez les enfants, les femmes enceintes et les nourrices.

Posologie. — 1 ou 2 cuillerées à café (1/2 ou 1 pour les enfants) après chacun des deux repas. Avaler sans mâcher à l'aide d'une gorgée de liquide.

Laboratoires UROMIL

L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 04-00.)

VITALYNE

Traitement phytothérapique rationnel de tous désordres organiques imputables à la diathèse arthritique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique urinaire et hépatique ; balsamique et diurétique ; dissolvant remarquable des phosphates, acide urique et urates.

Indications. — Goutte aiguë et chronique, Gravelle urique, Lithiase biliaire, Rhumatismes, Affections de la peau, Cellulite, Ménopause, Artériosclérose sous toutes ses formes.

Principaux constituants. — *Cynara scolymus*, *Chimaphylla umbellata*, *Ylex paraguayensis*, *Hydrocotyle asiatica*, *Fabianus imbricata*, *Barosma crenulata*, *Rhamnus frangula*, *Hemidesmus indicus*, etc.

Posologie. — Sauf avis contraire du médecin traitant, une infusion quotidienne le soir durant une semaine ; deux infusions quotidiennes, une le matin à jeun, une le soir durant la deuxième semaine ; une infusion quotidienne le soir pendant la troisième semaine. Se reposer 8 à 10 jours et reprendre, dans les mêmes conditions, le traitement pendant les deux mois suivants.

Présentation. — Boîtes de 15 ou 30 sachets cellophane, rigoureusement dosés pour une tasse d'infusion. Très agréable au goût.

Prix de vente au public. — La boîte : 15 fr. 50. La double boîte : 30 fr.

Laboratoires MINERVA — 10, rue Bayard — TOULOUSE.

VITAMINE D CORTIAL

Vitamine D cristallisée.

Composition. — Vitamine D cristallisée incorporée au chocolat. Pastilles dosées à 4 centièmes de milligramme de vitamine cristallisée pure.

Indications. — Spécifique de toutes les formes du rachitisme.

Curatif. — Chez l'enfant : retard de croissance, déformations osseuses, retard de la dentition, carie dentaire, troubles scorbutiques.

Chez le nourrisson : accidents convulsifs, tétanie, décalcification, avitaminoses.

Chez l'adulte : pré-tuberculose, grossesse, allaitement, consolidation des fractures, ostéomalacie.

Préventif. — Enfants prématurés ou de constitution faible, pour prévenir les troubles rachitiques ; dans les convalescences de maladies infectieuses.

Avantages. — Dosage précis, pureté de la vitamine D, conservation indéfinie, absorption agréable pour les enfants.

Mode d'emploi et doses. — Au-dessous d'un an, 1/2 pastille chaque matin. — Jusqu'à 10 ans : 1/2 pastille matin et soir. — Au-dessus : de 1 à 2 pastilles par 24 heures.

Pour les nourrissons, faire fondre la pastille dans du lait tiède.

Prix : le tube de 20 tablettes (20 à 40 jours de traitement) : 21 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

VITAMINES SECLO

Huile naturelle de foie de Fletan (Halibut).

Contenant : 30 000 unités int. Vitamines A par gramme.
2 500 unités int. Vitamines D par gramme.

Formes. — Gouttes, dragées.

Permettent l'absorption des Vitamines A et D à haute dose, sous un faible volume.

Elles ne provoquent ni dégoût, ni troubles digestifs.

Propriétés thérapeutiques. — Débilité générale, rachitisme, prétuberculose, lymphatisme, xérophtalmie, troubles de la nutrition, croissance, dentition, ostéomalacie, grossesse, allaitement, convalescence, surmenage.

Posologie :

Nourrissons, de ..	2 à 6	gouttes par jour.	
Enfants, de	6 à 12	—	—
Adultes, de	20 à 30	—	—
Adultes, de	2 à 5	dragées	—

Prix :

Le flacon compte-gouttes de 5 cc.....	14 fr. 60.
La boîte de 30 dragées	14 fr. 60.

Laboratoires SECLO

J.-P. PINTA, Pharmacien

6, rue Adolphe-La-Lyre — COURBEVOIE

(Tél. : Wagram 62-71.)

VITAMORRHUINE

GRANULÉS CHOCOLATÉS

Composition. — Concentré d'huile de foie de morue à 1/50 associé au phosphore et au calcium sous forme de granulés chocolatés. Une cuillerée à café de Vitamorrhutine représente:

3 500 unités internationales Vitamine A. naturelle.

750 — — — D. —

0 mgr. 02 de phosphore.

0 gr. 05 de calcium.

Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

Indications. — Croissance, Rachitisme, Scrofuleuse, Convalescence, Carie dentaire, etc.

Doses. — *Enfants* : de 3 mois à 1 an ; 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMORRHUINE

Perles

Composition :

1 perle contient 0,10 cc. d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50 et correspond à :

3.500 unités internationales, Vitamine A. *naturelle* ;

750 unités internationales, Vitamine D. *naturelle*.

Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

Indications. — Inappétence, anémie, aux femmes enceintes pendant la période de gestation, convalescence, etc.

Doses :

Adultes : 4 à 6 perles par jour.

Adolescents : 3 à 4 perles par jour.

Enfants : 1 à 2 perles par jour.

A avaler après les repas.

Pharmacie Centrale de Belgique,

Soc. Anonyme

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMYL

Vitamines A. B. et C. en extrait concentré.
Une cuillerée à café à chaque repas.

Prix public : 19 fr. 50 le flacon.

VITAMYL IRRADIÉ

Solution et Dragées.

Vitamines A. B. C. et D. en solution huileuse,
finement émulsionnée. Une cuillerée à café ou
2 dragées à chacun des 3 repas.

Une cuillerée à café renferme 2 200 unités anti-
rachitiques internationales, 1 dragée renferme
1 000 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

Le flacon de solution grand modèle : 21 fr. 30.

— — — petit modèle : 12 fr. 80.

Le flacon de 40 dragées : 20 francs.

VITAMYL IRRADIÉ CHLOROPHYLLÉ

Ampoules buvables.

Chlorophylle pure associée aux vitamines A, B, C
et D.

1 à 3 ampoules buvables par jour.

Chaque ampoule contient 10 cgr. de Chlorophylle
et 2 500 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

La boîte de 10 ampoules de 3 cc. : 23 fr. 50.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours
de traitement à dose journalière maximum.

Indications. — Toutes les indications du trai-
tement de carence. Tous les cas de déminérali-
sation. Les différentes formes de ce produit sont
aromatisées et d'un goût agréable.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

VITAOL

Huile de foie de morue survitaminée en vitamine A.

De très faible acidité facilement assimilable.

Teneur en vitamine A constamment contrôlée et ramenée à un titre uniforme de 2 000 unités internationales par gramme.

Produit très actif.

Indications. — Troubles de la croissance, état infectieux, lymphatisme, prétuberculose et précarence — sans contre-indication.

Doses : *Enfants :* 1/2 cuillerée à café, avant le repas du soir.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café, avant le repas du soir.

Présentation. — Forme liquide flacon de 180 cc. Prix : 14 francs.

Lab. pharmaceutiques CHABRE Frères.
TOULON.

VITARGYL

Composition. — Protéose argentique contenant 20 p. 100 d'argent.

Propriétés. — Antiseptique de toutes les muqueuses. Non irritant. Sédatif et décongestif externe. Non corrosif. Action absolument indolore.

Indications. — Traitements préventif, abortif et curatif de toutes les affections des muqueuses.

Posologie. — **Oto-rhino-laryngologie** : Coryzas, Sinusites, Amygdalites, Angines, Désinfection pré- ou post-opératoire, Prophylaxie de grippe, Oreillons, Rougeole, Otites :

Vitargyl 1 % flacon compte-gouttes... 12 fr. 50

Pour les cas aigus :

Vitargyl éphédriné, flacon compte-gouttes 14 fr. 50

Ophthalmologie : Conjonctivites banales ou purulentes, Ulcères, Ophtalmies, Préventif de l'Ophtalmie des nouveau-nés :

Collyre au Vitargyl 5 % flacon compte-gouttes 14 fr. 50

Urologie : Blennorragie (préventif : instillations 10 p. 100 Prophylargyl ou crayons ; abortif : injections 20 p. 100 ; curatif : lavages 1 et 5 p. 100), Urétrites, Cystites (injections 10 p. 100 ou crayons), Métrites du col, Bartholinites (crayons, ovules ou lavages).

Vitargyl 20 % en boîtes de 6 tubes scellés de 5 cc. 20 fr. 80

Vitargyl Crayons urétraux, en boîte de 6. 14 fr. 50

Vitargyl Crayons utérins, en boîte de 6.. 14 fr. 50

Vitargyl ovules, en boîte de 6..... 18 fr. 75

Prophylargyl, compte-gouttes..... 16 fr. 50

Laboratoires POINTET et GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Arch. 03-29 et 42-40.)

VITARSENIC

Une seule forme parce que la seule stable.
Dragées de 0 gr. 25.

Contenant :

Vitamine D..... 500 unités.
Triiodure d'Arsenic 1 milligramme.

Indications. — *Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Anémie, Convalescence, Anorexie, Asthénie.*

Mode d'emploi. — 2 à 10 dragées par jour pour enfants de 2 à 10 ans.

Adultes : 12 à 16 dragées par jour.

Littérature et Echantillons :

Laboratoire du BLAGNY
René PAMELA, Pharmacien
85, rue Turbigo — PARIS (III^e).
Tél. : Archives 12-39.

VITASCORBOL

Acide Ascorbique

Médication spécifique des états de précarence et de carence en vitamine C.

Indications :

Scorbut, Présorbut, Anorexie, retard de la marche, Anémie, Syndromes hémorragipares, retards de la dentition, Allaitement artificiel.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 025. (Tubes de 20) 21 fr. 30

Vitascorbol injectable :

Boîte de 10 amp. de 1 cc. à 0 gr. 05. Prix 29 fr.
— 10 amp. de 2 cc. à 0 gr. 10. Prix 41 —

Posologie :

Nourrissons : 2 comprimés à 0 g. 025 *pro die.*

Adultes et enfants : 2 à 4 comprimés *pro die.*

Par voie intraveineuse: 10 à 30 ctg. *pro die* suivant les cas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Pouleno Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

VITÈNE

Médication vitaminée, phosphorée.

Composition. — Gouttes :

Phosphatides cérébraux	0 gr. 025
Vitamine A	6000 unités Intern ^{les}
— D	2000 —
Huile d'olive	Q. S. pour 1 cc.

Capsules de 0 gr. 20 :

Phosphatides cérébraux	0 gr. 025
Vitamine A	6000 unités Intern ^{les}
— D	2000 —
Huile d'olive	Q. S. pour 1 cc.

Propriétés. — Le Vitène possède un pouvoir de croissance et anti-anémique remarquable. Agent anti-infectieux et antirachitique puissant, il est aussi fixateur de calcium.

Indications. — *Chez l'enfant :* Troubles de croissance, Rachitisme, Anémie. — *Chez l'Adulte :* Convalescence, Surmenage, Lésions bactériennes. — *Chez la femme enceinte :* Pare aux perturbations du métabolisme du calcium. — *A tous les âges :* Agent anti-infectieux.

Mode d'emploi. — *Nourrissons :* X gouttes matin et soir. — *Enfants :* XX gouttes matin et soir. — *Adultes :* 2 capsules à midi et le soir au début des repas.

Prix : 21 fr. 30. Enregistré au L. N. de C. sous le N° 544-4.

Laboratoire A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

VITORANGE DU DOCTEUR BARILLOT

Le *Vitorange* est un comprimé friable constitué par son poids de jus d'orange évaporé dans le vide à froid, auquel ont été ajoutées dix unités de vitamine D antirachitique.

Il est conservé et vendu dans un étui hermétiquement clos où l'air a été remplacé par de l'azote. Chaque étui renferme cinquante comprimés.

Mode d'emploi. — Un comprimé par biberon ou cinq comprimés par tasse pour les grands enfants qui ne supportent pas l'huile de foie de morue.

Prix de l'étui : 12 fr.

Laboratoire VITORANGE

1, rue de la Rochette — MELUN (S.-et-M.).

VIVACURE

Composition et formes. — Deux formes.

Formule:	Adulte.	Infantile.
Bi-iodure de Mercure (Hg).....	0 gr. 02	0 gr. 01
Iodure de potassium.....	0 gr. 25	
Arséniate de soude.....	0 gr. 01	0 gr. 005
Extrait atropa bellad.....	0 gr. 02	0 gr. 005
Arome q. s.....	15 cc.	15 cc.

Indications. — 1° Toutes les indications de la syphilis soupçonnée ou connue et de l'hérédo-syphilis.

2° Adjuvant indispensable de tous les traitements antisypilitiques soit au cours de la grossesse, de la croissance ou entre les périodes de traitement (cure de repos).

Avantages. — Présentation spéciale (ampoules buvables) ne comportant aucune indication susceptible de dévoiler la nature du traitement.

Mode d'emploi. — A prendre immédiatement avant les repas dans un verre d'eau gazeuse de préférence.

Posologie : Une ampoule par jour. Cette dose ne peut être dépassée que sur indication spéciale du médecin.

Note très importante : En cas de prédispositions anaphylactiques contre l'iode de potassium, prescrire la **forme infantile**.

La boîte de 14 ampoules : 23 francs.

Laboratoires de la JÉCOBIASE

D^r R. PIONNEAU, Pharmacien
VAYRES (Gironde).

VIVARGYRE

Traitement mercuriel dissimulé en ampoules buvables.

Deux dosages. — *Adultes :*

Phénoldisulfonate Hg et Na	0,05
Arséniate de soude	0,01
Excipient pour	10 cc.
Phénoldisulfonate Hg et Na	0,02

Enfants :

Méthylarsinate de soude	0,01
Excipient pour	5 cc.

Présentation. — Boîtes de 10 ampoules de 5 et 10 cc.

Indications. — Traitement Hg d'entretien ;
Troubles généraux ; Déficiences organiques ;
Agent dépuratif et reconstituant.

Doses. — 2 ampoules par jour (enfants et adultes)
dans de l'eau gazeuse, sucrée ou non.

Prix : *Adultes :* 23 fr. 50 — *Enfants :* 21 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous les n^{os} 403-23 24.

Laboratoires HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 04-71.)

VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines :

(Vitamines antirachitique et de croissance)
(Contrôle biologique rigoureux)

Forme. — Liquide.

Indications :

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

Posologie :

Enfants — Nourrissons :

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

Jusqu'à 3 ans :

1/2 à 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 3 ans :

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Adultes :

1 cuillerée à soupe par jour.

(Peut être pris à toute époque de l'année).

N.-B. — *Le Vivoléol a été la première huile de foie de morue contrôlée biologiquement.*

Prix : 17 fr. 10.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie. — Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 28-96.)

VOCALDOP

CACHET

Nouvelle formule. Même posologie.

Composition. — Yohimbe, Fenugrec et doses minima d'amorçage d'hypophyse antérieure et de thyroïdine.

Propriétés. — Le *Cachet Vocaldop* est un tonique spécifique du système vocal. Il représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la Voix considérée comme instrument de travail. Il a une élection élective sur le Timbre, la Puissance, la Résistance.

Indications.

Enrouement, Laryngite, Chevrotement.

Surmenage vocal, Asthénie vocale.

Et comme tonique pendant la période de tout traitement oto-rhino-pharyngien.

Posologie. — 2 cachets par jour pendant 8 jours, dans l'intervalle des repas. Un troisième les jours de gros effort vocal.

Présentation et prix. — Boîte de 20 cachets : 13 fr. 55.

INHALATION-GARGARISME VOCALDOP

Voir à Inhalation-Gargarisme.

Laboratoire Laryngologique.

R. CORDIER,

Docteur en Pharmacie,

45, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

20-2 (Tél. : Dorian 57-79.)

VOLTARGOL ROBIN

Composition. — Argent colloïdal électrique à très petits grains, isotonique et stabilisé, à 0,50 0/00

Propriétés. — Anti-infectieux, antiseptique, non toxique; ne produit pas de choc.

Indications. — Toutes infections aiguës : grippe, fièvre typhoïde et puerpérales, etc...

Forme et mode d'emploi. — Ampoules de 5 et 10 cc. pour injections intramusculaires ou intraveineuses, 1 à 10 cc. par 24 heures ; jusqu'à 50 cc. et plus dans les cas graves. Ovules.

Prix :	6 ampoules à 5 cc	25 fr. »
	6 ampoules à 10 cc	40 fr. »
	Ovules	18 fr. 15

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

VULCAPIL

**Lotion ininflammable au soufre
pour le cuir chevelu.**

Propriétés thérapeutiques. — Le VULCAPIL rend aisé, agréable, et sans danger le traitement de la Séborrhée et des Alopécies ; il apporte au cuir chevelu le soufre nécessaire à sa kératinisation et le débarrasse de ses sécrétions anormales et des desquamations de pellicules.

Indications. — Affections du cuir chevelu : Alopécies, Séborrhées.

Mode d'emploi. — Tous les matins faire une friction suivie d'un léger massage du cuir chevelu.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens,
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

VULCASE

(Comprimés).

Laxatif-cholagogue.

Soufre assimilable. Opothérapie biliaire.

Propriétés thérapeutiques. — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'Intestin. Dermatoses. Arthritisme.

Mode d'emploi. — Prendre de 1 à 4 comprimés par jour, soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Montmartre 75-01, 75-02.)

VULCRINOL

Pilules dragéifiées.

Opothérapie hépatique et chimiothérapie humorale associées.

Composition :

Extrait total de foie de veau frais.

Thiosulfate de magnésium.

Hexaméthylènetétramine.

Propriétés thérapeutiques :

Spécifique idéal des manifestations de l'insuffisance hépatique et des syndromes d'intolérance : agit comme excitant propre de la cellule hépatique et comme catalyseur de l'équilibre humoral.

Indications :

- 1° *Maladies d'intolérance et états anaphylactiques.* — Dermatoses, Prurits, Urticaires, Migraines, Asthme, Rhume des foies, Accidents sériques, Intolérances diverses.
- 2° *États hépatiques.* — Torpeur du foie et troubles digestifs consécutifs, Hépatites chroniques, Ictères, Foie colonial, Cholémie familiale, Arthritisme sous toutes ses formes : obésité, goutte, certaines formes de rhumatismes chroniques.
- 3° *Intoxications.* — Médicamenteuses et alimentaires, Auto-Intoxications, Adjuvant des traitements anti- Σ et de l'aurothérapie, Convalescences des maladies infectieuses.

Posologie :

3 à 4 pilules avant les deux principaux repas. Cure de 7 jours consécutifs, à répéter plusieurs fois avec intervalle d'une semaine entre les cures.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Prix : L'étui de 50 pilules : 23 fr. 50.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (I^{er}).

(Tél. : Opéra 43-79.)

VULNAMINE

Pommade à base d'Huile de foie de Flétan.

La *Vulnamine* contient 1 p. 100 d'huile de foie de Flétan correspondant à :

0 gr. 005 mgr. de Carotène pur cristallisé
et 0 mgr. 0125 d'Ergostérol pur cristallisé.

Indications. — Plaies atones de toute nature, Brûlures thermiques et chimiques, Ulcérations, Engelures, Dermatoses chroniques.

Emploi. — Étendre la *Vulnamine* en couche épaisse et recouvrir d'un pansement à garder le plus longtemps possible.

Prix : 17 fr. 05.

Laboratoire C. GIREL

F. JALOT, Pharmacien

19, rue Godot-de-Mauroy — PARIS (IX^e).

VULNÉRINE DU D^r BERGEN

Principes actifs. — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Éther éthylpyramido-benzoïque, oxyde de zinc, etc...

Forme. — Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 cc.

Indications. — Ulcères variqueux, plaies atones, Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Érysipèle, Engelures, Impétigo, Cancers ulcérés inopérables.

Spécifique de la gangrène gazeuse.

La VULNÉRINE calme, déterge, stérilise, épidermise toutes les plaies sans adhérer, sans macérer, sans intoxiquer. Les brûlures sont calmées instantanément et guérissent sans laisser de cicatrices.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 applications par jour avec le papier à pansement qui accompagne chaque tube de VULNÉRINE. Nettoyage à l'éther.

Prix du tube : 15 francs.

Laboratoire DUCOQ

LANGEAIS (Indre-et-Loire). — (Tél. : 68.)

R. C. Chinon 2059.

XANTHARLEM

Le Médicament du Foie.

Forme.

Pilules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin.

Composition.

Haarlem Bardet, Curcuma Xanthoriza (1), Cynara Scolymus.

Propriétés thérapeutiques.

Par accroissement de la cholérèse, augmente, progressivement et sans provoquer ni spasmes, ni coliques, l'écoulement de la bile, dont la teneur en bilirubine se trouve augmentée. Cholagogue énergique, mais non brutal. Assure l'asepsie de la vésicule et de l'intestin grâce à ses propriétés bactéricides. Antispasmodique, frénateur des contractions vésiculaires. Cholestérolitique.

Indications thérapeutiques.

Angiocholite, Cholécystite aiguë ou chronique, Péri-cholécystite, Cholélithiase, Cholémie, Cholestérinémie, Congestion du foie, Ictère catarrhal, Insuffisance hépato-biliaire, Cirrhose, Coliques vésiculaires, États hypercholestérinémiques, Constipation, Asthme hépatique, Colibacillose.

Posologie et mode d'emploi.

Affections aiguës : 4 à 6 pilules par jour.

Affections chroniques et cures d'entretien :
2 à 4 pilules par jour, à prendre au cours des repas.

Laboratoire National de Contrôle 518-7.

-
- (1) **Références scientifiques:** Dr Henri Leclerc, *Courrier médical*, 30 juin 1935 ; *Presse médicale*, 9 novembre 1935 ; *Journal de médecine et de chirurgie*, 25 mars 1937. — Thèse: Dr Van Loon, Amsterdam, 1934 ; H. Kalk et K. Nissen, *Deutsche mediz. Wochenschrift*, 18 septembre 1931 et 28 octobre 1932 ; Koch, *Congrès intern. de la lithiase biliaire*, Vichy, septembre 1932, etc.
-

LABORATOIRES BARDET, fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

XANTHORRYL

Composition :

Curcuma Xanthorhiza	5 centigr.
Extrait réglisse.....	5 —
Magnésie hydratée	10 —

Indications :

Insuffisance hépato-biliaire, états congestifs du foie, cholécystites, angiocholites, cholé-lithiase, constipation chronique, cellulite. Augmente la sécrétion biliaire sans spasmes ni coliques.

Présentation et prix :

18 francs la boîte de 60 comprimés glutinisés.

Mode d'emploi :

2 à 6 comprimés dans les 24 heures immédiatement avant les repas.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire des Produits **XANTHORRYL**

E. AUCLAIRE, Pharmacien,

36, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS (IX^e).

(Tél : Trudaine 38-63.)

XÉRODERME

Composition. — Pommade à base d'Oxyde de Zinc, de précipité blanc, d'Amidon, de Tribromophénate de Bismuth, de Vaseline.

Indications. — Spécifique de toutes les affections de la Peau.

Dartres, Eczéma, Herpès, Démangeaisons, Dermatoses, Rougeurs, Impétigo.

Emploi. — Après lavage de la région malade à l'eau bouillie ou avec une solution antiseptique, faire une légère application de Xéroderme. Faire deux ou trois applications par jour.

Prix au public : 9 francs.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (M.-et-M.).

YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

Composition. — Ferments bulgares vivants et sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragées et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie. — *Nourrissons.* — 1 à 2 cuillerées à café par jour. Yaourtine granulée.

Enfants et Adultes. — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

Prix : Dragées 12 fr. 80. — Granulés : 16 fr.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} classe

18, place de Laborde — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 64-90 à 95.)

YO-ANDROL

Médication hormono-vitaminique.

Composition :

Un complexe endocrinien :

Lipoïdes orchitiques	0, 03 cgr.
Antéro-hypophysine	0,005 mmgr.
Cortico-surrénine	0, 02 cgr.
associé à la vitamine E	0, 02 cgr.
et à la Yohimbine	à dose infinitésimale.

Présentation. — 1° Pilules (*tube de 60*).

2° Ampoules injectables en solution huileuse indolore. (*Boîte de 6.*)

Mode d'emploi. — *Per os* : 9 à 12 pilules par jour, avant chacun des principaux repas.

Voie injectable : 1 injection sous-cutanée ou intramusculaire journalière ou tri-hebdomadaire.

Indications. — Traitement spécifique des asthénies. Opothérapie complémentaire chez la femme.

Note. — Nous préparons aussi une forme sans yohimbine. Veuillez, dans ce cas, prescrire : **Yo-Androl sans Yohimbine.**

YO-GYNINE

Médication ovarienne renforcée.

Associant la totalité des hormones ovariennes à l'antéro-hypophysine, à la Vitamine E et à la Yohimbine

Présentation. — Pilules.

Mode d'emploi. — 9 pilules par jour, avant chacun des principaux repas et dans les 20 jours qui suivent le dernier jour des règles.

Indication. — Donne des résultats là où l'opothérapie ovarienne seule a échoué.

Laboratoire ISOOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 07-90.)

Adr. tél. : Lipoïdes Paris 54.

YOHIMBINE HOUDÉ

Alcaloïde cristallisé du *Pausinystalia Yohimbe*, spécialement purifié, constant et contrôlé par titrage physiologique.

Propriétés :

- 1° Aphrodisiaque (par vaso-dilatation élective et excitation directe du centre érecteur);
- 2° *Système nerveux*. Sympathicolytique véritable (R. Hamet).
- 3° *Système vasculaire*. Vaso-dilatateur général, donc hypotenseur (Loeper et Lemaire). Bons résultats dans l'aménorrhée et la dysménorrhée.
- 4° *Sécrétions*. Augmente la sécrétion lactée (Cortia, Nolle, Del Buono, Levent). Résultats remarquables et constants.

Présentation :

- 1° Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes sous le nom de **Yohimbine Houdé**.
- 2° Sous le nom de **Gynimbine Houdé**, avec une *littérature faisant abstraction complète des propriétés aphrodisiaques*:
 A. Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes.
 B. Ampoules de solution stabilisée, de 2 cc., à 5 milligrammes de chlorhydrate par cc.
 Prescrire : Ampoules de *Gynimbine Houdé*.

Doses :

- Frigidité, impuissance psychique : 6 à 10 granules par jour en 3 fois, avant les repas. Prescrire sous le nom de Yohimbine ou de Gynimbine.
- Sympathicotonie, Exophtalmie basedowienne, Hypertension, Dysménorrhée : 3 à 6 granules par jour, ou 1 ampoule (sous-cutanée). Prescrire sous le nom de Gynimbine.
- Hypogalactie : 1 ampoule Gynimbine de 10 milligrammes par jour, en injection sous-cutanée, pendant 4 à 6 jours ; commencer autant que possible dans les 3 jours suivant l'accouchement.
- A défaut d'injections, 3 à 6 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

Tél. : Nord 40-58.

YOHOURTHOGÈNE CARRION-LAGNEL

Pour la préparation domestique du Yohourth.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés fournis par les *cultures pures* des microorganismes producteurs du Yohourth.

Indications. — Le Yohourthogène permet la fabrication du Yohourth lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

Mode d'emploi. — La technique à suivre en utilisant n'importe quel appareil est donnée par une notice spéciale. Le contenu d'une ampoule correspond à 200 grammes environ de lait; une cuillerée à café du ferment en flacon correspond à un demi-litre de lait.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 10 fr. 65.

Le flacon (pour 20 pots de 120 cc.) : 4 fr. 70.

Laboratoires CARRION et LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV°).

(Tél. : Ségur 40-30.)

YPTOR

Bougies à l'argent colloïdal (non grasses, sans radium) pour le traitement abortif et curatif des urétrites.

Les bougies *Yptor* sont délivrées stériles en tubes scellés, lubrifiées et prêtes à être introduites dans l'urètre.

Bougies courtes (7 cm.). Boîte de 5 : 18 fr. ; de 10 : 35 fr.

Bougies longues (15 cm.). Boîte de 5 : 18 fr. ; de 10 : 35 fr.

Traitement abortif : 1 à 2 bougies courtes par jour.

Traitement curatif ou complémentaire des lavages : 1 bougie par jour après miction et lavage.

Laboratoire TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

YSEULT**(Gouttes)**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Adjonction à des vaso-constricteurs et sédatifs pelviens d'action sûre, du Boldo et du Cratægus. Tous ces malades sont de petits insuffisants hépatiques ou cardiaques, souvent les deux (Conception nouvelle confirmée par la mesure de la pression veineuse).

Indications. — Traitement nouveau des troubles de la circulation veineuse chez la femme et chez l'homme.

Doses. — X gouttes, 3 fois par jour, avant les repas.

Les résultats cliniques ne se comparent à aucune autre préparation, ils sont surprenants.

Prix : 17 fr. 70 pour un mois de traitement.

Dépôt chez tous les Grossistes.

E. ROCHE, Pharmacien

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

ZOMO-MALTINE

Composition. — Plasma musculaire de bœuf, Hémoglobine, Glycérophosphate de Na, Glycérine, Teinture de Vanille, Orange douce, Sirop.

Forme pharmaceutique. — Sirop.

Indications. — Toutes les anémies et déficiences organiques, simultanées ou consécutives, tuberculeuses, convalescence, trouble de croissance, grossesse, allaitement, etc.

Posologie. — 1 cuillerée à potage au début des repas. Aucune contre-indication.

Prix : 22 fr. 40.

Laboratoire J. GUINZBOURG

48, avenue de la Porte-d'Ivry — PARIS (XIII^e).

(Tél. : Gob. 06-63.)

ZOMO-STHÉNOL

Formule :

Sulfate de strychnine.....	0,001
Méthylarsinate de sodium.....	0,02
Sesqui-bromure de fer.....	0,03
Chlorure de manganèse.....	0,05
Glycérophosphate de calcium.....	0,10
Acide orthophosphorique.....	0,10

Lysat de globules rouges correspondant à 2 grammes de sang frais. Extrait de viande et de légumes concentrés par procédé spécial à quantité suffisante pour 1 tube scellé de 10 cc.

Indications. — Anémie, Asthénies, Anorexies, Dépressions, Neurasthénies, Convalescences, Surmenage, Cachexie, Amaigrissement, etc.

Présentation et prix :

Adultes : boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc : 22 francs.

Enfants : flacons de 150 cc. : 20 francs.

Posologie :

Adultes : une ampoule dans une demi-tasse à café d'eau très chaude

donne un excellent bouillon apéritif, stimulant nerveux et tonique général. A prendre avant le repas du midi ou du soir.

Enfants : une cuiller à dessert représente le 1/3 d'une ampoule.

Enregistré sous le n° 1779-1 et 2.

Remboursable aux Assurés Sociaux.

Laboratoire COURTIN

G. COURTIN, Pharmacien, ATTICHY (Oise).

ZYMATINE LESCÈNE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

Composition. — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonate de Mg., Phosphate de Na et de Mg., Bicarbonate de Na., Lactose.

Propriétés. — Déconstrictant, Cholagogue alcalin, Pansement des muqueuses. Empêche les fermentations intestinales, Antiémétique. Eupéptique.

Indications. — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Dermatoses, Hépatisme.

Adultes : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Affections hépatiques, Dermatoses.

Doses. — *Enfants* : 2 à 6 1/2 cuillerées à café par jour dans le lait (biberons), eau, bouillies. (Éviter température supérieure à 50°.) Dans la *constipation*, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café suivant effet, dans un demi-verre d'eau avant le repas, 2 à 3 fois par jour.

ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

Composition. — Zymatine, Vitamines, Nucléinate de Ca.

Indications. — Médications hépato-digestive et reminéralisante associées.

Doses : *Enfants.*

Jusqu'à 6 mois : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

— 1 an : — matin, midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 2 1/2 cuillerées à café matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19.)
et LIVAROT (Calvados).

ZYMION

Traitement du rhumatisme chronique.

Description. — Capsules glutinisées contenant : Soufre colloïdal, Manganèse colloïdal, Lithium colloïdal, Etain colloïdal et Levurine Extractive.

En flacons de 60 capsules.

Action pharmacodynamique. — L'action résolutive du soufre sur les tissus fibreux, celle du Lithium sur la diathèse uratique, du Manganèse sur la goutte et l'érythème noueux, et la présence d'Etain colloïdal (qui existe dans diverses sources thermales) et de *Levurine extractive*, antitoxique, antiglycémique et stabilisant des colloïdes minéraux, expliquent l'activité du *Zymion* dans de nombreuses formes de rhumatisme.

Indications. — Rhumatisme chronique simple, fibreux, déformant, noueux, infectieux, arthrite sèche, goutte, lumbago, et toutes manifestations arthritiques ou rhumatismales chroniques avec réactions douloureuses.

Doses. — 4 à 10 capsules par jour aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Prix : 28 fr. 60 pour 6 à 15 jours de traitement. A. S. B.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

Forme. — Poudre.

Composition. — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

Mode d'emploi :

A. *Adultes.* — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café soit : une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit : une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

B. *Nourrissons.* — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

Indications. — Tous états nauséux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.

Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 14 francs.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas

SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 02-28).

ZYMOSTOL

Vitamine D naturelle sur un support vivant, présentant en même temps des vitamines B et des acides aminés.

Indications. — Toutes déficiences de Calcium, Magnésium et Phosphore, alcaloses, Décalcification, Soudures osseuses, Asthénies, Convalescences, Certaines déficiences glandulaires.

Posologie. — *Ampoules buvables*: Une ampoule de 3 cc. 5 par jour ou tous les deux ou trois jours dans un peu d'eau sucrée ou non, le matin à jeun.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 3 cc. 5.

Prix : 25 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).
(Tél. : Odéon 73-92.)



2^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

avec les adresses de leurs
Fabricants

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 1^{re} partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.

A

- A 313**
 *Abactériol Chabre Frères, Toulon.
 54, bd Jacquemain, Bruxelles.
 *Absinthine Houdé 9, rue Dieu, Paris.
 *Absuric 17, rue de Provence, Paris.
 *Acatar 72, quai Jemmapes, Paris.
 Accessoires d'Électricité médicale 12, av. du Maine, Paris.
 Accod 28, r. de l'Hôp.-Militaire, Lille.
 *Acécoline-Acecolex 52, rue de La Bruyère, Paris.
 *Acécoline camphre 52, rue La Bruyère, Paris.
 *Acécoline Papavérine 52, rue La Bruyère, Paris.
 *Acécoline Spartéine 52, rue La Bruyère, Paris.
 *Acécoline Yohimbine 52, rue La Bruyère, Paris.
 *Acépile 74, rue Monge, Paris.
 Acépyrol Brun 18, rue Saint-Sulpice, Paris.
 *Acéryl J. Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain).
 *Acésine Guillaumin 13 r. Cherche-Midi, Paris.
 *Acétamone 40, rue de Bellechasse, Paris.
 Acétémine 16, av. de la Victoire, Nice.
 *Acéto-Sterandryl 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 Acétosulfol Huerre 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 *Acétylarsan 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Achlorol 110, route de Colmar, Strasbourg.
 Acide oléique P. Thibault 48, rue d'Alésia, Paris.
 (Voir : Oléocidase.)
 Acidural Dupraz 41, rue Étienne-Marcel, Paris.
 Acimyl Monimart 23, rue Grand-Cerf, Meaux.
 *Acobella 191, fg Saint-Antoine, Paris.
 Acodros 62, r. d'Antibes, Cannes (A.-M.).
 Acoégénol Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 *Acolitol 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 *Aconitine Houdé 9, rue Dieu, Paris.
 Acripyoril 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
 Acrisol Clérambourg 10, rue Saint-Antoine, Paris.
 Acticalcine 109, rue de Sèvres, Paris.
 *Acticarbine 149, av. des Minimes, Toulouse.
 *Actiformine 149, av. des Minimes, à Toulouse.
 Actine 60, rue Vieux-Pont-de-Sèvres, Billancourt.
 Actinophore 84, av. de Saint-Mandé, Paris.
 *Actiphos 42, rue Émile-Deschanel, Courbevoie (Seine).
 Actipyrine 9, rue Victor-Letalle, Paris.
 Adénocédran Gruyer, Anizy-le-Château.
 Adénocynésine 10, r. Rabelais, Asnières (Seine).
 *Adénoseptyl E. Dufour, Amplepuis (Rhône).

- Adiploc**
***Adipo-Fugine**
Adipolysine
Adolan
Adolol
***Adonal Vicario**
Adonidine Clin
***Adoverne Roche**
Adragol
Adral
Adréargyre
Adrénaline Aguetant
Adrénaline Byla
***Adrénaline Carrion**
***Adrénaline Choay**
***Adrénaline Clin**
Adrénaline Houdé
***Adrénaline Invar**
Adrénaline Sauba
***Adrénargol**
***Adrénine Mialhe**
***Adrénocalcine**
***Adrénoides Béral**
Adrénol Cortex
Adrénol Total (Voir
Lipoides)
***Adrénoléine**
Adrénolive
Adrénophyséine
Adréno-Styptique Midy
***Adrépatine Laleuf**
***Adréphédrine Béral**
Adrialgine
Adrianine
Adrogestil
Adsorgan
***Aeine**
Aérasthmyl Mossion
***Aérocid**
***Aérocolyl**
Aérol
***Aérophagyl**
***Æsculase**
***Æthone**
Afatyl
Affinex
Agamétol
Agaraffine
***Agarase**
Agardol
Agarham
Agar-Lac
Agarlaxine
***Agarol**
 9, rue Victor-Letalle, Paris.
 2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).
 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
 45, rue du Marché, Neuilly.
 Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 17, bd Haussmann, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 15, rue des Champs, Asnières.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 75, bd de Strasbourg, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 26, av. Observatoire, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 48, av. Th.-Gautier, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 Montreuil-Paris.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 8, rue Favart, Paris.
 L. ADAM, à Granville (Manche).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 107, rue des Dames, Paris.
 107, rue des Dames, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris.
 194, rue de Rivoli, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 6, place des Ternes, Paris.
 6, place Clichy, Paris.
 20, rue d'Angoulême, Cognac.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-Seine.
 19, rue Drouot, Paris.
 12, bd. Saint-Martin, Paris.
 20, bd Heurteloup, Tours.
 35, rue Boissonnade, Paris.
 107, rue des Dames, Paris.
 2, rue des Lombards, Paris.
 Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 58, bd Port-Royal, Paris.
 115, rue de Paris, Boulogne-s.-S.
 58, bd Port-Royal, Paris.
 Cator, r. Huguerie, Bordeaux.
 1, av. Lowendal, Paris.
 AURAL, Combronde (P.-de-D.).
 53, r. du Poinçon, Bruxelles.

- Agaryl Fournier** 7, rue Biscornet Paris.
Aglo 21, r. Cacheux, Boulogne-s.-S.
Agluocol PATRICE, à Vichy.
Agobyl Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
***Agocalcium** 299, rue des Pyrénées, Paris.
***Agocholine Zizine** 24-26, rue de Fécamp, Paris.
Agofluine Delaunay, Joué-lès-Tours (I.-et-L.)
***Agomensine Ciba** 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
Agonal 28, rue de Seine, Paris.
Agonocchine 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
Agonol Cognet 43, rue de Saintonge, Paris.
***Agorenal** 89, rue Martre, Clichy (Seine).
***Agorexine** 37, av. de la République, Paris.
***Ago Sels** Fosset, Montfermeil (S.-et-O.).
Agosthénine 3, pl. Hôtel-de-Ville, Vienne.
Agoxyl 69, rue de Sèvres, Paris.
***Agozymase** 71, av. République, Champigny.
Agrippol SAUBA, Montreuil (Seine).
***Aigue d'Or** 53 bis, bd de la Liberté, Lille.
Aimhepar 29, rue Jean-Perréal, Lyon.
***Airoglyce** 55, rue de Chabrol, Paris.
***Akésol Muzi** 40, quai Jeanne-d'Arc, Chinon.
***Albu-Coli** 84, av. Versailles, Paris (XVI^e).
Albumar 28, rue Marceau, Angers.
Albuplast 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
***Alburénol** Alpha Montreux-le-Château (H.-R.).
Alburol r. Albert-I^{er}, Beaumont-s.-Oise.
Albuvore 49, rue Jacob, Paris.
***Alcachol** 134, av. Parmentier, Paris.
Alcacyl Wander P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
Alcaderma 47, r. de la Boule-d'Or, Remilly (Aube).
Alcadermine 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
Alcala M. Le Floch, Quessy-Cité, (Aisne).
Alcalax 14, av. Perrichont, Paris.
Alcalinase 23, bd Hoche, Saint-Brieuc.
Alcalino-Correctine 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
Alcalino-Gasteryl Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
***Alcalinose** 27, rue Desrenaudes, Paris.
***Alcalisalyl** 35-37 rue, Joinville, Laval.
Alcaloïdes seuls et Labor. Dulcis, place Clichy, Monte-Carlo.
Alcalovules 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
Alcalozal Le Floch, Quessy-Cité (Aisne).
Alcasalyl GATEL, Évron (Mayenne).
Alcasodine 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
Aldhylène 74, rue de Rome, Marseille.
***Aldine** 37, rue de la Fédération, Paris.
Aldogène Carteret 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Aldophène 17, av. de la République, Aubervilliers.
Aldor 39, r. Roger-Salengro, Bondy.
***Alepsal Genévrier** 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
***Alexime** 8, rue Riblette, Paris.
Alfane 3, rue Watteau, Courbevoie.
***Algane** 35, rue de Paris, Clichy (Seine).

- Algarine Nyrdhal**
Algarol
Algatan
Algbiogyl
Algécrine
Algilaxine
Algional
***Algipan Midy**
Algoboldine
***Algocratine Lancosme**
Algocrinol
Algocurine
Algodigestine
***Algoil du D^r Guiraud**
Algolane Poulenc
***Algonal**
***Algophagine**
Algophos

Algoplast
Algosédine
Algosédol
Algosodyl
Algotérine Oliviero
Algovitine
***Algozone**
***Alibourine**
***Alimavéna**

***Aliment Edel**
Alimentine Mory
Aliment Mono
***Aliment Tinardon**
***Alisal**
***Allauroil Lumière**
**Allcock's Porous Plas-
ter**
***Allergantyl Milue**
***Allergine**
***Alliocar**
***Allisatine**
***Allium Coirre**
***Allocaïne Lumière**
***Allochrysine Lumière**
***Allonal Roche**
***Allophaquina**
***Aloïne Houdé**
***Aloplastine**
***Aloysine**
Alpilex
***Alsodine**
Altsara
***Alucol Wander**
***Alunozal**
Alvoricine
***Alzine**
Amalariol
- 12, r. de la République, Puteaux.
 6, rue des Dames, Paris.
 3-9, rue des Alouettes, Nanterre.
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 67, av. Wagram, Paris (XVII^e).
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 86, rue de la Réunion, Paris.
 PONCET, à Limoges.
 5, pl. Francheville, Périgueux
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 37, rue Brochant, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 Fontaine, rue d'Amiens, Com-
piègne (Oise).
 Fournier, Dijon.
 58, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).
 27, r. G.-Teissier, St-Étienne.
 15, rue Corneille, Lille.
 Boulogne-sur-Seine.
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 Lab. Marin, de Pontailac-Royan.
 Lab. B. E. A., Belfort.
 Aliments équilibrés Joly, Bourg-
la-Reine (Seine).
 22, rue des Martyrs, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 7, rue de Sèze, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 191, fg Saint-Antoine, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.

 5, rue de la Paix, Paris.
 2, rue J.-Bara, Paris (VI^e).
 11, rue de Clichy, Paris.
 14, rue des Pyramides, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 45, rue Villon, Lyon.
 10, rue Crillon, Paris.
 3, rue Watteau, Courbevoie.
 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 19, av. d'Orléans, Paris.
 139, rue de Paris, Pantin.
 47, rue Nollet, Paris.
 29, fg de Bourgogne, Orléans.
 151, rue Saint-Maur, Paris.
 P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 Jarmon, 4, pl. de la Gare, Tunis.

- Amandol**
 5, av. des Tilleuls, Paris.
 * **Ambocurine**
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
Amborhinol
 276, rue Lecourbe, Paris.
Ambrine
 48, bd La-Tour-Maubourg, Paris.
 * **Amibiasine**
 69, rue de Wattignies, Paris.
Amicrargol
 177, r. de Courcelles, Paris.
 * **Amidal**
 4, pl. des Vosges, Paris.
Amidon Planche
 2, rue Volney, Paris.
 * **Amido-Septine**
 rue Fred.-Chevillon, Allauch.
 * **Amiflorine**
 PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
 * **Aminoléine**
 72, r. de Bagneux, Montrouge.
 * **Aminophylline Boudier**
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 * **Aminophylline Carena**
 39, bd Latour-Maubourg, Paris.
Amino-Sel Byla
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 * **Amiphédrine**
 6, place Jean-Jaurès, Montrouge.
 * **Amiphène**
 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
Amipyrine
 113, bd Voltaire, Paris.
Ampélamine
 7, rue de l'Arbre-Sec, Lyon.
Ampélicônes
 11, rue La Fayette, Paris.
Ampélidine
 11, rue La Fayette, Paris.
 * **Amphomuth**
 21, bd Riquier, Nice.
 * **Amphoprophyl T. A. B.**
 21, bd Riquier, Nice.
Ampho-Pulvérisateur
 21, bd Riquier, Nice.
Ronchèse
 21, bd Riquier, Nice.
 * **Ampho - Quintivaccin**
 4, av. M.-Berteaux, Poissy (S.-et-O.).
Amphormone
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 * **Amphostabyl**
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 * **Amphosthène**
 21, bd Riquier, Nice.
 * **Ampho-Tablettes Ron-**
chèse
 14, rue Maubanc, Paris.
 * **Amphotonyl Lersam**
 21, bd Riquier, Nice.
 * **Ampho-Vaccins de**
Ronchèse
 21, bd Riquier, Nice.
 * **Ampolases - opolases**
 (Voir Opothérapie
 E. Vergelot)
Ampoules Aguetant
 163, rue de Flandre, Paris.
Ampoules antalgiques
 36, quai Fulchiron, Lyon.
Ophidios
 67, r. de Grenelle, Paris (VII^e).
 * **Ampoules Anti-H.**
 160, av. d'Italie, Paris.
 * **Ampoules Auto-In-**
jectables Acron
 37, r. de la Haie-Coq, Auber-
 villiers.
Ampoules de benzoate
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
et bi-iodure Hg. Vi-
gier
Ampoules bi - iodure
Hg. Midy
 67, av. Wagram, Paris.
 * **Ampoules Boissy**
 SOUDAN, 48, r. d'Alésia, Paris.
Ampoules Cantonnet
 19, rue Drouot, Paris.
Ampoules Cardio -
Camphre (simple et
sparthéiné)
 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
Ampoules Dubé
 177, rue de Courcelles, Paris.
Ampoules Égralène
 157, rue Championnet, Paris.
Brisson
 1, rue de la Martinière, Lyon.
Ampoules « Gay-Lus-
sac »

- Ampoule huile soufrée**
Brisson 157, rue Championnet, Paris.
Ampoules Lemary 36, quai Fulchiron, Lyon.
- * **Ampoules névrosthé-**
niques Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
Ampoules Ophidios 67, rue de Grenelle, Paris (VII^e).
Ampoules Optima Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Ampoules Pentamicros 177, rue de Courcelles, Paris.
* **Ampoules Reipar** DRAPIER, Rethel (Ardennes).
Ampoules Romon 13, av. de Ségur, Paris.
Ampoules Sigmuth 157, r. Championnet, Paris.
Ampoules d'Uriage 15, Champs-Élysées, Paris.
Ampoules V.-E. Dou-
mer
- * **Ampoules Vigor**
- Amunine**
Amybdine
Amyliodine
Amylobromine
* **Amylodiastase Thépé-**
nier
Anacamphre
Anacarboul
* **Anaclasine Ranson**
Anadiposine -
* **Analgénine**
* **Analgésol**
Analgine dentaire
Analgol
* **Analpyrine**
* **Anapeptone Vassal**
Anaphylène
* **Anapyyol**
* **Anaquinine Lescène**
- Anasectol**
* **Anatoxine diphtérique**
- * **Anaural**
- * **Anaxeryl**
* **Androcalcion**
Androcrinol
* **Andro-Gouttes**
Andropolycrinol
Androsthénol
* **Androstine Ciba**
- * **Androvar**
* **Androvules**
Andryl Vicario
* **Anégrine Rivier**
Aneuvryl
Anexol
* **Angéirol**
- BOMEL**, à Annonay (Ardèche).
26, chaussée de la Madeleine,
Nantes.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
44, av. Pasteur, Courbevoie.
163, rue de Flandre, Paris.
163, rue de Flandre, Paris.
- 10, rue Clapeyron, Paris.
37, rue de Bourgogne, Paris.
47, rue Maleret, Bordeaux.
96, rue Orfila, Paris.
FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.
17, rue Cadet, Paris.
24, r. des Plantes, Paris (XIV^e).
4, fg Stanislas, Nancy.
D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
BERTRAND, Nomexy (Vosges).
28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
132, av. Victor-Hugo, Paris.
à Livarot (Calvados) et 58, r. de
Vouillé, Paris.
66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
Institut Pasteur, 36, rue du
D^r-Roux, Paris.
Barthélemy, pl. Forbin, Aix
(B.-du-Rh.).
BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
7, rue de l'Armorique, Paris.
107, rue des Dames, Paris.
107, rue des Dames, Paris.
107, rue des Dames, Paris.
60, rue de Monceau, Paris.
103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
139, r. J.-Jaurès, Maisons-Alfort.
139, r. J.-Jaurès, Maisons-Alfort.
17, bd Haussmann, Paris.
10, pas. Morel, Montrouge (Seine).
71, rue du Fort, Aubervilliers.
Ruell-Malmaison (S.-et-O.).
10, rue du Pont-aux-Chèvres,
Fontenay-le-Comte (Vendée).

- *Angihormol Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
- Angiocholine 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
- *Angiolymphe 4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
- Angionevrol 8, rue Dubrunfaut, Paris.
- *Angiosédine 81, rue de la Roquette, Paris.
- Angiosthénine 5, av. des Tilleuls, Paris.
- *Angioxyl 97, rue de Vaugirard, Paris.
- Angitan 14, av. Mac-Mahon, Paris.
- *Angoral 5, pl. Francheville, Périgueux.
- Angostyl 21, rue de Neuilly, Nanterre.
- Angyl 44, av. Pasteur, Courbevoie.
- Anhémor 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- Anepatox 47, rue Maleret, Bordeaux.
- Anictérol 164, rue St-Honoré, Paris (1er).
- *Aniodol interne et externe 3-9, r. des Alouettes, Nanterre.
- *Ankylosyl 2, place des Vosges, Paris.
- *Anoïde 116, bd Haussmann, Paris.
- *Anorexyl 7, rue de l'Armorique, Paris.
- Anoxyne Gueret, Meung-sur-Loire (Loiret).
- Anozyl 24, rue Jardel, Bordeaux.
- Antacidyl Duret et Rémy, Asnières (Seine).
- Antalgol Dalloz 13, bd La Chapelle, Paris.
- *Antalgyl 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- *Antasthène 54, fg St-Honoré, Paris.
- Antasthme Cibrand 199, av. V.-Hugo, Aubervilliers.
- *Antélobine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Antéparsine Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
- *Antepsal interne A. Clanché, Vars (Charente).
- *Anthema 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Anthiomaline 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Anthracalcine SAUBA, Montreuil.
- *Anthraseptol BAUDE, Saint-Aubert (Nord).
- Anthraxone 11, ch. de la Muette, Paris.
- Anthylline 88, rue Duhesme, Paris.
- *Antialgos Christiaens 4, rue Colbert, à Reims.
- Anti-anémique F. F. 163, rue de Flandre, Paris.
- *Anti-Asthénie Lauriat 31, av. Foch, La Garenne-Colombes (Seine).
- Anti-asthmiques du Lab. du D^r CLÉRY, 53, bd Saint-Martin, Paris.
- Anti-asthmatique du D^r Hallay 36, rue Eugène-Carrière, Paris.
- *Antiasthme Bengalais Fagard, Lons-le-Saunier.
- Anti-asthme Noirot Vesoul (Haute-Saône).
- *Anti-Asthmine 50, rue Nationale, Lille.
- Antibillieux Fuzor 46, rue Pierre-Charron, Paris.
- Antibronchitique 22, fg Saint-Michel, Angers.
- Anticolibacillaire 14, r. de Normandie, Asnières.
- Anticonvulsif Kraus 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
- *Anti-diabète H Alpha, Montreux-le-Château (H.-Rh.).
- Anti-dermite 4, rue de Metz, Toulouse.
- Antidiabétique Midy 67, av. de Wagram, Paris.
- *Antidiabétique Monavon 14, rue Victor-Hugo, Lyon.

- * **Antidiabétique Requis** 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 * **Antidol Leroy** Lamalou-les-Bains (Hérault).
Antidolor 72, av. Thiers, Le Mans.
Antidotase " ANGLA ", Monte-Carlo.
Antidote-malaria 36, quai Fulchiron, Lyon.
Antidouleur Barbessou 10, allées Damour, Bordeaux.
 * **Anti-Floculine** 2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).
Antifluor 26, r. des Petits-Champs, Paris.
Antifuronculeux DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
Antigastralgique
 Winckler 67, av. de Wagram, Paris.
Antigel 18, rue de Beaune, Paris.
Antigélures 72, av. Thiers, Le Mans.
 * **Antigénines** 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
Antiglaire Forézen 62, rue Marengo, St-Étienne.
Antiglairol Castellane, Morteau (Doubs).
Antigonn RX 8, rue Dubrunfaut, Paris.
Antigonol 26, r. des Petits-Champs, Paris.
Antigrippal Demay 42, rue des Martyrs, Paris.
 * **Antigrippine Midy** 67, rue de Wagram, Paris.
Antikamnia 5, rue de la Paix, Paris.
Anti-kokytine 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
Antimucose Mariani 41, bd Haussmann, Paris.
Antimycose 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Antinéase Salavert, Ste-Foy-la-Gde (Gir).
Antinerveux Lesourd 88, rue Duhesme, Paris.
Antipaludique 18, av. Hoche, Paris.
Antipaludique Lumière 45, rue Villon, Lyon.
Antiphi CAPIN, Roquefort (Landes).
 * **Antiphlogistine** 11, r. Collange, Levallois (Seine).
Antiphymase Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
Antiphymique Nomss 88, rue Duhesme, Paris.
Antiphymique Vadam 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 * **Antipiol** 8, av. Walkanaer, Nice.
Antipsorine 14, rue A.-Briand, Levallois.
Antipur 121, av. de St-Ouen, Paris.
Antipyrine effervescente Le Perdriel 11, rue Milton, Paris.
Antipyrine U. R. 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Antirhumatismal Nuder 16, bd des Filles-du-Calvaire, Paris.
 * **Antirrhoïde Bélières** 19, rue Drouot, Paris.
 * **Antisciatique** CHAMBON, pl. Francheville, Périgueux.
Antiseptinol Baron, Sables-d'Olonne (Vendée).
 * **Antiseptoma** L. Robert, pharmacien à Niort.
Antispasmyl 30, bd Raimbaldi, Nice.
Antisuce FERCOCOQ, La Varenne-St-Maur (Seine).
Antityphique T. B. 14, r. de Normandie, Asnières.
 * **Antiurique de Con-trexéville** 222, bd Pereire, Paris.
 * **Antivirus** 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 * **Antivirus Probios** Voir : Probios.
Antixénol 74, r. de Lourmel, Paris (XV^e).
Antodyne Poulenc 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Antonal 2, quai Paul-Bert, Tours.

- Anturic Labesse** 38, rue des Lices, Angers.
Anucalm 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
Anuidol 62, av. de Paris, Villejuif.
Anuline 10, rue de l'Union, Clichy.
***Anurique Duplex** Dreyer-Dufer, Nogent-s.-Marne.
***Anusol** 13, r. Pagès, Suresnes, et 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
Anytal Brisson 157, rue Championnet, Paris.
***Anxiol** Falvy, 40, r. des Acacias, Paris.
Anxiosédine 74, fg d'Ambrail, Épinal.
Anxyl 4, av. M.-Berteaux, Poissy.
Anytal Brisson 157, r. Championnet, Paris.
***Aortol** 16, bd des Filles-du-Calvaire, Paris.
Apaisyl 133, rue Lecourbe, Paris.
Apaludol AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
***Aphloïne** 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
***Aphosal** 48 bis, av. Mozart, Paris.
Apiol PALC, Messigny (Côte-d'Or).
***Apioline Chapoteaut** 8, rue Vivienne, Paris.
Apioline Houdé 9, rue Dieu, Paris.
***Apiol Tanit** Rouanet, Antibes (A.-M.).
***Apivène** 39, r. Claude-Bernard, Paris (V^e).
Aplexil 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Apocynine du D^r Des-champs Laleuf, 51, rue Nicolo, Paris.
Appareils faradiques 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
Appareils galvaniques 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
Appareils galvano-faradiques 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
Appareils de haute fréquence 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
***Appareil Lancelot** 100 ter, av. de St-Mandé, Paris.
Appetonyl 27, r. G.-Teissier, St-Étienne.
***Appetyl** 37, av. de la République, Paris.
Aprol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
***Apsophol** 40, rue des Carmes, Orléans.
Apyrexine Optima 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Aquasoluble 16, rue Ficatier, Courbevois.
***Aquintol** 8, rue Favart, Paris.
Arachise 19, rue Drouot, Paris.
***Arapal** 5, rue Paul-Barruel, Paris.
Arcanan CRUET, 13, rue Miollis, Paris.
Archésine Trouette-Perret 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
***Arcica** 84, rue Rochechouart, Paris.
Ardogène 9, rue du Temple, Enghien.
Argent-Boulard 82, av. de Suffren, Paris (XV^e).
Argent colloïdal électrique Maronneau-Morel, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Argent colloïdal Nyr-dhal 12, r. de la République, Puteaux.
***Arg-Eph** 6, place des Ternes, Paris.
Argolacta 140, rue Lamarck, Paris.
Argolion 18, avenue Hoche, Paris.
Argolène Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Argostyl 21, rue de Neuilly, Nanterre.

- Argy
 *Argybil
 Argycarbonate
 *Argycuprol
 *Argyrescine Mars
 Argyrex
 *Argyrine
 *Argyrophédrine
 *Argyseptine
 *Arhémapectine Gallier
 *Arhéol Astier
 *Arhine Lambiotte Fr.
 Arhinoline
 *Aristargol
 Aristoplat
 *Aristoplastic (aristoplat élastique)
 *Arkébios
 *Armanite
 Armosine
 Aromalt
 Aromoka R. U. F. É.
 *Arquéritol
 *Arrhéнал Adrian
 Arrhéналitine Bureau
 Arrhéaniques Clin
 Arrhéномartiол Clin
 Arrhéно-Splénine
 *Arrhénuclène Bergevin
 Arron-root
 Arsallyl
 Arsallyl iodé
 *Arsaminol Clin
 Arsébényl Meurice
 Arsécrinol Lersam
 Arsenic Organique
 Glasser
 *Arséniode Buriat
 Arsénobenzènes Clin
 Arséno-fer Henry
 Arsénogéyl
 *Arsénomyl
 *Arsénos-Solvant
 Arsétonyl
 *Arshémo-Fer-B
 Arsiodyle
 Arsiquinine Lemaitre
 Arsi-quinoforme
 Arsi - Strychnal Longuet
 Arsocléine
 Arsycodeyle Leprince
 Arsyène Roche
 Arsynal Legrand
 Arsyserum
 *Artériocrinol
- 133, rue Lecourbe, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 96, rue Lafayette, Paris (Xe).
 4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
 Guérande (L.-Inf.).
 7, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 26, rue Chaptal, Paris (IXe).
 20, av. Jean-Jaurès, Suresnes.
 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 42, rue du Dr-Blanche, Paris.
 20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
 9, rue de la Gare, Levallois.
 9, rue de la Gare, Levallois.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 3, av. Daumesnil, Paris.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 139, rue des Pyrénées, Paris.
 54-56, av. République, Paris.
 LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 6, rue Mathilde, Courbevoie.
 à Châteaudun (Eure-et-Loir).
 BLOCH, Tomblaine, près Nancy.
 8, rue Dubrunfaut, Paris.
 8, rue Dubrunfaut, Paris.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 14, rue Maublanc, Paris.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 37, rue Spontini, Paris (XVIe).
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 6, pl. de Breteuil, Paris.
 Mouneyrat, Villen.-la-Garenne.
 19-21, rue Van-Loo, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 H. BENOIT, Poligny (Jura).
 Chassaigne, Ruffec (Charente).
 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
 37, rue Pajol, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 Châtelain, Niort (Deux-Sèvres).
 62, rue de la Tour, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
 46, rue de Rome, Marseille.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).

- *Artériolex (ou Miné-
ralogène)
- *Artérion Vincardi
- *Artério-Phan
- *Artérioveinine
- Artérol
- Arthri-Biose
- Arthricétol
- Arthrident
- Arthridol
- *Arthrilax
- *Arthrilyse
- Arthri-sel
- Arthritose
- Arthrizol
- Arthrolyl
- Arthrosédol
- Artichaut Rosa
- *Articholine
- Artil
- Artobyl
- Artoradine
- *Artrex-Croz
- *Artrocolchine " C "
- *Arvensyl
- Arzonil
- Ascabiol
- *Ascéine
- *Asciatine
- Ascle
- Asclérogénol
- *Ascoléine Rivier
- Aséphéine
- Aseptampoules Du-
- mesnil
- Aseptobiline
- Aseptocarbine
- Aseptoline Freysse
- *Aseptone
- Aseptophédrine
- Aseptopoudre
- Aseptoradol
- *Aseptorhine
- Aseptovules
- Asepturine
- Asepturol
- Asfarol
- *Asmocrine
- Aspiphane
- Aspirine Lafran
- Aspirine U. R.
- Aspirine Vicario
- Asquirol Poulenc
- Astasol Douetteau
- *Asthma
- 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
- 14, av. G.-Clemenceau, Nice.
- 5 bis, bd des Italiens, Paris.
- 121, av. St-Ouen, Paris.
- PESLIN, Planchez du Morvan
(Nièvre).
- 78, bd Batignolles, Paris.
- 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Fercocq, la Varenne-St-Maur.
- 21, rue de Neuilly, Nanterre.
- Lyons, 30, rue Monge, Paris.
- 17, rue Chomel, Paris (VII^e).
- 22, rue Morere, Paris.
- La Biomarine, à Dieppe (S.-Inf.).
- Delaunay, Joué-lès-Tours.
- 11, rue Lafayette, Paris.
- 15, rue Corneille, Lille.
- 11, rue Roger-Bacon, Paris.
- 7, rue Sainte-Isaure, Paris.
- 14, rue Demarquay, Paris.
- pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes.
- 25, rue Vaneau, Paris.
- 7, rue Sainte-Isaure, Paris.
- 92, rue Bobillot, Paris.
- 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
- 143, Gde-Rue Guillotière, Lyon.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 133, rue Lecourbe, Paris.
- 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- 10, passage Morel, Montrouge.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 10, rue du Plâtre, Paris.
- 71, rue Ste-Anne, Paris.
- 38, rue du Louvre, Paris.
- 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
- 50, r. République, Puteaux.
- 8, rue Dubrunfaut, Paris.
- 46, rue de Rome, Marseille.
- 33, rue Saint-Jacques, Paris.
- 21, rue de Lyon, Paris.
- 46, rue de Rome, Marseille.
- 30, rue Saint-Jacques, Namur.
- 86, bd Port-Royal, Paris.
- 14, av. Perrichont, Paris.
- 122, Champs-Élysées, Paris.
- 26, rue Ste-Claire, Mulhouse.
- 8, rue de Prague, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 17, bd Haussmann, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 20, fg St-Honoré, Paris.
- 94, rue Michelet, Alger.

- Asthmacidine**
Asthmalène
Asthmapepton
Asthmaphédrine
- *Asthmasédrine**
Asthmatyl
***Asthmédrine**
Asthmenthol
***Asthmo-Actine**
Asthmolène
***Asthmolysin**
Asthmor
- *Asthmosine**
Asthmyl
- Asthmylose**
Astmavol Reys
***Atalante**
***Atébrine**
***Atens**
Atensyl
Athérolysine
Atihal
Atlasantol
***Atocrazine**
Atolysan
- *Atomine**
Atonos
Atophan Cruet
Atophanyl
***Atoquinol Ciba**
- *Atospirine**
Atouxin RX
Atrabiline Gory
Atropophédrine
Attaches Néoplastex
***Atural**
Atussol
***Aubéliode**
Aubémone
***Audigénine**
Auriculine
Aurion
***Aurixéma**
Autogénol
Auto Inhalation Legras
Auxergyl
Avantol
Avistyl
Axonal
***Axyol**
***Azama**
- Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**
3, rue de Vouillé, Paris.
Mauchant, Gennevilliers.
Lab. Optima, 78, Gde-Rue-aux-Bois, Bruxelles.
17, rue Chomel, Paris (VII^e).
38, rue du Louvre, Paris.
19, av. Secrétan, Paris (XIX^e).
33, fg Montmartre, Paris.
BERTHON, à Dornes (Nièvre).
3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
92, rue Bobillot, Paris.
88, av. J.-B.-Clément, Boulogne-s.-Seine.
3, rue E.-Burgault, Vannes.
9, bd de la République, Noisy-le-Sec.
2, rue Lesdiguières, Paris.
21, rue de la Gare, La Broque.
9, bd Malesherbes, Paris.
(Voir: Quinacrine.)
92, rue Bobillot, Paris (V^e).
17 bis, av. Parmentier, Paris.
41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
Lab. Demasles, Vienne (Isère).
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
2 bis, place des Vosges, Paris.
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
97, r. J.-d'Arc, Rouen (S.-Inf.).
13, r. Miollis, Paris (XV^e).
13, rue Miollis, Paris.
103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
19, rue du Bac, Paris.
8, rue Dubrunfaut, Paris.
JOOSS, Montreuil (Seine).
CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
71, fg St-Martin, Paris (X^e).
10, rue de Strasbourg, Paris (X^e).
56, rue St-Lambert, Marseille.
60, r. Nationale, Castelnaudary.
3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
VAILLANT, 16, r. Jacob, Paris.
21, rue de Lyon, Paris.
18, av. Hoche, Paris.
11 bis et 13, r. Levert, Paris.
57, rue Edgar-Quinet, Nantes.
28, rue Monge, Dijon.
89, rue du Cherche-Midi, Paris.
20, rue des Écoles, Paris.
11, rue Lepic, Paris.
20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).
Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
2, rue St-Martin, Paris (IV^e).

- *Azigol 81, r. des Roses, Dijon.
- *Azotyl 25, rue Jasmin, Paris.
- *Azufrol 18, av. Hoche, Paris.
- *Azym 28, r. Guibal, Marseille.

B

- *Babeure Dardelet Bonnard (Yonne).
- *Babeurre Guigoz 2-4, rue Catulle-Mendès, Paris.
- Babeurre Lactella à Tourcoing.
- *Babeurre Nestlé Élé- 6, av. César-Caire, Paris (VIII^e).
- don 1, bd Saint-Martin, Paris.
- *Babeurre Nutricia
- *Babeurres Carrion- 5, rue du Capitaine-Scott, Paris.
- Lagnel Ferme de « La Faye ». Marlies
- *Babeurres La Faye (Loire).
- *Babeurres Molard 25, cours Lafayette, Lyon.
- Babutyrose 59, bd Gambetta, Tourcoing.
- Baby-Bala Brichard et fils, Bar-le-Duc.
- Babydermine 14, av. Perrichont, Paris.
- Baby-Ossine Billy-Montigny (Pas-de-Calais).
- Babysanine 37, r. du Vieil-Abreuvoir, Rou-
baix (Nord).
- Bacilacrine 50, r. de la République, Puteaux.
- Bacilactine 50, r. de la République, Puteaux.
- Bacillactine Nutricia 142, rue Fransman, Bruxelles.
- *Backérine 4, pl. des Vosges, Paris.
- *Bacté-Coli-Phage 1, av. de Villars, Paris.
- Bcté-Dysentéri-Phage 1, av. de Villars, Paris.
- *Bacté-Intesti-Phage 1, av. de Villars, Paris.
- Bacté-Phages 1, av. de Villars, Paris.
- *Bacté-Pyo-Phage 1, av. de Villars, Paris.
- *Bacté Rhino-Phage 1, av. de Villars, Paris.
- *Bacté-Ricyl 72, r. du Commerce, Paris (XV^e).
- *Bactériophages Probios Voir : Probios.
- *Bacté-Staphy-Phage 1, av. de Villars, Paris.
- Bactioxyné 15, rue d'Argenteuil, Paris.
- *Bacturyl 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
- Bagnolax Morellet, Bagnoles-de-l'Orne.
- *Bains Bagnor radioactif 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- Bains Brimox BRIMONT, 74, r. Blanche, Paris.
- Bains carbogazeux de Royat Royat (Puy-de-Dôme).
- *Bains carbogazeux Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- Wolo

*Bain Carré
Bain de bouche du
D^r A. Boll

*Bain de bouche à la
Duna-caine

*Bain de bouche Estève

*Bain de Royan Varech

Bain Fagard (Sulfador)

*Bain Flévar

*Bain Salvia

Bains médicamenteux

Bainsulphium

Bakolyse

*Baldisedan

*Ballotyl

*Balmiga

*Balnéradol

*Balsaformine

Balsaine

Balsamiode

*Balsamol Lescène

*Balsamorhinol

Balsaniodol

*Balsaquintine

Balseptol

*Balsoforme

*Balsofumine

*Balsorhine (Huile, Cap-
sules, Pommade)

Balsosantol

Balsurol

*Bandes crêpe Néoplas-
tex

*Bandes Mérinos Bébé

Bandes ulcérophiles
Nozan

*Barbiflorine

*Barcan

*Bardane stabilisée
Dausse

Bardanyl

Barkyl

Baromyl

*Barytol

*Baryx-Colloïdal

*Basedowine

*Basmyl

*Baume Adol

Baume Agerca

Baume Apard

*Baume Aroma

*Baume D^r Baissade

*Baume Bengué

*Baume Berthelot

71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.

7, av. du Doyenné, Lyon.

17, rue de Berri, Paris.

187, r. de la Croix-Nivert, Paris.

Lab. Marin, Pontailiac (Ch.-Inf.)

Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).

22, rue de la Sorbonne, Paris.

139, av. Émile-Zola, Paris.

199, rue Saint-Denis, Paris.

157, rue Championnet, Paris.

122, rue du Cherche-Midi, Paris.

133, rue Lecourbe, Paris.

113, bd Voltaire, Paris (XI^e).

127, bd Saint-Michel, Paris.

25, rue Friant, Paris.

42, r. Émile-Deschanel, Courbe-
voie (Seine).

156, av. Victor-Hugo, Paris.

19, cours Morand, Lyon.

à Livarot (Calvados), et 58, rue
de Vouillé, Paris.

Fides, 14, r. de la Comète, Paris.

10, rue Washington, Paris.

58, rue de Vouillé, Paris.

23, rue des Moines, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

22, rue Turbigo, Paris.

22, rue Turbigo, Paris.

39, rue Fondaudège, Bordeaux.

16 bis, rue Dufresnoy, Paris.

Voir: Néoplastex.

3r. des Reculettes, Paris (XIII^e).

6, ter, rue Voltaire, La Garenne-
Colombes.

"ANGLA", Monte-Carlo.

79, rue de Paris, St-Denis (Seine).

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

102, av. Michelet, Saint-Ouen.

30, rue Bobillot, Paris.

2, rue Chevalier-de-la-Barre,
Saint-Quentin.

184, route de Genas, Lyon (III^e).

1, r. de Paris, Limours (S.-et-O.).

38, bd Montparnasse, Paris.

A. Bouchand, Melle (D.-Sèvres).

78, c. de la Liberté, Lyon.

30, rue Bobillot, Paris.

27, bd de Courtais, Montluçon.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

St-Loup, Marseille (B.-du-R.).

16, rue Ballu, Paris (IX^e).

Saint-Ouen d'Aumône (S.-et-O.).

- Baume D^r Blancard
 Baume Boeglin
 Baume Chiron
 Baume Coqueluchyl
 *Baume Crésa
 Baume Dalet
 Baume Darnoe
 *Baume Delacour
 Baume de Dentition
 Baume de la Faculté
 Baume de l'Échalp
 Albert
 Baume Dolora
 Baume Dulac
 *Baume Duret
 Baume Flozo
 Baume Fuba
 Baume Géluro
 Baume du D^r Gigon
 *Baume Heptalgine
 Baume Iki
 *Baume Kalendol
 Baume Kamol
 *Baume Lartigol
 Baume Lorol
 Baume Marta
 *Baume de la Maternité
 Baume Merveilleux
 Baume Oco
 Baume Oculaire Alpha
 *Baume Panthésine
 Baume Pélévine
 Baume de Port-Royal
 Baume Py
 Baume des Pyrénées
 *Baume Rafax
 *Baume Rhodia
 Baume Robernard
 *Baume Robur
 Baume Saint-Antoine
 Baume Saint-Roch
 *Baume Selenia
 Baume du D^r Serin de
 Gaillac
 Baume Suelta
 Baume Tanex
 *Baume Thomas
 Baume Trisalyl
 Baume Valentin-Chail-
 lot
 Baume Vêrandy
 Baume Victor
 Baume Zénopal
 *Baumix
- 114, av. Jean-Jaurès, Paris.
 26, rue Ste-Claire, Mulhouse.
 Mougnaud, Longjumeau (S. et O.).
 38, rue du Louvre, Paris.
 2 bis, place des Vosges.
 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 Hubert, Romorantin (L.-et-C.).
 56, bd Pereire, Paris.
 32, fg Montmartre, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 Lab. Géha, Port-de-Bouc, près
 Marseille.
 50, r. de la République, Puteaux.
 55, av. des Écoles, Cachan.
 20, rue Saint-Lazare, Paris.
 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 37, rue des Lois, Toulouse.
 35, av. de Versailles, Paris (XVI)
 25, bd Beaumarchais, Paris. *).
 Berthoumeyroux, Souillac (Lot).
 MERCIER, Fécamp (S.-Inf.).
 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
 6, rue Ad.-La Lyre, Courbevoie.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Zedaire, à Grenoble.
 Bonnaure, à Alès (Gard).
 7, rue Galvani, Paris.
 6, pl. de Breteuil, Paris.
 87, rue Lafayette, Paris.
 Montreux-le-Château (Ht-Rhin).
 20, rue Vernier, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
 58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
 Chalet du Rêve, Bayonne.
 4, rue Boulard, Paris (XIV^e).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Pharm. Moderne, r. V.-Hugo,
 Mauléon-Soule (B.-Pyrénées).
 72, av. Thiers, Le Mans.
 4, avenue de Bayonne, Pau.
 place Forbin, Aix-en-Provence.
 49, rue de Bitche, Courbevoie.
 10, allées Damour, Bordeaux.
 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
 33, fg Montmartre, Paris.
 14, r. des Minimes, Paris.
 10, Square de Châtillon, Paris.
 G. Laurens, Aix-en-Provence.
 Pelaud et Bayle, La Courtine
 (Creuse).
 Miribel (Ain).
 Delaprée, Mortagne (Vendée).

- *Baumolacpinine
- *BB Derm Mars
- *Béatol
Béarnyl
- *Bécalciol « Mètère »
- *Bédénal
- Beef Lavoisier
- *Beef Lavoix
- *Bégessol
- Belanesie
- *Belcarmine
- *Belhémine
- *Belladenal
- Belladoforme
- *Belladone Dausse
- *Bellafoline
- *Bellasodine
- *Bellergal
- *Bellinguol
- Belvuline
- *Bemax
- Bémecé
- Benedictus (Produits)
- *Bénerva Roche (Vit B¹)
- Bengouté
- *Bensamine
- Benzethanopneumol
- *Benzethol
- Benzhermyl
- Benzoate de Folliculine
- Benzoate Le Perdriel
- Benzoate de Naphtol
- *Benzo-Bismuth Millot
- Benzobromine
- Benzocalyptol
- Benzocarbène
- *Benzoflorine Julien
- *Benzo-Gynœstryl
- *Benzo-Gynœstryl 5
- *Benzo-iodhydrine
- Benzolactine
- Benzo-Lactol
- Benzo - phosphine
- Christiaens
- *Benzoquinol
- Benzo-Ringyl
- *Benzosulfène
- Benzothymol
- Benzyanyl
- *Benzylcalcium
- Benzylol
- Berkendyl
- Berralgine
- Béryline du D^r Fayès
- *Bétul-Ol Midy
- *Bévita
- Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- Guérande (Loire-Inférieure).
- 25, rue Jasmin, Paris.
- à Salies-de-Béarn.
- 24, bd J.-Jaurès, Boulogne.
- Voir : Névrovitamine 4.
- Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- 222, bd Pereire, Paris.
- Lab. Lorrains, Étain (Meuse).
- 47, r. de Bretagne, Paris (III^e).
- 33, Gde-Rue, Besançon.
- 3, imp. Adam, Boulogne-s.-S.
- 20, rue Vernier, Paris.
- 14, av. Perrichont, Paris.
- 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- 20, rue Vernier, Paris.
- 13, Gde Rue, Herblay (S.-et-O.).
- 20, rue Vernier, Paris.
- 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
- 4^{ter}, rue Barbès, Courbevoie.
- 21, rue Violet, Paris.
- 17, rue Duguay-Trouin, Paris.
- 10, rue Crillon, Paris.
- 55, r. de Chabrol, Paris.
- 72, quai Jemmapes, Paris.
- 84, rue du Commerce, Ville-neuve-le-Roi (S.-et-O.).
- 79, r. de Paris, St-Denis (Seine).
- 36, quai Fulchiron, Lyon.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 11, rue Milton, Paris.
- 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
- 177, r. de Courcelles, Paris.
- 14, pl. Hôtel-de-Ville, Beauvais.
- 213, rue St-Honoré, Paris.
- Fouchère, Rive-de-Gier (L.).
- 105, rue de Rennes, Paris.
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- 10, passage Morel, Montrouge
- 38, rue Albouy, Paris.
- 10, rue du Parc-Royal, Paris.
- 4, rue Colbert, Reims.
- 25, rue de Calais, Dunkerque.
- 35, rue Boissonade, Paris.
- 62, av. Ph.-Auguste, Paris.
- 50, r. de la République, Puteaux.
- 37, rue de Bourgogne, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 37, rue Galilée, Paris.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- Noirot, Vesoul (Haute-Saône).
- 199, rue Saint-Denis, Paris.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 7, r. Fontaine-Delsaux, Lille.

- *Bévitine 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Bexinine L. Colin, 19, r. St-Jean, Caen.
- Bexoforme 43, rue Beudant, Paris.
- Bi-98 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Bi-Actival 49, r. du Château-d'Eau, Paris.
- Bianterol 37, r. Tivoli, Bordeaux.
- Bi-As Aguetant 36, quai Fulchiron, Lyon.
- *Biazan 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
- Bi-Carbène 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
- Bichlorhydrol 14, av. Perrichont, Paris.
- Bichlorone Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
- *Bi-Ci-Pa 62, r. du Gros-Noyer, Ermont.
- *Bi-Citrol Marinier 23, rue Ballu, Paris.
- Bicolyre 276, rue Lecourbe, Paris.
- *Bières des Nurses Bourg-la-Reine (Seine).
- Bière Fanta (nourrices) 77, route d'Orléans, Montrouge.
- Bifermments lactiques 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine (Nord).
- *Bifidigène 22, rue Pigalle, Paris.
- Bigonor 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
- Bigynol 54, rue de Paris, Charenton.
- Bi-Iodural Novat BOMEL, à Annonay (Ardèche).
- Bi-iodure Gros 12, rue de Nice, Paris.
- Bi-iodure Domergue 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Bi-iodure Midy 67, av. de Wagram, Paris.
- Bikréol 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
- *Bilaxyl 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- Bilentéric 112, rue de Gerland, Lyon.
- Bilexabol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- *Bileyl Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
- Bil-Flux 42, bd St-Marcel, Paris.
- *Biliase Raby à Asnières (Seine).
- *Biliboldo Barthélemy, pl. Forbin, Aix.
- Bilichlorine 8, rue Dubrunfaut, Paris.
- *Bilicrinol Lab. Demasles, Vienne (Isère).
- *Bilifluine 2 bis, place des Vosges, Paris.
- *Bilifluol 20, rue de Rivoli, Paris.
- Bili-Magnétol 58, r. de Maubeuge, Paris.
- *Biliogastrine Chevillon 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
- Biliol Bouty 3, rue Dunkerque, Paris.
- Bilirhéine 41, rue Étienne-Marcel, Paris.
- *Bilivaccins 5, rue Paul-Barruel, Paris.
- *Bilivaccin Anticolibacillaire 5, rue Paul-Barruel, Paris.
- *Billabstine 117, rue de Belleville, Paris.
- Billeros 33, rue Rennequin, Paris.
- Billirgyl 30, rue Miromesnil, Paris.
- Bilogène Reys 21, r. de la Gare, La Broque (B.-R.).
- Bil Soda 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
- Biminéral Reynaud Durand, à Aigues-Mortes.
- *Binidia 145, bd Haussmann, Paris.
- Binol Roger 177, bd St-Germain, Paris.
- *Binoxol 145, bd Haussmann, Paris.
- Biocalcine 2, rue des Lombards, Paris.
- *Biocalcion 50, av. Jacqueminot, Meudon.
- *Biocalcium 50, rue Nationale, Lille.

- Biocalcose**
Biocalmine
***Biocalyptol**
Biocatalyseur-Rolland
***Biocéane**
***Biocholine**
***Biocrina**
Biocrine
***Biodarcine**
Bioderma
Biodermyl Monal
***Biodynamine**
Biodynol
***Bioélixir**
***Bioentérase**
Bioforcil
Bioforgine
Biogastrine
***Biogastrol**
***Biogénol**
***Biolactyl Fournier**
Biolax
***Biolipase**
Biomagnésium
***Biomucine**
Bionéol
Bionergyil
Bionine
Bionucléine
***Bio-Organic**
Biopausine
***Biophène**
***Biophényl Rosso**
***Biophorine Girard**
Biophosphine
Biophosyl
Biophylactine
***Biophytol**
Bioplasmyl
***Bioplastine**
Biopulmol

***Biorégine**
Biorénine
Bio-Rob
Bio-Sel

Biosérine
***Biosérum**
Biosine Le Perdriel
***Biosodine**
Biosthène
***Biosulfol**
***Bio-Titane Prima**
***Biotone**

***Biotrigon**
- 52, rue Labruyère, Paris.
 50, route Nationale, Lille.
 76, rue Jean-Jaurès, Paris.
 85, r. V.-Hugo, Levallois-Perret.
 Oliviéro, à Boulogne-sur-Seine.
 1, av. de Villars, Paris.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 122, fg St-Honoré, Paris.
 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
 Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
 13, av. de Ségur, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
 160, av. d'Italie, Paris.
 69, r. de Wattignies, Paris.
 1, r. des Augustins, Perpignan.
 Pruvot Forges-les-Eaux (S.-Inf.).
 1, bd Henri-IV, Paris.
 12, rue Pavée, Paris.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 7, rue Biscornet, Paris.
 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
 20, fg Saint-Honoré, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 14, r. de Périgueux, Angoulême.
 16, rue Saint-Gilles, Paris.
 Lecronier, Domfront (Orne).
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 160, av. d'Italie, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 63, rue de Charonne, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Dépouilly, Le Creusot.
 Bertrand, Nomexy (Vosges).
 116, av. Berthelot, Vienne.
 Bouyssou, Chambois (Orne).
 2, r. N.-Dame, Guingamp (C.-du-N.).
 25, r. Dagorno, Paris (XII^e).
 Termes, Miramont-de-Guyenne
 (L.-et-G.).
 Chambron, Portes (Drôme).
 12, rue Pavée, Paris.
 Delaunay, Joué-lès-Tours (L.-et-L.).
 M. Desolmes, Le Cannet-Ro-
 cheville (A.-M.).
 63, cours Victor-Hugo, Lyon.
 8, rue Saint-Martin, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 191, rue St-Honoré, Paris.
 3, rue des Reculettes, Paris.
 r. Fréd.-Chevillon, Allauch (B.-
 du-R.).
 22, r. Perceval, Paris.

Biovigorine	6, rue du Colonel-Renard, Paris.
Biovital	7, r. de la République, Puteaux.
*Bioxyol	Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
Biozol	25, rue Drouot, Paris.
*Biphédrine	47, rue de Bretagne, Paris.
Biquinyl Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.
Bi-Ricin	72, route de Châtillon, Malakoff.
Bisalicylate	Lab. du Gastrocarbone, Saint Louis (B.-du-R.).
Bisalyl	41, av. Joffre, La Garenne.
Bicamph	55, av. des Écoles, Cachan.
Biscols Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
Biscopaks Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Biscottes Delft	45, r. Grande-aux-Belles, Paris.
Biscottes Grégoire	24, r. du Bois, Clichy (Seine).
Biscottes Heudebert	85, rue St-Germain, Nanterre.
Biscottes et Biscuits	
Nutricia	142, rue Fransman, Bruxelles.
Biscottes Redeuil	7, rue Couche, Paris (XIV ^e).
Bisermol	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
*Bis-Hyd	45, r. du Marché, Neuilly-Paris.
Biskalose	Hosselopp Grandadam, Buhl (B.-Rh.).
*Bis-ka-ma	15, r. des Champs, Asnières.
Bismétine Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Bismhydral	71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
Bismint	2, rue Paradis, Paris.
Bismogénol	8, r. Lafayette, Paris (IX ^e).
Bismogyre	2, allées de Chelles, Le Raincy.
*Bismokaol	7, rue de la République, Puteaux.
Bismucarbonate	7, Petite Place, Douai.
*Bismullium	St-Saturnin-les-Avignon (Vaucluse).
Bismupaine	194, rue de Rivoli, Paris.
*Bismusodine	3, rue Royet, Lyon-Caluire.
Bismutartrol	6, pl. de Breteuil, Paris.
Bismuth Adler	36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
*Bismuth Adrian	9-11, rue de la Perle, Paris.
*Bismuth B3	5, bd des Brotteaux, Lyon.
*Bismuth (Crème de)	5, rue d'Angoulême, Paris.
*Bismuth Desleaux	71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
Bismuthine	LOGEAY, Le Langon (Vendée).
*Bismuthion	18, av. Hoche, Paris (XVI ^e).
*Bismuthoidol Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Bismuth Perroud	7, rue des Archers, Lyon.
*Bismuth Pointet Girard	(Voir: Novismuth.)
Bismuth Terrial	22, rue de la Bienfaisance, Paris.
*Bismuth Tulasne	48, bd des Batignolles, Paris.
Bismuth 25	Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Bismuthyl « Meurice »	61, av. Louise, Bruxelles.
Bismuxyl RX	8, rue Dubrunfaut, Paris.
Bi-So-Dol	36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
Bissine	St-Hilaire-des-Loges (Vendée).
*Bissyl	117 ter, rue Ordener, Paris.

- Bistan**
***Bistomax**
Bitonine
Bituyol
***Bivatol**
Bivigor
Bladérol du D^r Jenrout
***Blagny (sirop, gouttes, dragées)**
Blastéase
Blécao Jacquemaire
***Blédine Jacquemaire**
***Blennopiat**
Blennoradine
Blennosine Fornet
Blennotoxyl
Blénosédol
Bleumyl 5 et 10
Blimal
***Blocs Vécór**
Blokao
Bluetine
***Blüyl**
Bokanol
Bolcitol
Boldagar
***Boldine Houdé**
Boldine Plagnol
Boldine Verne
Boldo-Basma Palc
Boldo-Biline
Boldobyl
***Boldochol**
***Boldocrinol**
***Boldocyna**
Boldo Glucine Chapeau-teaut
***Boldo-Gmet**
***Boldoïne Éparvier**
***Boldolactic Lagoutte**
***Boldolactol**
***Boldolaxine**
***Boldolive**
***Boldomucyl**
***Boldo-Verne**
***Boléase Monal**
***Bolène**
Bonbons Lucas (Vermifuges)
Bonbons vermifuges Royer
Boréol
Boricine Meissonnier
Borinhalant
Bornyval
Boro-borax Vigier
Borocalcyl Thévenot
 31, rue Francs-Bourgeois, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 62, av. de Paris, Villejuif.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 38, r. du Mont-Thabor, Paris.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 85, rue de Turbigo, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 à Villefranche (Rhône).
 78, cours de la Liberté, Lyon.
 25, rue Vaneau, Paris.
 11, Chaussée de la Muette, Paris.
 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
 15, rue Corneille, Lille.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 3, imp. Adam, Boulogne (Seine).
 Bloch, à Tomblaine (M.-et-M.).
 Meiller, Dumières (H.-L.).
 6, av. Mirabeau, Nice.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 88, rue Duhesme, Paris.
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 18, r. du Mar.-Foch, Versailles.
 13, r. Docteur-Mazet, Grenoble.
 Messigny (Côte-d'Or).
 Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
 Sauba, Montreuil (Seine).
 145, av. de Montredon, Marseille.
 86, r. Michel-Ange, Paris.
 6, av. Victor-Hugo, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 26, Grande-Rue-St-Clair, Lyon.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.
 19, rue de Ponteves, Marseille.
 45, rue Cambonne, Paris (XV^e).
 13, rue du D^r-Mazet, Grenoble.
 13, av. de Ségur, Paris (VII^e).
 154, av. Malakoff, Paris.
 Joubert et Sibassié, Nantes.
 Laumonnier, 225, r. St-Martin, Paris.
 21, rue de Lyon, Paris.
 J. Logeais, Issy-les-Moulineaux.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 2, rue des Lions, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 21, rue des Roses, Dijon.

Boroformyl	47, rue Nollet, Paris (XVII ^e).
Boromyl	2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, St-Quentin.
Boroseptine	20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
*Borosodine Lumière	45, rue Villon, Lyon.
Borosol	47, rue Nollet, Paris (XVII ^e).
*Borostyrol	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Borotropine Sevin	2 bis, rue Chevallier-de-la-Barre, Saint-Quentin.
Boues Radioactives de Pistyan - les - Bains (Tchécoslovaquie)	45, rue du Marché, Neuilly.
*Boues radioactives Rhemda	51, rue d'Alsace, Courbevoie.
Bougies Américaines	24, rue de Silly, Boulogne-s.-S.
Bougies camphrées Collas	Monnaud, Longjumeau (S-et-O).
Bougies Chaumel	78 Saint-Denis, Paris.
Bougies coricides Dermopode	22, rue Saint-Pierre, Évreux.
Bougies radioactives Rhemda	51, rue d'Alsace, Courbevoie.
Bougies Raynal	12, rue de Nice, Paris.
Bouillie Molard aux amandes	25, cours Lafayette, Lyon (VI ^e).
Bouillon antidysentérique DD	14, r. de Normandie, Asnières (Seine).
Bouillons végétaux	Heudebert, Nanterre (Seine).
Bouillon Vaccin opératoire Sténé	2 bis, place des Vosges, Paris.
*Boules Quiès	8, r. Aug.-Chabrières, Paris.
Bouragar	Bonnaure, à Alès (Gard).
Bourdainol	6, rue Berbisey, Dijon.
Bourgène Blanc	8, r. de Loge, Montpellier.
Boustrol	78, fg Saint-Denis, Paris.
*Bovavéna	Aliments équilibrés Joly, Bourgl-Reine (Seine).
*Bovcardia Lefrancq	36, av. de Metz, Romainville (S.).
*Bovhépatie Lefrancq	36, av. de Metz, Romainville (S.).
*Bovstrol Lefrancq	36, av. de Metz, Romainville (S.).
*Bradygastrine	Ducloy et C ^{ie} , Arques (P.-de-C.).
Bréthyl Dumesnil	10, rue du Plâtre, Paris.
Brévanyl	15, qu. de Bourbon, Paris.
*Brilo-Entérine	Piette, pharm., Étréaupont (Aisne).
Brimox	74, rue Blanche, Paris.
Briona	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Brional	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Brodynol	Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
Bromadyl Vicario	17, bd Haussmann, Paris.
Bromalbin Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
*Broméine Montagu	49, bd Port-Royal, Paris.
Bromephra	187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine).
*Bromésérine	59, rue Boissière, Paris.

Bromhydrate Le Per-
driel***Bromiase****Bromidia****Bromidine Henry****Bromisténine*****Bromocarbène****Bromocarpine Rocher*****Bromocodéine Chenu****Bromoderme*****Bromo-Garnal*****Bromogastrine Verge-**
lot***Bromogénol Pépin*****Bromomaïsine*****Bromone Robin****Bromophène****Bromoquietol****Bromovaleron Henry*****Bromovose*****Bromure de calcium****Bromure de camphre**
Clin**Bromure de Codéine****Bromure d'éthyle****Bromure Laroze****Bromure Pachaut****Bromure de sodium du**
D^r Gigon***Bronchasmine****Bronchialis*****Bronchial Luna****Bronchitol Henry****Broncho-Baume*****Broncho-Correctine****Bronchodermine*****Broncho Favrot****Bronchofluid****Bronchoforme****Bronchogénine*****Broncho-Lactol****Bronchonal****Bronchopan****Bronchophile*****Bronchophilos****Bronchopuerol*****Broncho-Rectine****Bronchorose*****Bronchosanyl Estève*****Bronchosédol****Bronchosédyl*****Bronchoseptol****Broncho-Sérum Con-**
nat**Bronchotonine**

11, rue Milton, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

5, rue de la Paix, Paris.

39, rue Sclessin, Liège.

171, rue de Belleville, Paris.

Leurquin, Dreux (E.-et-L.).

32, rue Grenelle, Paris.

Montferrand (Puy-de-Dôme).

8, av. Walkanaer, Nice.

13, rue Boïnod, Paris (XVIII^e).

6, rue de Navarin, Paris.

à Courbevoie (Seine).

48, rue d'Alésia, Paris.

13, rue de Poissy, Paris.

Roussel, Gde-Rue, Flers (O.).

14, av. Perrichont, Paris.

39, rue Sclessin, Liège.

14, rue Miromesnil, Paris.

18, rue des Écoles, Paris (V^e).

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

Dausse, 4, rue Aubriot, Paris.

Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.

2, rue des Lions, Paris.

130, bd Haussmann, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

Thoral, Mont-Dore (P.-de-D.).

6, rue Berbisey, Dijon.

7, av. du Doyenné, Lyon.

39, rue de Sclessin, Liège.

34, rue Turgot, Narbonne.

13, pl. du Peuple, St-Étienne.

34, bd de Clichy, Paris.

6, rue Dombasles, Paris.

66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).20 bis, rue Sergent-Godefroy,
Montreuil-sous-Bois.

229, cours Gambetta, Lyon.

6, pl. de l'Académie, Angers.

14, av. Perrichont, Paris.

112, rue de Gerland, Lyon.

Lab. Badel, Valence (Drôme).

6, rue Berbisey, Dijon.

Huyghe, Brazey-en-Plaine.

46, r. St-Mandé, St-Maurice
(Seine).

23, bd R.-Poincaré, Bar-le-Duc.

187, r. Croix-Nivert, Paris.

16, cours Gambetta, Lyon.

276, rue Lecourbe, Paris.

Lauriat, La Garenne-Colombes.

M. Folliér, Rumilly (H.-Savoie).

22, r. de la Sorbonne, Paris.

*Broncho-Vaclydun	27, rue Desrenaudes, Paris.
Broncodyl	177, rue Saint-Maur, Paris.
Bronco-sérum Connat	Folliet, Rumilly (H ^{te} -Savoie).
*Broncosol	Brésil, 12, r. St-Gilles, Paris.
*Broncurol	10, r. de Constantinople, Paris.
*Bronphélia	6, rue Berbisey, Dijon.
Bronxia	6, rue Berbisey, Dijon.
Brophytol	14, imp. Ronce, Paris (XX ^e).
*Broseyl	40, rue des Acacias, Paris.
Brumarsyl	65, cours National, Saintes.
Bruméol Elixir	65, cours National, Saintes.
Brunyl	17, rue de Berri, Paris.
*Bruzarine	Latour, Terrasson (Dordogne).
Bucchu-Basma	Lab. Palc, Messigny (C.-d'Or).
Buccochlore	5, cours St-Louis, Marseille.
Buccolan	24, rue Jardel, Bordeaux.
Bucco-Progone	15, r. Catulienne, St-Denis.
Buccospérine	11, rue Malher, Paris.
Buccothymol	27, r. du Juge-de-Paix, Lyon.
Buccurol	83, bd de la Villette, Paris.
*Buchobleu	117, r. V.-Hugo, Houplines (N.).
*Bucmine	4, ch. de La Muette, Paris.
Buctol Paris	4, rue Lamotte-Picquet, Paris.
*Bufox	21, r. Grange-aux-Belles, Paris.
*Bulgarine Thépénier	10, rue Clapeyron, Paris.
Bursol	20, rue des Martyrs, Paris.
Butyral	121, av. de Saint-Ouen, Paris.
Buvanhol	2, r. du Cherche-Midi, Paris.
*Buxema	18, r. Thiers, Mantes-Gassicourt (S.-et-O.).
Bylac	99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
Bylierine	37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
Byl-Efa	Lab. EFA, Carentan (Manche).
Bylyxyl	1, av. de Villars, Paris.

C

C. 40

Cachets Adol	37, r. Marly, Rueil-Malmaison (Seine).
Cachets Asminol	78, c. de la Liberté, Lyon.
Cachets Aspéca	1, rue Paul-Bert, Angers.
Cachets Atlantis	P. Dordin, Harnes (P.-de-C.).
Cachets B. O. S. C.	66, rue Paradis, Marseille.
*Cachets bronchosthé-	38, rue St-Ferdinand, Paris.
niques	St-Gilles-sur-Vie (Vendée).

- Cachet Caillau**
Cachets Castanet
Cachets C. A. S.
Cachets Céli
Cachets Charvoz

Cachets Chauvin au
quinocitrate de li-
thine composé
Cachets Cy-troène
Cachets Dellé
Cachets digestifs Car-
bowil
Cachets digestifs du
D^r Bern
Cachets digestifs Gydé
Cachets Dolozymes
Cachets Donol

Cachets du D^r Boveil
Cachets du D^r Faivre
Cachets du D^r Marck
Cachets Felle
Cachets Gau

Cachets Hériol
Cachets Kapytan
*** Cachets Lekma**
Cachets Louix
Cachets Merveilleux

Cachets Mictosidine
Cachets Némi
Cachets opothérapi-
ques Byla
*** Cachets Pachaut**
Cachets Phebor
Cachets Phydès
Cachets Prodigier
Cachets Pulmonix
Polvi
Cachets Pyrana
Cachets Rabelais
Cachets Rava
Cachets Réal
Cachets réparateurs
*** Cachets du D^r Ri-**
chomme
Cachets de Roux
Cachets Salvé
Cachets Saunier
Cachets S. F. T.
Cachets Séda
Cachets de Sidérol
PEM
*** Cachets Spévin**
Cachets Urby
- Argentat (Corrèze).
 Lab. Marin, Pontailac-Royan.
 49, rue de Metz, Nancy.
 Landes, à Gramat (Lot).
 3, chem. du Vallon, Lyon-
 Caluire (Rhône).

 Aubenas (Ardèche).
 4, av. de Bayonne, Pau.
 Le Naour, Quimperlé (Finistère).

 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel,
 Toulouse.
 4, cours Tolstoï, Lyon.
 Sauba, Montreuil, Paris.
 21, rue de la Gare, La Broque
 (B.-Rhin).
 1, rue Lassalle, Lyon.
 Tassin la Demie-Lune, Lyon.
 Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain).
 Guilbert, Hesdin (P.-de-C.).
 87, rue de la République, St-
 Mandé (Seine).
 Thévenin, Feurs (Loire).
 76, rue de Sèvres, Paris.
 P. Guin, Contres (L.-et-C.).
 78, cours de la Liberté, Lyon.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 21, rue de Lyon, Paris.
 Géha, Port-de-Bouc, Marseille.

 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 130, bd Haussmann, Paris.
 64, rue des Tournelles, Paris.
 Miribel (Ain).
 12, rue Grande, Évreux.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne,
 Paris.
 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
 Logeay, Le Langon (Vendée).
 4, ch. de la Muette, Paris.
 62, r. des Petits-Champs, Paris.
 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.

 29, bd Voltaire, Paris.
 56, r. des Minimes, Marseille.
 45, fg St-Denis, Paris.
 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e).
 38, rue Saint-Ferdinand, Paris.
 149, av. des Minimes, Toulouse.

 1, rue de l'Odéon, Paris.
 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
 P. Dordin, Harnes (P.-de-C.).

- Cachets Van-Sol
 Cachets Vilax
 Cacodylate Vigier
 *Cacodyle Gonnon
 Cacodyle Mars
 *Cacodyline Jammes
 Cacodylo Phosphate
 vital Jacquemaire
 Cacospermine
 Cacticardine du
 D^r Conraux
 *Cador
 Cadmiol zinc
 Cœcaline Gagnière
 Cafacétyl-Codéine
 Café décaféiné
 Cafédrine
 *Caféine granulée Houdé
 Calcéose Boillo
 *Calcériode Marin
 *Calcibronat
 Calciclo
 Calcifixine Bureau
 Calcigénie
 *Calcigénol
 *Calcigénol irradié
 *Calcilève
 *Calciline
 *Calciocholine
 Calciodyl
 *Calcio-Dynamyl
 *Calcional
 Calcion Elsse
 Calcior
 Calci-Ostéline
 Calciphorine
 Calciphose
 Calcisan
 Calcitanol
 Calcisthénine
 *Calcium Corbière
 *Calcium Français J. B.
 Calcium Francalcium
 *Calcium-Plé
 *Calcium Rosso
 *Calcium-Sandoz
 Calcium Vehem
 *Calcivitam
 Calco-céril
 *Calcoléol
 *Calcomagnésie
 Calco-magnésol
 Calcophore
 *Calcozymase
- 18, r. du Mar.-Foch, Versailles,
 16, bd des Filles-du-Calvaire,
 Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
 86, rue Michel-Ange, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 à Caudebec (Seine-Inférieure).
 10, rue Vignon, Paris.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 à Clermont-Ferrand.
 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
 Heudebert, Nanterre (Seine).
 Sauba, Montreuil (Seine).
 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 9, rue Saint-Paul, Paris.
 62, r. de Montreuil, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 90, bd St-Denis, Courbevoie.
 90, bd St-Denis, Courbevoie.
 90, bd St-Denis, Courbevoie.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 21, rue Violet, Paris.
 Bertrand, Nomexy (Vosges).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 45, r. Lazare-Carnot, Clamart.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 Chavanne, Fontaine, Grenoble.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 46, rue Claude-Lorrain, Lille.
 74, r. de la Jonquière, Paris.
 14, r. des Pyramides, Paris.
 23, r. Beautreillis, Paris.
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 171, r. de Belleville, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 7, rue de la Montagne-Ste-Gene-
 viève, Paris.
 3, rue St-Roch, Paris.
 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 63, rue de Charonne, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 rue du Moulleau, Arcachon.
 20 bis, rue Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 52, bd Diderot, Paris.
 6, rue Raoul-Berton, Bagnolet.
 3, rue Fernand-Widal, Paris.

- * Calmaby
- * Cal-Mag-Na

Calmant Meunier

- * Calmarine
- Calmasmine
- Calménol
- Calmidex
- Calmigorge
- * Calminal
- Calmitine
- * Calmobro - Niel (ex-Kalmobrol)
- * Calmocardine
- Calmogastrol
- * Calmopelvine
- * Calmosuppos
- * Calmovarine
- Calobil
- Calogyre
- Calomel R.-B. Lagrave
- Calomel Vicario
- Calox
- * Calsédine
- * Calyptol Charpentier
- * Calyptophédryl
- * Camformine
- Camphal
- Camphemol
- Camphex
- * Camphocalyptol
- * Camphodausse
- * Camphogénine
- * Campho-Pneumine
- Camphoral Aguetant
- Uamphoran
- Campho - Spartéine Dubois
- * Camphostyl Lacroix
- Camphroluble
- * Camphrolyse
- Camphro-Salyl Fraisse
- * Camphydryl Robin
- Camphydryl Spartéiné
- * Camphydryl strychno-spartéiné Robin
- * Canol
- * Cantéine Bouteille
- * Caparlem
- Capillairai
- Capsol
- Capsoléol
- Capsorhinol
- Capsovules Diptlos

84, rue Rochechouart, Paris.
 13, rue Pagès, Suresnes, et 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
 rue du Commerce, Montmarault (Allier).
 95, rue Lecourbe, Paris.
 137, fg. Saint-Antoine, Paris.
 Delaunay, Joué-lès-Tours.
 27, r. des Batignolles, Paris.
 à Thury-Harcourt (Calvados).
 63, rue de Charonne, Paris.
 Billebaud, Paray-le-Monial.

3, rue Royet, Lyon-Caluire.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes.
 192-194, rue St-Denis, Paris.
 Boivert, La Mothe-St-Héraye.
 192-194, rue St-Denis, Paris.
 84, rue Rochechouart, Paris.
 Imbert, à Toulon (Var).
 72, quai de Jemmapes, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 5, rue de la Paix, Paris.
 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.
 11 bis et 13, r. Levert, Paris.
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 15, r. Mercière, Erstein (B.-Rh.).
 1, pl. Morand, Lyon.
 59, bd Lefebvre, Paris.
 26, rue des Moines, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 63, rue de Charonne, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 59, bd Lefebvre, Paris.

16, bd Pereire, Paris.
 37, rue Pajol, Paris.
 Delaunay, Joué-lès-Tours.
 8, rue Saint-Martin, Paris.
 8, rue Jasmin, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.
 id.
 id.

Maizet (Calvados).
 23, rue des Moines, Paris.
 Lab. Lorrain de Produits Purs, Étain (Meuse).
 Arquevaux, Étampes (S.-et-O.).
 74, rue Blanche, Paris.
 Lab. Aninat, à Nîmes (Gard).
 17, rue Chomel, Paris.
 18, rue Pierre-Curie, Paris.

- Capsules Bonnefond 49, bd Port-Royal, Paris.
 *Capsules Bruel 10, passage Morel, Montrouge.
 Capsules Cédro - Mé-
 thyle 55, rue de Chabrol, Paris.
 Capsules Cognet 43, rue de Saintonge, Paris.
 Capsules Dartois 6, rue Abel, Paris.
 Capsules de Gonosan 2, rue des Lions, Paris.
 Capsules Dieu 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 Capsules Enos 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
 *Capsules et sirop Préga 50, rue Nationale, Lille.
 Capsules Goubaux 4, rue Colbert, Reims.
 Capsules grises Ca-
 banes 17, rue Cadet, Paris.
 Capsules Gurgol Jehan et Brera, Montauban.
 *Capsules H a a r l e m
 Bardet 76, rue de Sèvres, Paris.
 *Capsules Henry 36, quai Fulchiron, Lyon.
 Capsules d'Hojasol 10, rue Gay-Lussac, Paris.
 *Capsules Huile de
 Haarlem véritable 33, fg Montmartre, Paris.
 (Voir Huile de Haar-
 lem)
 Capsules d'Ichtyol Vi-
 gier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 *Capsules Joret et Ho-
 molle 165, rue Saint-Honoré, Paris.
 *Capsules Kuchner L. Hinglais, Épernay (Marne).
 Capsules de Morrhuine
 Puy Grenoble (Isère).
 *Capsules Noguès 7, rue Galvani, Paris.
 Capsules Pneumal 172, rue d'Alésia, Paris.
 *Capsules Préga 50, rue Nationale, Lille.
 Capsules Raquin 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Capsules Ricord 3, bd Beaumarchais, Paris.
 Capsules salolées 31, r. Philippe-de-Girard, Paris.
 Capsules Sédomictol 21, rue de Lyon, Paris.
 Capsules Sérafon 9, rue de la Perle, Paris.
 Capsules de sulfate de
 quinine 8, rue Vivienne, Paris.
 Capsules Taetz 2, rue Lesdiguères, Paris.
 Capsules Therpinol 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 Capsules Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Captobyl Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 *Carb 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 *Carbagol Marinier 23, rue Ballu, Paris.
 Carbaine Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 *Carbalcaloïdes 49, bd Port-Royal, Paris.
 Carbalga id.
 *Carbargyre 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 *Carbatropine 49, bd Port-Royal, Paris.
 Carbémétine id.
 Carbeserine id.
 Carbintol 151, rue de Charenton, Paris.
 *Carbobel 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 *C a r b o - Bismuth
 Adrian 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 Carbocarpine 49, bd Port-Royal, Paris.

- *Carbocitrol
- *Carbo-Combrosmol
- Carbodaussé
- Carbofixine
- *Carbogénase
- *Carboiodure Fraudin
- *Carbolactyl simple et bilié
- *Carbolaxine
- Carboléine
- *Carbolin Midy
- Carbomagnesol
- Carboméline
- *Carbomucil
- *Carbonal Magnésien
- *Carbonal Princeps
- Carbonaphtolan
- *Carbonate de Bismuth
- *Carbonate de Chaux
- Adrian
- Carbonate de Chaux
- Lancosme
- Carbonate de Lithine
- Le Perdriel
- *Carbonésie
- Carbophos
- *Carboquinol
- *Carborexyl
- *Carbos
- Carbosanis
- *Carboseptyl
- Carbotensyl
- *Carbotrignon
- Carboxine
- Cardi-Acron
- Cardialgine Dubois
- *Cardibaïne
- Cardicratine
- Cardiobromine
- Cardiocrinol
- *Cardioflorine
- *Cardiophylline
- *Cardior
- *Cardiosthénine
- *Cardiostreptine
- Cardiotonic
- Cardiotonine
- Cardiovasyl
- *Cardirène
- Cardiséline
- *Carditone
- *Cardosol
- *Caréna
- 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
- 59, rue Boissière, Paris (XVI^e).
- 4, rue Aubriot, Paris.
- 34, rue Sedaine, Paris.
- 45, fg Saint-Denis, Paris.
- 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine).
- 19, rue de Fleurus, Paris.
- 1, r. d'Arras, Béthune (P.-de-C.).
- 14, rue Demarquay, Paris.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 63, rue de Charonne, Paris.
- 229, cours Gambetta, Lyon.
- 41, rue de Rome, Paris.
- 14, rue Cantin, Courbevoie.
- id.
- B.-F. Delaunay, Joué-lès-Tours.
- 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
- 9-11, rue de la Perle, Paris.
- Voir: Calcilève.
- 11, rue Milton, Paris.
- 12, bd Saint-Martin, Paris.
- Noé, St-Amand-les-Eaux.
- 13, Gde-Rue, Herblay (S.-et-O.).
- 57, rue Pierre-Corneille, Lyon.
- Lab.Millet, Rambouillet (S.-et-O.).
- 49, bd Port-Royal, Paris.
- 94, rue Michelet, Alger.
- Chavanne, Fontaine - Grenoble (Isère).
- Lorthioir, 22, r. Perceval, Paris.
- 18, r. de Ménilmontant, Paris.
- 37, r. de la Haie-Coq, Aubervilliers.
- 16, bd Pereire, Paris.
- 15, bd Pasteur, Paris.
- 56, rue St-Lambert, Marseille.
- 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
- 107, r. des Dames, Paris.
- " ANGLA ", Monte-Carlo.
- 36, av. de Metz, Romainville.
- M. Robilliart, pharm., Lille.
- 8, r. Vivienne, Paris.
- 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
- 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- 84, fg du Temple, Paris.
- L. Robert, pl. des Halles, Niort.
- Milan, 7, rue Bonald, Lyon.
- Lobica, 25, rue Jasmin, Paris.
- 32, rue Mortinat, Asnières.
- 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e).

- * Caréna Calcium 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- * Caréna injectable id.
- * Caréna Ouabaine id.
- Carminase 199, rue St-Denis, Paris.
- Carnéose D^r Spès Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Carnets de Régime du D^r Corset de Vichy Palc, Messigny (Côte-d'Or).
- Carnicalcine 2, rue du Pensionnat, Lyon.
- * Carnine Lefrancq 36, av. de Metz, Romainville.
- Carnix Robert Lab. Elsse, Fontaine-Grenoble.
- Carnofer 3, r. des Rouairies, Dinan.
- * Carottase Wander, Champigny-s.-Marne.
- Cartilos 56, rue Beaubourg, Paris.
- Cartouches Lemary 36, quai Fulchiron, Lyon.
- Carypaine 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons.
- Casaldyl 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- Casbyl 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
- Cascalobyl 187, r. de Créteil, Maisons-Alfort.
- Cascara Alexandre 41, rue de Rome, Paris.
- * Cascara Eparvier 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon.
- Cascara Henry rue de Sclessin, Liège.
- * Cascara Midy 67, av. de Wagram, Paris.
- Cascarine Leprince 62, rue de la Tour, Paris.
- Caséoline Girard 48, rue d'Alésia, Paris.
- Caséone Fabre 33, rue de la Haie-Coq, Aubervilliers (Seine).
- * Casol 12, rue Montmartre, Dijon.
- * Cassilax 137, rue de Belleville, Paris.
- Cassitol Mauchant, Gennevilliers (Seine).
- * Castanol 9, pl. Municipale, Tulle (Corrèze).
- * Catalyl 10, r. J.-Hachette, Ivry (Seine).
- Cataplasme et boue radioactive de Pistyan Genevrier, 145, r. du Marché, Neuilly.
- * Cataplasme du D^r Le-lièvre 19, r. de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
- Cataplasme Electrique 46, rue Dauphine, Paris.
- Morgin
- Cataplasmes de Fango
- Fisch
- Cataplasme Optima
- Catéchiode Martinet Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- Catéményl Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- * Cathacide 16, rue Petit-Musc, Paris.
- Cathartine D^r G. Lalaurie, à Cuxac d'Aude.
- Cathiode Brisson 95, rue de Prony, Paris.
- Catramina 3, r. des Rouairies, Dinan.
- Cautére Lumière 157, r. Championnet, Paris.
- * Caveform 78, bd Beaumarchais, Paris.
- C. B. K. 12, avenue du Maine, Paris.
- * Cédoseptol 114, rue Solférino, Lille.
- Cèdre bleu 15, rue Catulienne, St-Denis.
- Cedrel Bel 50, av. Jacqueminot, Meudon (S.-et-O.).
- Cédro-Méthyle 42, bd St-Marcel, Paris.
- Cédrosan DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
- * Cellargos 55, rue de Chabrol, Paris.
- Bréant, 1, r. de Clichy, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.

- *Cellona
- Cellopansements
- *Cellucrine
- *Cellulax
- Cellules Paret
- Cellu-Son
- Cemag
- Centrosorum Grosjean
- *Cépaïne
- *Céphalgi-Lysine
- Cephmail
- Cephœmétine
- Cerdesol
- Céréales-Bébé

- Céréales granuléées
- Céréaline Tulivet

- Céréalose
- *Cérébrine Fournier

- Cérébrinol
- Cérébrocrinol
- *Cérébrolipase
- *Cérébron
- *Cérébrosthénine Dalin
- Cérédine Loudanot

- Céréol Gigon
- *Céréossine Dehaussy
- *Cérinil

- Cériomine
- Cerotto Bertelli
- Gersomine
- Cervol
- Cetemol
- *Cethocal
- Cétrarose Gigon
- Charbenzo Lafran
- *Charbon Fraudin simple, belladonné et naphtolé
- Charbon Tissot
- Chardyl Menrice
- Charleben

- *Charrier (Eau Minérale Naturelle viv.)
- *Chasvers Michel
- Chatel-Biase
- Chaulmorhuate Pomaret
- *Chélibile
- *Chelicyne
- *Chéloïdine
- *Chenanthol

- Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- La Cellophane, Bezons (S.-et-O.)
- 5, rue Paul-Barruel, Paris.
- 40, quai J.-d'Arc, Chinon.
- 28, rue Guibal, Marseille.
- Aubry, 62, r. Erlanger, Paris.
- D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
- 36, rue de Malte, Paris.
- 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
- 2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).
- 17, rue de Berri, Paris (VIII^e).
- 47, rue Maleret, Bordeaux.
- 12, r. de Strasbourg, Paris.
- Favrillon, St-Symphorien-de-Lay (Loire).
- id.
- 52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
- 45, r. du D^r Blanche, Paris.
- 6 bis, rue Campagne-Première, Paris.
- 72, quai Jemmapes, Paris.
- 107, rue des Dames, Paris.
- 17, rue Soufflot, Paris.
- 194, rue St-Honoré, Paris.
- 49, quai St-Vincent, Lyon.
- 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
- 25, bd Beaumarchais, Paris.
- 50, rue Nationale, Lille.
- 20 bis, r. Serg^t-Godefroy, Montreuil-s.-Bois.
- id.
- 78, bd Beaumarchais, Paris.
- 12, r. de Strasbourg, Paris.
- 19, rue de Fleurus, Paris.
- 15, rue d'Argenteuil, Paris.
- 6, rue Abel, Paris (XII^e).
- 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).
- 8, rue de Prague, Paris.

- 4, av. Desteux, Boulogne-Billancourt (Seine).
- 34, bd de Clichy, Paris.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.).
- à Laprugne (Allier), et 24, av. de l'Opéra, Paris.
- Cirey-sur-Vezouze (M.-et-M.).
- Miraton, Châtel-Guyon.

- 21, rue Marbeuf, Paris.
- A. Cousin, Estissac (Aube).
- 47, rue Maleret, Bordeaux.
- 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- L. Hinglais, à Épernay.

- Cheralys comprimés
 *Chibromercurobromée
 12, rue des Sts-Pères, Paris.
 5, r. St-Hérem, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
- *Chloeci
 *Chlomag
 Chlorakin
 *Chloral bromuré
 Dubois
 Chloral Dalis
 Chloral-Geranie
 *Chloralguine
 Chloralgot
 *Chloralosane
 *Chloramine
 *Chlorammonic
 L. Adam, Granville (Manche).
 18, rue des Écoles, Paris (V^e).
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 Duriez, 20, place des Vosges, Paris.
 84, rue Rochechouart, Paris.
 36, rue de Malte, Paris.
 6, cours V.-Hugo, Cavaillon.
 8, rue de la Paroisse, Versailles.
 145, bd Haussmann, Paris.
 Freyssinge, 6, rue Abel, Paris.
 25, bd de la Tour-Maubourg, Paris.
- Chlorasepthymol
 Chloraseptine
 *Chloréthyle Bengué
 Chlorhydropeptine
 Chlorhydrol
 Chlorical
 *Chloridia
 Chlorinol
 *Chloripepsine
 Chlormagnésium Fisch
 Chlorobacilline
 Chlorobyl
 *Chloro-Calcien
 Chlorofoline
 *Chloroforme Adrian
 Chloroforme anesthésique
 Saint-Sever (Landes).
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 16, rue Balu, Paris (9^e).
 5, bd Montparnasse, Paris.
 Fouché, 2, bd Pershing, Paris.
 Lab. Sauba, Montreuil, Paris.
 64, r. des Tournelles, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
 Tulivet, St-Germain-en-Laye.
 25, rue Jasmin, Paris.
 4 bis, rue du Colonel-Moll, Paris.
 21, rue de Piepus, Paris.
 9-11, rue de la Perle, Paris.
- Chloroforme amp.
 Chloroforme L. a. m. -
 biotte frères
 Chloroma
 *Chloro-Magneson
 Chloro - Magnésium
 Hatier
 Chloro - magnésium
 Henry
 Chloropeptase
 *Chlorophylle du D^r David
 Spécia, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 52, bd du Temple, Paris.
- Chlorostomalise
 Chlorosulfol Vigier
 Chloro-Thymol
 *Chlorumagène
 *Chlorure d'ammonium Bréant
 *Chlorure de Magnésium Adrian
 *Chlorure d'Éthyle Adrian
 Chlorurol
 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
 Henry, 39, rue de Sclessin, Liège (Belgique).
 14, r. Thiers, St-Amand-les-Eaux.
 39, bd de la Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
 Bedell, Lavejanet (Ariège).
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 45 fg Saint-Denis, Paris.
 42, rue Mont-Cenis, Paris.
- 11, r. de Clichy, Paris.
 9-11, rue de la Perle, Paris.
 9-11, rue de la Perle, Paris.
 55, rue de Chabrol, Paris.

- Chlory choline**
***Chocochaux**
Chocolat au lait Nutricia
Chocolat Redeuil
Chocolax
***Chocynol**
- *Cholagol**
Cholagon
***Cholal**
***Cholécystine**
***Choléfluine**
***Choléfluine (comprimés)**
Cholégastrol
***Choléine Camus**
***Choléine lactique**
Choléitoires Byla
***Cholélyse Carbou**
Choléoboldine Thévenot
Choléoclinol
- *Choléo-Combretol**
Choléocytol
***Choléo-Fluase**
***Choléokinase**
***Choléolactol Daguin**
***Choléolax**
***Choléopeptine**
***Choléo-Zymatine**
Cholépan
***Cholérène**
***Cholergine**
Cholétrypsine
Choline Roche
***Cholofluol**
Choloptomercuro
Cholotoxine
***Chophytol (Ampoules, Dragées et Gouttes)**
Christolax
- Chromo - Thermo - Thérapie**
***Chromomercurol Clars**
***Chronicystine Manor**
***Chrysalmiode Aguetant**
***Chrysemine Carteret**
Chymosine Fisch
***Cibalgine**
- Cibrol**
Cicabi
Cicatrigène
Cicatryl
- 22, rue Morère, Paris.
 79, r. de Paris, St-Denis (Seine).
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 7, rue Couche, Paris (XIV^e).
 6, r. A.-La-Lyre, Courbevoie (S.).
 Huyghe (G. et J.), Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or).
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 48, bd des Batignolles, Paris.
 95, rue de Prony, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 7, r. des Petits-Carreux, Paris.
- id.
 74, rue Lourmel, Paris.
 Darrasse, Nanterre (Seine).
 id.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 8, rue Jean-du-Bellay, Paris.
 21, rue des Roses, Dijon.
 Huyghe, Brazey-en-Plaine (C.-d'Or).
 37, rue de la Fédération, Paris.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 Verdon, Celles-s.-Belle (D.-S.).
 15, r. des Champs, Asnières.
 7-13, r. Bobillot, St-Maur (Seine).
 Colas, 133, r. Lecourbe, Paris.
 24, rue des Plantes, Paris.
 58, rue de Vouillé, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 5, rue de Vic, Nancy.
 10, rue Crillon, Paris.
 13, pl. de la Nation, Paris.
 5, r. St-Hérem, Clermont-Fer.
 Chaumont-Cazals, à Vichy (A.).
 Rosa, 11, rue Roger-Bacon, Paris (XVII^e).
 151 bis, route de Joinville
 Champigny.
- 12, av. du Maine, Paris.
 18, rue Saint-Sulpice, Paris.
 St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.)
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
 2, bd Pershing, Paris.
 54, r. du Commerce, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris.

- G^d Cidre Bol régime** M. Langlois, La Cressonnière,
Pont-l'Évêque.
- Cigares Gicquel** 64, r. des Tournelles, Paris.
- Cigarettes anti-asthm.** Escoufflaire, Baisieux (N.).
- Cigarettes anti-asthm.** Martin-Mazade, Saint-Raphaël.
- Cigarettes Barral** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Cigarettes du D^r Cléry** 44, r. de Lagny, Montreuil.
- Cigarettes Espic** 20, rue St-Lazare, Paris.
- Cigarettes Indiennes**
- Grimault** 8, rue Vivienne, Paris.
- Cigarettes Salva** r. de Châteaudun, Rennes.
- Cigarettes Schulze** Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).
- Cigarettes Zani** 52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
- *Cimalvol** 3, bd Beaumarchais, Paris.
- Cimarsényl** 50, av. de Normandie, Colombes.
- Cimatryl** 4, pl. Royale, Nantes.
- *Cinalose** 60, route de Châtillon, Malakoff.
- *Cinarascol** 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes.
- *Cinascol** G. Baetz, Chef-Boutonne (D.-S.).
- *Cinéyl** 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).
- *Cinnestérol** 56, r. St-Lambert, Marseille.
- *Cinnozyl Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Cinol** Immunos, av. des Sources, Nice.
- *Cipromarol** 12, r. de la République, Puteaux.
- Circogénol** 2, pl. République, St-Ouen.
- *Cirvose** 40, r. des Acacias, Paris.
- *Citralin** 10, imp. Milord, Paris.
- *Citra-Quint** 74, r. de La Fère, St-Quentin.
- Citrarose du D^r Gigon** 25, bd Beaumarchais, Paris.
- Citrase** 1, av. de Villars, Paris.
- Citrate de Lithine Le**
- Perdriel** 11, rue Milton, Paris.
- *Citrhémol** G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- *Citrixlex** 21, r. Mouton-Duvernety, Paris.
- Citrina** Lab. Sauba, Montreuil (Seine).
- *Citrocarbène** 4, ch. de la Muette, Paris.
- *Citrocholine** 49, rue du Loing, Montargis.
- Citro-fer** 22, fg St-Michel, Angers.
- *Citrofluyl** 4, ch. de La Muette, Paris.
- Citrol** 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- Citrolactine** 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge.
- *Citrolargol** 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
- Citroléol** 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
- *Citronai** Voir : Lemonai.
- *Citronema** 10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
- *Citropaïne** 304, r. Saint-Jacques, Paris.
- *Citropeptol** 83, bd de la Villette, Paris.
- Citrophos** Noé, St-Amand-les-Eaux.
- Citrosalol** 57 bis, av. Motte-Picquet, Paris.
- *Citrose-Vichy** 7, rue Galvani, Paris.
- *Citrosodine** 34, rue Sedaine, Paris.
- Citro-thymol** 49, rue de Bitche, Courbevoie.
- Clairmine** 6, rue du Laos, Paris (V^e).
- Clangoryl** 26, rue Norvins, Paris.

- *Clearol
 - *Cleinol
 - *Clinax
 - Clinuryl
 - Clisémine Longuet
 - *Clonazone Daufresne
 - *Clupéyl (Voir : Laitancyl)
 - *Coagulène Ciba

 - Coaltar Le Beuf
 - Coalt Derma
 - *Cobrallyre
 - Cobranyl
 - *Cobratoxine (Katox)
 - *Cocaïne Midy
 - Coccidal Grémy
 - Codarsyl
 - *Codéphryl Dufour
 - *Codérax
 - Codobromyl
 - *Codocol
 - Codoforme Bottu
 - Colargyl
 - *Colarsénol (collutoire et pommade)
 - *Colavé
 - *Colchicine Houdé
 - Colchiflor Vial
 - *Colchi-Sal Midy
 - Colhépatyl
 - *Colibacine
 - Colibyl
 - *Coliflorine Carrion
 - Coliformine
 - Colilactol

 - *Colisel
 - Coliseptine
 - *Colitique
 - *Coli-Vaclydun
 - Collargol
 - *Collargophédrine
 - Colleodin Leo

 - Colliodure
 - *Collobatilline du Dr Grimberg
 - *Collobiase de Sulfhydrargyre
 - Collobiase d'Or
 - *Collocrine

 - Collohirtol
 - Colloïdes Amicros
 - Colloïdes Clin
 - *Colloïdine
 - *Colloïdogénine
- 194, rue Rivoli, Paris.
 - G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 - 95, r. de Vaugirard, Paris (VI^e).
 - Délaunay, Joué-lès-Tours.
 - 34, rue Sedaine, Paris.
 - 42, rue Thiers, Le Havre.
 - Panier, à Malo-les-Bains.
 - 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 - 11, rue Milton, Paris.
 - 30, bd Raimbaldi, Nice.
 - (Voir : Cobratoxine).
 - 68, r. Berkendael, Bruxelles.
 - 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
 - 67, av. de Wagram, Paris.
 - 14, rue de Clichy, Paris.
 - Dubois, 16, bd Pereire, Paris.
 - 40, rue des Carmes, Orléans.
 - 69, av. du Maine, Paris.
 - Sauba, Montreuil (Seine).
 - 22, rue des Martyrs, Paris.
 - 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 - 49, rue de Bitche, Courbevoie.
 - 43, rue de Crétel, Joinville-le-Pont (Seine).
 - E. Verdon, Celles-s.-Belle (D.-S.).
 - 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 - 8, rue Vivienne, Paris.
 - 67, av. de Wagram, Paris.
 - 50, fg Poissonnière, Paris.
 - 22, rue des Martyrs, Paris.
 - 60, r. Nationale, Castelnaudary.
 - 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
 - 5, r. du Calvaire, Nantes.
 - 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.).
 - 54, r. de Paris, Charenton (S.).
 - 60, r. Nationale, Castelnaudary.
 - 42, r. du D^r-Blanche, Paris.
 - 27, rue Desrenaudes, Paris.
 - 67, av. de Wagram, Paris.
 - 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
 - 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 - 84, fg du Temple, Paris.
 - 74, rue Blanche, Paris.
 - Dausse, 4, r. Aubriot, Paris.
 - 4, rue Aubriot, Paris.
 - 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
 - Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 - 177, r. de Courcelles, Paris.
 - 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 - 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 - 8 et 10, r. Alp.-Bertillon, Paris.

- Collo-iode Dubois
Collophérine Bapt
Collosol Pépin
*Collosoufre
Collothiol
*Collovaccins
Collubiazol
Colluborine
Collubleu
*Collunovar
Colluséda
*Collusulfar
Collutoire gargarisme
Neyret
*Collutoire Mexyl
*Collutoire Trépallix
*Collutoire V.-E. Dou-
mer
Collybor
*Collyres Chibret.
*Collyres (rose, bleu,
irradié)
Collyres Stéryl
Collyre des Alpes Vica-
rio
Collyres stérilisés Clin
Colmatol
*Coloplastre
*Colpophile
*Coltène
Columiel
*Coluval
*Combex-Lax
*Combiné Gécán
*Combrétine
Combretochol
Combrosmol
*Comitil
Complexe Ovarien
Caldo
Complextraits
*Composé Gmet
*Compresses grasses
« Onctua »
*Compressif Beslier
Comprimés Adolan
Comprimés Alla
Comprimés Anta
16, bd Pereire, Paris.
4, rue de l'Alma, Asnières.
116, bd Haussmann, Paris.
Lab. Lorrain de Produits purs,
Étain (Meuse).
20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
74, rue Blanche, Paris.
89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e).
223, rue Saint-Martin, Paris.
11, rue Lepic, Paris.
7, rue de la République, Pu-
teaux (Seine).
149, av. des Minimes, Toulouse.
19-21, r. Van-Looy, Paris (XVI^e).
35, rue de la Bourse, Lyon.
6, rue des Dames, Paris.
66, rue de la Pompe, Paris.
Bomel, Annonay (Ardèche).
Adler, 36, rue des Francs-Bour-
geois, Paris.
5, r. St-Hérem, Clermont-Fer-
rand.
52, r. Heurtault, Aubervilliers.
94, rue Michelet, Alger.
17, bd Haussmann, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
36, r. de la Tour-d'Auvergne,
Paris.
29, rue Singer, Paris.
45, fg Saint-Denis, Paris.
Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain).
156, av. Victor-Hugo, Paris.
7, /r. L.-Jeannin, La Garenne
(Seine).
134, av. Parmentier, Paris (XI^e).
(Voir : Gécán.)
202 bis, r. de Paris, Clamart.
B.-F. Denaunay, Joué-lès-Tours
(I.-et-L.).
59, r. Boissière, Paris (XVI^e).
12, pl. de la Révolution, Besan-
çon.
20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
Huckel, Héricourt (Hte-Saône).
27, fg Montmartre, Paris.
Échard - Gillier, L'Arbresle
(Rhône).
Coquelu, Digoïn (Saône-et-L.).
45, r. du Marché, Neuilly.
Lapeyre, Neuviç-s.-Isle (Dor-
dogne).
178, rue Montmartre, Paris.

- Comprimés Aqua Pura 37, r. de Bourgogne, Paris.
 *Comprimés d'Alibour 15, r. des Champs, Asnières.
 Comprimés Aseptuter 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 Comprimés Chauvin
 d'Alibour
 Comprimés de Char-
 bon Fraudin
 Comprimés Chéralys
 Comprimés de Gibert
 Comprimés Dynamy
 *Comprimés Galac
 Comprimés Garga
 *Comprimés Guillau-
 min
 *Comprimés Kléos
 Comprimés Mercier à
 l'Iodorganine
 Comprimés N. B. M.
 Comprimés Néotho-
 rium Millot
 Comprimés Neyret
 *Comprimés Nican
 Comprimés Panto-
 laxine du Dr Bcszil
 Comprimés Pausis
 Comprimés du Prof.
 Pénieres
 *Comprimés Ortho-
 Malleval
 *Comprimés Probios
 Antipyogène
 *Comprimés Proto-
 Gambier
 *Comprimés Purgos
 *Comprimés Recal
 Comprimés Rhinol
 Comprimés Roy
 Comprimés Salvé
 Comprimés Sériques
 Clin
 *Comprimés de Thio-
 naïodine
 Comprimés Urbé
 Comprimés Vérandy
 *Comprimés Vichy -
 État
 Conarsynol
 Concentré des Nurses
 Condurango Gmet
 Condurango granulé
 Astier
 *Cônes Antiseptiques
 Rendell
 Conhydrargol
- Aubenas (Ardèche).
 4, av. Desfeux, Billancourt
 (Seine).
 12, r. des Saints-Pères, Paris.
 19, rue d'Aubagne, Marseille.
 Chavanne, Fontaine-Grenoble.
 Lambert, pl. du Châtelet, Or-
 léans.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 2, rue des Cordeliers, Meung-
 sur-Loire.
 41, route de Turin, Nice.
 56, rue Beaubourg, Paris.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 35, rue de la Bourse, Lyon.
 Cantin, Palaiseau (S.-et-O.).
 1, rue Lassalle, à Lyon.
 4, pl. de la Gare, Tunis.
 Coupât, Ussel (Corrèze).
 34, rue du Plat, et 9, rue Sala,
 Lyon.
 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 42, r. Émile-Deschanel, Courbe-
 voie (Seine).
 7, rue Galvani, Paris (XVIII^e).
 Fleury, Arcachon (Gironde).
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 7, av. Marceau, Paris.
 20, rue des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 71, av. de Clamart, Issy-les-
 Moulineaux (Seine).
 Laffargue, Barsac (Gironde).
 G. Laurens, Aix-en-Provence.
 G. Prunier et C^{ie}, 4, rue de la
 Coutellerie, Paris.
 12, pl. Puget, Toulon.
 Bourg-la-Reine (Seine).
 27, fg Montmartre, Paris.
 42, r. du Dr-Blanche, Paris.
 61, rue Damrémont, Paris.
 12, pl. Puget, Toulon.

- Conjonctol**
*** Continol**

*** Contracide Norgan**
*** Convalbaine**
Convallamarine
*** Cophed**
Copraxe
*** Coprex**
Cogluplaste
*** Coquelicônes**
*** Coqueluchyl**
*** Coramine**

Cordicura d'Ott. Can-
dela
*** Coréine**
Corizol
Coroplasme
*** Corosédine**
Corpogénine
Corps Thyroïde Mon-
cour
*** Cortiode**
Corylase
*** Coryphédrine**
Coryza-Ouate
Cosmargyre
CratæGINE
*** Cratægol**
Cratægiode

CratæGus Bocquillon
*** CratæGus Gmet**
Cratiode
Crayon à la chrysaro-
bine Vigier
Crayons Antifissure
Crayons Chaumel
Crayons néothorium
Millot
Crayon Thermosan
*** Crayons Thomas**
Créacalcine
*** Créagénol Corbière**
Créatonine
*** Crédone Dehaussy**
Crémasepta
*** Crème de Bismuth**
Quesneville
Crème de Bichlor.
magnésienne
Crème de laine Vi-
gier
Crème de Lait Nutricia
*** Crème Ludin**
Crème de Lygie
- Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 2, pl. de la Porte-des-Ternes,
 Paris (XVII^e).
 41, rue de Rome, Paris.
 12, rue Henner, Paris (IX^e).
 15, bd Pasteur, Paris.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 77, bd de Grenelle, Paris.
 120, rue Lecourbe, Paris (XV^e)
 Coquelu, Digoin (S.-et-L.).
 24, av. Mac-Mahon, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.

 78, bd Beaumarchais, Paris.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 24, pl. des Vosges, Paris.
 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 13, av. de Ségur, Paris.
 Lebon, Charost (Cher).
 49, av. V.-Hugo, Boulogne-s.-S.

 7, rue de l'Armorique, Paris.
 105, rue de Rennes, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 14, av. de Paris, Biarritz.
 21, r. des Roses, Dijon.
 46, rue de la Barrière, Elbeuf.
 14, rue Eug.-Delacroix, Paris.
 36, rue des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 202 bis, rue de Paris, Clamart.
 27, fg Montmartre, Paris.
 8, rue Dubrunfaut, Paris.

 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Domergue, Agen (L.-et-G.).
 78, fg Saint-Denis, Paris.

 177, rue de Courcelles, Paris.
 30, rue Singer, Paris.
 Lab. du Donagol, Péronne.
 3, place Jussieu, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 3, pl. Jussieu, Paris (V^e).
 50, rue Nationale, Lille.
 D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 L. Colleson, 5, rue d'Angou-
 lême, Paris.

 12, rue de Buci, Paris.

 9, rue de la Gare, Levallois.
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 Lab. Rey, Dijon (C.-d'Or).
 43, av. Kléber, Paris.

*Crème de Nujol (Voir :
Nujol)

Crème de quinine Sa-
polan

Crème Diadermine

*Crème Mégève

Crème Méta-Titane

Crème Probios anti-
pyogène

*Crème résolutive du
Dr Rap

Crème Stéar

Crèmes-Vaccin

Crémolax

Crémo-plastol Dumes-
nil

*Créoformine

*Créofruits

Créogarlic

Créoline Pearson

*Créosal Dubois

*Créositoires

*Créosoforme L a m -
biotte Frères

Crésolargol

Créosote soluble Va-
cheron

*Créo-suppo-camphre

Crêpe Eglanos

*Crêpe Velpeau

Crescogénol

*Crésentyl

*Crésolargol

*Crésophanyl

*Crésopirine

*Crésotanol

Crésyl Jeyes

*Crinex

*Crinex-Orex (Ambo)

*Crinhémol

Crinocalcine

*Crinocardine

*Crinoflux

Crinomarine

*Crino-Menstryl

*Crinopancrine

*Crino-Sérum

*Crino-Sthényl

*Crino-Tensyl

Crinothéine

*Crisalbine

Cristolax

Croquettes Marida

*Cruxol

98, rue de Sèvres, Paris.

29, rue Singer, Paris.

60, r. Ét.-Dolet, Malakoff (Seine).

9, rue de la Gare, Levallois.

P. Métadier, Tours.

8, rue Saint-Martin, Paris (IV^e).

29, rue Singer, Paris.

34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône).

74, rue de Lourmel, Paris.

57, rue du Cherche-Midi, Paris.

10, rue du Plâtre, Paris.

18, rue de Jouvence, Dijon.

Rte du Moulleau, Arcachon.

15, av. Parmentier, Ivry.

J. Midy, 41, r. de Courbevoie,
La Garenne (Seine).

(Voir: Sirop Dubois au Créosal.)

Margex, 13, r. Mélingue, Paris.

20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
(XVI^e).

191, r. du Fg St-Antoine, Paris.

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

62, av. de Paris, Villejuif (Seine).

3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).

25, bd Beaumarchais, Paris.
(Voir: Velpeau.)

18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.

1, pl. Lucien-Herr, Paris.

191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).

2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
id.

id.

35, r. des Francs-Bourgeois, Paris.

1, av. du D^r Lannelongue, Paris.

1, av. D^r Lannelongue, Paris.

Lab. Demasles, Vienne (Isère).
Hatier, à Saint-Étienne.

51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

41, rue Germain, Lyon.

29, r. Carnot, Levallois-Perret.

7, rue Biscornet, Paris.

17 bis, av. Parmentier, Paris.

passage des Princes, Paris (II^e).
7, rue Biscornet, Paris.

id.

48, rue de la Procession, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).

1, Jardin-Anglais, Le Raincy

49, rue de Maubeuge, Paris.

- Crynosol**
*** Cryogénine Lumière**
*** Cryosan** 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 Lab. Lorrain de Produits purs,
 Etain (Meuse).
*** Cryptargol Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
*** Crypthermol** 50, rue Nationale, Lille.
*** Crypthiol** 35, r. de Paris, Clichy (Seine).
Cryptos 4, av. M.-Berteaux, Poissy
 (S.-et-O.).
*** Cryptosote Néda** 134, cours de Verdun, Bordeaux.
*** Cryptotoxyl** 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
*** Crysiodal** 5, rue Paul-Barruel, Paris.
Crystol 8, rue Vivienne, Paris.
*** Cupranine** P. V. Léger, St-Pourçain (Allier).
*** Cuprase** 191, rue Saint-Honoré, Paris.
*** Cuprazurol** 352, r. Heurtault, Aubervilliers.
*** Cupremone F** Gouin, 20, r. des Écoles, Paris.
*** Cupremone simple** id.
*** Cupressiode** 6, rue Dombasle, Paris (XV^e).
Cupressus Dausse 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
Cuprifer à La Ferté-Macé (Orne).
Cuprinal Bertrand, Nomexy (Vosges).
Cuprinol Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Cuprion 18, av. Hoche, Paris.
*** Cuprobalt** 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).
Cuprocithine Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
*** Cuproformine** 17, rue Soufflot, Paris (V^e).
Cupro-Génitol 193, av. du Maine, Paris.
Cupro-Glycol 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
Cupro-Salyl 5, rue d'Angoulême, Paris.
*** Cuprosténol** 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
*** Cuproxil** 92, rue Bobillot, Paris.
Curalgine P. Fontanier, Moulins-sur-Yèvre
 (Cher).
Curalsine 27, rue Planchat, Paris.
Curaluès D^r Lafay 54, ch. d'Antin, Paris.
*** Curamida** A. Chapellier, Champagnac-lè-
 Vieux (Hte-L.).
Curandra (onguent, 71, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
 ovules) 260, r. de Rosny, Montreuil.
Curasme 23, rue des Ecoiffes, Paris.
*** Curatine Brunet** 114, rue du Temple, Paris.
Curatoxine 17, bd Haussmann, Paris.
Curgol Vicario 17 bis, av. Parmentier, Paris.
Curiodé 43-45, rue des Fauvelles, Cour-
 bevoie.
Curiosan 11, bd de Strasbourg, Paris.
Curocalcine 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.
*** Curogène** Saint-Sever (Landes).
Curospasm
Curovaccins atoxiques 60, rue Mathurin-Régnier, Paris.
 Cépède (Voir : Vacci- 269, rue Judaique, Bordeaux.
 nothérapie) Lab. B. E. A., Belfort.
Curoveinyl Gef 122, Champs-Élysées, Paris.
Curoxyure
*** Curozéma**

- *Cuscutine Foulon 12, bd St-Martin, Paris.
- Custodine 24, rue Flégier, Marseille.
- Cutidermine 10, av. de Wagram, Paris.
- Cuti-Dmelcos 21, rue J.-Goujon, Paris.
- *Cutigénol 60, rue de Monceau, Paris.
- Cutiphile 17, r. de Berri, Paris.
- Cutiplaste id.
- *Cutisanine 37, r. du Vieil-Abreuvoir, Roubaix.
- *Cutobronchyl 2, r. Sédillot, Strasbourg (B.-R.).
- Cutopralgine id.
- *Cuzinargol 22, rue des Martyrs, Paris.
- Cyalène 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- Cyanargyre 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Cyanaulol du Dr Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris.
- *Cyanhermine 37, r. de la Fédération, Paris.
- Cyanhermyl Dalin 1, rue de la Martinière, Lyon.
- Cyanovaine 34, bd Beaumarchais, Paris.
- Cyanure indolore Ercé 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Cycliton Roche 10, rue Crillon, Paris.
- *Cynabiline r. Fréd.-Chevillon, Allauch.
- Cynaboldine 2, r. du Pensionnat, Lyon.
- *Cynara Rosa 11, rue Roger-Bacon, Paris.
- Cynarine Estèbe à Villefranche-du-Lauragais.
- *Cynefluine 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- Cynhépatil Benderitter, Vendôme (L.-et-C.).
- *Cynurol Rosa 11, rue Roger-Bacon, Paris.
- Cyprol Janelle, pharm., Sens (Yonne).
- *Cyproveinol 18, rue de Beaune, Paris.
- Cystitol 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
- *Cystocône 15, rue des Champs, Asnières.
- Cystocure Calmels, Auterive (H.-G.).
- *Cystoflorine "Angla", Monte-Carlo.
- Cystorénol 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI^e).
- *Cytobaume 8, rue Vivienne, Paris.
- *Cytobiase 25-27, rue du Commandant-Rivières, Colombes (Seine).
- *Cyto-choline Corbière 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Cytomagnésium Oliviéro, Boulogne-s.-S.
- *Cyto-Manganol 27, r. Desrenaudes, Paris.
- *Cytopan 54, rue de Paris, Charenton.
- *Cytopepsal 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Cytophédrètes id.
- Cytophédrine id.
- Cytoplasmine Ducatte 191, rue St-Honoré, Paris.
- Cytopulmase 21, Grande-Rue, Monfermeil.
- Cytosal 60, r. de Miromesnil, Paris.
- *Cyto-Sérum Corbière 27, rue Desrenaudes, Paris.
- *Cyto-Sirop 183, r. de Rome, Marseille.
- Cystostrychnine 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Cytotropines 7, rue Biscornet, Paris.
- Cytuline 18, av. Hoche, Paris

D

- *Daboïne 38, bd Montparnasse, Paris.
- *Damicol 97, rue de Vaugirard, Paris.
- Daturasolène 11, rue de Clichy, Paris.
- Debreyrol L. Bailleul, Mortagne (Orne).
- *Décholestrol Ledent, Montreuil-s.-Mer.
- *Decorpa 41, rue de Rome, Paris.
- Defensol B 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
- *Delbiase 8, rue Vivienne, Paris.
- Delbosel id.
- *Delcaïne Roques 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
- Demalgon 25, bd Latour-Maubourg, Paris.
- Déméteros 163, rue de Flandre, Paris.
- *Demorphène 9, bd Malesherbes, Paris.
- Denisia Brisson 157, rue Championnet, Paris.
- *Denisoline Brisson id.
- *Dentochrysine Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- Dentoline 46, rue Pierre-Charron, Paris.
- *Dentoma 12, bd St-Martin, Paris (X^e).
- Dentoryl 3, r. Ch.-Gounod, St-Raphaël.
- *Dentoval 62, av. des Champs-Élys., Paris.
- Dentoxyl 37, rue Galilée, Paris.
- Depressytol 4 et 6, r. Ordener, Paris (XVIII^e).
- Dépuratif Berry Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- *Dépuratif Chauvin Aubenas (Ardèche).
- Dépuratif infantile Aubenas (Ardèche).
- Chauvin 21, r. de la Gare, La Broque (B.-R.).
- Dépuratif des Vosges 72, rue d'Alésia, Paris.
- Dépuratif Dubreuil 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- Dépuratif du D^r Régior 10, rue du Plâtre, Paris.
- Dépuratif Dumesnil 17, rue des Lois, Toulouse.
- Dépuratif Fuba 39, rue Drouot, Paris.
- Dépuratif Kromelinck 114, rue Demarquay, Paris.
- Dépuratif Nox 49, rue de Maubeuge, Paris.
- Dépuratif Rob-Lechaux 9, place Municipale, Tuile.
- Dépuratif Saint-Michel 46, rue des Faures, Bordeaux.
- n^{os} 1 et 2 2, pl. de la Salamandre, Nîmes.
- *Dépuratif Salganyl 41, route de Turin, Nice.
- Dépuratives Mercier

Dépurhémio

- *Dépuriode
- Dépurlaxyl
- *Dépurogène
- *Dépurogène T
- Dépurose
- Dépursan
- Dercusan
- *Dermacide Porcher
-
- Dermadésine
- Dermajic
- Dermal Hanbro
- Dermaline Corbière
- Dermaline Dèmeule-
naere
- *Dermathorium
- Dermatyon
- Derméon
- Dermobel
- *Dermodulcis
- *Dermofagine
-
- Dermogène
- *Dermo-Génésine
- Dermolène
-
- *Dermolive
- Dermone
- Dermoplastol
- Dermopode
- *Dermoradol
- Dermo-rhinhistol
-
- Dermoschistol
- *Dermose
- Dermoseptazine
- *Dermosplénine
- Dermosufrol
- Dermotyol
- Dermoyse
- *Dermylène Vaille
- *Derphyl
- *Desartyl
- Désensibilisant Chau-
vin
- Désensibilisant Infan-
tile Chauvin
- *Désensibilysine
- *Desintex
- Desitin
- Desitinol
- Détergine
- Dexiode
- Dexogyne
- *Dexoplasma

25 bis, quai de la Bibliothèque,
Lyon.

61, rue de Seine, Paris.

229, cours Gambetta, Lyon.

2, place des Vosges, Paris.

id.

r. des Marchands, Apt (Vaucluse).

23, bd R.-Poincaré, Bar-le-Duc.

78, bd Beaumarchais, Paris.

35, r. des Blancs-Manteaux,
Paris.

41, rue Saint-Pierre, Caen.

23, rue du Grand-Cerf, Meaux.

1, r. de Châteaudun, Rennes.

27, rue Desrenaudes, Paris.

25, rue de Calais, Dunkerque.

51, rue d'Alsace, Courbevoie.

L. Godart, Andenne (Belgique).

3, rue des Rouairies, Dinan.

20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.

85, cours Albert-Thomas, Lyon.

15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
Boulogne-sur-Mer.

10, rue de l'Union, Clichy.

2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).

158, Promenade de la Corniche,
Marseille.

19, rue de Pontevès, Marseille.

80, fg Saint-Denis, Paris.

10, rue du Plâtre, Paris (IV^e).

Évreux (Eure).

25, rue Friant, Paris.

2, rue Claude-Matrat, Issy-les-
Moulineaux, Paris.

Lecronier, Domfront (Orne).

78, bd Beaumarchais, Paris.

21, rue J.-Goujon, Paris.

14, rue des Minimes, Paris.

44, r. de Lagny, Montreuil.

Le Naour, Quimperlé (Finistère).

R. Klein, Baccarat (M.-et-M.).

1, r. du Puits-de-l'Ermite, Paris.

15, r. de Rome, Paris.

8, av. Walkanaer, Nice.

Aubenas (Ardèche).

Aubenas (Ardèche).

Bélières, 19, r. Drouot, Paris.

M. Richard, Aubenas (Ardèche).

8, rue La Fayette, Paris (IX^e).

id.

D^r Bourdeau, à Parthenay.

7, r. de la République, Puteaux.

id.

id.

- *Dextrosol 29, rue de Berri, Paris.
- Dextrospol id.
- Diabétalim 2, rue de Compiègne, Paris.
- *Diabétifuge 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- *Diabétosan 48, rue d'Alésia, Paris.
- Diabétuline Charret-Tomas (St-Just-sur-Loire).
- *Diadermine 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
- Diagnorenol 21, rue J.-Goujon Paris.
- *Diagnothorine id.
- *Dial Ciba 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Dialine 128, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- *Dialyl Brunot 16, rue Boulainvilliers, Paris.
- Dialyses Golaz 4, rue Bellart, Paris.
- Diardyscol 86, bd Port-Royal, Paris.
- Diasclérol 21, rue Norvins, Paris.
- *Diases Progil, 10, quai de Serin, Lyon et Ris-Orangis (S.-et-O.).
- Diasténine Gremy 14, rue de Clichy, Paris.
- *Diastogène 50, rue Nationale, Lille.
- *Diasto-Pepsine Riche-pin Lab. Dr Tissot, 31, bd de Clichy, Paris.
- *Diathermie 12, av. du Maine, Paris.
- *Diathès « Mètère » 24, bd Jean-Jaures, Boulogne.
- *Diatol Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
- *Dibromotyrosine 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
- *Dicaliodé 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- *Dicodéine Lafran 8, rue de Prague, Paris.
- *Didial Ciba 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Diéménal 18, rue de Beaune, Paris.
- *Diénol id.
- Dientyl 14, r. de Normandie, Asnières.
- *Digalène Roche 10, rue Crillon, Paris.
- *Digastrine 11, rue St-Agricol, Avignon.
- Digeryl 33, rue du Bois, Vincennes.
- Digestal Chenu, Montferrand (P.-de-D.).
- Digestif Capmartin 7, rue Charlot, Paris (VIII^e).
- Digestif Dal 36, rue de Verdi, Nice.
- Digestif Goy 23, rue Beautreillis, Paris.
- *Digestif Harvey 101, av. Paul-Doumer, Rueil.
- Digestif Henry 39, rue Sclessin, Liège.
- Digestif Maulin 50, r. de la République, Puteaux, à Bonnelles (Seine-et-Oise).
- Digestif Pinel 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
- Digestif Polvi 21, r. Chaptal, Paris (IX^e).
- *Digestonic Battut, à Vatan (Indre).
- Digestose 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
- *Digex 15, bd Pasteur, Paris.
- *Digibaïne Deglaude Immunos, av. des Sources, Nice.
- *Digicardine id.
- *Digicardine quininés 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Digifoline Ciba 8, rue Favart, Paris.
- *Digi-Lanatine 20, rue Vernier, Paris.
- *Digilanide 8, rue Favart, Paris.
- *Digi-mial-baïne

- ***Digistabiline** 12 r. du Téléphone, Bruxelles.
- Digitale Dausse** 4, rue Aubriot, Paris.
- Digitale Ecalles** 98, rue de Sèvres, Paris.
- Digitale Labelonye** 21, rue Chaptal, Paris.
- Digitaline Homolle et Quévenne** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- ***Digitaline Invar** 25, bd Beaumarchais, Paris.
- ***Digitaline Mialhe** 8, rue Favart, Paris.
- ***Digitaline Nativelle** 27, rue de la Procession, Paris.
- Digitalis Purpurea** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Diiodoforme Taine** 9, rue de la Perle, Paris.
- ***Diiodotyrosine Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- ***Diiodotyrosine Roche** 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
- Dilubyl** 61-63, r. Danrémont, Paris.
- Dimétol Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- Dimol** Bois-Colombes (Seine).
- ***Dinitra** 39, bd de la Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- ***Diocamphine Borne** 79, r. de Paris, St-Denis (Seine).
- Diocol** 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- ***Dionine Borne** 79, r. de Paris, St-Denis (Seine).
- ***Dionol** Fleury, Arcachon (Gironde).
- Dio-Quint** 74, r. de La Fère, St-Quentin.
- ***Diorine** Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
- ***Dioséine Prunier** 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Dipentyl** 42, bd Saint-Marcel, Paris.
- Diphasol** 57, bd A.-Briand, Champigny.
- Dippol** 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
- Dismenine Henry** 39, rue Sclessin, Liège.
- Disménol** Sauter, Bellegarde (Ain).
- ***Dismine Favrot** 6, r. Dombasle, Paris.
- Disolurane** 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
- ***Disonyl** 97, rue Vaugirard, Paris.
- Dissolvarsan** 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
- Disurol** 42, rue des Martyrs, Paris.
- Disuryl** 23, rue des Moines, Paris.
- Ditagel** 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- Dithioléine** 157, rue Championnet, Paris.
- ***Dithioral** 145, bd Haussmann, Paris.
- Diumnal** 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Diurédausse** 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- Diuregan** 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
- Diurégine** Charret-Tomasi, St-Just-s.-Loire.
- Diurélax** 111 bis, rue de Turenne, Paris.
- ***Diurène** 15, rue d'Argenteuil, Paris.
- ***Diuréphédrine** Thorat Le Mont-Dore (P.-de-D).
- Diurésinol** 1, r. des Augustins, Perpignan.
- Diurétique Couturieux** 18, av. Hoche, Paris.
- ***Diurétique Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- ***Diurobromine** 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- ***Diurocalcine Gros** 13, pl. Delille, Clermont-Fd.
- ***Diurocalcine iodurée** id.
- ***Diurocardine** 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- ***Diurocystine** id.
- Di-Uroïdine** 45, bd Lafayette, Calais.
- ***Diurophylline** 13, av. de Ségur, Paris.

- *Diurophyte
- Diurotonine
- Dmégon (Néo)
- *Dmelcos
- Dmesta (Néo)
- Dmetys (Néo)
- Docteurine
- Doganol
- *Dogastro
- Dolental
- Doliseti
- *Doloma
- Dolophos
- Dolosol
- *Dolotensine
- Dolozymes
- *Dolpyc
- *Dolysine Rochereau
- Domnol
- *Donagol
- Dontera
- *Do-Sa-No-Sal
- Dosarter
- *Dosotol
- *Dosurine (Trousses)
- Doxa
- Dozéol Deglaude
- Dracoline
- *Drag-Bil
- *Dragécalcion
- Dragées Adrian
- Dragées anticatar-
- rhales du Dr E. Du-
- hourcau
- Dragées aux Algues
- Marines
- *Dragées Bengué
- Dragées Blagny
- *Dragées Bondonneau
- Dragées Calm
- Dragées Carbonel
- Dragées de Charbon
- Fraudin
- Dragées de fer Cognet
- Dragées de fer Rabu-
- teau
- Dragées gargarisme de
- Luchon
- Dragées de Mastho-
- phile Annic
- Dragées Demazières
- Dragées de Prasion
- Dragées de Royat
- Lorthioir, 22, r. Perceval, Paris.
- 4, pl. de la Gare, Tunis.
- 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- id.
- id.
- id.
- Vignal, Dejoux et Raoux, Péri-
- gueux.
- 52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
- 8, rue Saint-Martin, Paris.
- 187, rue de Créteil, Maisons-
- Alfort (Seine).
- 157, rue Championnet, Paris.
- 29, pl. Bossuet, Dijon.
- Colmant, à Caudry (Nord).
- Foiret, à Montargis (Loiret).
- A. Clanché, Vars (Charente).
- Lab. Sauba, Montreuil-Paris.
- 78, avenue de St-Ouen, Paris.
- Salbris (L.-et-Ch.).
- 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
- Thomas, à Péronne (Somme).
- id.
- 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
- 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- 54, rue de Paris, Charenton.
- 16, rue Charlemagne, Paris.
- 4, pl. de la Gare, Tunis.
- 15, bd Pasteur, Paris.
- 5, av. Boissier, Nantes.
- 3, rue Watteau, Courbevoie.
- 24, av. Mac-Mahon, Paris.
- 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
- Colombes.
- 6, rue Berbisey, Dijon.
- 16, rue Ballu, Paris.
- Paméla, 85, rue Turbigo, Paris.
- 20-22, r. de la République, Lyon.
- 98, rue Jeanne-Maillotte, La
- Madeleine (Nord).
- 15, rue d'Argenteuil, Paris.
- 4, av. Desfeux, Billancourt
- (Seine).
- 43, r. de Saintonge, Paris.
- Comar et C^{ie}, 20, rue des Fossés-
- St-Jacques, Paris.
- Sauba, Montreuil, Paris.
- Montbron (Charente).
- 131, rue de Vaugirard, Paris.
- 14, rue Eug.-Delacroix, Paris.
- 26, av. de Royat, Chamalières-
- les-Clermont-Ferrand (P.-de-D.).

- Dragées d'iodurine**
Dragées Dubourg
Dragées Efgé
Dragées Elkin
*** Dragées Gélinaeu**
Dragées Fernel
Dragées Gesta
Dragées Gmet
Dragées Grimaud
*** Dragées Hecquet**
Dragées hépatiques
*** Dragées Hépto - Ré-**
nales Gros
Dragées Japat
*** Dragées Lebrun toni-**
cardiaques
*** Dragées Lumeval**
*** Dragées Mannet**
Dragées menthol-bo-
rax, cocaïne
*** Dragées Névrosthé-**
niques « Yse »
Dragées Northon
Dragées Nyrdhal
Dragées Pautauberge
Dragées Phlébos
*** Dragées Pierlot**
Dragées pulmonaires
Giry
Dragées St - André-
Mayniel
Dragées Sédo - car-
diaques Péliissier
Dragées Séranti
Dragées Somoedo
Dragées Tasch
*** Dragées Vichy-Amai-**
grissant
Dragées Vityl
Dragélines
*** Drageval**
*** Draguirol**
*** Drainobiline**
*** Drainobyl**

*** Drainochol**
Drainosel
*** Drinal**
Droséfruits
*** Drosol**
Dryam-Microlysat
*** Dryco (Lait sec)**
Dryol
Dulcilax
Dulcrem
*** Duna-caïne (Bains de**
bouche)
- Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.**
43, rue de Saintonge, Paris.
40, av. Secrétan, Paris.
18, r. de Beaune, Paris.
28, r. Velpeau, Antony (Seine).
76, bd Haussmann, Paris.
43, av. de la République, Paris.
27, fg Montmartre, Paris.
La Courtine (Creuse).
49, bd Port-Royal, Paris.
Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.

13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
252, fg St-Martin, Paris.

5, rue de Lubeck, Paris.
52, bd du Temple, Paris.
Loudun (Vienne).
Optima, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.

65, rue Louis-Blanc, Paris.
Cachat, Evian-les-Bains (H.-S.)
12, r. de la République, Puteaux.
10, r. de Constantinople, Paris.
229, cours Gambetta, Lyon.
(Voir : Valériane Pierlot.)

49, rue de Metz, Nancy.

85, rue Turbigo, Paris.

33, av. de Villiers, Paris.
R. St-Maurice, Nanterre (Seine).
à Meudon (Seine-et-Oise).
4, rue d'Illzach, Mulhouse.

Blancher, Vichy (Allier).
72, quai Jemmapes, Paris.
Lab. Sauba, Montreuil-Paris.
(Voir : Dragées Lumeval.)
13, rue Boïnod, Paris (XVIII^e).
Chavanne, Fontaine-Grenoble.
54, Chaussée-d'Antin, et 69, r.
de Provence, Paris.

95, rue de Vaugirard, Paris (VI^e).
73, rue de Balagny, Paris.
Mironneau, Chef - Boutonne.
Route du Moulleau, Arcachon.
J. Boutes, Muret (Hte-Garonne).
42, r. de l'Abbé-Groult, Paris.
5, rue Saint-Roch, Paris.
42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
134, bd Pereire, Paris (XVII^e).
Qulétiéville, Mézidon (Calvados).

17, rue de Berri, Paris.

- *Duna-caïnol
 *Duna-phorine
 Duodénase
 Dusart (sirop, solution)
 *Dycholium
 Dymozyl
 Dynabiose
 Dyn-Acron
 Dynaiode
 Dynamine Connat
 Dynamobiase
 Dynamoferol
 *Dynamogénine du Dr
 Chaboud
 Dynamose
 Dynaserum
 Dynasthénine
 Dynavone
 Dynos
 *Dynosthène
 Dyspepsia
 *Dyspeptine Hepp
 *Dyspné-Inhal
 *Dysthène
 *Dystonine
 Dysurol
 Dyuril
 17, rue de Berri, Paris.
 id.
 12, rue de Nice, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 40, rue des Carmes, Orléans.
 6, rue d'Alsace, Grenoble.
 37, r. de la Haie-Coq, Aubervilliers.
 66, rue d'Hauteville, Paris.
 FOLLIET, Rumilly (Hte-Sav.).
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 55, rue de Chabrol, Paris.
 Rumilly (Hte-Savoie).
 84, fg du Temple, Paris.
 Aubéry, Avignon (Vaucluse).
 MARTIN, Bordeaux - Cenon.
 42, rue de l'Abbé-Grouit, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 183, r. de Rome, Marseille.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.
 Le Puits d'Angle, Le Chesnay.
 38, r. du 11-Novembre, Clermont-Ferrand.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 45, r. Cambronne, Paris (XV^e).
 1, av. de Villars, Paris.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.

E

- Eaton
 *Eau de Charrier
 Eaux de Châtel-Guyon
 Eau de Lorraine
 Eau d'Enghien
 Eau Sova
 *Eaux-Mères
 Ectiazol
 34, rue Vignon, Paris.
 Laprugne (Allier), et 24, av. de l'Opéra, Paris.
 6, square de l'Opéra, Paris
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 10, rue Caumartin, Paris.
 2, rue Volney, Paris.
 Établis. Thermal, Salies-du-Salat (Haute-Garonne).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.

- Ectobiase Bonnay**
***Eczéda**
Eczémacure
Eczémine
***Eczosec**
***Edistol**
Edo-vaccins
***Edricamphre**
***Eductyl**
Edulax
***Efflozone Labocip**
***Egidol**
Egralene
Eitreb-embrocation
***Ektal**
***Ektogan**
***Ektophanol**
***Elastoplaste**
***Elatine Bouin**
Elbon Ciba
***Electrargol Clin**
Electrodes de haute
fréquence
***Elédon**
Eleodermine
***Elgine Julien**
Elipol
***Elixir Bonjean**
Elixir Bravaiss
Elixir Bryol
Elixir Daumy
Elixir de Catéchiode
Elixir de Larsa
Elixir de Pepto - Car-
dine
Elixir dépuratif aux
Algues Marines
***Elixir Déret**
***Elixir Duchamp**
***Elixir Ducro**
***Elixir du Dr Mialhe**
Elixir Duret
Elixir Dussaud
***Elixir eupeptique Tisy**
***Elixir eupnéique Mar-**
tin Mazade
Elixir de fer Kœnig
Elixir Fleig
Elixir Gabail
Elixir Glover
***Elixir Godfrin**
32, Gde-Rue, Nogent-s.-Marne.
15, r. des Blancs-Manteaux,
Paris.
121, av. Saint-Ouen, Paris.
33, Grande-Rue, Besançon.
35, r. des Blancs-Manteaux,
Paris.
40, rue des Carmes, Orléans.
21, rue Jean-Goujon, Paris.
40, rue des Acacias, Paris.
32, rue Assalit, Nice (A.-M.).
4, Chaussée de la Muette, Paris.
19, bd du Parc, Neuilly-s.-Seine.
74, rue Blanche, Paris.
157, r. Champignonnet, Paris.
Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Seguin, 7, r. Ste-Isaure, Paris.
12, rue Lamartine, Paris.
19-21, rue Van-Loo, Paris.
Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).
103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
12, av. du Maine, Paris.
Soc. NESTLÉ, 6, av. César-
Caire, Paris.
4, av. de Bayonne, Pau.
105, rue de Rennes, Paris.
DROUET & PLET, Rueil-
Malmaison (Seine-et-Oise).
23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.
56, bd Ornano, Paris.
97, av. Ledru-Rollin, Paris.
38, r. du 11-Novembre, Cler-
mont-Ferrand.
16, rue du Petit-Musc, Paris.
77, bd de Grenelle, Paris.
5, av. des Tilleuls, Paris.
6, rue Berbisey, Dijon.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
De Grauwe, La Plaine-St-Denis.
20, pl. des Vosges, Paris.
8, rue Favart, Paris.
12, rue de Nice, Paris.
1, rue Fondère, Marseille.
12, rue Charles-V, Paris.
Saint-Raphaël (Var).
37, av. Marceau, Paris.
18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
5, rue Lefebvre, Paris.
13, rue des Minimes, Paris.
6, r. de Paris, Joinville-le-Pont.

- *Elixir Grez 49, rue de Maubeuge, Paris.
 Elixir hépatique Henry 39, rue Sclessin, Liège.
 Elixir Houdé 9, rue Dieu, Paris.
 *Elixir Hymel 90, av. de St-Ouen, Paris.
 Elixir I. A. M. 18, bd de la Liberté, Rennes.
 Elixir iodépuratif Pépin 116, bd Haussmann, Paris.
 Elixir des Jacobins Mougnaud, Longjumeau.
 Elixir Koff Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 Elixir Lyctine 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 Elixir Maltopepsique Chavanne, Fontaine-Grenoble (Isère).
 *Elixir Mannet ferro-ergoté Loudun (Vienne).
 Elixir Mannet à l'Iodure de Potassium id.
 Elixir Mannet à l'Iodure de Sodium id.
 Elixir Tribromuré Mannet au Salol id.
 Elixir Mariani 41, bd Haussmann, Paris.
 Elixir Morlas passage des Princes, Paris (II^e).
 Elixir de Pepsine Boudault Mougnaud, Longjumeau (S.-et-O.).
 Elixir Percy 145, av. Montredon, Marseille.
 Elixir Phospho-Mel 2, pl. Duchesse-Anne, Nantes.
 Elixir polybromuré Yvon 5, rue Robert-Planquette, Paris.
 *Elixir Rodi 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 Elixir Saint-Jean Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 Elixir SEDA 149, av. des Minimes, Toulouse.
 Elixir Spix 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 *Elixir Spes 10, imp. Milord, Paris.
 Elixir supertonic Stella Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 Elixir du D^r Thermes 64, r. des Tournelles, Paris.
 Elixir thiogaïacolé Arquevaux Étampes (Seine-et-Oise).
 Elixir Tonicardiaque Roussel 10, rue Washington, Paris.
 *Elixir Valéro-bromuré (Voir : Valérianate Gabail.)
 Elixir vermifuge Allvers Domergue, Agen (L.-et-G.).
 Elixir vermifuge Chiarini Aix-en-Provence.
 Elixir Virenque 131, rue Vaugirard, Paris.
 Elixir de Virginie Nyr-dhal 12, r. de la République, Puteaux.
 Elixir Vital Quentin 28, rue Velpeau, Antony.
 Elixir Zidal 11, bd de Strasbourg, Paris.
 *Elkin Dragées et Granules Dépruneaux, 18, rue de Beaune, Paris.
 Elzévir Dentition H. Salle, 4, r. Elzévir, Paris.
 *Embrocane Saporta, 59, bd Lefebvre, Paris.
 Embrocation Richer 45, fg Saint-Denis, Paris.
 Embrocation Roche 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).

- *Embrocation Rosso
 Embrocation Siamoise
 *Embryohormone
 *Embryocytol
 *Embryol
 *Embryona-Probios
 Embryonine du Dr
 Barré
 Emencyl
 Emerson's Bromo-Sel-
 tzer
 Emétinol Viel
 *Emgé Lumière
 Emonctine
 Emollian
 *Emplâtres R. Cavaillès
 Emplâtre Duret
 Empyrol
 Emulsion Bonnefond
 Emulsion Marchais
 Emulsion Scott
 *Encyatl Cordonnier
 *Endocaïne-Adrianine
 Endocalcase
 Endocalcine
 *Endocarbone Erce
 Endocrisines Fournier
 Endodermol

 *Endolacgénine
 Endolcalcine
 *Endo-Ovarina
 *Endopancrine
 Endoplex Polvi

 *Endothymusine
 Endoxène
 *Endoxidine
 Energésine
 Energétènes végétaux
 Byla
 Energétyl
 Energine Iodée de
 Berck
 Energine Phosphorée
 de Berck
 *Enésol Clin
 Engelurool
 *Eniode Lefebvre
 Ennego
 *Eno
 Entalva
 Entaseptine

 Entelactol
 *Entérargol
- 63, rue de Charonne, Paris.
 M. Martin, Cloyes (E.-et-L.).
 191, fg St-Antoine, Paris.
 Lab. La Biomarine, Dieppe.
 id.
 8, rue St-Martin, Paris.

 20, rue St-Lazare, Paris.
 20. r. H.-Martin, Vanves (Seine).

 62, av. Champs-Élysées, Paris.
 7, rue Saint-Yves, Rennes.
 45, rue Villon, Lyon.
 G. Baude, St-Aubert (Nord).
 rue Faidherbe, Lille.
 29, rue Singer, Paris.
 61, rue de Vaugirard, Paris.
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
 49, bd Port-Royal, Paris.
 11, pl. Castellane, Marseille.
 6, r. Ad.-La Lyre, Courbevoie.
 52, r. de Cambrai, Lille.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 74, rue des Jacobins, Amiens.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 7, rue Biscornet, Paris.
 42, av. de Draveil, Vigneux-sur-
 Seine (S.-et-O.).
 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 48, rue de la Procession, Paris.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne.
 Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris.
 276, rue Lecourbe, Paris.

 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Alpha, Montreux-le-Ch. (Ht-Rh.).

 10, rue Saint-Leu, Amiens.
 id.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 22, rue de Vienne, Paris.
 2, rue Duphot, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 4 ter, rue Barbès, Courbevoie.
 LUMIERE, 45, r. Villon, Lyon.
 CH. LAVERGNE, r. de Rome,
 Cannes (Alpes-Maritimes).
 24, bd Sébastopol, Paris.
 143, cours de la Somme, Bor-
 deaux.

- *Entéraspirine 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- Entéricure 157, r. Championnet, Paris.
- *Entériode 39, rue de Clichy, Paris.
- Entérisane 112, r. de Gerland, Lyon.
- *Entéro-Antigènes 10, rue Barquette, Paris (III^e).
- *Enterobyl Dehaussy 50, rue Nationale, Lille.
- Entérochir Leclerc, 10, r. Vignon, Paris.
- *Entérococcène 54, r. Fg-St-Honoré, Paris.
- *Entérodausse et Enté-
rodausse calcique 4, rue Aubriot, Paris.
- *Enterofagos 8, av. Walkanaer, Nice.
- Entéroformine 141, rue de Paris, Angoulême.
- Entéroglandex 58, rue de Maubeuge, Paris.
- Entéro-granulé 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- *Entérohépatine 77, bd de Grenelle, Paris.
- *Entéromucine 1, av. de Villars, Paris.
- *Enteropansement du
D^r Zizine 24-26, rue de Fécamp, Paris.
- Enterophage 10, rue Vignon, Paris.
- Entérorubiase 14, av. Perrichont, Paris.
- *Entérosalicyl id.
- *Entéroseptyl 78, bd Beaumarchais, Paris.
- *Entérovaccin Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- *Entéro-Vaclydun 27, rue Desrenaudes, Paris.
- *Entéro-Vioforme 103-107, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
- *Entéroxin 10, rue Vignon, Paris.
- Entérozinc 4, pl. de la Gare, Tunis.
- Enterozone 56, bd Pereire, Paris.
- Entérozyme 52, rue Labruyère, Paris.
- Entéryl Falque, Besançon.
- Enurol Bardet, 76, r. de Sèvres, Paris.
- *Enzypan 41, r. de Rome, Paris.
- *Epanal 47, rue de Bretagne, Paris.
- Ephargol 44, rue d'Inkermann, Lille.
- *Ephasma 50, rue Nationale, Lille (Nord).
- *Ephédermine 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Ephédraféine id.
- Ephédramélis 20, av. J.-Jaurès, Suresnes.
- *Ephédrampoules 194, rue de Rivoli, Paris.
- Ephédargol 99, bd Lafayette, Calais.
- *Ephédrasmine Thorat, Le Mont-Dore (P.-de-D.)
- *Ephédricones 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Ephédrine Béral id.
- *Ephédrine Houdé 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- Ephédrine Proba 40, rue des Acacias, Paris.
- *Ephédrisol 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Ephédrivaine 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
- Ephédrocampfre 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- *Ephédrocure 11 bis, et 13, rue Levert, Paris.
- *Ephédroides Béral 194, rue de Rivoli, Paris.
- Ephédrol 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- *Ephédrolénol 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- *Ephédrolyptol 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- *Ephédromel 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Ephédro-rhinol 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- *Ephéiodine Béral 194, rue de Rivoli, Paris.

- *Ephétropine Béral 194, rue de Rivoli, Paris.
- Ephodol 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Epholéine 40, rue des Acacias, Paris.
- *Ephydion 18, bd de la Liberté, Rennes.
- *Epicral Lambert, rue de la Paix, Vichy.
- Epidermine 112, rue de Gerland, Lyon.
- Epidosine Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
- Epimesthol 33, rue Vaugirard, Paris.
- *Epipaline 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI^e).
- Epocl 14, r. Demarquay, Paris.
- Epoqualine François 16, cours Gambetta, Lyon.
- *Equisétol 59, rue Boissière, Paris.
- *Eranol 45, rue de l'Échiquier, Paris.
- Eranyl Sanson, Mer (Loir-et-Cher).
- *Erцерhinol 1, av. de Villars, Paris.
- Ergényl 1, pl. du Griffon, Lyon.
- *Ergépatine St-Just-en-Chaussée (Oise).
- Ergocoline 32, rue de l'Ouest, Paris.
- Ergophédrine Chauvin, Aubenas (Ardèche).
- *Ergophos 3, rue Royet, Lyon-Caluire.
- *Ergorone 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Ergostol Violet 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
- Ergot de seigle Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
- *Ergotine Bonjean 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- Ergotine Lamante M. Paris, 1, r. Lassalle, Lyon.
- Ergotine Yvon 5, rue Robert-Planquette, Paris.
- Ergotinine Tanret 10, r. du Com^t-Rivière, Paris.
- Ergotinine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Erystypticum Roche 10, rue Crillon, Paris.
- *Erysulfure Eon Dinan (Côte-du-Nord).
- *Erythéma 139, rue Jean-Jaurès, Maisons-Alfort (Seine).
- *Erythra 39, bd de la Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- Erythraseptol 3, pl. Thiers, Le Raincy.
- Erséol Prunier 4, rue de la Coutellerie, Paris.
- Esanofèle Bisleri 25, rue Dagorno, Paris.
- Escaine 14, av. Perrichont, Paris.
- Esculéol 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- Eska 76, rue Orfila, Paris.
- Essence algérienne pl. de l'Entonnoir, Berck-Plage.
- Essence alsacienne 11, r. La Fayette, Paris.
- Essence japonaise 79, rue Legendre, Paris.
- Essence Landaise 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- Essoforme Simon, 44, r. Inkermann, Lille.
- Etain Amicros 177, rue de Courcelles, Paris.
- Ether amyvalérianique 36, rue de Paris, Colombes.
- *Ether anesthésique 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Adrian 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Ether anesthésique Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Ether pour narcose 8, rue Vivienne, Paris.
- Ether valérianique Vial 18, rue de Jouvence, Dijon.
- Ethoforme
- *Ethyl-Pneumine Ler-sam 14, rue Maublanc, Paris.
- Etoléase Chauvin, Aubenas (Ardèche).
- *Eubine 18, r. de Ménilmontant, Paris.

- Eucalcium**
Eucalcyl
Eucalinhal
Eucalyptéol Antoine
***Eucalyptine Le Brun**
***Euchol**
Eucortone
Eucratol
Eudermyl
Eudigérase
Eudynol
Euférine
Eufosyl

Eugaline
Eugastrol
Eugéine Prunier
Eugestol

***Euglyma**
***Eugynol Grandval**
Eukéno! Clément
Eukiniase Carrion
Eumictine Leprince
***Eunéryl**
***Euonymine P. Thibault**
Eupatorine

***Eupaveryl**
***Eupeptique Monavon**
Eupeptyl
Euphélios
Euphénine Bastia
***Euphon**
Euphonol Aguetant
Euphorine du Dr Chaboud
Euphorol Loudenot
***Euphoryl**
***Euphoryl Infantile**
Euphrenine Bastia
Euphysol

***Euphytose**
Euplasmol
***Euplastyl**
Eupnéol
***Eupnine Vernade**
***Eupnogéno!l**
***Eupno!l**
Eupno!léine
***Eupnophédrol**
Euprandiol
***Eupulmol**
***Euquinargol**
Eurectol
Eurexine

 50, bd de Paris, Marseille.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 98, r. J.-Maillo!te, La Madeleine.
 8, rue Vivienne, Paris.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 Morellet, Bagnoles-de-l'Orne.
 Scott, fg St-Honoré, Paris.
 74, rue de Lourmel, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 112, rue de Gerland, Lyon.
 11, quai St-Clair, Lyon.
 7, rue des Petits-Carreaux, Paris
 41, av. Joffre La Garenne-Colombes (Seine).
 r. Albert-I^{er}, Beaumont-sur-Oise.
 8, r. de Passy, Paris.
 4, rue de la Coutellerie, Paris.
 187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine).
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 12 et 14, rue Féry, Reims.
 7, pas. Thionville, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 9, bd Malesherbes, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Lab. d'Allopathie générale, Brignais (Rhône).
 130, bd Haussmann, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 66, r. d'Hauteville, Paris.
 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.

 106, av. du Roule, Neuilly-s.-S.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 id.
 1, pl. Carnot, Lyon.
 722 bis, av. de St-Cloud, Versailles.
 14, rue de Miromesnil, Paris.
 79, rue de Wazemmes, Lille.
 13, rue Beudant, Paris.
 21, rue des Roses (Dijon).
 r. St-Maurice, Nanterre (Seine.).
 116, av. Berthelot, Vienne (Isère).
 26, r. des Moines, Paris (XVIII^e).
 id.
 id.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 Chavatte, r. de France, Roubaix
 60, r. J.-Jaurès, Firminy (Loire).
 Tours (I.-et-L.).
 11, rue des Postes, Angoulême

- Eurhéine**
***Eurinase**
Euronal
Eurythmine Dethan
Eusébine
***Eusedyl**
***Euskine**
***Eusomnine Bélières**
Eutectyl
***Eutensyl Grémy**
Euvagol
Evaloïne
***Evatmine Carrion**
***Evine**
Evobiline
Evolax
***Evolaxine**
***Evonyl**
Excytol
***Exentérol**
***Exhépa**
***Exobol**
- Exol Cognet**
Exolysés Byla
***Exometalion**
Exonagar
Exonérol
Exorphyl
***Exsugyl**
***Extensoplast**
Extrait antiseptique du
D^r Wolf
Extrait Bile Boudier
***Extrait de Bile Le-**
francq
Extrait de céréales
Adrian
***Extrait de Malt Fran-**
çais Déjardin
Extrait de Malt Grütli
- Extrait du D^r Rap**
***Extrait fluide de Bar-**
dane Dausse
***Extrait Hamyd**
***Extrait Hépatique Le-**
francq
Extraits injectables
Choay
Extrait Juvinium
Extraits Moncour
Extraits totaux Choay
- 7, pas. Thionville, Paris.
 Fleury, Arcachon (Gironde).
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 11, r. Al.-de-Neuville, Paris.
 Radifer, Nantes (L.-Inf.).
 32, r. des Vallées, Colombes.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 108, rue du Mal-Pétain, Vichy.
 14, rue de Clichy, Paris.
 17, rue Chomel, Paris (VII^e).
 75, bd de Strasbourg, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme).
 40, rue de Bellechasse, Paris.
 Fluxine, Villefranche (Rhône).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 160, rue de Monceau, Paris.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 12, rue du Chemin-Vert, Ville-
 neuve-la-Garenne (Seine).
 43, rue de Saintonge, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 14, rue Demarquay, Paris.
 8, rue de Passy, Paris.
 150, r. de Paris, Pantin (Seine).
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 9, r. de la Gare, Levallois (Seine).
 46, rue des Faures, Bordeaux.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 36, av. de Metz, Romainville.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 10, r. Parent-de-Rozan, Paris
 (XVI^e). (Voir Malt.)
 139, av. de Verdun, Issy-les-
 Moulineaux.
 29, rue Singer, Paris.
 (Voir : Bardane stabilisée.)
 27, fg Montmartre, Paris.
 36, av. de Metz, Romainville.
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
 sur-Seine.
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.

Extrait surréal Meurice
Extrait de Yogourth Ilgaz
*Exubyle
Exugyl

61, av. Louise, Bruxelles.

13, rue Nouvelle, Charenton.
7, rond-point Mirabeau, Paris.
Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).

F

Fabérian (dragées, ovules, pommades, suppositoires)

*Fanerval

*Fango Fisch

*Fantine Adoue

Fantol

Fantyl Manseau

Farines maltées Heudebert

Farine de Soja«Soyolk»

Farine lactée diastasée Salvy

Farine lactée Heudebert

Farine lactée Larousse

Farine lactée Nestlé

*Farine maltée Vial

Farine Mont-Blanc

Farines Benedictus

Farines de céréales, de légumes

Farines de céréales, légumes et fruits

*Farines de régime Bloch

Farines Favrichon

Farines Maltées Favrichon

Farines Maltées Jamme

Farines Nutricia

Farine Redeuil

Farré-Cure

112, rue des Pyrénées, Paris.

42, r. Mont-Cenis, Paris.

Mer Rouge, Mulhouse (Ht.-Rh.).

36 bis, r. Scaliger, Bordeaux.

22, r. de l'Arsenal, Angoulême.

à Margaux (Gironde).

85, r. de Saint-Germain, Nanterre.

25, rue Général-Foy, Paris.

4, rue Lambrechts, Courbevoie.

85, r. de St-Germain, Nanterre.

99, Cours Balguerie, Bordeaux.

6, av. César-Caire, Paris.

8, rue Vivienne, Paris.

Rumilly (Haute-Savoie).

74, rue Lamarck, Paris.

Heudebert, Nanterre (Seine).

BLOCH, Tomblaine, près Nancy (M.-et-M.).

à Tomblaine, près Nancy.

St-Symphorien-de-Lay (Loire).

St-Symphorien-de-Lay (Loire).

47, rue Miromesnil, Paris.

142, r. Fransman, Bruxelles.

7, rue Couche, Paris (XIV^e).

29, rue Mogador, Paris.

- Favexir
 Febrifuge Couturieux
 Fébrifuge
 Fébriline
 Fébrosérum Kylna
 *Féculyse
 *Félamine
 Félargent
 Félicol
 *Félisedine
 Félosine
 Felsol
 *Féminadène
 Féminoglandol
 *Feminol
 Féminose
 *Fénucalcium
 Fenugrec Ravin
 *Fenugrène
 *Fénurobur
 Fer Amicros
 *Férandrine Vitalis
 Fer-Arsenic
 Fer-Basma
 *Fer Bravais
 Fer Henry
 Fer injectable Rousse
 Fer intraveineux
 Fraisse
 Fériode Byla
 Fer-ion
 Fer Jaquemaire
 Fer Larcade
 Fer Manganèse Amicros
 *Ferment Dep
 Fermentérol
 *Fermentéryl
 Ferment lactique Van
 Lier
 Ferment pur de raisins
 *Ferment pur de raisin
 Jacquemin
 Ferment pur de raisin
 Médicoferment
 Ferments immuno-
 lactiques
 Ferments lactiques
 Fabre
 Ferments organiques
 Zévon
 *Férogyl
 *Fer-Ovarine Vitalis
 Fer Quévenne
 Fer Rabuteau
 Ferrocaltbiose
- 39, r. de Reims, Vichy.
 18, av. Hoche, Paris.
 Molière, à Constantine.
 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
 4, r. Lamartine, Nanterre (Seine).
 20, rue Vernier, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 10, rue Vignon, Paris.
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 Pl. Homme-de-Fer, Strasbourg.
 120, rue Lecourbe, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 M. Robilliart, pharmacien, Lille.
 7, rue Coq-Héron, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 2, pl. des Vosges, Paris.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 177, r. de Courcelles, Paris.
 40, bd de Charonne, Paris.
 Aucher, La Ferté-Macé (Orne).
 Palc, Messigny (Côte-d'Or).
 de Grauwe, La Plaine-St-Denis.
 39, rue Sclessin, Liège.
 28, r. Velpeau, Antony (Seine).
 8, rue Jasmin, Paris.
 26, av. l'Observatoire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 177, r. de Courcelles, Paris.
 44, rue Taitbout, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 30, r. St-Jacques, Namur (Bel-
 gique).
 10, rue de la Viotte, Besançon.
 à Malzéville-Nancy (M.-et-M.).
 10, rue de la Viotte, Besançon.
 8, av. des Sources, Nice.
 33, r. de la Haie-Coq, Auber-
 villiers (Seine).
 Coirre, 5, bd Montparnasse,
 Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 40, bd de Charonne, Paris.
 26, rue Petit, Saint-Denis.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 164, rue St-Honoré, Paris.

- Ferrocalcine** 86, rue de la Réunion, Paris.
Ferrocalcose 71, rue du Fort, Aubervilliers.
Ferrocodile et Ferrico-
dile Leprince 62, rue de la Tour, Paris.
Ferrogyll 3, bd Beaumarchais, Paris.
Ferroneurol Termes, Miramont-de-Guyenne.
Ferropeptone 17, rue Cadet, Paris.
***Ferrophytine Ciba** 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
***Ferroxyline** 26, Gde-rue-St-Clair, Lyon.
Ferrygène Carrau 34, bd de Clichy, Paris.
***Ferydal** 29, av. Charras, Clermont-Fer-
 rand.
Fibrinine 1, av. de Villars, Paris
Fibrogénine Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
Ficabyl 20, r. du Fg-Saint-Honoré, Paris.
Fidulac Warin 4, chaussée de la Muette, Paris.
Figadol Vivien 45, r. du Marché, Neuilly-s.-S.
***Filhosa** 133, rue Lecourbe, Paris.
Filtrat Inosepta 60, rue de Monceau, Paris.
***Filtraxyl** Mexyl, 6, r. des Dames, Paris.
***Fixase** 28, rue Guibal, Marseille.
***Fixase Irradiée** id.
Fixocalcine 9, rue Victor-Letalle, Paris.
Fixogène Loudenot 106, av. du Roule, Neuilly-s.-S.
Fixophos 151, rue de Charenton, Paris
Flavol-Boeglin Haguenau (Bas-Rhin).
***Flavuirol** 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV°).
Flébosanine 22, r. de la Sorbonne, Paris.
***Flétagène** 62, r. de la Brauderie, Château-
 roux.
***Flétase** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
***Flétobiol** 13, rue Pavée, Paris.
***Flétonic** 14, rue Demarquay, Paris.
***Fletyol** Novita, Reichshoffen (B.-R.).
Flocons d'avoine Nu-
tricia 142, rue Fransman, Bruxelles.
Floculysine 122, Champs-Élysées, Paris.
Floravène Mortier et C^{ie}, Bordeaux.
Floréases 12, bd St-Martin, Paris.
Floréal 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse
Florhamélis Cavy, à Montluçon (Allier).
***Florhépatine** 45, fg Saint-Denis, Paris.
Florisana 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
Florisédyl 42, bd Saint-Marcel, Paris.
Florosine 58-60, r. des Moulins, Valence.
***Flor-Peyotl** 54, Chaussée-d'Antin, et 69, r.
 de Provence, Paris.
***Fluase** r. Fréd.-Chevillon, Allauch (B.-
 d.-R.).
***Fludiose** 1-3, r. Malherbe, à Beauvais.
Fluène 12, r. de la République, Puteaux.
Fluenzyl 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Fluérase Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
Fluidbos Moyet 5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
***Fluidobile** Michel, Clirey-s.-Vezouze (M.-et-M.)

Fluidostérol

- *Fluobyl 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
- *Fluocholine 38, bd Bourdon, Neuilly, Paris.
- *Fluodyle 50, rue de Turenne, Paris.
- *Fluiformol Gonin 10, rue René-Bazin, Paris.
- *Fluoganèse 60, rue Saussure, Paris.
- *Fluokol 46, rue de Rome, Marseille.
- *Fluol Laffort, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
- *Fluor dia 43, av. Kléber, Paris.
- *Fluosalyl 50, rue de Lille, Tourcoing.
- *Fluveinose Mauchant 43, av. Kléber, Paris.
- *Fluvia Gennevilliers (Seine).
- *Fluxhémol 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
- *Fluxidia 112, rue de Gerland, Lyon.
- *Fluxine (gouttes) 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
- *Fluxivenol Fluxine, Villefranche (Rhône).
- *Fluxossan 14, r. Demarquay, Paris.
- *Focalyne Chavanne, Fontaine, Grenoble.
- *Fœnugol 153, bd Montparnasse, Paris.
- *Foie - Endocrisines 88, rue Duhesme, Paris.
- *Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
- *Fokienyl 117, rue de Belleville, Paris.
- *Foliavène 59, rue Boissière, Paris.
- *Follestrine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- *Follicormone buccale 30, r. de Miromesnil, Paris.
- *Folliculine Crinex 1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.
- *Folliculine cristallisée 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- *Follilobine 21, r. de Neuilly, Nanterre.
- *Folliovarine Laleuf 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
- *Fondants de Soufre 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- *Fondant Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
- *Fondant Iodotanique 11 ter, av. de Ségur, Paris.
- *Forcival 11, r. du Gal-Foy, St-Étienne.
- *Fordynol 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- *Foriod 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- *Formadermine 3, rue Dunkerque, Paris.
- *Formagol Bouty Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Formétine 71, rue Ste-Anne, Paris.
- *Formicalcine 9, rue de la Perle, Paris.
- *Formine Adrian 151 bis, r. de Joinville, Cham-
- *Formitrol Wander pigny.
- *Formobenzyl 50, rue Nationale, Lille.
- *Formocarbène 1-3, rue Malherbe, Beauvais
- *Formocarbos (Oise).
- *Formocholine Millet, Rambouillet (S.-et-O.).
- *Formocitrine 36, r. des Francs-Bourgeois,
- *Formogastrine 37, av. J.-Coutant, Ivry-s.-S.
- *Formojectine 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
- *Formoline 112, rue de Gerland, Lyon.
- *Formosaline Houdé rue de la Loge, Montpellier.
- *Formo-Vaccins 99, rue Dieu, Paris (X^e).
- 154 bis, rue Breteuil, Marseille.

***Formule Jacquemaire**

N° 60
 Formyl
 *Fornose
 Fortiane
 *Fortitonyl Clars
 *Fortossan Ciba
 Forvital
 Foscal Serono
 *Fosfomagnyl
 *Fosfoxyl Carron
 *Fosyls Carron
 *Francalcium
 *Francoplaste Kraus
 Frangoléine
 Frangulose Flach
 *Franlaxol
 *Freinolutéine
 Freinospasmyl
 Leprince
 *Frenasma
 Frène Gmet
 *Frenovex
 Frey
 Frialine Grémy
 *Frigyl
 Frixol
 Fructines Vichy
 Fructuval
 Frugeolines Vichy
 Fruits de Régime
 Tilloy
 Fucobiline Prothière
 Fucodinitrol
 Fucogem
 Fucoglycine
 Fucophosphine
 *Fucosine Prothière
 Fuculose
 *Fucus Gmet
 *Fucusol
 Fumar du D^r Fournier
 *Fumigalène
 Fumigator Gonin
 Furcol
 Furoncide
 Furonculase
 Furonculine
 *Furoplast
 Furosyl
 Fusol

Fluxine, Villefranche (Rhône).
 23, r. Valéry-Meunier, Pau.
 70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).
 Bonnafé, Milliau (Aveyron).
 18, rue St-Sulpice, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.

Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 25, rue Dagorno, Paris.
 92, av. de St-Mandé, Paris.
 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
 3, rue Saint-Roch, Paris.
 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 à Algurande (Indre).
 6, rue de la Cossonnerie, Paris.
 3, r. St-Roch, Paris.
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.

62, rue de la Tour, Paris.
 71, rue Saint-Blaise, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.
 12, rue Montmartre, Dijon
 (Côte-d'Or).
 14, rue de Clichy, Paris.
 F. Montanton, Buzançais (Indre).
 4, rue Richer, Paris.
 1 et 3, r. Lafloque, Vichy.
 Lab. du Comtat Viticole, Avi-
 gnon (Vaucluse).
 1 et 3, rue Lafloque, Vichy.
 J. Midy, 41, av. Joffre, La
 Garenne (Seine).

55, rue Auguste-Comte, Lyon.
 42, r. de la Boule-Rouge, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 Couget, à Olonzac (Hérault).
 55, rue Auguste-Comte, Lyon.
 223, rue Saint-Martin, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 Saint-Sever (Landes).
 7, r. du Marché, Blaye (Gironde).
 60, rue Saussure, Paris.
 47, r. Carnot, Versailles (S.-et-O.).
 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 Couget, à Olonzac (Hérault).
 9, r. de la Gare, Levallois.
 156 r. des Fauvelles, Courbevoie.
 154 bis r. Breteuil, Marseille.

G

- Gabiol** 2 bis, rue Chevalier-de-la-Barre, Saint-Quentin.
- Gadilène Vasseur** 114, r. Faidherbe, Boulogne-sur-Mer.
- Gadiodine** 38, rue des Lices, Angers.
- *Gaduamine** 35, r. de Paris, Clichy (Seine).
- *Gaduase** Servier, Orléans (Loiret).
- Gaduine algovitinée** Fontanier, Moulins-sur-Yèvre
- Gaïacalcine Latour** 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- *Gaïacamphre** 18, r. Mal-Foch, Versailles.
- Gaïcanthine** 133, rue Lecourbe, Paris (XV^e).
- Gaïacodil Godard** 13, rue Chernovitz, Paris.
- *Gaïacoline** 63, rue de Charonne, Paris.
- Gaïacol phosphaté Pautauger** 165, r. Saint-Denis, Courbevoie.
- Gaïacophosphal Clin** 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Gaïarsénan Ducatte** 191, rue Saint-Honoré, Paris.
- Gaïarsol Bouty** 3, rue de Dunkerque, Paris.
- *Galabactéine** 154 bis, rue Breteuil, Marseille.
- Galactina** 68, rue Phalsbourg, Le Havre.
- Galactogène Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris
- *Galactogil** Jacquemaire, Villefranche (Rhône).
- Galactose** 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Galaphos** 92, r. C.-Pelletan, 2, r. d'Amiens, Marseille.
- Galazène** 15, quai Bourbon, Paris.
- Galegalactol** 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Galiform** 20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
- Galliasec** 11, r. de Prony, Paris.
- *Gambéol** 42, r. É.-Deschanel, Courbevoie.
- Gamostyl** 43 et 45, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- *Ganderma** 42, r. É.-Deschanel, Courbevoie.
- Gangliosaa** 2, allées Spach, Strasbourg.
- *Gardénal** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Gardorinol** 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Garéphédrine** Thorat, Le Mont-Dore.
- Gargarinal** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Gargarisme Lancosme** 71, av. Victor-Emmanuel-II, Paris.

- *Gargarisme du Mont-Dore
 Gargarisme Salmon
 *Gargyl
 Garnitures Obstétricales « Parturia »
 Garsedol
 *Gasmanyl
 *Gasmar Legendre
 *Gastéose
 Gastergyl
 Gastérinase
 Gastérine Frémont
 Gastérodyne
 Gastérol
 Gastérophiline
 Gastiase
 Gasto-Entérol
 *Gastrépatine
 *Gastrhéma
 Gastrhépase
 Gastria
 *Gastricine du Dr
 Duhourcau
 Gastrilène
 Gastrine Mercier
 Gastrisodyl
 Gastrobellone
 Gastrobiase
 *Gastrocalcine
 Gastrocalmine
 Gastrocaol
 Gastrocarbone
 *Gastrocitrine
 *Gastroclean
 Gastrocolase
 Gastrodium
 Gastrofluid
 Gastrolex
 *Gastronaldine
 *Gastroniger
 *Gastropansement
 *Gastropeptyl
 Gastrophiline
 Gastrosaline
 Gastrosalvine
 *Gastro-Sédatif Atcia
 Gastrosédase
 *Gastro-Sodine
 Gastrosic Léo
 Gastrosthérol
 Gastrotherib
 Soulas, Surgères (Ch.-Inf.).
 151, r. Charenton, Paris (XII^e).
 Chemineau, à Vouvray (I.-et-L.).
 Echard-Gillier, l'Arbresle (R.).
 Simon, 44, r. Inkermann, Lille.
 E. Verdon, Celles-sur-Belle (D.-Sèvres.).
 Houilles (Seine-et-Oise).
 37, rue Brochant, Paris.
 15, r. Corneille, Lille.
 77, bd de Grenelle, Paris.
 à Vichy (Allier).
 137, fg St-Antoine, Paris (II^e).
 37, rue Galilée, Paris.
 rue Balainvilliers, Clermont-Fd.
 14, rue Demarquay, Paris.
 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
 29, fg de Bourgogne, Orléans.
 71, r. Saint-Blaise, Paris (XX^e).
 Cellier, Saint-Uzé (Drôme).
 Miraton, Châtel-Guyon.
 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).
 Richard, Aubenas (Ardèche).
 41, route de Turin, Nice.
 27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme).
 49, rue du Château-d'Eau, Paris.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 178, rue Montmartre, Paris.
 Benderitter, Vendôme (L.-et-C.).
 Saint-Louis (B.-du-Rhône).
 Luc-sur-Orbieu (Aude).
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
 14, av. Perrichont, Paris.
 51, rue de Paris, Pierrefitte.
 66, bd Exelmans, Paris (XV^e).
 Bertrand, Nomexy (Vosges).
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
 24-26, r. de Fécamp, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
 Lab. du BLOSSET, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 id.
 22, rue des Martyrs, Paris.
 41, rue de Rome, Paris.
 21, rue Violet, Paris.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 29, av. d'Orléans, Paris.
 5, r. Paul-Barruel, Paris.

- *Gastrozymase Bouty 3, r. de Dunkerque, Paris.
 *Gastruth 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 Gastryl 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
 Gatercodéine Domergue, Agen (L.-et-G.).
 *Gatran 14, r. A.-Briand, Levallois-Perret.
 *Gaurol 830, r. Armand-Sylvestre, Courbevoie.
 *Gaurol intraveineux id.
 Gaze Anadhère 29, rue Singer, Paris.
 Gaze Néolée 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 *Gécan Géha, Port-de-Bouc (B.-du-R.).
 Gelchol 56, rue Beaubourg, Paris.
 Gelciver 47, rue Maleret, Bordeaux.
 Gelée antidiarrhéique 45, rue Villon, Lyon.
 Lumière Ivago, 17, rue de Provence, Paris.
 Gelées Vaccins Golderberg 40, rue du Plâtre, Paris.
 Gélécime Dumesnil 16, rue St-Yon, La Rochelle.
 *Géliderm 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 *Gélobarine 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 Géloboldine 121, av. de Saint-Ouen, Paris.
 Gélocalcine 38, bd Bourdon, Neuilly-s.-S.
 *Gélogastrine Leurquin, Dreux (E.-et-L.).
 Gelok 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Gélo-Pansement Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Géloptone 63, rue Faisanderie, Paris.
 *Gélor 35, rue Cler, Paris.
 Gélo-Son 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 *Gélotanin 49, rue de Bitche, Courbevoie.
 *Gélotube 29 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 Gelsémium Dausse 38, rue du Louvre, Paris.
 Gemaline id.
 Gemiodol id.
 Gemmenagol id.
 Gémocarpine 49, bd Port-Royal, Paris.
 *Génacide 76, rue des Jacobins, Amiens.
 Génaldyl 78, av. St-Ouen, Paris (XVIII^e).
 Génalyptol 4, pl. des Vosges, Paris.
 *Génatropine 13, rue Mélingue, Paris.
 Gencigel 33, Grande-Rue, Besançon.
 *Génécarmine 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
 Génergosine 4, pl. des Vosges, Paris.
 *Génésérine 27, fg Montmartre, Paris.
 Genêt Gmet 4, pl. des Vosges, Paris.
 *Genhyoscyamine 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 Génisténal 24, rue de Montessuy, Paris.
 Génoderme 3, bd Courcelles, Paris.
 .Génolactine 4, pl. des Vosges, Paris.
 *Génomorphine id.
 *Génoscopolamine id.
 *Genosthéniques id.
 *Génostrychnine id.
 Génovital 3, rue Dulong, Paris.
 Génurine Boucly, Gde Place, Louvroil (Nord).

- Génysil
 Géo-baryum
 Géodyl
 Géraldine
 Geranine
 Geraseptol
 Gerasol Cimon
 Gerceure
 Gercéol
 Gercérine Eon
 Germex 42
 * Germidor
 * Germinol
 Germocalcine
 Germoléol
 Germolysine
 * Germose
 Germyl
 Gérol Testart
 Gesto Serum
 Giberol
 Girasiol Dumesnil
 Givrinol
 * Glandex phoscalcique
 * Glandimbine Lafran
 * Glandocalcyl
 Glandophile
 Glandovital
 Glaucurool
 Glaukosan Levogyre
 Glaxo
 * Gléfin
 * Glésol
 Globabyl
 Globépal
 * Globexine
 * Globinofer
 Globugénol
 Globular
 Globules Chomel
 Globules Hébert
 * Globules Fumouze
 Globules Laincar
 * Globules Rébaud
 * Globules Romon
 Globules Secrétan
 Glomalt (Malt Wan-
 der)
 * Glottyl
 * Gloxines
 * Glucalcium RX
 Glucalone
 * Glucamonix
 Gluchol
 7, rue St-Isaure, Paris.
 Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
 39, r. de Bourgogne, Paris.
 121, av. de St-Ouen, Paris.
 19, rue de la Porte-Trivaux, Cla-
 mart (Seine).
 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
 34, bd de Clichy, Paris.
 rue Balainvilliers, Clermont-Fd.
 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.
 3, r. des Rouairies, Dinan.
 85, rue du Canal, Roanne.
 Grasse (Alpes-Maritimes).
 8, rue St-Martin, Paris.
 29, rue de Metz, Toulouse.
 Blanc, Barcelonne - du - Gers.
 2, Gde-Rue, Enghien (S.-et-O.).
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
 9, rue Petitot, Dijon.
 Chalais (Charente).
 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
 pl. Thiers, Le Raincy (S.-et-O.).
 10, rue du Plâtre, Paris.
 14, rue d'Auge, Caen.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 8, rue de Prague, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 15, r. Martel, Paris.
 id.
 74, rue Blanche, Paris.
 59, r. de Charenton, Paris.
 46, rue Claude-Lorrain, Lille.
 348, rue Saint-Honoré, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 25, r. de Calais, Dunkerque.
 3, rue de Duinkerque, Paris.
 Scientia, 21, r. Chaptal, Paris.
 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
 Comtos, Feschés - le - Châtel
 (Doubs).
 Géha, Port-de-Bouc, Marseille.
 23, r. Beautreillis, Paris.
 à Saint-Lô (Manche).
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 33, bd Dubouchage, Nice.
 11 ter, av. de Ségur, Paris.
 71, av. de Clamart, Issy-les-
 Moulineaux (Seine).
 151 bis, rte de Joinville, Cham-
 pigny (Seine).
 20, rue du Laos, Paris.
 6 bis, rue Campagne-P^{re}, Paris.
 8, rue Dubrunfaut, Paris.
 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
 56, rue Beaubourg, Paris.

- *Glucobiocalcium 63, rue de Charonne, Paris.
- *Glucochaux E. Dufour, Amplepuis (R.).
- *Glucocithine 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- Glucoflavine rte Nationale, Wattignies (N.).
- Gluconate de calcium Sandoz, 20, r. Vernier, Paris.
- Sandoz 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
- *Gluconyl 14, avenue Perrichont, Paris.
- *Glucosalyl 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
- Glucose D 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- *Glucosium 71, bd Carnot, Toulouse.
- *Glucoxyl Nacher 55, av. des Écoles, Cachan.
- Gluphosol 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- *Gluquinix id.
- Glutéokina 16, cours Gambetta, Lyon.
- Glutines Chabre 14, rue des Pyramides, Paris.
- *Glutinettes d'Aspirine 24, rue Paul-Bert, Paris.
- Glutipolysalyl id.
- *Glutisalyl 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- Gluti-Santal 21, rue de Lyon, Paris.
- Glycalcion 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
- *Glyçarsol 13, rue Antoine-Vollon, Paris.
- Glycaspirine 3, bd Saint-Martin, Paris.
- Glycérine créosotée Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- phosphatée Catillon 151 bis, r. Joinville, Champigny.
- Glycéro-bromurine Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Glycéro Gloma 5, rue Mézelle, Tarare (Rhône).
- Glycéro-iodurine 6, rue Dombasle, Paris.
- Glycérolive Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Glycérométhylarsénié 13, bd de La Chapelle, Paris.
- Glycéro-ovarine 11, rue Milton, Paris.
- Glycérophosphate Dal- 48, rue d'Alésia, Paris.
- loz 6, rue Abel, Paris.
- Glycérophosphate Le à Villefranche (Rhône).
- Perdriel 13, rue de Poissy, Paris.
- Glycérophosphates de Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- chaux granulé Gi- id.
- rard 4, pl. des Vosges, Paris.
- Glycérophosphates Dalin, 49, q. St-Vincent, Lyon.
- Freyssinge 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- Glycérophosphates 10, rue Gay-Lussac, Paris.
- Jacquemaire 18, av. Hoche, Paris.
- *Glycérophosphates 1, av. Lowendal, Paris.
- Robin 4, rue de la Coutellerie, Paris.
- Glycéro-Thyroidine 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
- Glycéro-Tribromurine
- *Glycobyl
- *Glycocarpine
- Glycogène Clin
- Glycojasol
- Glyco-lactimase
- *Glyco-M.
- Glyco - phénique du D^r Déclat
- Glycophosphates gran- nulés Astier

- *Glyco-Thymoline 76-78, rue Dareau, Paris (XIV^e).
 Glyctone phosphatée Arquevaux, à Étampes (Seine-et-Oise).
 Charrière
- *Glyphéranol 52, rue des 5-Diamants, Paris.
 Glyphospher 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
- *Gmet (Extraits) 27, fg Montmartre, Paris.
 Gobérol 26, av. de Royat, Chamalières-
 lès-Clermont-Ferrand.
- Gobillettes Hypnos Chabeuil (Drôme).
 Golarsyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- *Gomenol 48, r. des Petites-Écuries, Paris.
 Gometer 1, av. de Villars, Paris.
 Gométyl id.
- *Gonacrine 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 *Gonagone 54, fg St-Honoré, Paris.
- *Gonarthri Vaclydun 27, rue Desrenaudes, Paris.
 Gonéine (Capsules) 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 Gonocure Sauba, Montreuil.
- *Gono-Vaclydun 27, rue Desrenaudes, Paris.
 Gonoyatrène 92, rue Bobillot, Paris.
 Gonurol A et B 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 Gorgéine Foiret, à Montargis (Loiret).
 Gorgex 33, Grande-Rue, Besançon.
- Gosiérine Dalloz 13, bd La Chapelle, Paris.
 Gossyl 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- *Gossypiol Maurin 19, rue Brunel, Paris (XVII^e).
 *Gotira 39, r. Taitbout, Paris.
- Goudrinhal 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
 *Goudroline 30, r. Fcs-Bourgeois, Paris.
- Goudron des Vosges 21, r. de la Gare, La Broque
 (B.-Rhin).
- Goudron Le Beuf 11, rue Milton, Paris.
 Goudron Freyssinge 6, rue Abel, Paris.
- Gouttes amères de D^r Gigon, 25, bd Beaumar-
 chais, Paris.
- Baumé
- Gouttes Antigél 18, rue de Beaune, Paris.
 Gouttes antirhumatis- 107, av. de la Reine, Boulogne-
 males Wagner sur-Seine.
- *Gouttes Antispasmo- 78, cours de la Liberté, Lyon.
 diques Adol
- Gouttes Antispasmo- 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 diques Dausse
- Gouttes Arsénosthé- 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 niques Dausse
- *Gouttes Bernamont 87-89, r. du Commerce, Nevers.
- *Gouttes Blagny 85, rue Turbigo, Paris.
- *Gouttes Bronchophiles 58-60, r. des Moulins, Valence
 André (Drôme).
- Gouttes calciques Za- 3, pl. Intérieure-St-Michel, Tou-
 nit louse.
- Gouttes C. C. U. 88, rue Duhesme, Paris.
- Gouttes Chauvin Aubenas (Ardèche).
- Gouttes C. Z. A. 88, rue Duhesme, Paris.
- Gouttes dépuratives 37, rue des Lois, Toulouse.
- Fuba 40, av. Secrétan, Paris.
- Gouttes Efgé

- *Gouttes Eryl
 Gouttes Esurine
 *Gouttes Géha
 Gouttes Glyciodines
 Gouttes Gydé
 *Gouttes Fluvia
 Gouttes halogènes du
 D^r Bern
 Gouttes Hélis

 Gouttes hypotensives
 Gouttes I. A. M.
 Gouttes Iodopan
 Gouttes iodopeptiques
 Narud
 *Gouttes Leconte
 *Gouttes Linober
 Gouttes livoniennes
 Gouttes Lo-Lo Tsé
 Isberg
 *Gouttes Magalo
 *Gouttes Malone
 Gouttes Veinophyles

 Gouttes M. I. A.

 Gouttes Milkô
 Gouttes Molinal
 Gouttes Narkay
 *Gouttes Nicari
 Gouttes au Nitrite de
 Soude Roussel
 *Gouttes Paidophiles du
 D^r Guiraud (Voir : *Io-
darsenic Guiraud.*)
 Gouttes P. A. S.
 Gouttes Pectiques du
 D^r Albert
 Gouttes de Pectosérum
 Gouttes Perettes
 *Gouttes Phosphosthé-
 niques Dausse
 *Gouttes Pilka
 Gouttes de Quarah-
 taine
 Gouttes Quassinol
 Gouttes Rami
 Gouttes Reynaud
 *Gouttes Sap
 Gouttes Scandinaves
 Gouttes Schmidt anti-
 convulsives
 Gouttes Sclérocurine
 *Gouttes de Sérû
 Gouttes Sédatives
 *Gouttes Trina

 Novalis, Oullins (Rhône).
 D^r R. Petit, Angoulême.
 Port-de-Bouc, près Marseillè.
 83, bd de la Villette, Paris.
 4, cours Toloi. Lyon
 (Voir : $\frac{1}{2}$ Fluvia.)
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel,
 Toulouse.
 6, cours V.-Hugo, Cavaillon
 (Vaucluse).
 Fraisse, 8, rue Jasmin, Paris.
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 9, rue de la Plâtière, Lyon.

 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 F. Bouvier, 31, bd de la Vil-
 lette, Paris.
 Goy, 23, r. Beautreillis, Paris.
 J. VINCENT, Ancenis (L.-Inf.).
 Manor, St-Germain - du - Bois
 (S.-et-L.).
 36, r. de la Tour-d'Auvergne,
 Paris.
 Cluzel, 60, c. É.-Zola, Lyon.
 Sauba, Montreuil (Seine)
 id.
 Cantin, à Palaiseau (S.-et-O.).

 10, rue Washington, Paris.

 10, imp. Milord, Paris.
 Gouin, 30, rue des Écoles, Paris.

 37, rue des Lois, Toulouse.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 42, av. de Breteuil, Paris.

 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 92, rue Bobillot, Paris.
 38, rue des Lices, Angers
 (M.-et-L.).
 73, bd Baille, Marseille.
 44, r. Chaptal, Levallois (Seine).
 Durand, Aigues-Mortes (Gard).
 2, rue des Lombards, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.

 G. Vilas, à Châlons-sur-Marne.
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 103-105, rue St-Lazare, Paris.
 Bernhard, 11 r. La Fayette, Paris.
 Gray Montmirail (Marne).

- Gouttes Triol
 Gouttes Vigor
 Gouttes Vocis
 Gouttes Yseult
 *Gouttolysine
 Goyl Meurice
 Grains céphalgifuges
 Grains de Seltz
 *Grains de Vals
 Grains d'Évian
 Grains d'Éphédrine
 Grains du Dr Jehan-Meyer
 Grains Miraton
 Gramalt
 *Granions de Fouard
 Granoxyl
 Granstimul
 *Granuchol
 Granulé Bravais
 *Granulé Cabasson
 Granulé Calmafreinkel
 Granulé Caresmel
 Granulé Chomel
 Granulé de Panphosphates
 Granulé du Dr Mousseaud
 Granulé dépuratif Künckel
 *Granulé Edgès
 Granulés Elkin
 Granulé Girard
 Granulé Hormos
 Granulé pulmonaire Giry
 Granulé Sabel
 *Granulé Salicylé
 Granulé Tinardon
 Granules antinausiques
 Granules 3 cachets
 *Granules Chanteaud
 Granules Chevrier
 Granules Colchicine
 Granules Crosnier
 Granules d'Aloïne
 Granules de Boldine
 *Granulés de Bourget
 Granules de Digitaline
 Granules Elkin
 Rousseau, Sens (Yonne).
 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 9, rue de la Plâtière, Lyon.
 Alpha, Montreux-le-Ch. (Ht-R.).
 61, av. Louise, Bruxelles.
 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
 Alpha, Montreux-le-Château (Ht-Rh.).
 7, rue Galvani, Paris.
 J. Perrochon, Tours (I.-et-L.).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 34, r. Saint-Martin, Château-du-Loir (Sarthe).
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Chassaigne, Ruffec (Ch.-I.).
 61, rue Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine).
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 78, fg St-Denis, Paris.
 42, r. de Paris, Pantin (Seine)
 56, bd Ornano, Paris.
 183, r. de Rome, Marseille.
 52, rue La Bruyère, Paris.
 2, quai Paul-Bert, Tours.
 23, r. Beautreillis, Paris.
 119 bis, av. Chemin-de-Fer, Rueil (Seine-et-Oise).
 H. Rivier, 10, passage Morel, Montrouge.
 3, rue Watteau, Courbevoie.
 59, rue Boissière, Paris.
 18, rue de Beaune, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 4, av. M.-Berteaux, Poissy.
 49, rue de Metz, Nancy.
 20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
 Dausse, 4, r. Aubriot, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 3-5, r. A.-Dumas, St-Ouen (Seine).
 5, bd Montparnasse, Paris.
 3-5, r. A.-Dumas, St-Ouen.
 21, fg Montmartre, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 44, r. de Lagny, Montreuil.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 id.
 8, r. St-Martin, Paris (IV^e).
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 18, r. de Beaune, Paris.

Granules Homolle et Quévenne	14, rue des Beaux-Arts, Paris
Granules Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Granules Hydrastinine	Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Granules Hyosciamine	id.
Granules Pantofort du Dr Boveil	1, rue Lassalle, à Lyon.
Granules du Dr Papillaud	Gigon, 25, bd Beaumarchais, Paris.
Granules Phosphure de Zinc	5, bd Montparnasse, Paris.
Granules Spartéine	25, bd Beaumarchais, Paris.
*Granules des Vosges	11, rue La Fayette, Paris.
*Granulochrysine	
Lumière	45, rue Villon, Lyon.
Granusel	« Angla », Monte-Carlo.
Grappuval	Aubery, Avignon (Vaucluse).
*Gravidostyl	97, rue de Vaugirard, Paris.
Graumanyl Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.
*Gravural	28, rue de Seine, Paris.
Griponal	19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Grippol	11, ch. de la Muette, Paris.
Gripposédine	M. Richard, Aubenas (Ardèche).
*Grippov-Vaclydun	27, rue Desrenaudes, Paris.
Grog antigrip Labo-rom	4, av. Brazza, Romainville (Seine).
Guanéc Lafosse	48, av. de la République, Paris.
Guarana Grimault	8, rue Vivienne, Paris.
*Guaraphos	92, rue Bobillot, Paris.
*Gubline	61, bd Malesherbes, Paris (VIII ^e).
Guérysipèle	71, av. de la République, Champigny (Seine).
*Guéthural	Pepin et Leboucq, Courbevoie.
Gui Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Gui Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
*Guigoz (Lait)	2 et 4, rue Catulle-Mendès, Paris.
Guilyl	102, av. Michelet, Saint-Ouen.
*Guimelinde	Ancenis (Loire-Inf.).
Guinitrol	20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
Guipsine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Guipsiode	56, r. St-Lambert, Marseille.
*Guitose	11, quai St-Clair, Lyon.
Gunose	Dr Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
Guttoléol	171, r. de Belleville, Paris.
Gutturyl	58, rue de Maubeuge, Paris.
Gynaicéol	17, rue Cadet, Paris.
*Gynarsol	16, rue du Petit-Musc, Paris.
Gynaseptone	Bréant, 11, r. de Clichy, Paris.
*Gynéco-Vaclydun	27, rue Desrenaudes, Paris.
Gynéoline	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Gynéose	14, rue des Pyramides, Paris.
*Gynepta	Bourdou, Frontignan (Hérault).
*Gynergène	20, rue Vernier, Paris.
Gynésodine	47, r. Bokanowski, Asnières.
Gynévrine	102, av. Michelet, Saint-Ouen.
Gynimbine Houdé	(Voir Yohimbine Houdé.)

- Gynium**
 ***Gynocalcion** 37, rue des Lois, Toulouse.
Gynochlor 7, r. de l'Armorique, Paris.
Gynocrinol 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
Gynocure 107, r. des Dames, Paris.
Gynodine 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.).
 ***Gynœstryl** 52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
 ***Gyno-gouttes** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
Gynohypophysol 107, r. des Dames, Paris.
Gynoids id.
 ***Gyno-Lactosmose** 52, r. de Cambrai, Lille.
Gynolactyl Lavril, Pacy-sur-Eure.
Gynolutéol 37, r. Château-Landon, Paris.
Gynolysats 107, rue des Dames, Paris.
Gynomalvine 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 ***Gynométine** 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
Gynopausine 45, fg Saint-Denis, Paris.
Gynophiline 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
Gynophyl Reboul Douard, Uzel (C.-du-N.).
 ***Gynoplix** 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
Gynopolycrinol 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
Gynosanine 107, r. des Dames, Paris.
Gynosol 151, rue de Charenton, Paris.
Gynoster 1, av. Eug.-Thomas, Le Kremlin-Bicêtre (Seine).
 133, rue Lecourbe, Paris.

H

- ***Halifléto** 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Halocalcion 90, bd St-Denis, Courbevoie.
Halocure 2 bis, r. du Chevalier-de-la-Barre, Saint-Quentin (Aisne).
Halogénol 1, pl. du Griffon, Lyon.
Halomagnésine 41, bd Haussmann, Paris.
Hamamélidine J. Logeais, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
Hamacitro 34, rue Sedaine, Paris.
Hamaméline Houdé 9, r. Dieu, Paris.
 ***Hamaméline Roya** 41, rue de Rome, Paris.
 ***Hamaméliode** 17, rue Cadet, Paris.
Hamamélis Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
 ***Hamamélis Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
 ***Hamamélis Grandval** 12-14, rue Féry, à Reims.
Hansénol 116, bd Haussmann, Paris.
 ***Harlédine** 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
 ***Harlem Philippe** 36, quai Fulchiron, Lyon.

- Hazellium** 62, av. des Champs-Élysées, Paris.
- *Hébéol** 20, rue de Rivoli, Paris.
- *Hectargyre** Mouneyrat, Villeneuve - la - Garenne.
- *Hectine** id.
- Hectiode** Canonne, bd Sébastopol, Paris.
- Hédéranol** 151, r. de Charenton, Paris (XII^e).
- *Hédéryl** 69, r. de Sèvres, Paris (VI^e).
- *Hedopeptol** 35, av. de Versailles, Paris
- *Hédusol** 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
- *Héganol** 33, fg Montmartre, Paris.
- Heinobiose** 145, av. Montredon, Marseille.
- *Hélénine de Korab** Bouyssou, Chambois (Orne).
- Hélénine Houdé** 9, r. Dieu, Paris.
- *Helguerol** 17, rue Soufflot, Paris.
- Héliatol (poudre, pom-
made)** 4, pl. Royale, Nantes.
- Hélieurone** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Hélital** 15, pl. Nationale, Dieppe.
- Helmazil** 25, rue du Général-Foy, Paris.
- Helminthyl** 14, r.A.-Briand, Levallois-Perret.
- Hémabéol** 72, av. Kléber, Paris.
- Hémabione** Chemin Neuf, Ganges (Hérault).
- *Hémagène Tailleur** 10, r. Le Chapelais, Paris.
- *Hémagénine Giraud** 65, rue Louis-Blanc, Paris.
- Hémaldine** Paray-le-Monial (S.-et-L.).
- *Héma-Rhéol** 27, av.V.-Hugo, Valence(Drôme).
- Hémarsyl du D^r Roux** Caillau, à Argentat (Corrèze).
- Hématéol** 81, r. Le Corrège, Bruxelles.
- Hématocalcyl** 1, pl. du Griffon, Lyon.
- *Hématoéthyroïdine** 54, fg Saint-Honoré, Paris
- Hématogénol** 37, rue Galilée, Paris.
- *Hémato-iodine** 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
- Hématopan** 263, rue Lecourbe, Paris.
- Hémaxol** 41, av. Joffre, La Garenne.
- *Hémédonine** 19, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- Hémoantitoxine Sofos** 11, quai St-Clair, Lyon.
- Hémobiose** Aubanel, Pointe-Rouge, Mar-
seille.
- *Hémocalcine** La Varenne-St-Maur (Seine).
- *Hémocalciopectine** 37, rue de Bourgogne, Paris.
- Hémocholine** 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- Hémocléan** 36, rue des Francs-Bourgeois,
Paris.
- Hémocléine Lafay** 54, ch. d'Antin, Paris.
- *Hémo-Coagulène** 103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
- *Hémo - Cyto Sérum** Lab. Corbière, 27, rue Desre-
naudes, Paris.
- Hémodrainase** Cosson, Romainville (Seine).
- *Hémodrome** 71, av. Victor-Emmanuel-III,
Paris.
- *Hémoductyl** 38, bd Bourdon, Paris.
- Hémoferrine** Gde-Rue-au-Bois. Bruxelles.
- Hémofixine** 4, r. Beaurepaire, Paris.
- *Hémofluidol** Léonardon, Angers (M.-et-L.).

- Hémogénase**
 ***Hémogénol Dausse**
Hémogényl Godart
Hémoglobine Bovel
Hémoglobine Dalloz
 ***Hémoglobine Deschiens**
Hémoglobine Star
Hémoglobine Van Lier
Hémoglyne Thuau
Hémo-Hépatext
 ***Hémolucyl**
 ***Hémoluol**
Hémoneurol Cognet
 ***Hémopanbiline**
 ***Hémopausine**
 ***Hémopectal**
 ***Hémo-Phagosthyl**
 ***Hémophiliné Planche**
Hémophytol
 ***Hémoplasme Lumière**
Hémoplasmine
Hémopoïne
 ***Hémopylore**
Hémoradol
Hémorex
 ***Hémorroïdine**
 (Pommade, Gouttes, Suppositoires)
Hémorroïdyl
 ***Hémosamine (Utérachine)**
Hémosédine
Hémosine
Hémosérum
Hémostase
 ***Hémostatique Coudert**
 ***Hémostatique Ercé**
 ***Hémostatique Goy**
 ***Hémostérine irradiée**
 ***Hémostra Roche**
 ***Hémostyl**
 ***Hémotal**
Hémo-Tonikéine
Hémotropé
Hémovarine
Hémovaryl Farma
 ***Hémoveïne**
Hémoviris
 (cachets, élixir)
Hémozol
Hémynne
 ***Hémypnal**
- à Courpière (Puy-de-Dôme).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 Andenne (Belgique).
 101, av. Mozart, Paris.
 13, bd de La Chapelle, Paris.
 9, r. Paul-Baudry, Paris (VIII^e).
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 30, rue Saint-Jacques, Namur.
 22, fg Saint-Michel, Angers.
 107, av. Jean-Jaurès, Paris.
 54, av. de la Bourdonnais, Paris.
 11, rue Mogador, Paris (IX^e).
 43, rue de Saintonge, Paris.
 Annonay (Ardèche).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 4, r. La Motte-Picquet, Paris.
 2, rue Volney, Paris.
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 45, rue Villon, Lyon.
 30, rue Saint-Jacques, Namur.
 Scholl, Gembloux (Belgique).
 42, r. E.-Deschanel, Courbevoie.
 25, rue Vaneau, Paris.
 7, Rond-Point Mirabeau, Paris.
 25, rue de Calais, Dunkerque (Nord).
 Roussel, Gde Rue, Flers (Orne).
 92, rue Bobillot, Paris.
 19, rue de Fleurus, Paris.
 89, bd Sébastopol, Paris.
 4, pl. de la Gare, Tunis.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 13, rue Antoine-Vollon, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 188, c. de la Somme, Bordeaux.
 10, rue Crillon, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 14, r. Demarquay, Paris.
 52, rue La Bruyère, Paris.
 71, av. République, Champigny.
 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 1, av. E.-Thomas, Kremlin-Bicêtre (Seine).
 Brichard et fils, à Bar-le-Duc.
 54, r. de Sablonville, Neuilly-s.-Seine.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 13, r. de la République, Yzeure-Moulin (Allier).
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.

Henrick's bill
Hényl

Hépacholine

- *Hépacrine
- Hépacynase
- *Hépadrainase
- *Hépaflorine
- *Hépafluol
- Hépagastrol
- *Hépaglycérol
- *Hépagyl
- *Hépalomel Védé
- *Héпамine Mauchant
- *Héпамult
- *Héпанème
- *Héпанова
- Hépapeptine
- *Hépaphos
- Héparadénine
- Héparbiline
- Héparcyl
- *Héparéguiline Wander
- Héparfer
- Hépargène
- Héпармone Byla
- *Hépartichaut adultes
et infantile
- *Hépasel
- *Hépasman
- Hépasodyl
- Hépastéryl
- Hépasthényl
- Hépatergol
- *Hépathemo Deschiens
- *Hépaticalcion
- *Hépatie Efa
- *Hépaticol
- Hépatine Bouty
- Hépatine Gad
- Hépationa
- Hépatique Delfos
- *Hépatismine
- Hépatobiline
- Hépato-Byl
- *Hépatocarnine Le-
- francq
- Hépatocrinol
- Hépatocynol
- *Hépatodiagnose
- *Hépatodiase
- *Hépatoformine

- 163, r. de Flandre, Paris.
- 31, av. Foch, La Garenne-Colombes.
- 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- 60, r. de Monceau, Paris.
- 35, rue Cler, Paris.
- 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- « Angla », Monte-Carlo.
- 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- 33, av. de Villiers, Paris.
- 54, r. du Fg-Saint-Honoré, Paris.
- 97, rue de Vaugirard, Paris.
- 2, pl. Gambetta, Paris.
- Gennevilliers (Seine).
- 41, rue de Rome, Paris.
- 54, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
- 37, rue Brochant, Paris.
- 60, rue de Monceau, Paris.
- 4, rue Platon, Paris (XV^e).
- Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- id.
- 11, ch. de la Muette, Paris.
- P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
- 33, av. de Villiers, Paris.
- 56, r. St-Lambert, Marseille.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 19, av. Payret-Dortail, Le Plessis-Robinson (Seine).
- 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
- 40, quai J.-d'Arc, Chinon.
- 9, rue Laloy, Chaumont.
- Martin, Bordeaux-Cenon.
- 21, r. de Neuilly, Nanterre.
- Cousin, r. Albert-I^{er}, Beaumont-s.-O.
- 9, rue Paul-Baudry, Paris.
- 14, rue de Clichy, Paris.
- 16 et 18, rue du Château, Carentan (Manche).
- Brun, La Demi-Lune (Rhône).
- 3, rue Dunkerque, Paris.
- Oliviero, Boulogne-sur-Seine.
- Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
- Occitan, Auterive (H.-G.).
- 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- E. Bassol, St-Alvère (Dordogne).
- 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- 36, av. de Metz, Romainville (Seine).
- 107, r. des Dames, Paris.
- 62, bd St-Germain, Paris.
- 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- 14, r. Demarquay, Paris.
- 26, av. de Royat, Chamalières-lès-Clermont-Ferrand (P-de-D).

Hépatogastrine	4, chaussée de la Muette, Paris
Hépatogènes Charvoz	3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.
*Hépatogénine	P. Boivert, Montguyon.
*Hépatoglobine	Ch. Vergelot, 6, rue de Navarin, Paris.
Hépatolax	201, r. du Fg-St-Denis, Paris.
*Hépatomagnésion	57, r. Pierre-Corneille, Lyon.
Hépatomanganol	11, pl. Louis-XII, Blois.
Hépat-Muscolisine	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Hépatonia	Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
Hépatoplasma	3, place Jussieu, Paris.
*Hépatoplasmine	21, rue de Neuilly, Nanterre.
Hépatorga	Orga, Avignon (Vaucluse).
Hépatoseptyl	108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
Hépat-Sérine	22, r. Guillaume-le-Conquérant, Caen.
*Hépatosodine	15, r. des Champs, Asnières.
*Hépatostimuline	St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
Manor	14, rue de Clichy, Paris.
Hépatotanic	
Hépat - Vésiculite du	
D ^r Phélyx	25, av. du P ^t -Wilson, Montluçon.
*Hépatoxane	81-83, r. de Lille, Roubaix.
Hépatozyl	40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
*Hépatrol buvable et	
injectable	4, rue Platon, Paris (XV ^e).
Hépaturyl	55, r. de Chabrol, Paris.
*Hépavita	11 bis et 13, rue Levert, Paris.
*Hepax	32, rue de l'Ouest, Paris.
*Hepbi	4, r. Platon, Paris (XV ^e).
*Hepenteryl	Boucly, Gde Place, Louvroil (Nord).
Heptanol	r. Condorcet, Poitiers.
*Heptyl Bourdou	Frontignan (Hérault).
Héracléine	18, av. Hoche, Paris.
Héracléol	Salle, 4, r. Elzévir, Paris.
*Hergénol	13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
Hermasinol	50, r. Nationale, Lille.
Hermomuthol	50, rue Nationale, Lille.
*Hermophényl	45, rue Villon, Lyon.
Hermoplast (Furoplast	
élastique)	9, rue de la Gare, Levallois.
Hermostyrum	4, chaussée de la Muette, Paris.
Héroïne Vicario	17, bd Haussmann, Paris.
Herpur	164, rue St-Honoré, Paris.
Hespéridausse	4, rue Aubriot, Paris.
Hétérolysine	Oliviero, Boulogne-sur-Seine.
Hétraménol	6, rue Berbisey, Dijon.
Hévoglan	Blanc, Barcelonne - du - Gers.
Hexacar	Pharma Spès, Lille (Nord).
Hexacarbine	83, bd de la Villette, Paris.
Hexachol	26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
Héxafel	47, r. Bokanowski, Asnières.
Hexaformine	123, pl. Beauvoisine, Rouen.
Hexalithine	62, av. de Paris, Villejuif (Seine).

- Hexaranol
 Hexarubrine
 *Hexorcène
 *Hexotal
 *Higadose
 Higalex
 Hippo-Carnis
 Hippohémo
 Hippoplasine du D^r
 Gran
 Hipposarcine Roy
 *Hirudinase
 *Hista (Histamine Bey-
 tout)
 *Hista Injectable
 *Hista Liniment
 *Hista Dimilli
 *Histaclartyl
 *Histalgine
 *Histamyl
 Histocalcine
 *Histogénol

 *Histogerma
 Histonyl
 *Histropa
 Hojasol
 Holaseptine
 Holocalcine

 Hololax
 *Holos Deschiens
 Holosplénine
 *Holovarine
 *Hopogamyl

 *Hopogan
 Hopoganase
 Horbyl
 Hordénine Lauth
 *Hordénol
 Hordéomaltine
 Hordose

 Hormaline
 *Hormantoxone
 Hormex
 *Hormiadyne

 *Hormobiline
 Hormobromine
 Hormocalcium
 *Hormocarbol
 Hormocarnyl
 *Hormocline
 *Hormocrinol F et M
- 88, rue Duhesme, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 37, rue Brochant, Paris.
 Le Gallo, Auray (Morbihan).
 157, r. de Paris, Vanves (Seine).
 BYLA, 26, av. de l'Observa-
 toire, Paris.
 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
 18, av. Daumesnil, Paris.

 12, bd St-Martin, Paris.
 id.
 id.
 id.
 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
 14, av. Perriehont, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 201, r. du Fg-St-Denis, Paris.
 Mouneyrat, Villeneuve-La-Ga-
 renne.
 Mahieu, Lens (Pas-de-Calais).
 153, bd Montparnasse, Paris.
 15, r. des Champs, Asnières.
 10, r. Gay-Lussac, Paris.
 r. de Rome, Cannes (Alpes-M.).
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.
 13, rue Boinod, Paris.
 9, rue Paul-Baudry, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 52, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beau-
 vais (Oise).
 12, rue Lamartine, Paris.
 12-18, rue Lamartine, Paris.
 84, rue de l'Aqueduc, Paris.
 9, r. du 4-Septembre, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 10, rue Richelieu, Paris.
 31, r. des Pierres, Bruges (Bel-
 gique).
 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne.
 84, rue de l'Aqueduc, Paris.
 A. Mironneau, Pharm., Chef-
 Boutonne (Deux-Sèvres).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 1, rue Christine, Paris.
 22, r. de l'Arsenal, Angoulême.
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 20, rue de Rivoli, Paris.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 19, rue Brunel, Paris (XVII^e).

- *Hormodausse
 - Hormoduodine
 - *Hormoflavéine
 - Hormo-gynol
 - Hormolaxine
 - *Hormoléol
 - *Hormolutéine
 - *Hormone Gonadotrope
du D^r Roussel
 - *Hormones Hypophy-
saires Byla
 - *Hormoplasmine
 - *Hormosthényl
 - Hormotensyl

 - Hormotone
 - *Hormovarine Byla
 - Hormoveinyl F
 - Hormoveinyl M
 - *Hormovitol
 - *Hormuclases (V. Opo-
thérapies du D^r
Roussel)
 - Hormuter
 - Horsine
 - *Hova (Tablettes)
 - Huile au Calomel Du-
mesnil
 - Huile au Calomel Du-
ret
 - Huilaixine
 - Huile Boris

 - *Huile camphrée Man-
ganésée « Métére »
 - Huile Crolas
 - *Huile de foie de morue
médicinalesuractivée
 - Huile de foie de morue
Seclo
 - Huile de genévrier Vial
 - *Huile d'Harlem
 - Huile Gallina
 - Huile grise Duret
 - Huile grise Ercé
 - Huile grise stérilisée
 - Huile de Hogg
 - *Huile iodée Finikoff
 - Huile Parlax
 - Huiles Cholestérinées
Dausse
 - *Huilorhine
 - Humeur Aqueuse Arti-
ficielle
 - *Humoro Stabiline
- 2, rue Aubriot, Paris.
 - 46, av. de l'Observatoire, Paris.
 - id.
 - 38, rue du Louvre, Paris.
 - 6, rue du Petit-Musc, Paris.
 - 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 - 2, rue des Deux-Ponts, Paris.

 - 97, rue de Vaugirard, Paris.

 - 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 - 36, av. de Metz, Romainville.
 - 63, rue de Charonne, Paris.
 - 20 bis, r. du Sergent-Godefroy,
Montreuil-sous-Bois.
 - 7, rue Princesse, Paris.
 - 26, av. Observatoire, Paris.
 - 8, rue Dubrunfaut, Paris.
 - id.
 - 16, r. du Petit-Musc, Paris.

 - 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 - 7, rue Biscornet, Paris.
 - 4, rue Saint-Anastase, Paris.
 - 92, rue Bobillot, Paris.

 - 10, rue du Plâtre, Paris.

 - 202 bis, r. de Paris, Clamart.
 - 15, rue de Rome, Paris.
 - 22, bd Circulaire d'Épinay, Gen-
nevilliers.
 - 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
sur-Seine.
 - 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
 - SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
Paris.
 - 6, r. Ad.-La-Lyre, Courbevoie
(Seine).
 - 8, rue Vivienne, Paris.
 - 33, fg Montmartre, Paris.
 - 4, rue Candolle, Paris.
 - 202 bis, r. de Paris, Clamart.
 - 1, av. de Villars, Paris.
 - 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 - 13, r. Paul-Baudry, Paris.
 - 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 - 65, r. Douy-Declupe, Montreuil.

 - 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 - 29, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
 - 5, r. St-Hérem, Clermont-Fer-
rand.
 - 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-
Moulineaux.

- Hupnosol Adrian
 *Hycal Duret & Rémy, Asnières (Seine).
 *Hydralin 37, rue de la Fédération, Paris.
 Hydramélis 33, Grande-Rue, Besançon.
 Hydrargyre-Boulard 82, av. de Suffren, Paris.
 Hydrargyrettes Hubert, Romorantin (L.-et-C.).
 Hydrariode à La Ferté-Macé (Orne).
 *Hydrastine Houdé 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 Hydrastis Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
 *Hydrastis Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.
 Hydrastol 222, fg Saint-Martin, Paris.
 *Hydrate de Magnésie
 Adrian 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
 Hydrocamphre 88, rue Duhesme, Paris.
 Hydroclonazone 42, rue Thiers, Le Havre.
 Hydrocotyle 21, rue Chaptal, Paris.
 Hydrogemmine La-
 gasse 4, chaussée de La Muette, Paris.
 *Hydrorrhéol 45, rue de Lyon, Paris.
 *Hydroxydase 10, rue Blanche, Paris.
 Hygiénane 172, rue d'Alésia, Paris.
 Hygienyl du Dr Gau- 38, rue Saint-Ferdinand, Paris
 lier (XVII^e).
 *Hygiocholine 61, bd Malesherbes, Paris.
 *Hygioline 222, bd Pereire, Paris.
 *Hymel 90, av. de Saint-Ouen, Paris.
 *Hyol 6, place des Ternes, Paris.
 Hyoscine Houdé 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 *Hyoscyamine Houdé id.
 *Hyostinal 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 *Hypalène 127, bd St-Michel, Paris.
 *Hypalène mal de mer id.
 *Hypalène obstétrical id.
 Hypercytol Matray, à Aubière (P.-de-D.).
 Hypergal Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
 *Hypersan 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 *Hyper Sérum Nac 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
 Hyperstyl Établ. H. O. E., 239, r. Natio-
 nale, Villefranche-en-Beaujo-
 lais (Rhône).
 *Hypiode 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 Hypnase Vergelot 163, rue de Flandre, Paris.
 Hypneural Cos 99, rue d'Aboukir, Paris.
 *Hypno-Nervine 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 Hypnosédine 11, chaussée de La Muette, Paris.
 Hypnovel 41, av. Joffre, La Garenne.
 Hypochlorine 48, r. de Londres, Paris.
 *Hypocholate 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 Hypodermozone 56, bd Pereire, Paris.
 *Hypogustyl 191, r. du Fg-St-Antoine, Paris.
 Hypolyse 24, av. Châtillon, Paris.
 *Hypophédrine 18, rue de Beaune, Paris.
 Hypophos Hurbourgne à Montmeyan (Drôme).

Hypophosphites Churchill	92, av. St-Mandé, Paris.
Hypophydose	21, r. de Neuilly, Nanterre.
Hypophyse - Endocrines Fournier	7, rue Biscornet, Paris.
Hypophysine	Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Hypophysol	107, rue des Dames, Paris.
*Hypostrontium	22, rue de la Sorbonne, Paris.
*Hyposulfène	id.
*Hypotan comprimés	52, r. La Bruyère, Paris.
*Hypotan injectable	id.
*Hypotan papavérine	id.
*Hypotenseur Vale	Hesdin (Pas-de-Calais).
Hypotensiode	21, rue de Neuilly, Nanterre.
*Hypotensol	38, r. des Lices, Angers.
*Hypo-Thiorine	39, rue Fondaudège, Bordeaux.
Hyrganiol	21, r. Jean-Goujon, Paris.
I	
*I. A. M. (Gouttes)	D ^r Lavoué, Rennes (I.-et-V.)
Iasthol	Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Ibogaine Nyrdhal	12, r. de la République, Puteaux.
Ichtyol Zinc	Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Icorase	6, r. de Dunkerque, Paris.
Idéalax	62, rue Marengo, Saint-Étienne.
Idéolaxine	78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
*Idonil	56, rue Beaubourg, Paris.
Idonil au Maté	id.
Iénol	37, rue Galilée, Paris.
*Ifranol	98, rue de Sèvres, Paris (VII ^e).
*Imido Roche	10, rue Crillon, Paris.
*Iminasthme	Servier, Orléans (Loiret).
*Immunicorps	6, rue Dombasle, Paris.
*Immuniderm Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Immuniperos Grémy	id.
Immuniphages Grémy	id.
*Immunizols Grémy	id.
Immuno-Antivirus	61, av. Louise, Bruxelles.
Immunovaccin anti-pyorrhélique	8, av. des Sources, Nice.
*Immunovaccin Anti-rhumatismal	id.

- Immunovaccin bron-**
chopulmonaire
Impaludol
***Impétigol**
Inajuglane
***Inava**
***Indhaméline Lejeune**
simple et pluriglan-
dulaire
Indine
Inertyl
***Infangyl Carlier**
Infantonyl
***Infra-rouges**
Infundibuline
Infusion orientale R.
B. L.
Inhabillol
***Inhalantyl**
Inhalateur Hojasol
Inhalateur et Inhala-
tions
***Inhalation-Gargarisme**
Inhalation Goy
***Inhalation Lancosme**
Inhalation Sargéthyl
Inhalations Dynamy
Inhalations Vocis
Inhalatoriol
Inhalène
Inhalex
***Inhalo-Bol**
Inhalogène
Inhalol
Irhalone
Inhalophédrine
Inhalopin
***Inhalo-Sel**
***Inhalo-Thiorine**
***Inhaloxyl**
Inhalyptol
Inhalyl
Inhaphone
Inhatillol
***Inbess**
Inhovap
Injection Clin Strychno-
Phospharsinée
Injection sèche Bréra-
Innerclean
***Inocrinines**
- 8, av. des Sources, Nice.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 181, av. V.-Hugo, Clamart (Seine).
 46, rue des Faures, Bordeaux.
 14, rue de Normandie, Asnières.
 142, rue de Picpus, Paris.
 Dabat, à Pau (Bas.-Pyr.).
 3, chem. du Vallon, Lyon-Ca-
 luire.
 43, rue de Créteil, Joinville-le-
 Pont (Seine).
 15, rue Corneille, Lille.
 12, av. du Maine, Paris.
 21, r. J.-Goujon, Paris.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
 14, rue de la Comète, Paris.
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
 Lab. Inhal, 98, r. J.-Maillotte,
 La Madeleine, Lille.
 45, rue de Lyon, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 Stolz, 56, av. Édouard-Vaillant,
 Boulogne-sur-Seine.
 Chavanne, Fontaine-Grenoble.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
 à Berson (Gironde).
 37, rue Galilée, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 62, r. d'Antibes, Cannes (A.-M.).
 Ch. Dehay, à Arras.
 4 et 6, r. Ordener, Paris (XVIII^e).
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 4, r. Raymond-Poincaré, Nancy.
 33, rue du Bois, Vincennes.
 20 bis, rue Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
 3, rue de Vouillé, Paris.
 151, rue de Charenton, Paris.
 20, rue des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.
 Montauban (L.-G.).
 46, rue Pierre-Charron, Paris.
 4, route du Médoc, Bordeaux-
 Bouscat (Gironde).

- Inogyl**
***Inolaxine**
***Inolène**
***Inorénol**
Inorhynyl
***Inosepta**
Inosphacelol
Inosplénol
***Inotylol**
Inoxemol
Inoxyl
Inoxine
Insevacins
Inshépatyl
***Institut Pasteur**
***Insulanol**
***Insuline** (Voir **Endo-pancrine*)
Insuline A. B.
***Insuline buccale Fornet**
Insuline Byla
***Insuline Choay**
***Insuline Léo**
***Insuline Novo**
Insuline Phylose
***Insulyl**
Intaline
Integral Vaccin
/ Interlactine
***Intestarsol**
***Intesto**
***Intraits Dausse**
***Intra-Reipar**
Introl
***Iocasine**
Ioda
Iodalbin Adrian
Iodalia
Iodalis
***Iodalose Galbrun**
***Iodamelis Logeais**

Iodaminase
***Iodamol Michel**
***Iodargol Viel**
***Iodarthos**
Iodarsène
***Iodarsenic Guiraud**
***Iodarsine**
Iodarsyle
***Iodasclérine**
***Iodaseptine Cortial**
Iodaseptine salicylée
***Iodassium**
Iodatoxine Laleuf
***Iodaupébine**
- 60, rue de Monceau, Paris.
 id.
 42, rue du Mont-Cenis, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.
 id.
 60, rue de Monceau, Paris.
 id.
 id.
 Debat, 60, r. de Monceau, Paris.
 id.
 id.
 22, av. Opéra, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 36, rue du Dr-Roux, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.

 48, rue de la Procession, Paris
 1, rue Dajot, Melun.
 11, chaussée de La Muette, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 Thomas, Chemillé (M.-et-L.).
 12, rue Paul-Baudry, Paris.
 5, av. de Saxe, Lyon.
 162, r. de l'Hay, Gentilly (Seine).
 Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 Drapier, Rethel (Ardennes).
 78, fg St-Denis, Paris.
 5-7, r. Cl.-Decaen, Paris (XII^e).
 63, rue de la Faisanderie, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
 51, av. G.-Clemenceau, Reims.
 10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 37, av. de l'Opéra, Paris.
 6, rue Parrot, Paris.
 42, av. de Breteuil, Paris.
 10, imp. Milord, Paris.
 304, rue St-Jacques, Paris.
 21, rue de Neuilly, Nanterre.
 103, r. Saint-Lazare, Paris.
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 id.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.

- Iodavelan
 Iode Aucher
 *Iode Colloïdal Roze
 Iodehameline Louveau
 Iode liquide Lambiotte
 *Iodéine Montagu
 Iodentérol
 Iode Oberlin
 Iodéolaxine
 Iode Organique Boissy
 *Iodéol Viel
 *Iodéopirine
 Iodeptol
 Ioderme
 *Iode Tulasne
 Iodeyl Fournier
 *Iodex
 *Iodhéma
 Iodhyrine du Dr Des-
 champs
 *Iodiformine
 *Iodinectol Jammes
 Iodion
 Iodo - Bismuthate de
 Quinine
 Iodo-Bismuth Ercé
 Iodo-Brou
 *Iodocaïne
 Iodo-calcique
 *Iodocalcium
 *Iodocardine
 Iodocéréol Dalloz
 *Iodocitrane
 *Iodo-Citrol
 Iodofosfal
 Iodogalle Vial
 Iodogargyval
 Iodogéline
 *Iodogénol Pépin
 Iodo-Hamamelis Du-
 coq
 Iodo-Juglan
 *Iodolipine
 *Iodo-Magnésium
 *Iodo-Maïsine
 Iodométine Hautdidier
 *Iodone Robin
 *Iodonésyl
 Iodonine
 Iodonion
 Iodonoses Clin
 *Iodonucléol
 Iodonyl
 Bèdeil, Lavelanet (Ariège).
 La Ferté-Macé (Orne).
 2, allée de Chelles, Le Raincy
 (Seine-et-Oise).
 78, bd des Batignolles, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 4, rue Candolle, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 37, av. de l'Opéra, Paris.
 id.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 20, rue de Verdun, Carcassonne.
 (Voir : Iodulane.)
 7, rue Biscornet, Paris.
 46, rue Claude-Lorrain, Lille.
 4, rue Candolle, Paris (V^e).
 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
 94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).
 86, rue Michel-Ange, Paris.
 94, rue Michelet, Alger.
 Fraisse, 8, rue Jasmin, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 19, av. d'Orléans, Paris.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne,
 Paris.
 13, bd de La Chapelle, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 Cody, Brive-la-Gaillarde.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 4, pl. Croix-Rousse, Lyon.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 Crozet, à Cannes (A.-M.).
 à Courbevoie (Seine).
 Langeais (Indre-et-Loire).
 Legallo, à Auray (Morbihan).
 Monal, 13, av. de Ségur, Paris.
 72, av. Kléber, Paris (XVI^e).
 48, rue d'Alésia, Paris.
 37, rue Galilée, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.
 34, rue Saint-Lazare, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 9, rue Victor-Letalle, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 56, rue Beaubourg, Paris.

- *Iodopan**
Iodopeptyl
 9, rue de la Platière, Lyon.
 Delaunay, Joué - les - Tours
 (I.-et-L.).
Iodophosfer Duplex
Iodoplasme
Iodoplume
Iodorganine Mercier
Iodo Rubidium
Iodo Salva Evesque
Iodosoufryl
Iodoscilline
 Dreyer-Dufer, Nogent-s.-Marne.
 85, rue des Morillons, Paris.
 55, rue de Chabrol, Paris
 41, route de Turin, Nice.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 10, rue de Belfort, Rennes.
 1, place L.-Herr, Paris.
 55, av. des Écoles, Cachan
 (Seine).
Iodosédine-Opophos
Iodosigol
***Iodosclérol**
***Iodo-Sodyl Clars**
Iodosoufre
***Iodosulfène**
Iodotensyl
Iodo-Théine Henry
***Iodo-Thyroidine Catil-**
lon
Iodo-Trypsine
***Iodoveine Leduc**
Iodo-Vitasine
Iodoxinol
Iodoxol
***Iodulane**
***Iodurase**
Iodure Boucard
***Iodure d'Amidon**
***Iodures Cros**
Iodures Domergue
Iodure de fer
Iodures Foucher
Iodures Laroze
Iodure Philippe
***Iodures Pachaut**
***Ioglott**
Iogol
***Ioguine Delba**
Iolase Corbière
Ionisalt
Ionoides
***Ionyl**
Iophénal
***Io-Salyl**
Iosorbine
I. O. Z. X.
***Ipalcal**
 19, rue de Fleurus, Paris (VI^e).
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 30, r. de Sète, Longuyon (M. et M.).
 18, rue St-Sulpice, Paris.
 20, r. Pré-St-Gervais, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris (V^e).
 16, bd Pereire, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 3, bd Saint-Martin, Paris.
 25, rue Jasmin, Paris.
 152, Côte Pavée, Toulouse.
 H. Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 107, r. des Dames, Paris.
 48, bd des Batignolles, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 82, av. de Suffren, Paris.
 Lumière, 45, rue Villon, Lyon.
 202 bis, rue de Paris, Clamart.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
 2, rue des Lions, Paris.
 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
 130, bd Haussmann, Paris.
 2, rue Michelet, Alger.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Delbary, St-Astier (Dordogne).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 199, bd Bineau, Neuilly-sur-S.
 13, rue Pavée, Paris.
 La Biomarine, Dieppe (S.-Inf.).
 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 1, r. du Cordouan, La Rochelle.
 16, r. Ficatier, Courbevoie.
 155 bis, r. Lafayette, Paris.
 6, av. des D^{rs}-Foix, Salies-de-
 Béarn (B.-P.).
Ipéca digitale Dausse
Ipecopan
***Irénine Gonnon**
Irol Churchill
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 20, rue Vernier, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 92, av. de St-Mandé, Paris.


- Irovarine Tisy
 Irracalcase
 Irradiol
 *Irrastérine Byla
 Isalaxine
 Isobromyl
 Isocollium
 *Isogev
 Isolulol
 *Isonal
 Isoptal
 Isorgane
 Isorhinol
 *Iso-Sels
 *Isotanin
 Isotonine
 *Isotonyl Bouret (Poudre de Lausanne)
 *Ispaghul
 Ivula Pearson
 Ixiole A et B
 *Ixium
 Ixogyne
- 95, r. de Turenne, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 16, rue de Rocroy, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 62, av. Champs-Élysées, Paris.
 26, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 2, r. des Lombards, Paris.
 (Voir : Opothérapie Lauriat.)
 90, r. Saint-Martin, Étampes.
 8, r. Aumont-Thiéville, Paris.
 2, place des Vosges, Paris.
 76, rue des Jacobins, Amiens.
 87, rue Lafayette, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 94, rue Michelet, Alger.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 52, rue de Crimée, Paris.

J

- *Jabosulfène
 Jacopol
 Jarsod
 *J. B. 5 Bellas
 *Jécobiase
 *Jécobaldine
 Jécocarbène
 Jécofluyol
 *Jécol (cachets et gtttes)
 *Jécolaxine
 *Jécopeptol
 Jécorine
 Jécorsan Fornet
 *Jécosédyl
 Jéjunine
 *Jemalt Wander
- 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 39, r. de Reims, Vichy.
 50, av. de Normandie, Colombes.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 R. Pionneau, Vayres (Gironde).
 2, rue du Pensionnat, Lyon.
 id.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 3, rue Watteau, Courbevoie.
 2, rue du Pensionnat, Lyon.
 13, rue Beudant, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Inst. de Microbiologie, à Sarrebruck.
 2, r. du Pensionnat, Lyon.
 42, av. de Breteuil, Paris.
 P. Bastien, Champigny-s.-M.

- Jennol**
Jicémine
Jodal
Jouvamély

Jovanyl
Jouvein B
Jovine Brisson
Juglamarine
***Jugland Gmet**
Juglandine Ferrouillat
***Juglane**
***Juglanrégine**
Juniodyl
Juniophos
Junovarine
Juraisin Macon

***Juranol**
Jus de myrtille pure
Jus de pomme « Le
Suc Normand »
Jus de raisins Chal-
land
Jus de raisins Fructu-
val
***Jus de raisins Pampryl**
***Jus de raisin quoti-**
dien
***Jus intégral de Pom-**
mes fraîches « Dal-
lery »
Juvantol
Juvenex
Juvéol
Juvigor
- 5, r. E.-Combes, St-Etienne
 304, r. Saint-Jacques, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (II^e).
 place Hôtel-de-Ville, Salon-de-
 Provence.
 1, place L.-Herr, Paris.
 6, rue Berbisey, Dijon.
 157, rue Championnet, Paris.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 33, rue Daguerre, Paris.
 C. Cons, Chambéry (Savoie).
 58-60, rue des Moulins, Valence.
 21, rue des Roses, Dijon.
 Joué-les-Tours (I.-et-L.).
 H. Dubois, Tours (I.-et-L.).
 Établ. Œnologiques de Bour-
 gogne, Mâcon (S.-et-Loire).
 5, bd du Montparnasse, Paris.
 H. Chartier, Saumur (M.-et-L.).
 id. 
 Nuit-St-Georges (C.-d'Or).
 Lab. du Contat Viticole, Avi-
 gnon (Vaucluse).
 149, r. du Port-de-Bercy, Paris.
 H. Chartier, Saumur (M.-et-L.).
 75, av. Victor-Hugo, Fresnay-
 sur-Sarthe (Sarthe).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 27, rue des Batignolles, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 Nuits-St-Georges (Côte-d'Or).

K

- *Kalastyl**
Kalefluid
Kaliosol
Kalmangor
- 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 21, av. de Neuilly, Nanterre.
 55, av. des Écoles, Cachan
 (Seine).

- ***Kalm-Asthmine** 437, fg St-Antoine, Paris.
- Kalmidor** Faure & Lagente, Montargis.
- Kalmine** Métadier, à Tours.
- Kalmigraine** Meunier, rue du Commerce, Montmarault (Allier).
- ***Kalmobrol** (Voir : Calmobro-Niel.)
- Kalmogastrol** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- Kamara C. 47** 72, quai Jemmapes, Paris.
- ***Kaneuron** 52, rue de Cambrai, Lille.
- ***Kaobrol** 54, r. Paris, Charenton (Seine).
- ***Kao-Carbo** 8, rue St-Martin, Paris.
- ***Kaolinase** 12, bd Saint-Martin, Paris.
- ***Kaolinase Belladonée** id.
- Kaolin Crookes** 2, fg Saint-Denis, Paris.
- Kaolin Géo** 20, cours Morand, Lyon.
- Kaolovules** 58, rue de Maubeuge, Paris.
- Kaomag** Huyghe, Brazey-en-Plaine.
- Kao-Pepsol** 39, rue de Reims, Vichy.
- ***Katox** (Voir : Cobratoxine.)
- ***Kaviase** 22, r. Lalande, Paris (XIV^e).
- Kéfir Nutricia** 142, r. Fransman, Bruxelles.
- ***Kéfirogène** 5, r. du Capitaine-Scott, Paris.
- ***Kélédol** 114, rue Solférino, Lille.
- Kélène** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Kéléinol** 11, r. La Fayette, Paris.
- Kénapirine Chanteaud** 3 et 5, rue Alex.-Dumas, Saint-Ouen (Seine).
- ***Kénol** 4, r. Richer, Paris.
- Képhaline Brunot** 10, pl. Thiers, Le Mans.
- ***Képhédryl** 1, rue Auber, Paris.
- ***Keralax** id.
- Kéraphiline** 112, r. de Gerland, Lyon.
- ***Kérasalicyl** 36, quai Fulchiron, Lyon.
- Kéraspirine** id.
- Kératolyne** Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
- Kératoplastol** L. Iordun, Harnes (P.-de-C.).
- Kerlactine** 1, rue Lassalle, Lyon.
- Ketophan** 6, r. rue Cigognes, Strasbourg.
- ***Kidoline** 38, bd Montparnasse, Paris.
- ***Kidophédrine** 38, bd Montparnasse, Paris.
- ***Kina-Coca-Kola** 12-14, rue Féry, Reims.
- Kins Elzévir** Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
- ***Kinaldyne** 2, pl. de la Salamandre, Nîmes.
- Kinébyl** 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- ***Kinéchol** 29, r. des Marchands, Avignon.
- ***Kinectine** 12, r. du Chemin-Vert, Ville-neuve-la-Garenne.
- Kinégastrine** Leurquin, Dreux (E.-et-L.).
- Kinémyl Bulgare V. B.** Les Bourdons, Nevers (Nièvre).
- Kineurine Moncour** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- Kinoram** H. Dubois, Tours (I.-et-L.).
- Kioféine** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Kipsol** 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- Kiroplast** 9, r. de la Gare, Aubervilliers.

- Kitine**
***Kluchol Remeaud**
***Kodos**
Koddyl
Kola Astier
Kola caféinée
Kola-fer Trouette
Kola Gmet
***Kola granulé Astier**
Kola granulé Roy
Kolaine
Kola Midy
***Kola Monavon**
Kola
Kola Pausodun
Kola Pichat
Kola Rik
Kola Roy
Kolarsan
Kolarsine Pautauberge
***Kola Sthényl**
Kolasthène Badel
***Kolatinès**
***Koumyl**
Kréazone
Kydalose
***Kymosine Rogier**
Kyralgine
- 90, rue Saint-Martin, Étampes.
 38, av. J.-B. Clement, Boulogne-sur-Seine.
 route du Moulleau, Arcachon.
 52, rue de Cambrai, Lille (Nord).
 42, r. du D^r-Blanche, Paris.
 3, pl. Jussieu, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 42, rue du D^r-Blanche, Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 6 bis, r. Campagne-Pr^e, Paris.
 5, cours Charlemagne, Lyon.
 38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
 81, bd Suchet, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 10, r. Constantinople, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 58-60, rue des Moulins, Valence.
 75, rue J. Dulud, Neuilly-s.-Seine.
 50, r. Nationale, Lille.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 49, quai St-Vincent, Lyon.
 56, bd Pereire, Paris.
 11, r. La Fayette, Paris.

L

- *Lab-Lacto-Ferment**
Laborol
***Laccodermes Brisson**
Lachésine
Lacodia
***Lacpinine**
Lacrenile Meurice
***Lac-Ser**
Lacta
***Lactacyd**
***Lactagol**
Lactalvose
- Mialhe, 8, r. Favart, Paris.
 Chauvin, Aubenas.
 157, r. Championnet, Paris.
 2, r. P.-Demours, Paris.
 Joué-les-Tours (Indre-et-Loire).
 Fisch, Mer Rouge, Mulhouse.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 Lavril, Pacy-sur-Eure.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.

*Lactaris
 *Lactavinaigre
 Lactéol Boucard
 Lactéomaltol
 Lactermol Vigier
 Lacticholéine Tulivet

*Lactifère
 Lactigélose
 Lactimase
 *Lactiphage
 *Lactobacilline
 Lactobactyl
 Lactobiase
 *Lactobyl
 *Lactocalcine
 *Lactochol
 Lactocoaguline Fabre

Lacto-Diastal
 Lacto-ferment
 Lactofermentine
 Lactoflavine (Vit. B¹)
 Lactogélose

*Lactolaxine Fydau
 *Lactoma
 Lacto Mannitase
 Lacto-Magnésie₂Vita
 Lactomorrhuel
 Lactophéine
 Lactophorine
 Lactophosphine
 *Lactoprotéide
 Lactorum
 Lactoscoparine
 Lactosine
 Lactoseptyl Legrand
 *Lacto-Sérum Carrion
 *Lacto-Sérum Lavril

*Lactosmose
 *Lactosodine
 Lactosone
 [Lactyl Meurice
 Lait albumineux Mol-

lard
 Lait allégé Dieticus

*Laitancyl
 Lait Berna
 *Lait calcique Zizine
 *Lait Dardelet
 Lait de cèdre Sapolan
 *Lait de Magnésie Bey-
 tout
 *Lait de magnésie Phil-
 lips

2, pl. Porte-des-Ternes, Paris.
 34, rue de Trévis, Paris.
 30, rue Singer, Paris.
 9, rue Rodier, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.

54, fg Saint-Honoré, Paris.
 Ducloy, Arques (P.-de-C.).
 18, av. Hoche, Paris.
 63, rue de Charonne, Paris.
 r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 83, bd de la Villette, Paris.
 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
 33, r. de la Haie-Coq, Auber-
 villiers.

45, fg Saint-Denis, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Thévenot, r. des Roses, Dijon.
 10, rue Crillon, Paris.
 Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
 4, r. de La Motte-Picquet, Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 37, rue de Tivoli, Bordeaux.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 5, rue Danton, Paris.
 Cachat, Evian-les-Bains (H.-S.).
 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
 8, rue de la Pompe, Paris.
 54, r. Fg-St-Honoré, Paris.
 50, bd des Batignolles, Paris.
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 11, pl. Louis-XII, Blois (L.-et-C.).
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 Pacy-sur-Eure (Eure), et 26, bd
 des Batignolles, Paris.

Id.
 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e).
 17, rue Cadet, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.

25, cours Lafayette, Lyon.
 15, quai de Bourbon, Paris.
 M. Panier, Malo-les-Bains.
 199 bis, bd St-Germain, Paris.
 24, rue de Fécamp, Paris.
 Bonnard (Yonne).
 29, r. Singer, Paris.

12, bd St-Martin, Paris.

O. C. P., 108, r. de Picpus, Paris

- Lait de Sapolan
 Lait de Soufre Sapolan
 *Lait Gallia Ch. Ger-
 vais
 Lait Gloria
 *Laits Guigoz : en pou-
 dre, dextrósé, malté,
 déchloruré
 [Lait Lepelletier
 Lait déchloruré Mo-
 lard
 Lait Molard au Calcia
 Lait Mont-Blanc
 Lait Ofco
 *Laits Carrien
 Lait sec Lo-lo
 Lait sec Nutricia
 Lait Sekle
 Laits Nutricia
 *Lambarène
 *Lanatine
 *Lanceryl
 *Lansoyl
 *Lantol
 Largocol Gef
 *Laristine Roche
 Larocaïne
 *Larosan Roche
 *Laroscobine
 Laryngol Reys
 Laryngolan
 *Lasal
 *Laurénol
 Lavement mucobary-
 tiné
 Lax
 Laxafégine
 Laxaflor
 Laxagarine
 Laxalates
 Laxalbine
 *Laxamalt
 Laxamer Lefèvre
 Laxapoudre Fleury
 *Laxaseptol
 Laxatif Châtel-Guyon
 Gubler
 Laxatif Blancher
 Laxatif Fluol
 *Laxatifs Miraton
 Laxatine Mory
 Laxatol
 Laxatone Déjardin
 29, rue Singer, Paris.
 id.
 11, rue de Prony, Paris.
 4, rue Roussel, Paris (XVII^e).
 2 et 4, rue Catulle-Mendès, Paris.
 48, rue Ampère, Paris.
 25, cours Lafayette, Lyon (VI^e).
 id.
 Romilly (Haute-Savoie).
 25, av. Michelet, Saint-Ouen.
 5, r. du Capitaine-Scott, Paris.
 123, rue de Paris, Saint-Denis.
 1, bd Saint-Martin, Paris.
 51, rue Rennequin, Paris.
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 5 bis, rue de Berri, Paris.
 (Voir : Digi-Lanatine.)
 13, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne
 (Seine),
 18, av. Hoche, Paris.
 269, rue Judaique, Bordeaux.
 10, rue Crillon, Paris.
 id.
 id.
 id.
 21, r. de la Gare, La Broque
 (B.-Rh.).
 24, rue Jardel, Bordeaux.
 348, rue Saint-Honoré, Paris.
 19, rue Drouot, Paris,
 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.
 19, av. Secrétan, Paris.
 74, rue Lourmel, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 15, rue des Champs, Asnières.
 84, fg du Temple, Paris.
 80, fg St-Denis, Paris.
 38, bd Bourdon, Paris-Neuilly.
 52, rue Decamps, Paris.
 Battut, à Vatan (Indre).
 M. Robilliart, pharm., Lille.
 70, rue Legendre, Paris.
 Vichy (Allier).
 43, av. Kléber, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Sauba, Montreuil.
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.

- Laxaul**
Laxaval
Laxia Dannec'h
Laximauve
***Laxior**
***Laxiris**
Laxocholéine Tulivet
Laxogélose Tulivet
Laxoil
Laxoléine
Laxol Fraudin
Laxo-lin
***Laxopeptine Girard**
Laxophényl
Laxophore Brachim
***Laxo-Psyllium**
Laxor
Laxorange Connat
Lebnol
Lécithine Adrian
Lécithine Clin
Lécithine Colloïdale
***Lécithine Vacheron**
Lécithine Vial
Lécithocéril
***Lemonai**
***Lénadryl**
***Lénibar**
Lenicade Brisson
Lénicure-Vichy
***Lénientol**
***Lenifédrine**
***Léniforme**
Lénigastre
***Lenior Bonnet**
***Léniserum**
Léophani
***Léotamine**
***Leptab**
Leptandrine Royer
***Leptol**
***Léthalgol**
***Leucagine**
Leucobules Gallier
Leucogénase
Leucolyse
Leucosérum
Levaine
***Levulinyl**
Levurase
Levure B. 17
Levure Boss
- pl. Guillaume-le-Conquérant, à
 Falaise (Calvados).
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 64, rue des Tournelles, Paris.
 7, rue de la République, Puteaux.
 Pillier, Compiègne (Oise).
 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.
 id.
 74, rue Monge, Paris.
 Millet, à Rambouillet.
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
 182, av. de Versailles, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Thomas, Eurville (Hte-Marne).
 à Joinville (Haute-Marne).
 Landon, Châtel-Guyon.
 19, av. d'Orléans, Paris.
 M. Folliet, Rumilly (Hte-S.).
 23, rue de Douai, Lille.
 9, rue de la Perle, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 8, rue La Fayette, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 8, rue Vivienne, Paris.
 20 bis, rue Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
 Fréchin, Lure (Haute-Saône).
 Novalis, Oullins (Rhône).
 Drouet & Plet, Rueil-Malmaison.
 157, r. Championnet, Paris.
 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 27, rue Brézin, Paris (XIV^e).
 26, rue Pétrelle, Paris.
 id.
 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
 5, r. E.-Combes, St-Étienne.
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-Seine.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 56, rue Beaubourg, Paris.
 223, rue Saint-Martin, Paris.
 333, rue de Vaugirard, Paris.
 32, rue Assalit, Nice (A.-M.).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 50, rue Nationale, Lille.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
 Charmaison, av. de Royat, Cha-
 malières (P.-de-Dôme).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 G. César & B. Boss, Besançon.

- Levure Coirre
 Levure de bière
 Levure Déjardin
 Levure fraîche Mycéta
 Levure Mycéta en com-
 primés
 Levure Vitæ d'Irwing
 Levure Zymaculine
 *Levurine extractive
 Lévrurine brute
 Levuritine
 Lévuromaltine Dejar-
 din
 Libérase
 Libérine
 Licardet Brisson
 *Lichénose
 Ligatures chirurgi-
 cales
 Likan Asiatique
 Limital
 Limmerol
 Limnéol
 *Limol Churchill
 *Limonade (Voir : Citrose
 Vichy)
 *Limonade Godfrin
 Limonade hypotensive
 Linadéline
 Lin Tarin
 Liniderme
 Liniment Bertrand
 Lipasonol
 *Lipaurol
 Lipex
 Lipiodol Lafay
 Lipiodol « F »
 Lipobil
 [Lipo-Bismuth Ercé
 *Lipocérébrine
 [Lipochol Byla
 *Lipocrinyl
 [Lipocytol Grémy
 Lipodeterpénol Zyma
 Lipoféine
 Lipogazes dermatolo-
 giques
 Lipogyre Ciba
 *Lipoiiodine Ciba
 Lipol
 Lipolysine Martinet
- 5, bd Montparnasse, Paris.
 Adrian, 9, r. de la Perle, Paris.
 10, r. Parent-de-Rozan, Paris.
 34, rue Vignon, Paris (IX^e).
 92, rue Bobillot, Paris.
 Palc, Mussigny (Côte-d'Or).
 92, rue Bobillot, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 id.
 Feigel, Lutterbach (H.-Rhin).
 Dejardin, 10, rue Parent-de-
 Rozan, Paris.
 35, av. de Versailles, Paris.
 Capin, Roquefort (Landes).
 157, rue Championnet, Paris.
 Ducloy & C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
 Optima, 78, Grande-Rue-au-
 Bois, Bruxelles.
 5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
 11 ter, av. de Ségur, Paris.
 12, rue de Strasbourg, Paris.
 12, pl. Renoux, Clermont-Fer-
 rand (P.-de-D.).
 92, av. de St-Mandé, Paris.
 7 bis, rue Galvani, Paris.
 5, av. Watteau, Nogent-sur-
 Marne.
 130, bd Haussmann, Paris.
 151 bis, Gde-Rue, Villemonble.
 6, rue Dombasle, Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris.
 Nomexy (Vosges).
 19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 14, r. A.-Briand, Levallois-
 Perret.
 41, av. Joffre, La Garenne.
 22, rue du Landy, Saint-Ouen.
 id.
 29, pl. Wilson, à Denain.
 1, av. de Villars, Paris.
 52, r. Labruyère, Paris (IX^e).
 26, av. Observatoire, Paris.
 154, av. Malakoff, Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 92, rue Bobillot, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 Lecoq & Ferrand, 14, r. A.-
 Briand, Levallois.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 id.
 34, pl. Alex.-Dumas, Lille.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.

- *Liposeptine
- *Liposeptol
- *Liposplénine du D^r Groc
- Lipothine
- Lipo-Vaccins
- *Lipovita
- Liqueur Bouty
- Liqueur de l'Étoile antiasthmatique
- Liqueur d'Hermès
- Liqueur Laprade
- Liqueur Laville
- Liqueur peptophosphorique
- Liqueur de Pittermont
- Liqueur Talobre
- Liqueur Thyro
- Liqueur végétale Narud
- Liq. organiques inject.
- Liqueur dépurative
- Vérandy
- *Liquidix
- Liquoïde
- Liseronine
- Listérine
- Listose Vicario
- *Lita
- Lithane
- Litharsyne Ferré
- Lithiné Henry
- Lithinés Magnésiés
- Maxim
- *Livartil
- Liverdase
- Liverphine
- *Lobéliane Laleuf
- *Lobeline Sandoz
- *Lobeline Bruneau
- Lobuline
- *Localibut
- Locrinol
- *Lofodol
- *Logaphos
- *Loraga
- Lortocarbol
- *Lotion Blanche R. F.
- Lotion végétale Pachaut
- *Lotion Py
- *Lotusédine
- Luatine
- 2, pl. des Vosges, Paris.
- id.
- 14, rue des Minimes, Paris.
- JOSSE, pl. Wilson, Denain.
- 32, rue de Vouillé, Paris.
- Mauchant, Gennevilliers (Seine).
- 3, rue de Dunkerque, Paris.
- 49, r. de Maubeuge, Paris.
- 12, bd Saint-Martin, Paris.
- 49, rue de Maubeuge, Paris.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 9, rue de la Perle, Paris.
- 2, rue de Paris, à Douai.
- Saint-Girons (Ariège).
- 3, rue de Dunkerque, Paris.
- 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
- Bouty, 3, r. Dunkerque, Paris.
- Laurens, Aix-en-Provence.
- Delaprée, Mortagne (Vendée).
- 10, rue Crillon, Paris.
- 19, rue Drouot, Paris.
- 5, rue de la Paix, Paris.
- 17, bd Haussmann, Paris.
- 7, rue de l'Armorique, Paris.
- 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
- 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
- 39, r. de Sclessin, Liège.
- 6, pl. de l'Académie, Angers.
- 86, r. du Pas-St-Georges, Bordeaux.
- 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
- 41, bd Haussmann, Paris (IX^e).
- 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
- 20, rue Vernier, Paris.
- 17, rue de Berri, Paris.
- 1, av. de Villars, Paris.
- (Voir : *Novalibut local*.)
- Guéraud, Pharm., Chabeuil (Drôme).
- 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
- 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- 13, rue Pagès, Suresnes.
- 86, bd Port-Royal, Paris.
- La Roche-Posay (Vienne).
- 130, bd Haussmann, Paris.
- 58, bd Richard-Wallace, Puteaux (Seine).
- 86, r. du Pas-St-Georges, Bordeaux.
- 2, av. Parmentier, Paris.

- Lual**
Luarsyl
Lubrilax
***Lubrokak**
Luchon
Lucimarine
Lucinine
Lucodal
Lucosalgue
***Ludin**
Luérol
***Lugocalcion**
***Lumeval** (Voir : *Dragées Lumeval*)
Luostyl
Lusitol
***Lusiforme**
***Luteovar**
Lux-Gaillac
Luxiber
Lycétol Vicario
Lyciflore
Lycobile
Lyctine (Elixir)
Lyctogen
Lyméogène
Lymphactol
***Lymphiode**
Lymphosclérol
Lynévol
Lynoléol
***Lysacrème L. M. L.**
Lysarthrol
***Lysaxins L. M. L.**
Lysidinal
Lysiode
Lyso-Choc
***Lysococcine**
Lysol
Lysolats
Lysomol
Lysosclérol
Lysurol
***Lyxanthine Astier**
- Bailly, 15, r. de Rome, Paris**
id.
2, rue du Pensionnat, Lyon.
19, rue Drouot, Paris.
C¹^e P^{er}mière de Luchon (Hte-G.).
154 bis, r. Breteuil, Marseille.
88, rue Duhesme, Paris.
2, quai Paul-Bert, Tours.
10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
Rey, 12, r. Montmartre, Dijon.
37, rue Pajol, Paris.
Novalis, Oullins (Rhône).
52, bd du Temple, Paris.
22, rue de Nemours, Paris.
7, passage Thionville, Paris.
15, rue d'Argenteuil, Paris.
12, bd St-Martin, Paris.
av. du Mar.-Foch, Gaillac (Tarn).
12, Gde-Rue, Évreux (Eure).
17, bd Haussmann, Paris.
11, r. des 2-Ponts, Paris.
11, rue de Clichy, Paris.
42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
id.
26, rue Cambon, Paris.
4 bis, rue de Lyon, Paris.
16, rue du Petit-Musc, Paris.
72, r. St-Dominique, Paris.
112, rue des Pyrénées, Paris.
Monge, Pharm., Oullins (Rhône).
1, av. de Villars, Paris.
89, r. du Cherche-Midi, Paris.
1, av. de Villars, Paris.
Bedeil, Lavelanet, Ariège.
21, rue St-Antoine, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
79, r. de Paris, St-Denis (Seine).
65, r. Parmentier, Ivry (Seine).
65, rue Parmentier, Ivry,
Hendrix, Anvers (Belgique).
Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
112, rue de Gerland, Lyon.
42, rue du D^r-Blanche, Paris.

M

- Maganéol**
Magbi
 ***Magbromyl**
 ***Magécarine**
 ***Magiodyl**
Magistère de Bismuth
Maglose
 ***Magnacalcine**
Magnebyl
Magnécal
Magnéclo
Magnécythine D^rTissot
 ***Magnélax**
Magnésia Régnier
 ***Magnésie Dechosal**
Magnésie Drouet
Magnésie Durel
Magnésie D^r Gustin
Magnésie hydratée
 ***Magnésie Lancosme**
Magnésie Roger's
Magnésie Roy
Magnésie San Pellegrino
Magnésio - Cacodyline
Magnésiode
Magnésion
Magnésium Boulard
Magnésium chloruré
Magnésium Grorichard
 ***Magnésium Hardy**
 (Sirop et Tablettes-Bouillon)
 ***Magnésium Rosso**
Magnésol
- Le Blosset, Moulin-s.-Yèvre (Cher).
 61, rue de Seine, Paris.
 10, r. J.-Hachette, Ivry (Seine).
 15, r. St-Maurice, Nanterre.
 10, r. J.-Hachette, Ivry-s.-Seine.
 2, bd Pershing, Paris.
 178, rue Montmartre, Paris.
 103, r. Saint-Lazare, Paris.
 126, rue de la Pompe, Paris.
 54, rue des Fcs-Bourgeois, Paris.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
 23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.
 75, rue Grande, Fontainebleau.
 39, r. R.-Salengro, Bondy (Seine).
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
 7, bd Denain, Paris.
 157, r. Championnet, Paris.
 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 103, rue St-Lazare, Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 86, rue Michel-Ange, Paris.
 20, pl. de la Mairie, Parc-St-Maur (Seine).
 27, r. Poids-de la-Farine, Marseille.
 82, av. de Suffren, Paris.
 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
 12, pl. de la Révolution, Besançon.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 63, rue de Charonne, Paris.
 37, rue Galilée, Paris.

- *Magnéso-tubes Robi-
 net
 *Magnésouvules
 Magnétol
 Magnétone
 Magnidia
 Magnogène
 Magnolax
 *Magol Churchill
 *Magsalyl
 *Maisleriase
 Maisleriase F.
 Maisleriase P. M.
 Maisleriase vétérinaire
 *Maïzena
 Malarsan
 Maltase Fanta
 Malt Barley
 Malt des Nurses
 *Maltea Moser
 *Malt Ethel
 *Malt français Déjardin
 (extrait)
 Maltine Gerbay
 Malt Kneipp
 Maltine-Phénix
 Malt Moritz
 *Maltogil
 Malt-Oléol
 *Maltosan
 *Maltosine Déjardin
 Malt Régina
 Malt Strauss
 *Malt Wander
 Malzémose
 Mamelle Endocrisines
 Fournier
 Mameline Meurice
 Mammaïrovarique
 Mercier
 Mammol
 *Manacine
 Mancobène
 *Mandelium
 *Mandocarbine
 Mandragol
 *Mangaïne
 *Manganésia
 Manganifer
 Mangano-Calciqne
 Mangano-Fer Henry
 Manganonuclyl
 Moret-sur-Loing (S.-et-M.).
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 58, r. de Maubeuge, Paris.
 10, rue Vignon, Paris.
 17, rue du Midi, Vincennes.
 13, av. de Ségur, Paris.
 87, av. Borriglione, Nice.
 92, av. de St-Mandé, Paris.
 10, r. J.-Hachette, Ivry (Seine).
 143, r. d'Alésia, Paris.
 id.
 id.
 id.
 29, rue de Berri, Paris.
 62, rue Erlanger, Paris.
 77, av. A.-Briand, Montrouge.
 id.
 à Bourg-la-Reine.
 8, ch. de Montbrillant, Lyon.
 132, r. du Fg-St-Denis, Paris.
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
 à Roanne (Loire).
 Juvisy-sur-Orge (S.-et-O.).
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 189, rue de Vaugirard, Paris.
 Progil, 10, quai de Serin, Lyon,
 et Ris-Orangis (S.-et-O.).
 12, bd St-Martin, Paris.
 Wander, Champigny-s.-Marne.
 10, rue Parent-de-Rosan, Paris.
 10, rue Pajol, Paris.
 12, rue Broca, Paris.
 Wander, Champigny-s.-Marne.
 18, r. de Ménilmontant, Paris.
 7, rue Biscornet, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 41, route de Turin, Nice.
 107, r. des Dames, Paris.
 83, bd de la Villette, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
 13, rue Beudant, Paris.
 113, bd Voltaire, Paris.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 64, r. des Tournelles, Paris.
 9, r. de la Gare, Levallois.
 à St-Amand-Montrond (Cher)
 36, rue de Sclessin, Liège.
 Delaunay, Joué-lès-Tours (I.-et-L.)

- *Mangano Phosphal Julien**
 Mangaphos
 Mangarsenic
 Manglynol Ducatte
 Mangratinés
 Maniodhamamélis
 Mannitine
 Marabout
 Marcynase
***Marinol**
 Mariode
 Marisine
 Marnal
 Marramélis
 Marron d'Inde Dausse
 Marronine
***Marrubène**
***Marrubiase**
***Marrucol**
 Marruséra
 Marsyle Clin
***Marubor**
 Masbi
 Masglandol
***Maté Douglas**
 Matéine Dufert
 Matico de Grimault
 Maya Bulgare
 Médicament de Saint-Boes
 Medicoferments Boss
 Mégathion
 Mélange Anesthésique Adrian
 Mélange Anesthésique de Schleich
 Mélange Balsamique de Schleich
 Mellolaxine
 Ménacrine
***Menatol**
 Menopausine
***Menosedine**
 Ménovarine
 Mensalgine
***Mensival**
 Mensorrhine
***Mensuosedyl**
***Menthe Mitcham Védé**
 Mentholina
- 105, rue de Rennes, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 D^r Lavoué, Rennes (I.-et-V.).
 31, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 55, r. de Chabrol, Paris.
 62, r. Carnot, Vernon (Eure).
 6, rue Trencavel, Béziers.
 11, r. Antoine-Bourdelle, Paris.
 Dieppe (Seine-Inférieure).
 14, r. des Pyramides, Paris.
 15, r. de l'Hôtel-de-Ville, Brive.
 8, rue Ribelette, Paris.
 2, allées de Chelles, Le Raincy.
 4, rue Aubriot, Paris.
 61 bis, r. Corot, Ville-d'Avray.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 60-62, r. St-Guilhem, Montpellier.
 69, av. du Maine, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 1, r. d'Arras, Béthune (P.-de-C.).
 7, pass. Thionville, Paris.
 43-45, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 62, Champs-Élysées, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 322, r. Saint-Honoré, Paris.
 par Orthez (Basses-Pyrénées).
 10, r. de la Viotte, Besançon.
 Oliviero, Boulogne-sur-Seine.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 id.
 id.
 3, r. Royet, Lyon.
 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
 15-17, r. de Rome, Paris.
 9, pl. de la Paix, Mulhouse.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 211, r. de la Convention, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 62, r. de la Brauderie, Châteaurox.
 3, r. des Rouairies, Dinan.
 2, r. des Lombards, Paris.
 2 et 4, pl. Gambetta, Paris (XX^e).
 Guignier, Bois-Colombes.

Ményantal	Lab. Sauba, Montreuil-Paris.
Méral	61, av. Louise, Bruxelles.
Mercuriaux Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Mercurochrome 220	25, r. St-Augustin, Paris.
*Mercuro-Past	52, r. des 5-Diamants, Paris.
Mériod	66, bd Exelmans, Paris (XVI ^e).
Méroléol Salle	4, rue Elzévir, Paris.
Mésosome	17 bis, av. Parmentier, Paris.
Mésogastrine	37, av. Jules-Coutant, Ivry-s.-S.
*Mésothine Rhemda	51, rue d'Alsace, Courbevoie.
Mésothorium	98, rue de Sèvres, Paris.
*Mésothorium Rhemda	51, rue d'Alsace, Courbevoie.
*Métacarbène	3, pl. Jussieu, Paris.
*Métacitrine	id.
*Métacuprol	5 bis, rue Pajou, Paris (XVI ^e).
*Métaformine	Aubert, 3, pl. Jussieu, Paris.
Métalase	252, fg Saint-Martin, Paris.
*Métallophédrine	22, rue des Martyrs, Paris.
Métallosal	149, r. du Palais-Gallien, Bordeaux.
Métarapnol	50, av. de Normandie, Colombes.
Métarsine Jasma	4, pl. de la Gare, Tunis.
Métasept	1, r. de Besançon, Montbéliard.
Métasérum	3, rue de Dunkerque, Paris.
Métaspirine	P. Métadier, Tours.
Métastérol	3, place Jussieu, Paris.
*Métasulfamide	16, route d'Abbeville, Amiens.
Métasulfol Vigier	12, bd Bonne Nouvelle, Paris.
*Méta Titane	Paul Métadier, à Tours.
*Métatone	348, rue St-Honoré, Paris.
*Métaux colloïdaux	8, rue des Capucines, Paris.
Métaux colloïdaux	18, av. Hoche, Paris.
Métaux et Métalloïdes Vivants	82, av. de Suffren, Paris.
*Méta Vaccin	Paul Métadier, à Tours.
*Métavitalysé	5 bis, rue Pajou, Paris.
Métharfer Bouty	3, r. de Dunkerque, Paris.
Métharsinate Clin	20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
Métharsol Bouty	3, rue de Dunkerque, Paris.
Méthinol	39, r. Roger-Salengrô, Bondy.
Méthylarsinates Bouty	3, rue de Dunkerque, Paris.
Méthylarsinate Vicario	17, bd Haussmann, Paris.
Méthylarsinate Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Métophan	34, bd Victor-Hugo, Grasse.
Métricine	23, Gde-Rue, Asnières (Seine).
Métricure (poudre et ovules)	21, rue de Lyon, Paris.
*Metritols	127, bd Saint-Michel, Paris.
Métrostyptal Grorichard	12, pl. de la Révolution, Besançon.
*Mexyl	6, rue des Dames, Paris.
Meyor	12, Grande-Rue, Évreux.
*Micelliode	4, rue Platon, Paris (XV ^e).
Micoforme	Savary, Sallaumines (P.-de-C.).

- *Micranyl
 - Microbol
 - Microcidal
 - *Microderme
 - *Microgel
 - *Microlyse
 - *Microvax
 - *Mictasol
 - *Mictasol Bleu
 - *Mictasovules
 - *Mictazine
 - *Mictophile
 - *Mictoséda
 - Mictosédine
 - *Mictoseptol
 - *Mictualine
 - Micturyl
 - Migrainol
 - Milkase

 - Mimophédrine
 - Minéraline du D^r Baud
 - *Minéralogène
 - Minérol
 - Minérolaxine
 - *Minervol
 - Mintosal
 - *Minurex
 - *Miroxyl Lahaye
 - Misalgol
 - *Mistol
 - *Mitosyl
 - Mixalthyl
 - *Mixiod
 - Moka du Travailleur
 - Mokavène
 - *Molagar
 - Molavose
 - *Molène

 - Molléine
 - Mondorasme
 - *Moréthyl Dausse
 - Morisland
 - *Morrhualène Gautier
 - *Morrhuéline Jungken
 - *Morrhuéline Jungken
 - Vitaminée
 - Morrhutine Puy
 - *Morrhual Chapoteaut
 - *Morrhuxine
 - Morsine
 - Moruan
 - Morubiline
 - *Morucalcose
- Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
 145, av. de Montredon, Marseille.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 25, rue du Général-Foy, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 10, rue Strasbourg, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 id.
 id.
 id.
 45, fg Saint-Denis, Paris
 Faure & Lagente, Montargis
 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 29, fg de Bourgogne, Orléans.
 Cluzel, 60, c. É.-Zola, Lyon.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 16, cours Gambetta, Lyon.
 pl. de l'Hôtel-de-Ville, Salon-
 de-Provence.
 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e).
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 (Voir : *Artériolex.*)
 10, rue Richelieu, Paris.
 87, av. Borriglione, Nice.
 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
 Jouffray, Bourgoin (Isère).
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 60, rte de Châtillon, Malakoff.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 61, av. de Saxe, Paris.
 5-7, r. Cl.-Decaen, Paris.
 59, rue Boissière, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 36, rue de Verdi, Nice.
 16, rue de Rocroy, Paris.
 13, r. Pagès, Suresnes (Seine).
 7, rue des Petits-Carreaux, Paris.
 14, rue A.-Briand, Levallois-
 Perret.
 80, fg St-Denis, Paris.
 95, rue de Turenne, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 105, r. de Normandie, Courbe-
 voie (Seine).
 id.
 à Grenoble (Isère).
 8, rue Vivienne, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 32, rue Joubert, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.

- ***Morufine** 6, rue Berbissey, Dijon.
- Moruphyllé** Bost, Villefranche (Rhône).
- Moruxase concentrée** 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- Mosti** 21, rue Mouton-Duvernet, Paris.
- ***Mothersill's seasick remedy** 5, rue de Provence, Paris.
- Mouches Albespeyres** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Movebil** 5, pl. Bisson, Lorient.
- ***Mucicarbos** Millet, Rambouillet (S.-et-O.).
- Mucicardine** Mouflet, Chennebrun (Eure).
- Mucigénol** 71, rue Sainte-Anne, Paris.
- ***Mucigrains** 94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).
- ***Mucilage Goy** 23, rue Beautreillis, Paris (XIV^e).
- ***Mucilaxine** Millet, Rambouillet (S.-et-O.).
- Mucilose** id.
- ***Mucinum** 26 bis, rue Dombasle, Paris.
- Mucobarytine** id.
- ***Mucobismuthine** 145, r. Yves-le-Coz, Versailles.
- Mucobyl** 4, av. M.-Berteaux, Poissy.
- Mucolflogose** 10, r. Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comté (Vendée).
- ***Mucofoie** 48, rue de la Procession, Paris.
- Mucogène Astier** 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
- Mucoléine** av. Baraduc, Châtel-Guyon.
- ***Mucosodine** 37, r. de la Fédération, Paris.
- ***Mucyllium** Bernard-Garcin, Saint-Saturnin-lès-Avignon (Vaucluse).
- Mugrizol Dumesnil** 10, rue du Plâtre, Paris.
- ***Multiplast** 3, r. des Reculettes Paris (XIII^e).
- ***Muoléol** Blanc, Barcelonne-du-Gers (Gers).
- Muqueuse Endocrisines Fournier** 7, rue Biscornet, Paris.
- ***Murones du D^r Robert Jacques** Silbert Ripert, 30, rue Benedit, Marseille.
- Musclanol** 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
- Musculargyre** 95, r. de Turenne, Paris.
- ***Musculogénol** 117, r. V.-Hugo, Houplines (Nord)
- Musculosine Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Mustérole** 78, rue Dareau, Paris.
- Mutandine** Grémy, 4, r. de Clichy, Paris.
- ***Muthanol** 22, rue de Turin, Paris.
- ***Muthiode** 14, r. Ar.-Briand, Levallois-Perret.
- Muthoquinol** 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- ***Muxagol** 43, r. de Chartres, Neuilly-s.-S.
- Muxol** Lab. Servier, à Orléans.
- Muxyl** 77, bd de Grenelle, Paris.
- ***Mycidol Badel** à Valence-sur-Rhône.
- Mycolactine** 122, r. du Cherche-Midi, Paris.
- ***Mycolysine Doyen** 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
- Mydriasine** Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
- Mydriédrine** 194, rue de Rivoli, Paris.
- ***Mygdal** 295 bis, rue de la Benauge, Bordeaux.
- ***Myochrysine** 21, rue Jean-Goujon, Paris.

*Myoden	37, r. des Lois, Toulouse.
Myodone	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Myodyne Mauchant	Gennevilliers (Seine).
Myonutrose	71, rue Ste-Anne, Paris.
*Myoral	3, rue Saint-Roch, Paris.
Myo-Sérum	168, bd St-Germain, Paris.
Myosine (forte et faible)	Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
*Myosthène	E. Bartier, Armentières (Nord).
Myotonine	14, av. Perrichont, Paris.
*Myothermine	47, r. Bokanowski, Asnières.
*Myovarsyl	89, rue Cherche-Midi, Paris.
Myrcia	38, rue du Louvre, Paris (1 ^{er}).
Myrcol	72, quai Jemmapes, Paris.
Myrone	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Myrrhina	38, rue du Louvre, Paris (1 ^{er}).
Myrtane	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Myrtanol	19, rue Godot de Mauroy, Paris.
Myrtille pure	Chartier, Saumur (M.-et-L.).
Myrtilline	Lab. Demasles, Vienne (Isère).
Myrtoline	9, pl. Municipale, Tulle.

N

Nader	6, rue de l'École, Versailles.
Nadolor	191, fg Saint-Antoine, Paris.
*Nador-Aseborhal	25, r. de Tocqueville, Paris.
Nadorine	25, rue Tocqueville, Paris.
*Naïodine Logeais	71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
Naphtocarbène	83, bd de la Villette, Paris.
Naphtolargol	3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
Narcotile Bengué	16, rue Ballu, Paris.
Narcyl	34, rue Sedaine, Paris.
Narkène	Mauchant, Gennevilliers (Seine).
Nasale Ymera	28, rue de Seine, Paris.
Nasargine	171, r. de Belleville, Paris.
*Nasobore	Novalis, Oullins (Rhône).
Nasocaïne	Lab. Aninat, Nîmes (Gard).
Nasogyne	37, rue des Lois, Toulouse.
Nasolène	42, r. du Mont-Cenis, Paris.
*Nasophédrine Béral	194, rue de Rivoli, Paris.
Nasopon	239, rue Paul-Bert, Lyon.
Nasosulfarsan	Domergue, Agen (L.-et-G.).
*Natibaine Nativelle	27, rue de la Procession, Paris.
Natrochol	19, r. du Panier, Marseille.
*Natrosyl	127, bd Saint-Michel, Paris.
Natura	10, rue de Strasbourg, Paris.

- *Navidrine 194, rue de Rivoli, Paris.
- Naza-Capsules 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- Nazilante Aninat, Nîmes (Gard).
- Naziline 33, Grande-Rue, Besançon.
- Nazogyne 37, rue des Lois, Toulouse.
- *Nazoïl Lacoste, Caudéran (Gironde).
- Nazophyl Darva 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- *Néadol 62, r. de la Brauderie, Château-roux.
- *Néalgyl Bottu 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- Nécessaire d'Accouchement Lucinia, 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.
- *Néfitol 24, rue de Monttessuy, Paris.
- Neigotan 48, bd La Tour-Maubourg, Paris.
- Nénita 58, r. de Maubeuge, Paris.
- *Néoarsite 7, rue Galvani, Paris.
- Néo-Arsycodile 62, rue de la Tour, Paris.
- Néo-Asclérol 110, av. E.-Vaillant, Boulogne-sur-Seine.
- *Néo-Biol 181, av. V.-Hugo, Clamart (Seine).
- *Néoboldine 17, rue Chomel, Paris (VII^e).
- Néoby 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
- *Néo-Calciline 21, rue Violet, Paris.
- Néo-Carbone Magnésie 75, r. Grande, Fontainebleau.
- *Néocardyl 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Néocedine 50, av. Jacqueminot, Meudon.
- Néo-chloral Nau 21, Gde-Rue, Argenteuil.
- *Néo-Coccyll 222, bd Péreire, Paris.
- *Néo-Codion 47, rue de Bretagne, Paris (III^e).
- *Néo-Collargol 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- *Néo-Crinol 89, rue Martre, Clichy (Seine).
- Néodermine 21, rue de Neuilly, Nanterre.
- Néo-Dispositif Ravaut 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Néo-Dmégon 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Néo-Dmétys id.
- Néo-Emétinol 2, rue de Rivoli, Paris.
- Néo-Ferments du Dr Wolf 46, rue des Faures, Bordeaux.
- Néofilhos le Perdriel 11, rue Milton, Paris.
- Néo-Galyll Mouneyrat, Villeneuve-la-Garenne (Seine).
- *Néoglobuline 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
- *Néo-Gynergène 20, rue Vernier, Paris.
- Néoiacol I. S. M. 25, rue Dagorno, Paris.
- Néo-Iodure Ménard 3, rue République, Lyon.
- Néo-Kola Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- Néol 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- Néolactyl 10, av. de Wagram, Paris.
- Néolaotine 2, r. des Fossés-St-Denis, Boulogne-sur-Seine.
- *Néo-Laxatif Chapotot 56, bd Ornano, Paris.
- Néolides H. B. 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- *Néolyse 22, rue de Turin, Paris.
- Néo-Mg 229, cours Gambetta, Lyon.

- *Néo-Neurosine Prunier**
1, quai Aulagnier, Asnières.
- *Néo-Pancarpine**
5, rue François-Ponsard, Paris.
- Néopansemment du Dr Wolf**
46, rue des Faures, Bordeaux.
- *Néophagie**
86, rue Michel-Ange, Paris.
- Néo-Phanol**
26, rue Sainte-Claire, Mulhouse.
- Néophos**
72, quai Jemmapes, Paris.
- Néo-Physio**
Drouet et Plet, Rueil-Malmaison.
- Néo-Pituitairine**
78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Néoplastex**
71, fg Saint-Martin, Paris.
- *Néopulmine**
45, fg Saint-Denis, Paris.
- Néoquinine Falières**
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Néoral**
295 bis, r. de la Benaugue, Bordeaux.
- Néorexine**
place Pilorget Saint-Symphorien (Indre-et-Loire).
- *Néo-Rhénium du Dr L. Fournier**
82-84, rue de Belleville, Paris.
- Néo-Rhomnol**
62, rue de la Tour, Paris.
- Néo-ricin**
39, r. Roger-Salengro, Bondy.
- *Néo-Riodine Astier**
42, r. Docteur-Blanche, Paris.
- Néosalicylate**
3, place Jussieu, Paris.
- Néosalicylate**
39, rue de Sclessin, Liège.
- *Néosaliodé**
55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
- *Néo-Salyl (ex Sodisalyne)**
222, bd Péreire, Paris.
- Néosantal**
Fabris, Chambéry (Savoie).
- *Néosédyll**
18, bd de Strasbourg, Albi.
- *Néo-Seti**
157, rue Championnet, Paris.
- *Néosolmuth**
14, r. A.-Briand, Levallois.
- Néo-Soufre Inava**
14, rue de Normandie, Asnières.
- Néospasmodyl**
41, av. Joffre, La Garenne.
- Néo-spermine**
48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
- *Néo-Sphérulines**
(Voir : *Opothérapie Moncour.*)
- Neospiran**
8, rue La Fayette, Paris (IX^e).
- *Néosplénine**
3, pl. Jussieu, Paris.
- Neostomol**
86, rue de la Réunion, Paris.
- Néosuline Fornet**
11, Chaussée de la Muette, Paris.
- *Néothorium Millot**
177, rue de Courcelles, Paris.
- Néo-Tréparséan**
20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Néo-Trépol**
22, r. de la Sorbonne, Paris.
- *Néotrope Aguettant**
36, quai Fulchiron, Lyon.
- Néotrophène**
31, r. Chemin-de-Fer, Nanterre.
- Néovaryl**
6, av. Mirabeau, Nice.
- Néovitalyne**
28, r. de l'Hôpital-Militaire, Lille.
- Néoxyl**
27, rue G.-Tessier, Saint-Étienne.
- *Néphractive**
10, r. Pont-au-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée).
- *Néphralbine**
2, r. Carnot, Melun (S.-et-M.).
- Néphrine Bouty**
3, rue de Dunkerque, Paris.
- Néphrine Byla**
26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Néphrocrinol**
107, r. des Dames, Paris.
- *Néphrylan**
6, rue Parrot, Paris.
- *Néptal**
21, rue Jean-Goujon, Paris.

*Nergine	4, rue Lamartine, Nanterre.
Nertosé	132, r. de Turenne, Paris.
Nervador	Lab. des Vosges, La Broque (B.-Rh.).
*Nervantyl Miluc	L. Ragoucy, 2, r. J.-Bara, Paris.
Nervobiolène	137, Fg Saint-Antoine, Paris.
*Nervocithine Tissot	34, bd de Clichy, Paris.
*Nervosédol	109, rue de Sèvres, Paris.
*Nervyl Rousseau	4, r. Gambetta, Sens (Yonne).
*Nesal	92, rue Bobillot, Paris.
*Néseptol Bengué	16, rue Ballu, Paris (IX ^e).
*Nestogène	6, av. César-Caire, Paris.
*Nestosyl	72, r. St-Dominique, Paris (VII ^e).
*Nestrovit	10, rue Crillon, Paris (IV ^e).
Neubryne	78, bd Beaumarchais, Paris.
*Neuralgic Carron	Latour, Terrasson (Dordogne).
Neuranol	Delaunay, Joué-lès-Tours.
Neuraxial	45, fg St-Denis, Paris.
Neuraxol	Delaunay, Joué-lès-Tours. L.).
*Neurène	62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s-S.
*Neuréal	3-5, jr. A.-Dumas, St-Ouen (Seine).
Neuricure	77, bd de Grenelle, Paris.
Neuridor	Saubas, Montreuil (Seine).
*Neurinase	45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
Neuristol	pl. de la Comète, Asnières.
Neurit	11, rue Malher, Paris.
Neurobore	23, rue des Moines, Paris.
Neurobrom	6, r. du Moulin, Charleville.
*Neurocalcium	19, av. d'Orléans, Paris.
Neurodonal Kœnig	Thomas, Chemillé (M.-et-L.).
Neurodose	47, rue de Neuilly, Nanterre.
*Neuroferyl	29, rue Carnot, Levallois-Perret.
*Neuroflorine	44, rue de Lagny, Montreuil.
Neurogaïacol Dethan	11, rue A.-de-Neuville, Paris.
*Neurogalène	61, bd Malesherbes, Paris.
*Neurogastrine	12, bd St-Michel, Paris (VI ^e).
Neurogénol	Blosset, Moulins - sur - Yèvre (Cher).
Neuroiodure Dethan	11, r. A.-de-Neuville, Paris.
Neurokabryl	150, r. de Paris, Pantin (Seine).
*Neuronal Brothier	20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).
Neuro-Pax	19, r. du Bailly, Plaine-St-Denis.
*Neurophoryl	187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine).
*Neurophos	11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes.
Neurophytol	78, av. St-Ouen, Paris (XVIII ^e).
Neuroplasma	16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
*Neuroplexyl	5 bis, rue Pajou, Paris.
*Neuropol	83, bd de la Villette, Paris.
Neuroséda	149, av. des Minimes Toulouse.
Neurosérine	Jarmon, 4, pl. de la Gare, Tunis.
*Neurosine Prunier	1, quai Aulagnier, Asnières.
Neurosol Debreyne	M. Bailleult, Mortagne (Orne).

- *Neurosolène
 Neurosomnyl
 Neurosthéma
 *Neurosthénol
 Neurosthyll
 Neurotanic
 *Neurotensyl
 Neurotonine
 Neurotrol Abadie
 Neurotropé
 Neurotrophène (am-
 poules)
 Neurotrophol Byla
 *Neurovarol Douetteau
 Neurovoïne
 *Neuséda
 *Neutracétyl
 *Neutracétyl chocolaté
 Neutracide
 Neutralcaol
 Neutralisine Bureau
 Neutralol
 Neutrobyl
 Neutropeptine
 *Neutrose Vichy
 Neuvaritol
 Névorol
 Névralgésine
 Névralgine Montsarrat
 *Névralgol Brossard
 Névraline Rosey
 Névrasite
 Névrof Fréval
 *Névrofan
 Névroserum
 *Névrofol
 Névrostérol
 *Névrosthénine Freys-
 singe
 *Névrovitamine 4
 Newlax
 Nézol
 Nickobalt
 Nicopyrine
 *Nigérine Vincent
 Nigroformine
 Nipostra
 *Nitium
 Nitracaine
 *Nitrargol
 Bréant, 11, r. de Clichy, Paris.
 229, cours Gambetta, Lyon.
 Cellier, Saint-Uzé (Drôme).
 Richard, Aubenas (Ardèche).
 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
 Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
 72, bd Davout, Paris (XX^e).
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 37, r. Pajol, Paris.
 35, rue de Boissonnade, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 20, fg Saint-Honoré, Paris.
 Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
 Lyons, 30, rue Monge, Paris.
 25, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris.
 id.
 42, bd St-Marcel, Paris.
 Benderitter, Vendôme.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 13-15, r. de la Sablière, Bécon-
 les-Bruyères.
 D^r Aubert, 3, pl. Jussieu, Paris.
 15, r. Pasteur, Bourg (Ain).
 1 et 3, rue Lafloque, Vichy.
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 95, r. de Turenne, Paris.
 Débordes, à Moulins (Allier).
 à Revel (Haute-Garonne).
 1, r. du Cordouan, La Rochelle.
 1, rue de l'Odéon, Paris.
 11, r. Joseph-Bara, Paris.
 84, r. de Rochechouart, Paris.
 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
 Mahieu, Lens (Pas-de-Calais).
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 6, rue Abel, Paris.
 11, r. F.-Giraud, Villefranche
 (Rhône).
 Coulaud, Lorris (Loiret).
 Châtelain, Niort (D.-Sèvres).
 12, r. Paul-Baudry, Paris.
 21, rue de la Gare, La Broque
 (B.-Rh.).
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 51, rue de Paris, Pierrefitte.
 Ferrembach, Kaisersberg (H.-
 Rh.).
 98, rue de Sèvres, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 12, rue du Chemin-Vert, Ville-
 neuve-la-Garenne (Seine).

Nitrophényl	4, r. de La Fère, St-Quentin.
Nobial	15, rue des Champs, Asnières.
Noctifen Léo	11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
Noctisédyll	2-4, r. des Lombards, Paris.
Noelline (Sirop-Savon)	45, place du Centre, Guingamp.
* Nogryp	Lacoste, Caudéran (Gironde).
Nopirine Vicario	17, bd Haussmann, Paris.
* Norgangine	41, rue de Rome, Paris.
* Normacol	41, rue de Rome, Paris.
Normaflux	2, rue du Pensionnat, Lyon.
* Normalax	17, rue Chomel, Paris.
* Normatensol Bouret	87, rue Lafayette, Paris.
* Normogastryl	14, rue des Minimes, Paris.
* Normucyl	45, rue Cambronne, Paris (XV ^e).
Nortal Clin	20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
Nosodol	57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
Nosol Aguetant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Notal (comprimés et gouttes)	23, rue Beautreillis, Paris.
Notaline	23, rue Beautreillis, Paris.
* Novacétine Prunier	1, q. Aulagnier, Asnières (Seine).
Novaiodal	45, fg Saint-Denis, Paris.
* Novalibut (ex-Halibut)	348, r. St-Honoré, Paris.
* Novalibut Local	id.
Novaline de Montfleury	6, rue d'Alsace, Grenoble.
* Novamide 109 M	Mouneyrat, Villeneuve-la-Garenne.
Novanol	41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
* Novargyre Guillaumin	13, rue Cherche-Midi, Paris.
Novarine Vicario	17, bd Haussmann, Paris.
* Novarsénobenzol Billon	21, r. Jean-Goujon, Paris.
Novarsénobenzol Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Novarsénobenzol Ercé	1, av. Villars, Paris.
Novarthritol	Darbans, St-Chinian, Hérault.
Novatropine	66, r. de la Pompe, Paris (XVI ^e).
Novaiodal	45, fg Saint-Denis, Paris.
* Novhépar	89, rue Martre, Clichy (Seine).
* Novigol	24, r. de Lesson, Rochefort-s.-Mer.
Noviode¹	237, r. Lafayette, Paris.
* Novismuth	30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
* Novo-Brol	62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-S.
Novochimosine	Lab. des Vosges, La Broque (B.-Rhin).
* Novocortex	107, r. des Dames, Paris (XVII ^e).
* Novolactol	Daguin, St-Maur (Seine).
* Novolug	Novalis, Oullins (Rhône).
Novophylline	8, rue La Fayette, Paris (IX ^e).
* Novoplasmine	7, av. des Marronniers, Fontenay (Seine).
Novoptine	Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Novosédine	83, bd de la Villette, Paris.
Novoseptine	57 bis, av. La Motte-Picquet, Paris (XV ^e).
Novoseptol	22, r. de l'Arsenal, Angoulême.

- *Novospasmyl
 *Novurit
 Novusang
 Nox
 *Nuciphos
 Nuclabia
 Nuclarène Cognet
 Nuclarrhol
 Nucléarrhol Gabriel
 *Nucléarsan
 *Nucléarsitol Robin
 Nucléasine
 *Nucléatol Robin
 Nuclécithine
 Nucléigène
 Nucléigénol

 Nucléinovarine
 *Nucléocardyl
 Nucléo-fenugrene
 Nucléo-fer Girard
 Nucléol Hanbro
 Nucléophorène
 Nucléotonyl
 *Nuclergol
 *Nujol
 Numal Roche
 Nuphos
 Nurécase
 Nurserine
 Nutréine
 Nutréol
 Nutritine Déjardin
 Nutrobiase
 *Nutromalt
 *Nuxeol
 Nuxiodine
 Nuxyl

 Nyctal
 Nydol
- 94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).
 25, bd de la Tr-Maubourg, Paris.
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 14, r. Demarquay, Paris.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 37, rue Tivoli, Bordeaux.
 43, rue de Saintonge, Paris.
 Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain).
 39, rue Sclessin, Liège (Belgique).
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.
 Collonges-St-Just-s.-L. (Loire).
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 30, rue St-Jacques, Namur (Belgique).
 22, rue Turbigo, Paris.
 188, c. de la Somme, Bordeaux.
 Furnon, Ste-Sigolène (Hte-L.).
 48, rue d'Alésia, Paris.
 1, r. de Châteaudun, Rennes.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse
 15, r. Corneille, Lille.
 37, rue Brochant, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 20, rue Beaubourg, Paris.
 Grandval, à Reims.
 6, c. Joseph-Thierry, Marseille.
 25, rue Jasmin, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 109, bd Haussmann, Paris.
 10, rue Cimarosa, Paris (XVI^e).
 Wander, Champigny-s.-Marne.
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
 15, r. des Petits-Champs Asnières.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.

O

- *Obsor
 Occi-Gourme
 *Ocréine Grémy
 *Octensanol
 Octo-Calcion
 *Oculase
- 8, r. St-Martin, Paris (IV^e).
 Pl. Carnot, Romainville (Seine).
 14, rue de Clichy, Paris.
 4, rue Platon, Paris (XV^e).
 193, av. du Maine, Paris.
 15, rue de Rome, Paris.

- *Odarsol
Oderma
Odochloraline
Oénole Paludofuge
- *Enophos
Enoquinol
Enosthène
*Oéréliode
*Estrobrol Roche
*Ostroglandol Roche
Olo-Thyroidine
*Okamine simple
*Okamine cystéinée
*Okamine (Dragées)
*Olbia
- *Olcalan
Olcanfral
*Olegel
Oleo-Calcium
*Oléochrysine Lumière
*Oléochrysos Lumière
*Oléocidase
Oléodermine Vincent
Oléodine
*Oléoformine Corbière
Olégarine
Oléogazeur
Oleo-Iode Dubois
Oléojasol
Oléol
Oléolaxine
*Oleo-Mel
*Oléophédrine Béral
Oleo-Psyllium
Oléorhinol
*Oleo-Sanocrysine de
Mollgaard
Oleo-Sérums
*Oléosodine P. Thibault
*Oléovules
*Oléthyle Benzyle
Olévone
Olical
Oliolase Corbière
*Oliphédrol
Oliphédrol BB
*Olriricyl Hardy
Olisol éphédriné
*Olivéol Etiévant
Ombiplaste
Omonos
*Onction Angelini
Onctua
- Ondanol
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.),
6, rue Berbissey, Dijon.
Dagniac, St-Sulpice-la-Pointe
(Tarn).
29, pl. Bossuet, Dijon.
12-14, rue Fery, Reims.
Mouflet, Chennebrun (Eure).
Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-O.).
10, rue Crillon, Paris.
id.
78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
50, rue de Turenne, Paris.
id.
id.
Mouneyrat, Villeneuve-la-Ga-
renne (Seine).
7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
M. Martin, Cloyes (E.-et-L.).
3, rue de Vouillé, Paris.
Maures, Port-de-Penne(L.-et-G)
45, rue Villon, Lyon.
id.
48, rue d'Alésia, Paris.
14, av. Mac-Mahon, Paris.
Pont-à-Celles (Belgique).
27, rue Desrenaudes, Paris.
151, rue de Charenton, Paris.
122, fg Saint-Martin, Paris.
16, bd Pereire, Paris.
19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
Brun, Demi-Lune, Lyon (Rh.).
5, av. des Tilleuls, Paris.
Delfour, Pouillon (Landes).
194, rue de Rivoli, Paris.
36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
17, rue Chomel, Paris (VII^e).
39, rue Fondaudège, Bordeaux
Route de Cimiez, Nice.
48, rue d'Alésia, Paris.
15, r. Catulienne, St-Denis.
122, fg Saint-Honoré, Paris.
25, r. du G^l-Foy, Paris (VIII^e).
Sauba, Montreuil (Seine).
27, rue Desrenaudes, Paris.
18, rue Daval, Paris.
id.
42, bd Saint-Marcel, Paris.
Sauba, Montreuil (Seine).
Brun, Demi-Lune, Lyon.
37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
33, Grande-Rue, Besançon.
61, rue de Seine, Paris.
25, r. de Bordeaux, Arbresle
(Rhône).
Sauba, Montreuil (Seine).

- Onguent Borgia**
 * **Onguent Fréval**
Onguent Ilon
Onguent Ivula
Onguent Prunot
Onguent Pyorrhépha-
gine
 * **Onogo**
Oophorine
 * **Ophtal**
Ophtalmine Leprince
Ophtalmiso 8
Ophtalmoforme
Ophtalmo-vaccin Sa-
lantale
Ophtélium
Opiacés liquides Chas-
sin
 * **Opobrol**
 * **Opobyl**
Opo-Calcéofibrose
 * **Opocalcium**
 * **Opocalcium Irradié**
 * **Opocérès**
 * **Opochol**
Opocobalt
 * **Opodermyl**
Opodigestif
 * **Opo-Dinitra**

 * **Opo ferrine vitaminée**
Opogénines
 * **Opogermine**

Opoglandéol Fray
 * **Opo-Iodamélis Logeais**

Opolases (Voir : Opothé-
rapie E. Vergelot)
Opolaxyl Corbière
Opomanganol
Opo-Micro, n° 1, 2,
3, 4
 * **Opomygdal**

Oponergyl
 * **Oponuclyl irradié ou**
simple
Opopédol
 * **Opophos**
Opophytol
 * **Opo-plasma**
Oporadol
 * **Oposclérine Vergelot**
Oposérothérapie Val-
try
Oposérum
- 61, rue de Seine, Paris.
 84, rue Rochechouart, Paris.
 31, rue Illzach, Mulhouse.
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 61, rue de Seine, Paris.

 Croissy-sur-Seine.
 Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 13, pl. de la Nation, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 42, Grandes Arcades, Stras-
 bourg.
 5, bd Montparnasse, Paris.

 33, place Meynard, Bordeaux.
 C. Le Follet, Nozeroy (Jura).
 15-17, rue de Rome, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 96, rue Orfila, Paris.
 id.
 71, rue Ste-Anne, Paris (II^e).
 TÊTARD, Beauvais (Oise).
 83, bd de la Villette, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 59, rue Boissière, Paris.
 39, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris (VII^e).
 96, rue Orfila, Paris.
 40, rue de Bellechasse, Paris.
 Ledent, Montreuil-s.-Mer (P.-de-
 France) (C.).
 Durand, Aigues-Mortes.
 71, av. de Clamart, Issy-les-
 Moulineaux (Seine).

 163, rue de Flandre, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 Duval, Mézières (Ardennes).

 1, av. de Messine, Paris.
 295 bis, r. de la Bénauge, Bor-
 deaux.
 Opos, Castelnaudary (Aude).

 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 107, r. des Dames, Paris.
 19, rue de Fleurus, Paris.
 Dr Testart, Chalais (Char^{te}).
 19, rue Drouot, Paris.
 25, rue Vaneau, Paris (VII^e).
 6, rue de Navarin, Paris.

 122, av. Champs-Élysées, Paris.
 Dr Testart, Chalais (Char^{te}).

- Opositoires opothérapiques Pellissier**
*** Oposséine** 33, av. de Villiers, Paris.
 60, r. Nationale, Castelnaudary (Aude).
*** Opostyl** 3, rue de Dunkerque, Paris.
*** Opothérapie Bazin** 9, cours Victor-Hugo, Bordeaux.
*** Opothérapie Bouty** 3, rue de Dunkerque, Paris.
*** Opothérapie Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
*** Opothérapie Carrion** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
Opothérapie Chaix 10, rue Al-Bertillon, Paris.
Opothérapie Chevretin 52, rue La Bruyère, Paris.
*** Opothérapie Choay** 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
*** Opothérapie du Dr Fraysse** 21, rue de Neuilly, Nanterre (Seine).
Opothérapie du Dr Roussel 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
*** Opothérapie E. Vergelot** 163, rue de Flandre, Paris.
Opothérapie Fortin 109, rue de Sèvres, Paris.
*** Opothérapie Fournier** 7, rue Biscornet, Paris.
Opothérapie Fumouze 78, fg Saint-Denis, Paris.
*** Opothérapie Iscovesco** 107, rue des Dames, Paris.
*** Opothérapie Lauriat Isorgane** La Garenne-Colombes (Seine).
Opothérapie « Le Pecq » 11, rue Beautreillis, Paris.
*** Opothérapie Moncour** 49, av. V.-Hugo, Boulogne-s.-S.
Opothérapie Richard 79, av. d'Orléans, Paris.
Opothérapie U. T. A. 13, r. Sainte-Véronique, Liège.
*** Opothérapiques Crinex-Uvé** 1, av. Dr-Lannelongue, Paris.
Opothérapiques Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
Opothérapiques Pellissier 33, av. de Villiers, Paris.
Optonine 20, rue des Martyrs, Paris.
*** Opo-vacuoline** 39, r. R.-Salengro, Bondy.
*** Opozones Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
Opsine Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
Opsolysine 7 à 13, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
Opsomyl A et B 1, av. de Villars, Paris.
*** Optalidon** 20, rue Vernier, Paris.
*** Opticura Bengué** 16, rue Ballu, Paris (IX^e).
*** Optiplaste** Mer Rouge, Mulhouse.
*** Opto Scott** 348, r. St-Honoré, Paris (I^{er}).
*** Optraex** 16-22, rue des Orteaux, Paris.
Opunsine 94, rue Michelet, Alger.
*** Orargol Amicros (Rhino-Gouttes-Collyre)** 177, r. de Courcelles, Paris.
Orarigène 35, av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
Or-Boulard 82, av. de Suffren, Paris.
*** Oralcine** 9, rue de la Platière, Lyon.
Orcéol 17, rue Mont-Désert, Nancy.
Orchidine 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Orchitine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
Orchitine Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.

- *Orex 4, av. du Dr-Lannelongue, Paris.
- *Orexyl 5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
- *Organésium 20, fg Saint-Honoré, Paris.
- *Organicalcion simple
et endocrinien poly-
vitaminé 81 et 83, r. de Lille, Roubaix.
- Organocalcine 121, av. de Saint-Ouen, Paris.
- *Organo-Sthénine 2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).
- *Organotiol S-S 22 bis, r. de Silly, Boulogne-s.-S.
- Orgas Médifar, Lomme (Nord).
- Orge maltée Fanta 77, rte d'Orléans, Montrouge.
- Orianol Genton, à Petit-Quévilly (S.-I.).
- Oriphol 8, rue Richer, Paris.
- Ormatol 80, rte des Petits-Ponts, Drancy
(Seine).
- Orocalcyl Le Gentil, Pontorson (Manche).
- Orpranor Louvel, Elbeuf (S.-I.).
- Orsanine 21, r. J.-Goujon, Paris.
- *Ortédrine id.
- Orthobiline 37, rue Galilée, Paris.
- *Orthochol 7, r. Ste-Isaure, Paris (XVII^e).
- Orthocumène simple 117, rue de Belleville, Paris.
- laxatif id.
- *Orthocynol 8, r. Aumont-Thiéville, Paris.
- Orthoflorène 18 et 20, rue Vavin, Paris.
- Ortho-Fokène 117, rue de Belleville, Paris.
- *Ortho-Gastrine 15, r. J.-Jaurès, Puteaux (Seine).
- *Orthogénol 19, rue Drouot, Paris.
- *Ortholaxine 8, rue Vivienne, Paris.
- Ortho Malleval 34, rue du Plat, Lyon.
- *Orthoneurol Souriguère, Angoulême (Ch^{te}).
- *Orthophorine 15, r. J.-Jaurès, Puteaux (Seine).
- *Orthosédan 7, r. Ste-Isaure, Paris (XVII^e).
- *Orthosiphène 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Orthosiphon Longuet (Voir : *Siphuryl*.)
- Ortho-Stomine 77, bd de Grenelle, Paris.
- *Orthozomine (Voir : *Zomine*.)
- *Osmoléine 26, rue des Moines, Paris.
- *Osmo-Peptide 103, rue St-Lazare, Paris.
- Osmos 56, rue Beaubourg, Paris.
- *Osmo-Vaccins Bréant 11, rue de Clichy, Paris.
- Ossical 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Ossyl Glageon (Nord).
- Osteline 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
- Ostéoglandulol 14, rue des Pyramides, Paris.
- Ostéo-hépatine 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
sur-Seine.
- *Ostéo-peptide DRAPIER, Rethel (Ardennes).
- Ostomalt 46, rue Claude-Lorrain, Lille.
- *Ostréiode 344, bd de la Plage, Arcachon.
- *Ostréiode injectable id.
- Otalgine adrénalinée 2, pl. de l'Hôpital-Gal, Mont-
pellier.
- *Otalgolex 21, rue de Lyon, Paris.
- Oto-Antisclérol 6, pl. Cambronne, Paris.
- Oto-Draineur 5, r. Emmanuel-Liais, Cherbourg.
- Otolan 24, rue Jardel, Bordeaux.

- Oto-vaccin Salantale 42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
 * Otoléine 72, r. de Bagneux, Montrouge.
 * Ouabaine Arnaud 27, rue de la Procession, Paris.
 * Ouabaine Mialhe 8, rue Favart, Paris.
 * Ouataplasme Langlebert 10, rue René-Bazin, Paris.
 Ouate Rhinol 80, fg Saint-Denis, Paris.
 * Ova-Grine 17, rue Chomel, Paris (VII^e).
 Ovaire Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
 * Ovaire Iscovesco 107, rue des Dames, Paris.
 Ovairine 62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
 Ovaridine Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
 Ovarids 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 Ovarine Dubois 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
 Ovarine Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
 Ovarine Optima 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Ovarine Orga Orga, Avignon (Vaucluse).
 Ovarine Tisy 95, rue de Turenne, Paris.
 Ovarose 58, rue Saint-Placide, Paris.
 Ovaro-Thyroidine 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Ovcaline 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 Ovex Léo 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 Oviginine Bouty 3, rue de Dunkerque, Paris.
 * Ovobiol 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 Ovo-Cao 2, rue de Compiègne, Paris.
 Ovo-lécithine Billon 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 * Ovomaltine Étab. Wander, Champigny (S.).
 Ovothyrol 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 Ovrine Douarnenez (Finistère).
 * Ovucridène 2, Rond-Point du Centre, La
 Garenne-Colombes (Seine).
 * Ovulacyd Lavril, Pacy-sur-Eure.
 * Ovule au Lactosmose Lavril, Pacy-sur-Eure.
 Ovules à l'Inolène 42, rue Mont-Cenis, Paris.
 * Ovules à l'Iodéol 37, av. de l'Opéra, Paris.
 Ovules Amicros 177, rue de Courcelles, Paris.
 Ovules antiseptiques 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 Ovules au Mictasol 5, rue de Lubéck, Paris.
 * Ovules au Nestosyl 72, r. Saint-Dominique, Paris.
 Ovules au Paraiode 48, rue Paul-Barruel, Paris.
 * Ovules Chaumel 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Ovules Derma Robin, 13, r. de Poissy, Paris.
 Ovules Evine 15, bd des Batignolles, Paris.
 Ovules au gonagone 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 Ovules Gynol Chaussée d'Ixelles, Bruxelles.
 Ovules Halogènes du 3, pl. Int.-Saint-Michel, Toulouse.
 D^r Bern 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 Ovules Halleana 54, Chaussée-d'Antin, et 69, rue
 de Provence, Paris.
 * Ovules Hystan 60, rue de Monceau, Paris.
 Ovules Inséva 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 Ovules Ivula Pearson 56, rue des Dames, Paris.
 Ovules Magida P. Métadier, Tours.
 Ovules Méta-Vaccin 177, r. de Courcelles, Paris.
 Ovules Néothorium Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
 * Ovules Oape 61, rue de Seine, Paris.
 Ovules Patrat

- Ovules Phena**
Ovules Probios
 * **Ovules Rhemda**
 * **Ovules Saporex**
 * **Ovules Sédo-hémosta-**
 tiques Jouve
 * **Ovules Stérigyne**
 * **Ovules au Terpoxyl**
 Ovules Uxora
 Ovules-Vaccins Gol-
 denberg
 * **Ovules-Vaccins Inava**
 Ovules-Vaccins Salan-
 tales
 Ovules Vézès
 * **Ovules au Vioforme**
 Ovunéol Bottu
 Oxhydrate de Bi
 Oxitane

 Oxnol
 * **Oxy-Buccol**
 Oxycarbina
 Oxycyanure d'hydrar-
 gyre
 Oxy-Dents C. R. S.

 Oxyde orangé de Hg
 ophtalmoforme
 Oxydolysine
 * **Oxydothyridine Paris**
 * **Oxydovarine Paris**
 Oxydrol

 * **Oxyfuge**
 Oxygénés du Dr Prim
 Oxygénobore « Obs »
 * **Oxy-Injecteur du Dr**
 Fialip
 Oxyléine (Adultes et
 Enfants)
 Oxylisine
 * **Oxymenthol Ferraudin**
 Oxymuth Saca
 Oxynargyl
 * **Oxyplastine**
 Oxyquinothéine
 Oxythymol
 Oxy-Thymoline
 Oxytoires Sorin
 * **Oxythyol**
 Ozobiase

 Ozobiase opothérapi-
 que
 Ozodor
- Boîte Postale, n° 5, Limoges.
 8, rue Saint-Martin, Paris.
 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
 184, route de Genas, Lyon (III°).

 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI°).
 Servier, Orléans (Loiret).
 (Voir : *Terpoxyl*.)
 Dhaussy, à Mennevret (Aisne).

 17, rue de Provence, Paris.
 14, r. de Normandie, Asnières.

 42, Grandes Arcades, Strasbourg.
 52, bd du Temple, Paris.
 (Voir : *Vioforme*).
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 89, av. Wagram, Paris.
 Caseneuve, St-Cyprien (Dor
 dogne).
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 15, r. de Rome, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.

 168, bd Saint-Germain, Paris.
 16, rue des Immeubles-Indus-
 triels, Paris.
 Lab. Dulcis, pl. Clichy, Monte-
 Carlo.
 7, rue Charlot, Paris (III°).
 4, r. de La Motte-Picquet, Paris
 id.
 30, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
 27, rue Fourcroy, Paris.
 Neuilly-sur-Saône (Rhône).
 23, av. de La Motte-Picquet,
 Paris.
 37, rue de Marly, Rueil-Mal-
 maison (S.-et-O.).
 Rue de la Paix, Vichy.
 21, rue Chaptal, Paris (IX°).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 56, rue des Dames, Paris.
 78, av. St-Ouen, Paris (XVIII°).
 91, rue Marietton, Lyon.
 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 13, r. Gambetta, Nancy.
 Trombetta, à Blain (L.-Inf.).
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 37, rue de Marly, à Rueil-Mal-
 maison.

 id.
 Lab. Servier, Orléans (Loiret)

*Ozol
 *Ozolase
 Ozonair
 *Ozothine

6, place des Ternes, Paris.
 id.
 2, rue de Vienne, Paris.
 4, chaussée de la Muette, Paris.

P

Pacemol
 Pacyl
 *Padéryl
 Paidol
 Pain d'amandes au
 gluten frais
 Pain essentiel Heude-
 bert
 Pain massé Sana
 Pains de régime Mil-
 liat
 Pains Nutricia
 Pain Redeuil
 Pain de santé Martin
 *Pains de régime Heu-
 debert
 Paloval
 *Palpitine
 Paludase Corbière
 *Pampryl
 Panbiase antiphymi-
 que
 *Panbiline
 *Panbiol
 Panbromine
 Pancalbiose
 *Pancalcion
 *Pancarbo
 *Panchol-Sel
 Pancréadénine
 *Pancréal Kirchner
 Pancréas-Endocrisines
 Fournier
 *Pancréastase Defresne
 *Pancréatine
 *Pancréatokinase
 *Pancréatose Idon
 *Pancrébile
 *Pancrépar
 *Pancrépatine Laleuf

Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 8, rue de Prague, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Roussel, Gde-Rue, Flers (Orne).
 37, rue du Rocher, Paris.
 85, rue de Saint-Germain, Nan-
 terre (Seine).
 Gaillac (Tarn).
 319, av. Berthelot, Lyon.
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 7, rue Couche, Paris (XIV^e).
 à Montreuil-Belfroy (M.-et-L.).
 85, rue de Saint-Germain, Nan-
 terre (Seine).
 Pharm. de l'Étoile, Strasbourg.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 149, r. du Port-de-Bercy, Paris.
 15-17, rue de Rome, Paris.
 à Annonay (Ardèche).
 15, rue de Rome, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 1, rue Chancelier, Périgueux.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 Rousseau, Sens (Yonne).
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 24, rue de Verdun, Strasbourg.
 7, rue Biscornet, Paris.
 19, rue Jacob, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 89, rue Saint-Georges, Nancy.
 3, place Jussieu, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

Pancrésil

- *Pancrinol du Dr Debat 60, rue de Monceau, Paris.
 Pandermol 43, avenue Kléber, Paris.
 Pandigitale Houdas 26, rue St-Claude, Paris.
 Pandigitale Optima 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Pandiol 15, rue de Rome, Paris.
 *Pandrénaline Julien 105, rue de Rennes, Paris (VI^e).
 *Panfébrine 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 Panfito 163, rue de Flandre, Paris.
 *Panfluine 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 Panfortan 4, chaussée de la Muette, Paris.
 *Pangaduine 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 *Pangastrol 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 Pangermine 20, rue Saint-Lazare, Paris.
 *Pangestyl Narty 134, bd Péreire, Paris.
 *Panglandine 18, av. Hoche, Paris.
 Pangynol 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 *Panhémol R. Bouyssou, Chambois (Orne).
 Panhistol 4 bis, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 Paniode 239, rue Paul-Bert, Lyon.
 Panlaby 117, rue de Belleville, Paris.
 Panlacto Midy 67, av. de Wagram, Paris.
 Panlax Allard 27, fg Montmartre, Paris (IX^e).
 Panlaxyl 37, rue des Lois, Toulouse.
 Panlithyl 47, rue Bokanowski, Asnières.
 *Panlutéine 2, rue des 2-Ponts, Paris.
 *Pan-Neurol 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 Panopepton 5, rue de la Paix, Paris.
 Panophytes 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 *Panosan 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).
 *Panostyl 57, rue Mathurin-Régnier, Paris.
 Panpectose 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
 *Panphosphates 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 Panphylase 1, av. de Villars, Paris.
 Panprocol 222, rue Duguesclin, Lyon.
 Pansedine 121, rue de Gerland, Lyon.
 Pansement otalgique 1, rue Griffon, Lyon.
 Alsai
 Pansements gras Mau-
 jean (simple et aux
 essences)
 *Pansmacol
 *Pansolanée
 *Panstomase
 *Pantamine
 *Pantavoine
 Pantocamphre
 Pantofort du Dr Boveil
 (granules)
 Panto-Kinon
 Pantolaxine du Dr Bo-
 veil (cachets)
 *Pantopon Roche
 Panurol Tissot
 Panvalérase
 Panvalerine Delattre

Schreiber, av. du Bois, Luxem-
bourg.

- 60, rue de Monceau, Paris.
 43, avenue Kléber, Paris.
 26, rue St-Claude, Paris.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 15, rue de Rome, Paris.
 105, rue de Rennes, Paris (VI^e).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 20, rue Saint-Lazare, Paris.
 134, bd Péreire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 R. Bouyssou, Chambois (Orne).
 4 bis, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 239, rue Paul-Bert, Lyon.
 117, rue de Belleville, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris (IX^e).
 37, rue des Lois, Toulouse.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 2, rue des 2-Ponts, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 5, rue de la Paix, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).
 57, rue Mathurin-Régnier, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 1, av. de Villars, Paris.
 222, rue Duguesclin, Lyon.
 121, rue de Gerland, Lyon.
 1, rue Griffon, Lyon.
 Jean Boutes, Muret (H^{te}-Gar.).
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 45, rue du Marché, Neuilly.
 1, avenue de Villars, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 66, rue de la Pompe, Paris.
 1, rue Lassalle, Lyon.
 94, rue Michelet, Alger.
 1, rue Lassalle, Lyon.
 10, rue Crillon, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
 36, av. Niel, Paris.
 10, rue du Bac, Paris.

- *Panveinine** 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
***Panvita** 188, cs. de la Somme, Bordeaux.
***Panxylon Logeais (granulé)** 22 bis, 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
***Panxylon Logeais injectable** 22 bis, 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
***Panxylon L 12 %** Logeais, Boulogne-sur-Seine.
Panzanon 12, r. de Strasbourg, Paris.
Paospholine 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
Papaine Henry 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
***Papaine Trouette-Perret** 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
***Papavérine Houdé** 9, rue Dieu, Paris (X^e).
***Papaveryl** 245, rue de Vaugirard, Paris.
Papier Albespeyres 78, fg Saint-Denis, Paris.
Papiers Anti-Asthm Martin-Mazade S -Raphaël (Var).
Papier du Dr Balme 56, bd Péreire, Paris.
Papier Barral 78, fg St-Denis, Paris.
Papier Fayard 2, av. Mathurin-Moreau, Paris.
Papier Gicquel 64, rue des Tournelles, Paris.
***Papier iodogène Eymonnet** 14, Gde-Rue, Pont-de-Vaux (Ain).
***Paquets Alcals** Fleury, Arcachon (Gironde).
Paquets P. C. L. 163, rue de Flandre, Paris.
Paquets Salins-du-Revard Saint-André (B.-du-Rhône).
Paquets solubles ORL. 156, av. Victor-Hugo, Paris.
***Paquets Védé** 2 et 4, pl. Gambetta, Paris.
Parabenzyl 3, pl. Jussieu, Paris.
Paracarbochloryl 76, rue Réaumur, Paris.
Paracrinase 18 et 20, rue Vavin, Paris.
***Paradoxex** 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
***Paradoline** id.
***Paraffino-Bande** 34, r. de Besançon, Pontarlier.
Paraffinol av. Baraduc, Châtel-Guyon.
Paraffinoléol 17, rue de Berri, Paris.
Paraformine 172, rue d'Alésia, Paris.
Paragangline Vassale 25, rue Dagorno, Paris.
Paragar 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
Paragélose 11, rue de Clichy, Paris.
Paragerm 151, av. de Neuilly, Neuilly.
Paraghurt Léo 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
Paraiode 48, rue Paul-Barruel, Paris.
Paralactine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
Paralaxol 52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
Paralymphine 32, rue de Grenelle, Paris.
***Parasclérose** 2, place des Vosges, Paris.
Paratétanine 17, rue Bourgelat, Lyon.
Parathyroïde Endocrines Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
Paratone Léo 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
***Paratoxine Ducatte** 191, rue Saint-Honoré, Paris.
Paratyl CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).

- *Paratyrone
- *Paraveinine
- Parbelle
- Parégorique Lafran
- Parémanol
- Parkipan
- *Parlax
- *Parolagar
- *Paroxyl
- *Parulcine Robin
- *Parvula
- Parvuline
- Passacanthine
- *Passicarbhone
- *Passiflorine
- Passival
- Pastapalm
- *Pasticaïne
- Pastilles Arvos
- Pastilles Bala
- Pastilles Brachat
- Pastilles Brunet
- Pastilles Contre-ut
- Pastilles Debar
- Pastilles Dionol
- Pastilles des Eaux-Bonnes
- Pastilles Fayès
- Pastilles de Gonacrine
- Pastilles Helgé
- *Pastilles Houdé
- Pastilles Lezin
- Pastilles Libéria
- Pastilles Maya
- *Pastilles M. B. C.
- Pastilles Méry
- Pastilles Midy
- Pastilles Miraton
- Pastilles Norvégiennes
- Pastilles Paterson
- Pastilles Pepsa
- Pastilles de Pougues
- Pastilles St-Christau
- Pastilles Seclo
- Pastilles Violettes A. B. C.
- Pastilles Vichy-Etat
- Pastils Meran
- *Pâte à l'eau Aloplas-tine
- *Pâte à l'Eau R. P.
- Pâte Aseptor
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 45, fg-St-Denis, Paris.
- 14, rue Perrichont, Paris.
- 8, rue de Prague, Paris.
- 17, rue de Berri, Paris.
- 20, av. J.-Jaurès, Suresnes
- 71, r. Douy-Delcupe, Montreuil-s.-Bois.
- 10-12, r. de Strasbourg, Paris.
- 26 et 28, rue des Ponts, Nancy.
- 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
- Brunschwik, 3 bis, rue Vallier, Levallois-Perret (Seine).
- 20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
- 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- 115, r. de Paris, Boulogne-s.-S. id.
- H. Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
- Bailly, 15, r. de Rome, Paris.
- 23, rue Beautreillis, Paris.
- Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
- Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
- 5, av Victoria, Paris.
- 164, rue St-Honoré, Paris.
- 217, rue La Fayette, Paris.
- Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
- Fleury, Arcachon (Gironde).
- Raimoa, 16, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
- 199, rue Saint-Denis, Paris.
- 21, r. J.-Goujon, Paris.
- D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
- 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- 1, rue de l'Odéon, Paris.
- 10, r. Cyrano-de-Bergerac, Paris.
- 142, rue Fransman, Bruxelles.
- Goy, 23, rue Beautreillis, Paris.
- 19, r. du Balily, Plaine-St-Denis.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 48, rue d'Alésia, Paris.
- 36, rue de Verdi, Nice.
- 43, rue de Saintonge, Paris.
- 38, r. du 11-Novembre, Clermont-Ferrand.
- 21, rue Chaptal, Paris.
- 163, r. de Flandre, Paris.
- 6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
- 24, rue de Montessuy, Paris.
- 24, bd des Capucines, Paris.
- 18, rue de Maubeuge, Paris.
- 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
- La Roche-Posay (Vienne).
- 21, rue de Lyon, Paris.

- Pâte Berthé** 78, fg Saint-Denis, Paris.
Pâte Bleue Goy 23, rue Beautreillis, Paris.
***Pâte Dentaire Bleue** (Voir : *Inava.*)
Pâte dentifrice 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Pâte dentifrice du Dr
Léon Boyer Laffargue, Barsac (Gironde).
Pâte dentifrice Kraus 37, rue Godot-de-Mauroy.
Pâte dentifrice Philipps O. C. P., 108, rue de Picpus, Paris.
Pâte Dermos Neyret 35, rue de la Bourse, Lyon.
Pâte de Terpene Guédet Grignon, 2, r. Duphot, Paris.
Pâte Germidex 29, r. Carnot, Levallois-Perret.
***Pâte Gingivale à l'acé-**
tylarsan 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Pâte Jane 7, rue Charlot, Paris (III^e).
Pâte Magali 43, av. Kléber, Paris.
***Pâte Mireille** Lab. Legendre, Houilles (S.-et-O.).
Pâte Neyret 35, rue de la Bourse, Lyon.
Pâte pectorale du Dr
Williams 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
Pâte Rami 44, r. Chaptal, Levallois (Seine).
Pâte Robin 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
Pâte Silka 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
Fâtes de régime Re-
deuil 7, rue Couche, Paris (XIV^e).
Pâtes Pectoral Edulcor 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
Pâtes Sana Gaillac (Tarn).
Pausodyne 98, rue d'Angoulême, Paris.
***Pavérinol Laleuf** 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
***Paveron Dausse** 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
***Pavonol** Castel, 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
Pavydis 39, r. de Reims, Vichy.
Paxanus 295 bis, rue de la Benauge, Bordeaux.
***Paxène** 4, rue Richer, Paris.
Paxineurol 41, rue Germain, Lyon.
***Paxyl** 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
Pebromon Henry 39, rue Sclessin, Liège.
Pectanol 49, rue Lacépède, Paris.
Pecthionol Manseau, Margaux (Gironde).
***Pectine Oberlin** 17, rue Cadet, Paris.
Pecto-Bronchyl Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
Pectoforme Pruvot, Forges-les-Eaux (S.-I.).
Pectopax Lab. des Vosges, La Broque (B.-R.).
Pectophédryl 149, av. des Minimes, Toulouse.
***Pectoral Coulloux** 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
Pectoral des Dames de
France 119, rue de Sèvres, Paris.
Pectoral Henry 39, rue de Sclessin, Liège.
Pectoral Serla 23, rue Beautreillis, Paris.
Pectoséda 149, av. des Minimes, Toulouse.
Pectosédyl 15, rue Pasteur, Bourg (Ain).
Pectosol Lab. ORGA, Avignon (Vauc.).
Pédiasma 122, Champs-Élysées, Paris.

- *Pediozema
 *Pélargon de Nestlé
 Pelletierine Tanret
 Pellicules radifères du
 Dr Vallet
 Pellidol
 Pelviformine
 *Pelvinal
 Pelvi-Pyrine
 Pelvisedyl
 *Pelvuryl
 *Penghawar des Iles
 Penghawar Vicario
 Pennès (Produits)
 Pentarsyl
 *Pepiodon Henry
 *Pépione
 Pepsencia Roberts
 Pepsichlorine
 *Pepsinacid
 Pepsine-Ferment
 Pepsipaine
 Pepsiphos
 *Pepsobyl
 Pepsodia
 *Pepso-Pancré-Malt
 *Peptalmine
 *Peptalmine magnésiée
 *Peptargyl Aguetant
 *Pepticol
 Peptidol
 Pept'iode Farma
 Peptobrol Kopp
 Peptocalcine
 Pepto-Correctine
 *Peptodiase
 *Pepto-fer Jaillet
 Pepto-ferrine
 *Peptogil
 *Peptokola Robin
 *Pepto-Magnésie Vas-
 sal
 *Peptomaltone Déjar-
 din
 *Peptonal
 Peptonate d'Étain
 Henry
 *Peptonate de fer Robin
 Peptone Byla
 Peptone Catillon
- 122, Champs-Élysées, Paris.
 6, av. César-Caire, Paris (VIII^e).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 26, rue Vauquelin, Paris.
 14, rue des Minimes, Paris.
 21, Grande-Rue, Montfermeil
 id.
 15, rue des Champs, Asnières.
 38, bd de Strasbourg, Toulouse.
 Ringeade, Fosseboudeau-Blaye
 (Gironde).
 17, bd Haussmann, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 14, r. A.-Briand, Levallois-Per.
 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
 8, rue St-Martin, Paris.
 5, rue de la Paix, Paris.
 Delaunay, Joué-les-Tours (I-
 et-L.).
 116, bd Haussmann, Paris.
 168, bd St-Germain, Paris (VI^e).
 B. F. Delaunay, Joué-les-Tours
 (I.-et-L.).
 39, r. de Reims, Vichy.
 22, rue Turbigo, Paris.
 53, rue de Crimée, Paris.
 P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
 21, r. Chaptal, Paris (IX^e).
 21, rue Chaptal; Paris (IX^e).
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 13, av. Maréchal-Foch, Dam-
 marie-les-Lys (S.-et-M.).
 7, r. des Petits-Carreux, Paris.
 1, av. E. THOMAS, Kremlin-
 Bicêtre (Seine).
 19, r. des Foulons, Strasbourg.
 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.).
 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
 Zizine, 24, r. de Fécamp, Paris.
 Darrasse, 13, r. Pavée, Paris.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Jacquemaire, Villefranche (Rh.).
 13, rue de Poissy, Paris.
 28, rue Hôpital-Militaire, Lille.
 10, rue Parent-de-Rozan, Paris.
 15, r. des Champs, Asnières
 (Seine).
 39, r. de Sclessin, Liège (Bel-
 gique).
 13, rue de Poissy, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 3, bd Saint-Martin, Paris.

- Peptone Chapoteaut
 Peptone Cornélis
 *Peptone Vassal
 *Peptopancréasi
 *Peptosthénine Choay
 Peptoalériane du Dr
 Gigon
 Peptovitine
 *Peptozym
 *Perandrone
 *Pérasurol
 Peraziodol
 *Percaïne-percaïnal
 *Percalcine
 *Percalcium
 *Per-Extraits Carrion
 *Perglandènes (ovarien,
 hépatique, orchiti-
 que).
 *Per-Hépatique Carrion
 *Péricols Legros
 Périol Soulié
 *Péristaltine Ciba
 *Perles Ferro-Vitales
 Perles Jeka
 Perles Nivernaises
 *Perles Taphosote
 *Permyase
 Péroséol
 *Per-Ovarien Carrion
 Peroxydines
 Perparine
 Perquinol
 Perrhinol
 *Persodine Lumière
 *Per-Surrénalien Car-
 rion
 *Per-Thymique Carrion
 Pertussin Salle
 *Pérubore
 Péruglan
 Perunhyl
 *Pérusol
 Péruviol
 *Pervosine
 Phagocytine Bureau
 *Phagolysine
 *Phagosthyl
 *Phagosthyl Mangané
 *Phaguryl
 Phanodorme
 Pharmetan
 *Pharyngaseptyl
 *Pharyngoléine
- 8, rue Vivienne, Paris.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 28, rue Hôpital-Militaire, Lille.
 25, rue Dagorno, Paris.
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 R. Bouyssou, Chambois (Orne).
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 Baetz, Chef-Boutonne (D.-S.).
 1, av. de Villars, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 84, rue Rochechouart, Paris.
 6, av. V.-Hugo, Paris.
 54, Faubourg-St-Honoré, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 54, Faubourg-St-Honoré, Paris.
 88, rue Duhesme, Paris.
 21, rue Mouton-Duvernét, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 2, rue Michelet, Alger.
 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 135, rue de Rome, Paris.
 66, rue de la Pompe, Paris.
 22, cité Trévisé, Paris (IX^e).
 Étampes (S.-et-O.).
 45, rue Villon, Lyon.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 id.
 4, rue Elzévir, Paris.
 1, place Victor-Hugo, Paris.
 M. Richard, Aubenas (Ardèche).
 83, bd de la Villette, Paris.
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 G. Baetz, Chef-Boutonne (D.-S.),
 86, bd Port-Royal, Paris.
 14, rue Cantin, Courbevoie.
 4, r. La Motte-Picquet, Paris.
 id.
 15-17, rue de Rome, Paris.
 rue Saint-Honoré, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 72, rue de Bagneux, Montrouge.

- *Pharynxol
 Phéchlorment
 Phelaxine Moulines
 *Phéna
 Phénacodine
 Phénalgréine
 Phénaseptyl
 *Phéniodine
 Phénol Bobœuf
 *Philentérol
 Philhepar
 *Philoderme Yldra
 Philodermine
 *Philogastrine
 Philogyne
 Philtroline
 *Phlébocratyl
 Phléboguil
 *Phlébos
 *Phlébosine M. et F.
 *Phlébotonine
 Phléboveinol
 Phlogogyne
 Phlogovules
 *Phloxiode
 Phlyctol
 Phocéol
 Phocitrol
 *Phonodiose
 Phora
 Phosarrhène
 *Phosarkyl (Voir : *Quinarsol Antianémique.*)
 Phosbiogyl
 *Phosbiose
 Phoscalgène
 *Phoscamine
 Phoscol
 Phosféryl Fournier
 Phosfodéine
 Phoshémoquinol
 Phosiodine
 Phoskadyl
 *Phosma
 Phosoforme
 *Phosol
 Phosorine
 *Phosote Lambiotte
 Phosovigol
 Phosphalose
 *Phosphan Caducia
 Phosphantyl
- 8, rue Vivienne, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 à Villeneuve-la-Guyard (Yonne).
 Boîte postale n° 5, Limoges.
 41, av. Joffre, La Garenne.
 29, rue de Metz, Toulouse.
 4, pl. Wilson, Limoges.
 57, bd A.-Briand, Champigny.
 41, rue de Rome, Paris.
 42, r. du D^r-Blanche, Paris.
 2, allées de Chelles, Le Raincy.
 20, rue Antoinette, Paris.
 13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
 34, rue Saint-Lazare, Paris.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 61, bd Malesherbes, Paris.
 H. Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 85, crs. Albert-Thomas, Lyon.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 id.
 94, rue Michelet, Alger.
 1, av. de Villar9, Paris.
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 71, rue Douy-Delcupe, Montreuil (Seine).
 Lang, 14, r. de Marignan, Paris.
 112, rue de Gerland, Lyon.
 Lab. Grandval, Reims.
 P. Fontanier Moulins-sur-Yèvre
 12, rue Pavée, Paris.
 Lescaroux, Châteauroux (Indre)
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 Lescaroux, à Châteauroux.
 7, rue Biscornet, Paris.
 4, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 21, rue des Roses, Dijon.
 1, av. Eug.-Thomas, Le Kremlin-Bicêtre.
 H. Dubois, Tours (I.-et-L.).
 143, c. de la Somme, Bordeaux.
 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
 143, rue du Temple, Paris.
 Vidal, 90, r. St-Martin, Étampes.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 Lab. Sauba, Montreuil-Paris.
 Lab. Elsse, Fontaine-Grenoble.
 95, r. de Vaugirard, Paris (VI^e).
 M. Richard, Aubenas (Ardèche)

- *Phospharsol**
Phospharsinol
Phospharsyl colloïdal
du D^r Pinard
Phosphate Geffroy
 46, rue Pierre-Charron, Paris.
 Morand, à Auray (Morbihan).
- *Phosphates Finard**
Phosphate Vital de
Jacquemaire
Phosphatine Falières
***Phosphigem**
***Phosphobiase**
***Phosphobiol**
***Phosphobrom**
Phosphocalcase
Phospho-Calcine
Phospho calcine ferru-
gineuse
Phosphodéine
***Phospho-Fluor-Beynet**
***Phospho-Gaïacol Mary**
Phosphogayol
Phosphogénase
Phosphogène Favri-
chon
Phosphogène Pachaut
Phospho-Iodine
***Phospholéose**
***Phosphoneurol**
***Phosphonine Soulié**
Phosphonucléose
***Phosphopinal Juin**
Phosphorescine Leker
Phospho-Sérum
***Phosphosodine**
Phospho-Strychnal
Phosphotal Clin
 90, bd Saint-Denis, Courbevoie.
 Delamare et C^{ie}, Romilly-sur-Andelle (Eure).
 90, bd Saint-Denis, Courbevoie.
 à Villefranche (Rhône).
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
 Landon, Châtel-Guyon (P.-de-D.).
 16, cours Gambetta, Lyon.
 4, r. Leconte-de-Nouy, Paris.
 Jouffray, Bourgoin (Isère).
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Phospirine**
 id.
 41, av. Joffre, La Garenne
 165, rue Saint-Honoré, Paris.
- [Phostanio**
Phostaniol
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 Rouanet, Antibes (Alp.-M.).
 37, rue Tivoli, Bordeaux.
 Saint - Symphorien - de - Lay
 (Loire).
 130, Bd. Haussmann. Paris.
- *Phosthénine**
 46, Gde-Rue, Boulogne-s.-Mer.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 18, rue de Beaune, Paris.
- Phostone**
***Phostyl Py**
Phrosthémor
Phusasmine
Phydermol
 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
 Dupont, Velines (Dordogne).
 10, impasse Milord, Paris.
- Phygynol**
Phylactone Byla
Phylaxines
***Phylla**
 13, rue Marbeuf, Paris.
 62, r. Dupont-des-Loges, Rennes.
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 (Voir : *Strychnal*.)
 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 22, fg St-Michel, Angers.
 Comtos, Fesches - le - Châtel
 (Doubs).
 7, av. des Marronniers, Fontenay (Seine).
 Bréant, 11, r. de Clichy, Paris.
 58, bd R.-Wallace, à Puteaux.
 80, fg St-Denis, Paris.
 80, rte des Petits-Ponts, Drancy-
 70, rue Boucicaud, Fontenay-
 aux-Roses.
 27, r. des Batignolles, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 16, rue du Dragon, Marseille.
 39, bd de la Tour-Maubourg
 Paris (VII^e).

- Phyllosan**
Physéine Grémy
***Physioscyamine**
Physiosthénine
Physocrisine
Phytalgine

Phytéol
Phytergol
Phyteta
***Phytine Ciba**

***Phytocuprine**
Phytogénine Byla
***Phytogénol**
***Phytogyl**
***Phytojava**
***Phyto-Kola**
Phytol
***Phytolax**
Phytomensyl
Phytophosphine
Phytosang Sarda
***Phytosplénol Plé**
Phyto-Tanin
Phytothérapie Coirre
***Phytothérapie Coloniale**
***Phytoveinol**
***Phyto-vitamines Plé**
***Picricol**
Picrol
Pilixyl
***Pilka (Gouttes)**
Pilules Anhépatiques
Christiaens
Pilules anti-Diabé-
tiques Jaillardon
Pilules antidiabétiques
Midy
Pilules antinévralgi-
ques du Dr Cronier
Pilules Bengué
Pilules Blancard
Pilules Bosredon
Pilules bronchotoni-
ques Arco
Pilules Clérambourg
Pilules de Chloramine
Pilules Corail

Pilules Coter
Pilules Coulpier
Pilules Cuticura
Pilules de Boldo-Biline
Ducloy
***Pilules d'Eurinase**
Pilules Doumer
- 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
 14, rue de Clichy, Paris.
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
 7, rue Biscornet, Paris.
 P. Fontanier, Moulins - sur-
 Yèvre (Cher).
 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 53, rue de Crimée, Paris.
 7, passage Thionville, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 15, rue Pasteur, Bourg (Ain).
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
 3, rue Chanez, Paris (XVI^e).
 50, rue Nationale, Lille.
 59, rue Boissière, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 119, rue de Sèze, Lyon.
 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 Dr A. Petit, à Angoulême.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 116, bd Haussmann, Paris.
 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 22, r. Mar.-Foch, Montpellier.
 62, rue d'Antibes, Cannes.
 92, rue Bobillot, Paris.

 4, r. Colbert, Reims.

 Martin-Mazade, St-Raphaël (Var).

 67, av. de Wagram, Paris.
 MONIN, 49, rue de Maubeuge,
 Paris.
 16, r. Ballu, Paris.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.

 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 10, rue Saint-Antoine, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 Lab. Legendre, Houilles (S.-
 et-O.).
 11, place Ste-Eulalie, Bordeaux.
 30, rue Louis-le-Grand, Paris.
 3, av. Lowendal, Paris.

 Arques (P.-de-C.).
 (Voir : *Eurinase*.)
 à Annonay (Ardèche).

- Pilules Dray** 196, r. de Paris, Montreuil-sous-Bois.
- *Pilules du D^r Debouzy** 34, rue Sedaine, Paris.
- *Pilules du D^r Moustier** Saint-Vallier (Drôme).
- Pilules du D^r Séjournet** 62, rue de la Tour, Paris.
- Pilules écossaises Collas** Mougnaud, Longjumeau (S.-et-O.).
- Pilules énergétiques Fradier** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Pilules Éparvier** 26, Gde-Rue, St-Clair, Lyon.
- Pilules Galvane** Chabanais (Charente).
- Pilules Gip** 7, r. Galvani, Paris.
- Pilules Hardy** 13, rue Minimes, Le Mans.
- *Pilules héléniennes Naud** 37, rue Pajol, Paris.
- Pilules Hémabione** Chemin-Neuf, Ganges (Hérault).
- Pilules d'Hermal** 10, pass. Morel, Montrouge.
- Pilules Laville** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Pilules Lartigue** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- *Pilules Lemary** 36, quai Fulchiron, Lyon.
- Pilules lithuranées du D^r Boveil** 1, rue Lassale, à Lyon.
- Pilules de Moussette** 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Pilules Myosotis** 41, rue de Rome, Paris.
- Pilules Nella** 4, rue Jean-Goujon, Paris.
- Pilules Norma** 33, Grande-Rue, Besançon.
- Pilules Oco** 87, rue Lafayette, Paris.
- Pilules oporénales** 132, rue de Turenne, Paris.
- *Pilules Philippe** 36, quai Fulchiron, Lyon.
- Pilules Prophylactiques Christiaens** 4, rue Colbert, Reims.
- Pilules Purgatives du D^r Dehaut** 147, fg Saint-Denis, Paris.
- Pilules de Quassine Frémint** 6, rue Abel, Paris.
- Pilules Salvia** 139, av. Émile-Zola, Paris.
- Pilules stibiées** 2, rue Volney, Paris.
- Pilules Tix** 61, rue de Seine, Paris.
- *Pilules V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ardèche).
- Pinofluol** 3, rue de Surène, Paris.
- *Pineoleum** 7, rue L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
- *Pioréagine** Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
- Pipérasol Tissot** 34, bd de Clichy, Paris.
- *Pipérazine Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
- Pipérazine R.-B. La-grave** 72, quai Jemmapes, Paris.
- Pipérazyl** 30, bd Raimbaldi, Nice.
- Pipettes nasales M. S.** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- Piscidia Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- Pitol** 2, rue de Paris, Douai.
- Pituilobine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- Pituitairine** 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Pivadorme** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Pixel Kœhly** 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.

Placenta Endocrisines

- Fournier** 7, rue Biscornet, Paris.
Placentodose 47, rue de Neuilly, Nanterre.
Plaganaze 18, r. Nonnains-d'Yères, Paris.
Plaganol id.
Plagéine Soulas 119, rue de Sèvres, Paris.
***Plasma de Quinton** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
Plasmargol Hion, Paimpol (C.-du-N.).
***Plasmarine** Lab. de la Blomarine, Dieppe
Plasmastyl 20 bis, rue Sergent-Godefroy,
Montreuil-sous-Bois.
Plasmatol Roussel, Gde-Rue, Flers (Orne).
Plasmobeef Aubery, Avignon, (Vaucluse).
Plasmobiol id.
Plasmocalcium Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
Plasmocéane Delaunay, Joué-les-Tours (I.-
et-L.).
Plasmocol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Plasmodine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
Plasmo Prima 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
Plasmostérol Aubery, Avignon (Vaucluse).
***Plasmosthène** 14, rue des Minimes, Paris.
Plasone Vours 72, av. Kléber, Paris.
Plasthamélyne 59, rue Boissière Paris.
Plastima 17, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Pléthorine 112, rue de Gerland, Lyon.
***Plexalgine Laleuf** 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
***Plexamine** 40, rue de Bellechasse, Paris.
Plexorine 41, av. Joffre, LaGarenne (Seine).
Plombyl 37, rue de Marly, Ruell-Mal-
maison (S.-et-O.).
Fluorysse Fabris, Chambéry (Savoie).
***Fluribiase** 21, rue Violet, Paris.
Plurigliandine M et F 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
***Flurinatryl** 151, rue de Charenton, Paris.
***Plurion** 18, av. Hoche, Paris.
Pneuma Wander 151 bis, rue de Joinville, Cham-
pigny.
Pneumobiol 48, rue de Paris, Vichy.
Pneumo-calcine 25, rue Jasmin, Paris.
Pneumocratol 147, fg Saint-Denis, Paris.
***Pneumogéine Renard** 35, rue de Paris, Clichy.
Pneumogénol Buré, 74, fg d'Ambrail, Épinal.
***Pneumo-lipase** Yvrard, 17, r. Soufflot, Paris.
Pneumonctyl Jouannet, Le Perray (S.-et-O.).
***Pneumostyl Daguin** à Saint-Maur (Seine).
Pneumotanic Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
Podophylle Coirre 5, bd Montparnasse, Paris.
Podoxyl Palc, Messigny (Côte-d'Or).
***Pofénane** 18, rue des Écoles, Paris (V^e).
***Poliol Churchill** 92, av. de Saint-Mandé, Paris.
Polvista 6, rue Trencavel, Béziers.
***Polybromure Gonnon** 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
***Polycalcion** 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
Polycalcose 6, rue Berbissey, Dijon.
Polycautére 19, rue Drouot, Paris.
Polychromol Couderc 143, rue de la Guillotière, Lyon.

- Polycine**
[Polydigeral Calmel 113, bd Voltaire, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
- *Polyferments Laleuf** 51, rue Nicolo, Paris.
Polyformiate 18, avenue Hoche, Paris.
***Polyiodure Gonnon** 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Polymétal 56, rue Beaubourg, Paris.
Polyminéral Fort 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
***Polyna** 102, av. Michelet, Saint-Ouen (Seine).
- Polypeptine** 61, rue de Seine, Paris.
***Polypeptonal** 15, r. des Champs, Asnières (Seine).
- Polyphorine** 6, rue Abel, Paris.
Polypirine 120, rue Lecourbe, Paris.
Polysel Joué-les-Tours (Indre-et-Loire).
Polyseptol 74, rue Lourmel, Paris.
Polysodine 24, rue Monttessuy, Paris.
***Polytonyl** 32, rue de l'Ouest, Paris.
***Polyvaline D^r Bayle** 10, r. Alphonse-Bertillon, Paris.
***Polyveinine** 152, côte Pavée, Toulouse.
Pommade Acar 5, r. E.-Combes, St-Étienne.
Pommade 731 1, rue Delacroix, Chartres.
Pommade adrénostyp-tique Midy Lab. Midy, 67, av. Wagram, Paris.
***Pommade Aiphème** 54, r. d'Étretat, Fécamp (S.-I.).
Pommade à l'Inolène 42, r. Mont-Cenis, Paris.
Pommade antihémorroïdale Manor, St-Germain - du - Bois (S.-et-L.).
Pommade Ascigué Huyghe (G. et J.), Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or).
- *Pommade Bebia** 5, av. E.-Boissier, Nantes.
***Pommade Bernamont** 87-89, rue du Commerce, Nevers.
Pommade Bertol Vichy 34, bd Victor-Hugo, Grasse.
Pommade Brune Manor St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
***Pommade-Crème Luddin** Lab. Rey, 12, rue Montmartre, Dijon.
- Pommade Cuticura** 3, av. Lowendal, Paris.
Pommade de l'Esterel 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
Pommade de Séru Lettry, 69, r. de Sèvres, Paris.
- *Pommade du D^r Butler** 1, rue Bossuet, Dijon.
Pommade du D^r Wolf 46, rue des Faures, Bordeaux
- *Pommades aseptiques Dulcis** (Voir : *Tubes Dulcis*).
Pommades Éon 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- Pommade épidermogène** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
Pommade Forgeue 1, av. de Villars, Paris.
***Pommade Fornet** 11, Chaussée de LaMuette, Paris.
Pommade au goudron Mougnaud, Longjumeau.
***Pommade Heliatol** 4, pl. Royale, Nantes.
***Pommade Inséva** 60, rue de Monceau, Paris.
***Pommade d'Insuline Phyloze** (Voir : *Poudre et Pommade d'insuline*.)

- *Pommades Kléos** 12, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire.
- Pommade L. 3** 3, r. Abreuvoir, Boulogne-s.-S.
- *Pommade Lenoir** 142, rue de Picpus, Paris.
- *Pommade Logeais** 22 bis et 24, r. de Silly, Boulogne-s.-Seine.
- *Pommade Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
- Pommade Néothorium Millot** 177, rue de Courcelles, Paris (XVII^e).
- *Pommade au Nestosyl** 72, rue Saint-Dominique, Paris.
- *Pommade Noelline** Guingamp (C.-du-N.).
- Pommade Périol** 21, rue Mouton-Duvernet, Paris.
- Pommade Phlébos** 229, cours Gambetta, Lyon.
- Pommade Poncet** 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
- Pommade Quartier** 34, r. de Paris, Essonnes (S.-et-O.).
- Pommade Radine** Duclos, Évreux (Eure).
- Pommade Raimoa** 16, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
- Pommade Reys** 21, r. de la Gare, La Broque (B.-Rh.).
- Pommade Rhinol** Dubat, 80, fg St-Denis, Paris.
- *Pommades ophtalmiques Chibret** Chibret, 5, rue Saint-Hérem, Clermont-Ferrand.
- *Pommades Probios** 8, rue St-Martin, Paris.
- Pommades Royer** 223, rue Saint-Martin, Paris.
- Pommades Stéryl** 94, rue Michelet, Alger.
- Pommades Talon** 153, bd Montparnasse, Paris.
- Pommade-Vaccin Sallantale** 42, r. des Gdes-Arcades, Strasbourg.
- Pommade Valentin Chaillot** 10, square de Châtillon, Paris.
- Pommade V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ardèche).
- Pommade Vérandy** G. Laurens, Pharm., Aix-en-Provence.
- *Pommade Vitamorphuine** 12, rue du Téléphone, Bruxelles.
- *Pommade Zylor Ponine** 22, rue des Martyrs, Paris.
- *Poroderma** 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
- Poroplaste A. K.** 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
- *Postérisan** 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
- *Post-Hypophyse Choay** 92, rue Bobillot, Paris.
- *Potion Adol** 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- Potion Boissel** 78, c. de la Liberté, Lyon.
- Potion Bonnet** 295 bis, r. de la Benaugue, Bordeaux.
- Potion des Cordeliers de Seez** 17, rue Cadet, Paris.
- *Potion Dioga** 19, av. Secrétan, Paris.
- Potion du D^r Henry** 37, rue Brochant, Paris.
- Potion Granval** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Poudre à l'Inolène** 12-14, rue Fery, Reims.
- Poudre américaine Le-roy** 42, r. Mont-Cenis, Paris.
- 12, r. de la République, Puteaux.

Poudre antiasthma- tique Henry	39, rue Sclessin, Liège.
Poudre antiasthme Bengalais	Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).
Poudre anti-asthm	Martin-Mazade, Saint-Raphaël
Poudre antigestralgi- que	11, r. La Fayette, Paris.
*Poudre Anti-H	160, av. d'Italie, Paris.
Poudre Arria	47, rue Maleret, Bordeaux.
*Poudre Beau chloro- formée	Ph. Guely, 16, cours Gambetta, Lyon.
Poudre Bébia	5, avenue Boissier, Nantes.
Poudre Bellada	24, rue Keller, Paris.
Poudre Blot Laxative	49, rue de Maubeuge, Paris.
Poudre Cap	7, rue Charlot, Paris (III ^e).
*Poudre Cassarini	24, rue Flégier, Marseille.
*Poudre Chaumel	78, fg Saint-Denis, Paris.
Poudre Cosy	89, rue Saint-Georges, Nancy.
Poudre Cytisia	15, rue Catulienne, St-Denis.
*Poudre Danica	50, rue de Turenne, Paris.
Poudre Deol	61, rue de Seine, Paris.
Poudre Diadermine	60, r. Et.-Dolet, Malakoff (Seine).
Poudre Dumur	78, cours de la Liberté, Lyon.
Poudre dentifrice Charlard	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
*Poudre de Lausanne	(Voir : <i>Isotonyl</i> .)
Poudre de Sapolan	29, rue Singer, Paris.
Poudre de viande	61, av. Philippe-Auguste, Paris.
*Poudre du D ^r Butler	(Voir : <i>Pommade du D^r Butler</i> .)
Poudre du D ^r Cléry	44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
Poudre du D ^r Souligoux	1, quai Aulagnier, Asnières.
Poudre épidermogène	53, bd de Verdun, Fontenay-s.- Bois.
*Poudre Escoufflaire	à Baisieux (Nord).
Poudre Espic	20, rue Saint-Lazare, Paris.
Poudre Evine	15, bd des Batignolles, Paris.
Poudre Exhibard	6, rue Dombasle, Paris.
Poudre Fiore	61, rue de Seine, Paris.
Poudre Gécé	48, rue de Berri, Paris.
Poudre Génia	136, rue Chemin-Vert, Paris.
Poudre Gilbert Trillon	24, r. Eug.-Pelletan, Vitry-s.-S.
Poudre Gynol	316, ch. d'Ixelles, à Bruxelles.
Poudre Gynule	Ch. Dehay, à Arras.
Poudre Héliatol	4, pl. Royale, Nantes.
Poudre Helvétia	50, r. de la République, Puteaux.
Poudre Hunier	62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
Poudre Jifa	44, r. Chaptal, Levallois (Seine).
Foudre Klappa	Giban, à Sens (Yonne).
Foudre Lartigue	78, fg Saint-Denis, Paris.
Poudre laxative André	60, r. des Moulins, Valence.
Foudre Mass plastique	20, rue Joubert, Paris.
*Foudre Noelline	(Guingamp (C.-du-N.).
Poudre Optima	Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Poudre O. R. L.	4, rue d'Illzach, Mulhouse.

- Poudre Pastorilos**
***Poudre Paterson**
Poudre Pelevine
Poudre de Pepsine
Boudault
***Poudre et Pommade**
d'Insuline Phyloze
Poudre purgative Kün-
ckel
Poudre Pylor
Poudre Remoro
Poudre Reys

Poudre Rhodys
***Poudre Rocher laxative**
Poudre du roy
Poudre Salva
***Poudre Satine**
Poudre de soufre Sapo-
lan
Poudre Stear
Poudre Stoma

Poudre Zani

Poudre Zeden
Poudre Ziethen
Praequine
***Pragmoline**
Praidow
Pré-asthme
Précibiase
Frécy
***Préfagyl**
Prélase
***Prémaline**
***Pressyl**
***Prévalidine**
Prévarsyl
Préventyl
***Prézymase**
Prima Furoncles
Primalgine
Primaplast
Prima-Stéril
Primatex
***Primulyze**
***Probios**
***Procolyl**
***Procuta Brisson**
Proderma
Produits antidiabé-
tiques Dupont
Produits Benedictus
Produits Billault
Produits Chanteaud
- 10, rue du Plâtre, Paris.
 43, rue de Saintonge, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 Mougnaud, Longjumeau (S.-et-
 Oise.)

 48, rue de la Procession, Paris.

 3, rue Watteau, Courbevoie.
 20, Grande-Rue, Besançon.
 Montauban (Tarn-et-Garonne).
 21, r. de la Gare, La Broque (B.-
 Rhin).
 97, bd Saint-Germain, Paris.
 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
 5, rue Diderot, Nice.
 1, rue de Châteaudun, Rennes.
 7, rue Galvani, Paris.

 29, rue Singer, Paris.
 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
 Hérin, 98, rue Jeanne-Maillotte,
 La Madeleine (Nord).
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.
 27, bd Henri-IV, Paris (IV^e).
 85, rue des Morillons, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 Battut, à Vatan (Indre).
 3, pl. d'Armes, Valenciennes.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 11, rue de Clichy, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 52, r. La Bruyère, Paris (IX^e).
 Mer Rouge, Mulhouse.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 74, rue des Jacobins, Amiens.
 3, rue Fernand-Widal, Paris.
 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
 24, bd Sébastopol, Paris.
 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
 id.
 id.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 8, r. St-Martin, Paris.
 9, r. de la Platière, Lyon.
 157, rue Championnet, Paris.
 Cosson, Romainville (Seine).

 38, rue Rochechouart, Paris.
 17, rue Duguay-Trouin, Paris.
 4, pl. de la Sorbonne, Paris.
 3 et 5, r. Alex.-Dumas, St-Ouen.

Produits diététiques

Favrichon, à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).

Produits du Dr Serin de Gaillac

10, allées Damour, Bordeaux.

Produits Gmet

27, fg Montmartre, Paris.

Produits Gory

51, rue des Mathurins, Paris.

***Produits Lémery**

36, quai Fulchiron, Lyon.

Produits Maïas

Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).

Produits de Malt

5, rue Labroque, Strasbourg.

Produits opothérapiques

56, rue Beaubourg, Paris.

Produits organiques

79, av. d'Orléans, Paris.

Richard

82, rue de la Croix-Verte, Albi.

Produits Orbino

3, rue de Dunkerque, Paris.

Produits Pennès

142, r. Fransman, Bruxelles.

Produits de Régime

Palc, Messigny (Côte-d'Or).

Produits Shamb

92, rue Bobillot, Paris.

Produits Zyma

12, rue Charles-V, Paris.

***Prodynase**

9 et 11, rue de la Perle, Paris

***Progadol**

9, rue de la Platière, Lyon.

***Progaster**

15, rue Catulienne, Saint-Denis.

***Progone**

id.

Progoseptone

36, r. de la Tour d'Auvergne,

***Prolax**

Paris.

***Prolyses**

6, rue de Navarin, Paris.

***Prométhine**

20, rue des Écoles, Paris.

***Promulier**

20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.

***Propavine**

21, rue Jean-Goujon, Paris.

***Prophylactyl**

76, rue des Jacobins, Amiens.

I rophylyargyl**(Voir : *Vitargyl*.)Prophylax**

6, rue des Feuillants, Marseille.

***Prophylaxis**

11, rue Montagne-Ste-Geneviève,

Paris.

***Propidex**

21, rue Jean-Goujon, Paris.

***Propidon**

id.

***Prostal**

13, avenue de Ségur, Paris.

***Prostalyse**

21, rue de Lyon, Paris.

***Prostatidausse**

4, rue Aubriot, Paris.

***Prostatols**

72, quai Jemmapes, Paris.

***Prosthénase Galbrun**

10-12, r. Guynemer, St-Mandé.

***Prostigmine**

10, rue Crillon, Paris.

Prosvelta

24, bd Sébastopol, Paris, et 8,

r. de Hollerich, Luxembourg.

***Prosypal**

21, rue Jean-Goujon, Paris.

Protaminol Byla

26, av. Observatoire, Paris.

Protargol-Boulard

82, av. de Suffren, Paris.

Protège-Vaccin Kraus

37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.

***Protensène**

142, rue de Picpus, Paris.

Protensol

Godart, Andenne (Belgique).

Protéobiol

Bailly, 17, r. de Rome, Paris.

***Protéodyne**

29, pl. Bossuet, Dijon.

Protéol

5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.

Protéo Maltase

29-31, quai Henri-IV, Dieppe.

Prothéine

29, pl. Bossuet, Dijon.

Prothiol

4, rue Childebert, Lyon.

Protiodé Grémy

14 rue de Clichy, Paris.

- *Protiodyne
 Protonic
 Proto-Gambier

 Protyline Roche
 *Provac's
 *Proveinase Midy
 Provenine
 Proxystase
 *Proxyltol
 *Prunagar
 Pruneline Bost
 Prunines Sentini
 *Prurilyse
 Prurititol Raimoa

 Psinase Grémy
 *Psoréal
 *Psorène
 *Psoréon
 Psorialan
 *Psoryl
 *Psothanol
 Psychobiasés
 Psycho-Neuryl
 Psyliolaxine

 *Psyllium Langlebert
 Purgerglandol
 Puerol
 Pulcéine
 Pulmicure
 Pulmine Byla
 *Pulmo Bailly
 Pulmobiasé

 Pulmobryne
 Pulmobules Hyva
 *Pulmocardine
 Pulmocholine
 Pulmochrysine
 *Pulmodion
 *Pulmodynol
 *Pulmofluide
 *Pulmofluide éphédrine
 *Pulmogrog
 Pulmogyl
 *Pulmonaire du
 D^r P. Bourgogne
 Pulmonase
 Pulmonine Bouty
 *Pulmorectol
 *Pulmorex

 *Pulmoseptine
- 29, pl. Bossuet, Dijon.
 88, rue Duhesme, Paris.
 42, r. E.-Deschanel, Courbevoie
 (Seine).
 10, rue Crillon, Paris.
 42, rue Thiers, Le Havre.
 67, av. de Wagram, Paris.
 8, rue Riblette, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 18, rue des Écoles, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 Domergue, Agen (L.-et-G.).
 72, Grande-Rue, Flers (Orne).
 16, rue des Immeubles-Indus-
 triels, Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 Eon, Dinan (Côtes-du-Nord).
 Eon, Dinan (Côtes-du-Nord).
 Eon, Dinan (Côtes-du-Nord).
 14, rue Saint-Claude, Paris.
 2 et 4, pl. St-Martin, Vendôme.
 22, rue de Turin, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 St-Rémy-de-Provence (B.-du-
 Rhône).
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 Le Naour, Quimperlé (Fin.).
 3, r. des Rouairies, Dinan.
 26, av. Observatoire, Paris.
 15, rue de Rome, Paris.
 36, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 38, r. N.-Dame-de-Lorette, Paris.
 12, rue Grande, Évreux.
 J. Perrochon, Tours (I.-et-L.).
 20, rue d'Avron, Paris.
 Bonnay, Nogent-s.-Marne (Seine).
 10, impasse Milord, Paris.
 22, rue de Nemours, Paris.
 Leurquin, Dreux (E.-et-L.).
 id.
 Fercoc, La Varenne-Saint-Maur
 33, rue Lauriston, Paris.

 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 14, av. Perrichont, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 23, rue des Moines, Paris.
 Mouneyrat, Villeneuve-la-Ga-
 renne.
 183, r. de Rome, Marseille.

Pulmoseptol	133, rue Lecourbe, Paris.
*Pulmosérum	(Voir : <i>Pulmo-Bailly</i>).
Pulmosirop	r. du Commerce, Montmarault (Allier).
*Pulmositoires	7, r. Ste-Isaure, Paris (XVII ^e).
Pulmosodyl	15, rue Corneille, Lille.
Pulmostéryl	à Châteauroux (Indre).
Pulmostyl	3, r. Victor-Hugo, Châteauroux.
*Pulmo-Thiorine	39, rue Fondaudège, Bordeaux.
Pulmovaccin	23, rue des Moines, Paris.
Pulmoverne	13, rue D ^r -Mazet, Grenoble.
Pulmovitine	Moulins-sur-Yèvre (Cher).
*Pulsamone	59, rue Boissière, Paris (XVI ^e).
Pulsophyle	102, av. Michelet, St-Ouen.
*Pulvéol	10, impasse Milord, Paris.
Pulvérisateur E. C. S.	10, rue Caumartin, Paris.
Pulvérisateur Vaast	22, rue de l'Odéon, Paris.
Pulvinasol	26, rue des Moines, Paris.
Pulvi-Lactéol du D^r Boucard	30, rue Singer, Paris.
Pulvinha-Pathuro	Le Gallo, à Auray (Morbihan).
Fulviséda	149, av. des Minimes, Toulouse.
*Pulvita	62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
l ulvobarine	21, rue Jean-Goujon, Paris.
Pulvo - Collargophé-drine	11 bis et 13, r. Levert, Paris (XX ^e).
Pulvo-Ephrédrocure	id.
Punch Novela	Saint-Julien-en-Jarez (Loire).
Puragar	46, rue de Rome, Marseille.
*Purargol	Novalis, Oullins (Rhône).
*Purethyl	74, rue des Jacobins, Amiens.
Purgalex	24, rue Montessuy, Paris.
*Purganol Daguin	7-13, r. Bobillot, St-Maur (Seine).
Purganséline	Ansel, Samer (Pas-de-Calais).
*Purgarex	18, r. du Rempart, Valenciennes.
Purgatif Voux	31, av. Michel-Bizot, Paris.
Purgelettes Roux	58, rue de Maubeuge, Paris.
Purgemint	Moulin, 50, rue de la République, Puteaux.
Purgettes Lentilhac	33, fg Montmartre, Paris.
Purgipastilles	37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
Purgos	7 bis, rue Galvani, Paris.
Purgyl Kœhly	117, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Purolive	25, av. Ledru-Rollin, Le Perreux (Seine).
Purpuro	133, r. Lecourbe, Paris.
*Pyo-Amphogel	21, bd de Riquier, Nice.
*Pyocoline	2 et 4, pl. St-Martin, Vendôme.
*Pyodarsénol	14, r. de Normandie, Asnières.
Pyodermase	pl. du Marché, La Rochelle.
*Pyodolysine	2, rue des Trois-Mages, Marseille.
Pyodont « 21 »	155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
*Pyoformine	89, rue du Cherche-Midi, Paris.
Pyogénol	14, r. de Normandie, Asnières.

- Pyol Hambro**
 ***Pyorex**
Pyoseptol
 ***Pyo-Vaclydun**
Pyovargol
 ***Pyrallium**
Pyramidon U. R.
Pyran
Pyratone
 ***Pyrôlaine Collas**
 ***Pyréthane**
Pyréthrine
Pyréthrosol
Pyréthroxyl
Pyridone D^r Berlioz
 ***Pyri-Pyridium**
Pyrocidine
Pyroclase
 ***Pyrocuroil**
 ***Pyroléol Edet**
 ***Pyroselline**
 ***Pyurol**
- 1, r. de Châteaudun, Rennes.
 15, rue de Rome, Paris.
 13, r. de Paris, Clichy (Seine).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 28, rue du Four, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 71, bd Saint-Michel, Paris.
 Mougnaud, Longjumeau (S.-et-O.).
 18, rue Ernest-Rousselle, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 12, rue Pavée, Paris.
 rue Faidherbe, Lille.
 6, rue d'Alsace, Grenoble.
 Servier, Orléans (Loiret).
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 15, rue des Champs, Asnières.
 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 56, bd Ornano, Paris.
 15, r. J.-Jaurès, Puteaux (Seine).

Q

- ***Quassia-Kina Rabot**
Quassine Frémint
Quassine Houdé
 ***Quassinol**
Québralgine
Quiétol
Quiétudol
Quiétyl
Quina Baron
 ***Quina Bourcet**
 ***Quinacrine**
 ***Quina pepsiné Blot**
Quinacinas
Quina-Fer des Vosges

Quina-Fer Mechling
Quina Laroche

Quinamagnésion
 ***Quinarsol antianémi-**
que Grandval
 ***Quinarsol Fébrifuge**
Grandval
- 49, rue Bitché, à Courbevoie.
 6, rue Abel, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 73, bd Baille, Marseille.
 2, bd Pershing, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Bertrand, Nomexy (Vosges).
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 3, pl. Tobie-Robatel, Lyon.
 7, av. du Doyenné, Lyon-St-Jean.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 38, bd de Strasbourg, Toulouse.
 5, rue de la Paix, Paris.
 21, r. de la Gare, La Broque
 (B.-R.).
 à Mulhouse.
 Comar, 20, rue des Fossés-Saint-
 Jacques, Paris.
 Sauba, Montreuil (Seine).
 12 et 14, rue Féry, Reims.
 Id.

Quinastase	56, r. St-Lambert, Marseille.
Quinby	62, rue Erlanger, Paris.
Quinéase	37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
* Quinéine	21, rue Chaptal, Paris (IX ^e).
* Quinicardine	27, rue de la Procession, Paris.
* Quinimax	154, av. Malakoff, Paris.
Quinimuthol Saca	89, rue du Cherche-Midi, Paris.
* Quinine - Calcium - Sandoz	20, rue Vernier, Paris (XVII ^e).
* Quinine Pelletier	Vial, 8, rue Vivienne, Paris.
* Quinino-Phytine	103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
Quinio-Goyl Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.
Quiniopraequine	21, rue Jean-Goujon, Paris.
* Quinio-Stovarsol	id.
Quinismuth	89, av. Wagram, Paris.
Quinium Roy	81, bd Suchet, Paris.
Quinium Roy phos-phaté	id.
* Quinobore	143, rue du Temple, Paris.
Quinobrome	15, r. des Champs, Asnières.
* Quinocarbine	7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.
* Quinoforme Lacroix	37, rue Pajol, Paris.
* Quinoidine Duriez	20, pl. des Vosges, Paris.
Quinol	G. Henry, à Vernon (Eure).
* Quinolax	7, r. L.-Jeannin. La Garenne (Seine).
Quinophage	12, rue Pavée, Paris.
Quinopyrol	172, rue d'Alésia, Paris.
Quinorhéine Duteil	90, av. Saint-Ouen, Paris.
* Quinosiphon	25-27, r. du Com ^t -Rivière, Colombes (Seine).
Quinotane Valguy	12, rue Charles-V, Paris.
Quinovarine	78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
* Quinquina Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
Quinquina granulé Astier	42, r. du Dr-Blanche, Paris.
Quinquina Grandval	12-14, rue Féry, Reims.
Quinquina Watelet	15, av. du Parc-Montsouris, Paris.
* Quinsal	34, r. Thiers, Gray (H ^{te} -Saône).
* Quinthéryl	1, rue Paul-Bert, Angers.
Quintolyse Feret	4, rue des Martyrs, Paris.
Quinurea	22, r. de la Bienfaisance, Paris.
* Quintozone	18, rue Daval, Paris.
* Quinuryl	34, rue Sedaine, Paris.
Quiphos Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Quotibyl	29, av. d'Orléans, Paris.

R

- Rachisténine** 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
- Radiargyl** 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
- Radiesthésie médicale** 88, rue Duhesme, Paris.
- Radioactine** 24, r. de Monttessuy, Paris (VII^e).
- *Radio-Baryx** 1, r. de Paris, Limours (S.-et-O.).
- *Radiobaume Adrian** 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Radiobiogyl** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Radiocréméline** 25, rue Vaneau, Paris.
- Radiodine** 4, rue Saint-Anastase, Paris.
- Radiogyl** Delaunay, Joué-lès-Tours.
- Radiole** 25, rue Vaneau, Paris.
- *Radiomagnésium** 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
- Radio-osséine** 264, rte d'Heyrieu, Lyon.
- Radiopague** 4, r. Lamartine, Nanterre.
- Radiophédrine** Lab. Marin, Pontailac-Royan.
- Radiophorine** Jooss, Montreuil (Seine).
- Radiopirine** Coulaud, Lorris (Loiret).
- Radioplasme** 24, rue de Monttessuy, Paris.
- *Radio-Salil** 19, rue Drouot, Paris.
- Radiosantal** 24, rue de Monttessuy, Paris.
- Radiosérum Jaboin** 24, rue de Monttessuy, Paris.
- *Radiotétrane** 40, rue Bellechasse, Paris.
- Radio-Thalline** Bassol, Ste-Alvère (Dord.).
- Radiotonine** 4, rue St-Anastase, Paris.
- *Radio Topic C.** Lab. Marin de Royan-Pontailac.
- Radiovitine** Fontanier, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Radioviva** 35, rue Cler, Paris.
- Radiovules** 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
- Radipirine** 9, rue Victor-Letalle, Paris.
- Radiurèse** Delaunay, Joué-lès-Tours.
- Radiuryl** id.
- Radjunal Chevrier** 21, fg Montmatre, Paris.
- Raiforyl** 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
- Raisin quotidien** Chartier, Saumur (M.-et-L.).
- Rami-gouttes** 44, r. Chaptal, Levallois-Perret.
- *Rangol** 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
- *Raphabil** 20, rue Vernier, Paris.
- *Rapharène** Journet, 18-20, rue Vavin, Paris.
- Rapidoats** Bloch, à Tomblaine (M.-et-M.).
- Rapnol** 50, av. de Normandie, Colombes.
- *Ravix** 2-4, rue Catulle-Mendès, Paris.
- Réalgose** 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- Réaline** Guillaume, Issoudun.
- *Réalphène Buisson** 98, rue de Sèvres, Paris.

***Recal** (Voir . *Comprimés*)

Récalcifiant Henry

***Reconstituant Mary**

***Recrésal**

***Rect'Acolitol**

***Rectagine**

Rectanol

Rectocalm

***Rectoline**

Rectoma

***Rectopanbiline**

***Rectopansement-Amibiasine**

Rectoplasme

***Rectoseptol**

***Rectosol**

Rectosote

Recto-Vaccin Salantale

Recytile

Redermine-Bœglin

Réfistine

Reginase

Régulase Eifgé

Régulaxane

Reinaxine

Rein - Endocrisines Fournier

***Reinicalcine**

Remède Boss

Renaleptine

Renalgine

Renetol

***Renocardine**

***Rénoline**

Renosiphon

Renotanic Grémy

Renovir

***Renovitase**

Renovol

Renovules

***Rénoxyl**

Réparateur Thuau

***Résocaine**

***Résyl**

***Réthragine**

***Rétropituine Carrion**

Retusol

Revitalose

***Révulsif Adrian**

Fleury, Arcachon (Gironde).

39, rue de Sclessin, Liège.

32, rue de l'Ouest, Paris.

19, rue Drouot, Paris.

71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.

22, r. de la Sorbonne, Paris.

1, av. de Villars, Paris.

55, rue de Chabrol, Paris.

M. SOULAS, Surgères (Ch.-I.).

Delaunay, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).

à Annonay (Ardèche).

69, rue de Wattignies, Paris.

Millet, à Rambouillet.

154, av. Malakoff, Paris.

M. Soulas, Surgères (Ch.-I.).

43, r. de Créteil, Joinville-le-Pont (Seine).

42, r. Grandes-Arcades, Strasbourg.

4, rue d'Illzach, Mulhouse.

Haguenau (Bas-Rhin).

20, rue du Conseil, Bruxelles.

71, r. Sainte-Anne, Paris.

40, av. Secrétan, Paris.

24, bd Sébastopol, Paris, et 8, r. de Hollerich, Luxembourg.

Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).

7, rue Biscornet, Paris.

191, r. du Fg-St-Antoine, Paris.

Prax, à Brest (Finistère).

21, rue Jean-Goujon, Paris.

34, rue Sedaine, Paris.

Duval, à Falaise.

Perrochon, Tours (I.-et-L.).

7, r. des Petits-Carreaux, Paris.

39, r. de Sclessin, Liège.

14, rue de Clichy, Paris.

6, rue Berbissey, Dijon.

50, av. Jacqueminot, Meudon.

22, rue de Paris, Houilles.

id.

89, rue du Cherche-Midi, Paris.

22, fg Saint-Michel, Angers.

Novalis, Oullins (Rhône).

103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.

22, rue de la Sorbonne, Paris.

54, fg Saint-Honoré, Paris.

119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil (S.-et-O.).

21, r. de Neuilly, Nanterre.

9 et 11, rue de la Perle, Paris.

Révulsif Boudin*Révulsif Dynamy*****Révulsif Fisch****Révulsif liquide S R*****Révulsif Manor*****Révulsif Milko****Révulsior*****Rexacarbine****Réxiode*****Rhagadine Bracque-
mond****Rhamnausol****Rhamnine Henry*****Rhéantine Lumière****Rhésalgine-Vicario****Rheumasan****Rhinadorine****Rhinadrargol*****Rhinadrol****Rhinaldose****Rhinalène****Rhinalginol*****Rhinaquintine****Rhinargol****Rhinarsénol****Rhinarvox*****Rhinaspir****Rhine****Rhinil*****Rhino-Amphogel*****Rhino-Antipiol*****Rhino-Borostyrol*****Rhino-Colloïdol****Rhinodol*****Rhinodrops*****Rhinofluine****Rhinogeraniol****Rhinogénol*****Rhino Glottyl*****Rhinol****Rhino-Lactéol du Dr
Boucard****Rhinolan****f Rhinolin*****Rhino-Liposeptine****Rhinolive****Rhino-Orargol éphé-
driné****Rhinophédrine****Rhino-Pro****Rhinorcine****Rhino-Robur****Rhino-Salva****Rhino-Sec**9, av. J.-Jaurès, Joinville-le-
Pont (Seine).Chavanne, Fontaine-Grenoble
(Isère).

Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).

4, rue Levert, Paris.

St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).

60, cours Émile-Zola, Lyon.

PAULIN & BARRE, Tours.

G. GAYRAUD, Lavit (T.-et-G.).

16, r. H.-Régnault, Courbevoie.

71, av. de Villiers, Paris.

61, bd Malesherbes, Paris.

39, rue de Sclessin, Liège.

45, rue Villon, Lyon.

17, bd Haussmann, Paris.

11, rue Malher, Paris.

33, fg Montmartre, Paris.

56, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).

40, r. des Acacias, Paris.

102, av. Michelet, Saint-Ouen.

Richard, Aubenas (Ardèche).

Longuet, 34, r. Sedaine, Paris.

58, rue de Vouillé, Paris.

71, bd Saint-Michel, Paris.

2, allées de Chelles, Le Raincy
(S.-et-O.).

Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.)

21, rue de Lyon, Paris.

Fleury, Dresles (Oise).

Orga, Avignon (Vaucluse).

21, bd de Riquier, Nice.

8, av. Walkanaer, Nice.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

81-83, rue de Lille, Roubaix.

50, r. de la République, Puteaux.

194, rue de Rivoli, Paris.

5, r. François-Ponsard, Paris.

36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.

4, villa Ornano, Paris.

Denis, 20, rue du Laos, Paris.

80, fg Saint-Denis, Paris.

30, rue Singer, Paris.

24, rue Jardel, Bordeaux.

82, av. Malakoff, Paris.

2, pl. des Vosges, Paris.

19, rue de Pontevès, Marseille.

177, rue de Courcelles, Paris.

149, r. des Minimes, Toulouse.

8, rue Riblette, Paris.

133, rue Lecourbe, Paris (XV^e).

72, av. Thiers, Le Mans.

10, r. de Belfort, Rennes.

74, r. de Lourmel, Paris.

- *Rhino Spécifique Favrot
Rhinostagone
Rhino-Titane
*Rhino-Sulforgan
Rhino-therme
Rhino-Vaccin Creuzé
Rhino-Vaccin Inava
Rhino - Vaccin Salantale
*Rhino-Vaclydun
*Rhizotanin
*Rhocya
*Rhodarsan
*Rhodazil
*Rhodiocarbine
Rhodiaphylline
Rhodium Amicros
*Rhodoboryl
Rhodocaïne
Rhodoquine
*Rhoféine
Rhomnol Leprince
Rhumacrescol
Rhumatoïdine
*Rhumofan
Ricigel
*Ricigonol
*Ricilax
Ricinopalmine
Ricinpoudre
Ricomalt
Rinoleïna
*Riodine Astier
*Rob Cabanès
Rob Dussang
Rob Gory
*Rob Oberlin
*Robrodyne
Roburex
*Roche-Posay
*Rodilone
Rodopræquine
*Rogerma
Roléine
Romaboldo
*Romarène
*Romarinex
Romarol
Romyl
*Rosalyl
Rosanol
6, rue Dombasle, Paris.
20 bis, rue Sergent-Godefroy,
Montreuil-sous-Bois.
P. Métadier, Tours.
16, r. de Gramont, Paris (II^e).
Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.).
74, rue de Lourmel, Paris.
14, rue de Normandie, Asnières.
42, r. Grandes-Arcades, Stras-
bourg.
27, rue Desrenaudes, Paris.
56, bd Ornano, Paris.
39, bd de La Tour-Maubourg,
Paris (VII^e).
21, rue Jean-Goujon, Paris
id.
id.
id.
177, r. de Courcelles, Paris.
Mauchant, Gennevilliers (Seine).
18, av. Hoche, Paris.
21, rue Jean-Goujon, Paris.
id.
62, rue de la Tour, Paris.
14, Gde-Rue, Pont - de - Vaux
(Ain).
39, r. Roger-Salengro, Bondy.
60, r. Nationale, Castelnau-dary.
5, rue de la Paix, Paris.
2, rond-point du Centre, La
Garenne-Colombes (Seine).
60, rte de Châtillon, Malakoff.
5, bd des Brotteaux, Lyon.
15, rue de Naples, Paris.
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
78, bd Beaumarchais, Paris.
42, r. du D^r-Blanche, Paris.
17, rue Cadet, Paris.
Lescaroux, Châteauroux.
Jooss, Montreuil (Seine).
Tinardon, 17, r. Cadet, Paris.
L. Robert, Nîort (D.-S.).
156, av. Victor-Hugo, Paris.
La Roche-Posay (Vienne).
21, rue Jean-Goujon, Paris.
id.
MAHIEU. Lens (Pas-de-Calais).
49, r. de Bitche, Courbevoie.
119, rue de Sèze, Lyon.
18, pl. Doguereau, Dreux (E.-
et-L.).
PHARMA-SPÈS, Lille.
81, av. Malakoff, Paris.
11, r. de Rome, Issoudun.
Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
L. Hinglais, à Épernay.

- Rosaphédrine**
***Rosaseptor**
Rossoline
Royanol
Royérine Dupuy
***Roziode**
Rozoderme
Rubargyre
***Rubiaderm**
***Rubiazol**
***Rubrophène**

Rubyl
***Rutonal**
Rylal Noyon
***Rythmosystol**

Ryvema
- Farman, 19, r. Auber, Paris.
 21, rue de Lyon, Paris.
 5, av. E.-Boissier, Nantes (L.-I.).
 Lab. de l'Océanie, Royan (Ch.-I.)
 223, rue Saint-Martin, Paris.
 6, rue de Navarin, Paris.
 11, rue des Deux-Ponts, Paris.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 id.
 25, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 53, rue de Crimée, Paris.
 60-62, r. St-Guilhem, Mont-
 pellier.
 8, rue Riblette, Paris (XX^e).

S

- *Saburrase**
Sacérase
***Sacnel**
***Saint-Aré**

***Salantale**
Salbiase
***Salbine du D^r Fayès**
***Salénal Ciba**

***Salène Ciba**
***Salganyl**
***Salibra**
Salicaïne
Salicaire Dausse
Salicaire Henry
***Salicairine**
Salicéral Clin
Salicol Dusaule
***Salicure**
***Salicylate Ana**
***Salicylate de soude**
Clin
Salicylate Le Perdriel
Salicylate Manor
***Salicylna**
***Saliformiode**
Saliode
Saliphoryl
Saliquinol
- 30, r. A.-Silvestre, Courbevoie.
 20, r. du Pré-St-Gervais, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris (IV^e).
 Sté des Eaux minérales de
 Decize (Nièvre).
 42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
 La Baule-sur-Mer (Loire-Inf.).
 3, rue d'Alexandrie, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 id.
 (Voir : *Dépuratif Salganyl*.)
 1, rue des Jardins, Asnières.
 168, bd Saint-Germain, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 39, rue de Sclessin, Liège.
 37, av. de l'Opéra, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 19, rue du Bac, Paris.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 20, rue des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
 D^r Lavoué, Rennes (I.-et-V.).
 57, bd A.-Briand, Champigny.
 Gabail, 5, r. Lefebvre, Paris.
 43, r. des Chantiers, Versailles.
 14, av. Perrichont, Paris.

- *Salitropine Aguetant 26, quai Fulchiron, Lyon.
 Salmenthyl 4, rue de Metz, Toulouse.
 *Salsanos 7, r. L.-Jeannin, La Garenne.
 *Sal-Sodyl 5, bd Gambetta, Grenoble.
 Salt Pepton 9, av. J.-Jaurès, Lyon.
 Salubrine Phénix Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 Salubrine Dentaire id.
 *Salvacid Mialhe, 8, rue Favart, Paris.
 Salvandra 71, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
 Salvanos 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 Salva-Sérum 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 *Salvatyl 42, r. E.-Deschanel, Courbevoie.
 *Salvé 45, fg Saint-Denis, Paris.
 *Salvebyl 45, rue du Fg-St-Denis, Paris.
 *Salvenase Legoux 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).
 Salvoxy 237, rue Lafayette, Paris.
 Salychlore 46, rue de Rome, Marseille.
 *Salyfrène 17, av. de la Capelette, Marseille.
 *Salyptol Narty 134, bd Pereire, Paris.
 Salsérum 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison.
 Sambul (liquide et comp.) 22, r. St-Pierre, Evreux (Eure).
 Sanaféine 7, rue Biscornet, Paris.
 *Sanalepsi Russi 78, bd Beaumarchais, Paris.
 Sanalgine Sanal, St-Louis (Haut-Rhin).
 Sanalia 35, rue des Fcs-Bourgeois, Paris.
 *Sanargol 13, quai Ragobert, Joigny (Y.).
 *Sanarteryl 124, r. St-Dominique, Paris.
 *Sanas 72, rue du Commerce, Paris.
 Sandar av. de Grasse, Cannes.
 *Sandoptal 20, rue Vernier, Paris.
 *Sanedrine 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 *Sanex Inhalant Pillier, Compiègne (Oise).
 Sanguifer Bouret 87, rue Lafayette, Paris.
 *Sanguil 12, rue Saint-Gilles, Paris.
 Sanguine irradiée 40, rue des Abbesses, Paris.
 Sanguinova 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 Sangule Dubat 80, fg Saint-Denis, Paris.
 Sanicérène 24, r. des Plantes, Paris.
 Sanka 54, quai de Boulogne, Boulogne-s.-Seine.
 *Sanocrysine 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 Sanocure 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 *Sanoformine 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 Sanogène 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 *Sanogyl 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 Sanogynol 161, rue Croix-de-Seguey, Bordeaux (Gironde).
 Sanomint 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 *Sanoquinol 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 *Sanoram 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 Sanos 3, av. Lowendal, Paris.
 Sanpur 80, fg St-Denis, Paris.

- Santal Bretonneau**
Santal Clin
Santal Dolmay
Santalex
Santal Henry
***Santal Midy**
***Santal Monal**
Santal Oberlin
Santal P. Petit
Santal Salolé
Santal Salolé Cabanès
Santaline Daupez
Santalol Montagu
Santéine Montagu
***Santhéose**
***Santonia**
Santurol
Santyol
***Sanubrol Mars**
Sanuryl
Saphylococcine
Sapobarbe
Sapocade
Sapocrème
Sapocridine
Sapodol
Sapogynol
***Sapolan**
Sapolysine
Sapopâte
***Saporex**
***Saposide**
***Saproxyl**
Sarcoglobine
Sarcohémol
Sarcolactine
***Sarcoptol**
Sargéthyle
***Saridon**
Satine
***Saturalgine**
Saturaline
Saturol
Saubarsinol
Saucholine
Sauge Gmet
Savon Aiphème
Savon Bébia
Savon dentifrice Vigier
Savon de Sapolan
 10, pas. Morel, Montrouge.
 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
 71, av. République, Champigny (Seine).
 14, rue Demarquay, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 8, rue Vivienne, Paris.
 13, av. de Ségur, Paris (VII^e).
 17, rue Cadet, Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 37, rue Pajol, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 37, rue des Lois, Toulouse.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 id.
 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris.
 139, av. E.-Zola, Paris.
 21, rue des Roses, Dijon.
 Cosson, Romainville (Seine).
 Guérande (Loire-Inférieure).
 20, rue de Rivoli, Paris.
 21, r. Chaptal, Paris (IX^e).
 29, rue Singer, Paris.
 id.
 id.
 15, quai Bourbon, Paris.
 Chavanne, Fontaine-Grenoble (Isère).
 74, rue Blanche, Paris.
 29, rue Singer, Paris.
 18, rue Daguerre, Paris.
 29, rue Singer, Paris.
 184, rte de Genas, Lyon (III^e).
 29, rue Singer, Paris.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne (Seine).
 Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
 Huyghe, Brazey-en-Plaine (C.-d'Or).
 28, bd de la Cluse, Genève.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 56, av. Ed-Vaillant, Boulogne-Billancourt.
 10, rue Crillon, Paris.
 7, rue Galvani, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 80, r. du Fg-St-Denis, Paris.
 Duret & Rémy, Asnières.
 Sauba, Montreuil (Seine).
 id.
 27, fg Montmartre, Paris.
 Mercier, Fécamp (S.-Inf.).
 5, av. E.-Boissier, Nantes.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 29, rue Singer, Paris.

- Savon Glytra**
Savon au goudron
Savon Iodé Oberlin
Savons Benys
Savons Denisol Brisson
Savons ichthyol, sou-
fre, etc.
Savons Méta-Titane
Savons Michon
Savons Mollard
Savon Neutrèpur
Savon Perusol
***Savons liquides Ramet**

Scatagar
Scialine
Sciaticure
***Scillarène**
Scillase
Scillitensyl

***Scillitrine**
Scléramine Dausse
***Sclérana**
Sclérobyl
***Sclérolysine**
***Sclérosérol**
***Sclérosérum Ana**
***Sclérotensyl**

Scléroveine Hardy
Scopolamine Houdé
Scorogènes
***Scurocaine**
Scuroforme
Sealandair
Séborrhéine
Sécacornine Roche
Seccase
Sécurigène

***Sédabios**
***Sédacônes**
***Sédacrine**
Sédalgol
***Sédangor**

***Sédaortine**
Sédarsan Optima
***Sédarthryl**
Sédasia
Sédasix
***Sédasthmine**
Sédatif Py

Sédatine Christiaens
Sédaton Leo
- 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 Mougnaud, Longjumeau.
 17, rue Cadet, Paris.
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 157, rue Championnet, Paris.
 Vigier, 12, bd Bonne-Nouvelle
 Paris.
 P. Métadier, Tours.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 Fontenay-Mauvoisin, par Man-
 tes (S.-et-O.).
 46, rue de Rome, Marseille.
 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 121, av. Saint-Ouen, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 85, r. des Morillons, Paris (XV^e).
 Delaunay, Joué-les-Tours (I.-
 et-L.).
 Perrier, 12, rue Henner, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 18, av. Daumesnil, Paris.
 65, av. Victor-Hugo, Paris.
 191, rue St-Honoré, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 (Voir : *Sclérana*.)
 Chavanne, Fontaine-Grenoble
 (Isère).
 200, rue de Tolbiac, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 id.
 « Angla », Monte-Carlo.
 4, rue de Metz, Toulouse.
 10, rue Crillon, Paris.
 Dubat, 80, fg St-Denis, Paris.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
 Orge (S.-et-O.).
 3, rue St-Martin, Paris.
 Bailly, 15, r. de Rome, Paris.
 Soulas, Surgères (Ch.-Inf.).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
 Orge (S.-et-O.).
 72, quai Jemmapes, Paris.
 Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 22, rue de Nemours, Paris.
 20, rue Fg-St-Honoré, Paris.
 20, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 58, bd Richard-Wallace, Pu-
 teaux.
 4, rue Colbert, à Reims.
 21, sq. Marie-Louise, Bruxelles.

- Sédatoze Gigon
 Sédatuline
 *Sédatussine
 Sédergine
 *Sédhépatine
 *Sed'Hormone
 *Sédibaine
 *Sedlitz Ch Chanteaud
 Sedobore
 *Sédobrol Roche
 Sédobronchol
 Sédocardine
 Sédoderme
 Sédoflorine
 *Sédofolline
 Sédoformine
 *Sédogastrine
 Sédogène Sallé
 *Sédogastrol
 *Sédo-Gynœstryl
 *S é d o - Hypotenseur
 Dausse
 *Sédol Buisson
 Sédomens
 Sédomictol
 *Sédoneurol
 Sédontal
 Sédopathyl
 *Sédopavérine
 Sédopelvien
 *Sédopeptine
 Sédophoryl
 Sédoplasme
 Sédoplexine
 *Sédoprostyl
 Sédopulmine
 Sédorectal
 Sédorgino
 *Sédorhinol
 *Sedormid Roche
 *Sédosalyl
 Sédoseptyl
 *Sédosine
 Sédosol
 Sédospasmose
 *Sedotan
 *Sedotonine
 *Sédotyol
 Sédoviette
 Sédycal Py
 *Seignet'fruits
 *Seinderm Mars
 Sekle
 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e)
 46, rue de la Barrière, Elbeuf.
 6, av. V.-Hugo, Paris.
 Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
 124, rue St-Dominique, Paris.
 4, place des Vosges, Paris (IV^e).
 20, av. J.-Jaurès, Suresnes (S.).
 3 et 5, r. A.-Dumas, St-Ouen
 (Seine).
 83, bd de la Villette, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 2, rue des 3-Mages, Marseille.
 Barré, 7, pl. Percire, Paris.
 Ferrand, Clichy (Seine).
 24, bd Sébastopol, Paris.
 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
 12, rue Pavée, Paris.
 Zizine, 24, r. de Fécamp, Paris.
 14, rue des Pyramides, Paris.
 76, rue de Sèvres; Paris (VII^e).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 50, rue Nationale, Lille.
 13, rue Beudant, Paris (XVII^e).
 62, bd St-Germain, Paris.
 122, fg Saint-Honoré, Paris.
 196, r. de Paris, Montreuil-s.-
 Bois.
 60, rue de Monceau, Paris.
 20 bis, rue Sergent-Godefroy,
 Montreuil-s.-Bois.
 276, rue Lecourbe, Paris.
 31, bd de la Villette, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris (II^e).
 6, rue Robert-Estienne, Paris.
 31, bd de la Villette, Paris (X^e).
 33, Grande-Rue, Besançon.
 276, r. Lecourbe, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 60, route de Châtillon, Malakoff.
 37, r. des Lois, Toulouse.
 38, bd Bourdon, Neuilly-s.-S.
 4, villa Ornano, Paris.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 Ledent, Montreuil - sur - Mer.
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 60, rue de Monceau, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 58, bd Richard-Wallace, Pu-
 teaux (Seine).
 route du Mouleau, Arcachon.
 Guérande (Loire-Inférieure).
 51, rue Rennequin, Paris.

- Sektal Grémy
 *Selamon
 Seleniol
 Sels Clarks
 Sel D
 *Sels de Bains R. P.
 *Sel de Hunt
 *Sel d'Ewald
 *Sel digestif Bé Me Cé
 *Sélénol
 Sel hépatique U. N.
 Arquevaux
 Sels Heudebert (achlo-
 ruré et hypochloruré)
 *Sels Intar
 Sels du Jura
 Sels de lithine effe-
 vescents
 *Sels Mags
 Sels Marva
 Sels Montecatini
 Sels Na 4
 Sel de Salins-Moutiers
 *Selor
 Sels radioactifs Ra-
 diana
 Selsodion
 *Seluníc
 *Sel Vial
 Sel Vichy-État
 Sel Vital RX
 Sel Zem
 *Seneçonine
 Sénophile
 Séphydine
 *Septazine
 *Septicarbhone
 *Septicema
 *Septicémine Cortial
 *Septisan
 Septocarbhone
 Septolan
 Septometrol
 *Septoplix
 Septylase
 Séquardine Bouty
 Sérélbé
 *Sérénol
 *Séricrine Rey
 *Serifer Laurençon
 Seringue Léo (spéciale
 pour insuline)
 Sérípol
 Sérobel
 *Sérobiol
 34, rue Sedaine, Paris.
 10, rue Vignon, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 16 bis, rue Vivienne, Paris.
 Dupuy, à Montluçon (Allier).
 La Roche-Posay (Vienne).
 16, r. Boulainvilliers, Paris.
 105, r. de Normandie, Cour-
 bevoie.
 21, rue Violet, Paris.
 18, avenue Hoche, Paris.
 à Étampes (Seine-et-Oise).
 4, rue Lamartine, Nanterre.
 83, bd de la Villette, Paris.
 11, av. de l'Opéra, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 88, rue Duhesme, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris.
 Leurquin, Dreux (E.-et-L.).
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 3, rue de Vouillé, Paris.
 20, pl. de la Nation, Paris.
 46, rue des Faures, Bordeaux.
 1, av. Lowendal, Paris.
 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
 24, bd des Capucines, Paris.
 8, rue Dubrunfaut, Paris.
 85, rue Turbigo, Paris.
 1, r. Reynouard, Paris.
 17, rue de Berri, Paris.
 Chabeuil (Drôme).
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.
 22, rue des Martyrs, Paris.
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 60, rue Nationale, Castelnaudary
 4, rue Major, Pamiers.
 Laffort, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 41, av. Joffre, La Garenne.
 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
 157, r. Championnet, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 L. B. L., 18, r. Daguerre, Paris.
 25, rue Jamin, Paris (XVI^e).
 12, rue Montmartre, Dijon.
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 149, r. du Palais-Gallien, Bor-
 deaux.
 21, rue de Neuilly, Nanterre.
 L. B. L., 18, rue Daguerre, Paris.
 191, fg Saint-Antoine, Paris.

Sérocalcine*Sérocampbre****Sérocarbone****Séro-Citral****Séro-Collosol*****Séro-Comprimés I. M.*****Sérodausse*****Sérodausse Avarien*****Sérodausse infantile*****Séroglobine****Sérogène*****Sérolactyl I. M.****Séroléine*****Séro-liquide*****Séroma Rey*****Séro-Neuropsychique****Séroquinol****Séro-Sérum Rivier****Serosine Boullé****Sérosthényl Bouty****Séro-Vaccin Antipyo-
gène****Séroxamine*****Séroxéma****Serpoline*****Sérum antiasthmati-
que de Heckel****Sérum antiphymique
Vadam*****Sérum antityphoïdique
de Rodet****Sérum Collyre*****Sérum de Jousset****Sérum maternel****Sérum Névrosthénique
Fraisie****Sérum Nevrotone*****Sérum Oliviero*****Sérums Clin*****Sérums Pasteur****Sérum polymicrobien*****Sérum Polyvalent de
Leclainche et Vallée****Sérum sthénique*****Sérum végétal*****Servo-Freiny*****Seti****Setirtem****Sféol****S. I. A. V.****S. I. C.****Siccogyne****Siccol****Lab. Lorrain de produits purs,
Étain (Meuse).****G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).****72, rue Saint-Dominique, Paris.****1, av. de Villars, Paris.****116, bd Haussmann, Paris.****18, cours Suchet, Lyon.****4, rue Aubriot, Paris.****id.****id.****Aubery, Avignon (Vaucluse).****L. B. L., 18, rue Daguerre, Paris.****18, cours Suchet, Lyon.****C. Baron, Sables-d'Olonne.****18, cours Suchet, Lyon.****12, rue Montmarie, Dijon.****191, fg St-Antoine, Paris.****15, rue des Champs, Asnières.****10, passage Morel, Montrouge.****19, rue de la Porte-Trivaux,****Clamart (Seine).****3, rue de Dunkerque, Paris.****97, rue de Vaugirard, Paris.****62, r. Gioffredo, Nice.****1, rue de Phalsbourg, Paris.****78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.****Corbière, 27, rue Desrenaudes,
Paris.****(Voir : Antiphymique.)****36, q. Fulchiron, Lyon.****26, av. de l'Observatoire, Paris.****17, rue de Berri, Paris.****Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.****8, rue Jasmin, Paris.****12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Boulogne-sur-Seine.****20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.****36, r. du D^r-Roux, Paris.****36, r. Francs-Bourgeois, Paris.****97, rue de Vaugirard, Paris (VI^e).****78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.****19, r. des Chalets, Toulouse.****52, r. de Cambrai, Lille (Nord).****157, r. Championnet, Paris.****8, rue Passy, Paris.****15, r. Catulienne, St-Denis
(Seine).****8, av. des Sources, Nice.****P. Métadier, Tours.****41, av. Joffre, La Garenne
(Seine).****5, rue Robert-Planquette, Paris.**

- *Sicovaire
 Sicridine
 *Sidéranyl
 Sidérarsan
 Siforgia
 Sigbi
 Sigmoldine Grémy
 Sigmotal
 Sigol
 *Silguine
 Silicate de soude
 Pellissier
 *Silicyl
 *Siligone
 *Siliplastine
 *Silisode
 Sinahin
 Sinapisme Rigollot
 *Sinaplasme
 *Sinapol
 Sinagua Nutricia.
 *Sinaseptic
 Sinesol
 Sinrénalline
 *Sinusyl
 *Siphuryl
 Sirodion
 Sirop d'Aconit Ecalle
 Sirop antiasthmatique
 Favrot
 Sirop antiphlogistique
 de Briant
 Sirop d'Aubergier
 *Sirop au Solucamphre
 Sirop Bala
 Sirop béchique Maire
 Sirop Belca
 *Sirop Berthé
 Sirop Blagny
 Sirop de Blancard
 Sirop Blottière
 Sirop Bolla
 *Sirop Brahma
 Sirop Briant
 Sirop Richiard
 Sirop Britannia
 Sirop de Broméine
 Sirop bromoformique
 Henry
 Sirop Bronchophilos
 Sirop Brumauld
 89, rue Martre, Clichy (Seine).
 13, rue Beudant, Paris (XVII^e).
 52, rue de Cambrai, Lille.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 163, rue de Flandre, Paris.
 Delaunay, Joué-lès-Tours (I.-et-
 L.).
 14, rue de Clichy, Paris.
 5, rue de Stockholm, Paris.
 à Saint-Fons (Rhône).
 115, r. de Paris, Boulogne-sur-
 Seine.
 33, av. de Villiers, Paris.
 18, rue Ernest-Rousselle, Paris.
 47, av. de la République,
 Villeneuve-le-Roi.
 60, rue de Monceau, Paris.
 4 bis, r. du Colonel-Moll, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 13, rue Pavée, Paris.
 23, av. de Marlioz, à Aix-les-
 Bains.
 R. Renaud, Anould (Vosges).
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 197, av. de Versailles, Paris.
 44, av. Pasteur, Courbevoie.
 50, rue Nationale, Lille.
 33, rue du Bois, Vincennes.
 34, rue Sedaine, Paris.
 228, r. de Paris, Montreuil-s.-
 Bois.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 64, rue La Rochefoucauld, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 Brichard, Bar-le-Duc.
 171, rue de Belleville, Paris.
 Thévenot, rue des Roses, Dijon.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 85, r. Turbigo, Paris.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
 131, rue Vaugirard, Paris.
 23, bd R.-Poincaré, Bar-le-Duc.
 Labor. BERTHIER, Grenoble.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège (Bel-
 gique).
 6, rue Berbizey, Dijon.
 65, cours National, Saintes.

- Sirop Buci**
- Sirop Bungal**
- Sirop carbolique du D^r Vialle**
- *Sirop du D^r Canac**
- Sirop Carpeau**
- *Sirop Cassibor**
- Sirop Chauvin à l'Adréno-Ephédrine**
- Sirop Cbevassus**
- Sirop composé aux Hypophosphites Fellows**
- *Sirop Cophed**
- *Sirop de Créosote Vacheron**
- Sirop Debar**
- Sirop Delabarre**
- Sirop de Raifort iodé de Grimault**
- Sirop Derbecq**
- Sirop de digitale**
- Sirop Deroux**
- Sirop d'hypophosphite de chaux de Grimault**
- Sirop Diver**
- Sirop Drocot**
- *Sirop Dubois au Créosol**
- Sirop du D^r Dubreuil**
- Sirop Ducode**
- Sirop de Dusart**
- Sirop Dynamy**
- *Sirop Efryl**
- Siropeco**
- Sirop Escolle**
- *Sirop Eucalyptine**
- *Sirop Famel**
- Sirop de Fenouil**
- Sirop Ferret**
- Sirop ferrug. Laroze**
- Sirop France**
- Sirop C. Frany**
- Sirop Froment**
- *Sirop de Gaïarsol**
- Sirop Gelineau**
- Sirop Gelvart**
- *Sirop Géraudel**
- Sirop de Gibert**
- Sirop Gigon**
- *Sirop Girard**
- Comar, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- 145, av. Montredon, Marseille.
- 87, rue Lafayette, Paris.
- Port-de-Bouc, près Marseille.
- 102, av. Camille-Pelletan, Marseille.
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Aubenas (Ardèche).
- 6, rue Berbissey, Dijon.
- 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
- (Voir : *Cophed*.)
- 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
- Brichard, Bar-le-Duc.
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
- 8, rue Vivienne, Paris.
- 12, rue Cadet, Paris.
- 99, r. d'Aboukir, Paris.
- Vic-sur-Aisne (Oise).
- 8, rue Vivienne, Paris.
- 50, r. de la République, Puteaux.
- 83, bd de la Villette, Paris.
- 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
- 37, rue Galilée, Paris.
- P. Roche, Aigueperse (P.-de-D.).
- 8, rue Vivienne, Paris.
- Chavanne Fontaine, Grenoble.
- 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
- Lab. des Vosges, La Broque (Bas-Rhin).
- pl. Forbin, Aix (B.-du-R.).
- 5, rue de Lubeck, Paris.
- 16 à 22, r. des Orteaux, Paris.
- 21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
- Le Chapelain, Lambazellec (Finistère).
- 2, rue des Lions, Paris.
- 23, rue Beautreillis, Paris.
- 52, av. de la République, Paris.
- Bouyssou, Chambois (Orne).
- 3, rue de Dunkerque, Paris.
- 28, r. Velpeau, Antony (Seine).
- 24, rue Bagnolet, Paris.
- 3, rue Watteau, Courbevoie.
- 35, av. de Poissy, Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise).
- 25, bd Beaumarchais, Paris.
- 48, rue d'Alésia, Paris.

- *Sirop de glycérophosphates Vacheron
 *Sirop Gribell
 Sirop du D^r Hecquet
 Sirop Helgé
 Sirop d'Hémoglobine Byla
 Sirop d'Hémoglobine Star
 Sirops Henry
 *Sirops Henry Mure
 *Sirop Herceul
 Sirop Hinglais
 Sirop I. A. M.
 Sirop Iodacanit
 Sirop d'Iodéine
 Sirop Iodermol Vigier
 *Sirop Iodocalcium
 Sirop-Iodo-noyer
 Sirop iodotannique Guillermon
 Sirop Irsi
 Sirop Jackson
 Sirop Jane
 Sirop Jolivet
 Sirop Jovin
 Sirop Kérída
 Sirop de Kola Henry
 Sirop Koff
 Sirop Kopé
 Sirop de la Bonne Mère
 Sirop Lagasse
 Sirop de Lamouroux
 Sirop Lanchat
 Sirop Larphaud
 Sirop Laurin
 Sirop Lauzi
 *Sirop laxatif Gobey
 *Sirop Lecœur
 Sirop Lefeuvre
 Sirop Lex
 *Sirop de Lovel
 Sirop Magali
 Sirop du D^r Manceau
 *Sirop de la Maternité
 Sirop Mauchant
 Sirop Mignard
 Sirop de Mimotannin Iodo-phosphaté
 *Sirop minéral sulf. Crosnier
 *Sirop Mireille
 *Sirop Morlas
 Sirop Mory
 Sirop Négri
 Sirop Névra
- 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 19, rue Drouot, Paris (IX^e).
 49, bd Port-Royal, Paris.
 D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 26, av. Observatoire, Paris.
 7, r. Charlot, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 18, rue des Écoles, Paris (V^e).
 85, r. de Trignac, St-Nazaire
 Épernay (Marne).
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 19, av. d'Orléans, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 4, Ch. de la Muette, Paris.
 Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 140, fg Saint-Honoré, Paris.
 172, rue d'Alésia, Paris.
 37, rue des Lois, Toulouse.
 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 25, r. de Calais, Dunkerque.
 Gavin, Vimoutiers (Orne).
 8, rue Vivienne, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 Comtos, Feschés-le-Châtel (Doubs).
 12-14, rue Féry, Reims.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 GAVIN, Vimoutiers (Orne).
 18 et 20, rue Vavin, Paris.
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 43, av. Kléber, Paris.
 à Château-du-Loir (Sarthe).
 7, rue Galvani, Paris.
 Gennevilliers (Seine).
 29, bd Sébastopol, Paris.
 3, rue Bab-Azoun, Alger.
 44, rue de Lagny, Montreuil.
 Legendre, Houilles (S.-et-O.).
 Passage des Princes, Paris (II^e).
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 83, bd de la Villette, Paris.

[Sirop au Nitrite de soude Roussel

- *Sirop Noguès
- Sirop Nourry
- *Sirop de Papaine
- Sirop Patrat
- Sirop Pectiline
- Sirop pectoral Berstrand
- Sirop pectoral du D^r Pyot
- Sirop Pectoral Edulcor
- *Sirop pectoral Gobey
- Sirop pectoral Laënnec
- Sirop phéniqué Vial
- *Sirop Poléry
- Sirop Polybromuré Laroze
- Sirop polyiodure Gonnon
- *Sirop Prega
- Sirop Pulmophile
- Sirop Rabuteau
- Sirop Rambaud
- *Sirop Rami
- Sirop Ramos
- Sirop Rébillion
- Sirop du D^r Reinwillier
- Sirop Rhégia
- *Sirop Robin
- *Sirop Roche au thiocol
- Sirop Sédatif Bernhard
- *Sirop Sédatif Neurocalcium
- Sirop Sédatif Gobey
- Sirop Seillon
- Sirop Sentini
- Sirop de Sirtal
- Sirop de Sozopectone éphédriné
- Sirop de Sulfogaiacolate de Potasse du D^r Henry
- *Sirop Teyssedre
- Sirop Thébé
- Sirop Thomas
- *Sirop Tinardon
- *Sirop du vin de Vial
- Sirop tribromure Gignon
- *Sirop Vacheron au gaiacol
- Sirop Vauthier Marcq

10, rue Washington, Paris.

7, rue Galvani, Paris.

(Voir *Vin Nourry*.)

(Voir *Papaine*.)

61, rue de Seine, Paris.

37, rue des Lois, Toulouse.

Nomexy (Vosges).

pl. de l'Hôtel-de-Ville, à Salon-de-Provence.

19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.

89, rue du Cherche-Midi, Paris.

Moulins-sur-Yèvre (Cher).

8, rue Vivienne, Paris.

J. Fréchin, Lure (H.-S.).

2, rue des Lions, Paris.

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

(Voir *Capsules Préga*.)

pl. Forbin, Aix-en-Provence.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

20, r. Beaubourg, Paris.

44, r. Chaptal, Levallois-Perret.

7, rue Capeyron, Bordeaux.

6, rue Pas-de-la-Mule, Paris.

64, r. La Rochefoucauld, Paris.

145, av. de Montredon, Marseille.

13, rue de Poissy, Paris (V^e).

10, rue Crillon, Paris.

11, r. La Fayette, Paris.

19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).

89, rue du Cherche-Midi, Paris.

2, allées de Chelles, Le Raincy (S.-et-O.).

Domergue, Agen (L.-et-G.).

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

Chauvin, Aubenas (Ardèche).

Pruvost, Houplines (Nord).

74, fg d'Angoulême, Limoges.

56, r. St-Lambert, Marseille.

2, rue Volney, Paris.

17, rue Cadet, Paris.

36, place Bellecour, Lyon.

25, bd Beaumarchais, Paris.

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

98, rue du Chemin-Vert, Paris.

- Sirop Viano** 15, r. Catulienne, St-Denis, Seine.
Sirop Viète 163, rue de Flandre, Paris.
Sirop Zemmette 85, rue Turbigo, Paris.
Sirtal 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
Sistobyl Delaunay, Joué-les-Tours (I.-et-L.).
***Sistomensine Ciba** 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
S. I. V. A. Immunos, av. des Sources, Nice.
***Sodamine** 22, rue des Martyrs, Paris.
Sodamyl Legras, à Avranches (Manche).
***Sodergyl** A. Mironneau, Pharm., Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
***Soderséine** 18, rue de Beaune, Paris.
***Sodésyl** Vierzon (Cher).
***Sodisalyne** (Voir *Néo-Satyl*).
Sodocalcine 27, r. des Batignolles, Paris.
Sodogastrol 85, cours Alb.-Thomas, Lyon.
***Sodolactine** 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
Sodorose 64, bd Voltaire, Paris.
Sodotétrane 41, av. Joffre, La Garenne.
***Sodothioli** Lab. de médecine expérimentale, Beauvais.
Softol 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
***Soja « Soyolk »** 25, rue du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
Solacitrine 47, rue Maleret, Bordeaux.
Solargol 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
***Solarsal** 6, rue des Dames, Paris.
Sol-Bi-Fraisse 8, rue Jasmin, Paris.
***Solhermol « Mètère »** 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-S.-S.
Solicide 94, rue Michelet, Alger.
Solmuth 14, r. A.-Briand, Levallois (Seine).
Solubaine Nativelle 27, rue de la Procession, Paris.
***Solubéol** 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
***Solucalcine** 5, bd Montparnasse, Paris.
***Solucamphre Delalande** 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
***Solucamphre spartéiné Delalande** id.
Soludex Plonneau, Vayres (Gironde).
***Soluphédrine** 11 bis et 13, r. Levert, Paris.
Solu-Plastol 10, r. du Plâtre, Paris.
***Soluprotine Roche** 10, rue Crillon, Paris.
Solurase 71, r. du Fort, Aubervilliers.
Solurol 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
***Soluseptazine** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
***Solusoufre Labocip** 19, bd du Parc, Neuilly-s.-Seine.
Soluté Gaube du Gers 177, r. de Courcelles, Paris.
Soluthanol 22, rue de Turin, Paris.
Solution de Bi-phosphate de chaux Arsac, Montélimar (Drôme).
Solutions Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Solution Coirre 5, bd Montparnasse, Paris.
Solution Cunaud pl. du Marché, La Rochelle.
***Solution du D^r Jacobson** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
***Solution du D^r Watelet** 15, av. Parc-Montsouris, Paris.

- Solution Fumouze**
Solutions Mercurielles du D^r Lafay
Solution Henry Mure
 * **Solution Hepatoum**
 * **Solution huileuse au Nestosyl**
Solution Laroyenne
 * **Solutions Normet**
 * **Solution Pautauberge**
 * **Solution Quinquina Bardet**
Solution salicylate Henry
 * **Solution Schoum**

Solution Talon
 * **Solution Tisch**
Solution Valens
Solutol
Solvant Ana
Solvochine
Solvosclérose
Solvurène
 * **Solvuric**
Somnalone
 * **Somnicônes**
 * **Somnifène Roche**
Somnitis
Somnoblol
Somnopol
 * **Somnothyrid**
 * **Sonagar**
 * **Sonamel**
 * **Sonène**
 * **Soneryl**
Sonomalt
 * **Soporalose**
 * **Soporigène**
Soporine
 * **Sorbocalcion**
Sornyal
Sorol Churchill
Source Marie-Christine
Sous-Nitrate de Bis-muth Tulasne pur
 * **Soutensa**
Sparablanc
Sparaplast Fournier
Spartédrine
 * **Spartéine Houdé**
 * **Sparto-Camphre**
 * **Spartophédrine Béral**
Spartoval
 * **Spasa**
Spasalgique
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
 54, Chaussée-d'Antin et 69, rue de Provence, Paris.
 à Annonay (Ardèche).
 150, r. de Paris, Pantin (Seine).
 72, rue St-Dominique, Paris.
 7, bd Denain, Paris.
 10, rue Vignon, Paris.
 10, r. de Constantinople, Paris.
 76, rue de Sèvres, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
 15, r. de la Sablière, Bécon-les-Bruyères (Seine).
 153, bd Montparnasse, Paris.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 52, rue Decamps, Paris.
 22, fg Saint-Michel, Angers.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
 201, fg Saint-Denis, Paris.
 place Forbin, Aix-en-Provence.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 J. VINCENT, Ancenis (L.-I.).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 Lyons, 30, rue Monge, Paris.
 Lab. Elsse, Fontaine, Grenoble.
 80, rue du Rocher, Paris.
 Cantin, Palaiseau (S.-et-O.).
 20, bd Heurteloup, Tours.
 id.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 128, rue du Mont-Cenis, Paris.
 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 58-60, r. des Moulins, Valence.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 12, rue Castiglione, Paris.
 Le Breuil-sur-Couze (P.-de-D.).
 48, bd des Batignolles, Paris.
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 Sauter, à Bellegarde (Ain).
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 Lab. Sauter, Montreuil (Seine).
 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 194, rue de Rivoli, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 90, av. de Saint-Ouen, Paris.

- *Spasédol 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
- *Spasmacol 41, r. de Rome, Paris.
- *Spasmalgine Roche 10, rue Crillon, Paris.
- Spasmalgol R. Renault, Anould (Vosges).
- *Spasmalone J. Vincent, Ancenis (L.-I.).
- *Spasmine Jolly 1, rue Christine, Paris.
- *Spasmocalcyl 52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
- *Spasmo-florine 38, rue du Louvre, Paris.
- Spasmolyse 24, av. de Chatillon, Paris.
- *Spasmonal 13, pl. Delille, Clerm.-Ferrand.
- *Spasmoneural 239, cours de l'Yser, Bordeaux.
- Spasmoryl 18, av. Daumesnil, Paris.
- *Spasmosédine 15, bd Pasteur, Paris.
- Spasneurol 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
- Spécialités de Brides 46, rue Pierre-Charron, Paris.
- Spécialités Valentin-Chaillot 27, rue Planchat, Paris.
- Spécific Brachat Livry-Gargan (S.-et-O.).
- *Spécifique Bejean 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Spécifique Eldé 24, r. Paul-Bert, Paris.
- *Spécifique Lancelot 100 *ter*, av. Saint-Mandé, Paris.
- Spécifique Mignard 29, av. Charras, Clerm.-Ferrand.
- Spécifique Rousset 9, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
- *Spectrol 9, rue Paul-Baudry, Paris.
- Sphérulines - Moncour 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- (Voir : *Opothérapie*.)
- Sphygmine 109, rue de Sèvres, Paris.
- Spicanol 54, rue de Sablonville, Neuilly-sur-Seine.
- Spirobismol 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
- *Spirochtan 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- *Spirogyl 5, rue Paul-Barruel, Paris.
- Splénamine 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Splénarmcne 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Splénique (Extrait du 8 et 10, rue Alphonse-Bertillon, Paris.
- D^r Bayle)
- Splénocarbine 88, rue Duhesme, Paris.
- Splénocrinol 107, rue des Dames, Paris.
- *Splénocrisines 7, rue Biscornet, Paris.
- Splénodose 47, rue de Neuilly, Nanterre.
- *Splénogastrine 14, rue des Minimes, Paris.
- Spléno-Magnésium 83, bd de la Villette, Paris.
- *Splénomanganol 191, fg Saint-Antoine, Paris.
- *Splénomédulla Lab. Chaix, 8 et 10, r. Alph.-Bertillon, Paris (V^e).
- Splénora 1, r. Paul-Bert, Angers.
- Splénose 163, rue de Flandre, Paris.
- Splenotanic 14, rue Clichy, Paris.
- *Splényl 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Spyrolides 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Stabilisine Salesse, Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze).
- Stabylacto Chatelain pl. des Halles, Niort (D.-S.).
- Stabyne 62, r. de Paris, Villejuif (Seine).
- *Stadrhine 26, rue des Moines, Paris.
- *Stal-Kosal 62, bd Jaurès, Boulogne-s.-S.
- *Stalysine 42, rue Docteur-Blanche, Paris

- *Stanion 18, av. Hoche, Paris.
 *Stanno-Bardane Henry 39, rue Sclessin, Liège.
 Stannolip Henry id.
 *Stanno-Sufrol Gros-
 nier 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
 *Stannoxy 1, av. de Villars, Paris.
 Staphydex 4, ch. de La Muette, Paris.
 *Staphylagone 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 *Staphylase du D^r Lebeault, Bessin et C^{ie}, 5, rue
 Doyen Bourg-l'Abbé, Paris.
 Staphylocide Audras 112, rue de Gerland, Lyon.
 *Staphylo-coccine Fra-
 quet 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 Staphylophage 10, rue Vignon, Paris.
 Staphyloplast Fournier, Dijon.
 *Staphylotanol 22, rue de Turin, Paris.
 *Staphylo-Vaclydun 27, rue Desrenaudes, Paris.
 *Straprolysat 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 Staréol Dupraz 41, rue Étienne-Marcel, Paris.
 *Stavafer 45, fg Saint-Denis, Paris.
 *Stéarol 5, r. Em.-Combes, St-Étienne.
 Stechlovules 58, rue de Maubeuge, Paris.
 Sténacrine 95, rue de Vaugirard, Paris.
 Stenergine 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 *Sténic A. Cousin, Estissac (Aube).
 Stenobiose D^r Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 Sténofer Lumière 45, rue Villon, Lyon.
 Sténogénine Mouflet, Chennebrun (Eure).
 Sténol Chanteaud 3 et 5, rue Alex.-Dumas, Saint-
 Ouen (Seine).
 Stenon du D^r Gelm D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 Stenophos 74, rue de Lourmel, Paris.
 Sténophyl Vigan 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 Stéracholine Delaunay, Joué-lès-Tours (l.-et-l.)
 *Stéramine 42, rue Thiers, Le Havre.
 *Stérandryl 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 Stérarsinol Delaunay, Joué-lès-Tours (l.-et-l.)
 Stérasmine id.
 Stérédrine id.
 Stéridrophil Wuhrlin à Houdouville (Eure).
 *Stérigyne (Voir *Ovules Stérigyne*).
 Stérilait 10, rue Cardinal-Mercier, Paris.
 Stérinase Vincent 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 Sternol 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
 Orge (Seine-et-Oise).
 *Stérogyl 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 *Sténobiose G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 Sténophos 74, rue Lourmel, Paris.
 Sthénoléine 2, r. Cl.-Matrat, Issy-les-Mouli-
 neaux.
 *Sthénoxal 47, rue Bokanowski, Asnières.
 Stibyal 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Sticplast 3, rue des Reculettes, Paris.
 *Stillargol 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 *Stimulaxine Bartier, Armentières (Nord).
 Stimyl Falque, Besançon.
 *Stinergyx 6, rue de Dunkerque, Paris.

Stock-Vaccin	Bovy-	10, rue Drouot, Paris.
Cantonnet		Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Stomachine		14, rue E.-Delacroix, Paris.
Stomacol Boulet		21, rue de Neuilly, Nanterre.
Stomacurine		143, c. de la Somme, Bordeaux.
Stomagyl		58, bd R.-Wallace, Puteaux
Stomal		(Seine).
Stomalex		14, rue Demarquay, Paris.
Stomalise		Bedeil, Lavelanet (Ariège).
Stomalumine		84, rue de l'Aqueduc, Paris.
* Stomarol		4, rue Platon, Paris.
Stomasalvine		Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Stomasédine		48, r. de Flandre, Le Bourget.
Stoméol		99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
* Stomobrol		Place Carnot, Romainville.
Stomolan		155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise).
Stomophile		17 bis, av. Parmentier, Paris.
Stomoxygène		2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, à Saint-Quentin.
Stomytéol		Vignal, Périgueux.
* Stopral		47, rue Bokanowski, Asnières.
Stosédol		52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
Stovaine Billon		21, rue Jean-Goujon, Paris.
* Stovarsol		id.
* Stovédrine		38, bd Bourdon, Neuilly-s.-S.
* Stovoléine		(Voir <i>Studrhine</i> .)
Stovoquine		21, rue Jean-Goujon, Paris.
* Stragol Merlet		24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
* Streptoderme		25, rue du Gal-Foy, Paris.
Strepto-Vaclydun		27, rue Desrenaudes, Paris.
* Strictoforme Dausse		4, rue Aubriot, Paris (IV ^e).
* Strongenol		199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
* Strontiode		19, rue du Bac, Paris.
Strophantal		Lab. Elsse, Fontaine, Grenoble.
* Strophantine et Stro-		
phantus Catillon		3, bd Saint-Martin, Paris.
Strophantine Houdé		9, rue Dieu, Paris.
* Stry-Calcium Aguet-		
tant		36, quai Fulchiron, Lyon.
* Strychnal Longuet		34, rue Sedaine, Paris.
Strychnan		10, r. de Strasbourg, Paris.
* Strychnarsitol Robin		13, rue de Poissy, Paris.
Strychnine Houdé		9, rue Dieu, Paris.
Strychno-Cacodyl		21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
Strychno Gardenal		21, rue Jean-Goujon, Paris.
* Strychnophyl		74, rue Lourmel, Paris.
* Strychnotonine		25, bd de La Tour-Maubourg, Paris.
* Stupho		38, rue Mainguy, Bondy (Seine).
* Subtensène		2-4, place Gambetta, Paris.
Succharure Leprince		62, rue de la Tour, Paris.
Succomusculine		8-10, r. Alp-Bertillon, Paris.
Suc-Durham		Mauchant, Gennevilliers (Seine).
Suckine		12, av. Stéphane-Mallarmé, Paris.
Suc Normand		Chartier, Saumur (M.-et-L.).

- *Sucre Edulcor Ferré 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
 *Sucs organiques Ba- (Voir *Opothérapie Bazin*.)
 zin
 *Sucre « Vita D » 40, rue François-I^{er}, Paris.
 Suc Simon Chalon-sur-Saône.
 Sudyl Roberts 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 *Sufrol Crosnier 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
 *Suiseryl 97, rue de Vaugirard, Paris.
 Sulcichlorine 47, rue Maleret, Bordeaux.
 Sulfa ampoules Sté Pyrne, Cauterets (Htes-P.).
 *Sulfagone 54, fg St-Iionoré, Paris.
 *Sulfan Dalayeu, Sannois (S.-et-O.).
 Sulfarène (Lab. du), à Agen.
 *Sulfarsénol 19-21, rue Van-Loo, Paris.
 Sulfarsinol Lefèvre 52, rue Decamps, Paris.
 *Sulfarsiodé 11, quai St-Clair, Lyon.
 Sulfate d'Atropine Clin 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 Sulfate de quinine Léo 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 *Sulfex 13, rue du D^r-Mazet, Grenoble.
 *Sulfhedral Chanteaud 3-5, r. A.-Dumas, Saint-Ouen
 (Seine).
 Sulfinhal 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
 Sulfo-benzol 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 *Sulfobiol Aqueuttant 36, quai Fulchiron, Lyon.
 Sulfo-Bore Roy 81, bd Suchet, Paris.
 *Sulfobyl 3-5, r. A.-Dumas, St-Ouen
 (Seine).
 Sulfocadol 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 *Sulfocaïne Fayès 3, rue d'Alexandrie, Paris.
 *Sulfocalcyl 29, av. Charras, Clermont-Fd.
 Sulfocol M. Godart, Andenne (Belgique).
 *Sulfocrème Liless Fisch, Mer Rouge (Mulhouse).
 *Sulfodermol Flahaut, 74, r. Monge, Paris.
 *Sulfoidol Robin 13, rue de Poissy, Paris.
 *Sulfolax 22, rue des Martyrs, Paris.
 Sulfol Charlard 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Sulfoléine Rozet à Vendôme (Loir-et-Cher).
 Sulfoline 78, bd des Batignolles, Paris.
 *Sulfolive 19, rue de Pontevès, Marseille.
 Sulfo-Mésarca Roche 10, rue Crillon, Paris.
 Sulfo-Perless 26, rue Friant, Paris.
 Sulforéon 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-
 Nord).
 *Sulforgan 16, rue de Gramont, Paris.
 *Sulfo-rhinol Fayès 3, rue d'Alexandrie, Paris.
 *Sulfosalyl 14, av. Perrichont, Paris.
 *Sulfosine Léo 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 Sulfostan Cavallès, 29, r. Singer, Paris.
 Sulfoterpine B.-F. Delaunay, Joué-lès-Tours
 (I.-et-L.).
 Sulfoterpinol Chenu, Montferrand (P.-de-D.).
 *Sulfo-Thiorine 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 Sulfo-Tréparséan 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 *Sulfoxal 48, rue Claude-Lorrain, Lille.
 *Sulfoxyl Novalis, Oullins (Rhône).

- Sulfoxyne**
***Sulfur concentré Dax**
***Sulfureux Pouillet**
***Sulfurine du D^r Langlebert**
***Sulfurion**
***Sulfuryl Monal**
Sulf-Y
- *Sulfpène**
Sulhyp
Sulphaqua Pépin
Sulphénine Trouette
Sulphium
- *Sulsod**
***Sunalcol**
Suniforme
***Sunoxidon**
***Sunoxol**
Super-digestif
Supernucléine Legrand
Superol
***Suppabaine**
- *Suppargyres du D^r Faucher**
Supparsol
***Suppoalgos Lagoutte**
Suppo-Anestaline
Suppo Bil Olive
***Suppocamphryl**
Suppo-cuivrol
***Suppo-Eurinase**
***Suppoglandines**
***Suppo-Gynals**
***Suppo-Kélédol**
Suppol
***Suppolive**
***Supponéryl**
***Suppopirine Séclo**
***Suppopulmos**
***Suppoquinol**
Supporhoïdes
***Suppo-Sédol**
***Suppositoires Almine Louveau**
***Suppositoires Amibiasine**
Suppositoires Anucalm
Suppositoires Anugéol
***Suppositoires au Nestosyl**
Suppositoires Bébia
Suppositoires Cabanès
***Suppositoires Calmo-pelvine**
- Bouvol, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
 Morellet, à Bagnoles-de-l'Orne.
 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris.
- 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 13, av. de Ségur, Paris (VII^e).
 Salavert, Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).
 39, r. de Reims, Vichy.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 116, bd Haussmann, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 Brisson, 157, rue Championnet, Paris.
 56, rue Beaubourg, Paris.
 145, bd Haussmann, Paris.
 11, rue de la Station, Asnières.
 145, bd Haussmann, Paris.
 id.
 96, rue Monge, Dijon.
 id.
 5, r. Newton, Paris.
 2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes.
- 34, bd de Clichy, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 19, rue de Pontevès, Marseille.
 85, cours Al.-Thomas, Lyon.
 Matray, Aubières (Puy-de-D.).
 (Voir *Eurinase*).
 84, rue Rochechouart, Paris.
 127, bd Saint-Michel, Paris.
 114, rue Solférino, Lille.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 19, rue de Pontevès, Marseille.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 6, r. Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 3, pl. Thiers, Le Raincy (S.-et-O.).
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 98, rue de Sèvres, Paris.
- 78, bd des Batignolles, Paris.
- 69, r. de Wattignies, Paris.
 21, rue de Lyon, Paris.
 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
- 72, rue Saint-Dominique, Paris.
 5, av. E.-Boissier, Nantes.
 17, rue Cadet, Paris.
- 192-194, r. St-Denis, Paris (II^e)

- *Suppositoires Calmo-**
varine 192-194, r. St-Denis, Paris (II°).
***Suppositoires de Cam-**
phocalyptol 26, rue des Moines, Paris.
***Suppositoires Chau-**
mel 78, fg Saint-Denis, Paris.
Suppositoires Collu-
drol r. des Étuves, Montpellier.
***Suppositoires Corbière** 27, rue Desrenaudes, Paris.
Suppositoires Éon 3, r. des Rouairies, Dinan.
***Suppositoires Eucalyp-**
tine 5, rue de Lubeck, Paris.
Suppositoires Gonnon 74, rue Victor-Hugo, Lyon.
***Suppositoires Hymel** 90, av. de St-Ouen, Paris.
***Suppositoires Inséva** (Voir *Pommade Inséva.*)
Suppositoires Lagoutte 85, cours Al.-Thomas, Lyon.
Suppositoires Lama-
line
Suppositoires Lemary Affre, Saint-Mandé (Seine).
***Suppositoires Logeais** 36, quai Fulchiron, Lyon.
 22 bis, 24, r. de Silly, Boulogne-
 s.-Seine.
Suppositoires Hg du 14, rue A.-Briand, Levallois-
D^r Lafay Perret.
Suppositoires anti- Manor, St-Germain-au-Bois (S.-
hémorroïdaux et-L.).
***Suppositoires Mictasol** 5, rue de Lubeck, Paris.
***Suppositoires Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
***Suppositoires Pachaut** 130, bd Haussmann, Paris.
***Suppositoires Pautau-**
berge 10, rue de Constantinople, Paris.
***Suppositoires Pepet** 56, bd Pereire, Paris.
***Suppositoires Pyrax** Chavialle, 70, Gde-Rue, Sèvres
 (S.-et-O.).
Suppositoires Reys 21, r. de la Gare, La Broque (B.-
 Rhin).
Suppositoires Rocav 116, bd Haussmann, Paris.
Suppositoires Royer 223, rue Saint-Martin, Paris.
Suppositoires Sféat 15, rue Catulienne, Saint-Denis.
***Suppos-Sédabios** 8, rue Saint-Martin, Paris.
***Suppothermos** 85, cours Al.-Thomas, Lyon.
***Suppotonic** id.
Suppo-Vaccin Salan-
tale 42, r. Gdes-Arcades, Stras-
 bourg.
Suppo-Zinol 37, rue Brochant, Paris.
Suprarénidine G.-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Suprasthényl 33, r. Barthou, Angoulême (Ch^{te}).
***Supravéna** Aliments équilibrés Joly, Bourg-
 la-Reine (Seine).
Suractivase 122, rue du Cherche-Midi, Paris.
Suralimentine Rolland 41, rue d'Amsterdam, Paris.
***Surbical** 42, rue Mont-Cenis, Paris.
Suriodinine 52 r. Blanc-Dutrouilh, Bordeaux.
Surlax 24, bd Sébastopol, Paris.
***Suroxydal** Lab. C. Le Follet, Nozeroy (Jura).
***Surparine** 66, r. de la Pompe, Paris.
***Surpaver** 245, r. de Vaugirard, Paris.
***Surrasthénine** 26, av. Observatoire, Paris.

- Surrénale - Endocri-**
sines Fournier
Surrénaline Bouty
Surrénine
Surrénotanin Grémy
Suryali
***Sylcase**
Sylvinhalant
Sylvol
Sylvor
Sympaneuro
Sympaséda
***Sympathocrine**
Sympathomine
***Sympathorine**
***Sympathyl**
Sympatonyl
***Sympax**
Syncaïne Clin
***Synchrones Choay**
Synergyl Vadam
Synthaline B.
***Synthéma**
Synthol
***Syntropan Roche**
Syphonéol
***Syséros**
- 7, rue Biscornet, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 Orga, Avignon (Vaucluse).
 14, rue de Clichy, Paris.
 50, rue de Turenne, Paris.
 7, rue Saint-André, Le Mans.
 16 bis, rue Dufrénoy, Paris.
 46, rue Pierre-Charron, Paris.
 4, quai Pasteur, Sète.
 15, rue Corneille, Lille.
 130, bd Murat, Paris (XVI^e).
 37, rue Brochant, Paris.
 1, r. du Puits-de-l'Ermite, Paris.
 21, Gde-Rue, Montfermeil.
 26 bis, rue Dombasle, Paris.
 44, rue d'Inkermann, Lille.
 191, r. du Fg-St-Antoine, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 13, rue Miollis, Paris.
 25, bd Latour-Maubourg, Paris.
 3 à 9, rue de l'Abreuvoir, Boulogne-sur-Seine.
 10, rue Crillon, Paris.
 Baude, Saint-Aubert (Nord).
 18, rue des Écoles, Paris.

T

- Tabedo**
***Tablette Perroud**
Tablettes Boval
Tablettes Enurésan
***Tablettes Gelok**
***Tablettes Hova**
Tablettes oxymenthol
Perraudin
Tablettes de Phospharsol
Tablettes Renard
***Tablettes Robin**
Tablettes de thyroïde
Tablettes Vych'Edulcor
***Tablettes Zeva**
Tacia
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
 Dehay, Arras (P.-de-C.).
 Kuntzmann, Ribeaupillé (Ht-Rh.).
 (Voir *Gélok*).
 92, rue Bobillot, Paris.
 Lab. Scientia, 21, rue Chaptal, Paris.
 17, rue Rochechouart, Paris.
 Giban, à Sens (Yonne).
 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
 3, bd St-Martin, Paris.
 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
 60, cours Émile-Zola, Lyon.
 15, rue du P^t-Wilson, Gentilly (Seine).

- *Tachygastrine Ducloy Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.) ·
Tachysmuth 89, av. Wagram, Paris.
- *Tænifuge Bardet 76, rue de Sèvres, Paris.
- *Tænifuge Castel 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
- Tænifuge des Dames 119, rue de Sèvres, Paris.
- de France 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).
- *Tænifuge du D^r Du-hourcau
- *Tænifuge du D^r Jacquème
- Tænifuge Ercé
- *Tænifuge Kirn
- *Tænifuge Larix
- Tænifuge Limousin
- Talcazone
- *Tamar Indien Grillon
- *Tamarine
- *Tampol Roche
- Tampons Alsas
- Tampovules Corbière
- Tanacétyl Clin
- Taniglane
- Tanisol
- Tannarsol
- Tanno-Bismuth
- *Tanno-Calciue
- *Tannurgyl
- Tanode
- Tanosal
- *Tapo
- Tarbisol
- Tartrate Borico-potas-sique du D^r Gigon
- *Tartrate Borico-potas-sique Pachaut
- *Tartroborol
- Taxobyl
- *Taxol
- Tébéphaguine
- Tégéol
- *Teinture de Cocheux
- Téja
- Ténébryl
- *Tensédine
- Tensiofuge
- Tensiorex
- *Tensol Laurençon
- Tensopan
- *Tensoryl
- Teperos
- *Terbinthiol Thomas
- Tercinol
- Terco
- *Tercodal
- Tercolène
- Térébane
- Chiarini, Aix-en-Provence.
- 1, av. de Villars, Paris.
- 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- 20, rue Thiers, Tarbes.
- 202 bis, r. de Paris, Clamart.
- 42, rue de Thiers, Le Havre.
- Darrasse, 13, r. Pavée, Paris.
- 4, route de Médoc, Le Bouscat (Gironde).
- 10, rue Crillon, Paris.
- 1, rue Griffon, Lyon.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 33, rue Barthou, Angoulême.
- 119, r. de Noisy, Les Lilas.
- 119, rue de Sèvres, Paris.
- 62, r. de Paris, Villejuif (Seine).
- 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- 87, av. Borriglione, Nice.
- 62, r. de Paris, Villejuif (Seine).
- Feigel, à Lutterbach (Ht-Rhin).
- 14, rue Miromesnil, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 25, bd Beaumarchais, Paris.
- 130, bd Haussmann, Paris.
- 18, rue des Écoles, Paris.
- 15, r. Pasteur, Bourg (Ain).
- 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
- 11, Ch. de la Muette, Paris.
- 11, rue de Clichy, Paris.
- 36, quai Fulchiron, Lyon.
- 50, r. des Ferrats, Marseille.
- 22, rue du Landy, Saint-Ouen.
- 13, av. de Ségur, Paris.
- 39, r. de Reims, Vichy.
- 84, rue de l'Aqueduc, Paris.
- Villefranche-sur-Saône (Rhône).
- 139, av. Émile-Zola, Paris.
- 52, bd du Temple, Paris.
- 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
- 33, fg Montmartre, Paris.
- 247 bis, r. des Pyrénées, Paris.
- 239, fg Saint-Honoré, Paris.
- 14, rue Demarquay, Paris.
- Mauchant, Gennevilliers (S.).
- 59, bd Lefebvre, Paris.

- Térébthine**
Térébules Gallier
Tergyl Lamo
***Terkal Monal**
Ternose Trouette
Térozone
Terpène iodé
Terpine Boveil
Terpine Cailleux
Terpine du Mezenc
Terpine Duval
***Terpine Gonnon**
***Terpine granulée**
Baron
Terpinol Adrian
Terpoflor
Terpopneumol

***Terpoxyl interne et**
externe, ovules
Tersol
Teskrine
Testicule - Endocrisi-
nes Fournier
Tetra magnesium
***Tétranitrol Roussel**
Tétrasulfol Vigier
Thalaphyl
Thalassotonine Vadam
***Thaolaxine**
***Thébail**
Thé d'Albret

Thé de l'Emyrne
Thé Evine
***Théinol Bailly**
***Théïsine Dubat**
Themsaline
Théobromine Guillau-
min
Théobromine Houdé
***Théobromine Invar**
Théobromine Vicario
***Théobromose**
***Théobryl Roche**
Théocalciode
***Théocardine Laleuf**
Théocrinol
***Théophylline Bruneau**
***Théophylline Carena**
Théosalvine
***Théosalvose**
***Théostène scillitique**

***Théostène simple**
Théovadil
***Théovérine Laleuf**
- 1, bd de la Madeleine, Marseille.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 52, rue de Crimée, Paris.
 13, avenue de Ségur, Paris (VII^e).
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 62, rue d'Antibes (Cannes).
 86, r. de Varenne, Paris.
 9, pl. des Terreaux, Lyon.
 Parmain (S.-et-O.).
 Cellier, Roanne (Loire).
 Lab. Elsse, Fontaine-Grenoble.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.

 74, rue Monge, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 26, rue Petrelle, Paris.
 Huyghe, Brazey-en-Plaine (C.-
 d'Or).

 Jolly, 1, rue Christine, Paris.
 32, r. Carnot, Beaune (C.-d'Or).
 89, Grande-Rue, Sens (Yonne).

 7, rue Biscornet, Paris.
 45, r. du Marché, Neuilly.
 10, rue Washington, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Bouttet, à Ruffec (Ch.-Inf.).
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 15, r. des Champs, Asnières.
 7, rue Galvani, Paris.
 295 bis, r. de la Bénauge, Bor-
 deaux.
 151, rue Saint-Maur, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 15 et 17, rue de Rome, Paris.
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 92, rue Bobillot, Paris.

 3, rue du Cherche-Midi, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris (IV^e).
 10, rue Crillon, Paris.
 12, rue Henner, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris.
 33, av. de Villiers, Paris.
 17, rue de Berri, Paris.
 39, bd La Tour-Maubourg, Paris.
 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 id.
 47, av. de la République, Ville-
 neuve-le-Roi.
 id.
 85, r. des Morillons, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

- *Théoxanthine
 *Théramine
 Thermalgol

 Thermaseline
 Thermo-bloc
 Thermocédone
 Thermo-Vicardine
 Thé Suédois

 Thiesdyne
 *Thigénol Roche
 *Thi-Lip Aguetant
 *Thiobyl Bourcet
 *Thiocitran
 *Thiocol Roche
 *Thiodacaine Midy
 *Thiodérazine Midy
 *Thiofène Robin
 *Thio-Goudron
 Thiokéine
 *Thionaiodine A et B

 Thionoïadine (Com-primés de)
 Thionaphte
 Thionhydrol Grémy
 *Thiopheol Inava
 *Thiophyl
 Thiophytol
 Thiorubrol
 *Thiosédal
 Thiosinamine Cognet
 *Thiosote-Lambiotte
 Thiosyl
 Thio-terpine Dalin
 *Thioxyol
 *Thorix (Thorium X Rhemda)
 Thoroxyl
 Thylargol
 *Thyméphédrine

 Thymétol
 Thymobrol

 Thymo-Mentol Eup-nique
 Thymophtytine
 Thymoseptol
 Thymoseptyl
 Thymus - Endocrisines Fournier
 Thymoseptol
 Thymine
 Thymol doré
 Thymoléine
- 15, bd Pasteur, Paris.
 50, rue Nationale, Lille.
 Deodax, R. Renaud, Arnould (Vosges).
 62, Champs-Élysées, Paris.
 Gaudichard, Châtellerault.
 11, rue Lepic, Paris.
 15, r. du Commerce, Riom.
 Herin, 98, rue Jeanne-Mailotte, La Madeleine (Nord).
 56, rue des Dames, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 7, av. du Doyenné, Lyon.
 21, rue des Roses, Dijon.
 10, rue Crillon, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 id.
 13, rue de Poissy, Paris.
 Cébé, St-Just-sur-Loire.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 id.
 9, pl. Municipale, Tulle.
 14, rue de Clichy, Paris.
 14, r. de Normandie, Asnières.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 Mer Rouge, Mulhouse.
 79, rue de Paris, Saint-Denis.
 43, rue de Saintonge, Paris.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 M. Berger, à Orléans.
 1, rue de la Martinière, Lyon.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 51, rue d'Alsace, Courbevoie (S.).
 40, rue de Bellechasse, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 7, rue de la République, Puteaux (Seine).
 77, bd de Grenelle, Paris.
 Lab. des Vosges, La Broque (Bas-Rhin).
 13, rue de Rivoli, Paris.
 12, r. de Strasbourg, Paris.
 117, r. V.-Hugo, Houplines (N.).
 2, rue des 3-Mages Marseille.
 7, rue Biscornet, Paris.
 M. H. Pruvost, Houplines (N.).
 11, ch. de la Muette, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 Abou, 26, rue Temple, Paris.

- Thymusine Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Thyratoxine Byla id.
***Thyrénine Grémy** 14, rue de Clichy, Paris.
***Thyrocréine Grémy** id.
Thyrodose 47, rue de Neuilly, Nanterre.
Thyro Gardenal 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Thyrogueine Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
Thyroïde - Endocrisi-
nes Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
***Thyroïde Léo** 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
Thyroidine Bouty 3, rue de Dunkerque, Paris.
Thyroidine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
Thyroidine Flourens 62, rue Notre-Dame, Bordeaux.
Thyroidine Gory 7 bis. r. Gen.-Galliéni, Montreuil.
Thyroidine Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
Thyrol A 107, rue des Dames, Paris.
Thyroxine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
***Thyroxine Roche** 10, rue Crillon, Paris.
Tiliane Lacaze, Amélie-les-Bains (P.-O.).
Tilleul Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
Tinctiode 1, av. de Villars, Paris.
Tinga Rhino-Bismuth 70, r. Carnot, Stains (Seine).
***Tiodine Cognet** 43, rue de Saintonge, Paris.
Tisane Anticolibacil-
laire Lesourd 88, rue Duhesme, Paris.
Tisane Bala Brichard et fils, Bar-le-Duc.
Tisane Borkou 69, av. du Maine, Paris (XIV^e).
Tisane Cisbey 12, bd Saint-Martin, Paris.
Tisane de Maraisa Lab. Lorrain, à Étain (Meuse).
Tisane dépurative de
Cavaillès
Tisane Ferlys 29, rue Singer, Paris.
***Tisane hépatique** 59, rue Boissière, Paris.
Dausse
***Tisane hépatique La-**
haye 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

Tisanes Lesourd n^{os} 145, rue des Bourguignons, Bois-
 19, 62, 55, 10, 20, Colombes (Seine).
 40, 3
Tisane R. P. La Mon-
tagne 88, rue Duhesme, Paris.
Tisane Sanova 19, av. Secrétan, Paris.
Tisane Talon 103, rue Saint-Lazare, Paris.
***Tisane Tanit** 153, bd Montparnasse, Paris.
Tisane Valentin-Chail-
lot Rouanet, Antibes (A.-M.).
Tissus Le Perdriel 10, square de Châtillon, Paris.
Titanoderme 11, rue Milton, Paris.
Tochlorine Lab. Palc, Messigny (C.-d'Or).
Tœnifuge Larix 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Togal 20, rue Thiers, Tarbes (B.-P.).
 13, fg Ste-Foy, Forbach (Mo-
 selle).
Tolu Le Bœuf 11, rue Milton, Paris.
Tonal 61, rue de Seine, Paris.
Tonax Lyons, 30, rue Monge, Paris.
Toni bronchique 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).

- Tonicalcine**
***Tonicardine Gannon**
Tonicardine
Toni-Dol
Toniflux
Toniformiase
Tonifort
Tonifosfal
Tonigène
Tonigénine
***Tonikéine Chevretin**
Tonik Elsse
Tonikéol
Tonilécithine Rogier
Tonimalt
***Toni-Pectoral Adrian**
Toniphlébine Hardy
Toniphos Baron
Toniphosphine
Tonique Chapès
Tonique Dulciane
***Tonique Favrot**
Tonique Garnier
***Tonique Gannon**
***Tonique Nèda**
Tonique Rik
***Tonique Roche**
Tonique Rouveray
Tonique Zéva
Toni sérum Freyssinge
***Toniveinine**
Tonixyl
Tonuclyl
***Tonudol**
***Tophista**
***Tophol**
Topique Bertrand
Topiques Chaumel
Topique pyorrhépha-
gine
Topique Robein

Topique stomacal
Dausse
Torigyre Lamo
Toritane Lamo
Toritanol Lamo
Totaliode
***Total Magnésien**
***Total-Tonic**
***Tot'Cobra**
***Tot'Hamelis**
***Tot'Héma**
Tot'Hépatine
***Touranol**
Touranyl
- 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Bassol, Saint-Alvère (Dordogne).
 31, bd de la Villette, Paris
 34, rue Montgallet, Paris.
 41, r. Saint-Louis, Montauban.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 11, rue Eugène-Flachat, Paris.
 Lab. à Montrevel (Ain).
 52, rue Labruyère, Paris (IX^e).
 Chavanne, Fontaine-Grenoble.
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
 56, bd Pereire, Paris.
 Rumilly (Haute-Savoie).
 9, rue de la Perle, Paris.
 200, rue de Tolbiac, Paris.
 Les Sables-d'Olonne.
 56, rue des Dames, Paris.
 Bouyssou, Chambois (Orne).
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 134, c. de Verdun, Bordeaux.
 38, rue du Louvre, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 3 bis, r. Vallier, Levallois-Perret.
 60, cours Émile-Zola, Lyon.
 6, rue Abel, Paris.
 15, av. Parc-Montsouris, Paris.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 Meunier, Montmarault (Allier).
 38, bd Bourdon, Paris-Neuilly.
 3, rue Condillac, Grenoble.
 id.
 à Oullins (Rhône).
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Hygiodontis, Croissy-s.-Seine.
 21, rue de la Gare, La Broque
 (Bas-Rhin).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 53, rue de Crimée, Paris.
 id.
 id.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris.
 29, fg Bourgogne, Orléans.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 26 bis, rue Dombasle, Paris.
 26 bis, rue Dombasle, Paris.
 3, pl. Jussieu, Paris.
 117, rue de Belleville, Paris.
 id.

- Toussyl Py**
Toxurol
 ***Trachédrine**
Trachovaccin Salantale
 ***Traitement Ambula-
toire**
Traitement Vernet
Tranquinal
Transfusine
 ***Transitol**
Transpulmine
 ***Traphéine**
 ***Trasentine**

Traumatol
Traumaplaste
 ***Trepallix**
Tréparsénans
Tréparsinyl
 ***Tréparsol**
 ***Tréphonymyl**
Trépocidine
Trépol
Trépoquinol
 ***Trépositoires**

Trialgine
Triano
Triarsonyl
Triase
Tribromure Gigon
Tricadol
 ***Tricalcine**
 ***Tricalm**
Tricarbol Begon
Tricarbène Le franc

Tricophan
Tricostérid
Tridigestine Dalloz
 ***Tridynol**
Triféryl
Trifloral François
Triganol Vigier
Trigastatine
 ***Triglandine Bouty**
Triglandol Bouty
Trigonellose
 ***Trigosthéne**
Tri-Iodo-Ercé
Trijumine Pelletier
Trilactine
Trimétal
Trineuxyl
 ***Trinibaine Laleuf**
 ***Trinitral Laleuf**
- 58, bd Richard-Wallace, Pu-
teaux.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 60, rte de Châtillon, Malakoff.
 42, Grandes-Arcades, Strasbourg.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 9, rue Laloy, Chaumont.
 13, av. de Ségur, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 13, rue Basly, Gennevilliers.
 4, rue d'Ilzsch, Mulhouse.
 13, rue Beudant, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
 id.
 66, rue de la Pompe, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Falque, Besançon.
 14, r. A.-Briand, Levallois-Per.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 id.
 43-45, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.
 13, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
 8, rue St-Martin, Paris.
 137, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 22, r. de Turin, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 Donagol, Péronne (Somme).
 Pionsat (Puy-de-Dôme).
 31, rue du Chemin-de-Fer, Nan-
terre.
 21, r. Mouton-Duvernety, Paris.
 Pelloille, Champigny (Seine).
 13, bd La Chapelle, Paris.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 37, rue Galilée, Paris.
 Taclet, Arras (P.-de-C.).
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 336, r. des Pyrénées, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 id.
 23, bd Hoche, St-Brieuc.
 "Angla", Monte-Carlo.
 1, av. de Villars, Paris.
 48, rue Jacob, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 38, rue du Louvre, Paris.
 6, rue des Dames, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 id.

- *Trinitrine Caleinée Du-bois
- *Trinitrine-Caréna 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
39, bd de Latour-Maubourg, Paris.
- *Trinitrine -Papavérine Laleuf 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
10, rue Washington, Paris.
- *Trinitrine Roussel
- *Trinitrine Simple Laleuf 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
17, bd Haussmann, Paris.
- Trinitrine Vicario 13, av. de Ségur, Paris (VII^e).
- *Trinivérine 50, rue de Turenne, Paris.
- *Trinobenzyle 150, r. de Paris, Pantin (Seine).
- Triplexine 22, rue de Turin, Paris.
- *Triradol 14, rue des Minimes, Paris.
- *Trisalyl 163, rue de Flandre, Paris.
- Triseltz Lambert, rue de la Paix, Vichy.
- Triseptine 21, r. des Roses, Dijon.
- Triseptol 348, rue St-Honoré, Paris.
- *Trisilmag Benderitter, à Vendôme.
- Trisodyl Rozet 53, rue de Crimée, Paris.
- Tristyl Noyon 64, rue des Tournelles, Paris.
- Tritonine 46, rue de Rome, Marseille.
- Triurase 4, av. Desieux, Boulogne-s.-S.
- Trixyl Fraudin Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Tri-Zymol (Voir : *Dosurine*)
- *Tcussess Dosurine 52, bd du Temple, Paris.
- Tryclène 40, rue des Acacias, Paris.
- *Trynol 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Tryparsamide id.
- Tuberculine C. L.
- *Tuberculines de l'Institut Mérieux 17, rue Bourgelat, Lyon.
- *Tubérol 23, rue des Moines, Paris.
- *Tubes Blache Chauvin, Aubenas (Ardèche).
- Tubes Bromure Pachaut 130, bd Haussmann, Paris.
- *Tubes Chauvin Aubenas (Ardèche).
- *Tubes Dulcis Dr Ferry, Monte-Carlo.
- *Tubes Ferlux G. Bousquet, à Albi.
- *Tubes du Dr Guiraud 10, imp. Milord, Paris.
- Tubes Levasseur 23, rue de la Monnaie, Paris.
- Tubes Lux 35, rue de l'Abattoir, Bruxelles.
- *Tubes P. O. S. Ferrenbach, Kayzersberg (H.-R.).
- *Tubes Ratio Bousquet, Albi.
- Tubes Sals Oullins (Rhône).
- *Tubes Strana Salantale, Strasbourg.
- *Tulle gras Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- Tulle gras Prima 3, rue des Reculettes, Paris.
- Tulle neutre AD-NO 5, rue Mézelle, Tarare (Rhône).
- *Tulle rose Beslier Coquelu, Digoin (S.-et-L.).
- Tussédyl 15, r. des Champs, Asnières.
- Tuxyl 4, av. M.-Berteaux, Poissy (S.-et-O.).
- Tuya Feuillé 4, rue du Cirque, Paris.
- Tymocalcine 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Tympano 66, rue Falguière, Paris.
- *Tympanyl 215, bd Voltaire, Paris.

U

- Ubécholîne**
***Uclarsyl**
Udanka
***Ulcéobalnéine**
***Ulcéobande**
Ulcéocure
***Ulcéoplaque**
***Ulcéosine**
***Ulcéosol**
***Ulcérine Berger**
***Ulcérophile Nosan**

Ulmacétyl
Ulmairé Gmet
Ulmarrène Gigon
Ultracalcine
***Ultracalcium Irradié**

Ultracao Laurençon

***Ultracrinol**
***Ultraformine B et S**
***Ultra-Levure**
Ultrapraidow
Ultrargen Leclerc
Ultrasténil

***Ultra-Violets**
***Ultravitamine 4**

Ultravitine

***Umcka**
Uracétose
Uradol
***Uralysol**
Uranol
Uraséol
***Uraseptine Rogier**
***Urazine**
***Ur-Clar**
***Ureinol**
***Urémiasé**
Urénile Meurice
Uribiol
Urdol
***Uréol Chanteaud**
- Mouflet, Chennebrun (Eure).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 Dr Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 76, rue des Rondeaux, Paris.
 id.
 82-84, rue de Belleville, Paris.
 76, rue des Rondeaux, Paris.
 id.
 id.
 31, bd de la Villette, Paris.
 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine).
 54, r. Sablonville, Neuilly-s.-Seine.
 27, fg Montmartre, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 41, rue Germain, Lyon.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
 11, rue François-Giraud, Villefranche-sur-Saône.
 40, quai Jeanne-d'Arc, Chinon.
 60, r. J.-Jaurès, Firminy (Loire).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 Battut, à Vatan (Indre).
 10, rue Vignon, Paris.
 P. Fontanier, Moulins - sur-Yèvre (Cher).
 12, av. du Maine, Paris.
 11, r. F.-Giraud, Villefranche-s.-Saône.
 P. Fontanier, Moulins - sur-Yèvre (Cher).
 34, rue St-Lazare, Paris (IX^e).
 14, rue des Minimes, Paris.
 av. de Grasse, Cannes.
 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
 22, rue de Turin, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 56, Bd Péreire, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Roux, 58, r. de Maubeuge, Paris.
 43, r. de Chartres, Neuilly-s.-S.
 7, rue Galvani, Paris (XVII^e).
 61, av. Louise, Bruxelles.
 145, av. de Montredon, Marseille.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 3-5, rue A.-Dumas, St-Ouen (Seine).

- Urgoplast**
***Uriage (Ampoules)**
Uribiline
Uribiol
Uricase
***Uricémine**
Uricine
***Uriclarine**
Uricural
Uricure
***Urifluine**
Uriloal
Urilyse
Urilysonne
Uri-Magnétol
Urisal du Dr Des-
champs
***Urisanine**
Urobarine
Uro-Bestol
Urobiose
***Urobleu Vergelot**
***Uroboldine**
***Urobuccol Malmanche**
Urocarbol benzo-
naphtolé
Urocassine
Urocédrol
***Urocholine**
***Uroclarol**
***Uroclase**
***Uroclase « M »**
Uroclean
Urococcine
***Urocylate**
***Uroflux**
***Uroformine Gobey**
Urogem
Urogène
Urogénine
***Uroïdine**
Urokaps
Urolan
Urolavose
Urol
Urolithol
Urolyse
***Urométhyl**
***Urométine Lambiotte**
***Uromil**
Urophényl
- Fournier, Dijon.
 15, av. des Champs-Élysées,
 Paris.
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 145, av. de Montredon, Marseille.
 26, rue de Gagny, Neuilly-sur-
 Marne.
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 50, rue République, Puteaux.
 157, rue Championnet, Paris.
 place de la Comète, Asnières.
 6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 Longuet, 34, r. Sedaine, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 6, rue de Navarin, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 101, av. Paul-Doumer, Rueil.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 61, bd Malesherbes, Paris.
 Gallo, à Aurillac (Cantal).
 20, pl. de la Mairie, Parc-Saint-
 Maur (Seine).
 117, r. V.-Hugo, Houplines
 (Nord).
 95, rue de Prony, Paris.
 id.
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 57, rue Pierre-Corneille, Lyon.
 21, rue de Lyon, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 38, r. du Louvre, Paris (I^{er}).
 Dr Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 55, av. des Écoles, Cachan
 (Seine).
 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e).
 38, bd des Brotteaux, Lyon.
 55, bd de Strasbourg, Paris.
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 27, rue G.-Tessier, Saint-Étienne.
 Novalis, Oullins (Rhône).
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 73, r. d'Albuféra, Vernon (Eure).

- *Urophile Bailly
 Uropiat
 Uroquinase
 *Uroquinol
 *Urosalyl
 Urosan
 Uroscéral
 Uroseptic
 Urose Vigan
 *Urosérum
 Urosinol Damber
 *Urosiphon
 Urosodine Louveau
 Uro-tisan
 Urotropine Lafran
 *Urovitine
 Uroxyl
 *Urticide (Dragées et
 Liquide)
 Utérol Leo
 Utéro-streptine
 *Utersan
 *Uvargol
 Uvastar
 *Uvasthène
 *Uvé
 Uvécalcion
 *Uvéoline
 Uvéovules
 Uvéphorine
 *Uvestérol
 Uvotonyl
- 15 et 17, rue de Rome, Paris.
 119, rue de Sèze, Lyon.
 Dubois, 16, bd Pereire, Paris.
 7, r. de la République, Puteaux.
 6, rue Félix-Pyat, Marseille.
 12, rue des Saints-Pères, Paris.
 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 80, fg St-Denis, Paris.
 103, rue St-Lazare, Paris.
 56, rue St-Lambert, Marseille.
 71, av. de la République, Cham-
 pigny (Seine).
 1, rue de l'Odéon, Paris.
 78, bd des Batignolles, Paris.
 112, rue des Pyrénées, Paris.
 8, rue de Prague, Paris.
 190, bd Haussmann, Paris.
 11, place Ste-Eulalie, Bordeaux.
 2, rue Michelet, Alger.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 22, rue des Martyrs, Paris.
 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 Route du Moulleau, Arcachon.
 Bourdou, Frontignan (Hérault).
 1, av. du Dr-Lannelongue, Paris.
 11 bis, place de l'Hôtel-de-Ville,
 Cannes (A.-M.).
 Ph^{ie} Ambard, Carcès (Var).
 Ambard, Carcès (Var).
 37, rue G illée, Paris.
 1, av. du Dr-Lannelongue, Paris.
 Joué-les-Tours (I.-et-L.).

V

- Vabéol
 Vacciderm
 *Vaccin anti - asthma-
 tique du P^r Minet
 Vaccin Anticolibacil-
 laire M. M.
 Vaccin antigonococci-
 que
 *Vaccin antigrippal du
 Pr. Minet
 *Vaccin antipneumo-
 nique du P^r Minet
- 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris,
 Unis-Spès, 14, rue Demarquay.
 Paris.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 43-45, rue des Fauvelles, Cour-
 bevoie (Seine).
 Olliviero, Boulogne-sur-Seine.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 id.

- Vaccin antivariolique** av. de Lodève, Montpellier.
***Vaccin de Weill et Dufourt** 1, av. de Villars, Paris.
- Vaccin H antirhumatismal** 154 bis, r. Breteuil, Marseille.
Vaccin M. A. Creuzé, 74, r. de Lourmel, Paris.
- *Vaccinothérapie atoxique Cépède** 57, rue Mathurin-Régnier, Paris.
- *Vaccinothérapie Pro-bios** 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 23, rue des Moines, Paris.
- *Vaccinovules**
- *Vaccins antibrucelliques polymicrobiens** 17, rue de Sauve, Nîmes.
 26, av. Observatoire, Paris.
- Vaccins antipollin** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Vaccins atoxiques stabilisés**
- *Vaccins Bactériens I. O. D.** 16, rue Dragon, Marseille.
 46, rue de Verneuil, Paris.
- Vaccins bactériophages** 7, rue Biscornet, Paris.
- *Vaccins Bruschettini** 54, rue du Fg-St-Honoré, Paris.
- *Vaccins Carrion** 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Vaccins Clin** 74, rue de Lourmel, Paris (XV^e).
 98, r. de Sèvres, Paris.
- *Vaccins Creuzé** 14, rue de Normandie, Asnières.
- *Vaccins Demonchy** 17, rue de Provence, Paris.
- *Vaccins Inava**
- *Vaccins Ivago**
- Vaccins microbiens curatifs** Gremy, 14, r. de Clichy, Paris.
 36, r. du D^r-Roux, Paris.
- *Vaccins Pasteur**
- Vaccins Polyvalents Renard** 1, av. de Villars, Paris.
- *Vaccin Provac's** 42, rue Thiers, Le Havre.
- *Vaccins Ronchèse** 21, bd Riquier, Nice.
- *Vaccins Salantale** 42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
- *Vaccins Sténale** 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 à Launay-Serquigny (Eure).
 Fournier, Dijon.
- *Vaccins Virultra** 27, rue Desrenaudes, Paris.
 (Voir : *Opo-Vacuoline*.)
- Vacciplast** 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
- Vaclydun Vaclyderm** Saint-Venant (P.-de-C.).
- *Vacuoline** 21, Gde-Rue, Montfermeil.
- *Vagodénal** 122, av. Champs-Élysées, Paris.
- *Vagogastryl Crozet** 49, rue de Maubeuge, Paris.
- *Vagoriane** Inst. physiologique Vaucaresson.
- *Vagosédyl** 26, av. Observatoire, Paris.
- *Vagostabyl** 56, bd Péreire, Paris.
- Vagotonic Fournier** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- Vagotonine** 191, fg Saint-Antoine, Paris.
- *Valbornine Rogier** Novalis, Oullins (Rh.).
- *Valbrol** 12, bd St-Martin, Paris.
- *Valedyl** rue Gambetta, Bolbec.
- *Valénal** 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
- Valéramyl Foulon** 2, rue Duphot, Paris.
- Valergyl Doucet** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Valérianate Gabail** 4, rue Aubriot, Paris.
- *Valérianate Grignon**
- Valériane Byla**
- Valériane Dausse**

- *Valériane Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
- *Valériane Pachaut 130, bd Haussmann, Paris.
- *Valériane Pierlot 10, pas. Morel, Montrouge.
- Valérianose Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris.
- Valériflore 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
- *Valérinodor Malmanche 101, av. Paul-Doumer, Rueil (Seine-et-Oise).
- *Valerium Paul Thibault 48, rue d'Alésia, Paris.
- *Valérobromine Le-grand Darrasse, 13, rue Pavée, Paris.
- *Valéronal 14, rue des Pyramides, Paris.
- Valérose G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- Valérothéine Domergue, Agen (L.-et-G.).
- Valéthryne 39, rue de la Chapelle, Paris.
- Valimyl Clin 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Vallathen 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- *Val'ovarine Farma 1, av. Eug.-Thomas, Kremlin-Bicêtre (Seine).
- *Valovosan 25, bd de la Tour-Maubourg, Paris.
- Vals St-Jean 53, bd Haussmann, Paris.
- *Valthène 166, r. de la Roquette, Paris (II^e).
- Valtine 12, rue Tour-des-Dames, Paris.
- Valyl Midy 67, av. de Wagram, Paris.
- Vamétol 14, r. de Périgieux, Angoulême.
- *Vanadarsine Guillaumin 13, rue du Cherche-Midi, Paris.
- Vanadine Chevrier 21, fg Montmartre, Paris.
- Vanadyl 8, rue Richer, Paris.
- Vaniol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Vanosan 58, r. Oberkampf, Paris.
- Vanotonyl 11, rue de Clichy, Paris.
- *Vanoxyle 4, rue Richer, Paris.
- *Vansol 18, r. Maréchal-Foch, Versailles.
- *Vanucléol 37, rue Pajol, Paris.
- *Vaposulphium 157, rue Championnet, Paris.
- Varicine 12, rue Cadet, Paris.
- Varicolyse 16, rue Salaire, Tarascon.
- Varicyl 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- *Varilaxine M. Soulas, Surgères (Ch.-Inf.).
- Varilose G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- *Variphile 21, rue de Lyon, Paris.
- *Varisclérine 61, rue de Seine, Paris.
- Variserum Lebon à Charost (Cher).
- *Vascosodine 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
- Vasculine 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- *Vascuro 86, rue de la Réunion, Paris.
- Vaseline Chesebrough 76-78, rue Dareau, Paris (XIV^e).
- Vasocônes Brun, Demi-Lune, Lyon.
- Vasoconstrictine id.
- Vasogènes Pearson 48, rue d'Alésia, Paris.
- Vasolaxine 7, rue Biscornet, Paris.
- *Vaso-Neurine 5, r. François-Ponsard, Paris.
- *Vasonitryl 13, rue Pagès, Suresnes et 53, rue du Poinçon, Bruxelles.
- Vasorhinine 22, rue Gambetta, Cherbourg.

- *Vaso-Rhinol
 *Vaso-Rhinol adrénaliné
 Vaso-Rhinol mentholé
 Vasothyol
 *V. A. V.
 Vavéol
 Vaxa du D^r Boucard
 *Vaxitiol Bouty
 Véba-gastrine
 *Véganine
 *Végécarnis Bengué
 *Végélact-Soja
 *Végélax
 *Végéphos
 Végétol Fournier
 *Végumine
 *Véguva
 Veinalgol
 Veinargyre
 Veinhormones Logeais
 *Veinicura
 Veinixir
 Veinoilorine
 Veinofluine
 Veinoflux
 *Veinogène
 Veinoglandol
 Veinophiline
 Veinophos
 Veinophyl
 *Veinoposine
 Veinosalvine
 Veinosan
 *Veinoserol (Élixir et Gouttes)
 *Veinosine
 Veinotensyl
 Veinotonyl
 *Veinotrope
 Veinovarine Mercier
 Veinyl
 Velledol Adrian
 *Velpeau (bande de crêpe)
 *Venapressine
 *Vérachol
 *Véralgine
 Veramone
- 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 Id.
 Id.
 9, rue Laloy, Chaumont.
 51, rue du Ranelagh, Paris.
 19, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 30, rue Singer, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 92, r. du Mar.-Pétain, Vichy (Allier).
 13, r. Pagès, Suresnes, et 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
 16, rue Ballu, Paris.
 25, rue du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 8, rue des Quatre-Fils, Paris.
 Wander, Champigny-s.-Marne.
 Id.
 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
 29, rue des Jardiniers, Montreuil (Seine).
 24, r. de Silly, Boulogne-s.-S.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 20, rue de Rivoli, Paris.
 37, rue Brochant, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 27, rue Poids-Farine, Marseille.
 Huyghe, Brazey - en - Plaine (C.-d'Or).
 Mounier, Egliseneuve-d'Entraygues (P.-de-D.).
 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse.
 20 bis, rue du Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
 1, av. de Villars, Paris.
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel, Toulouse.
 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
 20, rue de Rivoli, Paris.
 15, rue Corneille, Lille.
 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
 41, route de Turin, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 9, rue de la Perle, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 7, rond-point Mirabeau, Paris.
 44, rue Chaptal, Levallois (Seine).
 38, rue du Mainguy, Bondy.
 Cruet, 13, rue Miollis, Paris.

Verbal

- Verbenol Hanbro**
***Vérianne Buriat**
***Véricardine**
Vermicide Grahaut
Vermicure Pigeon
Vermifuge Castel
***Vermifuge Chiarini**
***Vermifuge Cornet**
Vermifuge des Moines
Vermifuge Rabi
Vermifuges Sorin
Vermifuge des Vosges
***Vermirène Audibert**
Vermi-Robur
Vermitox
Vermosol
Vermus
Vérocodal Boeglin
***Vérogénol**
***Véronidia Buisson**
Verrucida Robur
Verruccin Leo
Verrucure
***Verrulyse**
Verrumag
***Verticurine**
***Vertox**
***Véryl**
***Vésicatoire rose Bes-
lier**
**Vésicatoires d'Albes-
peyres**
Vexillan
Viabyllis
Viargol
Viburniode
Viburnum Gmet
***Vicalphos (simple et
irradié)**
***Viceliase**
Vichy Amaigrissant
Vichy Purgatif
Vigardyne
Vigobiase
***Vigofruits**
Vigogastrine
***Vigoral**
Vigoria
Vigorine
- 34, av. de la République,
Montrouge (Seine).
 10, rue de Belfort, Rennes.
 37, rue Spontini, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 21, rue Sainte-Catherine, Ville-
neuve-sur-Lot.
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
 Aix-en-Provence (B.-du-R.).
 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 14, rue Turgot, Limoges.
 Trombetta, Blain (L.-Inf.).
 21, rue de la Gare, La Broque
(Bas-Rhin).
 Cinq Cantons, Bayonne.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 19, rue de la Porte-Trivaux,
Clamart (Seine).
 46, rue du Bac, Asnières.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 26, rue Sainte-Claire, Mulhouse.
 139, av. E.-Zola, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 11, square Marie-Louise, Bru-
xelles.
 6, rue d'Auteuil, Paris.
 Fluxine, Villefranche (Rhône).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 47, rue Feray, à Corbeil (S.-et-O.).
 56, rue Beaubourg, Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 Coquelu, Digoin (S.-et-L.).
 Fumouze, 78, fg Saint-Denis,
Paris.
 98, av. Wagram, Paris.
 6, rue de Dunkerque, Paris.
 44, av. Pasteur, Courbevoie.
 Giry, 49, rue de Metz, Nancy.
 27, fg Montmartre, Paris.
 48, rue St-Jean, Lyon.
 71, av. de la République, Cham-
pigny (Seine).
 Blancher, Vichy (Allier).
 7 bis, rue Galvani, Paris.
 21, r. du Chemin-de-Fer, Sceaux.
 PHARMA SPES, Lille.
 route du Mouleau, Arcachon.
 222, rue Duguesclin, Lyon.
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 Aubery, Avignon (Vaucluse).
 Bassol, Sainte-Alvère (Dord.).

- Vigorstyl** 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
- Vigostérol irradié** Brichard, Bar-le-Duc.
- Vigotonique** 71, av. de la République, Champigny (Seine).
- Vilax** 16, bd Filles-du-Calvaire, Paris.
- Vin à l'extrait de foie de morue** 21, fg Montmartre, Paris.
- Vin d'Anduran** 28, r. Velpeau, Antony (Seine).
- *Vin Anti-Diabétique** 153, bd Montparnasse, Paris.
- Talon** 6, rue Dombasle, Paris.
- Vin Aroud** Avignon (Vaucluse).
- *Vin Aubery** 172, rue d'Alésia, Paris.
- Vin Boillaud** 56, bd Ornano, Paris.
- *Vin Bravais** 13, rue Pagès, Suresnes.
- *Vince** 12, rue Charles-V, Paris.
- *Vin de Baudon** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Vin de Beef Lavoisier** 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
- Vin de Bugeaud** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Vin de Carnéose** 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Vin de Chassaing** 21, fg Montmartre, Paris.
- Vib de Coca du Pérou** 8, rue Vivienne, Paris.
- Vin de Dusart** G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- Vin Erlos** 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- Vin de Galien** 61, rue de Seine, Paris.
- Vin des Indes** 36, pl. Bellecour, Lyon.
- *Vin de Vial** Levallois-Perret (Seine).
- Vin Désyles** 19, rue des Chalets, Toulouse.
- Vin diurétique Pyrola** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Vin énergétique Fra-dier** 7, rue des Petits-Carreaux, Paris.
- Vin Gallia** 48, rue d'Alésia, Paris.
- *Vin Girard** 67, av. de Wagram, Paris.
- Vin de Kola Midy** 12, r. République, Puteaux.
- Vin de Moride** 165, rue Saint-Honoré, Paris.
- Vin de Séguin** 6, av. Foch, Gaillac (Tarn).
- Vin Lux Gaillac moussoux** 41, bd Haussmann, Paris.
- Vin Mariani** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Vin Mory** Bassol, Sainte-Alvère (Dord.).
- Vin Néo-Vital** 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
- Vin Nourry** 30, r. de Sète, Longuyon.
- *Vinocrinol** Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Vin Oophorine** 19, rue des Chalets.
- Vin Pyrola** 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- *Vin-Raci-Bel** 16, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
- Vin Raimoa Tonic** 1, rue de l'Odéon, Paris.
- Vin Rénovateur Hu-chédé** à Valence (Drôme).
- Vin St-Raphaël** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Vin Surtonique Val-Notre-Dame** 24, rue de Monttessuy, Paris.
- Vin Tonic Tiffeneau**

Vin Tonique des Vosges	21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
Vin Urané Pesqui	rue de Béhobie, Hendaye.
Vin Voguet	5, rue Eug.-Delacroix, Paris.
*Vioforme Ciba	103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
Violet Bidot	4, rue du Cirque, Paris.
*Viophan	81-83, rue de Lille, Roubaix.
*Vlostex	D ^r Lescène, 58, r. de Vouillé, Paris, et Livarot (Calvados).
*Vioxyl Mouneyrat	Villeneuve-la-Garenne (Seine).
*Viradène	120, rue Lecourbe, Paris.
*Viredox	7, rue Fontaine-Delsaux, Lille.
Viridol	65, rue Monge, Paris.
Viriligen	7, rue Princesse, Paris.
Viristhène	76, rue des Jacobins, Amiens.
*Virmonal « Piam »	11, quai St-Clair, Lyon.
Viroglan I. S. M.	25, rue Dagorno, Paris.
Viscine	11, rue de Fontainebleau, Kremlin-Bicêtre.
Visco-dermine	21, Gde-Rue, Montfermeil.
*Viscoserum	22, rue de Turin, Paris.
Viscosodine	20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
*Voscoveine	21, Gde-Rue, Montfermeil.
-Viscum Zyma	92, rue Bobillot, Paris.
*Vitacalcine Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-s.-Seine.
Vitacarnol	Aubery, Avignon (Vaucluse).
*Vitacholine	190, bd Haussmann, Paris.
*Vitacrine	188, c. de la Somme, Bordeaux.
Vitacurool Savare	190, bd Haussmann, Paris.
Vitaderme Bergonier	122, bd Murat, Paris.
Vitadermine	Rueil (Seine-et-Oise).
*Vitadiase	145, rue Yves-le-Coz, Versailles.
*Vitadone	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitaferine	Moulins-sur-Yèvre (Cher).
*Vitagar	19, rue Drouot, Paris.
Vitagéine	7, r. Sainte-Isaure, Paris.
Vitalactyl	Sauba, Montreuil (Seine).
Vital Extrait	à Ste-Alvère (Dordogne).
Vitalium	97, bd Arago, Paris (XIV ^e).
Vitalogène	62, av. de Paris, Villejuif.
*Vitalyne	10, rue Bayard, Toulouse.
Vitamine B¹ Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitamine B² Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitamine C Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Vitamine D Cortial	7, rue de l'Armorique, Paris.
Vitamine E Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitamine Rogier	56, bd Péreire, Paris.
*Vitamines Seclo	6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
Vitaminol	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Vitamorrhaine, perles et granulés	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
*Vitamyl	4, pl. des Vosges, Paris.
*Vitaol	Chabre frères, Toulon.
Vitaphorine	Usines du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).

Vita-Raisin	Lemale	7, rue d'Argenteuil, Paris.
* Vitargyl		30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
* Vitarsenic		R. Paméla, 85, r. Turbigo, Paris.
* Vitascorbol		21, rue Jean-Goujon, Paris.
Vitasol		49, rue d'Angoulême, Cognac.
Vitastérol		10, r. du Collège, Arras.
Vitazem		85, rue Turbigo, Paris.
* Vitène		12, rue Charles-V, Paris.
Vitergomine		12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Vitimone		16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI ^e).
Vitocalcion		50, av. de Normandie, Colombes.
* Vitorange du Dr Barillot		1, r. de la Rochette, Melun (S.-et-M.).
Vitosine Décornez		à Ornans (Doubs).
Vitricine Carves		à Chambéry (Haute-Savoie).
Vityl		72, quai Jemmapes, Paris.
* Vivacure		R. Plonneau, Vayres (Gir.).
* Vivargyre		191, fg St-Antoine, Paris (XI ^e).
Vivassol		78, fg Saint-Denis, Paris.
Viviodol		11, rue de Marseille, Paris.
Vivo-Dynergol		20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).
* Vivoléol		24, rue de Fécamp, Paris (XII ^e).
Vixol		45, fg Saint-Denis, Paris.
* Vocaldop		45, rue de Lyon, Paris.
Vogénol		13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
Voka		11, rue Ant-Bourdelle, Paris.
* Voltargol Robin		13, rue de Poissy, Paris.
Voxinhal		163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
* Vulcapil Brisson		157, rue Championnet, Paris.
* Vulcase		id.
Vulco (ouate)		Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
* Vulcrinol		15, r. d'Argenteuil, Paris.
* Vulnamine		19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
* Vulnérine Bergen		Ducoq, Langeais (I.-et-L.).

W

Wantor	122, r. La Fontaine, Paris.
Witch Hazel	3, av. Lowendal, Paris.
Wipla	6, rue des Dames, Paris.
Wismuthane	41, av. Joffre, La Garenne.

X

- *Xantharlem 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
- Xanthocol 1. av. de Villars, Paris.
- *Xanthorryl 36, r. de la Tour d'Auvergne, Paris.
- Xémaderm 18, r. Blanche, Paris.
- *Xeroderme Michel, Cirey-s.-Vezouze (M.-et-M.).
- Xylosulfol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Y

- *Yaourtine 18, place Laborde, Paris.
- *Yo-Androl 107, rue des Dames, Paris.
- Yocaïne 12, rue Pavée, Paris.
- Yoghourt Karlos à Léchuse (Nord).
- Yoghourt Lactella à Tourcoing.
- Yoghourt Nutricia 142, rue Fransman, Bruxelles.
- *Yo-Gynine 107, rue des Dames, Paris.
- Yohimbine Gilbert 7, rue Charlot, Paris (III^e).
- *Yohimbine Houdé 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- Yohimbine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- *Yohourthogène Car- 5, rue du Capitaine-Scott, Paris.
- rion-Lagnel 37, rue Voiture, Amiens.
- Yohourt Douriez 5, c. Saint-Louis, Marseille.
- Yorva 4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
- Yprine 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- *Yptor Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
- Yro 62, rue Louis-Blanc, Paris.
- Yse 2, pl. du Th.-Français, Paris.
- Ystaline 9, rue de la Platière, Lyon.
- *Yseult

Z

- | | |
|-----------------------------|---|
| Zébo-Plastol | 10, rue du Plâtre, Paris. |
| Zédeno | 1, av. de Villars, Paris. |
| Zidaline | 11, bd de Strasbourg, Paris. |
| Zinc Stovarsol | 21, rue Jean-Goujon, Paris. |
| Zingal | 11, ch. de la Muette, Paris. |
| Zistazine | 163, rue de Flandre, Paris. |
| Zogol | 1, place Bouquerie, Nîmes. |
| Zohol | 25, r. Jasmin, Paris. |
| Zomine | 34, rue Sedaine, Paris. |
| Zomol | Vial, 8, rue Vivienne, Paris. |
| *Zomo-maltine | 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris. |
| *Zomo-Sthénol | G. Courtin, Attichy (Oise). |
| Zoocytine | Duret et Rémy, Asnières (Seine). |
| Zycream | 84, fg du Temple, Paris. |
| *Zymatine-Lescène | à Livarot (Calvados), et 58, rue de Vouillé, Paris. |
| *Zymion | 18, av. Hoche, Paris. |
| *Zymogastrine Kervan | 3-5, r. Alex.-Dumas, St-Ouen (S.). |
| *Zymostol | 22, rue de la Sorbonne, Paris. |

3^e Partie

**NOMENCLATURE
DE
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
CLASSÉES
PAR LABORATOIRES**

- Lab. Félix Abadie**, 25, r. Thiers, Tarbes (Htes-Pyr.). — *Tœnifuge Larix*.
- Lab. Abadie Tanzi**, 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. — *Algoboldine*, *Asclérogénol*, *Aubémone*, *Baume de la Faculté*, *Bellinguol*, *Cachets digestifs du D^r Bern*, *Calcior*, *Dépuratif du D^r Regol*, *Diocol*, *Essence landaise*, *Florénal*, *Gouttes calciques Zanil*, *Gouttes halogènes du D^r Bern*, *Gouttes de Pectosérum*, *J.-B. 5 Bel-las*, *Moruxase*, *Naphtolargol*, *Neurorol*, *Névrostérol*, *Ovules halogènes du D^r Bern*, *Urolithol*, *Vallathen*, *Veinosérum* (élixir et gouttes).
- Lab. Abarnou**, 72, av. Thiers, Le Mans. — *Antidolor*, *Anti-gélures*, *Baume Robur*, *Fenurobur*, *Rhino-Robur*, *Vermi-Robur*, *Verrucide Robur*.
- Lab. des Abatilles**, r. du Moulleau, Arcachon. — *Calcivitam*, *Créofruits*, *Droséfruits*, *Kodos*, *Seignet'fruits*, *Uvastar*, *Vigofruits*.
- Lab. de l'Absuric**, 17, rue de Provence, Paris. — *Absuric*.
- Lab. d'Actino-Biologie**, 11, r. François-Giraud, Villefranche-sur-Saône. — *Ultravitamine 4.*, *Tensol-Laurençon*, *Serifer Laurençon*, *Algécrine*, *Ultracao Laurençon*, *Thiophytol*, *Névrovitamine 4*.
- Lab. d'Actithérapie**, 81-83, rue de Lille, Roubaix (Nord), *Hepaloxane*.
- Lab. Adam**, Granville (Manche), *Adrénocalcine*, *Chloci*.
- Lab. Adler**, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Biolax*, *Bismuth belladoné du D^r Adler*, *Collybore*, *Formo-choline*, *Gastroclean*, *Gynochlore*, *Gynomalvine*, *Hémoclean*, *Hémovarine*, *Hepaclean*, *Inhatillol*, *Iodau-bépine*, *Oléopsyllium*, *Pulmobiasse*, *Rhinogéraniol*, *Tonikéol*, *Uroclean*.
- Lab. Adol (L. Giroud)**, 78, cours de la Liberté, Lyon. — *Baume Adol*, *Blennopiat*, *Cachets Adol*, *Cachets Louix*, *Gouttes Antispasmodiques Adol*, *Potion Adol*, *Poudre Dumur*.
- Lab. Adrian et C^{ie}**. — Voir **Société Française de Productions Pharmaceutiques**, 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Lab. de l'Aéine**, 6, place Clichy, Paris (IX^e). — *Aéine*, *Cachets Antigrippe Flamand*, *Nuclhémose*, *Sirop Flamand*.
- Lab. de l'Aérocid**, 71, rue St^e-Anne, Paris. — *Aérocid*, *Opo-cérès* (comprimés).
- Lab. de l'Æthone**, 35, r. Boissonnade, Paris. — *Æthone*, *Neurotrophène*.
- Lab. de l'Agocalcium**, 299, rue des Pyrénées, Paris (XX^e). — *Agocalcium*.
- Lab. de l'Agorenal**, 89, rue Martre, Clichy (Seine). — *Ago-renal*.

- Lab. de l'Agorexine**, 37, av. de la République, Paris (XI^e). — *Agorexine*.
- Lab. N. Aguetant**, 36, quai Fulchiron, Lyon — *Adrénaline Aguetant*, *Ampoules Aguetant*, *Bi-As Aguetant*, *Chrysalmiode Aguetant*, *Néotrope Aguetant*, *Nosol Aguetant*, *Peptargyl Aguetant*, *Picricol Aguetant*, *Salitropine Aguetant*, *Sérum antityphoïdique*, *Stry-Calcium Aguetant*, *Sulfobiol Aguetant*, *Teinture de Cocheux*, *Thi-lip Aguetant*.
- Lab. de l'Aigue d'Or**, 53 bis, bd de la Liberté, Lille. — *Aigue d'Or*.
- Lab. Albu-Coli**, E. Lemonnier, pharmacien, 84, av. de Versailles, Paris (XVI^e). — *Albu-Coli*.
- Lab. Pierre Alexandre**, 41, r. de Rome, Paris. — *Hama-méline Roy*, *Pilules Myosotis*.
- Lab. de l'Alexime**, 8, r. Riblette, Paris (XX^e). — *Alexime*, *Marnal*.
- Lab. Alpha**, Montreux-le-Château (Haut-Rhin). — *Albu-Rénol*, *Anti-Diabète H*, *Baume oculaire Alpha*, *Energétyl*, *Gouttolysine*, *Grains de Seltz*.
- Lab. de l'Amibiasine**, 69, r. de Wattignies, Paris. — *Amibiasine* (*Liquide*, *Comprimés*, *Suppositoires*), *Bioentérase*, *Rectopansement-Amibiasine*.
- Lab. Amicros**, 177, r. de Courcelles, Paris (XVII^e). — *Amicrargol*, *Ampoules Pentamicros*, *Elain Amicros*, *Fer Amicros*, *Orargol* (*Rhino-Orargol*, *Rhino-Orargol éphédriné*, *Gouttes Orargol*, *Collyre Orargol*), *Ovules Amicros*, *Rhodium Amicros*, *Sarcophtol*.
- Lab. des Prod. Amido**, 4, pl. des Vosges, Paris (IV^e). — *Amidal*, *Backerine*, *Génatropine*, *Génésérine*, *Genhyoscyanine*, *Génomorphine*, *Génosthéniques*, *Génosconolamine*, *Génostrychnine*, *Glycobyl*, *Sed'Hormone*, *Vitamyl irradié*.
- Lab. de l'Amiphédrine**, L. Hugon, docteur en pharmacie, 6, pl. Jean-Jaurès, Montrouge (Seine). — *Amiphédrine*.
- Lab. H. Ammann**, 3, impasse Adam, Boulogne-sur-Seine. — *Belhemine*, *Blocs Vécors*.
- Lab. des Ampho-Vaccins Ronchèse**, 21, bd de Raquier, Nice, et 62, r. Charlot, Paris. — *Amphomuth*, *Amphoprophyl T. A. B.*, *Ampho-pulvérisateur*, *Ampho-Quintivaccin*, *Ampho-tablettes*, *Ampho-vaccin anti-infectieux*, *Ampho-vaccin anti-staphylococcique*, *Ampho-vaccin intestinal*, *Ampho-vaccin pansement antipyrogène*, *Ampho-vaccin pansement rhino-pharyngien*, *Ampho-vaccin pulmonaire*, *Ampho-vaccin urinaire*, *Pyo-Amphogel*, *Rhino-Amphogel*.

- Lab. Ana**, 18, av. Daumesnil, Paris. — *Euphorul*, *Euphoryl*, *Infantile*, *Hirudinase*, *Salicylate suractivé Ana*, *Sclérana* (ex-Sclérosérum), *Solvant Ana*, *Spasmoryl*.
- Lab. de l'Analpyrine**, Nomexy (Vosges). — *Analpyrine*, *Biophosyl*, *Calciocholine*, *Cuprinal*, *Gastrolex*, *Liniement Bertrand*, *Quiétudol*, *Sirop pectoral Bertrand*.
- Lab. Androvar**, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort. — *Androvar*, *Androvules*, *Erythéma*.
- Lab. Angelini**, 61, rue de Seine, Paris. — *Depuriode*, *Magbi*, *Nutréol*, *Onction Angelini*, *Onguent Borgia*, *Onguent Prunot*, *Ovules Patrat*, *Pilules Tix*, *Polypeptine*, *Poudre Deol*, *Poudre Floré*, *Sirop Patrat*, *Tonal*, *Vari-sclérine*, *Vin des Indes*, *Phytothérapie coloniale* : *Thé Malgache*, *Thé de Bourbon*, *Uvarion*, *Aphilex*.
- Produits spécialisés « Angla »**, H. Adam, pharmacien, av. de la Madone, Monte-Carlo. — *Antidotase*, *Barbiflorine*, *Cardioflorine*, *Cystoflorine*, *Granusel*, *Hépaflorine*, *Sealandair*, *Trigosthène*.
- Lab. de l'Angiolymphé**, 4 bis, rue Hébert, Courbevoie. — *Angiolymphé*, *Argycuprol*, *Yprine*.
- Lab. de l'Aniodol**, 3-9, rue des Alouettes, Nanterre. — *Algulan*, *Aniodol*.
- Lab. des Antigénines**, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — *Anligénines*, *Biazan*, *Cresentyl*, *Iodosaufryl*, *Jovanyl*.
- Lab. de l'Antiphlogistine**, 11, r. Collange, Levallois-Perret (Seine). — *Antiphlogistine*.
- Lab. de l'Aphosal**, 48 bis, av. Mozart, Paris. — *Aphosal*.
- Lab. de l'Appétyl**, 37, av. de la République, Paris. — *Appétyl*.
- Lab. d'Applications biologiques**. — (Voir à *Labiola*.)
- Sté d'Applications pharmacodynamiques**, 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e). — *Aminophylline*, *Caréna*, *Caréna-Calcium*, *Caréna-Injectable*, *Caréna-Ouabaïne*, *Caréna-Ouabaïne comprimés*, *Chlorophyllé du D^r David*, *Dinitra*, *Erythru*, *Opo-Dinitra*, *Phylla*, *Rhocya*, *Trinitrine-Caréna*, *Théophylline*.
- Sté Générale d'Applications Thérapeutiques**, 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — Voir "*Théraptix*".
- Lab. du D^r Ardely**, 20, rue Antoinette, Paris. — *Philoderme Yldra*.
- Pharmacie Ardoin**, 33, bd Dubouchage, Nice. — *Globules Rébaud*.
- Lab. de l'Argyrophédrine**, 20, avenue J.-Jaurès, Suresnes (Seine). — *Argyrophédrine*, *Ephédramélis*, *Parkipan*, *Sédibaïne*.
- Lab. de l'Armanite**, 3, av. Daumesnil, Paris. — *Armanite*.
- Lab. Armoril**, 7, rue de l'Armorique, Paris. — *Anorexyl*, *Camformine*, *Soutensa*.

- Lab. J.-C. Arnault**, Saint-Just-en-Chaussée (Oise). — *Ergépatine*.
- Lab. Aseptor**, 21, rue de Lyon, Paris (XII^e). — *Aseptorhine*, *Auriculine*, *Boréol*, *Glycalcion*, *Otalgolex*, *Rhinaspir*, *Rosaseptor*.
- Lab. P. Astier**, 42, rue du Dr-Blanche, Paris. — *Arhéol*, *Colitique*, *Condurango granulé Astier*, *Glycophosphates granulés Astier*, *Kola Astier*, *Lyxanthine Astier*, *Néo-Riodine*, *Philentérol*, *Quinquina granulé Astier*, *Riodine*, *Stalysine*.
- Lab. de l'Atospirine et du Strontiode**, 19, rue du Bac, Paris. — *Atospirine*, *Strontiode*.
- Lab. du Dr E. Aubert**, 3, pl. Jussieu, Paris. — *Créacalcine*, *Créatonine*, *Hépatoplasma*, *Kola Aubert caféinée*, *Métacarbène*, *Métacitrine*, *Métaformine comprimé*, *Métaformine granulé*, *Métastérol*, *Néosalicylate*, *Néosplénine*, *Neutrobyl*, *Pancrèbile*, *Parabenzyl*, *Tot'Hépatine*, *Tous produits de marque « Bertal »*.
- Lab. Aubriot**, 56, boul. Ornano, Paris. — *Élixir Bravais*, *Granulé Bravais*, *Vin Bravais*.
- Lab. Aubery**, av. de Monclar, Avignon (Vaucluse). — *Grappuval*, *Plasmobeef*, *Plasmobiol*, *Plasmostérol*, *Séroglobine*, *Vigoria*, *Vin Aubery*, *Vitacarnol*.
- Lab. Auclaire**, 36, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (IX^e), — *Bi-So-Dol*, *Cachets Pulmonix Polvi*, *Colmatol*, *Defensol B*, *Digestif Polvi*, *Endoplex Polvi*, *Gouttes M. I. A.*, *Iodocardine*, *Panveinine*, *Paxyl*, *Prolax*, *Ultracalcium irradié*, *Xanthorryl*.
- Lab. Marcel Audibert**, Cinq-Cantons, Bayonne. — *Vermirène Audibert*.
- Lab. Augier**, 2, rue des Lombards, Paris. — *Affinex*, *Biocalcine*, *Gouttes Sap*, *Isoptal*, *Mensuosédyl*, *Noctisédyl*.
- Lab. A. V. E.**, 56, rue Beaubourg, Paris. — *Cartilos*, *Comprimés N. B. M.*, *Gelchol*, *Gluchol*, *Idonil*, *Idonil au Maté*, *Leptab*, *Osmos*, *Sulsod*, *Vertox*.
- Lab. Badel**, 58-60, rue des Moulins, Valence (Drôme). — *Florosine*, *Gouttes Bronchophiles André*, *Juglanrégine André*, *Kolasthène Badel*, *Mycidol Badel*, *Poudre laxative André*, *Soporine*.
- Lab. G. Baetz**, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — *Cinascol*, *Perasurol*, *Pervosine*.
- Lab. A. Bailly**, 15, rue de Rome, Paris (VIII^e). — *Pulmo Bailly (ex-Pulmosérum)*, *Opobyl*, *Sédacônes*, *Anaxéryl*, *Derphyl*, *Ménatol*, *Panbiol*, *Oxy-Buccol*, *Pyorex*, *Theinol*, *Urophile*, *Oculase*, *Phaguryl*.

- Lab. du Dr Baissade**, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume du Dr Baissade*.
- Lab. du Dr Baraige**, 24, r. Paul-Bert, Paris (XI^e). — *Glutipolysalyl, Glutisalyl, Glutisutyl Infantile, Spécifique Eldé*.
- Lab. Bardet**, 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — *Cachets Kapytan, Capsules Haarlem Bardet, Sédogastrol, Solution Quinquina Bardet, Tœnifuge Bardet, Xantharlem*.
- Lab. Bardiaux et Colomb**, 39, rue de Reims, Vichy (Allier). — *Favexir, Jacopol, Kao-Pepsol, Pavydis, Pepsiphos, Sulfypène, Tensiofuge*.
- Lab. Bardou**, 13, q. Ragobert, Joigny (Yonne). — *Sanargol*.
- Lab. Barthélemy**, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rhône). — *Anaural, Baume St-Roch, Biliboldo, Sirop Escolle, Sirop Pulmophile, Solvurène*.
- Lab. E. Bartier**, Armentières (Nord). — *Myosthène, Stimulaxine*.
- Lab. Basuyaux**, 117, rue de Belleville, Paris. — *Billabstine, Fokienyl, Orthocumène, Ortho-Fokène, Touranol, Touranyl*.
- Lab. Baude**, St-Aubert (Nord). — *Anthrseptol, Emonctine, Syphonéol*.
- Lab. P. Baude**, 72, rue Saint-Dominique, Paris. — *Lympho-sclérol, Nestosyl (Pommade, Solution huileuse, Suppositoires, Ovules), Sérocarbène*.
- Lab. Spécial Bazin**, H. Garraud, pharmacien, 9, cours Victor-Hugo, Bordeaux (Gironde). — *Opothérapie Bazin*.
- Lab. B. C. L.**, 29, fg de Bourgogne, Orléans. — *Also tine, Gastrépatine, Naza capsules, Micloseptol, Totaltonic*.
- Lab. B. E. A.**, 17, faub. des Ancêtres, Belfort. — *Alibourine, Curoxyure*.
- Lab. Beaufour**, 18, pl. Doguereau, Dreux (E.-et-L.). — *Romarène*.
- Lab. Beaugourdon**, 43, av. Kléber, Paris. — *Crème Lygie, Fluosalyl Beaugourdon, Laxatif Fluol, Pandermol (amp. et pommade), Pâte Magali, Sirop Magali*.
- Lab. Beaulieu**, 40, bd de Charonne, Paris. — *Ferandrine Vitalis, Fer-Ovarine Vitalis*.
- Lab. Beauxis-Lagrange**, 72, quai Jemmapes, Paris. — *Acatar, Bensamine, Calomel R. B. Lagrange, Cérébrinol A et B, Dragées Vityl, Infusion orientale RBL, Kamara C. 47, Myrcol, Néophos, Palpitine, Pipérazine RB Lagrange, Prostatols, Rubargyre, Sédartine*.
- Lab. Bebia**, 5, av. E.-Boissier, Nantes (Loire-Inf.). — *Dra-coline, Pommade et Poudre Bebia, Rossoline Lefort, Savon et Suppositoires Bébia*.
- Lab. du Spécifique Bejean**, 12, rue des Hospitalières-St-Gervais, Paris (IV^e), et 30, r. des Francs-Bourgeois. — *Spécifique Bejean*.

- L. Bellères**, 19, rue Drouot, Paris. — *Antirrhoïde*, *Arachise*, *Biophène*, *Dépuratif Kromelinck*, *Désensibilysine*, *Eusomnine*, *Laurenol*, *Lubrokal*, *Opo-plasma*, *Orthogénol*, *Polycaulère*, *Radio-Satil*, *Recresal*, *Sirop Gribbell*, *Uromil*, *Vaccins Ivago* (procédé L. Goldenberg), *Vitagar*.
- Lab. R. Bernardo**, 47, av. de la République, Villeneuve-le-Roi (S.-et-O.). — *Siligone*, *Théostène* (*Scillitique et Simple*).
- Lab. du Dr Bengué et fils**, 16, rue Ballu, Paris (IX^e) — *Baume Bengué*, *Chloréthyle Bengué*, *Anestile Bengué*, *Narcotile Bengué*, *Siphons de Méthyle Bengué*, *Dragées Bengué*, *Néseptol Bengué*, *Opticura Bengué*, *Vegecarnis Bengué*, *Eupurgo Bengué*, *Topique Bengué*.
- Lab. H. Benoit**, Poligny (Jura). — *Arshémo*, *Fer B*.
- Lab. Berger**, 14, rue des Pyramides, Paris. — *Alliocar*, *Calciphose*, *Glutinettes d'Aspirine*, *Gynéose*, *Mariode*, *Ostéoglandulol*, *Valéronal*.
- Lab. Bergevin**, Châteaudun (E.-et-L.). — *Arrhénuclène*.
- Lab. Bernamont**, 87-89, rue du Commerce, Nevers (Nièvre). — *Pommade et Gouttes Bernamont*.
- Lab. Bernard Garcin**, St-Saturnin-lès-Avignon, Vaucluse. — *Bismullium*, *Mucyllium*.
- Lab. G. Bernhard**, 11, rue La Fayette, Paris. — *Ampéline Bernhard*, *Ampelicoûnes Bernhard*, *Essence Alsacienne du Dr Frech*, *Gouttes Sédatives Bernhard*, *Granules des Vosges*, *Kélénol Bernhard*, *Kyralgine Bernhard*, *Poudre antigestralgique Bernhard*, *Sirop Sédatif Bernhard*.
- Lab. Berthelot**, Saint-Ouen-l'Aumône (S.-et-O.). — *Baume Berthelot*.
- Lab. G. Berthon**, Dornes (Nièvre). — *Asthmo Actine Berthon*.
- Lab. Jean Berthoumeyroux**, Souillac (Lot). — *Baume Heptalgine*.
- Lab. A. Besnier**, 1, rue Raynouard, Paris. — *Seneçonine*.
- Lab. R. Beurton**, 2, rue Joubert, Paris. — *Poudre Mass Plastique*.
- Lab. de la Bexinine** — **L. Colin**, 19, rue Saint-Jean, Caen (Calvados). — *Bexinine*.
- Lab. Beytout**, 12, bd St-Martin, Paris. — *Aérophagul*, *Carbonésie*, *Dentoma*, *Hista Injectable*, *Hista Liniment*, *Hista Dimilli*, *Hordénol*, *Kaolinase*, *Kaolinase Belladonnée*, *Lactoma*, *Lait de Magnésie*, *Suppol*, *Thiophyl*, *Tisane Cisbey*, *Véryl*.
- Lab. du Bi-Ci-Pa**, 62, r. du Gros-Noyer, Ermont (S.-et-O.). — *Bi-Ci-Pa*.
- La Bière des Nurses**, Bourg-là-Reinë (Seine). — *Bières pures*: *Diaslasée*, *Hypermallée*, *Santé*, *Elite*, *Lunch*, *Concentré des Nurses*.
- Lab. Biget**, 37, r. Château-Landon, Paris. — *Gynolactyl*.

- Lab. du Bifidigène, 22, rue P^egalle, Paris. — *Bifidigène*.
- Lab. du Bilifluol, 44, rue Marcel-Sembat, Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). — *Bilifluol*, *Hormocarnyl*, *Sanuryl*, *Veinoflux*, *Veinotensyl*.
- Lab. du Biocalyptol, 76, rue Jean-Jaurès, Paris. — *Biocalyptol*.
- Lab. de Biochimie médicale (Ch. Desgrez, D^r en pharmacie), 19-21, rue Van-Loo, Paris. — *Arsénos solvant*, *Collusulfar*, *Ektophanol*, *Sulfarsénol*.
- Lab. Biochimique de l'Est, Lure (Hte-Saône). — *Lemonai*, *Sirop Poléry*.
- Lab. Biolabo, 9, bd Malesherbes, Paris. — *Atalante*, *Demorphène*, *Euneryl*.
- Lab. de Biologie médicale et de Dermothérapie, 8, avenue Walkanaer, Nice. — *Antipiol*, *Desartyl*, *Entérofagos*, *Rhino-Antipiol*.
- Lab. Biologique de l'Île-de-France, 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e). — *Aloplastine*, *Iodocalcium*, *Neurocalcium*, *Pâte à l'eau Aloplastine*, *Sirop Iodocalcium*, *Sirop Sédatif Neurocalcium*.
- Lab. La Biomarine, Dieppe (S.-Inf.). — *Arthritose*, *Embryocytol*, *Embryol*, *Ionyl*, *Marinol*, *Plasmarine*.
- Lab. Biopharmax, 40, quai Jeanne-d'Arc, Chinon (I.-et-L.). — *Akésol Muzi*, *Cellulax*, *Hépasman*, *Ultracrinol*.
- Lab. Biosedra, 37, rue Brochant, Paris (XVII^e). — *Algonal*, *Gastéose*, *Hépanova*, *Higalex*, *Nuclergol*, *Potion Dioga*, *Suppo-Zinol*, *Sympathocrine*, *Veinogène*.
- Produits de la Biothérapie, H. Villette et Cie, pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, Paris. — *Antivirus*, *Arapal*, *Bilivaccins*, *Cellucrine*, *Crysiodal*, *Sanogyl*, *Sanoram*, *Spirogyl*, *Uroscléral*.
- Lab. du Bissyl, 117 ter, r. Ordener, Paris. — *Bissyl*, *Néocrinol*.
- Lab. Pharmaceutiques A. Blanc, Barcelonne-du-Gers (Gers). — *Germoléal*, *Hevoglan*, *Muoleol*.
- Lab. J. Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain). — *Acéryl*, *Cachets du D^r March*, *Collène*, *Nuclarrhol*.
- Lab. Blancher, Vichy (Allier). — *Dragées Vichy-Amaigrissant*, *Laxatif Blancher*.
- Lab. Blanchot, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris. — *Toni-veinine*, *Solution Watelet*.
- Lab. Bloch, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.). — *Arrow-root*, *Blokao*, *Farines de régime*, *Farines de céréales*, *de légumes et de fruits*, *Rapidoats*, *Semoules et flocons de céréales*, *Tapiocas*.

- Lab. Blouin**, 50, r. de Turenne, Paris. — *Adénoseptyl*, *Fluocholine*, *Okamine simple*, *Okamine cystéinée*, *Okamine dragées*, *Poudre Danica*, *Suryali*, *Trinobenzyle*.
- Lab. H. Boissel**, 295 bis, rue de la Benaugue, Bordeaux. — *Mygdal*, *Néoral*, *Opomygdal*, *Paxanus*, *Potion Boissel*, *Thé d'Albret*.
- Lab. P. Boivert**, Montguyon (Char.-Inf.). — *Hépatogénine*.
- Lab. Boize et Alliot**, 9, av. Jean-Jaurès, Lyon. — *Alzine*, *Atomine*, *Diurobromine*, *Diurocardine*, *Diurocystine*, *Logaphos*.
- Lab. du Boldochol**, 145, avenue de Montredon, Marseille (B.-du-R.). — *Boldochol*, *Elixir Percy*, *Heinobiose*, *Microbol*, *Sirop Burgal*, *Sirop Rhégia*, *Uribiol*.
- Lab. du Boldocyna**, A. Jourdin, 6, avenue Victor-Hugo, Paris. — *Boldocyna*.
- Lab. Bomel**, Annonay (Ardèche). — *Ampoules V.-E. Doumer*, *Collutoire V.-E. Doumer*, *Pilules V.-E. Doumer*, *Pommade V.-E. Doumer*.
- Lab. Boncour**, 46, rue de St-Mandé, St-Maurice (Seine). — *Bronchorectine*.
- Lab. Bonetti**, 60, rue E.-Dolet, Malakoff (Seine). — *Diadermine*.
- Lab. Bordelais**, 47, rue Maleret, Bordeaux. — *Anacarboul*, *Anhépalox*, *Cephæmeline*, *Chelicyne*, *Gelciver*, *Enterrargol*, *Phosma*, *Phosphosodine*, *Physioscyamine*, *Poudre Arria*, *Solacitrine*, *Stomagyl*, *Sulcichlorine*.
- Lab. Borne**, 79, r. de Paris, St-Denis. — *Barcan*, *Benzéthol*, *Chocochaux*, *Diocamphine*, *Dionine*, *Lysococcine*, *Thiosédal*.
- Lab. Bornet**, 5, bd des Brotteaux, Lyon. — *Bismuth B3*.
- Lab. Bottu**, 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris. — *Codoforme Bottu*, *Gaze néolée*, *Néalgyl Bottu*, *Néol*, *Néolides*, *Ovunéol Bottu*.
- Lab. A. Bouchand**, Pharmacien, Melle (Deux-Sèvres). — *Basmyl*.
- Lab. E.-Bouchara**, 47, r. de Bretagne, Paris. — *Belanesie*, *Biphédrine Aqueuse*, *Biphédrine Huileuse*, *Epanal*, *Neo-Codion* (Gouttes et Dragées).
- Lab. P. Bouchereau**, 57, bd Aristide-Briand, Champigny (Seine). — *Diphasol*, *Phéniodine*, *Saliformiode*.
- Lab. Boucly**, Grande-Place, Louvroil (Nord). — *Génurine*, *Hepentéryl*.
- Lab. Boudier**, 37, rue de Bourgogne, Paris (VII^e). — *Aminophylline Boudier*.
- Lab. Boudin**, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Réulsif Boudin*.
- Lab. Bouillet**, 48, bd des Batignolles, Paris. — *Bismuth Tulasne*, *Sous-Nitrate de Bismuth Tulasne pur*, *Iodulane*.

- Lab. H. Bouisset, Pharmacten**, 18, bd de Strasbourg, Albi (Tarn). — *Néosédyl*.
- Lab. H. Boulay**, 62, r. de Montreuil, Paris. — *Calcériode Marin*.
- Lab. G. Boulet**, 14, rue Eug.-Delacroix, Paris (XVI^e). — *Craægol*, *Dragées de Prasion*, *Stomacol*.
- Lab. E. Boulle**, 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine). — *Cataplasme du D^r Lelièvre*, *Géranine*, *Rachisténine*, *Sérosine Boulle*, *Vermilox*.
- Lab. Bourdou**, Frontignan (Hérault). — *Gynepta*, *Heptyl Bourdou*, *Uvasihène*.
- Lab. Bourillot**, 6, r. Berbissey, Dijon. — *Bourdainol* (comprimés), *Bronphélia*, *Bronchialis*, *Bronchophilos*, *Bronxia*, *Choleocytol*, *Dragées et Elixir aux Algues-Marines*, *Hétraménol*, *Jouvéin B*, *Lacta*, *Morufine*, *Odochloraline*, *Polycalcase*, *Renovir*, *Sirop Chevassus*, *Toxurrol*, *Vermus* (sirop).
- Lab. G. Bousquet**, Albi (Tarn). — *Tubes Ferlux Ratio*.
- Lab. Jean Boutes**, rue Clément-Ader, Muret (Haute-Garonne). — *Drosol*, *Pansements gras Maujean* (simple et aux essences).
- Lab. Bouteille**, 23, r. des Moines, Paris. — *Balseptol*, *Cantéine*, *Disuryl*, *Neurobore*, *Pulmorectol*, *Pulmovaccin*, *Tubérol*, *Vaccinovules*.
- Lab. B. Boutin**, 8, rue Aumont-Thiéville, Paris (XVII^e). — *Iso-Sels*, *Orthocynol*.
- Lab. Boutroux**, 25, rue du Général-Foy, Paris (VIII^e). — *Comprimés Chloripepsine*, *Comprimés Fluvia*, *Microderme* (crème et solution), *Soja Soyolk*, *Streptoderme Végélact*, *Soja*.
- Lab. Bouty**, 3, rue de Dunkerque, Paris. — *Biliol*, *Gastrozymase*, *Globépal*, *Liqueur Bouty*, *Liqueur Thyro*, *Liquides organiques injectables*, *Métasérum*, *Métharfer*, *Métharsol*, *Néphrine*, *Opostyl*, *Opothérapie Bouty*, *Ovigénine*, *Produits Pennès*, *Sérosthényl*, *Sirop de Gaïarsol*, *Surrénaline*, *Thyroidine*, *Triglandine*, *Triglandol*, *Vaxitiol Bouty*.
- Lab. Bouvot**, Auvers-sur-Oise (S.-et-O.). — *Bichlorone*, *Oérelode*, *Pastilles Arvox*, *Rhinarvox*, *Sulfoxyne*, *Yro*.
- Lab. Bouyssou**, Chambois (Orne). — *Biophytol*, *Helenine de Korab*, *Panhemol*, *Peplozym*, *Sirop Froment*, *Tonique Chapès*.
- Lab. Boyer**, 12, r. Pavée, Paris. — *Biogastrol*, *Phosbiose*.
- Lab. Bracquemond et Cie**, 105, rue de Normandie, Courbevoie. — *Morrhuéline Jungkem*, *Morrhuéline Jungken Vitaminée*, *Sel d'Ewald*.
- Lab. d'Analyses Bréant**, 11, rue de Clichy, Paris. — *Allergine*, *Cédrosan*, *Chlorure d'Ammonium Bréant*, *Daturasolène*, *Lycobile*, *Neurosolène*, *Osmo-Vaccins Bréant*, *Paragelose*, *Phostone*, *Précy*, *Tegeol*, *Vanotonyl*.

- Lab. Ch. Brésil**, 12, rue St-Gilles, Paris. — *Broncosol*, *Sanguil*
- Lab. Brichard et fils**, 23, bd Raym.-Poincaré, Bar-le-Duc. — *Alcalino-Gastryl*, *Belvuline*, *Bronchorose*, *Elixir St-Jean*, *Forvital*, *Hémovéine*, *Inhalopin*, *Isalaxine*, *Nuxiodine*, *Nydol*, *Pastilles Bala*, *Pastilles Debar*, *Pecto-Bronchyl*, *Reinaxine*, *Sirop Bala*, *Sirop Brichard*, *Sirop Debar*, *Supporhoïdes*, *Thyroguine*, *Tonixyl*, *Urobarine*, *Veinixir*, *Vigostérol irradié*.
- Lab. G. Briens**, 20-22, rue de la République, Lyon. — *Dra-gées Bondonneau*.
- Lab. de la Brilo-Entérine**, Piette, pharmacien, Etréaupont (Aisne). — *Brilo-Entérine*.
- Lab. Brisson**, 157, rue Championnet, Paris. — *Ampoules Egralène*, *Ampoules huile soufrée*, *Ampoules Sigmuth*, *Anytal Brisson*, *Bainsulphium*, *Cathiode Brisson*, *Denisia*, *Denisoline*, *Dithioléine Brisson*, *Doliseti*, *Entéricure Brisson*, *Jovine Brisson*, *Laccodermes Brisson*, *Lenicade Brisson*, *Licardet Brisson*, *Néo-Séti*, *Procuta Brisson*, *Savon Denisol Brisson*, *Vaposulphium*, *Vulcase Brisson*, *Vulcapil Brisson*, *Uriclarine Brisson*, *Septylase Brisson*, *Séti*.
- Lab. Brochon**, 202 bis, rue de Paris, Clamart (Seine). — *Combretine*, *Cratægus Boquillon*, *Huiles Duret*, *Tænifuge Limousin*.
- Lab. du Broncho-Lactol**, 6, place de l'Académie, Angers. — *Broncho-Lactol*, *Lithinés Magnésiés Maxim*.
- Lab. P. Brothier**, 20, rue Henri-Martin, Vanves (Seine). — *Axonal*, *Emencyl*, *Neuronal*.
- Lab. Bruneau et Cie**, 17, rue de Berri, Paris. — *Bain de bouche à la Duna-caïne*, *Brunyl*, *Cutiphile*, *Cutiplaste*, *Duna-caïne*, *Duna-caïmol*, *Lobéline*, *Paraffinoléol*, *Parémanol*, *Sénophile*, *Sérum de Jousset*, *Théophylline Bruneau*.
- Lab. A. Brunot**, 16, rue de Boulainvilliers, Paris. — *Dialyl*, *Sel de Hunt*.
- Lab. Brunschwik**, 3 bis, rue Vallier, Levallois-Perret. — *Parvula*, *Tonique Rouveray*.
- Lab. du Bufox**, 21, rue Grange-aux-Belles, Paris. — *Bufox*.
- Lab. Buriat**, 37, rue Spontini, Paris. — *Arséniode Buriat*, *Vériane Buriat*.
- Lab. du Dr Butler**, Boguet, pharmacien, 1, rue Bossuet, Dijon. — *Pommade du Dr Butler*, *Poudre du Dr Butler*.
- Lab. du Buxema**, J. Avril, 18, rue Thiers, Mantes-Gassicourt (S.-et-O.). — *Buxema*.
- Etab. Byla**, 26, avenue de l'Observatoire, Paris. — *Adréna-line Byla*, *Amino-sel*, *Aminine*, *Antélobine*, *Di-Iodotyrosine Byla*, *Di-bromotyrosine Byla*, *Energé-tènes Byla*, *Ergotinine Tanret*, *Galactogène Byla*, *Gélo-Pansements*, *Gélopeptone*, *Hémosérol*, *Héparmone*,

Hépatomusculosine, Hormoduodine, Hormoflavéine, Hormones Hypophysaires Byla, Hormovarine, Insuline Byla, Irrastérine, Musculosine Byla, Neurotrophol, Paralactine, Paratyronine, Peptone Iodée Byla, Pelletérienne Tanret, Peptone Byla, Phylactone, Phosphophine, Phytogénine, Pituitobine, Splénamine, Splénarmone, Splényl, Surrasthénine, Thyraloxine, Thyroxine Byla, Vagotonine, Vitadone, Vitamine B¹ Byla, Vitamine B² Byla, Vitamine C Byla, Vitamine E Byla, Vitaminol.

Lab. des Spécialités Cabasson, 183, rue de Rome, Marseille. — *Cyto-Sirop, Dynosthène, Granulé Cabasson, Pulmo-septine.*

Lab. Caducia, 95, r. de Vaugirard, Paris (VI^e). — *Clinax, Drainochol, Phosphan Caducia, Sténacrine.*

Lab. Caillaud, 37, rue de la Fédération, Paris. — *Aldine, Choléo Combretol, Cyanhermine, Hydralin, Mucosodine.*

Lab. H. Calas, 162, rue de l'Hay, Gentilly (Seine). — *Intestarsol.*

Lab. du Calcio-Dynamyl, 45, rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine). — *Calcio-Dynamil.*

Lab. Calmel-Domergue, 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse. — *Arsétonyl, Arthricétol, Biiodures Domergue, Complexe Ovarien Caldo, Dermobel, Ephédro-Rhinol, Eucalcyl, Gonurol A et B, Guinitrol, Hexarubrine, Iodures Domergue, Pangynol, Pharyngaseptyl, Polydigerol Calmel, Promulier, Sanguinova, Vaso-rhinol simple, Vaso-rhinol mentholé, Vaso-rhinol adrénaliné, Viscosodine.*

Lab. Calmopelvine-Calmovarine, 192-194, r. St-Denis, Paris. — *Calmopelvine, Calmovarine, Suppositoires Calmopelvine, Suppositoires Calmovarine.*

Lab. des Calmosuppos, La Mothe-Ste-Héraye (Deux-Sèvres). — *Calmosuppos antithermiques, Calmosuppos sédatifs.*

Lab. Camuset, 18, rue Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal, Pyrétane, Silicyl.*

Lab. du Canol, Maizet (Calvados). — *Canol.*

Lab. Cantin, Palaiseau (S.-et-O.). — *Comprimés Nican, Gouttes Nican, Somnothyrid.*

Lab. A. Capitel, 16, bd des Filles-du-Calvaire, Paris. — *Antirhumatismal Nuder, Aortol, Cachets Vilax.*

Lab. du Carbonal, 14, rue Cantin, Courbevoie (Seine). — *Carbonal Magnésien, Carbonal Princeps.*

- Lab. Carbou**, 8, rue Jean-du-Bellay, Paris. — *Cholétlyse*.
- Lab. du Cardosol**, 32, rue Martinat, Asnières (Seine). — *Cardosol*.
- Lab. René Carlier**, 43, r. de Créteil, Joinville-le-Pont (Seine). — *Colarsénol collutoire*, *Colarsénol pommade nasale*, *Infangyl Carlier*, *Rectosote*.
- Prod. Biologiques Carrion**, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris. — *Adrénaline*, *Antasthène*, *Cardio-Streptine*, *Coliflorine*, *Dyspeptine Hepp*, *Entérococcène*, *Eukinase*, *Evatmine*, *Gonagone*, *Hémaloéthyréine*, *Hépaglycérol*, *Hépanème*, *Lactifère*, *Lactoprotéide*, *Lactosérum*, *Opothérapie Carrion*, *Ovules au Gonagone*, *Pancréalokinase*, *Per-Extraits*, *Per-Hépatique*, *Per-Ovariën*, *Per-Surrénalien*, *Per-Thymique*, *Phlébosine M. et F.*, *Plasma de Quinlon*, *Rétropituine*, *Solution du D^r Jacobson*, *Staphylagone*, *Sulfagone*, *Uléro-Streptine*, *Vaccins Carrion*.
- Lab. Carrion-Lagnel**, 5, rue du Capitaine-Scott, Paris. — *Babeurres*, *Kéfirogène*, *Laits Carrion*, *Yohourthogène*.
- Lab. Carron**, 69, rue de St-Cloud, Clamart. — *Amiphène*, *Fosfoxyl*, *Fosyls*.
- Lab. Carteret**, 15, rue d'Argenteuil, Paris. — *Bactioxylène*, *Cétémol*, *Chrysemine Carteret*, *Diurène*, *Euronal*, *Fermentérol*, *Lusoforme*, *Sinahin*, *Vulcrinol*.
- Lab. du Castanol**, 9, pl. Municipale, Tulle. — *Castanol*, *Dépuratif Sainte*, *Myrtoline*, *Thionaphte*.
- Lab. Castel**, 1, pl. Bouquerie, Nîmes. — *Oxyfuge*, *Pavonol*, *Tœnifuge*, *Vermifuge Castel*, *Zogol*.
- Lab. Catillon**, 3, bd St-Martin, Paris (III^e). — *Glycérine Catillon*, *Iodo-thyréine Catillon*, *Peptone Catillon*, *Strophantine Catillon*, *Strophantus Catillon*.
- Lab. du D^r R. Cavaillès**, 29, r. Singer, Paris (XVI^e). — *Coloplastre*, *Crème du D^r Rap*, *Crème de Quinine-Sapolan*, *Emplâtres Rogé-Cavaillès*, *Extrait du D^r Rap*, *Gaze Anadhère*, *Lait de Cèdre Sapolan*, *Lait de Sapolan*, *Lait de Soufre Sapolan*, *Poudre de Soufre Sapolan*, *Sapobarbe*, *Sapocade*, *Sapocrème*, *Sapolan*, *Sapopâte*, *Saposide*, *Savon de Sapolan*, *Sulfostan*, *Tisane dépurative de Cavaillès*.
- Lab. Cébé**, St-Just-sur-Loire (Loire). — *Thio-Goudron*.
- Lab. Central**, 2, pl. de la Porte-des-Ternes, Paris. — *Lactaris*.
- Lab. Central de la Bastille**, 3, bd Beaumarchais, Paris. — *Capsules Ricord*, *Cimalvol*, *Endolcalcine*, *Ferogyl*, *Inhalogène*, *Iodamol Michel*, *Iodo-Brou*, *Lactalvose*, *Mensalgine*, *Saluralgine*, *Sédasthmine*.
- Lab. Central de Châtel-Guyon** (P.-de-D.). — *Laxo-Psylim*, *Landon*, *Phosphobiase*.
- Lab. Central de Paris**, 122, fg. St-Honoré, Paris. — *Oléthyle Benzyle*.

- Lab. de la Cérébrine Fournier**, 6 bis, rue Campagne-Première, Paris (XIV^e). — *Cérébrine Fournier*.
- Lab. Yves Chabrol**, 29, avenue d'Orléans, Paris. — *Gastro-sihénol*, *Huilorhine*, *Quotibyl*.
- Lab. Pharmaceutiques Chabre Frères**, Toulon. — *A 313*, *Vitaol*.
- Lab. Chaix**, 8-10, rue Alphonse-Bertillon, Paris (XV^e). — *Colloïdogénine du D^r Bayle*, *Polyvaline du D^r Bayle*, *Splenomedulla* (opothérapie splénique et médullaire).
- Lab. Chalas**, 75, rue Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine. — *Kolatinés*.
- Lab. Chamard et Niel**, 3, rue Royet, Lyon-Caluire. — *Bismu-sodine*, *Calmobro-Niel* (ex *Kalmobrol*), *Ergephos*.
- Lab. Chambon**, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne). — *Antisciatique P. Chambon*, *Angoral*, *Algoil du D^r Guiraud*.
- Lab. Chambron**, Portes (Drôme). — *Biorégine*.
- Lab. Chanteaud**, 3 et 5, rue Alex.-Dumas, St-Ouen (Seine). — *Granules Chanteaud*, *Kénapirine Chanteaud*, *Sedlitz Chanteaud*, *Sténol Chanteaud*, *Sulshydral Chanteaud*, *Uréol Chanteaud*, *Granules Antinausiques*.
- Lab. Chantereau** (Prod. Innothéra), 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum*, *Sympathyl*, *Tot'Hamélis*, *Tot'Héma*.
- Lab. A. Chapellier**, Champagnac-le-Vieux (Haute-Loire). — *Curamida*.
- Lab. Chapotot**, 56, bd Ornano, Paris. — *Néo-laxatif Chapotot*, *Pyroselline*, *Rhizotannin Chapotot*.
- Lab. des Charbons Fraudin**, 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine). — *Benzoate de naphthol Fraudin*, *Biscols*, *Carboiodures Fraudin*, *Charbon Fraudin belladonné*, *Charbon Fraudin naphtolé*, *Charbon Fraudin simple* (granulés, comprimés, dragées), *Laxol Fraudin*.
- Lab. Alph Charmaison**, 26, av. de Royat, Chamalières-lès-Clermont-Ferrand (P.-de-D.). — *Dragées de Royat*, *Gobérol*, *Hépaloformine*.
- Lab. E. Charpentier**, 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris. — *Boldolaxine*, *Calyptol Charpentier*, *Quinocarbine*.
- Sté des Mines de Charrier**, Laprugne (Allier). — *Charrier* (*Eau Minérale Naturelle Vivante*).
- Lab. Chartier**, Saumur (M.-et-L.). — *La Myrtille pure H. Chartier*, *Le Raisin quotidien*, *Le Suc Normand*.
- Lab. Chassaing**, Le Coq et C^{ie}, 1, quai Aulagnier, Asnières (Seine). — *Dioséine Prunier*, *Néro-Neurosine Prunier*, *Neurosine Prunier*, *Novacétine Prunier*.
- Lab. Pierre Château**, 33, rue du Bois, Vincennes. — *Digéryl*, *Inhalyl*, *Sinuzyl*.
- Lab. Chatelut**, 65, rue Louis-Blanc, Paris. — *Dragées Névros-théniques*, *Dragées Yse*, *Hémagénine Giraud*.

- Lab. Chatron**, 45, r. Cambronne, Paris (XV^e). — *Boldomucyl*, *Dystonine*, *Normucyl*.
- Pharmacie Chaumel**, 87, rue La Fayette, Paris. — *Isotonyl* Bouret (poudre de Lausanne), *Normatensol*.
- Établ. Alfred Chauvin**, Aubenas (Ardèche). — *Acoégénol*, *Atropophédrine*, *Cachets Chauvin au Quinocitrate de Lithine composé*, *Collohirtol*, *Comprimés Chauvin à l'extrait d'Alibour*, *Dépuratif Chauvin aux hyposulfites*, *Désensibilisant Chauvin*, *Ergophédrine*, *Gouttes Chauvin à l'Audisclérocure*, *Gouttes Chauvin à la Sclérocure*, *Laborol*, *Lactoscoparine*, *Paratyl*, *Phocéol*, *Sirop Chauvin à l'Adréno-Ephédrine*, *Sirop de Sozopectone Ephédriné*, *Tubes Blache*, *Tubes Chauvin*.
- Lab. L. Chauvin**, 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e). — *Asthmo-lène*, *Cachets Spévin*, *Glucamonix*, *Glucocithine*, *Gluconyl*, *Glucosium*, *Gluquinix*, *Inhess*, *Levulinyl*, *Olegel*, *Selor*, *Solubéol*.
- Lab. Chavialle**, 70, Grande-Rue, Sèvres. — *Fornosse*, *Suppositoires Pyrax* (bébés, enfants, adultes).
- Lab. R. Chemineau**, Vouvray (I.-et-L.). — *Gargyl*.
- Lab. Chenu**, Montferrand (Puy-de-Dôme). — *Bromocodéine Chenu*, *Digestal*, *Sulfoterpinol* (élixir et cachets).
- Lab. Chevillon**, 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.). — *Bilio-gastrine*, *Bylac*, *Morisland*, *Nucléigène*, *Paradoxex*, *Paradoline*, *Stoméol*.
- Lab. Chevretin-Lematte**, 52, r. La Bruyère, Paris. — (Voir **Lab. Lematte et Boinot**.)
- Lab. Chiarini**, Aix-en-Provence (B.-du-R.). — *Elixir vermifuge Chiarini*, *Tœnifuge du Dr Jaquème*.
- Lab. Chibret**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Ferrand. — *Collyres et Pommades Chibret « Optima »*, *Chibromercurobrome* sous toutes ses formes, solution, ovules, ampoules lavages et ampoules injectables, collyre, tube et collutoire, *choloptomercuro*, *humeur aqueuse artificielle*.
- Lab. de Chimio-Opothérapie**, 22, rue de Turbigo, Paris. — *Bal-sofumine simple et mentholée à 1 et 4 p. 100*, *Balsorhine* (Huile, Capsules, Pommade), *Nucléinovarine*, *Pepsobyl*.
- Lab. de Chimiothérapie Antibactérienne**, 16, route d'Abbeville (Somme). — *Métasulfamide*.
- Sté Chimique de Vichy**. — **P. V. Léger**, Saint-Pourçain (Allier). — *Cupranine*.
- Lab. de la Chloralguine**, 6, cours Victor-Hugo, Cayavillon. — *Chloralguine*, *Gouttes Hélis*.
- Lab. Choay**, 48, av. Théophile-Gautier, Paris (XVI^e). — *Opothérapie Choay* : Extraits totaux, Extraits injectables Synchrones, *Peptosthénine*, *Adrénaline Choay*, *Insuline Choay*, *Post-Hypophyse Choay*, *Gélotanin Choay*.

- Lab. du Chocynol**, Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or). — *Chocynol*, *Pommade Ascigué*, *Kaomag*, *Veinophos*, *Sarcohémol*, *Terpopneumol*, *Bronchopuerol*, *Choléoclinol*.
- Lab. Christiaens**, D^r René Marq, S^r (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale), 4, rue Colbert, Reims. — *Antialgos Christiaens*, *Benzophosphine Christiaens*, *Capsules Goubaux*, *Pilules anhépatiques Christiaens*, *Pilules prophylactiques Christiaens*, *Sédatine Christiaens*.
- Lab. des Produits du D^r Churchill**, 92, av. de St-Mandé, Paris (XII^e). — *Fosfomagnyl Churchill*, *Limol Churchill*, *Magol Churchill*, *Poliol Churchill*.
- Lab. Ciba**, 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — *Agomensine*, *Androstine*, *Ascéine*, *Atoquinol*, *Cibal-gine*, *Coagulène et Hém-Coagulène*, *Coramine*, *Dial*, *Didial*, *Digifoline*, *Elbon*, *Enléro-Vioforme*, *Ferrophytine*, *Fortossan*, *Fortossan irradié*, *Hémypnal*, *Lipoiodine*, *Perandrone*, *Percaïnal*, *Percaïne*, *Péristaltine*, *Phytine*, *Quinino-phytine*, *Résyl*, *Salène-Salénal*, *Sanoquinol*, *Sistomensine*, *Trasentine*, *Vioforme*.
- Lab. Léon Claeys**, 1, bd St-Martin, Paris (III^e). — *Babeurre Nutricia*.
- Lab. A. Clanché**, Vars (Charente). — *Antepsal interne*, *Dolotensine*.
- Lab. Clars**, 18, rue St-Sulpice, Paris. — *Chromomercuroil Clars*, *Fortitonyl Clars*, *Iodo-Sodyl Clars*.
- Lab. Clartyl**, Bapaume, pharmacien, 85, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. — *Histaclartyl*.
- Lab. du D^r J.-P. Clary**, Vauris, pharmacien, 72, av. Kléber, Paris (XVI^e). — *Iodo-Magnésium*.
- Lab. Claverie**, pl. Carnot, Romainville (Seine). — *Occi-Gourme*, *Stomobrol*.
- Lab. Clin**, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris (V^e). — *Adrénaline Clin*, *Cinnozyl*, *Electrargol*, *Arsaminol*, *Elixir Deret*, *Enesol*, *Néo et Sulfo-Tréparsénan*, *Odarsol*, *Salicylate de soude Clin*, *Sérums Clin*, *Sirop d'Aubergier*, *Sirop de Sirtal*, *Paderyl*, *Soluroil*, *Sparto-Camphre*, *Spartoval*, *Génisténal*, *Iogol*, *Lyso-Choc*, *Orthosiphène*, *Vaccins Clin*, *Pyovargol*, etc.
- Lab. Cluzel**, 60, cours Émile-Zola, Lyon. — *Gouttes Milko*, *Mictualine*, *Révuksif Milko*, *Tablettes Zéva*, *Tonique Zéva*.
- Lab. de la Cobratoxine**, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris. — *Cobratoxine nouvelle (Katox)*, *Cobrallyre*.
- Lab. des Produits Cody**, Brive-la-Gaillarde (Corrèze). — *Iodo-Citrol*.
- Lab. des Prod. Cognet** (Armingeat et Cie), 43, rue de Saintonge, Paris (III^e). — *Tiodine Cognet*, *Thiosinamine Cognet*, *Agonol Cognet*, *Capsules Cognet*, *Dragées de fer Cognet*, *Dragées Dubourg*, *Hemoneurol Cognet*.
- Lab. A. Colrier**, 69, av. du Maine, Paris. — *Codérax*, *Marrucol*, *Tisans Borkou*.

- Lab. du Dr Coirre**, 5, bd Montparnasse, Paris. — *Allium Coirre*, *Chlorhydropeptine*, *Granules Phosphure de Zinc*, *Juranol*, *Levure Coirre*, *Ophthéium*, *Solucalcine*, *Solution Coirre*.
- Lab. Colas**, 133, r. Lecourbe, Paris. — *Apaisyl*, *Argy*, *Asclé*, *Baldisédan*, *Choléolax*, *Filhosa*, *Gaiacanthine*, *Gynoster*, *Marrusera*, *Nitracaine*, *Pulmoseptol*, *Purpuro*, *Rhinorcine*, *Urocarbol benzo-naphtolé*.
- Sté des Prod. Collas et Boudault, Mouznaud et C^{ie}**, Longjumeau (S.-et-O.). — *Pyrélaïne Collas*, *Pommade et savon au Goudron*, *Baume Chiron*, *Elixir et poudre de Pepsine Boudault*, *Pilules Ecossaises Collas*, *Bougies camphrées Collas*, *Elixir des Jacobins de Rouen*.
- Lab. de la Collocrine**, 155, bd Aristide-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.). — *Citrolactine*, *Collocrine*, *Pyodont 21*, *Sécurigène*, *Sédangor*, *Sternol*, *Stomolan*.
- Lab. des Collovaccins**, 74, rue Blanche, Paris (IX^e). — *Collobacilline du Dr Grimberg*, *Collovaccins*.
- Lab. Colonial**, 21, rue Mouton-Duvernet, Paris (XIV^e). — *Mosti*, *Périol Soulié*, *Phosphonine Soulié*, *Tricophan*.
- Lab. Columeau**, 24, r. Flégier, Marseille. — *Custodine*, *Poudre Cassarini*.
- Lab. Combefreyroux**, 134, av. Parmentier, Paris (XI^e). — *Alcachol*, *Combey-Lax*.
- Lab. Comte**, 60-62, rue St-Guilhem, Montpellier. — *Marrubiase*, *Rythmosystol*.
- Lab. Condou et Lefort**, 61, av. Philippe-Auguste, Paris. — (Voir *Trouette-Perret*.)
- Lab. C. Cons**, rue des Écoles, Chambéry. — *Juglane*.
- Lab. Coquela**, Digoin (S.-et-L.). — *Compressif Beslier*, *Coqluplaste*, *Tulle rose Beslier*, *Vésicatoire Rose Beslier*.
- Lab. Corbière**, 27, rue Desrenaudes, Paris. — *Alcalinose*, *Benzylcalcium*, *Broncho-Vaclydun*, *Calcium Corbière*, *Cellargos*, *Coli-Vaclydun*, *Créagénol*, *Cytocholine*, *Cytomanganol*, *Cytopepsal*, *Cytophédrine*, *Cyto-serum*, *Cyto-Strychnine*, *Dermaline*, *Entéro-Vaclydun*, *Gono-Vaclydun*, *Gynéco-Vaclydun*, *Grippo-Vaclydun*, *Hémocytosérum*, *Iolase*, *Lacto magnésie Vila*, *Novarsénobenzol*, *Oléoformine*, *Oliolase*, *Ophtalmiso 8*, *Opolaxyl*, *Paludase*, *Pantavoine*, *Pyo-Vaclydun*, *Rhino-Vaclydun*, *Sérum antrasthmatic de Heckel*, *Slaphylo-Vaclydun*, *Strepto-Vaclydun*, *Suppositoires à l'arséno-benzol Corbière*, *Vaclyderm*.
- Lab. Cornaud et Brossard**, 1, rue du Cordouan, La Rochelle. — *Io-Salyl*, *Névralgol Brossard*.
- Lab. Corteel**, 74, rue de La Fère, Saint-Quentin (Aisne). — *Citra-Quint*, *Dio-Quint*.
- Lab. Cortial**, 7, rue de l'Armorique, Paris. — *Androcalcion*, *Cortiode*, *Gynocalcion*, *Iodaseptine*, *Iodaseptine salicylée*, *Lita*, *Septicémine*, *Vitamine D Cortial*.

- Lab. Coudere**, 28, rue du Four, Paris. — *Pyralium*.
- Lab. Coudert**, 13, rue Antoine-Vollon, Paris (XII^e). — *Hémostatique Coudert*.
- Lab. R. Coudert**, 19, av. Payret-Dortail, Le Plessis-Robinson (Seine). — *Hépartichaut adultes et infantile*.
- Lab. Coulloux**, 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne). — *Baume Kalendol, Pectoral Coulloux, Sirop Brahma*.
- Lab. Courtin**, Attichy (Oise). — *Zomo-Sthenol*.
- Lab. A. Cousin**, Estissac (Aube). — *Chélibile, Sténic*.
- Lab. G. Coussinet**, 22, rue des Martyrs, Paris. — *Aliment Edel, Bursol, Codocol, Colibacine, Cuzinargol, Gastro-Sédatif Atcia, Métallophédrine, Opolonine, Pommade Zylor, Septicema, Sodamine, Sulfolax, Utersan, Vago-sedyl*.
- Lab. du D^r Couture**, 2, rue du Pensionnat, Lyon. — *Carni-calcine, Cynaboldine, Jécocarbine, Jécoboldine, Jécolaxine, Jecosedyl, Lubrilax, Normaflux*.
- Lab. Couturieux**, 18, av. Hoche, Paris. — *Anti-paludique, Argolion, Aurion, Azufrol, Bismuthion, Bromiase, Collargol, Cuprion, Cytuline, Diurétique, Fébrifuge, Fer-ion, Glésol, Glycolactimase, Héracléine, Iodurase, Lactimase, Lantol, Levurine extractive, Levurine brute, Métaux colloïdaux, Panglandine, Plurion, Polyformiate, Séléniol, Stanion, Sulfurion, Zymion*.
- Lab. Couvert**, 11, rue de Mogador, Paris (IX^e). — *Bil Soda, Gastroniger, Harledine, Hemoluol*.
- Lab. de la Créoformine**, 18, r. de Jouvence, Dijon. — *Créo-formine*.
- Lab. Creuzé**, 74, rue de Lourmel, Paris. — *Antixénol, Cholégastrol, Crèmes-Vaccins, Eucratol, Laxafégine, Polyseptol, Rhino sec, Rhino-Vaccin Creuzé, Sténophos, Strychnophyl, Vaccin M. A.*
- Lab. Crinex-Uvé**, 1, avenue du D^r-Lannelongue, Paris. — *Crinex, Crinex-Orex, Folliculine Crinex, Frénovex, Orex, Uvé, Uvéstérol*.
- Lab. du Crinoflux**, 41, rue Germain, Lyon. — *Crinoflux, Paxineurol, Ultracalcine*.
- Lab. Crosnier**, 44, rue de Lagny, Montreuil (Seine). — *Biosodine, Neuroflorine, Sirop Minéral sulfureux Crosnier, Stanno-Sufrol Crosnier, Sufrol Crosnier*.
- Lab. Crouy**, Vernon (Eure). — *Urophényl*.
- Lab. de Phytothérapie du D^r Cuguillière**, 19, r. des Chalets Toulouse. — *Sérum végétal, Vin Pyrola*.
- Lab. R. Cuniasse**, 6, pl. des Ternes, Paris (XVII^e). — *Arg-Eph, Hyol*.

Lab. de la Curatine Brunet, 23, rue des Écouffes, Paris. — *Curatine Brunet*.

Lab. M. Curie, 40, r. François-I^{er}, Paris. — *Sucre « Vila D »*.

Lab. Daguin, 7-13, rue Bobillot, Saint-Maur (Seine). — *Choléolactol, Novolactol, Pneumostyl, Purganol Daguin*.

Lab. Dalayeun, 15, rue de Paris, Sannois (S.-et-O.). — *Sulfan*.

Spéc. Pharm. C. Dalin, 49, quai St-Vincent, Lyon. — *Cérébrosthénine, Glycocarpine, Kydalose*.

Lab. de l'Industrie de la pomme, Dallery, 75, av. Victor-Hugo, Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe). — *Jus Intégral de Pommes Fraîches « Dallery »*.

Lab. Dagonnot, 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.). — *Artobyl, Charleben, Cinarascol, Colilactol, Neuropfos, Uvécalcion*.

Lab. Daney, 134, cours de Verdun, Bordeaux. — *Cryptosote Néda, Tonique Néda*.

Lab. A. Daniel Brunet, 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-Seine. — *Biocrina, Cholergine, Coréine, Hépatobyl, Neurène, Novo-Brol, Ostéo-hépatine, Ovobiol, Ovothyrol, Pulvita, Stal Kosal, Tænistige Kirn, Tanno-Calchine*.

Lab. Danjou, 28, rue de l'Hôpital-Militaire, Lille (Nord). — *Anapeptone, Pepto-Magnésie Vassal, Peptone Vassal*.

Prod. Dannec'h (MM. Brun et Martineau), 64, rue des Tournelles, Paris. — *Cachets Phébor, Chloridia, Cigares Gicquel, Laxia Dannec'h, Manganésia, Papier Gicquel*.

M. J. Dardelet, Bonnard (Yonne). — *Babeurre Dardelet, Laits Dardelet*.

Établ. Darrasse, 13, rue Pavée, Paris. — *Flétobiol, Pepto-fer du D^r Jaillel, Tamar Indien Grillon, Valérobromine Legrand*.

Lab. Darrasse, rue St-Maurice, Nanterre. — *Choléine Camus, Choléine lactique, Dragées Séranti, Eupnine Vernade, Lactobacilline, Magécarine*.

Lab. Pharmaceutique Daufresne, 42, rue Thiers, Le Havre. — *Clonazone, Hydroclonazone, Stéramine, Talcazone, Vaccin Provac's*.

Lab. Daupez, 37, rue des Lois, Toulouse (Hte-Gar.). — *Baume Fuba, Gouttes Dépuratives Fuba, Gouttes Pectiques du D^r Albert, Gynium, Myoden, Nasogyne, Panlaxyl, Santaline Daupez, Sedoseptyl, Sirop Kérida, Sirop Pectiline*.

Lab. Dausse, 4, r. Aubriot, Paris. — *Ampoules Névrosthéniques, Bardane stabilisée, Belladone Dausse, Bromure de Codéine, Camphodausse, Carbodausse, Collobiase d'Or, Collobiase de Sulphydrargyre, Enterodausse et*

Enterodausse calcique, Fondant de soufre, Fondant Iodotanique, Gouttes Arsenosthéniques, Gouttes Phosphosthéniques, Granulé Salicylé Dausse, Hémogénol, Hespéridausse, Hormodausse, Intrait Dausse, Moréthyl, Pavéron, Prostatidausse, Salicaire Dausse, Sédo-Hypotenseur Dausse, Sérodauasse, Strictoforme, Tisane hépatique Dausse.

Lab. du Dr Debat, 60, rue de Monceau, Paris. — *Androsthénol, Cutigénol, Exentérol, Filtrat Inosepta, Hépacrine, Hépa-peptine, Inogyl, Inolaxine, Inorénol, Inorhinyl, Inosepta, Inosepta ophtalmique, Inosphacéol, Inosplénol, Inotyl, Inoxémol, Inoxyl, Insévaccins, Ovules Inséva, Pancrinol, Pommade Inséva, Sédopeptine, Sédotyl, Septicarbonate, Siliplastine.*

Lab. Dechâtre, 20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois. — *Boroseptine, Bronchoforme, Calco-Céril, Cérinil, Cériomine, Granulé Sabel, Hormotensyl, Inhaphone, Lécithocéril, Parvuline, Plasmastyl, Rhinostagone, Sédophoryl, Veinosalvine.*

Lab. Déchosal, 39, rue Roger-Salengro, Bondy (Seine). — *Aldor formogène, Magnésie Déchosal, Méthinol, Néo-ricin, Opo-Vacuoline, Rhumatoïdine, Vacuoline.*

Lab. Deffarge, 188, cours de la Somme, Bordeaux. — *Hémostérine irradiée, Nucléocardyl, Panvita, Vitacrine.*

Lab. Defresne, 19, r. Jacob, Paris. — *Pancréastase Defresne.*

Lab. Deglaude, 15, bd Pasteur, Paris. — *Cardibaïne, Digi-baïne, Théoxanthine, Spasmosédine.*

Lab. Dehaussy, 50, rue Nationale, Lille. — *Anti-Asthmine, Biocalcium, Capsules et sirop Préga, Céréossine, Crédone, Crypthermol, Diastogène, Entérobil, Ephasma, Formobenzyl, Hermarsinol, Hermomuthol, Koumyl, Leucosérum, Phylolax, Sédoneurol, Sinrénaline, Théramine.*

Lab. Déjardin, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris. — *Extrait de malt français Déjardin, Malt français Déjardin, Mallosine Déjardin, Peptomaltone Déjardin.*

Lab. Delalande et Cie, 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie. — *Baume Suella, Entéro-granulé, Ephédrocamphre, Esculéol, Hypiode, Neuroplasma, Neuroplasma Massif, Polyminéral, Rexiode, Sirop au Solucamphre, Solucamphre, Solucamphre Associations, Solucamphre sparteïne, Sulfocadol.*

Lab. du Dr Delalbre, 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux (Seine). — *Adipo-Fugine, Anti-Floculine, Cephalgi-Lysine, Dermo-Génésine, Humoro-Stabiline, Organo-Sthénine.*

Pharmacie Delaprée, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée). — *Baumix, Liquidix.*

Lab. Delbary, Saint-Astier (Dordogne). — *Ioguine Delba.*

Lab. Delfour, Pouillon (Landes). — *Oléo-Mel.*

- Lab. du Delta**, 84, rue Rochechouart, Paris. — *Arcica, Calmaby, Galobil, Chloral Dalis, Névrol Fréval, Onguent Fréval, Percalcine, Suppoglandines.*
- Lab. Demasles**, 5, pl. Miremont, Vienne (Isère). — *Artériocrinol, Aihal, Bilicrinol, Biogénol, Crinhémol, Menosédine, Myrtilline, Phospholéose, Sédospasmosé.*
- Lab. Demoulin**, 27, rue Brezin, Paris (XIV^e). — *Lenientol.*
- Lab. Denis**, 20, rue du Laos, Paris. — *Glottyl, Rhino-Glottyl.*
- Lab. Denisot**, 19, rue de Fleurus, Paris (VI^e). — *Carbolactyl simple, Carbolactyl bilié, Cervol, Hémosédine, Iodosédine, Opophos.*
- Lab. du Dr Densmore**, 25, rue Dagorno, Paris. — *Bioplastine, Endolacgénine, Endo-Ovarina, Endoxidine, Esanofèle, Foscal Serono, Hyostinal, Sels de Montecatini, Néoiacol ISM, Paragangline Vassale, Peptopancréasi Serono, Soporigène, Viroglan et toutes préparations de l'Institut Sérothérapique de Milan (Opothérapie et Vitamines Ferments, Métaux Colloïdaux, Peptopancréasi, Antiluétiques).*
- Lab. Deodax**, R. Renaud, Anould (Vosges). — *Sinapol, Spasmalgol, Thermalgol.*
- Lab. Depruneaux**, 18, rue de Beaune, Paris. — *Cyproveinol (Gouttes-suppositoires), Diemenal, Dienol, Dragées Elkin, Gouttes Antigél, Granules Elkin, Hypophédrine, Phosphoneurol, Soderséine.*
- Lab. de la Dermofagine** (L. Sagot), 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — *Dermofagine, Dyspepsia, Dyuril, Holocalcine, Raiforyl.*
- Lab. Derol**, 154, av. Malakoff, Paris. — *Bolène, Lipocrinyl, Quinimax, Rectoseptol.*
- Lab. Deschiens**, 9, rue Paul-Baudry, Paris. — *Hémoglobine Deschiens, Hépathémo Deschiens, Holos, Spectrol.*
- Lab. Descouraux et fils**, 52, bd du Temple, Paris. — *Chloro-Magnésion, Dragées Lumeval (Drageval), Ovules Vézès, Tensoryl, Tryclène.*
- Lab. Dexo**, 7, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Biovital, Bismokaol, Collunovar, Dexiode, Dexogyne, Dexoplasma, Laximanne, Thyméphédrine, Uroquinol.*
- Lab. Diéto-Pharmaceutiques**, Ch. Heudebert fils, 4, rue Lamartine, Nanterre (Seine). — *Féculyse, Nergine, Radiopaque, Sels Heudebert (achloruré et hypochloruré).*
- Lab. de la Digastrine**, 11, r. St-Agricol, Avignon. — *Digastatine.*
- Lab. A. Djian**, 137, r. de Belleville, Paris. — *Cassilax.*
- Lab. du Douagol**, Péronne (Somme). — *Crayons Thomas, Donagol, Dontera, Tricalm.*

- Lab. Dorantowicz**, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloïdine*, *Crinopancrine*, *Curiodé*, *Higadose*, *Hormobiline*, *Hormoléol*, *Hypno-Nervine*, *Mésiforme*, *Morrhualène*, *Gauthier*, *Panfébrine*, *Stomophile*.
- Lab. de la Dosurine**, 16, rue Charlemagne, Paris. — *Dosurine* (*Trousses*).
- Lab. Douetteau frères**, 20, r. du Fg-St-Honoré, Paris. — *Astasol*, *Ficabyl*, *Neurovarol*, *Organésium*, *Sédasix*.
- Lab. Drapier**, Rethel (Ardennes). — *Ampoules Reipar*, *Intra-Reipar*, *Ostéopeptine*.
- Lab. Dreyer-Dufer**, Nogent-sur-Marne. — *Anurique Duplex*, *Iodophosfer Duplex*.
- Sté Française du Lait sec Dryco**, 5, rue St-Roch, Paris. — *Druco* (lait sec).
- Lab. du Dr Dubat**, 80, fg St-Denis, Paris. — *Dermone*, *Laxalbine*, *Molléine*, *Phrosthémor*, *Rhinol* (comprimés, ovale, pommade), *Sangule*, *Sanpur*, *Saturaline*, *Sec-case*, *Thésine*, *Uroseptic*.
- Lab. Duc**, 24, av. Mac-Mahon, Paris. — *Cèdrel Bel*, *Coguelicônes*, *Dragécalcion* (dragées), *Dragécalcion* (granulé).
- Lab. Ducatte**, 10, rue Barbette, Paris. — *Entéro-antigènes* *Danyasz*.
- Lab. Ducatte**, 191, rue Saint-Honoré, Paris. — *Biosulfol*, *Cérébron*, *Cuprase*, *Cytoplasmine*, *Entéro-Antigènes*, *Gaïarsénan*, *Paratoxine*, *Sclérollysine*.
- Lab. Ducloy et Cie**, Arques (P.-de-C.). — *Pilules de Boldo-Biline* *Ducloy*, *Bradygastrine*, *Lactogélose*, *Lichénose*, *Sarcoglobine*, *Tachygastrine*.
- Lab. Ducoq**, Langeais (Indre-et-Loire). — *Iodo-Hamamelis* *Ducoq*, *Vulnérine*.
- Lab. E. Dufour**, Amplepuis (Rhône). — *Adenoseptyl*, *Glucocaux*,
- Lab. Henri Dufour**, 40, rue des Carmes, Orléans (Loiret). — *Apsochol*, *Codéphryl*, *Dymoaryl*, *Edistol*.
- Lab. du Dr E. Duhourcau, Legoux frères, pharmaciens**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Dragées anti-catarrhales* du Dr Duhourcau, *Gastricine* du Dr E. Duhourcau, *Tœnifuge français* du Dr E. Duhourcau, *Salvenase* *Legoux*.
- Lab. Dulcis**, Dr Ferry, place Clichy, Monte-carlo. — *Alcaloïdes seuls et combinés*, *Argolène*, *Cadmiol zinc*, *Cuprinol*, *Iodo-calcique*, *Iodo-Rubidium*, *Ichtyol zinc*, *Myosine forte et faible*, *Mydriazine*, *Novoptine oxyde orangé de Hg*, *Ophtharmoforme*. *Tubes Dulcis*.
- Lab. Dumesnil**, 10, rue du Plâtre, Paris. — *Aseptampoules* *Dumesnil*, *Bréthyl Dumesnil*, *Crémo-plastol Dumesnil*, *Dépuratif Dumesnil*, *Dermo-Plastol Dumesnil*, *Géli-*

crème Dumesnil, Girasiol Dumesnil, Huile au calomel Dumesnil, Mugrizol Dumesnil, Poudre Pastorilos, Sacnel, Solu-Plastol Dumesnil, Théobromose Dumesnil, Zébo-Plastol Dumesnil.

Lab. M.-L. Durand, 28, rue de Seine, Paris. — *Gravural*.

Lab. Duret et Rémy, voir Lab. du D^r Pierre Rolland et Duret et Rémy réunis.

Ph^{ie} E. Duriez, 20, pl. des Vosges, Paris. — *Chloral bromuré Dubois, Elixir Ducro, Quinoidine*.

Lab. Dursent, 74, r. Blanche, Paris (IX^e). — *Brimox, Capsol, Egidol, Glaucurolo, Sapogynol*.

Lab. A. Duteil, 90, av. de St-Ouen, Paris. — *Élixir Hymel, Quinorhéine Duteil, Spasalgique Maréchal, Suppositoires Hymel*.

Lab. de la Dynamogénine, Rumilly (H.-S.). Bureau de correspondance : Boîte postale 33, Aix-les-Bains (Savoie). — *Dynamogénine du D^r Chaboud*.

Lab. des Eaux-Mères, Etablissement Thermal, Salies-du-Salat (H.-G.). — *Eaux-Mères*.

Sté des Eaux minérales de Decize, 49, bd de Port-Royal, Paris. — *Source Saint-Aré*.

Étab. Echard-Gillier, 25, rue de Bordeaux, à l'Arbresle (Rhône). — *Compresses grasses « Onctua », Garnitures Obstétricales « Parturia »*.

Lab. Echeman, 26, rue des Moines, Paris (XVII^e). — *Camphocalyptol, Eupnol (pastilles et poudre), Eupnoléine (ampoules et solution), Eupnophédrol, Osmoléine, Pulvinasol, Stadrhine (ex Stovoléine), Suppositoires de Camphocalyptol*.

Lab. de l'Edistol, 40, r. des Carmes, Orléans (Loiret). — *Edistol*.

Lab. Efa du D^r Lecacheux, 16-18, rue du Château, Carentan (Manche). — *Byl Efa, Hépatie Efa*.

Lab. de l'Élocine, 51, r. du Ranelagh, Paris. — *V. A. V.*

Lab. Elsse, Ph. Chavanne, Fontaine-Grenoble (Isère). — *Calcion Elsse, Carbobenzyl, Carnix Robert, Elixir Mallopepsique, Fluxossan, Inhalations Dynamy, Phosphalose, Révulsif Dynamy, Sapodol, Sirop Dynamy, Somnoblol, Strophantal, Terpene Duval, Tonikelsse*.

Lab. de l'Endopancrine, 48, r. de la Procession, Paris (XV^e). — *Endopancrine, Endothymusine, Holosplénine, Holovarine, Insuline (Voir Endopancrine), Insuline Phyloze (poudre et pommade), Mucofcic, Perglandènes (ovarien, hépatique, orchitique), Permyase*.

- Lab. de l'Entériode, 39, r. de Clichy, Paris (IX^e). — *Entériode*,
- Lab. de l'Entéroseptyl, 78, bd Beaumarchais, Paris. — *Entéroseptyl*.
- Lab. Éon, 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). — *Derméon*, *Pommade et suppos. Eon*, *Erysulfure Eon*, *Psoréal*, *Psorène*, *Psoréon*, *Pulmicure*,
- Lab. Éparvier, 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon. — *Boldoïne*, *Cascara*, *Ferroxyline*.
- Lab. de l'Éphédrine Béral, 194, r. de Rivoli, Paris. — *Adrénoides*, *Adréphédrine*, *Cleazol*, *Ephédermine*, *Ephédraféine*, *Ephédrampoules*, *Ephédricones*, *Ephédrine*, *Ephédrisol*, *Ephédroïdes*, *Ephédromel*, *Ephéiodine*, *Ephétropine*, *Grains d'Ephédrine*, *Mydriédrine*, *Nasophédrine*, *Navidrine*, *Oléophédrine*, *Rhinodrops*, *Somnicones*, *Spartophédrine*.
- Lab. de l'Éranol, 45, rue de l'Echiquier, Paris. — *Éranol*.
- Lab. E la (Latour, ph^{ica}), Terrasson (Dordogne). — *Brurazine*, *Neuralgic Caron*.
- Lab. de l'Erythéma, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort (Seine). — *Androvar*, *Androvules*, *Erythéma*.
- Lab. Escouflaire, Baisieux (Nord). — *Cigarettes anti-asthmiques Escouflaire n^{os} 1 et 2*, *Poudres anti-asthmiques Escouflaire n^{os} 1 et 2*.
- Lab. Estève, 187, rue de la Croix-Nivert, Paris (XV^e). — *Bain de Bouche Estève*, *Bronchosanyl Estève* (Adultes et Enfants).
- Lab. Etienne, 19, av. Secrétan, Paris. — *Asthmédrine*, *Potion des Cordeliers de Séz*, *Tisane R. P. La Montagne*.
- Lab. général d'Études biologiques, 29, pl. Bossuet, Dijon (Côte-d'Or). — *Doloma*, *Ænophos*, *Protéodyne injectable*, *Protiodyne dragées*.
- Lab. de l'Eupulmol, Chavatte, pharmacien, rue de France, Roubaix. — *Eupulmol*.
- Lab. de l'Eusedyl, 32, rue des Vallées, Colombes (Seine). — *Eusedyl*.
- Lab. Évène, 15 bd des Batignolles, Paris (VIII^e). — *Baume Pélevine*, *Ouvels Evène*, *Poudre Evène*, *Poudre Pélevine*, *Thé Evène*.
- Lab. de l'Evolax, Guéraud, pharmacien, 27, av. Victor-Hugo, Valence (Drôme). — *Evolax*, *Gastrisodyl*, *Héma-Rhéo*.
- Usines Ethel, Schiltigheim (Bas-Rhin) et 132, fg St-Denis Paris. — *Malt Ethel*.

- Lab. Fabiou**, 132, av. Victor-Hugo, Paris. — *Anaptyol*, *Elixir Rodi*, *Veinicura*.
- Lab. Fagard**, Lons-le-Saunier (Jura). — *Anthiaslhme Bengalais*, *Bain Fagard (Sulfador)*, *Cigarettes Schulzé*, *Elatine Bouin*.
- Lab. Falvy**, 40, r. des Acacias, Paris. — *Adrénoléine*, *Anxiol*, *Broséyl*, *Chlorinol*, *Cirvose*, *Edricamphre*, *Epholéine*, *Fermenteryl*, *Gastropeptyl*, *Hemopectal*, *Holuryl*, *Rhinadrol*, *Synase*, *Trynol*.
- Lab. P. Famel**, 16-22, rue des Orteaux, Paris (XX^e). — *Optræx*, *Sirop Famel*.
- Lab. de la Fantine Adoue**, 36 bis, rue Scaliger, Bordeaux (Gironde). — *Fantine Adoue*.
- Lab. Faure**, 83, bd de la Villette, Paris. — *Citropeptol*, *Gouttes Glyciodines*, *Hexacarbine*, *Lactobiase*, *Manacine*, *Neuropol*, *Novosédine*, *Sels Intar*, *Sirop Drocot*.
- Lab. Faure et Dussuel**, 23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains. — *Elixir Bonjean*, *Euphorine du D^r Chaboud*, *Magnelax*, *Sinaplasme*.
- Lab. Faure et Lagente**, à Montargis (Loiret). — *Citrocholine*, *Kalmidor*, *Mictoseda*.
- Lab. des Produits Sulfureux du D^r Fayès**, 3, rue d'Alexandrie, Paris. — *Salbine du D^r Fayès*, *Sulfocaine Fayès*, *Sulfo-Rhinol du D^r Fayès*.
- Lab. du Féminadène**, 120, r. Lecourbe, Paris (XV^e). — *Coprex*, *Féminadène*, *Polypirine*, *Viradène*.
- Lab. Fercocq**, La Varenne-St-Maur (Seine). — *Antisuce*, *Arthrident*, *Hémocalcine*, *Pulmogrog (Enfants et Adultes)*.
- Lab. G. Fermé**, 22, rue de Turin, Paris. — *Muthanol*, *Néolyse*, *Psothanol*, *Soluthanol*, *Staphylothanol*, *Triradol*, *Urolan*, *Viscosérum*.
- Lab. du Ferment Dep**, 44, rue Taitbout, Paris (IX^e). — *Ferment Dep*.
- Ferme de Lafaye**, Marlihes (Loire). — *Babeurre La Faye*.
- Lab. du D^r Ferré**, 6, rue Dombasle, Paris. — *Broncho Favrot*, *Cupressiode*, *Dismine Favrot*, *Immunicorps*, *Lin Tarin*, *Rhino-spécifique*, *Sirop Lamouroux*, *Tonique Favrot*, *Uroboldine*.
- Lab. E. Ferré**, 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris. — *Iodures L. Foucher*, *Litharsyne*, *Pâtes et Sirop Pectoral Edulcor*, *Poudre Rocher laxative*, *Sucre Edulcor*, *Tablettes Vych' Edulcor*, *Tonique Garnier*.
- Lab. du D^r Ferry**, pl. Clichy, Monte-Carlo. — *Tubes Dulcis*.
- Pharmacie du D^r Fialip**, 23, av. de La Motte-Picquet, Paris. — *Oxy-injecteur du D^r Fialip*.
- Lab. Fides (M. Vouzellaud)**, 14, r. de la Comète, Paris. — *Balsamorhinol*, *Inhalanthyl*.

- Lab. Fisch et Cie**, Mer-Rouge, Mulhouse (Haut-Rhin). — 104, fg Poissonnière, Paris. — *Bains carbogazeux Wolo*, *Baumolacpinine*, *Cataplasmes de Fango-Fisch*, *Cellona*, *Chlormagnésium*, *Chymosine Fisch*, *Elastoplaste*, *Empyrol*, *Fango Fisch*, *Lacpinine*, *Optiplaste*, *Poudre ORL*, *Prévalidine*, *Recytèle*, *Révuksif Fisch* (anc. *Procipha*), *Sulfocrème Liless*, *Thiorubrol*.
- Lab. Flahaut**, 74, r. Monge, Paris. — *Acépile*, *Anadiposine*, *Laxoil*, *Sulfodermol*, *Terpine granulée Baron*.
- Lab. Fleury**, Arcachon (Gironde). — *Comprimés Récal*, *Dionol*, *Eurinase*, *Paquets Alcats*, *Pastilles Dionol*.
- Lab. Fluxine**, *Produits Bonthoux* (Edm. Joët, pharmacien), rue Pasteur, Villefranche (Rhône). — *Evonyl*, *Fluxine*, *Formule Jacquemaire n° 50*, *Verrulyse*.
- Lab. du Forcival**, 11 ter, av. de Ségur, Paris. — *Forcival*.
- Lab. Roger Fosse**, 86, rue du Pas-St-Georges, Bordeaux. — *Livartil*, *Lotusédine*.
- Lab. Fosset**, 21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.). — *Ago Sels*, *Cytopulmase*, *Pelvinal*, *Pelvi-Pyrine*, *Sympathoriane*, *Vagoriane*, *Viscodermine*, *Viscoveine*.
- Lab. Fouard**, 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine). — *Les Granions*.
- Lab. du D^r Foucaud**, St-Gilles-sur-Vie (Vendée). — *Cachet bronchosthéniques*.
- Lab. H. Foucher**, 77, bd de Grenelle, Paris. — *Copraxe*, *Elixir de Larsa*, *Entérohépatine*, *Gastérinase*, *Muxyl*, *Neuricure*, *Ortho-Stomine*, *Thymetol*.
- Lab. Fougérat**, 44, r. Chaptal, Levallois (Seine). — *Gouttes Rami*, *Pâte Rami*, *Poudre Jifa*, *Sirop Rami*, *Vérachol*.
- Lab. Foulon**, 12, bd St-Martin, Paris. — *Colhépathyl*, *Cuscutine*, *Inshépatyl*, *Lutéovar*, *Valéramyl*.
- Lab. Fournier frères**, 7, rue Biscornet, Paris. — *Bileyl*, *Biolactyl*, *Crino-Menstryl*, *Crino-Stényl*, *Crino-Tensyl*, *Hormuter*, *Opothérapie Fournier*, *Ovaire Fournier*, *Physocrisine*, *Sanaféine*, *Splénocrisines*, *Vaccins Bruschettini*, *Vasolaxine*.
- Lab. Fourton**, D^r en Pharmacie, 38, rue du 11-Novembre, Clermont-Ferrand. — *Dyspné-Inhal*, *Elixir Daumy*, *Pastilles Pepsa*.
- Lab. Français Gastro-Entérologie**, 3, pl. Jussieu, Paris (V°). — *Néosplénine*, *Tot'Hépatine*.
- Lab. du D^r Fraysse**, 21, r. de Neuilly, Nanterre. — *Argostyl*, *Arthridol*, *Follilobine*, *Hépathényl*, *Hépatoplasmine*, *Kaliosol*, *Opothérapie associée du D^r Fraysse* (*Thyrodose*, *Neurodose*, *Splenodose*, *Placentodose*), *Revitalose*, *Stomacurine*.
- Lab. du Frénasma**, 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e). — *Mimophédrine*, *Frénasma*, *Gastrhéma*.

- Lab. Freyssinge**, 6, rue Abel, Paris. — Capsules Dartois, Céthocal, Nevrosthénine, Chloramine, Polyphorine, Quassine Fremint, Salicol Dusaule.
- Lab. Frigyl, F. Montanton**, Pharmacien, Buzançais (Indre). — *Frigyl*.
- Lab. H. Frilley**, 94, bd. Lefebvre, Paris (XV^e). — Iodifor-
mine, Mucigrains, Novospasmyl.
- Lab. du Fumigalène**, 7, rue du Marché, Blaye (Gironde). —
Fumigalène.
- Établissements Fumouze**, 78, faub. St-Denis, Paris. — Baume
Lartigol, Bougies uréthrales Chaumel, Capsules Raquin,
Cigarettes Barral, Crayons utérins Chaumel, Globules
Fumouze, Granstimul, Introl, Ovules Chaumel, Papier
Barral, Poudre, Chaumel, Sirop Berthé, Sirop Cassi-
bor, Suppositoires Chaumel.
- Lab. S. Gabail**, 55, av. des Ecoles, Cachan (Seine). — Anti-
Kokytine, Baume Dulac, Biscamph, Elixir valero-
bromuré, Gluphosol, Iodoscilline, Kalmangor, Néo-
saliode, Valérianate Gabail désodorisé, Urogénine.
- Lab. Gadreau**, Savigny-sur-Orge. — Sedangor.
- Lab. Gaillard (L. E. V. A.)**, 26, r. Pétreille, Paris (IX^e). —
Lénifédrine, *Léniforme*.
- Lab. Gaizard**, 94, rue Michelet, Alger. — Asthma, Carboseptyl,
Ixiode A et B, Opunsine, Panto-Kinon, Phloxiode,
Solicide.
- Lab. du Galaphos**, 92, av. Camille-Pelletan, et 2, rue d'Amiens,
Marseille. — Galaphos.
- Lab. Galbrun**, 10 et 12, rue Guynemer, Saint-Mandé (Seine).
— Aristargol, Citronema, Iodalose Galbrun, Loco-
salgue, Prosthénase Galbrun.
- Lab. du D^r Galimard**, 145, rue Yves-Le-Coz, Versailles. —
Curogène, Mucobarytine, Mucobismuthine, Vitadiase.
- Lab. R. Gallier**, 38, bd Montparnasse, Paris. — Arhéma-
pectine Gallier, Arkéhios, Basedowine, Daboïne, Kido-
line, Kidophédrine, Tot'Cobra.
- Établ. Gallina**, 4, rue Candolle, Paris. — Huile Gallina,
Iodentérol, Iodhéma.
- Lab. du Gambéol (J. Gautier)**, 42, r. Emile-Deschanel, Cour-
bevoie (Seine). — Actiphos, Balsaformine, Compri-
més de Proto-Gambier, Gambéol, Ganderma, Hémopy-
lore, Salvatyl.
- Lab. Gamel**, 2, pl. de la Salamandre, Nîmes. — Kinaldine,
Salganyl.

- Lab. Clément Gardiol, 6, rue Félix-Pyat, Marseille. — *Urc-salyl*.
- Lab. du Gastrhema, 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e). — *Frénasma*, *Gastrhema*, *Mimophédrine*.
- Lab. de la Gastrocitrine, Luc-sur-Orbieu (Aude). — *Gastrocitrine*.
- Lab. Gatel-Léger, 35-37, r. Joinville, Laval (Mayenne). — *Alcalisalyl*.
- Lab. Gavin, Vimoutiers. — *Sirop Lecœur*.
- Lab. du D^r Gayraud, Lavit (T.-et-G.). — *Bleumyl*, *Citrhémol*, *Cléinol*, *Eupeptyl*, *Fénugrec Ravin*, *Opo-Calcéofibrose*, *Rexacarbène*, *Sérocamphe*, *Sirop Lauzi*, *Sténobiose*, *Urilyse*, *Valérose*, *Varilose*, *Vin Erlos*.
- Lab. Géha, Port-de-Bouc, près Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume de l'Echalp Albert*, *Cachets Némé*, *Combiné Gécán*, *Globular*, *Gouttes Géha*, *Sirop du D^r Canac*.
- Lab. Gelia, 16, rue St-Yon, La Rochelle. — *Geliderm*.
- Lab. G. Geneslay, 5 bis, rue Pajou, Paris. — *Métavitalyse*.
- Lab. Genevet, 29, rue des Marchands, Avignon. — *Kinechol*.
- Lab. Génévrier, 45, rue du Marché, Neuilly-sur-Seine. — *Adolan*, *Alepsal*, *Bis-Hyd*, *Boues radioactives de Pistyan-les-Bains (Tchécoslovaquie)*, *Figadol (Vin et Capsules du D^r Vivien)*, *Neurinase*, *Panstomase*, *Tétramagnésium*.
- Lab. Géraudel, 3, r. Watteau, Courbevoie. — *Drag-Bil*, *Sirop Géraudel*.
- Lab. Gerda, 163, bd Croix-Rousse, Lyon (Rhône). — *Anti-diabétique Requis*, *Arvensyl*, *Calsédine*, *Euphrénine Bastia*, *Lenigastre*, *Sodolactine*, *Tablette Perroud*.
- Lab. du Germidor, av. Font-Laugièrre, Grasse (Alpes-Maritimes). — *Germidor*.
- Lab. Gev, 26, rue Chaptal, Paris (IX^e). — *Argyrine*, *Isogev*.
- Lab. Gewa, 32, rue Assalit, Nice. — *Eductyl*, *Léthalgol*.
- Lab. A. Girard, 48, rue d'Alésia, Paris. — *Caséoline*, *Glycérophosphate de Chaux granulé Girard*, *Nucléofer Girard*.
- Lab. Girel, 19, rue Godot-de-Mauroy, Paris (IX^e). — *Hémédonine*, *Vulnamine*.
- Lab. du Glefina, 348, rue Saint-Honoré, Paris. — *Gléfina*, *Lasal*, *Novalibut*, (*Gouttes et Pilules*) (*ex Halibut*), *Novalibut Local (Localibut)*.
- Lab. E. et G. Glomaud, 12, bd Saint-Michel, Paris (VI^e). — *Neurogastrine*.

- Lab. des Gloxines, 6 bis**, rue Campagne-Première, Paris. — *Gloxines, Gloxines Polyvalentes*.
- Lab. du Glucalcium, 8**, rue Dubrunfaut, Paris (XII^e). — *Angionevrol, Antigonn RX, Arsallyl, Aseptophédrine, Atouxin RX, Bilichlorine, Biomuxyl RX, Cratiode, Glucalcium (ampoules et granules), Hormoreinyli F et M, Sel Vital RX*.
- Lab. des Gluconates, 7**, rue de la Montagne-Sainte-Genève, Paris. — *Calcium Français J. B.*
- Lab. Glyco M, 1**, avenue Lowendal, Paris (VII^e). — *Agar-Lac, Glyco M, Sanos, Sélunio, Witch Hazel*.
- Lab. Gmet, 27**, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. — *Boldo Gmet, Composé Gmet, Condurango Gmet, Cratægus Gmet, Diurétique Gmet, Dragées Gmet, Extrait Hamyd, Frêne Gmet, Fucus Gmet, Gui Gmet, Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Jugland Gmet, Kola Gmet, Piscidia Gmet, Quinquina Gmet, Sauge Gmet, Tilleul Gmet, Ulmaire Gmet, Valériane Gmet, Viburnum Gmet*.
- Lab. P. Godfrin, 5**, av. Watteau, Nogent-sur-Marne. — *Limonade Godfrin*.
- Lab. Jammes de Golbery, 19**, rue Brunel, Paris (XVII^e). — *Gossypiol Maurin, Hormocrinol F et M*.
- Lab. du Gomenol, 48**, rue des Petites-Ecuries, Paris. — *Gomenol, Gomenoléo et tous produits au Gomenol*.
- Prod. Gonnon, 14**, rue Victor-Hugo, Lyon. — *Antidiabétique Monavon, Cacodyle Gonnon, Créosote soluble Vacheron, Eupeptique Monavon, Irénine Gonnon, Kola Monavon, Lecithine Vacheron, Polybromure Gonnon, Polyiodure Gonnon, Sirop de créosote Vacheron, Sirop de glycérophosphates Vacheron, Sirop de Lovel, Sirop Vacheron au gaiacol, Suppositoires Gonnon, Terpène Gonnon, Tonicardine Gonnon, Tonique Gonnon*.
- Lab. Gouin, 20**, r. des Ecoles, Paris. — *Avantol, Cuprémone F, Cuprémone simple, Prométhine, Gouttes P. A. S.*
- Lab. Gouzène, 139**, rue de Paris, Pantin (Seine). — *Aloysine*.
- Établ. Goy, 23**, rue Beautreillis, Paris. — *Calcisan Cachets, Gouttes Magalo, Comprimés et Gouttes Notal, Digestif Goy, Elixir Goy, Fer Larcade, Globules et Granulé Chomel, Gouttes Vocis, Hémostatique Goy, Impaludol, Inhalation Goy, Inhalations Vocis, Juvantol, Misalgol, Mucilage Goy, Narizol, Notaline, Oxycarbène, Panol, Pasticaïne, Pastilles M. B. C., Pâte Bleue Goy, Pâte Goyer, Pectoral Serla, Pimpinol, Primulyse, Reclusol, Saturateur Chomel, Sédalgol, Sirop Chalin, Sirop France, Thiocosyl, Urosidal, Verrumag, Vin William*.
- Lab. Grandval, Quirin succ., 12-14**, r. Féry, Reims (Marne). — *Eugynol Grandval, Hamamelis Grandval, Énoquinol Grandval, Potion Grandval, Quinquina Grandval, Kina coca kola Grandval, Quinarsol antianémique Grandval, Quinarsol fébrifuge Grandval, Sirop Larphaud*.

- Lab. Granger**, 13, rue Basly, Gennevilliers (Seine). — *Transitol*.
- Lab. du Granuchol**, 42, rue de Paris, Pantin (Seine). — *Granuchol*.
- Lab. René de Grauwe**, 19, r. du Bailli, La Plaine-St-Denis. — *Elixir Duchamp*, *Fer Bravais*.
- Lab. R. Gray**, Pharmacien, Montmirail (Marne). — *Gouttes Trina*.
- Lab. Grémy**, 14, rue de Clichy, Paris. — *Antéparsine Grémy*, *Diasténine*, *Epidosine Grémy*, *Eutensyl Grémy*, *Folles-trine Grémy*, *Hépatocalcion Grémy*, *Immuniderm Grémy*, *Immuniperos Grémy*, *Immuniphages Grémy*, *Immunizols Grémy*, *Micranyl Grémy*, *Ocréine Grémy*, *Thyrénine Grémy*, *Thyrocréine Grémy*.
- Lab. Grias**, 47, rue Féray, Corbeil (S.-et-O.). — *Verticurine*.
- Lab. Grignon**, 2, rue Duphot, Paris. — *Eniode Lefebvre*, *Valérianate Grignon*, *Pâte de Terpène Guédet*.
- Lab. Grorichard**, 12, pl. de la Révolution, Besançon. — *Comitol*, *Magnésium Grorichard*, *Métrostyptal Grorichard*.
- Lab. Gros**, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand. — *Diurocalcine Gros*, *Diurocalcine iodurée*, *Dragées Hépatorénales Gros*, *Hépafluol*, *Hergénol*, *Puerol*, *Sanomint*, *Sédotonine*, *Spasmonal*.
- Lab. Grysa**, 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe). — *Ginéyl*, *Cuprobalt*, *Sylcase*.
- Lab. Guéret**, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret). — *Anoxyne*, *Comprimés Kléos*, *Pommade Kléos*.
- Lab. P. Guérin**, 86, rue de la Réunion, Paris (XX^e). — *Algo-curine*, *Ferrocaltine*, *Néostomol*, *Vascurol*.
- Lab. R. et M. Guignard**, 38, rue du Louvre, Paris. — *Arhino-line*, *Aseptocarbène*, *Asthmatyl*, *Casbyl*, *Coqueluchyl*, *Fucogem*, *Gemaline*, *Gemiodol*, *Gemmenagol*, *Gemocarpine*, *Hormoqynol*, *Kola « Rik »*, *Kola Stheyl*, *Myrcia*, *Phosphigem*, *Phyto Kola*, *Spasmo-florine*, *Trimetal*, *Urogem*.
- Lab. F. Guilbert**, place d'Armes, Hesdin (P.-de-C.). — *Hypotenseur Vale*, *Cachets Felle*.
- Lab. André Guillaumin**, 13, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Acésine*, *Comprimés Guillaumin*, *Cyanargyre*, *Novargyre*, *Théosalbose*, *Vanadarsine*.
- Lab. Guillaumin et Gérard**, 12, rue Charles-V, Paris. — *Elixir eupeptique Tisy*, *Prodynase*, *Quinotane Valguy*, *Vin de Baudon antiminio-phosphaté*, *Vitène*.

Lab. de la Guimelinde, Ancenis (L.-Inf.). — *Guimelinde*.

Lab. P. Guin Contres (L.-et-C.). — *Cachets Lekma*.

Lab. J. Guinzbourg, 48-50, avenue de la Porte-d'Ivry, Paris (XIII^e). — *Blennotoxyl, Liverdase, Neo-Spermine, Vagodénal, Zomo-Malline*.

Lab. Halleana, G. Vienne, Pharmacien, 102, avenue Michelet, Saint-Ouen (Seine). — *Maigrylline, Polyna*.

Lab. Paul Hardy, 42, bd St-Marcel, Paris. — *Bil-flux, Cèdre bleu, Dipentyl, Florisétyl (et Polypnal), Cachets Gastruth, Jecofluyt, Magnésium Hardy, Neutracide, Oliricyl Hardy, Pancarbo, Pulmonaire du D^r Paul Bourgogne (et Borsalyl), Solution Tisch*.

Lab. de l'Hémolucyl, 54, avenue de la Bourdonnais, Paris (VII^e). — *Hémolucyl*.

Lab. de l'Hémoluol, 11, r. Mogador, Paris (IX^e). — *Hémoluol*.

Lab. Henry, 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique). — *Arséno-Fer Henry, Bromidine Henry, Bromovaleron Henry, Bronchitol Henry, Cascara Henry, Chloro-magnésium Henry, Digestif Henry, Disménine Henry, Elixir hépatique Henry, Fer Henry, Lithine Henry, Iodothéine Henry, Mangano-Fer Henry, Néo-Salicylate Henry, Nucléarhol Gabriel, Papaïne Henry, Pebromon Henry, Pectoral Henry, Peptonate d'étain Henry, Pepiodon Henry, Recalcifiant Henry, Renosiphon Henry, Salicaire Henry, Sirop bromoformique Henry, Sirop d'hémoglobine, Sirop de kola composé Henry, Solution salicylate Henry, Stanno-bardane Henry, Stannolip Henry*.

Lab. de l'Hépatomagnésion, 57, rue Pierre-Corneille, Lyon. — *Carborexyl, Hépatomagnésion, Urocylate*.

Lab. Hépatoum, 150, rue de Paris, Pantin (Seine). — *Exorphyt, Neurokabyt, Solution Hépatoum, Triplexine*.

Prod. Heudebert, 85, rue St-Germain, Nanterre (Seine). — *Pains et spécialités de régime, farines pour enfants, café décaféiné*.

Lab. Louis Hinglais, Epernay (Marne). — *Capsules Kuchner, Chenanthol*.

Prod. Hinglais, 30, rue Miromesnil, Paris. — *Follicormone buccale Hinglais*.

Lab. Hocquette, 191, rue du Faubourg-St-Antoine, Paris. — *Acobella, Alisal, Crésolargol, Embryhormone, Fenucalcium, Hypoguisstyl, Rangol, Reinicalcine, Seroliol, Séro-neuropsychique, Splénomanganol, Sympax, Valédyl, Vivargyre*.

Lab. F. Hoffmann-La Roche et Cie, 10, rue Crillon, Paris (IV^e). — *Adoverne*, *Allonal*, *Arsylène*, *Bénerva Roche* (Vit. B¹), *Biolipase*, *Cachets Roche de Thiocol*, *Choline*, *Comprimés Roche de Thiocol*, *Cycliton Roche*, *Dibromotyrosine*, *Digalène*, *Diiodotyrosine Roche*, *Globinofer*, *Hémostra*, *Imidos*, *Lactoflavine* (Vit. B²), *Laristine*, *Larocaïne*, *Larosan*, *Laroscobine*, *Liquoide*, *Nestrovit*, *Numal Roche*, *Œstrobrol*, *Œstroglandol*, *Ovules Roche au Thigénol*, *Pantopon*, *Prostigmine*, *Saridon*, *Sécacornine*, *Sédobrol*, *Sédormid*, *Sirop Roche au Thiocol*, *Soluprotine*, *Somnifène*, *Spasmalgine*, *Syntropan*, *Tampol Roche au Thigénol*, *Théobryl*, *Thigénol Roche*, *Thiocol Roche*, *Thyroxine Roche*, *Tonique Roche*.

Lab. de l'Hopogamyl, 52, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beauvais (Oise). — *Hopogamyl*.

Lab. des Hormométalions, 50, avenue Jacqueminot, Meudon (S.-et-O.). — *Biocalcion*, *Cedoseptol*, *Exometalion*, *Hormocarbol*, *Neocedine*, *Panphosphates*, *Renovitase*, *Vigoral*.

Lab. Houdé, 9, r. Dieu, Paris. — *Aconitine Houdé*, *Aloïne Houdé*, *Apioline Houdé*, *Boldine Houdé*, *Caféine Houdé granulée*, *Colchicine Houdé*, *Ephédrine Houdé*, *Formosaline Houdé*, *Granules Houdé* (tous alcaloïdes et glucosides), *Gynimbine Houdé* (voir *Yohimbine*), *Hamaméline Houdé*, *Hélénine Houdé*, *Hydrastine Houdé*, *Hyoscine Houdé*, *Hyoscyamine Houdé*, *Papavérine Houdé*, *Pastilles Houdé à la cocaïne*, *Quassine Houdé*, *Scopolamine Houdé*, *Spartéine Houdé*, *Strophantine Houdé*, *Strychnine Houdé*, *Théobromine Houdé*, *Yohimbine Houdé*.

Cie de l'Hydroxydase, 10, rue Blanche, Paris. — *Hydroxydase*.

Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées, 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine). — *Calcomagnésie*, *Gophed* (Sirop), *Dysthène*, *Félosine*, *Gynésodine*, *Héxafel*, *Myothermine*, *Nuciphos*, *Panlithyl*, *Phocitrol*, *Sthénoxal*, *Stopral*.

Lab. Hygio-Dontis, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.). — *Pioréagine* (onguent, topique, pastilles), *Fibrogénine* (injectable et applicable), *Kératoline*, *Anaphylène* (pilules).

Lab. Immunos, 8, av. des Sources, Nice (A.-M.). — *Cinol*, *Digicardine*, *Digicardine quininée*. *Ferments immuno-lactiques*, *Immuno-vaccin antirhumatismal*, *Immuno-vaccin bronchopulmonaire*, *S. I. V. A.* *Immuni-vaccin antipyorrhéique*.

- Lab. Inava**, 14, rue de Normandie, Asnières (Seine). — *Antityphique* « TP », *Bouillon Antidysentérique* « Db », *Dientyl Anticolibacillaire*, *Néo-Soufre*, *Ovules-Vaccins*, *Pâte Dentaire Bleue*, *Pyodarsénol Injectable et Gelée*, *Pyogénol Gelée*, *Rhino-Vaccin Gelée*, *Thiophéol (Injectable)*, *Vaccins Injectables* « A » *Antibronchitique*, « G » *Antigonococcique*, « P », *Antipyogène*, « D » *Antistaphylococcique*, « M » *Gynécologique*.
- Lab. Ingé**, 14, rue Maublanc, Paris (XV^e). — *Amphotonyl Lersam*, *Ethyl-Pneumine Lersam*.
- Lab. Innerva**, 52, rue de Cambrai, Lille (Nord). — *Servo-Freinyl*.
- Sté Innothéra**, 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum*, *Sympathyl*, *Tot'Hamélis*, *Tot'Héma*.
- Lab. des Inocrinines**, 4, rte du Médoc, Bordeaux-Bouscat (Gironde). — *Inocrinines*.
- Institut de Biologie appliquée (C. Cépède)**, 57-59-61, rue Mathurin-Régnier, Paris (15^e). — *Panostyl*, *Vaccinothérapie atoxique Cépède*, *tous examens de laboratoire*.
- Institut Pasteur**, 36, rue du Docteur-Roux, Paris. — *Sérums*, *Vaccins*.
- Lab. de l'Inhalo-Bol**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Inhalo-Bol*, *Inhalo-Sel*.
- Lab. de l'Iodarsenic Guiraud**, 10, imp. Milord, Paris. — *Citratin*, *Iodarsenic ou Gouttes Païdophiles du D^r Guiraud*, *Véricardine*.
- Lab. de l'Iodosclérol**, 30, rue de Sète, Longuyon (M.-et-M.). — *Iodosclérol*, *Vinocrinol*.
- Lab. de l'Iodoveine Leduc**, 152, côte Pavée, Toulouse. — *Iodoveine Leduc*.
- Lab. des Iodures Cros**, 202 bis, rue de Paris, Clamart (Seine). — *Iodures Cros*.
- Lab. de l'Ipalcal**, 6, av. des Docteurs-Foix, Salies-de-Béarn (B.-P.). — *Ipalcal*.
- Lab. Iscovesco**, 107, rue des Dames, Paris. — *Adrénol total*, *Adrénol Cortex*, *Afatyl*, *Androcrinol*, *Andro-gouttes*, *Andropolycrinol*, *Cardiocrinol*, *Cérébrocrinol*, *Gynocrinol*, *Gyno-Gouttes*, *Gynohypoophysol*, *Gynolutéol*, *Gynopolycrinol*, *Hépatocrinol*, *Hypophysol*, *Mammol*, *Néphrocrinol*, *Novocortex*, *Opopédol*, *Opothérapie Iscovesco*, *Ovaire Iscovesco*, *Splenocrinol*, *Thyrol A.*, *Yo-Androl*, *Yo-Gynine*.
- Lab. Ivago**, 17, r. de Provence, Paris. — *Vaccins intradermiques*, *Vaccins Ivago*, *Gelées-vaccins Ivago*.

Établ. Jacquemaire, Villefranche (Rhône). — *Blécao*, *Blédine*, *Galactogil*, *Peptogil*.

Institut Jacquemin, Malzeville-Nancy (M.-et-M.). — *Ferment pur de Raisin*.

Lab. Jammes, 86, rue Michel-Ange, Paris. — *Boldocrinol*, *Cacodyline Jammes*, *Iodinjectol Jammes*, *Magnésio-Cacodyline*, *Néophage*.

Lab. Jauffret, 181, av. Victor-Hugo, Clamart (Seine). — *Impetigol*, *Néobiol*.

Lab. de la Jécobiase, Vayres (Gironde). — *Jécobiase*, *Soludex*, *Vivacure*.

Lab. du Jécol, 3, rue Watteau, Courbevoie. — *Allopha-Quina*, *Jécol* (*Cachets et Gouttes*).

Lab. Jicem, 304, rue Saint-Jacques, Paris. — *Citropaïne*, *Iodarsine*, *Jicémine*.

Lab. Jolly, 1, rue Christine, Paris. — *Hormobromine*, *Spasmine Jolly* (*Elixir et Comprimés*), *Terpoxyl* (*Externe, Interne, Ovules*).

Lab. M. Joly, Bourg-la-Reine (Seine). — *Aliments équilibrés Joly*, *Alimavèna*, *Bovavèna*, *Supravèna*.

Lab. Journet, 18-20, r. Vavin, Paris (VI^e). — *Bladérol du D^r Jenrout*, *Iodofosfal*, *Orthoflorène*, *Paracrinase*, *Perles Nivernaises*, *Rhapharène*, *Sirop Lefevre*, *Tonifosfal*, *Tridynol*.

Lab. du D^r Jouve, 16 bis, rue Dufrénoy, Paris (XVI^e). — *Balsurol*, *Gystorénol*, *Epipaline*, *Ovules Sédo-Hémostatiques du D^r Jouve*, *Sylvinhalant*, *Vitimone*.

Lab. Jouveinal, 137, fb St-Antoine, Paris. — *Kalm-Asthmine*, *Nervo-Biolène*.

Lab. Juin, 10, Impasse Milord, Paris (XVIII^e). — *Phosphopinal Juin*, *Pulmodion*, *Pulvéol*.

Lab. Julien, 105, rue de Rennes, Paris (VI^e). — *Benzoflorine*, *Corylase*, *Elgine Julien*, *Manganophosphal Julien*, *Pandrénaline Julien*.

Jus de Raisin Pampryl, Nuits-St-Georges (Côte-d'Or); 149, rue du Port-de-Bercy, Paris (XII^e). — *Jus de raisin naturel*, *Pampryl*.

Lab. de la Kaviase, 22, rue Lalande, Paris (XIV^e). — *Kaviase*.

Lab. du Kéralax, 1, r. Auber, Paris. — *Kéralax*.

Lab. L. Kerfysse, 25, rue de Calais, Dunkerque (Nord). — *Benzoquinol*, *Dermaline*, *Demeulenaere*, *Globabyl*, *Hémorroïdine* (*Pommade, Gouttes, Suppositoires*), *Sirop Kopé*.

Lab. du Képhédryl, 1, rue Auber, Paris. — *Képhédryl*.

Lab. du D^r Kirchner, 24, r. de Verdun, Strasbourg (B.-Rh.). — *Pancréal Kirchner*.

- Lab. Koehly**, 18, r. de Ménilmontant, Paris. — *Carboxine*, *Eubine*, *Malzemose*.
- Lab. Kraus**, 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris. — *Anti-convulsif Kraus*, *Citrol*, *Coroplasme*, *Francoplaste*, *Furonicide*, *Ombiplaste*, *Poroplaste*, *Protège-vaccin Kraus*, *Savon Glytra*, *Savon Neutrèpur*, *Solargol*, *Traumatol*, *Traumatoplaste*.
- Lab. Krieger**, 121, av. de St-Ouen, Paris (XVII^e). — *Antipur*, *Artérioveinine*, *Butyral*, *Eczémacure*, *Gélocalcine*, *Géraldine*, *Organocalcine*, *Sciaticure*.
- Lab. René Krotoff**, 78, av. de Saint-Ouen, Paris (XVIII^e). — *Dolpyc*.
- Établ. Kuhlmann**, 145, bd Haussmann, Paris. — *Binidia*, *Binoxol*, *Chloralosane*, *Dithioral*, *Sunalcol*, *Sunoxidon*, *Sunoxol*.
- Labiola, Lab. d'Applications Biologiques**, 52, r. de Cambral, Lille (Nord). — *Doganol*, *Encyral*, *Cordonnier*, *Gynoids*, *Gynodine*, *Icorase*, *Kaneuron*, *Koddy*, *Sidé-ranyl*, *Spasmocalcyl*, *Stinergix*, *Stosédol*, *Viabylis*.
- Labocip, Lab. de Spécialités Pharmaceutiques**, 19, bd du Parc, Neuilly (Seine). — *Efflozone*, *Labocip*, *Solu-soufre*, *Labocip*.
- Laboradium**, 25, rue Friant, Paris (XIV^e). — *Balneradol*, *Delmoradol*.
- Lab. Lacombe**, 4 ter, r. Barbès, Courbevoie (Seine). — *Bemax*, *Eno's Fruit Salt*.
- Lab. Lacombe et Cie**, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. — *Chlorumagène*, *Do-sa-no-sal*, *Fanerval*, *Surbical*.
- Lab. Lacor**, 81, rue de la Roquette, Paris. — *Angiosédine*.
- Lab. Lacroix**, 37, rue Pajol, Paris. — *Arsi-Quinoforme*, *Camphostyl simple*, *spartéiné* et *strychniné*, *Luerol*, *Neurotrope*, *Pilules Hélieniennes Naud*, *Quinoforme*, *Santal salolé*, *Vanucléol*.
- Lab. du Lactavinaigre**, 34, rue de Trévise, Paris. — *Lactavinaigre*.
- Lab. du Dr Lafay, Lecoq et Ferrand**, pharmaciens, 54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence, Paris (IX^e). — *Curaluès*, *Drainobyl*, *Flor-Peyott*, *Ovules Hystan*, *Solutions mercurielles injectables du Dr Lafay*, *Suppositoires mercuriels du Dr Lafay*.
- Lab. Laffort**, Joué-lès-Tours (I.-et-L.). — *Evobiline*, *Fluokol*, *Lysosclérol*, *Septolan*, *Uvotonyl*.

- Lab. Lafran**, 8, rue de Prague, Paris. — *Aspirine Lafran*, *Charbenzo Lafran*, *Dicodéine Lafran*, *Glandimbine Lafran*, *Parégorique Lafran*, *Urotropine Lafran*.
- Lab. F. Lagarce** (D^r en Ph^{1^e}), 13, Place de la Nation, Paris. — *Choloftuol*, *Ophthal*.
- Lab. du Laitancyl** (M. Panier), 69, r. Faldherbe, Malo-les-Bains. — *Laitancyl*.
- Lait Guigoz**, 2 et 4, rue Catulle-Mendès Paris (XVII^e). — *Babeurre Guigoz*, *Lait en poudre Guigoz*, *Lait dextrosé-malté Guigoz*, *Lait déchloruré Guigoz*, *Ravix* (lait Guigoz irradié).
- Lab. Lagoutte**, 25, cours Albert-Thomas, Lyon. — *Boldolactic*, *Calmocardine*, *Dermodulcis*, *Phlébos*, *Suppoalgos*, *Suppocamphryl*, *Suppopulmos*, *Suppothemos*, *Suppotionic*.
- Lab. Laiter**, 52, rue Heurtault, Aubervilliers. — *Collyres* (bleu, rose, irradié), *Cuprazurol*.
- Laits Molard**, 25, cours Lafayette, Lyon (IV^e). — *Bouillie Molard*, *Lait déchloruré Molard*, *Lait Molard au Calcia*.
- Lab. Laleuf**, 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e). — *Adrépatine*, *Colloïdine*, *Créosal*, *Crinocardine*, *Folliovarine*, *Iodatoxine*, *Lobéliane*, *Pancrépatine*, *Pavérinol*, *Plexalguine* *Laleuf*, *Polyferments*, *Sirop Dubois au créosal*, *Théocardine Laleuf*, *Théovérine Laleuf*, *Trinibaïne Laleuf*, *Trinitral Laleuf*, *Trinitrine caféinée Dubois*, *Trinitrine-Papavérine Laleuf*, *Trinitrine simple Laleuf*, *Urisal du D^r Deschamp*, *Urococcine*.
- Lab. du Lambarène**, 5 bis, rue de Berri, Paris. — *Lambarène*.
- Lab. Lambert**, rue de la Paix, Vichy. — *Epicral*, *Oxylysine*, *Triseptine*.
- Lab. Lambert**, pl. du Châtelet, Orléans. — *Comprimés Galac*.
- Lab. Lambiotte frères**, 20, rue Dumont-d'Urville, Paris. — *Arhine*, *Créosoforme*, *Galform*, *Perles Taphosote*, *Phosote*, *Thiosote*, *Urométine*.
- Lab. Lancelot**, 100 ter, av. de Saint-Mandé, Paris (XII^e). — *Appareil et Spécifique Lancelot*.
- Lab. des Procédés André Lancien**, France et Colonies françaises, G. Weber, pharmacien, 8, rue des Capucines, Paris. — *Métaux colloïdaux et Dérivés cinnamiques*.
- Lab. Lancosme**, 19, rue Alain-Chartier, et 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris. — *Acolitol*, *Algocratine*, *Anhémor*, *Argybil*, *Bain Carré*, *Bismhydral*, *Bismuth Desleaux*, *Bistomax*, *Calcilève*, *Gargarisme Lancosme*, *Globules Lincarc*, *Hémodrome*, *Inhalation Lancosme*, *Magnésie Lancosme*, *Rect' Acolitol*.
- Lab. Landrin et Oie**, 12, rue de la République, Puteaux. — *Cipromarol*, *Elixir de Virginie Nyrdahl*.

- Lab. J. Laroze**, 54, rue de Paris, Charenton (Seine). — *Bigynol*, *Colisel*, *Cytopan*, *Dosotol*, *Kaobrol*.
- Lab. Laryngologique**, R. Cordier, 45, rue de Lyon, Paris (XII^e). — *Hydrorrhéol*, *Inhalation* *gargarisme* *Vocaldop*, *Vocaldop*.
- Lab. F. Latour**, 71, rue Douy-Delcupe, Montreuil (Seine). — *Parlax*, *Phonodiose*.
- Lab. Laugier**, 56, rue St-Lambert, Marseille. — *Atussol*, *Biosthène*, *Bitonine*, *Cardicratine*, *Cinnestérol*, *Dynamobiase*, *Euprandiol*, *Guipsiode*, *Hépargène*, *Microcidal*, *Quinastase*, *Sirop Thébé*, *Téja*, *Urosérum*.
- Lab. du Dr Laurent-Gérard**, 40, rue de Bellechasse, Paris. — *Acétamone*, *Evolaxine*, *Plexamine*, *Radiotétrane*.
- Lab. Lauriat**, av. Foch, La Garenne-Colombes (Seine). — *Anti-Asthénie Lauriat* (*Ex-Lauriatol*), *Bronchoseptol*, *Isorgane*.
- M. J. Laurin**, pharmacien, 3 et 5, rue Alexandre-Dumas, Saint-Ouen (Seine). — *Neuréol*, *Sulfobyl*, *Zymogastatine* *Kervan*.
- Lab. J. Laval**, 245, rue de Vaugirard, Paris. — *Surpaver*.
- Lab. du Dr Lavoué**, Rennes (I.-et-V.). — *Ephydion*, *Felisedine*, *Gouttes Elixir et Sirop I. A. M.*, *Mangarsenic*, *Salicylna*, *Uro-Bestol*.
- Lab. Lavril**, Pacy-sur-Eure. Bureaux : 26, bd des Batignolles, Paris (XVII^e). — *Gyno-Lactosome*, *Lactosérum Lavril*, *Lactacyd*, *Lactosome*, *Ovules au Lactosome*, *Ovulacyd*.
- Lab. J.-B. Lahaye**, 145, rue des Bourguignons, Bois-Colombes (Seine). — *Tisane hépatique Lahaye*.
- Lab. Lebeault, Besins et Cie**, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris. — *Citrolargol*, *Germose*, *Mycolysine*, *Staphylase du Dr Doyen*, *Veinosine*, *Vin de Bugeaud*.
- Lab. Le Blond**, 15, rue Jean-Jaurès, Puteaux (Seine). — *Ortho-Gastrine*, *Orthophorine*, *Pyurol*.
- Lab. Leboime**, 1, 3 et 5, r. Fernand-Widal, Paris. — *Calcozymase*, *Prezymase*.
- Lab. Le Brun**, 5, rue de Lubeck, Paris (XVI^e). — *Dragées tonocardiaques*, *Eucalyptine*, *Mictasol*, *Mictasovules*, *Mictazine*, *Pancalcion*, *Sirop d'Eucalyptine*, *Suppositoires Eucalyptine*, *Suppositoires Mictasol*.
- Lab. Leclerc, S. A.**, 10, rue Vignon, Paris. — *Cadior*, *Entérochir*, *Entérophage*, *Entéroxin*, *Félicol*, *Magné-tone*, *Sélamon*, *Solution Normet* : *chirurgicale*, *médicale*, *sclérolitique*, *Staphylophage*.
- Lab. Leconte**, 7, r. des Petits-Carreux, Paris. — *Ambocurine*, *Bilaxyl*, *Choléfluine granules*, *Choléfluine comprimés*, *Euférine*, *Euglyma*, *Gouttes Leconte*, *Hémocholine*, *Lactocalcine*, *Morsine*, *Peptidol*, *Rénoline*, *Urolavose*, *Varicyl*, *Vin de Galien*.

- Lab. Lecoq et Ferrand**, 14, rue A.-Briand, Levallois-Perret. — *Antipsorine*, *Curalues* du Dr Lafay, *Gatran*, *Helminthyl*, *Lipaurol*, *Molène*, *Muthiode*, *Néosolmuth*, *Pentarsyl*, *Suppositoires Hg* du Dr Lafay, *Tréparsol*.
- Établ. Pharmaceutiques M. et P. Ledent**, Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.). — *Décholestrol*, *Opogermine*, *Sédotan*.
- Lab. Lees**, 127, bd St-Michel, Paris (V^e). — *Métrilols*, *Suppogynals*.
- Lab. C. Le Follet**, Nozeroy (Jura). — *Opobrol*, *Suroxydal*.
- Lab. Lefrancq**, 36 à 46, av. de Metz, Romainville (Seine). — *Bovcardiac*, *Bovhépatic*, *Bovstrol*, *Cardiophylline* Lefrancq, *Carnine* Lefrancq, *Extrait de bile* Lefrancq, *Extrait hépatique* Lefrancq, *Hépatocarnine* Lefrancq, *Hormoplasmine* Lefrancq.
- Lab. Lezendre et Cie**, Houilles (S.-et-O.). — *Gasmar* Legendre, *Pâte Mireille*, *Pilules Corail*, *Sirop Mireille*.
- Lab. Legoux frères**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. (Voir **Lab. du Dr E. Duhourcau**.)
- Lab. Lejeune**, 142, rue de Picpus, Paris. — *Indhaméline simple*, *Indhaméline plurigl.*, *Pommade Lenoir*, *Pro-lensène*.
- Lab. Lematte et Boinot**, 52, rue La Bruyère, Paris. — *Acécoléx*, *Acécoline*, *Acécoline-papavérine*, *Acécoline-spartéine*, *Acécoline-camphre*, *Acécoline-Yohimbine*, *Bio-calcose* Chevreton, *Calcional*, *Hémo-Tonikéine*, *Hormocline*, *Hypotan*, *Hypotan-papavérine*, *Hypotan* Injectable, *Lipocérébrine*, *Pressyl*, *Tonikéine*.
- Lab. Léonardon**, 1, r. Paul-Bert, Angers (M.-et-L.). — *Cachets Asminol*, *Hemofluidol*, *Quinthéryl*.
- Lab. du Leptol**, 333, rue de Vaugirard, Paris (XV^e). — *Leptol*.
- Lab. Leroy-Jalabert**, Lamalou-les-Bains (Hérault). — *Antidol* Leroy.
- Lab. Lescène**, 58, rue de Vouillé, Paris. — *Anaquinine* Lescène, *Balsamol*, *Balsaquinine*, *Choléo-Zymatine*, *Rhinaquinine*, *Viosten*, *Zymatine*.
- Lab. G. Lesourd**, 88, r. Duhesme, Paris (XVIII^e). — *Anthylline*, *Antiphym que Nomss*, *Antinerveux* Lesourd, *Bolcitol*, *Fœnugol*, *Gouttes C. Z. A.*, *Gouttes C. C. U.*, *Lucinine* Borelle, *Périsols* du Dr Legros, *Radiesthésie Médicale*, *Sels-Mags*, *Splénocarbène*, *Tisane Anticollibacillaire*, *Tisanes* Lesourd n^{os} 19, 62, 55, 10, 20, 40, 3.
- Lab. du Dr Le Tanneur**, 87, av. Borriglione, Nice. — *Tannurgyl*, *Minéroxaline capsules*, *Magnélaix*.
- Lab. Lettry**, 69, rue de Sèvres, Paris. — *Agoxyl*, *Hederyl*, *Pommade de Sérâ*.
- Lab. Leurquin**, Dreux (E.-et-L.). — *Bromocarbène*, *Kinégastine*, *Pulmo-fluide*, *Pulmo-fluide éphédriné*, *Sels Na 4*, *Tablettes Gélok*.
- L. E. V. A.**, 26, rue Pétreille, Paris. — *Lénifédrine*, *Léniforme*.

- Lab. Licardy**, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine. — *Fluobyl*, *Gélogastrine*, *Hémoductyl*, *Laxamall*, *Sédosine*, *Stovédrine*, *Tonudol*.
- Lab. des Lices**, 38, rue des Lices, Angers. — *Anturic Labesse*, *Gouttes de Quarantaine*, *Hypotensol*.
- Lab. Lindeux**, 7, av. des Marronniers, Fontenay-sous-Bois (Seine). — *Novoplasmine*, *Phosthénine*.
- Lab. Lip**. Voir Laboratoire Saporex.
- Lab. des Lipides**, 14, rue des Minimes, Paris. — *Baume Trisalyl*, *Dermosplénine*, *Liposplénine* du Dr Groc, *Spléno-gastrine*, *Trisalyl*.
- Lab. de la Liposeptine**, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Ankylosyl*, *Dépurogène*, *Fenugrène*, *Fucusol*, *Gastrobiase*, *Isolanin*, *Isotanan* "G", *Liposeptine*, *Liposeptol*, *Marrubène*, *Pansolanée*, *Parasclérose*, *Rhino-Liposeptine*, *Sonène*.
- Lab. Lobica**, 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e). — *Azotyl*, *Béatol*, *Carditone*, *Chlorobyl*, *Iodo-trypsine*, *Lactobyl*, *Lactochol*, *Nutréine*, *Pneumo-calcine*, *Sérénol*, *Taxol*, *Uralysol*, *Veinotrope*.
- Lab. Lobru, Louis Brun**, pharmacien, 92, rue Bobillot, Paris. — *Asthmolysin*, *Gouttes Pilka*, *Guaraphos*, *Hémosamine*, *Posterisan*, *Tablettes Hova*, *Produits Zyma*.
- Lab. Lobry**, 6, rue Parrot, Paris. — *Iodaphos*, *Néphrylan*.
- Lab. des Spécialités Scientifiques Logeais**, 22 bis et 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Organotiol S.-S.*, *Panxylon* (Ampoules et Granulés), *Pommade Logeais*, *Suppositoires Logeais*, *Veinhormones Logeais*.
- Lab. Jacques Logeais**, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux. — *Boricine Meissonnier*, *Fluidostérol*, *Globules Secretan*, *Iodamélis* (Gouttes et Comprimés), *Opo Iodamélis*, *Naïodine A et B*, *Thionaïodine A et B*, *Thionaïodine* (Comprimés).
- Lab. Marcel Logeais**, 24, rue des Plantes et 1, r. Bénard, Paris. — *Analgsol*, *Choléopeptine*, *Sanicérène*.
- Lab. Loiseau**, 61, bd Malesherbes, Paris. — *Gubline*.
- Lab. Longuet**, 34, rue Sedaine, Paris. — *Arsi-Strychnal*, *Carbofixine*, *Cholépan*, *Citrosodine*, *Clisemine*, *Hamacitro*, *Narcyl*, *Ortho-Zomine*, *Phospho-Strychnal*, *Phytocjava*, *Pilules du Dr Debouzy*, *Quinuryl*, *Rénalgin*, *Rhinalginol*, *Siphuryl* (*Orthosiphon Longuet*), *Strychnal*, *Urisanine*, *Zomine*.
- Lab. Lormeau**, 27, r. Planchat, Paris. — *Cépaïne*, *Curalsine*, *Glycarsol*, *Hépasel*, *Vascosodine*. — *Spécialités Valentin-Chaillot*.

- Lab. Lorrain de Produits purs**, Etain (Meuse). — *Bégessol*, *Caparlem*, *Collosoufre*, *Cryosan*, *Sérocalsine*.
- Lab. J. Lorthioir**, 22, rue Perceval, Paris. — *Biotrignon*, *Carbotrignon* (synonyme *Biotrignon hépatique*), *Diurophyte*.
- Lab. A. Louveau**, 78, bd des Batignolles, Paris. — *Arthri-Biose Louveau*, *Iodehaméline Louveau*, *Sulfoline*, *Suppositoires Almine Louveau*, *Urosodine Louveau*.
- Lab. André Lucien**, 19, rue du Bac, Paris (VII^e). — *Atospi-pirine*, *Salicure*, *Strontiode*.
- Lab. Lucinia**, 154 bis, rue Breteuil, Marseille. — *Fusol*, *Galabactéine*, *Lucimarine*, *Vaccin H antirhumatis-mal*.
- Lab. Lumière** (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 45, rue Villon, Lyon. — *Allauroi Lumière*, *Allocaïne Lumière*, *Allochrysine Lumière*, *Antipaludique*, *Boro-sodine Lumière*, *Cryogénine Lumière*, *Cryptargol Lumière*, *Dentochrysine Lumière*, *Emgé Lumière*, *Entalva Lumière*, *Entérovaccin Lumière*, *Gelée Lumière*, *Granulochrysine Lumière*, *Hémoplasme Lumière*, *Hermophényl Lumière*, *Iodure d'amidon Lumière*, *Néohola Lumière*, *Oléochrysine*, *Oléochrysos Lumière*, *Opozones Lumière*, *Persodine Lumière*, *Rhéantine Lumière*, *Tulle gras Lumière*.
- Lab. Henri Luzuy**, 29, r. Carnot, Levallois-Perret (Seine). — *Crinomarine*, *Neuroferyl*, *Pâte Germidex*.
- Lab. A. Lyons**, 30, rue Monge, Paris. — *Arthrilax*, *Neuséda*.
- Lab. Madyl**, 14, rue de Miromesnil, Paris. — *Bromovose*, *Euphytose*, *Tapo*.
- Lab. du Magsalyl**, 10, rue J.-Hachette, Ivry-sur-Seine. — *Catalyl*, *Magbromyl*, *Magiodyl*, *Magsalyl*.
- Lab. Mahé**, pharmacien, 85, rue de Trignac, Saint-Nazaire-Penhoët (L.-Inf.). — *Sirop Hercell*.
- Lab. du Mainguy**, M. Bassin, Bondy (Seine). — *Stupho*, *Véral-gine*.
- Lab. de la Maisleriasse**, 143, rue d'Alésia, Paris (XIV^e). — *Maisleriasse*.
- Lab. Malmanche**, 101, av. Paul-Doumer, Rueil-Malmaison. — *Digestif Harvey*, *Rosalyl*, *Urobuccol*, *Valérinodor*.
- Lab. du Malone**, J. Vincent, pharmacien, Ancenis (L.-I.). — *Gouttes Malone*, *Somnalone*, *Spasmolone*.

- Lab. de la Manacine**, 83, bd de la Villette, Paris. — *Manacine*.
- Lab. Mannet**, Loudun (Vienne). — *Dragées Mannet ferro-ergotées*, *Elixir Mannet ferro-ergoté*, *Elixir tribromuré Mannet au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de potassium et au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de sodium et au Salol*.
- Lab. Manor**, St-Germain-du-Bois (S.-et-L.). — *Chronicystine*, *Gouttes Manor*, *Hépatostimuline*, *Pommade Antihémorroïdale Manor*, *Pommade Brune Manor*, *Révuksif Manor*, *Salicylate Manor*, *Suppositoires Manor*.
- Lab. Marceau** (D^{rs} A. Grigaut et A. Bontroux, pharmaciens, chefs de Lab. à la Faculté de Médecine), 25, rue du Général-Foy, Paris. — *Carb*, *Carbagyre*, *Cholérène*, *Olévone*.
- Lab. Margex**, 13, r. Mélingue, Paris. — *Créositoires*, *Gencigel*.
- Lab. Marin de Royan-Pontailiac** (Ch.-I.). — *Algozone*, *Bain de Royan Varecr*, *Cachets Castanet*, *Radio Topic C.*, *Radiophédrine*.
- Lab. Marinier**, 23, rue Ballu, Paris. — *Bi-Citrol*, *Carbagol*.
- Lab. Mariotte**, 15, rue Pasteur, Bourg (Ain). — *Neutropeptine*, *Pectosédyt*, *Phytogénol*, *Taxobyl*.
- Lab. Mars**, Guérande (L.-Inf.). — *Argyrescine Mars*, *BB Derm Mars*, *Sanubrol Mars*, *Seinderm Mars*.
- Lab. Martin**, 25-27, r. du Commandant-Rivière, Colombes (Seine). — *Cytobiase*, *Quinosiphon*.
- Lab. du Dr Martinet**, 16, rue du Petit-Musc, Paris. — *Granoxyl*, *Gynarsol*, *Hémopausine*, *Hépadrainase*, *Hormovitol*, *Hygiodine*, *Insuline Novo*, *Lipolysine*, *Lymphiode*, *Magnésosvules*, *Néocollargol*, *Pangaduine*.
- Lab. Martinie**, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Benzo-sulfène*, *Phlebotonine*, *Tonicalcine*, *Uvargol*.
- Lab. Martin-Mazade**, St-Raphaël (Var). — *Elixir Eupnéique Martin-Mazade*, *Cigarettes-Papier-Poudre Antiasthmatiques Martin-Mazade*, *Pilules anti-diabétiques Jaillardon*.
- Lab. Maronneau-Morel**, 43 et 45, r. des Fauvelles, Courbevoie (Seine). — *Curiosan*, *Gamostyl*, *Trépositoires*, *Vaccin anticolibacillaire polyvalent M.-M.*
- Lab. du Marubor**, 1, rue d'Arras, Béthune. — *Carbolaxine*, *Marubor*.
- Lab. Masson**, 2, place de la Porte-des-Ternes, Paris (XVII^e). — *Continol*, *Lactaris*.
- Lab. R.-L. Mathivat (Synthesis)**, 66, rue de la Pompe, Paris (XVI^e). — *Collutoire Trepallix*, *Novatropine*, *Pantocamphe*, *Perparine*, *Surparine*, *Trepallix*.
- Lab. Mato, J.-B. Dupeyroux**, 95, rue Lecourbe, Paris (XV^e). — *Calmarine*.

- Lab. Mauchant**, 22, bd Camelinat, Gennevilliers (Seine). — *Asthmapepton*, *Cassitol*, *Fluveinose Mauchant*, *Héparmine Mauchant* (Ampoules buvables et sirop), *Iodonucléol*, *Lipovita*, *Maltine Phenix*, *Minéraline du Dr C. Baud*, *Myodyne Mauchant*, *Narkène*, *Phoscamine*, *Rhodoboryl*, *Salubrine* (Liquide et Comprimés), *Sirop Mauchant*, *Solvuric*, *Suc Durham*, *Tercolène*, *Trilactine*.
- Lab. C. Maury**, 6, rue de Paris, Joinville-le-Pont (Seine). — *Elixir Godfrin*.
- Lab. P. May**, 215, bd Voltaire, Paris (XI^e). — *Tympanyl May*.
- Lab. Mayaud**, 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ulcérophile Nosan*.
- Lab. Mayoly Spindler**, 1, place Victor-Hugo, Paris. — *Baume Aroma*, *Borostyrol*, *Dicaliode*, *Euphon*, *Fluenzyl*, *Isoluol*, *Kalastyl*, *Pérubore*, *Pipettes nasales M. S.*, *Rhino-Borostyrol*, *Sanoformine*, *Stillargol*, *Valbrol*.
- Lab. de Médecine Expérimentale**, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. — *Fludiose*, *Formocarbène*, *Opochol*, *Sodothioli*.
- Lab. Médico-Pharmacologique de Vichy**, 1 et 3, r. Lafloque, Vichy. — *Frugeolines-Vichy*, *Neutroses-Vichy*.
- Lab. Mercier**, Fécamp (S.-I.). — *Baume Iki*, *Pommade Aiphème*, *Savon Aiphème*.
- Institut Biologique Mérieux**, 17, rue Bourgelat, Lyon. — *Tuberculines*.
- Lab. Merlet**, 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine. — *Becalciol*, *Cuprosténol*, *Ephédrolyptol*, *Huile camphrée manganésée Mètere*, *Stragol*, *Solhermol*.
- Lab. J. Messis**, 71, av. de la République, Champigny (Seine). — *Agozymase*, *Guérysipèle*, *Hémotrope* (Gouttes), *Santal Dolmay*, *Urosinol Damber*, *Vicéliase*, *Vigotonique*.
- Lab. du Métacuprol**, 5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e). — *Métacuprol*, *Métavitalyse*, *Neuroplexyl*, *Phylocuprine*.
- Lab. Paul Métadier**, Tours. — *Métaspirine*, *Méta-Titane* (crème, savons), *Méta-Vaccin* (ovules), *Rhino-Titané*, *S. I. C.*
- Lab. Mètere**, 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne (Seine). — *Béalciol « Mètere »*, *Cuprosténol « Mètere »*, *Diathès « Mètere »*, *Huile camphrée Manganésée « Mètere »*, *Solhermol « Mètere »*.
- Lab. Mexyl**, 6, rue des Dames. — *Collutoire Mexyl*, *Filtraxyl*, *Mexyl*, *Solarsal*, *Trineuxyl*, *Wipla*.

- Lab. du D^r Mialhe**, 8, rue Favart, Paris. — *Adrénine*, *Aquintol-Mialhe*, *Digi-Lanatine*, *Digi-Mial-Baine*, *Digitaline-Mialhe*, *Elixir du D^r Mialhe*, *Lab-lacto-ferment*, *Oua-baine-Mialhe*, *Salvacid*.
- Lab. Michel**, Cirey-sur-Vezouze (M.-et-M.). — *Chasvers Michel*, *Fluidobile*, *Xeroderme*.
- Lab. Michelin**, 20, bd Heurteloup, Tours. — *Æsculase*, *Sonagar*, *Sonamel*.
- Lab. Michels**, 4 bis, rue du Colonel-Moll, Paris (XVII^e). — *Chloro-calcion*, *Silisode*.
- Lab. du Mictasol**, 5, rue de Lübeck, Paris. — *Mictasol*, *Mictasol Bleu*, *Mictasovules*, *Mictazine*, *Suppositoires Mictasol*.
- Lab. Midy**, 67, av. de Wagram, Paris. — *Algipan Midy*, *Antidiabétique Midy*, *Antigastralgique*, *Antigrippine Midy*, *Bétul-ol Midy*, *Bi-iodure de mercure indolore Midy*, *Carbolin Midy*, *simple et composé*, *Cascara Midy*, *Cocaïne Midy*, *Colchi-Sal Midy*, *Panlacto Midy*, *Pipérazine Midy*, *Pommade Midy*, *Proveinase Midy*, *Suppositoires Midy*, *Thiodacaïne Midy*, *Thiodérazine Midy*.
- Lab. L. Mignard**, 24, bd de Sébastopol, Paris. — *Entelactol*, *Total Magnésien*.
- Lab. E. Millet**, Rambouillet (S.-et-O.). — *Carbos*, *Comprimés et Suppositoires de Calomel*, *Comprimés de Carbonate de chaux*, *Formocarbos*, *Laxoléine*, *Mucicarbos*, *Mucilaxine*, *Mucilose*, *Rectoplasme*.
- Lab. Millet et Guillaumin**, 4, rue Richer, Paris. — *Frixol*, *Hormuclases du D^r Roussel*, *Kénol*, *Myovarsyl*, *Paxène*, *Uclarsyl*, *Vanadyl*, *Vanoxyle*.
- Lab. Millot**, 177, rue de Courcelles, Paris. — *Ampoules Dubé*, *Benzo-bismuth Millot*, *Comprimés néothorium Millot*, *Crayons néothorium Millot*, *Orargol (Rhino, Gouttes, Collyre, Ampoules)*, *Ovules néothorium Millot*, *Pommade néothorium Millot*, *Sarcoptol*, *Soluté Gaube du Gers*.
- Lab. Miluc (L. Ragoucy)**, 2, r. Joseph-Bara, Paris (VI^e). — *Allergantyl Miluc*, *Nervantyl Miluc*.
- Lab. Minerva**, 10, rue Bayard, Toulouse (H.-G.). — *Vitalyne*.
- Lab. A. Mironneau**, Pharmacien à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — *Drinal*, *Hormiadyne*, *Sodergyl*.
- Lab. Moisière**, 62, r. du Gros-Noyer, Ermont (S.-et-O.). — *Sirop Eupeptique Bi-Ci-Pa*.
- Lab. J. Moity**, 199, bd Bineau, Neuilly-sur-Seine. — *Aérocodyl*, *Amphostabyl*, *Antalgyl*, *Cynefluine*, *Ionisalt*, *Léniserum*, *Panfluine*, *Pansmacol*, *Strongenol*.
- Lab. Monal**, 13, avenue de Ségur, Paris. — *Boléase*, *Corosédine*, *Diurophylline*, *Forcival*, *Globules Romon*, *Iodolipine*, *Magnogène*, *Prostal*, *Santal Monal au Bleu de méthylène*, *Sulfuryl Monal*, *Tensédine*, *Terkal Monal*, *Trinivérine*.

- Lab. Moncour**, 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — *Opothérapie Moncour (sphérulines et néo-sphérulines)*, *Vitacalcine Moncour*.
- Lab. Monin**, 49, rue de Maubeuge, Paris. — *Cruxol*, *Dépuratif Rob. Lechaux*, *Elixir Grez*, *Liqueur de l'Etoile anti-asthmatique*, *Pilules anti-névralgiques du D^r Cronier*. *Poudre Blol laxative*, *Vagostabyl*.
- Lab. Montagu**, 49, bd de Port-Royal, Paris. — *Broméine Montagu*, *Carbocaloïdes*, *Carbatropine*, *Carbosanis Dragées Hecquet*, *Génacide*, *Iodéine Montagu*, *Lac-Ser*, *Papier réactif du Génacide*, *Savons Michon*.
- Lab. V. et G. de Montmorot**, 2 et 4, place Gambetta, Paris. — *Subtensène*.
- Lab. P. Morand**, 197, avenue de Versailles, Paris (XVI^e). — *Sinaseptic*.
- Lab. Moreau**, 13, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris. — *Lanceryl*, *Plaganaze*, *Plaganol*, *Trialgine*.
- Lab. Morellet**, Bagnoles-de-l'Orne (Orne). — *Bagnolax*, *Euchol*, *Sulfur concentré Dax*.
- Lab. Moser et Cie**, 8, chem. de Montbrillant, Lyon (Rhône). — *Maltea Moser cristallisée*.
- Lab. Mothersill Remedy Company**, 5, rue de Provence, Paris. — *Mothersill's Seasick Remedy*.
- Lab. Moulin**, 50, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Aseplone*, *Bacilactine*, *Baume Dolora*, *Benzothymol*, *Poudre Helvétia*, *Purgement granulé*, *Rhinodol*, *Sirop Diver au Gaïacol ou au Bromoforme*, *Uricine (cachets, solution)*.
- Lab. Mouneyrat, D^r Mouneyrat, Prof. Agrégé Faculté de Médecine**, 12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — *Histogénol*, *Vioxyl*, *Hectine*, *Hectarqyre*, *Kinectine*, *Arsénomyl*, *Olbia*, *Exobol*, *Nitragol*, *Novamide*, *Pulmorex*.
- Lab. Mouré**, 5 bis, bd des Italiens, Paris. — *Artério-Phan*, *Grino-serum*, *Sirop Morlas*.
- Lab. Mousnier-Delerme**, 28, rue Velpeau-Antony (Seine). — *Dragées du D^r Gélinau*, *Sirop du D^r Gélinau*.
- Lab. du D^r Moustier**, Saint-Vallier (Drôme). — *Pilules du D^r Moustier*.
- Lab. du Musculogenol**, 117, rue Victor-Hugo, Houplines (Nord). — *Musculogenol*.
- Lab. du Muxagol**, 43, rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine. — *Muxagol*, *Ureinol*.
- Lab. du Myoral**, 3, r. Saint-Roch, Paris. — *Calcium-Francalcium*, *Franccalcium*, *Franlaxol*, *Myoral*.

- Lab. Nacher**, Pharmacien licencié ès sciences, 71, bd Carnot, Toulouse. — *Glucosyl Nacher*.
- Lab. P. Nadaud**, 31, bd de la Villette, Paris (X^e). — *Sédoplexine, Sédorectal, Toniflux, Ulcérine Berger*.
- Lab. Nador**, 25, r. de Tocqueville, Paris (XVII^e). — *Nador-Aseborhal*.
- Lab. du D^r Narodetzki**, 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris. — *Elixir Spark, Griponal, Halifletol, Nazophyl Darva, Spyrolides*.
- Lab. Nativelle**, 27, rue de la Procession, Paris (XV^e). — *Digitaline Nativelle, Natibaïne Nativelle, Ouabaïne Arnaud, Quinicardine*.
- Lab. du Néocrinol**, 89, rue Martre, Clichy (Seine). — *Bissyl, Néocrinol*.
- Néoplastex (Thuasne et Cie)**, 71, Fg St-Martin, Paris (X^e). — *Attaches Néoplastex, Bande Néoplastex*.
- Lab. du Néo-Rhénium**, 82-84, rue de Belleville (XX^e). — *Néo-Rhénium*.
- Lab. de la Néphralbine**, R. Faure, D^r en Pharmacie, 2, r. Carnot, Melun (S.-et-M.). — *Néphralbine*.
- Société Nestlé**, 6, av. César-Caire, Paris. — *Babeurre sec Elédon, Lait sec, Nestogène, Lait entier acidifié sec, Pélargon*.
- Lab. du Neurophoryl**, 187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine). — *Bromephra, Cascalobyl, Dolental, Eugestol, Neurophoryl*.
- Lab. Noelline**, Guigamp (C.-du-N.). — *Pommade Noelline, Poudre Noelline, Noelline (Sirop laxatif), Noelline (Savon)*.
- Lab. Nogryp-Nazoïl**, 94, rue de l'Ecole-Normale, Caudéran (Gironde). — *Nazoïl, Nogryp*.
- Lab. H. Nogues**, 7, r. Galvani, Paris. — *Grains de Vals, Baume maternité, Capsules Noguès, Comprimés Purgos, Néoarsite, Pilules Gip, Poudre Satine, Sirop maternité, Sirop Noguès, Thébaïl, Urémiase*.
- Lab. Nollet**, 47, rue Nollet, Paris (XVII^e). — *Alpilex, Boroformyl, Borosol, Hédusol, Pyrocurool, Végélax*.
- Lab. Norgan**, 41, rue de Rome, Paris. — *Contracide, Carbo-mucil, Decorpa, Enzypan, Hépamull, Norgangine, Normacol, Spasmacol*.
- Lab. Nova**, 61, av. de Saxe, Paris. — *Mistol*.

- Lab. Novalis**, Oullins (Rhône). — *Adrénargol*, *Gouttes Eryl*, *Lénadryl*, *Lugocalcion*, *Nasobore*, *Novolug*, *Purargol*, *Résocaïne*, *Sulfoxyl*, *Urométhyl*, *Valénal*.
- Lab. du Novhépar**, 89, rue Martre, Clichy (Seine). — *Novhépar*.
- Lab. du Novigol**, 24, rue de Lesson, Rochefort-sur-Mer (Ch.-Inf.). — *Novigol*.
- Lab. Novita**, Reichshoffen (Bas-Rhin). — *Fletyol*.
- Lab. Oberlin**, 17, rue Cadet, Paris. — *Aliment Tinardon*, *Analgénine*, *Biodynamine*, *Capsules grises Cabanès*, *Ferropeptone Oberlin*, *Gastrocalcine*, *Gouttes Linober*, *Granulé Tinardon*, *Gynaicéol*, *Hamaméliode*, *Iode Oberlin*, *Juvéol*, *Lactosone*, *Panbromine*, *Pectine Oberlin*, *Potion Bonnet*, *Rob Cabanès*, *Rob Oberlin*, *Santal Oberlin*, *Santal Salolé Cabanès*, *Savon iodé Oberlin*, *Sirop Tinardon*, *Suppositoires Cabanès*, *Uraséol*.
- O. C. P.**, 108, r. de Picpus, Paris. — *Lait de magnésie Phillips*, *Pâte dentifrice Phillips*.
- Lab. Odilia**, 42, rue du Mont-Cenis, Paris. — *Gynopausine*, *Inolène (simple, thymolé)*, *ovules à l'Inolène*, *pommade à l'Inolène*, *poudre à l'Inolène*, *Nasolène*, *Sedofolline*.
- Lab. Odinot**, 21, r. Violet, Paris. — *Calciline*, *Gastro-Sodine*, *Néo-calciline*, *Pluribiase*, *Sel digestif Bé Mé Cé*.
- Lab. de l'Oliphédrol**, 18, rue Daval, Paris (II^e). — *Oliphédrol*, *Oliphédrol BB*, *Quintozone*.
- Lab. J. Olive**, 14, rue des Minimes, Paris. — *Normogastryl*, *Plasmosthène*, *Trisalyl*, *Baume Trisalyl*.
- Lab. Olivéol-Hépaticol-Etiévant (Ed. Brun)**, La Demi-Lune (Rhône). — *Hépaticol*, *Oléol*, *Olivéol*, *Vasocônes*, *Vasconstrictine*.
- Lab. Oliviéro**, Boulogne-sur-Seine. — *Algostérine*, *Biocéane*, *Cytomagnésium*, *Hépatine Gad*, *Hétérolysine*, *Mégathion*, *Sérum de cheval Oliviéro*.
- Lab. de l'Opocalcium (A. Ranson)**, 96, r. Orfila, Paris. — *Anaclasine*, *Anaclasine Infantile*, *Opocalcium*, *Opoferrine vitaminée*.
- Lab. Opos**, 60, r. Nationale, Castelnaudary (Aude). — *Aubeliode*, *Colibyl*, *Coliseptine*, *Oponergyl*, *Oposséine*, *Rhumofan*, *Septisan*.
- Lab. Moderne d'Opothérapie et Biologie médicale**, 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse. — *Complexe Ovarien Caldo*, *Glandocalcyl*, *Hépatozyl Caldo*, *Nucléophorène*, *Sclérosérol*, *Veinoposine*.

- Lab. de l'Orcalcine**, 9, r. de la Platière, Lyon. — *Gouttes Iodopan*, *Gouttes Yseult*, *Orcalcine*, *Procolyl*, *Progaster*.
- Lab. Orrillard**, 245, rue de Vaugirard, Paris. — *Papaveryl*.
- Lab. de l'Ossyl**, Dr F. Vasseur, Glageon (Nord). — *Ossyl*.
- Lab. de l'Ostréiode**, 34, bd de la Plage, Arcachon (Gironde). — *Ostréiode*, *Ostréiode injectable*.
- Lab. de l'Oxyplastine**, 78, av. de Saint-Ouen, Paris. — *Oxyplastine*.
- Lab. de l'Ozol**, 6, pl. des Ternes, Paris. — *Arg-Eph*, *Hyol*, *Ozol*, *Ozolase*.
- Lab. Ozothine**, 4, chaussée de la Muette, Paris (XVI^e). — *Ozothine*.
- Lab. Pachaut**, 130, bd Haussmann, Paris. — *Bromures Pachaut* *Cachets Pachaut Alpha et Gamma*, *Eupaveryl*, *Pachaut*, *Iodures Pachaut*, *Limonade hypotensive Pachaut*, *Lotion végétale Pachaut*, *Phosphogène Pachaut*, *Suppositoires Pachaut*, *Tartrate borico-potassique Pachaut*, *Tubes de Bromure Pachaut*, *Valériane liquide Pachaut*.
- Lab. R. Paméla**, 85, rue Turbigo, Paris (III^e). — *Blagny* (dragées, gouttes, sirop), *Vitarsenic* (dragées).
- Société du Pampryl**, Nuits-St-Georges (Côte-d'Or), et 149, rue du Port-de-Bercy, Paris (XII^e). — *Pampryl*, *Jus de raisin*.
- Lab. de la Pancréatose Idon**, Jean Brevière, successeur, Dr en Pharmacie, 89, r. St-Georges, Nancy. — *Pancréatose Idon* (poudre, cachets, granulé), *Poudre Cosy*.
- Pansements Prima**, 3, rue des Reculettes, Paris (XIII^e). — *Bande Mérinos-Bébé*, *Bio-Titane-Prima*, *Crêpe Eglanos*, *Multiplast*, *Plasmo-Prima*, *Prima-Furoncles*, *Primaplast*, *Prima-Steril*, *Primalex*, *Sticplast*.
- Lab. du Papier Eymonnet**, 14, Grande-Rue, Pont-de-Vaux (Ain). — *Papier Iodogène Eymonnet*, *Rhumacrescol*.
- Lab. Paret** (28 ex-22), r. Guibal, Marseille. — *Azym*, *Cellules Paret*, *Fixase et Fixase irradiée*.
- Lab. A. Paris**, 4, rue de La Motte-Picquet, Paris. — *Hémosthagosthyl*, *Lactolaxine*, *Oxydothyryne*, *Oxydovarine*, *Phagosthyl*, *Phagosthyl Mangané*.
- Lab. du Parolagar**, 348, r. St-Honoré, Paris. — *Parolagar*.
- Lab. des Prod. Paterson** (G. et M. Armingeat), 46, rue de Saintonge, Paris. — *Poudre Paterson*, *Pastilles Paterson*.
- Lib. de Pathologie générale**, 5, r. François-Ponsard, Paris. — *Néopancarpine*, *Rhinofluine*, *Vaso-neurine*.

- Lab. Pautauberge**, 10, rue de Constantinople, Paris. — *Broncurool*, *Dragées Pautauberge*, *Gaïacol Pautauberge*, *Kolarsine Pautauberge*, *Solution Pautauberge*, *Suppositoires Pautauberge* (*Adultes et Enfants*).
- Lab. Pépin et Leboncq**, 30, rue Armand-Silvestre, Courbevoie. — *Bromogénol*, *Gaurol*, *Guethural*, *Iodogénol*, *Saburase*.
- Lab. du Pepticol**, 13, av. du Maréchal-Foch, Dammarie-les-Lys (S.-et-M.). — *Pepticol*.
- Lab. du Percalcium**, A. Jourdin, 6, av. Victor-Hugo, Paris. — *Percalcium*.
- Lab. des Peroxydes médicaux**, 12-18, r. Lamartine, Paris. — *Ektogan Bocquillon* (*Poudre*, *Pommade*, *Pâte*, *Méchettes*, *Gazes*, *Ovules*, *Ekto-Plaste*), *Hopogan Bocquillon* (*Cachet*, *Pilules glutinisées*, *Prise-Bébé*), *Hopogranase*.
- Lab. Perrier**, 12, rue Henner, Paris (IX^e). — *Convalbaine*, *Scillitrine*, *Théocalciode*.
- Lab. Perrin**, 11, quai Saint-Clair, Lyon. — *Eudynol*, *Guïtose*, *Hémo-antitoxine Sofos*, *Sulfarsiode*, *Virmonal*.
- Lab. Perrochon**, Tours (I.-et-L.). — *Eurectol*, *Grains d'Évian*, *Pulmocardine* (*simple et éphédrinée*), *Rénocardine*.
- Lab. Perroud**, 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon. — *Carbonate de bismuth*, *Lénigastre*, *Tablettes Perroud*.
- Lab. du Pérusol**, 31, rue Gambetta, La Rochelle. — *Pérusol*, *Savons Benys*.
- Lab. J.-P. Petit**, 72, bd Davout, Paris (XX^e). — *Neurotensyl*.
- Lab. de la Phagolysine**, 14, rue Cantin, Courbevoie (Seine). — *Phagolysine*.
- Lab. Pharmaceutiques du Rhône** (P. Guély, D^r en Pharmacie). — 16, cours Gambetta, Lyon. — *Bronchosédol*, *Glutines Chabre* (KI ou Na!), *Migrainol*, *Phosphobiol*, *Poudre Beau chloroformée ou Ether*.
- Pharmacie anglaise des Champs-Élysées**, 62, av. des Champs-Élysées, Paris. — *Emerson's Bromo Seltzer*, *Hazellium*, *Isocollium*, *Maté Douglas*, *Thermaseline*.
- Pharmacie Biologique**, G. Combastel, F. Rischshoffer, S^r, 57, r. Mathurin-Régnier, et 47, rue Bargue, Paris. — *Panostyl*, *Vaccinothérapie Atoxique Cépède*.
- Pharmacie Centrale de Belgique**, 12, rue du Téléphone, Bruxelles. — *Carbobel*, *Digistabiline* (*Gouttes et Pilules*), *Hypersan*, *Iophénal*, *Névrosan*, *Vitamorrhaine* (*granulés, perles et pommade*).
- Pharmacie Centrale de France**, 25, bd Beaumarchais, Paris. — *Adrénaline Invar*, *Crêpe Velpeau*, *Digitaline Invar*, *Pyroléol Edet*, *Théobromine Invar*, *Végéphos*.

- Lab. de Pharmacologie appliquée**, rue Frédéric-Chevillon, Allauch (B.-du-R.). — *Amido-Septine*, *Biotone*, *Cynabiline*, *Fluase*.
- Lab. de Pharmacologie générale (Vial et Cie)**, 8, rue Vivienne, Paris. — *Capsules d'apioline* Chapoteaut, *Capsules de Morrhuol* Chapoteaut, *Capsules de Morrhuol créosote* Chapoteaut, *Capsules de Cardiosthénine*, *Cigarettes indiennes de Grimault*, *Crystol*, *Cytobaume*, *Delbiase*, *Delbosel*, *Farine maltée Vial*, *Guarana purifié de Grimault*, *Ortholaxine*, *Pharynxol*, *Quinine Pelletier*, *Santal Midy*, *Sédoprostyl*, *Sirop Lagasse*, *Sirop phénique Vial*, *Sirop de Raifort iodé de Grimault*, *Vin et poudre de Peptone de Chapoteaut*, *Vin et sirop de Dusart au lacto-phosphate de chaux*.
- Lab. Pharma-Spès**, 7, av. Louise, La Madeleine-les-Lille (Nord). — *Algasodyl*, *Arthrosedol*, *Blenosedol*, *Gastergyl*, *Hexacar*, *Infantonyl*, *Nucleotonyl*, *Pulmosodyl*, *Romarinex*, *Sympaneurol*, *Veinotonyl*, *Vigobiase*.
- Lab. Phéna**, Boite postale n° 5, Limoges (Haute-Vienne). — *Ovules Phéna*, *Phéna*.
- Lab. Philbert**, 6, av. Mirabeau, Nice. — *Blüyl*, *Néovaryl*.
- Lab. Philippe**, 122, Fg St-Honoré, Paris. — *Sédopavérine*.
- Lab. Philippe**, 5, rue Mazard, Lyon. — *Fluidbos Moyet*, *Likan asiatique*, *Orexyl*.
- Produits du Dr Philippe**, 36, quai de Fulchiron, Lyon. — *Ampoules Lémery*, *Antidote-Malaria*, *Capsules Henry*, *Cartouches Lémery*, *Gouttes Scandinaves*, *Harlem Philippe (Kérat-Harlem)*, *Kérasalicyl*, *Kéraspirine (Aspirine kératinisée)*, *Pilules Philippe Ki ou Nai*, *Pilules Lémery*, *Produits Lémery*, *Santal Henry*, *Suppositoires Lémery*.
- Lab. Phosma, M. Frémont**, 143, Cours de la Somme, Bordeaux. — *Entérargol*, *Phosma*, *Stomagyl*.
- Lab. Physiène**, 7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne (Seine). — *Coluval*, *Hormantoxone*, *Lansoyl (liquide et gelée)*, *Pineoleum*, *Quinolax*, *Salsanos*, *Saproxyl*.
- Lab. Physia**, 7, rond-point Mirabeau, Paris (XV°). — *Exu-byle*, *Venapressine*.
- Lab. de Physiologie du Puits-d'Angle**, Le Chesnay (S.-et-O.). — *Dyspeptine Hepp*.
- Lab. de Physiologie et de Thérapeutique**, 10, rue de Strasbourg, Paris (X°). — *Atural*, *Microlyse*, *Natura*.
- Lab. de Phytothérapie de Paris**, 113, bd Voltaire, Paris. — *Amipyrine*, *Ballotyl*, *Mandragal*, *Polycine*.
- Lab. de Phytothérapie Expérimentale**, 61, bd Malesherbes, Paris. — *Hygiocholène*, *Neurogalène*, *Phlebocratyl*.

- Lab. Pialoux**, 55, r. de Chabrol, Paris. — *Airoglyce*, *Bengouté*, *Cédro-Méthyle*, *Chlorurol*, *Dynamoférol*, *Hépaturyl*, *Iodoplume*, *Maniodhamamélis*, *Rectocalm*.
- Lab. du Dr Pillet**, 222, bd Péreire, Paris. — *Anti-urique de Contrexéville*, *Beef Lavoix*, *Hygiodyne*, *Neo-Coccyll*, *Neo-Salyl* (ex-Sodisalyne).
- Lab. Pillier**, 10, pl. St-Jacques, Compiègne (Oise). — *Laxior Sanex-Inhalant*.
- Lab. du Dr Pinard**, 90, bd St-Denis, Courbevoie. — *Phosphates du Dr Pinard*, *Calcigénol*, *Halocalcion*.
- Lab. Plagnol**, 18, r. du Maréchal-Foch, Versailles. — *Boldine Plagnol*, *Gaïacamphe*, *Nasylum Blondin*, *Van Sol* (cachets).
- Lab. Planche**, 2, r. Volney, Paris (II^e). — *Amidon Planche*, *Eau Sova*, *Hémophiline Planche*, *Pilules Stibiées Sirop Thomas*.
- Lab. du Dr Plantier**, Annonay (Ardèche). — *Hémopanbiline*, *Panbiline*, *Rectopanbiline*.
- Lab. J. Plé**, 111 bis, rue de Turenne, Paris. — *Antiphymique Vadam*, *Calcium-Plé*, *Diurélax*, *Histamyl*, *Phytosplénol Plé*, *Phyto-Vitamines Plé*, *Synergyl Vadam*, *Thalassotonine Vadam*, *Thalassotonine infantile*.
- Lab. du Plurinatryl**, 151, rue de Charenton, Paris (XII^e). — *Plurinatryl*.
- Lab. Pointet et Girard**, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Goudroline*, *Hépatodiagnose*, *Novismuth*, *Oxydrol*, *Prophylargyl*, *Soporalose*, *Vitargyl*.
- Produits Polypharma. Concessionnaire : L. Brun**, pharmacien, 92, rue Bobillot, Paris (XIII^e). — *Artrocolchine* « C », *Atens*, *Cuproxil*, *Nesal*.
- Lab. de la Polyveinine**, 152, Côte Pavé, Toulouse. — *Polyveinine*.
- Lab. Pompanon**, 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris. — *Sulfureux Pouillet*.
- Lab. Porcher**, 35, rue des Blancs-Manteaux, Paris. — *Dermacide Porcher*, *Eczéda*, *Eczosec*.
- Lab. Porsin**, 39, rue Claude-Bernard, Paris. — *Apivène*.
- Lab. du Praticien**, Hussigny-Godbrange (M.-et-M.). — *Angihormol*, *Axyol*, *Bioxyol*, *Diatol*, *Exugyl*, *Minurex*, *Oxythyol*, *Thioxyol*, *Traitement Ambulatoire*.
- Lab. D. Prigniau**, 52, rue des Cinq-Diamants, Paris (XIII^e). — *Glyphéranol*, *Mercuro-Past*.
- Lab. Probios**, 8, r. St-Martin, Paris (IV^e). — *Amiflorine*, *Azama*, *Bioserum*, *Camphrolyse*, *Comprimés Probios* (antipyogènes, voies respiratoires, intestinal), *Denti-*

frice Probios, Diorine, Dogastro, Germinol, Kao-Carbo, Embryona, Granules de Bourget, Hepationa, Intesto, Obsor, Onogo, Ovules Oape, Ovules Probios, Pépione, Pommade Probios, Sedabios et Suppos. Sedabios, Spasa, Triano, Vaccinothérapie Probios.

Lab. des Produits Biologiques I. M. (S. Savigneux, pharmacien), 18, Cours Suchet, Lyon. — Séro-Comprimés, Sérolactyl, Séro-liquide.

Lab. des Produits Dermiques R. P., La Roche-Posay (Vienne). — Lotion Blanche R. P., Pâte à l'Eau R. P., Roche-Posay (produits), Sels de Bains R. P.

Soc. des Produits du Maïs, 29, rue de Berri, Paris. — Dextrosol, Dextrospor, Maïzena.

Lab. des Produits Ortho-Malleval, 34, r. du Plat, 9, r. Sala, Lyon (Rhône). — Comprimés Ortho-Malleval.

Lab. Progil, 10, quai de Serin, Lyon (Rhône) et 6, rue du Pont, Ris-Orangis (S.-et-O.). — Diasés, MaltoGil.

Le Progrès Scientifique, 25, bd Latour-Maubourg, Paris (VII^e). — Chlorammonic, Demalgon, Neutracétyl, Neutracétyl chocolaté, Novurit, Rubrophène, Strychnotonine, Synthéma, Valovosan.

Lab. L. Prothière, 55, rue Auguste-Comte, Lyon. — Fucosine.

Lab. Prunier 4, rue de la Coutellerie, Paris. — Comprimés Vichy-Elat, Neurosine Prunier.

Lab. du Pulmodynol, 22, rue de Nemours, Paris. — Sédarthryl.

Lab. du Purgarex, 58, r. du Rempart, Valenciennes (Nord). — Purgarex.

Lab. du Pugetol, 19, rue de Pontevès, Marseille. — Boldolive, Dermolive, Rhinolive, Sulfolive, Suppo Bil Olive, Suppolive.

Lab. Py, 58, bd Richard-Wallace, Puteaux. — Lotion Py, Phostyl Py, Sédygal Py, Toussyl Py.

Lab. de la Pyodolysine (F. Martin, pharmacien), 2, rue des Trois-Mages, Marseille (B.-du-R.). — Pyodolysine Sédo-Bronchol, Thymoseptyl.

Lab. du Quassinol, J. Olive, pharmacien, 73, bd Baille et 109, rue de Lodi, Marseille. — Gouttes Quassinol.

Lab. Quesneville, L. Colleson, 5, r. d'Angoulême, Paris. — Crème de Bismuth, Crème de Bismuth Chl. magnésienne, Cupro-Salyl du D^r Quesneville.

- Lab. Quies**, 8, rue Auguste-Chabrières, Paris (XV^e). — *Boules Quies*.
- Lab. du Quina Blot**, 38, bd de Strasbourg, Toulouse. — *Pelvi-ryl*, *Quina pepsiné Blot*.
- Lab. du Quina Bourcet**, 7, avenue du Doyenné, Lyon. — *Bain de Bouche du D^r A. Boll*, *Bronchial Luna*, *Quina Bourcet*, *Thiobyl Bourcet*.
- Lab. Quinet**, 143, r. du Temple, Paris. — *Phosol*, *Quinobore*.
- Lab. du Quinsal** (F. Bolla), 34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône). — *Crème Stéar*, *Poudre Stéar*, *Quinsal*, *Sirop Bolla*.
- Lab. Raby**, pl. de la Comète, Asnières. — *Biliase*, *Raby*, *Neuristol*, *Uricural*.
- Lab. du Radio-Baryx**, 1, rue de Paris, Limours (S.-et-O.) — *Baryx-Colloïdal*, *Radio-Baryx*.
- Agence Générale des Produits Rafax**, 4, rue Boulard, Paris (XIV^e). — *Baume Rafax*.
- Lab. des Savons Ramet**, Fontenay-Mauvoisin par Mantes-Gassicourt (S.-et-O.). — *Savons liquides Ramet*.
- Lab. Ranque et Senez**, 16, rue du Dragon, Marseille. — *Vaccins bactériens I. O. D.*, *Phylaxines*.
- Lab. D. Raquet**, 114, rue Solférino, Lille. — *Cavéform*, *Kélédol et Suppo-Kélédol*.
- Etabl. André Ratier**, 13, pl. du Peuple, St-Etienne (Loire). — *Alcalino-Correctine*, *Broncho-Correctine*, *Laxiris*, *Pepto-Correctine*.
- Lab. Y. Ravalec**, Pharmacien, 13, Grande-Rue, Herblay (S.-et-O.). — *Bellasodine*, *Carboquinol*.
- Lab. R. B. D.**, 37, rue du Vieil-Abreuvoir, Roubaix (Nord). **D^r J. Willot**, pharmacien. — *Babysanine*, *Cutisanine*.
- G. Reaumont et C^{ie}**, 115, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. — *Agarase*, *Passicarbonate*, *Passiflorine*, *Silguine*.
- Lab. Reboul**, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine). — *Anuidol*, *Bituyol*, *Cardiobromine*, *Cholagol*, *Créo-suppo-camphre*, *Ergostol Violet*, *Péruiol*, *Sanocure*, *Tanode*, *Toni-bronchique*, *Uribiline*.
- Lab. du Reconstituant Mary**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Phosphogaiacol Mary*, *Reconstituant Mary*.
- Lab. Regagnon et Cie**, 276, rue Lecourbe, Paris (XV^e). — *Amborhinol*, *Bicolyle*, *Bronchosédyl*, *Energésine*, *Sédoplasme*, *Sedorhinol*.
- Lab. M. Reinhold**, 20, rue de Rivoli, Paris (IV^e). — *Hébéol*.

- Lab. Reivilo**, 191, fg Saint-Antoine, Paris (XI°). — *Digex*.
- Lab. Remeaud**, 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine. — *Kluchol Remeaud*.
- Lab. Renard**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Algane*, *Crypthiol*, *Pneumogéine*.
- Lab. Renard et Cie**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Gaduamine*.
- Lab. du Dr Renaud**, 2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes. — *Cupro-Glycol*, *Ampoules Cardio-camphre simple et spar-téiné*, *Elixir Phospho-Mel*, *Hyper-Sérum Nac*, *Suppa-baine*.
- Dépôt général Rendell**, 61, rue Damrémont, Paris (XVIII°). — *Cônes solubles antiseptiques Rendell*.
- Lab. Ch. Requis**, 163, bd Croix-Rousse, Lyon. — *Antidiabétique Requis*.
- Lab. Revel**, 34, rue St-Lazare, Paris. — *Iodonesyl*, *Philo-gastrine*, *Umcka*.
- Lab. Rey**, 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or). — *Casol F. Rey*, *Ludin*, *Pommade Crème Ludin*, *Sericine Rey*, *Seroma Rey*.
- Lab. Reygagne**, 160, avenue d'Italie, Paris (XIII°). — *Ampoules Anti-H*, *Bioélixir*, *Bio-organic*, *Poudre Anti-H*.
- Lab. Rhemda**, 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine). — *Boues radioactives Rhemda*, *Bougies radioactives Rhemda*, *Dermathorium*, *Mésothine*, *Mésothorium Rhemda*, *Radiovules Rhemda*, *Radiargyl*, *Radiomagnésium*, *Thorix (Thorium X Rhemda)*.
- Lab. Rhinophta**, 82, rue de la Croix-Verte, Albi (Tarn). — *Produits Orhino*, *Tubes Ferlux Ratio*.
- Lab. Ricardou et Cie**, 46, r. Pierre-Charron, Paris (VIII°). — *Antibilieux Fuzor*, *Dentoline*, *Innerclean*, *Phospharsol*, *Spécialités de Brides*, *Sylvol*.
- Lab. M. Richard**, Aubenas (Ardèche). — *Desintex*, *Gastri-lène*, *Gripposédine*, *Neurosthénol*, *Péruglan*, *Phosphan-tyl*, *Rhinalène*.
- Lab. Richer**, 45, fg St-Denis, Paris. — *Adrogestill*, *Carbogé-nase*, *Chlorothymol*, *Colpophile*, *Comprimés et Cachets Salvé*, *Embrocation Richer*, *Euskine*, *Florhépatine*, *Gynométine*, *Kolarsan*, *Lactodiastal*, *Mictophile*, *Morucalcose*, *Néopulmine*, *Neuraxial*, *Novaiodal*, *Nucléar-san*, *Oxmol*, *Paraveinine*, *Salvébyl*, *Stavafer*, *Vixol*.
- Lab. Richomme**, 29, bd Voltaire, Paris. — *Cachets du Dr Ri-chomme*.
- Lab. Richou**, 39, r. Taitbout, Paris. — *Gotira*.
- Lab. Ringeade**, Pharmacien, Fosseboudeau-Blaye (Gironde). — *Penghawar des Iles*.

- Lab. Rissa**, 46, rue Claude-Lorrain, Lille. — *Calci-Osteline*, *Glaxo*, *Glucose D*, *Iodex*, *Ostetine*, *Ostomalt*.
- Lab. M. de Rive**, 11 bis et 13, rue Levert, Paris (XX^e). — *Aurixéma*, *Biodarcine*, *Calyptophédryl*, *Collargophédryne*, *Ephédryvaine*, *Ephédrocure*, *Hépavita*, *Minervol*, *Pulvo-Collargophédryne*, *Pulvo-Ephédrocure*, *Soluphédryne*.
- Lab. H. Rivier**, 10, passage Morel, Montrouge (Seine). — *Anégrine*, *Ascoléine Rivier*, *Benzo-Iodhydrine*, *Cap-sules Bruel*, *Dragées Pierlot*, *Séro-sérum Rivier*, *Valériane Pierlot*.
- Phar. J. Robert** (J. Boudier, succ.), 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Bylyxyl*, *Hémocalciopectine*, *Extrait Bile Boudier*, *Veinosan*.
- Lab. Robert**, Place des Halles, Niort. — *Antiseptoma*, *Cardirène*, *Robrodyne*.
- Lab. Robert et Carrière**, 1, av. de Villars, Paris. — *Bacté-Intesti-Phage*, *Bacté-Coli-Phage*, *Bacté-Pyo-Phage*, *Bacté-Staphy-Phage*, *Bacté-Rhino-Phage*, *Biocholone*, *Biomucine*, *Endocarbone Ercé*, *Entéromucine*, *Ercerhinol*, *Hémostatique Ercé*, *Lysacrème L. M. L.*, *Lysaxins L. M. L.*, *Pantamine*, *Stannoxyd*, *Vaccin de Weill et Dufourt*.
- Lab. Robia**, M. Robilliart, pharmacien, 33-35, rue Faidherbe Lille. — *Cardior*, *Feminol*, *Laxaseptol*.
- Lab. Robin**, 13, rue de Poissy, Paris (V^e). — *Bismuthoidol Robin*, *Bromone Robin*, *Camphydryl Robin*, *Camphydryl spartéiné*, *Camphydryl strychno-spartéiné*, *Glycérophosphate Robin*, *Iodone Robin*, *Nucléarsitol*, *Nucléatol*, *Parulcine*, *Pâte Robin*, *Peptonate de fer Robin*, *Peptokola Robin*, *Sirop Robin*, *Strychnarsitol Robin*, *Sulfoïdol Robin*, *Tablettes Sédatives Robin*, *Thiofène Robin*, *Voltargol*.
- Lab. Robinet**, Moret-sur-Loing (S.-et-M.). — *Magnésotube Robinet*.
- Lab. Roche**, Pharmacien, 9, r. de la Platière, Lyon. — *Iodopan*, *Orcalcine*, *Progaster*, *Yseult*.
- Lab. Ch. Roche**, 2, rue Michelet, Alger. — *Ioglott*, *Perles Ferro-Vitales*, *Urticide*.
- Lab. Rochereau**, Salbris (L.-et-C.). — *Dolysine*.
- Pharmacie Rogé Cavaillès**, M. Lachartre, Docteur en Pharmacie, succ., 116, bd Haussmann, Paris. — *Anoïde*, *Elixir iodépuratif Pépin*, *Pepsinacid*, *Phytoveinol*, *Suppositoires Rocav*.
- Lab. Rogerma**, rue des Jardins, Lens (Pas-de-Calais). — *Histogerma*, *Neurosol*, *Rogerma*.
- Lab. Henry Rogier**, 56, bd Pereire, Paris. — *Baume Delacour*, *Kymosine Rogier*, *Suppositoires Peper*, *Uraseptine*, *Valbornine Rogier*, *Vitamine Rogier*.

- Lab. Albert Rolland**, 4, rue Platon, Paris (XV^e). — *Hépa-*
phos, Hépatrol, Hepbi, Micelliode, Octensanol, Stomazrol.
- Lab. du Docteur Pierre Rolland**. Dépôt : 127, bd St-Michel,
Paris (V^e). — *Balmiga, Hypalène, Hypalène Mal de*
Mer, Hypalène obstétrical, Natrosyl.
- Lab. du D^r P. Rolland et Duret et Rémy réunis**, 15, rue des
Champs, Asnières (Seine). — *Bis-Ka-Ma, Choléo-*
kinase, Comprimés d'Alibour, Cystocone, Hépatoso-
dine, Histropa, Nobial, Nyctal, Pelvisedyl, Peptonal,
Polypeptonal, Pyroclase, Quinobrome, Saturo, Sero-
quinol, Thaolaxine, Tussédyl, Zoocytine.
- Lab. Romon**, 11 ter, av. de Ségur, Paris. — *Ampoules Romon,*
Forvical, Globules Romon, Limital, Magnogène,
Tranquital.
- Étab. Roques**, 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. —
Delcaïne Roques.
- Lab. Rosa**, 11, r. Roger-Bacon, Paris, XVII^e. — *Chophytol*
Rosa cristallisé (ampoules injectables de 5 cc.), Cho-
phytol gouttes, Chophytol dragées, Cynuro, Rosa
(dragées).
- Lab. des Produits biochimiques Rosso**, 63, rue de Charonne,
Paris. — *Biophényl, Calcium Rosso, Calminal, Cam-*
phogénine, Embrocaton Rosso, Gaïacoline, Gluco-
biocalcium, Hormosthényl, Lactiphage, Magnésium
Rosso.
- Lab. L. Rouanet**, 48, rue de la République, Antibes (A.-M.).
— *Apiol Tanit, Phosphogayol, Tisane Tanit*.
- Lab. Rousseau**, 71, av. de Villiers, Paris (XVII^e). — *Rhaga-*
dine Bracquemond.
- Lab. Rousseau**, 4, rue Gambetta, Sens (Yonne). — *Gouttes*
Triol, Nervyl Rousseau, Panchol-Sel.
- Pharmacie Roussel**, 10, rue Washington, Paris. — *Élixir*
Tonicardiaque Roussel, Sirop et Gouttes au Nitrite de
Soude Roussel, Tétranitrol Roussel, Trinitrine Roussel.
- Lab. du D^r Roussel**, 97, r. de Vaugirard, Paris (VI^e). —
Angioxyl, Damicol, Disonyl, Gravidostyl, Hémostyl,
Hépagyl, Hormone Gonadotrope, Insulanol, Insulyl,
Microgel, Microvax, Proxylol, Sérum Polyvalent de
Leclainche et Vallée, Suiseryl, Trephonyl.
- Lab. du D^r Roussel**, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e).
— *Acéto-Sterandryl, Benzo-Gynœstryl, Benzo-Gynœs-*
tryl 5, Bivatol, Casaldyl, Collubiazol, Ectiazol, Folli-
culine, Gynœstryl, Hormuclases, Isonal, Lysarthrol,
Myovarsyl, Opodermyl, Opothérapie du D^r Roussel,
Phytogyl, Pyroformine, Renoxyl, Rubiaderm, Rubiazol,
Sedo-Gynœstryl, Sirop laxatif Gobey, Sirop pectoral
Gobey, Sirop sédatif Gobey, Stérandryl, Sterogyl,
Uclarsyl, Uroformine Gobey.

- Lab. R. Roussel**, 72, Grande-Rue, Flers (Orne). — *Bromophène*, *Hémorroïdyl*, *Paidol*, *Plasmatol*, *Prurilyse*.
- Lab. Routier**, 20, rue St-Lazare, Paris. — *Baume Duret*.
- Lab. M.-A. Roux (M. A. R.)**, 58, rue de Maubeuge, Paris. — *Antiseptique Nénita*, *Armosine*, *Bili-Magnétol*, *Entéroglandex*, *Gastronaldine*, *Glandex*, *Gutturul*, *Kaolovules*, *Phlogogyne*, *Phlogovules*, *Purgelettes Roux*, *Sirop Iodaconit*, *Stechorules*, *Sulhyp*, *Totaliode*, *Ur-Clar Blanc Bleu*, *Urimagnétol*.
- Lab. Roux**, 60, route de Châtillon, Malakoff. — *Ricilax*, *Sédosalyl*, *Miroxyl*, *Trachédrine*, *Cinalose*.
- Lab. Roy**, 29, av. Charras, Clermont-Ferrand. — *Ferydal*, *Spécifique Mignard*, *Sulfocalcyl*.
- Lab. de Biol. Appl. G. Roze**, 2, allées de Chelles, Le Raincy (S.-et-O.). — *Iode colloïdal Roze*, *Bismogyre*, *Marra-mélis*, *Philhepar*, *Rhinarsenol*, *Sirop Seillon*.
- Lab. Sabatier**, 10, rue René-Bazin, Paris (XVI^e). — *Fluodyle*, *Ouataplasme D^r Langlebert*.
- Lab. Salantale**, 42, Grandes-Arcades, Strasbourg. — *Vaccins Salantale* : *Auriculo*, *Cysto*, *Gingivo*, *Ophthalmo*, *Oto*, *Ovules*, *Pommade*, *Recto*, *Rhino*, *Suppo*, *Tracho Salantale*.
Tubes Strana : *Pommades ophtalmiques*.
- Lab. du Salibra**, 1, rue des Jardins, Asnières (Seine). — *Salibra*.
- Établ. Thermal de Salies-du-Salat** (Haute-Garonne). — *Eaux-Mères*.
- Lab. A. Salles**, 11, bd de Strasbourg, Paris. — *Boldolactol*, *Elixir Zidal*, *Zidaline*.
- Lab. du Salyfrêne**, 17, avenue de la Capelette, Marseille. — *Salyfrêne*.
- Lab. Sanarteryl**, 124, rue St-Dominique, Paris (VII^e). — *Sanarteryl*, *Sedhepatine*.
- Lab. Sanavita**, 7, r. Fontaine-Delsaux, Lille. — *Bevita*, *Viredox*.
- Prod. Sandoz**, 20, r. Vernier, Paris (XVII^e). — *Allisatine*, *Baume-Panthésine*, *Belladénal*, *Bellafoline*, *Bellergal*, *Calcibronat*, « *Calcium-Sandoz* », *Digilanide*, *Féla mine*, *Gynergène*, *Ipecopan*, *Lobéline*, *Néo-Gynergène*, *Opialidon*, « *Quinine-Calcium-Sandoz* », *Raphabil*, *Sandoptal*, *Scillarène*.

- Produits Sanova**, 103, rue St-Lazare, Paris. — *Enteraspirine*, *Hépatismine*, *Iodasclérine*, *Magnacalcine*, *Magnésie Roger's*, *Osmo-Peptine*, *Talyc*, *Tisane Sanova*, *Uricémine*, *Urose Vigan*.
- Lab. de la Santhéose**, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris. — *Santhéose*.
- Lab. Saporex**, 184, route de Genas, Lyon. — *Barytol*, *Saporex (liquide)*, *Ovules Saporex*.
- Lab. Saporta**, 59, bd Lefebvre, Paris (XV^e). — *Embrocane*, *Térébane*.
- Lab. du Sarcoptol**, 177, rue de Courcelles, Paris. — *Sarcoptol*.
- Lab. Sarein**, 14, avenue Perrichont, Paris. — Voir *Lab. de Thérapeutique Antirhumatismale*.
- Lab. Sassé**, 78, bd Beaumarchais, Paris. — *Cacospermine*, *Dercusan*, *Dermose anti-impétigineuse*, *Enteroseptyl*, *Rinoleina*, *Sanalepsi Russi*.
- Lab. Saunier**, 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e). — *Baume Géluirol*, *Gachets Saunier*, *Hédopeptol*, *Libérase*.
- Lab. Sanze**, 60, rue Jean-Jaurès, Firminy (Loire). — *Euquinargol*, *Ultraformine B et S*.
- Lab. Roger Savoie**, 2 et 4, place St-Martin, Vendôme (L.-et-Ch.). — *Psoryl*, *Pycoline*.
- Lab. Henri Schéhadé**, 17, rue Chomel, Paris (VII^e). — *Arthrilyse*, *Asthmasédine*, *Capsorhinol*, *Euvagol*, *Normalax (pur et au Cascara)*, *Oléorhinol*, *Ova-Crine*.
- Lab. Schmit**, 71, rue Ste-Anne, Paris. — *Aérocine*, *Aseptobiline*, *Formicalcine*, *Mangaine*, *Mucigénol*, *Myonutrose*, *Opocères*, *Prélase*, *Régénase*.
- Lab. des Prod. Scientia** (Dr E. Perraudin, pharmacien de 1^{re} classe), 21, r. Chaptal, Paris. — *Bain Bagnor*, *Calcoléol*, *Diabétifuge*, *Digestonic*, *Ergotine Bonjean*, *Globexine*, *Huile iodée et Calcium Finikoff*, *Iodocitrane*, *Oxymenthol*, *Pancrépar*, *Peptalmine*, *Peptalmine magnésinée*, *Polycalcion*, *Quineine*, *Saphylococcine Fraquet*, *Tricalcine*.
- Lab. Scott et fils**, 348, rue St-Honoré, Paris (I^{er}). — *Mélatone*, *Opto Scott*, *Trisilmag*.
- Lab. Schoum**, 15, rue de la Sablière, Bécon-les-Bruyères (Seine). — *Solution Schoum*.
- Lab. Seclo**, 6, r. Adolphe-La-Lyre, Courbevoie. — *Baume Kamol*, *Chocolax*, *Emulsion Scott*, *Huile de foie de Morue Seclo*, *Pastilles Seclo*, *Suppopirine Seclo*, *Uricure*, *Vitamines Seclo*.
- Lab. Seda**, 149, av. des Minimes, Toulouse. — *Acticarbène*, *Actiformine*, *Cachets Seda*, *Colluséda*, *Elixir Seda*, *Neuroséda*, *Pectophédryl*, *Pectoséda*, *Pulviséda*.

- Lab. du Sédarthryl, 22, rue de Nemours, Paris. — *Luostyl, Pulmodynol*.
- Lab. de la Sédatussine, A. Jourdin, 6, av. Victor-Hugo, Paris. — *Sédatussine*.
- Lab. de la Sedhepatine, 124, rue St-Dominique, Paris (VII^e). — *Sanarteryl, Sedhepatine*.
- Lab. du Sédosalyl, 60, route de Châtillon, Malakoff (Seine). — *Sédosalyl*.
- Lab. Seguin, 165, rue St-Honoré, Paris. — *Capsules Joret et Homolle, Phosphofluor Beynet*.
- Lab. Ch. Seguin, 7, r. Sainte-Isaure, Paris (XVIII^e). — *Articholine, Artrex-Croz, Calcium Vehem, Ektal, Génysil, Iodoxinol, Irracalcase, Moruan, Orthochol, Orthosedan, Phéchlorment, Pulmositoires*.
- Lab. Serindat, 4, rue Lecomte-de-Nouy, Paris (XVI^e). — *Phosphobrom*.
- Lab. du Séroxéma, 1, rue de Phalsbourg, Paris (XVII^e). — *Séroxéma*.
- Lab. du Serpent, 5, bd Gambetta, Grenoble (Isère). — *Sal-Sodyl*.
- Lab. J.-M. Serre, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Olcalan, Porodermal, Vermifuge Cornet*.
- Lab. Servier, 25, rue Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Gaduase, Iminasthme, Muxol, Ozodor, Pyri-pyridium, Stérigyne (ovules)*.
- Lab. Sevenet, 10, rue Le Chapelais, Paris. — *Hémagène Tailleur*.
- Lab. Sévigné, 76, rue des Rondeaux, Paris (XX^e). — *Ulcéoplaque, Ulcéobande, Ulcéosine, Ulcéosol, Ulcéobalnéine*.
- Lab. Sféat, 15, r. Catulienne, St-Denis. — *Acripyoril, Bucco-Progone, C. B. K., Oléovules, Progone, Progoseptone, Sféol, Sirop Viano, Suppositoires SFEAT*.
- Lab. SICA, 13, r. Beudant, Paris (XVII^e). — *Euplastyl, Jecopeptol, Mandocarbène, Sédontal, Sicridine, Tra-phéine*.
- Lab. du Sicovaire, 89, rue Martre, Clichy (Seine). — *Sicovaire*.
- Lab. du Siècle, 13, rue Boinod, Paris. — *Bromo-Garnal, Draguirol*.
- Étab. Silbert et Ripert, 30, rue Bénédict, Marseille. — *Murones du D^r Robert Jacques*.
- Société Industrielle de Thérapeutique scientifique appliquée, lab. du D^r Paul Rolland et Duret et Rémy réunis, 15, rue des Champs, Asnières (Seine). — *Bis-Ka-Ma, Choléokinase, Comprimés d'Alibour, Cystocone, Hépatosodine, Histropa, Nobial, Nyctal, Pelvisedyl, Peptonal, Polypeptonal, Pyroclase, Quinobrome, Saturol, Seroquinol, Thaolaxine, Tussédyl, Zoocytine*.

Société Française de Produits Pharmaceutiques (Anc. Adrian et Cie), 9 et 11, rue de la Perle, Paris. — Arrhénal Adrian, Bismuth Adrian, Carbo-Bismuth Adrian, Carbonate de chaux Adrian, Chloroforme Adrian, Chlorure de Magnésium Adrian, Chlorure d'Ethyle Adrian, Endocaïne, Ether anesthésique Adrian, Hupnosol Adrian, Hydrate de Magnésie Adrian, Mélange Anesthésique A. C. E., Mélange de Schleich, Progadol, Radiobaume Adrian, Révulsif Adrian, Sul'urine du D^r Langlebert, Toni-Pectoral Adrian, Velledol Adrian.

Lab. du Sodésyl, Vierzon (Cher). — Comprimés Luc, Edalgine, Electralgine, Iodo-Dépuratif Jacquet, Sodésyl, Venisette.

Étab. Soudan, 48, rue d'Alésia, Paris. — Ampoules Boissy (Iodure d'Ethyle), Ampoules Boissy (Nitrite d'Amyle), Biophorine Girard, Bromomaisine, Caséoline Girard, Diabétosan, Euonymine Thibault, Glycérophosphate de chaux, Granulé Girard, Iode organique Boissy, Iodomaisine, Lactagol, Laxatifs Miraton, Laxopeptine Girard, Nucléo-Fer Girard, Oléocidase Thibault, Oléosodine P. Thibault, Sirop Girard, Valérium Thibault, Vasogènes Pearson, Vin Girard.

Lab. Souffrice, 16, rue de Gramont, Paris (II^e). — Rhino-Sulforgan.

Lab. du Soufre Organique, 16, rue de Gramont, Paris (II^e). — Sulforgan.

Lab. E. Soulié, 21, rue Mouton-Duvernét, Paris (XIV^e). — Argyseptine, Citrilex.

Lab. Souriguère, Angoulême (Charente). — Orthoneurol.

Lab. du Spasmonéural, 239, cours de l'Yser, Bordeaux. — Spasmonéural.

Spécialités Phargène, Vial et C^{ie}, 8, rue Vivienne, Paris. — Voir Lab. de Pharmacologie générale.

• **Specia** (Sté Parisienne d'Expansion chimique), 21, rue Jean-Goujon, Paris. — Acétylsarsan, Alunozal, Alvoricine, Anthéma, Anthiomaline, Asciatine, Balsoforme, Baume Rhodia, Bévitine, Coryphédrine, Crisalbine, Diagnothorine, Dmelcos, Ergorone, Flétase, Foriod, Gardenal, Gélobarine, Gonacrine, Hexorcène, Huile de foie de morue médicinalement suractivée Rhône-Poulenc, Hyrganol, Myochryesine, Néocardyl, Néo-Dmegon, Néo-Dmèlys, Néptal, Novarsénobenzol Billon, Ortédrine, Ovo-Lécithine, Pâte Gingivale, Pragmoline, Prémaline, Propidex, Propidon, Prosympal, Quinacrine, Quinio-Praequine, Quinio-Stovarsol, Rénaleptine, Rhodarsan, Rhodazil, Rhodiacarbène, Rhodoquine, Rhoféine, Rodilone, Rubyl, Rutonal, Sanédrine, Scurocaïne, Scuroforme, Septazine, Soluseptazine, Soneryl, Stovaïne, Stovarsol, Strychno-Gardénal, Tabédo, Thyro-Gardénal, Tochlorine, Tryparsamide, Urazine, Vaccins atoxiques stabilisés, Vilascorbol.

Lab. Spes-Guiraud, 10, impasse Millord, Paris (XVIII^e). — Elixir Spes du D^r Guiraud, Tubes du D^r Guiraud.

- Lab. du Stearol**, 5, r. E.-Combes, St-Etienne (Loire). — *Jennol*, *Lenior Bonnet*, *Pommade Acar*, *Stearol*.
- Lab. Stelvia**, 59, rue Boissière, Paris (XVI^e). — *Bromésérine*, *Carbo-Combrosmol*, *Combrosmol*, *Equisétol*, *Foliavène*, *Granulé Edgès*, *Mixalthyl*, *Opodigestifs*, *Phytomensyl*, *Plasthamélyne*, *Pulsamone*, *Tisane Ferlys*.
- Lab. Sténé**, 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e). — *Atocrazine*, *Baume Crésa*, *Bilifluine*, *Bouillon vaccin opératoire Sténé*, *Crésopirine*, *Crésotanol*, *Cryptotoxyl*, *Dissolvansan*, *Flavurool*, *Fluxidia*, *Hémato-iodine*, *Hypocholate*, *Sténergine*, *Triase*, *Urifluine*, *Vaccin anti-pyogène Sténé*, *Vaccin antistaphylococcique Sténé*, *Vaccins Sténé*, *Vaccins* (anti-asthmatique, anti-pneumonique, anti-grippal) du Professeur Minet.
- Lab. H. Stouls**, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — *Balsaine*, *Borinhalant*, *Columiel*, *Comp. Aseptuter*, *Cyalène*, *Ephodol*, *Galégalactol*, *Gardorinol*, *Hemostase*, *Iodogargyval*, *Laxaflor*, *Pangastrol*, *Pan-Neurol*, *Paquets Solubles O. R. L.*, *Passacanthine*, *Roburex*, *Suppuestaline*, *Tonique Dulciane*.
- Lab. G.-R. Strohl**, 2, r. Sédillot, Strasbourg (Bas-Rhin). — *Cutobronchyl*, *Cutopralgine*.
- Lab. Substantia**, 13, rue Pagès, Suresnes. — *Anusol*, *Cal-Mag-Na*, *Loraga*, *Molagar*, *Panosan*, *Vasonitryl*, *Véganine*, *Vince*.
- Lab. Substantia**, 53, r. du Poinçon, Bruxelles. — *Agarol*, *Anusol*, *Cal-Mag-Na*, *Vasonitryl*, *Véganine*.
- Lab. Sujal**, 62, rue de la Brauderie, Châteauroux (Indre). — *Fletagène*, *Mensival*, *Neadol*.
- Lab. Sulfo-Thiorine**, 39, r. Fondaudège, Bordeaux. — *Bacturyl*, *Balsosantol*, *Hypo-Thiorine*, *Inhalo-Thiorine*, *Pulmo-Thiorine*, *Sulfo-Thiorine*.
- Lab. du Sulfoxal**, 48, rue Claude-Lorrain, Lille. — *Sulfoxal*.
- Lab. Synops**, 84, rue du Faubourg-du-Temple, Paris (XI^e). — *Agonoccine*, *Aseptoline Freysse*, *Cardiovasyl*, *Colliodure*, *Dynamose*, *Jodal*, *Laxalates*, *Néoglobuline*, *Panpectose*.
- Lab. Tachot**, 103, rue St-Lazare, Paris (IX^e). — *Gouttes de Seru*, *Psyllium Langlebert*.
- Lab. du Dr Talon**, 153, bd Montparnasse, Paris. — *Focalyne*, *Histonyl*, *Pommade Talon*, *Tisane Talon*, *Solution Talon*, *Vin Anti-Diabétique Talon*.
- Lab. de la Tamarine**, 4, route du Médoc, Le Bouscat (Gironde). — *Tamarine*.
- Lab. L. Tattevin, Dr en Pharmacie**, 3, r. E.-Burgault, Vannes. — *Asthmosine*.

- Lab. P. Tavernier**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Biopausine*, *Ergocoline*, *Hépax*, *Inhalo-bol*, *Inhalo-sel*, *Leucolyse*, *Phospho-Gaïacol Mary*, *Polytonyl*, *Prefagyl*, *Reconstituant Mary*.
- Lab. de Technique Thérapeutique, M. Coudert**, 37, rue de la Haie-Coq, Aubervilliers (Seine). — *Ampoules auto-injectables Acron*, *Cardi-Acron*, *Dyn-Acron*.
- Lab. Terrasse**, 2, rond-point du Centre, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ovucridine*, *Ricigonol*.
- Lab. Teyssède**, 74, fg d'Angoulême, Limoges. — *Sirop Teyssède*.
- Lab. Thaïdelmo**, 11, Chaussée de la Muette, Paris (XVI^e). — *Antraxone Fornet*, *Blennosine Fornet*, *Grippol Fornet*, *Héparcyl*, *Insuline Fornet*, *Néosuline*, *Pom-made Fornet*, *Tébéphaguine Fornet*.
- Lab. A. Thepenier**, 10, rue Clapeyron, Paris. — *Amylodiastase*, *Bulgarine Thépenier*.
- Lab. de Thérapeutique Antirhumatismale, Sarein**, 14, av. Perrichont, Paris. — *Alcalax*, *Asfarol*, *Babydermine*, *Belladoforme*, *Bichlorhydrol*, *Bromoquietol*, *Bronchonal*, *Entérorubiasé*, *Entérosalicyl*, *Escaïne*, *Gastrocolase*, *Glucosalyl*, *Histalgine*, *Myotonine*, *Parbelle*, *Pulmonase*, *Saliquinol*, *Sulfosalyl*.
- Lab. de Thérapeutique O. R. L.**, 72, rue de Bagneux, Montrouge. — *Aminoléine*, *Otoléine*, *Pharyngoléine*.
- « **Théraplax** », Sté générale d'Application thérapeutique, 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — *Dycholium*, *Gynoplax*, *Ifranol*, *Ixiun*, *Mandelium*, *Nitium*, *Nujol*, *Réalphène*, *Sédol*, *Septoplax*, *Sirop Efryl*, *Spasedol*, *Supponeryl*, *Supposédol*, *Vaccins Demonchy*, *Véronidia*.
- Lab. Thérinex, R. Condé, Pharmacien**, 6, r. de Dunkerque, Paris. — *Icorase*, *Stinergyx*, *Viabylis*.
- Lab. Thévenot**, 21, rue des Roses, Dijon. — *Azigol*, *Borocalcyl*, *Choléoboldine*, *Eupnéol*, *Juniodyl*, *Lacto-fermentine*, *Phoshémoquinol*, *Santurool*, *Thiocitran*, *Triseptol*.
- Lab. Thiers**, 3, place Thiers, Le Raincy (S.-et-O.). — *Erythraseptol*, *Suppoquinol*.
- Lab. Thiriet et Cie**, 26-28, rue des Ponts, Nancy. — *Paroxyl*.
- Lab. Thirode**, 33, Gde-Rue, Besançon. — *Belcarmine*, *Eczémine*, *Génécarmine*, *Gorgex*, *Hydramélis*, *Naziline*, *Omonos*, *Pilules Norma*, *Sédorgine*.
- Lab. L. Thomas**, 33, fg Montmartre, Paris. — *Asthmenthol*, *Baume Thomas*, *Héganol*, *Huile de Haarlem*, *Purgettes Lentilhac*, *Rhinadorine*, *Terbinthiol*.
- Lab. Thoral**, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme). — *Bronchsa-mine*, *Diuréphédrine*, *Ephédrasmine*, *Garéphédrine*.

- Lab. Tifféneau**, 24, rue de Monttessuy, Paris. — *Génoderme*, *Nefitol*, *Pastilles Violettes A. B. C.*, *Polysodine*, *Purgalax*, *Vin Tonic Tiffeneau*.
- Lab. G. Tinard**, 134, bd Pereire, Paris. — *Dulcilax*, *Pangestyl*, *Salypsol*.
- Lab. du D^r G. Tissot**, 34, bd de Clichy, Paris. — *Bronchodermins*, *Charbon Tissot*, *Diasto-pepsine*, *Gérasol Gimon*, *Magnecythine*, *Nervocithine* (*Hépatocithine*), *Panuro*, *Supparyges*.
- Lab. du Tophol**, 3, rue Condillac, Grenoble. — *Tophista*, *Tophol*.
- Lab. Torau**, 22, rue de la Sorbonne, Paris. — *Antimycose*, *Bain Flévar*, *Bronchotonine*, *Campophopneumine*, *Diumnal*, *Ephédrolénol*, *Flébosanine*, *Gluti-Santal*, *Hypos-trontium*, *Hyposulfène*, *Iodassium*, *Iodosulfène*, *Jabosulfène*, *Leucagine*, *Levure B. 17*, *Néo-Trépol*, *Précibiase*, *Psychobiases*, *Rectagine*, *Réthragine*, *Sorbo-calcion*, *Sornyal*, *Spirochlan*, *Staprolysat*, *Trépol*, *Trépoquinol*, *Ultra-Levure*, *Vin Raci-Bel*, *Yptor*, *Zymostol*.
- Lab. du Total Magnésien**, 24, bd Sébastopol, Paris. — *Total Magnésien*.
- Lab. Trouette-Perret**, 61, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Aphloïne*, *Ispaghul*, *Lofodol*, *Oponucyl*, *Papaïne*.
- Union Chimique et Biologique**, 5 et 7, rue Claude-Decaen, Paris (XII^e). — *Iocasine*, *Mitosyl*.
- Lab. Unis-Spès**, 14, rue Demarquay, Paris (X^e). — *Algophagine*, *Artil*, *Carboléine*, *Dépuratif Nox*, *Epocl*, *Exona-gar*, *Flétonic*, *Fluxivenol*, *Gastiasse*, *Hémotal*, *Hépatodiase*, *Nox*, *Santalex*, *Sels Marva*, *Stomalex*, *Tercodal*, *Vacciderm*.
- Lab. de l'Urocholine**, 20, place de la Mairie, Parc-St-Maur (Seine). — *Urocholine*.
- Lab. de l'Uroclarol**, 117, rue Victor-Hugo, Houplines (Nord). — *Buchobléu*, *Sirop de Sulfogaiacolate de Potasse du D^r Henry*, *Thymoseptol*, *Uroclarol*.
- Lab. de l'Uroclase**, 95, rue de Prony, Paris. — *Cathacide*, *Cholal*, *Uroclase*.
- Lab. de l'Uroflux**, 21, rue de Lyon, Paris (12^e). — *Anucalm* (suppositoires), *Métricure* (poudre et ovules), *Mictosédine* (cachets), *Prostalyse*, *Sédomicol* (capsules), *Uroflux*, *Variphile*.
- Lab. de l'Uroïdine**, 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e). — *Lactosodine*, *Uroïdine*.
- Lab. Uromil** (L. Bélières, D^r en Pharmacie), 19, r. Drouot, Paris. — *Uromil*, *Radio Salil*, *Vitagar*.

- Lab. de l'Urosiphon**, 1, r. de l'Odéon, Paris. — *Cachets de Sidérol PEM, Névratine Rosey, Pastilles Lezin, Urosiphon, Vin Rénovateur Huchédé.*
- Lab. de l'Urticide**, 2, rue Michelet, Alger. — *Ioglott, Urticide.*
- Usines Chimiques des Laboratoires Français**, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Calciodyl, Myovarsyl, Prévarsyl, Uclarsyl.*
- Lab. de l'Uvéoline** (M. Ambard, Pharmacien), Carces (Var) — *Uvéoline. Uvéovules.*
- Lab. des Vacins en Plasma marin**, 17, rue de Sauve, Nîmes (Gard). — *Vaccins Antibrucelliques, Polymicrobiens.*
- Lab. du Vagosédyl**, 22, rue des Martyrs, Paris. — *Sulfolax, Utersan, Vagosédyl.*
- Lab. de Vagothérapie**, M. Crozet, docteur en pharmacie, Saint-Venant (P.-de-C.). — *Vagogastryl.*
- Lab. Vaillant**, 19, r. Jacob, Paris. — *Audigénine, Pancréastase Defresne.*
- Lab. Vaille**, 1, rue du Puits-de-l'Ermite, Paris (V^e). — *Dermylène Vaille, Sympathomine.*
- Valentin Aage Moller**, 149, r. du Palais-Gallien. et 39, rue Fondaudège, Bordeaux. — *Insuline « Leo », Insuline Retard « Leo », Seringues « Leo », Leotamine, Sanocrysine et Oléo-Sanocrysine de Mollgaard, Sulfosine « Leo », Exhepa, Metallosal « Leo ».*
- Lab. de la Valthène** (A. Valat), 166, rue de la Roquette, Paris (XI^e). — *Valthène.*
- Lab. de la Val'Ovarine Farma**, 1, av. Eug.-Thomas, Kremlin-Bicêtre (Seine). — *Hémovaryl Farma, Pept'iode Farma, Val'Ovarine Farma.*
- Lab. Valtry**, 122, Champs-Élysées, Paris. — *Asmocrine, Curozema, Oposérothérapie Valtry, Pediozema, Vagosédyl.*
- Lab. de la Varilaxine**, Surgères (Ch.-Inf.). — *Gargarisme du Mont-Dore, Rectoline, Rectosol, Sédacrine, Varilaxine.*
- Lab. Védé**, 2, pl. Gambetta, Paris. — *Hépalomel, Paquets Védé, Menthe Védé.*
- Lab. F. Vellay**, 116, av. Berthelot, Vienne. — *Biophylactine (dragées), Eupnogénol.*
- Fabrique Vendéenne de produits pharmaceutiques**, 10, rue Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée). — *Angéiol, Mucoflogose, Néphractive.*
- Lab. Venot**, 139, av. Émile-Zola, Paris (XV^e). — *Bain Salvia, Pilules Salvia, Santonia, Tensopan, Vérogénol.*

- Lab. E. Verdon, Pharmacien, Celles-sur-Belle (D.-S.).** — *Choleo-Fluase, Colave, Gasmanyl.*
- Lab. Ch. Vergelot, 6, rue de Navarin, Paris.** — *Bromogastrique, Hépatoglobine, Oposclérine, Prolyses, Roziode, Urobleu.*
- Lab. opothérapique E. Vergelot, 163, rue de Flandre, Paris.** — *Ampolases, Amyliodine, Anti-Anémique F. F., Déméteros, Henrick's bill, Opolases, Mangratines, Matéine Dufert, Morrhuxine, Paquets P. G. L., Nucléasine, Panfito, Pastilles Saint-Christau, Sédo Viète, Siforcina, Sirop Viète, Splénose, Transfusine, Triseltz, Zistasine.*
- Lab. du Dr Vermersch, 18, rue des Écoles, Paris (V°).** — *Bromure de Calcium, Chlomag, Pofénane, Prunagar, Sirops Henry Mure, Syseros, Tartroborol.*
- Lab. Verne, 13, rue Dr Mazet, Grenoble (Isère).** — *Boldine Verne, Boldo Verne, Pulmoverne, Sulfex.*
- La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris (XV°).** — *Diathermie, Infra-Rouges, Ultra-Violets.* — *Appareils galvaniques, faradiques, galvano-faradiques, de haute fréquence.* — *Electrodes de haute fréquence.* — *Accessoires d'électricité médicale.* — *Cautère-Lumière.*
- Lab. Vial, 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.** — *Artériolex (ou Minéralogène), Sel Vial.*
- H. Vial, Pharmacien, 36, pl. Bellecour, Lyon.** — *Vin de Vial et Sirop du Vin de Vial.*
- Lab. E. Viel, 37, av. de l'Opéra, Paris.** — *Usine à Rennes, 11 et 12, bd de Chézy.* — *Iodargol, Iodeol, Iodéopirine, Ovules à l'Iodéol, Salicairine.*
- Lab. du Vicalphos, 48, r. St-Jean, Lyon.** — *Vicalphos irradié, Vicalphos simple.*
- Lab. Vigier (J. Huerre et Cie), 9, r. de la Gare, Levallois.** — *Albuplast, Aristoplast, Aristoplastic, Crème Mégève, Crème de Lainine, Extensoplast, Furoplast, Hermoplast, Kiroplast, Lactophorine, Manganifer.*
- Lab. Vigier-Lesure, 70, rue du Bac, Paris (VII°).** — *Arquéritol Lesure.*
- Lab. Vigor, 26, chaussée de la Madeleine, Nantes (L).** — *Ampoules Vigor.*
- Lab. Vincardi, 14, av. G.-Clemenceau, Nice.** — *Artérion Vincardi.*
- Lab. Vincent, 14, av. Mac-Mahon, Paris.** — *Angitan, Cholestine, Iodocaïne, Nigérine.*
- Lab. du Vinocrinol, 30, rue de Sète, Longuyon (M.-et-M.).** — *Iodosclérol, Vinocrinol.*
- Labo-Vita, 190, bd Haussmann, Paris.** — *Urovitine, Vitacholine, Vitacuro.*

Lab. du Viophan, 81-83, rue de Lille, et 10, rue des Arts, Roubaix. — *Viophan, Organi-calcion simple, Organi-calcion endocrinien polyvitaminé, Rhino-Colloïdol.*

Lab. Virultra, Launay-Serquigny (Eure). — *Vaccins injectables, Vaccins-pansements et Vaccins buvables Virultra.*

Lab. du Vitorange, 1, rue de la Rochette, Melun (S.-et-M.). — *Vitorange du Dr Barillot.*

Lab. Vogein, 2, 4 et 6, rue des Deux-Ponts, Paris (IV°). — *Freinoluléine, Panlutéine, Hormolutéine.*

Produits Wander, P. Bastien, pharm., Champigny-sur-Marne (Seine). — *Alcacyl, Alucol, Cristolax, Formitrol, Héparéguline, Jémalt, Pepso-Pancré-Malt. Pneuma.*

Sté anonyme des Étab. Wander, 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine). — *Carottase, Glomalt (Malt Wander), Maltosan, Nutromalt, Ovomaltine, Végumine, Veguva (Voir Produits Wander).*

Lab. Warin, 4, chaussée de la Muette, Paris. — *Bucmine, Cachets Rava, Citrocarbène, Citrofluyl, Edulax, Fidulax, Hépatogastrique, Hermostyrum, Hydrogemmine Lagasse, Inhaloxyl, Juglamarine, Micturyl, Ozothine, Panfortan, Psycho-Neuryl, Sirop Irsi, Staphydex.*

Lab. Weber, 76-78, rue Dareau, Paris. — *Glyco-Thymoline, Vaseline Chesebrough.*

Lab. A. Welcker et Cie, 72, rue du Commerce, Paris. — *Bacté-Ricyl, Sanas.*

Lab. des Produits Xanthorryl, 36, r. de la Tour d'Auvergne, Paris. — *Xanthorryl.*

Lab. de la Yaourtine (L.-J. Mounier), 18, pl. Laborde, Paris. — *Yaourtine.*

Lab. Yldra, 20, rue Antoinette, Paris. — *Philoderme Yldra.*

Lab. Yvrard, 17, rue Soufflot, Paris. — *Cérébro-lipase, Ouproformine, Helguerol, Pneumolipase.*

Lab. du Docteur Zizine, 24, rue de Fécamp, Paris (XII°). — *Agocholine, Entéropansement, Gastropansement, Lait Calciqne Zizine, Peptodiase, Sédogastrine, Vivoléal.*

Prod. Zyma. — Dépôt général, Lab. Lobru, 92, rue Bobillot, Paris (XIII°). — *Hémosamine, Tablettes Hova, Levure Mycéta en comprimés, Lipodéterpénol, Gouttes Filka, Themsaline, Viscum Zyma.*



